

*Bibliothèque numérique*

**medic@**

**Baumes, Jean-Baptiste. Fondemens  
de la science méthodique des  
maladies, pour servir de suite à l'essai  
d'un système chimique de la science  
de l'homme...**

*Montpellier, chez l'auteur et à l'Ecole de médecine,  
1802.*

*Cote : 32362*



**(c) Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris)**  
Adresse permanente : <http://www.bium.univ-paris5.fr/hist/med/medica/cote?32362x04>

# FONDEMENS

DE LA SCIENCE MÉTHODIQUE

DES MALADIES.

## FONDEMENTS

L'Auteur de cet ouvrage, mis sous la sauve-garde de la loi, déclare comme des contrefaçons dont il se réserve de poursuivre les *Auteurs* et les *Débitans*, les exemplaires qui ne seront pas revêtus de sa signature au verso du premier frontispice de ce volume.

**FONDEMENTS**  
**DE LA SCIENCE MÉTHODIQUE**  
**DES MALADIES,**

*POUR servir de suite à l'essai d'un  
système chimique de la science de  
l'homme, et d'introduction à la  
nosologie clinique que va bientôt  
publier le même Auteur ;*

Par J. B. TH. BAUMES,

Ci-devant Professeur de médecine en l'Université de  
Montpellier, etc., etc.

Aujourd'hui Professeur de pathologie, météorologie et  
nosologie à l'école de médecine de Montpellier ; Prési-  
dent de la Société de médecine-pratique de Montpel-  
lier, et rédacteur général de ses annales ; Secrétaire  
perpétuel de la Société de médecine du Gard ; Associé  
de la Société de l'école de médecine de Paris ; Mem-  
bre des Sociétés de médecine de Paris, Bordeaux,  
Marseille ; des Académies du Gard, de Vaucluse, de  
Dijon ; de la Société galvanique de Paris, séante à  
l'Oratoire, etc., etc.

TOME QUATRIÈME.

32362

A MONTPELLIER,  
Chez l'Auteur et à l'École de Médecine.

AN XI — 1802.

FONDEMENTS  
DE LA SCIENCE MÉTHODIQUE  
DES MALADIES

Le but de ce livre est de servir de base à l'étude des  
systèmes classiques de la science de la médecine,  
et de leur application à la pratique de la médecine.  
Il est destiné à servir de manuel pour les étudiants  
de la Faculté de Médecine de Paris.



PARIS, CHEZ M. MONTPELLIER,  
RUE DE LA HARPE, N. 105.

---

## AVERTISSEMENT.

---

L'IMPRESSION de cet ouvrage est commencée depuis plus de deux ans ; des circonstances, dues à un changement de domicile et aux peines que l'on trouve à soigner les épreuves d'un livre qui ne se publie pas immédiatement sous les yeux de son auteur, ont été les principales causes du retard qui a été apporté à son exécution. Demandés de toutes parts, attendus avec la plus vive impatience, sollicités par les nombreux élèves de l'illustre école dont j'ai l'honneur d'être membre, ces *fondemens de la science méthodique des maladies*, dont la doctrine m'appartient exclusivement, et dont la distribution a été pressentie par un opuscule que j'ai fait paroître en l'an VII, sous le titre d'*essai sur un système chimique de*

vj

*la science de l'homme*, voient enfin le jour, au milieu des grandes occupations que me donnent les devoirs publics de l'enseignement, et l'exercice privé de la médecine pratique.

Praticien extrêmement répandu depuis nombre d'années; professeur de médecine dans l'ancienne et florissante Université de Montpellier; toujours chargé, dans la distribution de l'instruction, de l'histoire des maladies et de l'analyse clinique des remèdes que l'expérience et l'observation ont appris à diriger contre elles; j'ai dû m'occuper sérieusement de leur classification, dans l'ordre que j'ai cru le plus propre à les enchaîner d'une manière méthodique.

Tous les gens instruits ont suffisamment remarqué les avantages nombreux que les classifications portent dans l'étude des sciences: ces avantages ont été posés par la nature elle-même qui, en ne créant que des individus, a cepen-

dant en l'attention de diriger notre esprit du côté de l'utilité des méthodes. Classifier, c'est comparer; les objets qui se présentent en foule à notre examen pourroient-ils jamais se retracer clairement, si, après de sages analogies, on ne parvenoit ou à les rassembler ou à les placer par séries, de manière que les connoissances plus parfaites à acquérir sur chacun d'eux, fussent en quelque sorte successives; c'est-à-dire, que les lumières acquises sur les premiers objets fussent les conditions qui nous facilitent la connoissance des seconds.

En plaçant, au commencement de chacune de mes classes, une introduction qui fait connoître sous quel rapport on doit considérer l'économie animale dans un cadre donné d'affections morbides, et à la fin de chacune d'elles une conclusion qui montre la nuance qui s'établit d'une de ces affections à l'autre, j'ai rendu ma méthode aussi

vii

recommandable qu'elle peut l'être, et j'ai indiqué l'avantage qu'elle peut avoir sur toutes les distributions connues. Mais l'époque à laquelle j'écris, et qui est celle où l'étude de la chimie animale est goûtée par tous les bons esprits, où les médecins commencent à sentir que l'union de la chimie et de la médecine doit être à jamais inséparable, est aussi celle où, faute de connoissances assez approfondies, il est le plus facile d'errer. Si mes fautes sont profitables à la science, aurai-je lieu de m'en repentir ? Au reste, nul ne m'a devancé dans cette carrière, le sentier que j'ai parcouru n'a été défriché que par moi, et on peut, sans honte, tenir quelque fausse route dans des régions inconnues.

Ce n'est pas que je n'aie été aidé par les travaux partiels de plusieurs médecins ou chimistes auxquels la science doit ses plus beaux progrès. On seroit

bien étranger à son histoire ainsi qu'à ses découvertes , si l'on ne connoissoit pas tout ce dont elle est redevable aux génies inventifs de FOURCROY , de VAUQUELIN , de ROLLO , de BEDDOES , de GIRTANNER et de tous ceux qui travaillent aujourd'hui , en physique et en médecine , sur un plan neuf , sur celui qu'a tracé la chimie , dont les préceptes , les analyses et les discussions vivifient la très-grande partie du système général de nos connoissances.

Mais personne n'avoit songé à profiter de ces travaux , à les encadrer , à les enrichir des résultats de l'induction et de l'analogie , sur-tout à placer les causes fondamentales de toutes les maladies , hors celles qu'il faut imputer à quelques violences accidentelles , dans la prédominance d'un des principes élémentaires et dans les combinaisons extra-naturelles qui se forment alors. Plus j'ai réfléchi aux conséquences qui en

æ

sont la suite , et plus j'ai vu que l'économie ne souffre véritablement que par l'accumulation , l'aberration ou l'écoulement des substances propres aux corps des animaux ; et c'est dans ce sens qu'il est vrai de dire que nous portons , au dedans de nous , les causes de nos maux et les principes des désordres auxquels notre mécanisme peut être en butte.

Depuis que j'ai publié mon *essai d'un système chimique de la science de l'homme* , titre dont , pour le dire en passant , il seroit facile de prouver la justesse , on a vu divers écrits , trop appuyés sur les connoissances fournies par la chimie , pour ne pas faire croire que les médecins *philosophes* , comme on veut bien les appeler , aiment à tourner leurs vues vers les applications judicieuses de cette science à la médecine ; et qu'ils sont plus prêts d'adopter le partage de toutes les maladies , tel qu'il est fait dans cet ouvrage , que ne

pourroient le faire croire des médecins qui doivent d'autant plus devenir chimistes , que les vraies connoissances médicales leur seront moins étrangères. Il suffit effectivement d'entrer dans la carrière pratique de la médecine , pour se convaincre de l'incurabilité de plusieurs maladies , de la difficulté de triompher d'une foule d'autres , parce que ni les connoissances anatomiques , quoique très-avancées de nos jours , ni les faits accumulés par la médecine clinique , n'ont pu nous éclairer sur leur nature. On cherche par exemple à fonder les embarras des viscères , sans connoître en aucune manière la qualité des matières qui les obstruent. On agit donc alors en empyriques ? c'est-à-dire qu'en suivant la méthode qui s'arrête aux faits de l'expérience , sans chercher à en déduire les résultats , on se livre , sans le savoir , à des analogies imparfaites , et l'on ne confie ainsi qu'au hasard la justesse des applications qu'on a tentées.

*xij*

( *Voy.*, sur les vices du dogmatisme et de l'empyrisme, M. DEGERANDO, *des signes et de l'art de penser*, tom. III, pag. 352 et suiv. )

Sans doute, ce qui nuit le plus à l'adoption des nouvelles méthodes, est ce que beaucoup de gens appellent leur expérience, sans s'apercevoir qu'elle n'est que la réunion de leurs habitudes, c'est-à-dire, de ce qui tend à nous faire répéter toujours ce que nous avons déjà fait. Ces obstacles ont trop souvent l'erreur pour base, pour qu'on puisse en faire compte dans la recherche de la vérité ! Mais ces habitudes, auxquelles se rattachent les mêmes idées, ne laissent pas que de faire condamner des doctrines auxquelles la science médicale pourra devoir une grande partie de ses progrès. C'est ainsi, pour en donner un exemple, qu'après avoir feint que la théorie chimique, quelque ingénieuse qu'elle soit, a ce premier défaut, qu'au-

cune expérience comparative directe , faite sur l'être vivant dans l'état de santé et de maladie , ne lui sert de fondement ; on lui a reproché de reproduire , dans une latitude indéterminée , le système de la pathologie humorale , dont les médecins *philosophes* ( encore des philosophes ! c'est la mode de les placer partout ; ) avoient sagement circonscrit le domaine. C'est donc à dire qu'un système de chimie animale ne peut point être vrai , parce qu'il revivifie la doctrine des humeurs que proscrivent les *solidistes*. En croyant de très-bonne foi à l'existence d'un principe conservateur et réparateur des êtres : force singulière qui les soutient contre la puissance physique , laquelle tend toujours à leur décomposition , qui agit indépendamment des lois mécaniques , physiques ou chimiques , et qui ne laisse plus de traces de sa présence dans les corps que le mouvement de la vie abandonne ; on condamne encore ce

xiv

même système , sans considérer sans doute que le caractère distinctif de l'économie animale y est infiniment mieux déterminé, par sa qualité matérielle et par ses lois qui sont celles de l'affinité ou mieux de la nature , que par les propriétés métaphysiques que lui attachent des médecins qui devroient savoir que l'interprétation d'un fait est souvent très-arbitraire , et que plus d'une fois on l'a fait plier forcément en faveur de ce qui n'est au fond qu'une pure hypothèse.

En écrivant cet avertissement , je ne voulois que dire quelque chose sur la nomenclature adoptée dans cet ouvrage , et sans y prendre garde j'en ai défendu la doctrine, comme si des mots étoient toujours des argumens solides. Ce n'est point parce que la chimie a créé sa langue , que j'ai désiré que la pathologie reformât la sienne. L'imperfection d'une nomenclature est ordinairement

le résultat de l'imperfection des connaissances elles-mêmes. D'un autre côté on ne peut aspirer à établir une langue parfaitement méthodique, dans laquelle la liaison des mots entr'eux représente fidèlement l'enchaînement qui existe entre les faits, et dans laquelle les règles du langage ne sont, en quelque sorte, que l'expression des lois générales observées dans les phénomènes de la nature (a), que lorsqu'une science est arrivée au dernier terme de ses progrès : cependant, lorsqu'on n'a souvent dans la nomenclature d'une science, que des périphrases au lieu d'un nom, ou des dénominations si vicieuses qu'elles font prendre le change sur la nature de la chose qui doit être désignée, un nosologiste n'a rien de mieux à faire que de recréer la langue avec laquelle il doit transmettre ses principes et ses détails.

---

(a) Voy. M. DEGERANDO, ouvrage cité, pag. 198.

Cependant j'avoue que , quelque disposé que je fusse à me conduire d'après ce que je viens de dire , ayant à établir une doctrine nouvelle , je n'ai pas voulu la hérissier de ce que j'ai craint qu'on appellât *néologismes*. Pourquoi , relativement aux sciences , faut-il tant respecter l'empire de l'opinion ! Les mots dont je me suis servi , à l'exception de ceux qui désignent les *classes* , ont presque toujours été empruntés de quelque nosologiste ou de quelque écrivain de la médecine ; à la vérité j'en ai quelquefois dévié l'emploi , sur-tout à l'égard des *genres* qui , formant des êtres factices , valaient peut-être moins la peine que l'on s'astreignît aux dénominations reçues , que pour les *espèces* , qui sont ce que les médecins voient et doivent voir. La manière dont j'ai considéré les fièvres m'a sur-tout déterminé à ne les prendre jamais que comme des *sous-genres* ou des *espèces* , puisqu'enfin la même cause matérielle existant avec

fièvre

fièvre ou sans fièvre, il est évident que c'est la cause qui doit donner son nom au *genre*, et la fièvre à l'une de ses principales divisions. Aussi ai-je bientôt abandonné les noms que j'avois choisis pour désigner chaque genre de fièvre; je ne les ai pas même proposés dans les synonymies, quoique je ne puisse qu'approuver ceux qui adoptent des noms génériques ou spécifiques expressifs. Parmi ceux qui méritent mes éloges sous ce rapport, je ne peux m'empêcher de citer M. le docteur SWEDIAUR qui, dans sa *pharmacopée universelle du médecin praticien*, publiée en latin en l'an XI, s'est servi de quelques termes nouveaux que je rappellerai ici, parce qu'il n'en est pas question dans mes synonymies.

Ataxie, <i>ataxia</i> ;	Sensibilité et mobilité morbifiques du système nerveux.
Bléchropyre, <i>blechropyra</i> ;	Typhe ou fièvre lente nerveuse.
Sapropyre, <i>sapropyra</i> ;	Synochus ou fièvre putride.

b

## xcviiij

Cnesme , <i>enesmus</i> ;	Prurit.
Dialeypire , <i>dialeypira</i> ;	Fièvre intermittente.
Eréthisme , <i>erethismus</i> ;	Irritabilité morbifique.
Hæmorrhæe , <i>hæmorrhæa</i> ;	Flux de sang passif.
Helminthiase , <i>helminthiasis</i> ;	Maladies par les vers dans les intestins.
Malacostéon ,	Ramollissement des os , cachexie rachitique , rachitis.
Myodynïe , <i>myodynia</i> ;	Douleur rhumatique des muscles , des membranes ou des tendons , ou rhumatisme chronique.
Myosite , <i>myositis</i> ;	Inflammation des muscles ou des tendons , ou rhumatisme aigu.
Æstromanie , <i>æstromania</i> ;	Nymphomanie , satyriase.
Orchiocèle ;	Tumeur du testicule , ou hernie humorale.
Phlogopyre , <i>phlogopyra</i>	Fièvre inflammatoire ou <i>synocha</i> .
Rheumapyre , <i>rheumapyra</i> ;	Fièvre rhumatique.
Thyroçèle ;	Bronchocèle ou tumeur de la glande thyroïde.
Uriase , <i>uriasis</i> ;	Maladies par calcul des voies urinaires , ou lithiasis.

Quant aux dénominations dont j'ai fait usage, pour les rendre les plus uniformes possibles, j'ai toujours choisi le nom de l'organe, en quelque sorte, comme le radical, auquel a été associé celui qui caractérise plus ou moins la nature de la maladie. Si la réforme que je desire en ce point, n'a pas été poussée très-loin dans cet ouvrage, j'en ai donné en partie la raison : peut-être que les obstacles que j'ai eu à vaincre dans cette première édition d'un ouvrage majeur, cédant au temps et à la masse des lumières, il me sera permis d'en offrir une seconde perfectionnée et propre à mériter de plus en plus les suffrages des hommes qui accueillent les travaux des autres avec bienveillance, et qui, loin de se tourmenter pour en rabattre le mérite, en profitent s'ils sont utiles, et les font tourner, par une sage critique, à l'accroissement des sciences et au bien de l'humanité.

Cet ouvrage fondamental, à plusieurs égards au moins pour ma méthode d'enseignement, en annonce un autre tout clinique, dans lequel je m'attacherai à décrire toutes les maladies, à analyser sévèrement les indications qu'elles offrent, et à apprécier la vertu des médicamens qu'on emploie trop souvent d'une manière tout-à-fait routinière. Cette nosologie clinique est faite, et, en la livrant à l'impression, je m'acquitterai de ce que je regarde comme une dette sacrée. J'ai travaillé trente années de ma vie à élever un monument à l'expérience, puisse-t-il être durable et utile !

---

---

## EXPOSÉ MÉTHODIQUE

*Des classes, des genres, des espèces  
et des formes des maladies.*

---

### CLASSE QUATRIÈME.

QUELQUES nouvelles que soient les dénominations qui ont été données aux *classes de ces fondemens de la nosologie*, on a vu néanmoins, par leur théorie philosophique, qu'il s'y rattachoit des idées très-précises, propres à embrasser les faits de pratique les plus incontestables. La *classe quatrième* étant destinée aux maladies essentiellement putrides, offre pareillement des notions claires et qu'on ne sauroit rejeter. Dans plusieurs circonstances, les corps vivans renferment, sinon les produits tous formés de la putréfaction, au moins les élémens qui les constituent et qui n'attendent qu'un certain degré de combinaison que quelques obstacles retardent encore. C'est sous ce

*Tom. IV.*

1

( 2 )

rapport généralement vrai, que cette quatrième classe a été établie sous le nom particulier qui en fixe le caractère.

### A Z O T E N È S E S.

*Eth.* d'*azote*, formé lui-même d'*a*, privatif, et *zoos*, vie : base solidifiable du fluide élastique délétère, qui fait la plus grande partie de l'air atmosphérique; et de *nosos*, terme grec qui veut dire *maladie*.

Le mot *azote* est synonyme à privation de la vie : c'est qu'en effet le gaz azote ne peut servir ni à la combustion, ni à la respiration. Mais ce gaz n'est pas plus funeste aux animaux vivans, que les autres fluides aériformes méphitiques. Il ne présente point d'ailleurs l'idée de la putridité qui est l'objet spécial de cette classe, ni des substances composées qui la contiennent. Pour parer à de tels inconvéniens, M. SALTONSTALL a proposé de changer la dénomination d'*azote* en celle de *septon*, mot grec qui veut dire *putride*; et le professeur CHAPTAL a préféré le terme de *nitrogène*. Cependant, malgré les raisons qui ont milité en faveur de cette innovation de nomenclature,

( 3 )

le terme *azote* est resté à la chimie pneumatique, et il a été conservé, en faveur de l'usage, dans ces *fondemens de la science méthodique des maladies*.

Il est suffisamment connu, et on a eu occasion de le rappeler, que les deux principaux ingrédiens de l'air atmosphérique sont l'oxigène et l'azote, en l'état de gaz, simplement mélangés et non combinés, ainsi que l'a prétendu le professeur DAVY. Les proportions indiquées de ces deux gaz, évaluées sur cent parties d'air, sont comme de 3 à 1, et plus généralement de septante-trois de gaz azote sur vingt-sept de gaz oxigène; mais toutes les expériences endiométriques, faites avec le phosphore, indiquent, comme on sait, une proportion d'oxigène notablement moindre, c'est-à-dire de vingt à vingt-deux centièmes seulement. Dans tous les cas, le gaz azote y domine trop pour ne pas indiquer un grand rôle dans les phénomènes de la nature, et plus grand peut-être que celui que jouent d'autres fluides aériformes très-conséquens. Absorbé dans l'acte vital de la végétation, il est changé ou fixé dans quelques-uns des composés qui sont propres aux plantes; et ces corps orga-

( 4 )

nisés expirent le gaz oxigène lorsqu'ils sont frappés par l'action vivifiante de la lumière. Mais c'est dans le système animal que l'azote, après avoir quitté la portion de calorique qui le tenoit sous forme gazeuse, se fait principalement remarquer. La fibrine, les muscles se l'approprient d'une manière spéciale. Sa présence fait, en général, un caractère de l'animalisation, et sa fixation dans les corps vivans, une différence fondamentale entre les principes propres aux animaux et aux végétaux. Si les premiers sont susceptibles de donner de l'ammoniaque dans leur analyse par le feu ou dans les progrès de la putréfaction qui s'en empare très-facilement; c'est à l'azote auxquels ils en sont redevables. Aussi c'est moins du côté de la faculté que le gaz azote possède d'asphyxier et de tuer les animaux, qu'il mérite d'être considéré, puisque cette faculté ne lui est point exclusivement propre, que sous le rapport très-caractéristique d'être un des produits majeurs de la putréfaction animale.

L'azote n'étant qu'un radical ou une base, n'existe jamais seul. Indécomposé jusques à ce jour, il est placé parmi les corps simples ou les substances réputées élémentaires. Mais

( 5 )

fondu par le calorique , il devient gaz azote ; brûlé par l'oxigène , il forme un oxide d'azote ; combiné , en ce dernier état , avec le principe de la chaleur , il constitue l'oxide gazeux d'azote ; enfin , plus ou moins intimement associé à l'hydrogène , au carbone , au phosphore , il présente des substances marquées par une action et des propriétés qui leur sont relatives.

Le gaz azote qu'on obtient facilement , entre autres procédés , en traitant la chair des animaux par de l'acide nitrique foible , est un fluide qui ressemble parfaitement à l'air. Il est insipide ; son odeur est fade , comme animale. Sa pesanteur est à celle de l'air commun dans le rapport de 675 à 720. Il éteint les bougies et asphyxie les animaux. On sait que toutes les substances aériformes méphitiques sont ou acides ou inflammables ou solubles dans l'eau. Mais le gaz azote ne jouit d'aucune de ces propriétés. Il emprunte donc de ces conditions un caractère qui lui est propre. Cependant on aura occasion de faire remarquer que certains composés d'azote , sans être de nature acide , se rapprochent toutefois beaucoup plus des acides que d'aucune autre substance. Ainsi les combinaisons des

principes entr'eux changent la composition des corps , modifient ou dénaturent les affinités , et sont alors susceptibles d'effets qu'ils n'auroient pas pu produire sans cette circonstance.

Deux réflexions découlent naturellement des notions qui viennent d'être rapidement indiquées sur l'effet , en général , du gaz/azote. La première porte sur le danger d'accumuler , dans les chambres des malades , des plantes vivantes sous prétexte d'en purifier l'air ; puisqu'on a déjà fait remarquer que le contact de la lumière est requis pour que les végétaux expirent de l'oxigène. La seconde réflexion est relative aux propriétés que l'on attribue à la flamme , d'assainir certains lieux infectés par des épidémies putrides , puisque alors on consume l'oxigène de l'air qu'on rend conséquemment moins respirable. Si l'on a vu de grandes combustions employées avec succès dans cette intention , en quelques cas ; on en a vu d'autres où elles ont très-mal réussi : témoins la peste de Marseille , celle de Londres en 1665 , la fièvre contagieuse de New-Yorck en 1795 , etc. Ces faits contradictoires et les raisons purement empyriques d'après lesquelles on se guide pour détourner les grands fleaux , ne

prouvent-ils pas la nécessité d'une étude éclairée par les connoissances chimiques. Aussi, pour emprunter les propres expressions de M. GUYTON-MORVEAU (a), que de pratiques sont en contradiction avec les vérités que la chimie moderne a révélées ! que de théories qui ne subsistent que parce qu'elles n'ont pas encore été présentées au foyer de ses nouveaux instrumens ! que d'objets qui demandent à être revus par des observateurs exercés à les manier ! On dit que les exhalaisons des tombeaux ont adouci les ravages faits par certaines épidémies ; et l'on a avancé, paradoxalement sans doute, que les personnes attaquées de fièvre putride s'accoutument mieux d'un air corrompu, comme celui des hôpitaux, que d'un air pur (b).

Si l'azote, à l'instant où il se dégage des substances animales frappées de putréfaction, ou, selon une autre expression, dans l'état naissant, se trouvant en contact avec l'oxigène ou dans sa sphère d'attraction, se combine

---

(a) Désinfection de l'air, pag. 9.

(b) BOYER, essai sur les épidémies ; Montpellier, an XI, pag. 50.

( 8 )

avec lui sans passer à l'état intermédiaire de gaz, par son union avec le calorique ; il en provient un oxide d'azote. On ne peut nier que cette circonstance ne puisse avoir lieu, puisque enfin il se forme quelquefois de l'acide nitreux pendant la putréfaction ; car tous les produits de cet acte ne sont point de nature alcaline comme on pourroit le croire. N'est-ce point par un effet de ces combinaisons directes que l'oxigène de l'air qui entre dans les poulmons à chaque inspiration, s'empare du carbone pour la production de l'acide carbonique, et de l'hydrogène pour la formation de l'eau ? n'est-ce point par une suite du même mode que se constituent plusieurs composés dans l'opération de quelques sécrétions animales, dans lesquelles l'organisation, pour écarter les obstacles à l'union chimique des substances, et produire des composés qu'on ne peut obtenir par aucune voie directe, par aucun mélange pur et simple, n'a d'autre procédé que de priver l'oxigène, l'hydrogène et l'azote du calorique nécessaire pour les maintenir ou pour les faire passer à l'état de gaz, et à rapprocher conséquemment leurs élémens à la distance convenable pour que leur union s'opère ?

Dans l'oxide d'azote, il y a combinaison et non mélange d'azote et d'oxigène; et le calorique n'y surajoute ni son action, ni son effet. Dans l'oxide gazeux d'azote, ou l'oxide nitreux de DAVY, il y a le concours de l'oxigène, de l'azote et du calorique. D'après les faits amplement détaillés par ce chimiste, cent grains d'oxide nitreux sont composés d'environ trente-sept d'oxigène sur soixante-trois d'azote; et ce gaz est tellement remarquable par sa nature que, quoique réellement de la classe des fluides aériformes mortels, il entretient pendant quelque temps la flamme et la respiration; et que, entr'autres propriétés, il a une saveur décidément sucrée et une légère odeur qui n'est pas désagréable: on pourroit ajouter qu'il se rapproche plus des acides que d'aucune autre substance, quoiqu'il en diffère à plusieurs égards.

L'azote se combine avec l'hydrogène pour la formation de l'ammoniaque, dans la proportion, assignée par M. BERTHOLET, de 121 pour l'azote à 29 pour l'hydrogène. Suivant le professeur DAVY, cent grains d'ammoniaque sont composés d'environ quatre-vingt d'azote et de vingt d'hydrogène; ce qui re-

( 10 )

vient à peu près aux données du célèbre chimiste français. Nous ne poursuivrons pas plus loin l'énumération des diverses substances dans lesquelles l'azote entre en quantité plus ou moins remarquable ; il ne s'agit point ici d'un traité de chimie , mais bien de quelques sages applications des principes chimiques à l'art de guérir.

Pour apprécier sainement les effets de l'azote sur l'économie animale , il faut séparer les combinaisons oxigénées de ce principe , des combinaisons hydrogénées ou autres. Les premières sont remarquables principalement en ce que l'affinité qui retient l'oxigène et l'azote n'étant pas forte , l'oxigène se dégage facilement lorsque l'oxide gazeux d'azote peut être décomposé par les matières animales. Aussi , ne doit-on pas être surpris que cet oxide , mêlé avec le sang veineux , opère sur lui des effets analogues à ceux qui sont produits par le gaz oxigène. Il résulte effectivement des expériences tentées par le professeur DAVY , 1.<sup>o</sup> que lorsqu'on agite le sang veineux dans l'oxide nitreux , une portion du gaz est absorbée , tandis que la couleur du sang passe du rouge foncé au pourpre vif ; 2.<sup>o</sup> que pendant

cette absorption , il paroît de petites quantités d'azote et d'acide carbonique ; soit que ces gaz se dégagent du sang ou qu'ils proviennent de la décomposition d'une partie de l'oxide. 3.<sup>o</sup> Que le sang veineux , imprégné d'oxide nitreux , est capable d'oxigénation ; et que le sang oxigéné peut se combiner avec l'oxide nitreux. Cependant l'oxide gazeux d'azote n'a qu'une partie des effets qui sont propres au gaz oxigène ; et il n'en doit pas moins être compté parmi les productions incompatibles avec l'exercice régulier de nos fonctions.

Quelques médecins instruits , convaincus qu'on ne pouvoit enrichir la partie éthiologique de la science de l'homme , qu'en recherchant les causes les plus probables des maladies , dans les composés aériformes qui peuvent influer sur les corps vivans , ont accusé l'azote de prendre une part très-active dans la production de plusieurs affections.

Le professeur REICH a fondé , en très-grande partie sa méthode curative des fièvres sur l'indication qu'il annonce être directe dans ces maladies , et qui consiste dans la nécessité d'oxigéner fortement le système à l'aide des acides minéraux et notamment de l'acide mu-

riatique qui est celui auquel l'auteur donne la préférence. Cette opinion est fondée sur ce que, dans les fièvres en général, il y a selon lui une diminution plus ou moins grande d'oxygène, que M. REICH regarde comme le principe vital calmant, tempérant et négatif; et une augmentation plus ou moins forte d'azote que cet observateur considère comme le principe vital irritant, excitant et positif. On sait que la théorie de M. REICH porte principalement sur ces considérations: que les diverses fonctions du corps humain doivent être regardées comme le résultat des combinaisons chimiques, combinaisons par le moyen desquelles la matière organique est sans cesse modifiée; que ce genre de combinaisons ne sauroit avoir lieu sans l'existence de plusieurs principes d'une nature opposée, et réagissant continuellement les uns sur les autres; que le corps humain se trouvant exposé, d'après la marche générale de la nature, à l'influence des forces chimiques, et l'action de celles-ci étant de réduire les molécules intégrantes à l'homogénéité, il ne peut se conserver ni exister en l'état (*in statu quo*), s'il n'oppose à cette tendance une tendance diamétralement opposée, c'est-à-dire, une tendance vers l'hétérogénéité; que tout

phénomène résultant de l'effet réciproque de deux principes contraires, c'est par une suite de cette loi générale que l'atmosphère est composée de deux principes opposés, le gaz azote et le gaz oxygène, et que, dans l'économie des animaux, ces mêmes principes influent par une juste opposition sur la régularité des fonctions; enfin que tout concourt à prouver que les substances simples, telles que l'azote, l'hydrogène, le carbone, le soufre, le phosphore, modifiées de tant de manières par le calorique, la lumière, l'électrique, etc., qui, par la nature de leurs combinaisons, deviennent les vraies causes morbifiques, ont pour principe opposé l'oxygène qui les brûle toutes sans pouvoir jamais être brûlé, et qui les retient sous une tendance continuelle à la combinaison.

Mais les idées que présente le professeur REICH sur le rôle que joue l'oxygène, et surtout sur les propriétés qui en sont la suite, ne sont que des idées de relation: autrement elles seroient absolument contraires aux résultats des faits qui annoncent que l'oxygène est un excitant direct; que l'azote est un affoiblissant direct aussi; et que les oxides d'azote ne sont momentanément excitans que par l'oxy-

gène et le calorique qui leur sont inhérens. M. REICH lui-même paroît avoir tellement senti cette vérité, que, en cherchant à rétablir l'oxigène qui manque, d'après lui, dans toute sorte de fièvre, et de la proportion duquel résulte un équilibre parfait, il observe qu'il faut remédier au défaut de ce principe, en prenant toutefois assez de précautions pour ne léser aucun viscère nécessaire à la vie. Si effectivement toute fièvre consiste dans un état réel d'excitation; si cet état est amené par une diminution absolue ou relative d'oxigène: absolue lorsque cette substance est véritablement en trop petite quantité, relative lorsqu'elle est en quantité suffisante, mais combinée de manière à ne plus exercer d'action comme oxigène; si les accidens de la fièvre ne peuvent cesser qu'en rétablissant ce principe en des proportions convenables; sans doute M. REICH a eu raison de statuer que l'azote étoit un excitant, et que l'oxigène étoit un sédatif. Mais, ainsi qu'on vient de le voir, de pareilles assertions ne peuvent être que relatives; elles ne détruisent nullement les faits avancés dans la théorie de la seconde *classe* ( tom. II, pag. 4 ), ainsi que ceux qui permettent d'assurer qu'il y a beaucoup de différence entre fièvres

et fièvres ; et qu'en général , celles qui sont véritablement putrides , et qui appartiennent autant aux DÉSOXIGÉNÈSES qu'aux AZOTÉNÈSES , appartiennent aux maladies très-asthéniques ; que , sous ce rapport , fort exact d'ailleurs , l'azote ne peut pas être présenté comme un principe excitant.

Le professeur MITCHILL et M. SALTONSTALL , son disciple , ont beaucoup plus généralisé les effets morbifiques de l'azote et , suivant eux , du septon. Ils jugent , induits par quelques rapprochemens de cas , que l'oxygène et l'azote en état d'oxide gazeux , c'est-à-dire de combinaison intime , mais en des proportions respectives très-différentes , possèdent divers degrés d'activité virulente , et que de cette source proviennent les cancers et toute la famille des ulcères rongeurs , les fièvres contagieuses et miasmatiques. C'est à ces maladies , que les auteurs qui viennent d'être cités rapportent les fièvres procurées par les éfluves marécageux , et celles qu'engendrent les émanations corrompues des animaux. A la vérité , les surfaces marécageuses contiennent souvent des myriades d'insectes , de vers , d'amphibies , de poissons qui , surpris par le desséchement ,

meurent sur le sol vaseux qui les contenoit. Les exhalaisons que de pareilles surfaces envoient dans l'atmosphère, doivent être plus ou moins chargées d'azote; mais l'hydrogène, le carbone et l'oxigène qui en font partie, en des proportions très-variables, non-seulement affectent un caractère particulier aux miasmes marécageux, mais encore lui donnent pour résultats des maladies qui ont une nature spéciale.

Les corps des animaux, au contraire, exhalent l'azote, ainsi que l'a montré un médecin très-ingénieur, le savant professeur de physique et de chimie à l'école centrale de l'Isère. Ce principe, combiné avec une quantité déterminée d'hydrogène, quantité néanmoins qui n'est pas celle qui produit l'ammoniaque, produit le gaz humain ou miasme animal. Aussi, le docteur ODIER, très-habile médecin de Genève, opposant l'opinion de MM. MITCHILL et SALTONSTALL aux conclusions des expériences du docteur SMYTH, présuinoit-il, en soupçonnant qu'il n'est pas impossible que l'azote soit la base de deux gaz morbifiques très-différens l'un de l'autre, que le premier de ces gaz, provenant des marais et peut-être aussi dans certaines circonstances

Circonstances des amas de matières animales en putréfaction, pourroit bien être de l'azoté oxigéné ; tandis que le second de ces gaz, fourni par des hommes entassés dans le même lieu, ne seroit que de l'azote combiné avec l'hydrogène dans une proportion plus foible que celle d'où résulte l'ammoniaque. D'après cela, il est plus que vraisemblable que le gaz marécageux seroit un oxide gazeux d'azote particulier, conséquemment un composé à peu près de nature acide ; et que le gaz humain seroit un composé ammoniacal, par conséquent un gaz alcalin. Les grands effets du gaz acide muriatique, oxigéné pour désinfecter les lieux putrides et frappés de contagion, viennent à l'appui de cette doctrine.

Ces explications peuvent paroître plus ou moins satisfaisantes, en proportion d'une étude plus approfondie des véritables phénomènes naturels et morbifiques. Mais plus l'observation sera exacte sur ce point, et plus on verra que, dans toutes les affections où il s'agit d'une putridité réelle, l'azote exerce une influence directe et prédominante. C'est ce qu'a très-bien senti M. GUYTON-MORVEAU, en cherchant à déterminer ce qui imprime un caractère aux

virus contagieux, et qu'il annonce n'être point une matière inconnue, un élément nouveau, mais un accroissement d'activité de l'un des principes simples que recèlent si abondamment toutes les substances animales. Ne demandons plus, dit-il, d'où peut venir cet accroissement, il s'explique naturellement par cette règle familière, que les affinités sont d'autant plus puissantes, que les corps entre lesquels elles s'exercent sont plus libres; la mesure nous en est donnée par un exemple non moins étonnant dans la réunion des deux conditions simultanées de condensation et de foible union. Il est donc extrêmement probable que c'est l'azote condensé et en même temps peu engagé, qui fait le principal caractère de tous les virus contagieux; qu'ils peuvent être rendus spécifiques par la nature et les proportions différentes des substances qui lui servent de véhicule; mais que leur grande énergie est toujours la suite nécessaire de l'action de ce principe, dans cet état jusqu'à présent peu connu; et pour trancher le mot, qu'elle dépend d'une véritable surazotation, comme celle de l'acide muriatique de la suroxygénation. (*Désinfect. de l'air, pag. 249.*)

Une idée qui se présente naturellement à

ceux qui ne s'attachent point aux simples résultats des phénomènes généraux, mais qui les approfondissent autant qu'il est possible, est que l'azote, diversement combiné, a des effets propres à ces différentes combinaisons, sans perdre cette propriété essentielle d'infecter profondément les sources de la vie. Alors les composés d'azote auront une activité meurtrière; ils irriteront le système; ils exciteront les forces qui le dirigent; sans que cette excitation, cette irritation, cette activité puissent être assimilées à l'action des principes excitans de leur nature, tels que l'oxigène et les corps fortement oxigénés, soit par la quantité d'oxigène qu'ils contiennent, soit par le peu d'union de l'oxigène avec les divers matériaux qu'il a brûlés. C'est d'après cela qu'il faut apprécier sans doute non-seulement les opinions de ceux qui ont donné des qualités actives aux composés d'azote, mais encore les conseils empyriques de ces praticiens qui, dans des maladies très-putrides, ont eu recours à des médicamens qui ne sont que des modes d'union ou de combinaison de l'azote; tels sont les remèdes fournis par l'ammoniaque.

En considérant les maladies dans leur uni-

versalité, on voit que leur siège s'isole sans que leur nature diffère très-essentiellement. C'est, dit-on, un effet de l'action des causes formelles bien séparée de celle des causes matérielles. La foiblesse ou l'irritation des organes influant sur les directions morbifiques, explique ces affections secondaires contrastant d'une manière réelle sur les primitives; ou mieux ces désordres particuliers associés aux généraux. Cependant ces modifications peuvent être assujéties à une action immédiate des gaz morbifiques sur tel ou tel système d'organes, préparé par des impressions soudaines ou successives, ou par la nature même des fonctions qui leur sont propres. Les maladies putrides peuvent être sous ce rapport générales ou locales; mais, dans toutes, il existe une foiblesse radicale: ce qui le prouve, c'est qu'elles excluent essentiellement les saignées, les grandes évacuations, et que leurs indications directes consistent à anéantir les élémens de la putridité, en fortifiant généralement toute l'économie animale.

Mais si ces termes de putridité et conséquemment de surazotation n'étoient que des termes abstraits, des entités dont l'existence

est supposée ; alors les humeurs animales , le sang lui-même vivant et circulant , ne pourroient jamais être frappés de septicité. C'est ce qui , en effet , passe pour constant dans la doctrine de la vitalité ou du vitalisme. On ne rapportera point ici la sage discussion qu'a faite des principes sur lesquels cette doctrine repose , en l'appliquant à la possibilité de la putréfaction du sang circulant dans ses vaisseaux , l'auteur de la dissertation , *de sanguinis per corpus vivum circulantis putredine ; Edinb. 1784*. On se contentera de rapporter que M. FERRIS , privé des lumières que jette sur cette matière la chimie moderne , n'en a pas moins conclu que le sang doué de vie , éprouve réellement un certain degré de putridité. Ainsi l'observation fidelle vient apporter des faits concluans à la doctrine médico-chimique , et prouver que sa doctrine est bien loin d'être imaginaire.

Eh comment se pourroit-il que dans les maladies inflammatoires et dans les maladies putrides , le sang , les humeurs , les solides fussent dans un état diamétralement opposé ; s'ils ne se trouvoient dans des circonstances contraires d'assimilation , de mélange et de composition ! MM. PARMENTIER et DEYEUX qui

ont publié un travail sur le sang, dans la vue d'établir les différences qui peuvent exister, dans les divers états d'inflammation, de scorbut et de putridité, ont conclu que dans les maladies putrides, le principe de la putridité n'existe pas dans le sang; que s'il s'y trouve, il est tellement enveloppé, qu'on ne sauroit le reconnoître, ni par des propriétés particulières, ni par des altérations produites sur le fluide présumé le contenir. Mais de quelle nature peuvent donc être ces maladies, nommées *scorbut*, *fièvres putrides*, dans lesquelles la saignée est nécessaire, soit par la pléthore, soit par les orages et les complications d'une maladie naissante? Toutefois les praticiens ont vu que le sang versé dans les affections inflammatoires se coaguloit promptement; que celui que les hémorragies donnent dans les maladies véritablement putrides et scorbutiques, dans certains *melæna*, reste sans consistance et prend souvent la couleur de suie détrempée. Ils ont vu que toutes les excréctions sont très-vite frappées de tous les signes extérieurs de la putréfaction, même au moment où venant d'être secrétées, elles sortent du corps des malades. Ils ont vu que la putréfaction la plus complète, commencée même avant que la vie vint à s'é-

teindre , s'emparoit des cadavres avec cette rapidité qui annonce toujours que les opérations qui la constituent avoient pris naissance bien avant l'époque où leurs produits n'ont pu être méconnus. Joignons à ces données de l'expérience , ces cas rares encore de formation spontanée de prussiate de fer dans le corps vivant ; ces cas plus communs des produits de l'urée , à la suite de la déviation des matières urineuses , et nous rassemblerons les principales circonstances qui établissent que tout ce qui tient foncièrement à la putridité , porte un caractère spécifique et ne peut point être assimilé aux cas qui peuvent s'en rapprocher par une frappante analogie.

Une classe de maladies putrides n'est donc point étrangère à une nosologie basée sur l'état bien apprécié de l'économie vivante. D'après ce qui précède et une foule de réflexions ou de faits qui pourroient être présentés ici , on sent que les affections éminemment putrides sont de véritables azotenèses. N'est-il pas prouvé que le gaz des cadavres asphyxie , tue ou cause une fièvre putride (a) ? Et lorsqu'on voit , ainsi

---

(a) J'ai décrit dans un autre mémoire l'histoire de

que l'observation l'a démontré, que, après des épizooties désastreuses, après la génération et la mortalité d'une grande quantité d'insectes, dont les cadavres ont long-temps jonché le sol dont ils avoient dévoré les productions; des épidémies putrides, souvent pestilentielle, se sont répandues parmi les hommes et en ont moissonné un grand nombre : peut-on s'empê-

---

la maladie d'une femme qui, ayant aidé à transporter au tombeau une de ses amies morte d'une fièvre très-putride, et qui, par curiosité ou par tout autre motif, s'étant placée sur le bord de la fosse et sous le vent pour voir la fin de cette lugubre cérémonie, reçut inopinément une vapeur infecte qui sortit de la cavité abdominale du cadavre; cavité qui, fortement météorisée, s'ouvrit par l'effet d'une secousse trop forte donnée au corps par les fossoyeurs. La maladie de cette femme fut une fièvre extrêmement putride, qui lui fit courir les plus grands dangers, et qui prouva, d'une manière très-concluante, combien le gaz putride animal influe sur la production des maladies éminemment putrides.

Le docteur J. St-JEAN a mis à la tête de sa traduction anglaise de la *nouvelle nomenclature chimique*, des observations sur une espèce particulière de vapeur qui s'élève des cadavres humains en putréfaction; et desquelles il conste que cette vapeur a souvent produit des inflammations externes du genre putride ou gangreneux.

cher de croire que , des composés gazeux de la putréfaction , se combinent sans doute les causes destructives de ces maladies générales ? Ce qu'il y a de particulier , et ce fait n'en est pas moins digne d'attention , c'est que ces fleaux et les émanations aériformes , qui si visiblement influent sur leurs productions , paroissent avoir , ainsi que l'a fort exactement noté le docteur THOUVENEL (a) , des rapports de co-existence ou de causalité réciproque avec d'autres phénomènes de divers ordres , tels que la végétation de certaines plantes qui ont quelques caractères de l'animalisation , la génération excessive de certains animaux reptiles ou insectes qui passoient autrefois pour naître de la corruption , la nitrification , etc. ; comme si l'azote , qui joue un rôle important dans ces diverses circonstances , donnoit , en se combinant de diverses manières , une impulsion générale et féconde en résultats , identiques dans leur nature , mais variés dans les compositions.

Une autre vérité peut être présentée à l'appui

---

(a) Mémoire sur l'air et les airs , etc.

de ces détails ; car l'utilité et l'importance de la doctrine chimico-animale ressortent bien mieux, pour les hommes sans prévention, de tous ces rapprochemens fondés sur l'exactitude des faits. Le résultat ordinaire de toutes les fièvres paroît être de surazoter le système, avec cette différence que ce phénomène n'a lieu, dans les fièvres inflammatoires, que sur le déclin et d'une manière bornée, ou plus à bonne heure, comme on le voit dans ces fièvres qu'on sait être inflammatoires dans leur première période et putrides dans leur seconde ; au lieu que, dans les fièvres putrides, cette surazotation est plus ou moins forte et commence de très-bonne heure, même avec la maladie : et voilà ce qui donne aux urines la qualité remarquable qu'elles ont dans certaines périodes des maladies. Il est manifeste, ainsi que le célèbre FOURCROY nous l'a appris, que le phosphate de chaux n'étant dissous dans l'urine qu'à cause de son état acidule, c'est de la production si facile et si prompte de l'ammoniaque dans cette lessive animale, que dépend le nuage qui s'y forme, et le précipité qui s'y dépose, par le transport de cet alcali volatil sur la portion d'acide phosphorique qui rendoit le sel terreux soluble. Ainsi la rapide précipi-

tation et l'abondant sédiment qu'on observe dans les urines critiques à la fin des maladies, ne vient que de la grande disposition dans laquelle se trouvent ces urines pour former de l'ammoniaque ; JURINE a également montré que dans les fièvres la proportion d'acide carbonique très-supérieure dans l'état de santé, diminue, et que celle du gaz azote augmente. Voilà donc plusieurs circonstances imposantes se réunir pour modifier la doctrine trop générale du professeur REICH dans les fièvres ; et pour convaincre, autant qu'on peut le faire sur une pareille matière, que la théorie de la putridité doit être restreinte à la surazotation des êtres vivans et aux phénomènes qui en sont une conséquence rigoureuse.

J'en ai fait la remarque dans mon *essai d'un système chimique de la science de l'homme* ; si, dans l'économie animale, on pouvoit considérer les diverses actions de la vie d'une manière abstraite, ou si les changemens chimiques qui amènent les maladies se faisoient isolément, on n'observeroit, dans les affections morbifiques, que l'ordre des phénomènes qui leur sont propres. Mais la machine humaine est trop compliquée pour qu'il n'en arrive pas

autrement. Aussi la suroxigénation du système marche ordinairement avec la désazotation, comme la désoxigénation se rencontre assez fréquemment avec la surazotation. D'après cela, les désazoténèses étant pour la plupart des suroxigénèses, il convient de ne reconnoître d'autre division dans la *classe* des maladies dues à une action directe de l'azote, que celle des *genres* qui s'y rapportent naturellement et qui en constituent l'ensemble.

Cet aperçu justifie le rang que j'ai donné ailleurs (*classe deuxième, sous-classe première, vol. II, pag. 26*) à des maladies qui, par leur nature putride, auroient dû être rapportées à la *classe* des AZOTÉNÈSES. Les *genres* XVI *adynamie* (vol. II, pag. 4) et XIX *stuporisme* (vol. II, pag. 127.) renferment, à titre de *genres*, d'*espèces* ou de *sortes*, plusieurs affections essentiellement putrides. Mais si, contre les vues générales de classification que j'avois présentées dans mon *essai d'un système chimique de la science de l'homme* (pag. 65), j'ai placé parmi les DÉSOXIGÉNÈSES, et réuni, sous le genre *stuporisme*, les fièvres intermittentes sous le titre spécifique de *stuporisme synéqué* (tom. II, pag. 133), et les

fièvres putrides sous celui de *stuporisme synoqué* ( tom. II , pag. 173 ), c'est que je n'ai pu me refuser au desir , reconnoissant pour causes essentielles le miasme marécageux pour les premières , et le miasme animal ou humain pour les secondes , de resserrer dans un même cadre les maladies marquées par une désoxigénation évidente , mais dans lesquelles un poison destructeur , quoique varié dans son essence , pouvoit être justement considéré comme le seul et vrai principe de tous les désordres.

De là , les *genres* qui composent la *classe* des AZOTENÈSES sont restreints à ceux-ci :

LXXIX. *Scorbut.*

LXXX. *Septose.*

LXXXI. *Gangrène.*

LXXXII. *Puose.*

LXXXIII. *Elcose.*

LXXXIV. *Cancer.*

*Gen.* LXXIX. *SCORBUT.*

*Eth.* de *croboth* , mot hollandais pris du danois , qui veut dire *ventre rompu* ; ou de *scormut* , terme allemand dont la signification est *os rompu* ou *bouche rompue*.

*Syn.* Scorbut, *scorbutus*; BOERHAAVE, *aph.* 1148. — JUNCKER, *tab.* XCII. — SAUVAGES, cl. X, cachexies; ord. V, impétiginosités; gen. XXVII. — LINNÉ, cl. X, difformes; ord. III, décolorés; gen. CCXXIII. — VOGEL, cl. VIII, cachexies; gen. CCCXVIII. — CULLEN, cl. III, cachexies, ord. III, impétiginosités; gen. LXXVI. — SAGAR, cl. III, cachexies; ord. V, impétiginosités; gen. XXVIII. — PINEL, cl. V, maladies du système lymphatique; ord. I, maladies cutanées; gen. LXV.

*Bibl.* G. E. STAHL, *de scorbuti et veneræ Luis diversis signis et medicinis*; Halæ 1706; et coll. de HALLER, vol. VI, pag. 158.

J. F. BACHSTROEM, *observationes circa scorbutum, ejusque indolem, etc.*; Leidæ 1734; et coll. de HALLER, vol. VI, pag. 89.

J. G. H. KRAMER, *de scorbuto*; Norimb. 1737; et coll. de HALLER, vol. VI, pag. 127.

G. G. RICHTER, *de scorbuto*; Goetting. 1744; et coll. de RICHTER, vol. I, pag. 160. — *Brevis inquisitio in hippocraticas scorbuti antiquitates*; Goetting. 1744; et coll. de RICHTER, vol. III, pag. 110.

J. H. FURSTENAU, *de scorbuto*; Rinteln. 1751.

R. RUSSEL, *a dissertation on the use of sea water in diseases of the glands, particularly the scurvy, etc.*; Lond. 1752.

LIND, *a treatise of the scurvy, etc.*; Edinb. 1753. — En franç., Paris 1755-71. — En italien, par L. MARTINI, Venezia 1766.

A. ADDINGTON, *an essay on the sea scurvy, etc.*; Lond. 1753.

H. M. MISSA, *an a diversâ virûs scorbutici indole et sede, morbi diversi?* Paris. 1754.

G. CH. DETHARDING, *de scorbuto megapolensium*; Rostoch 1754.

J. F. CARTHEUSER, *nonnulla de scorbuto*; Franc. ad Viadr. 1755.

CH. BISSET, *a treatise on the scurvy*; Lond. 1755. — *Medical essays and observations, etc.*; 1766, pag. 195.

J. A. BONA, *tractatus de scorbuto*; Veron. 1761.

A. E. BUCHNER, *de scorbuti cum lue vereâ complicatione*; Halæ 1764.

ROUPPE, *de morbis navigantium*; Lugd.-Batav. 1764; *de scorbuto*, pag. 90.

S. EUGALENNS, *de scorbuto liber, etc.*; edit. ultima; Venetiis 1766.

J. N. CHMELSKY, *de scorbuto exercitum*

*cæsareo regium in Silesiâ graviter 1760 et 1761 afficiente; Pragæ 1766.*

S. DE OUDEN, *de scorbuto; Lugd.-Batav. 1767.*

POISSONIER DESPERRIERES, *traité des maladies des gens de mer, etc.; Paris 1767, chap. 1, pag. 27.*

N. HULME, *de naturâ, causâ, curationeque scorbuti; Lond. 1768.*

G. V. ZEVIANI, *sopra lo scorbuto, etc.; in Veronâ 1770.*

W. JERVEY, *practical thoughts on the prevention and cure of the scurvy especially in the british navy; Lond. 1769.*

*Observations on the effects of sea water in the scurvy, and scrophula; Lond. 1770.*

E. J. P. HOUSSET, *dissertation sur les parties sensibles..... avec deux observations sur l'usage du mercure pour la guérison du scorbut et des dartres; Lausan. 1770.*

J. LE MEILLEUR, *de scorbuto; Monsp. 1770. — En français, par GIRAUD; Paris 1777.*

C. A. LINNÉ, *scorbutus; Upsal. 1775; et amæn. acad., vol. IX, pag. 291.*

J. G. HEMPEL, *eigene erfahrungen und wahrnehmungen von scharbocke, etc.; Copenh. 1778.*

VON

VON ALBERTIZ, *der zucker ein preservatif mittel wider den scharbock*, etc.; Vienne 1779.

E. BRERETON, *de scorbuto*; Edinb.; et coll. de WEBSTER, tom. III, 1781, ord. V, pag. 36.

F. MILMAN, *an inquiry into the source from whence the symptoms of the scurvy, and of putrid fevers arise*, etc.; Lond. 1782. — En franç., par VIGAROUX, 1786.

CH. L. HOFFMANN, *vom scharbock*, etc.; Munster 1782.

R. KIERNAN, *de scorbuto*; Edinb. 1783; et *diss. medic. Edinburg.*, ann. 1783, diss. 9.

H. BACHERACHT, mémoire sur le scorbut pour l'usage des chirurgiens de l'armée et de la flotte impériale russe; trad. franç.; Reval 1788.

M. STOLL, *scorbutus: prælect. in divers. morb. chronic.*; Vindob., vol. I, 1788, pag. 1. — *De scorbuto, dissert. medic.*, tom. I, pag. 24.

FR. THOMPSON, *an essay on the scurvy*, etc.; Lond. 1790.

M. SCHINDLER, *commentatio medica sistens observationes circa usum conii maculati et mali citrei in scorbutum*, etc.; Ulm 1791.

G. RENWICK, *an inquiry into the nature*  
Tom. IV.

*and causes of sickness in ships of war, etc. ;  
Lond. 1792.*

TH. TROTTER, *observations on scurvy, etc. ;  
Lond. 1792.*

J. C. JACOBS, *traité du scorbut en général ;  
Bruxelles et Paris 1800.*

*Voy. COGUELIN, mémoire sur le scorbut ;  
hist. et mém. de la soc. roy. de méd. de Paris,  
ann. 1780-81, pag. 168 des mém.*

*Car. Lassitudes, ordinairement plus fortes  
après le sommeil de la nuit ; gencives gon-  
flées, flasques et saignantes ; fétidité de l'ha-  
leine ; et taches de différentes couleurs, mais  
communément livides, qui surviennent sur la  
peau et particulièrement autour de la racine  
des poils.*

*Var. A. Due aux périodes du scorbut.*

*A. Commencant. Lassitude, pesanteur des  
membres et changement de couleur de la face ;  
1.<sup>re</sup> période d'HOFFMANN.*

*B. Déclaré. Puanteur de l'haleine, vices des  
dents, des mâchoires et des gencives ; 2.<sup>e</sup> pé-  
riode d'HOFFMANN.*

*C. Accru. Craquement des articulations ;*

douleurs des membres , rigidité des muscles et des articles , taches ; ulcères fongueux , ichoreux et saignans ; 3.<sup>e</sup> période d'HOFFMANN.

*D. Consummé.* Hémorrhées ou hémorragies passives , œdèmes , syncopes , évacuations colliquatives , sphacèle , etc. ; 4.<sup>e</sup> période d'HOFFMANN.

*Var. B.* Dues à la couleur des taches.

*A.* Scorbut livide ; NITZCH , *theoret. pract. abhandl. des scharbocker* , etc.

*B.* Pétéchial , *ibid.*

*C.* Pâle , *ibid.*

*D.* Rouge , *ibid.*

*Voy. E. ROSEN* , *de symptomatibus purpuræ chronicæ scorbuticæ* ; Lond. Goth. 1756 ; et coll. de HALLER , vol. VI , pag. 138.

*Var. C.* Dues à la marche de la maladie :

*A.* Scorbut lent ; MERTENS , *observ. medic.* , tom. II , cap. II , *de scorbuto* , pag. 124.

Scorbut chronique ; HOFFMANN , *loc. cit.*

*B.* Scorbut aigu ; HOFFMANN , *loc. cit.*

*Esp. I. Épidémique.*

*Car.* Sur les vaisseaux qui ont resté long :

temps en mer, et où l'on se nourrit de viandes salées et d'eaux pourries, le scorbut attaque toute sorte de tempérament, a des symptômes plus prononcés et une activité plus sensible.

*Rap. A.* Scorbut chaud; NITZCH, *loc. cit.*

*B.* Scorbut épidémique; SELLE, *médec. clinique*, trad. franç., tom. 1, pag. 254.

*C.* Scorbut de mer.

*Esp. II. Sporadique.*

*Car.* Marches plus lente; symptômes marqués d'engouement dans les viscères du bas-ventre.

*Rap. A.* Scorbut froid; G. E. HAMBERGER, *de scorbuto frigido*; Jenæ 1751.

*B.* Scorbut sporadique; SELLE, *loc. cit.*, pag. 155.

*C.* Scorbut de terre.

Plusieurs auteurs d'un très-grand poids ont pensé que la distinction du *scorbut* en celui *de mer* et celui *de terre*, étoit très-inexacte et peu fondée dans la nature de cette maladie. On a même loué SAUVAGES de n'avoir fait qu'une seule *espèce de scorbut*, et d'avoir regardé cette maladie comme n'ayant véritablement que des variétés plus ou moins marquées.

Cependant M. TODE, médecin de Copenhague, assure qu'on voit, tous les ans, dans cette capitale du Dannemarck, un très-grand nombre de malades atteints du *scorbut de mer*, qui diffère essentiellement de celui *de terre*. M. SELLE a présenté une opinion analogue; le docteur LETTSOM a présenté un exemple d'un véritable *scorbut de mer* qu'on a rencontré au milieu de la terre ferme (*mém. de la soc. roy. de médéc. de Lond.*, vol. 1, art. XXVIII.); et comme il est en outre très-vrai que les praticiens reconnoissent sur les terres une affection scorbutique très-prononcée qu'ils séparent de ce qu'ils appellent le véritable *scorbut*, je ne saurois m'empêcher de reconnoître les deux espèces de cette maladie que je viens de déterminer.

#### Formes.

Sor. 1. Hémorragie des maladies chroniques; SAUV., cl. IX, ord. 1, gen. 1, esp. 6.

2. Ulorragie scorbutique.

Stomacace; SAUVAGES, cl. IX, flux; ord. 1, sanguinolens; gen. III. — LINNÉ, cl. IX, évacuatoires; ord. 1, de la tête; gen. CLXXXVI. — VOGEL, cl. II, flux; gen. LXXXV. — SAGAR, cl. V, flux, ord. 1, sanguins; gen. III.

A. Stomacace scorbutique ; SAUV. , *ibid* ,  
esp. 1.

B. Stomacace universel ; SAUV. , *ibid* , esp. 2.

C. Stomacace purulent ; SAUV. , *ibid* , esp. 3.

D. Cancer aqueux ; VAN SWIETEN , *comm.*  
*in aph.* BOERH. ; *aph.* 423 et 432. — DE  
MEZA , *acta societ. reg. Haun.* , tom. II , pag.  
102.

E. Gangrène scorbutique des gencives ; BER-  
THE , *mém. de l'acad. roy. de chirurgie* , tom.  
V , in-4.<sup>o</sup> , pag. 381.

3. Pétéchiaire hémorragique ( maladie sans  
fièvre , caractérisée par des taches plus ou moins  
nombreuses mais discrètes , accompagnées d'hé-  
morrhagie souvent abondante et pour l'ordinaire  
par la bouche ) ; voy. SEIP , *specimen medicum*  
*syllogen observationum varii argumenti sistens* ,  
etc. ; Copenhag , 1782. — WICHMAN , *biblioth.*  
*german.* , tom. II , pag. 20. — J. W. GUL-  
BRAND , *observ. de morbo maculoso hæmor-*  
*ragico* ; *acta societ. Hauniens.* , tom. II , pag.  
140. — *Voy. aussi* tom. I , pag. 230 ; tom.  
III , pag. 369 de cet ouvrage.

4. Hémoptysie sphacélique ; SAUV. , cl. IX ,  
ord. I , gen. II , esp. II.

A. Hémoptysie scorbutique ; SAUV. , *ibid* ,  
esp. 6.

5. Maladie noire, symptomatique, atrabiliense et scorbutique; BRIEUDE, *rec. périod. de la soc. de méd. de Paris*, tom. I, pag. 445.

6. Hectique cachectique; SAUV., cl. II, ord. I, gen. V, esp. 10.

7. Ascite scorbutique; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XIV, esp. 11.

8. Pica antiscorbutique; SAUV., cl. VIII, ord. II, gen. VII, esp. 4.

9. Syncope scorbutique; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIII, esp. 15.

10. Lipothymie scorbutique; STOLL, *diss.*, tom. I, pag. 71.

11. Hépatirrhée scorbutique; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. VIII, esp. V. — *Voy.* tom. II, pag. 43.

12. Gale scorbutique; CH. BISSET, *medical essays and observations*, etc.; *Newcastle* 1766, art. 19, pag. 259. — BALDINGER, *von den krankheiten einer armée*, etc.; pag. 317.

13. Peste scorbutique; SAUV., cl. III, ord. I, gen. I, esp. 10.

14. Trisme scorbutique; SAUV., cl. IV, ord. I, gen. II, esp. 4.

15. Contracture scorbutique ; SAUV., cl. IV ;  
ord. I ; gen. IV , esp. 3.
16. Dyspnée scorbutique ; SAUV., cl. V ,  
ord. II , gen. VII , esp. 18.
17. Orthopnée scorbutique ; SAUV., cl. V ,  
ord. II , gen. IX , esp. 22.
18. Phthisie scorbutique ; SAUV., cl. X ,  
ord. I , gen. II , esp. 4.
19. Odontalgie scorbutique ; SAUV., cl. VII ,  
ord. II , gen. XVI , esp. 4.
20. Rachialgie scorbutique ; SAUV., cl. VII ,  
ord. V , gen. XXIX , esp. 6.
21. Paralysie scorbutique ; SAUV., cl. VI ,  
ord. III , gen. XVIII , esp. 6. — SCHAMBERG,  
*de paralyssi scorbuticâ* ; Lips. 1694.
22. Atrophie scorbutique ; SAUV., cl. X ,  
ord. I , gen. III , esp. 12.
23. Lienterie scorbutique ; SAUV., cl. IX ;  
ord. II , gen. XVIII , esp. 3.
24. Ptyalisme scorbutique ; SAUV., cl. IX ,  
ord. III , gen. XXIII , esp. 7.
25. Éphidrose scorbutique ; SAUV., cl. IX ,  
ord. III , gen. XX , esp. 2.
- A. Sueur de sang ; GALLANDAT, *verhande-  
lingen vitgegeeven door de hollandsche*, etc. ;  
*XIV deel* ; the Haarlem 1773 ; *append.*, pag.  
46 , art. 4.

26. *Synocha* scorbutique ; SAUV. , cl. II ,  
ord. I , gen. II , esp. 6.
27. *Synochus* scorbutique ; SAUV. , cl. II ,  
ord. I , gen. III , esp. 13.
28. Rousseur (*ephelis*) scorbutique ; SAUV. ,  
*loc. cit.* , esp. 6.
29. Tache scorbutique ; ODOARDO , *d'una  
specie particolare di scorbuto* ; Venise 1777.  
— *Voy.* , tom. III de cet ouvrage pag. 339 ,  
*rap. D Pélagre* , appelée par quelques-uns *scor-*  
*but de montagne* , *scorbut des Alpes*.
30. Aphte scorbutique ; SAUV. , cl. III , ord.  
I , gen. X , esp. 5.
31. Rhumatisme scorbutique ; SAUV. , cl. VII ,  
ord. I , gen. III , esp. 4.
32. Ulcère scorbutique ; BELL , *traité des  
ulcères* ; pag. 310.

Ils ne fournissent pas de bon pus mais une  
espèce de sanie tenne , fétide , mêlée de sang  
corrompu ; leur chair est molle ou spongieuse  
et très-putride ; leurs bords sont livides et hé-  
rissés d'excroissances charnues et fongueuses ;  
*voy. FRANCKE , de hydropse ascite ex scorbu-*  
*ticis exulcerationibus ; Marp. 1735.*

33. Cancer scorbutique ; GAMET , *traité des  
affections cancéreuses* , pag. 28 et 60.

Cancer applati, sanieux, pourpré, souvent noirâtre, avec infiltration édemateuse autour de l'ulcère, le mauvais état des gencives, coexistence des taches violettes et noires à la tumeur, enfoncement et retirement des mamelons : ses bords sont plus mous, plus renversés, plus frangés et plus infiltrés ; le pus en est sanieux et putride ; les hémorragies y sont plus fréquentes que dans les autres espèces de cancers ; BRIDAULT, *traité sur la carotte*, pag. 41.

34. Goutte scorbutique ; SAUV., cl. VII, ord. 1, gen. 1, esp. 7.

### Gen. LXXX. SEPTOSE.

*Eth.* de septon, putride.

Le desir de présenter, dans un même tableau, les diverses maladies dans lesquelles on a lieu de reconnoître un état de putridité plus ou moins caractérisé, m'a déterminé à classer dans les genres *adynamie* (XVI, tom. II, pag. 41) et *stuporisme* (XIX, tom. II, pag. 127) plusieurs affections qui appartiennent, aussi essentiellement, au genre *septose*. C'est qu'en effet il est mal-aisé d'isoler les maladies que

l'on peut considérer sous des rapports différens sans perdre de vue leur vrai génie ou leur nature propre. D'après cela, le genre *septose* doit réunir ces diverses affections, pour les compléter ou pour les étendre.

*Syn. Sepsis; DANIEL, systema ægritudinum, etc.; nosolog., pag. 182.*

*Bibl. SALZMANN, de febre putridâ continuâ; Argent. 1654.*

*NAAHEIMER, de febre putridâ epidemicâ; Mogunt. 1765.*

*KRAHNER, de febre malignâ topicâ; Argent. 1765.*

*J. PELLICIONI, sopra la efficacia e virtu della china china, etc.; Florence 1769.*

*H. M. MARCARD, specimen inaug. examinis rigorosioris malignitatis febrilis; Gotting. 1770.*

*BOEHMER, de constitutione epidemicâ Halæ ad Salam, inque ejus consiniis annis 1771 et 1772 observatâ, etc.; Halæ ad Sal. 1772.*

*DELIUS, de moderando usu nitri in febribus putridis et malignis; Erlang. 1772.*

*G. ALEXANDRE, an experimental inquiry, etc. ( recherches expérimentales concernant les*

causes auxquelles on attribue généralement les fièvres putrides ); *Lond.* 1773.

J. COLLIN, *arnicæ in febribus et aliis morbis putridis vires*; *Viennæ* 1775.

A. WESTPHAL, *de limitandis laudibus vomitoriorum ad curandas febres malignas*; *Gryphisw.* 1775; et coll. de BALDINGER, vol. II, pag. I.

BELL, *de febre malignâ quæ 1779 legionem de Buccleugh afflixit*; *Edinb.* 1779.

VACCA BERLINGHIERI, *sulle febbri dette putride*; *Luca* 1781.

PLOUCQUET, *an febris putrida sit contagiosa?* *Tubing.* 1784.

O-RYAN, *dissert. sur les fièvres infectieuses et contagieuses, etc.*; *ib.* *Lyon* 1785.

J. F. CH. PICHLER, *mémoire sur les maladies contagieuses, etc.*; *Strasb.* 1786.

G. PRATOLONGO, *discorso sulle febbri, che si dicono putride*; *Genova* 1786.

MELBER, *de febre putridâ*; *Jenæ* 1794.

*Car.* Avec la diminution des forces, la mollesse des chairs, la couleur terne des yeux, la saleté des dents, la fétidité de l'haleine et en général des matières excrétées; il y a pouls mou, dégoût sur-tout pour les substances ani-

males, et disposition manifeste à la diarrhée, aux sueurs, à l'hémorragie et aux pétéchies.

*S-GEN. I. Pyrétique.*

*Car.* Aux accidens du genre se joint la fièvre qui est toujours de nature asthénique; avec langue blanche au commencement, ensuite noire, sèche et fendillée; sang vermeil, d'une consistance plus molle et plus lâche, et quelquefois fétide et sanieux, couvert d'une pellicule qui a une teinte jaunâtre; sérum rouge, sans coagulum.

*Rap. A.* Fièvre putride générale. — Fièvre putride sanguine; voy. tom. II, pag. 174.

*Esp. I. Vive.*

*Car.* Maladie avec marche rapide; pouls vite, inégal, avec quelque force d'abord, et bientôt avec mollesse et plus d'inégalité, et, dans ce cas, stupeur, tremblottement, météorisme, etc.

*Rap. A.* Débilité fébrile; C. F. KALTSCHMID, *de causis debilitatis febrilis*; Jenæ 1765.

*B.* Catarre suffocant; J. GATSLEFF, *de catharro suffocativo in morbis acutis malignis*; Halæ 1760.

C. Diarrhée colliquative ; SAUV. , cl. IX ,  
ord. II , gen. XVI , esp. 13 , var.

D. Pourpre symptomatique ; SAUV. , cl. III ,  
ord. I , gen. VI , esp. 3.

A. Pourpre vermineux ; SAUV. , *ib.* , esp. 4.

*Esp. II. Lente.*

*Syn.* Fièvre nerveuse adynamique.

Fièvre lente nerveuse ; HUXAM , *opera medica* ; édit. de REICHEL , tom. II , *cap.* VII ,  
pag. 78. — GILCHRIST , *medical essays and observations by a society in Edinburgh* , tom. IV , art. 23 et tom. V , part. II , art. 48. — BUCHAN , *médecine domest.* , tom. II , chap. VIII. — DE MEZA , *compend. med. pract.* , tom. I , pag. 342.

Fébricule ; R. MANNINGHAM , *the symptoms, nature, causes, and cure of the febricula, etc.* ; Lond. 1746.

*Bibl.* VOGEL , *de febre nervosâ, ejusque genuinâ indole* ; Gotting. 1767.

CH. G. DEMIANI , *de febre lentâ nervosâ, rheumatismo et hydrope* ; Lipsiæ 1777 ; et coll. de BALDINGER , tom. IV , pag. I.

NUGENT , *de febre nervosâ* ; Edinb. 1780.

J. A. GOTTEL , *de febris lentæ nervosæ*

*naturá*; Halæ-Magdeb. 1781; et coll. de FRANK, tom. v, pag. 261.

G. FEARNE, *de typho, vel febre nervosá*; coll. de WEBSTER, tom. 1, 1781, pag. 358.

J. B. OSWALD, *de ætheris, vini et aquæ frigidæ præstantiâ in febre lentâ nervosâ*, etc.; Francfort-sur-l'Oder 1784.

KEMME, *de febribus nervosis*; Halæ 1786.

*Car.* Chaleur médiocre, pouls peu fréquent, mais foible et petit; abattement considérable; putridité peu avancée dans les excrétiens, mais réelle dans certaines matières animales, et forte disposition à la lésion des facultés intellectuelles.

*Rap. A.* Fièvres ataxiques; SELLE, *rudimenta pyretologiæ method.*; edit. tert.; Berol. 1789; ord. III, gen. 299. — PINEL, cl. 1, fièvres; ord. v.

*B.* Fièvre engourdisante; (*febris torpens*); SCHRAUD, *de febribus tentamina duo*; Viennæ 1781, pag. 13-14.

*C.* Fièvre pestilentielle; FRACASTOR, *de morbis contagiosis*; lib. II, cap. IV.

*D.* Fièvre pestilentielle sans venin; FORESTUS, lib. VI, obs. 26.

*E.* Fièvre maligne cacoëthe ou de mauvais

caractère; BELLINI, *de febribus*; edit. Venet.; pag. 165.

F. Fièvre maligne; LORRY, *de melancholiâ*, etc.; tom. I, pag. 117. — FIZES, *traité des fièvres*, chap. VI. — QUARIN, *methodus medend. febr.*, cap. V.

G. Fièvre maligne *in specie*; VOLPRECHT, *dissertatio de febre nervosâ*, etc.; Gotting. 1767.

H. Fièvre maligne lente; VOGEL, *de cognoscendis et curandis morbis*, §. 56.

I. Fièvre hectique pestilentielle; FORESTUS, *lib. VI*, obs. 23.

S-esp. I. Fièvre nerveuse, adynamique, sporadique.

*Car.* Elle frappe quelques individus isolément.

*Rap. A.* Typhus nerveux; SAUV., cl. II, ord. I, gen. IV, esp. 2.

*B.* Typhus modéré; CULLEN, cl. I, ord. I, sect. II, gen. V, esp. I, var. I.

*C.* Typhus ataxique sporadique; PINEL, cl. I, ord. V, gen. XI.

*D.* Fièvre lente nerveuse; PINEL, *ibid*, gen. XIII.

*E.* Peste

*E.* Peste sporadique ; SAUV., cl. III, ord. I, gen. I, esp. 4.

*F.* Typhus exhaustique ; voyez tom. II de cet ouvrage , pag. 47 , sorte 14.

*S-esp.* II. Fièvre nerveuse adynamique , épidémique.

*Car.* Elle frappe en même temps plusieurs individus.

*Rap. A.* Fièvre lente ou hectique nerveuse de l'an 1711 ; WILLIS , de morb. convuls. , cap. VIII.

*B.* Fièvre nerveuse pétéchiiale à Schelestat en 1790-91 ; COZE , journ. de méd. , mai 1792 , tom. XCI , pag. 3.

*S-GEN.* II. *Apyrétique.*

*Car.* Puanteur très-remarquable d'une excretion ou d'une partie sans ulcère.

*Esp.* I. *Dysodie.*

*Eth.* de *dys* , difficile , mauvais ; et *osme* , odeur.

*Syn.* Puanteur , *dysodia* ; SAUVAGES , cl. IX , flux ; ord. IV , aériens ; gen. XXXVI. — VOGEL , Tom. IV.

( 50 )

cl. II, flux; gen. CXXV. — SAGAR, cl. V, flux;  
ord. v, aériens; gen. XXXVI.

*Car.* Exhalaison des vapeurs fétides hors du  
corps.

*S-esp.* I. Dysodie (*rhinique*) avec odeur  
fétide du nez.

Dysodie rhinostenote (punaisie des canards);  
SAUV., *loc. cit.*, esp. 2. — J. F. BLUMEN-  
BACH, *de sinibus frontalibus*, etc.; *Gotting.*  
1779.

*S-esp.* II. Dysodie (*stomatique*) avec  
puanteur de la bouche.

Dysodie stomatique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

*S-esp.* III. Dysodie (*gastrique*) avec puanteur  
provenant de l'estomac.

Dysodie stomacale; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

*S-esp.* IV. Dysodie (*pulmonique*) avec  
puanteur provenant du poumon.

Dysodie pulmonique; SAUV., *loc. cit.*,  
esp. 5.

*S-esp.* V. Dysodie (*axillique*) avec puanteur  
des aisselles.

Dysodie axillique; SAUV., *loc. cit.*, esp. 8.

Tom. IV.

*S-esp. VI. Dysodie (génitale) avec puanteur des organes qui servent à la génération.*

*Dysodie hircine; SAUV., loc. cit., esp. 9.*

*S-esp. VII. Dysodie (urélique) avec puanteur occasionnée par l'urine.*

*Dysodie urineuse; SAUV., loc. cit., esp. 10.*

*S-esp. VIII. Dysodie (pédique) avec puanteur provenant des pieds.*

*Dysodie du pied; SAUV., loc. cit., esp. 11.*

*S-esp. IX. Dysodie (corporelle) avec puanteur du corps ou de la sueur.*

*Voy. J. JUNCKER, de sudore vitioso, ingrato plerumque nobilium hospite; Hal.-Magd. 1756.*

*Gen. LXXXI. GANGRÈNE.*

*Eth. de gaggraina, du verbe grao, graio, je mange, je consume.*

*Car. Extinction plus ou moins complète de la vie dans une partie, avec un degré plus ou moins sensible de désorganisation; marquée, pour le premier objet, par la diminution et la perte de la sensibilité et de la chaleur; et, pour le second, par la couleur livide, grisâtre*

ou noire, l'élévation des vésicules remplies d'une matière ichoreuse, l'engorgement ou la dessiccation, enfin par la destruction putréfactive de la partie et l'odeur cadavéreuse qu'elle émane.

*S-GEN. I. Atonique.*

*Syn.* Gangrène; SAUVAGES, cl. X, cachexies; ord. VI, anomales; gen. XL. — LINNÉ, cl. XI, vices; ord. I, humoraux; gen. CCXXXIV. — VOGEL, cl. VIII, cachexies; gen. CCCXXVII. — CULLEN, cl. I, pyrexies; ord. II, phlegmasies; gen. VII, phlogose; suite 2. — SAGAR, cl. V, cachexies; ord. VII, anomales; gen. XLI.

Sphacèle; LINNÉ, cl. XI, vices; ord. I, humoraux; gen. CCXXXV. — VOGEL, cl. VIII, cachexies; gen. CCCXXVIII. — CULLEN, cl. I, pyrexies; ord. II, phlegmasies; gen. VII, phlogose; suite 3.

*Bibl.* G. C. DETHARDING, *de corticis chinæ efficacia in gangrænâ et sphacelo adhuc dubia*; Rostoch. 1746.

F. QUENAY, *traité de la gangrène*; Paris 1749.

C. LUCAS, *de gangrænâ et sphacelo*; Lugd.-Batav. 1752.

J. H. FURSTENAU, *de brachio sphacelato*;

*spontaneâ naturæ vi ab integro reliquo corpore separato ; Rintel. 1754.*

G. E. HAMBERGER, *de gangrænâ ; Jenæ 1754.*

G. A. BRAMBILLA, *lettera critica in cui si scioglie la questione : se le infiammazioni e le gangrene si debano abandounar alla natura sola , etc. ; in Milano 1765.*

ALEFELD, *de sphacelo à causâ internâ salutifero et nocivo ; Giessæ 1765.*

H. J. POINTE, *essai sur la nature et les progrès de la gangrène humide , vulgairement dite pourriture ; Amsterdam et Lyon 1768.*

J. SIDREN, *dissert. sistens casum sphaceli cranii ; Upsal. 1768.*

BERG, *de gangrænâ et sphacelo ; Goetting. 1779.*

KEMME, *de notione gangrenæ et sphaceli ; Halæ 1781.*

J. J. HARTMANN, *de gangrænâ ; Erfurt 1781.*

A. MURRAY, *in gangrænam scroti observatio , etc. ; Upsal. 1783.*

J. D. MARCK, *dissertatio sistens methodum gangrænam et sphacelum medendi ; Gotting. 1785.*

*Car.* Gangrène avec mollesse, relâchement et engorgement de la partie dont le tissu se déchire facilement, et est abreuvé de sucs qui exhalent une odeur fétide.

*Esp. I. Gangrène d'hôpital.*

*Syn.* Pourriture d'hôpital.

*Bibl.* A. DUSSAUSOY, dissert. et observat. sur la gangrène des hôpitaux, etc.; Lyon 1787.

MOREAU et BURDIN, essai sur la gangrène humide des hôpitaux; Paris an v; *rec. périod. de la soc. de sant. de Par.*, vol. I, pag. 353.

*Car.* Annoncée dans une plaie ou dans un ulcère par l'augmentation de la douleur et un enduit visqueux et blanchâtre sur la surface des chairs, qui sont dures, d'un gris cendré, et sanguinolentes; la gangrène se manifeste par un cercle rouge pourpré, plus ou moins étendu, œdémateux, avec dureté et renversement des bords, élévation et boursoufflement des chairs qui tombent peu après par escarres mollasses et rougeâtres, en fournissant une abondante suppuration putride très-infecte.

*Rep. A.* Gangrène épidémique; VIGAROUS;

observ. et remarq. sur la complic. des sympt. vénér. avec d'autres virus, etc.; pag. 68, §. LXXXVI.

*Esp. II. Gangrène sporadique.*

*Car.* Elle se déclare par des causes variées dans des circonstances étrangères aux hôpitaux.

*S-esp. I.* Par contusion; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

*A.* Gangrène emphysémateuse; TH. KIRKLAND, *an inquiry into the present state of medical surgery*, etc.; vol. II, Lond. 1787.

*S-esp. II.* Par infiltration; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

*S-esp. III.* Par étranglement; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

*S-esp. IV.* Par inflammation; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5.

*A.* Gangrène par brûlure; SAUV., *loc. cit.*, esp. 6.

*S esp. V.* Gangrène par pourriture; SAUV., *loc. cit.*, esp. 7.

*S-esp. VI.* Gangrène par compression; F. J. WOHLLEBEN, *de gangrænâ generatim*, et

*in specie de illâ quæ a decubitu oritur, etc.;*  
*Vindob. 1780.*

*S-GEN. II. Excitative.*

*Syn.* Nécrose ; SAUV., cl. X , cachexies ;  
 ord. VII , anormales ; gen. XLI. — SAGAR , cl.  
 III , cachexies ; ord. VII , anormales ; gen. XLIII.

Gangrène sèche ; voy. tom. II de cet ouvrage,  
 pag. 332 , sorte 31.

*Car.* Gangrène avec douleur ou état con-  
 vulsif.

*Esp. I. Fièvre gangreneuse.*

*Car.* La gangrène est précédée de fièvre ;  
 de douleurs vagues , de lassitudes , etc. , ou en  
 est accompagnée.

*Rap. A.* Nécrose épidémique ; SAUV., *loc.*  
*cit.* , esp. 5. — BOUCHER , mémoire sur la gan-  
 grène épidémique qui a régné en 1749 et 1750 ;  
*journ. de médéc.* ; vol. XVII , pag. 327.

*B.* Nécrose fébrile ; SAUV., *loc. cit.* , esp. 3.

*C.* Rhumatisme nécrosique ; SAUV., *loc. cit.* ,  
 esp. 14.

*Esp. II. Gangrène des riches.*

*Car.* Appartenant à la classe des personnes

qui se nourrissent avec des alimens trop succulens , et qui mènent une vie molle et sédentaire , et précédée par une espèce d'apathie avec perte ou diminution d'appétit , etc. La gangrène se montre par une tache ou escarre noire qu'accompagnent l'engourdissement , la pesanteur et l'insensibilité des parties voisines ; une inflammation superficielle d'un rouge un peu pourpré , bientôt suivie de dessèchement et de la séparation de l'épiderme ; enfin une odeur fade et particulière , propre aux chairs molles et noires qui se trouvent au-dessous. Les escarres , toujours isolées , se multiplient , et les parties qui ne sont pas gangrenées sont agitées par des mouvemens spasmodiques.

*Voy.* JEANROI , mém. sur une espèce particulière de gangrène , etc. ; *mém. de la soc. roy. de méd.* , ann. 1782-83 , pag. 151 des *mémoires*.

*Esp. III. Gangrène des vieillards.*

*Bibl.* COSCHWITZ , de *sphacelo senum* ; Halæ 1725.

CH. WHITE , *observations on gangrenes and mortifications* , etc. ; Lond. 1790.

TH. KIRKLAND , de l'utilité de l'opium dans

la gangrène ; *journ. de médéc.*, ann. 1791 ;  
tom. LXXXV, pag. 208.

*Car.* Tache noire ou livide un peu au-dessus  
de l'orteil, avec séparation de l'épiderme, et  
chair livide en dessus ; production d'une ma-  
tière ichoreuse, âcre et rongeante, et irritabi-  
lité des parties de la tumeur que la gangrène  
n'a pas encore attaquées.

*Rap. A.* Gangrène par les engelures ; AL.  
GRANT, observ. sur les effets de l'opium dans  
les maladies par augmentation contre nature de  
l'irritabilité ; *journ. de médéc.*, ann. 1782, vol.  
LXXXII, pag. 435.

### *S-GEN. III. Charbonneuse.*

*Car.* Gangrène avec tumeur, circonscrite,  
dure et indolente.

#### *Esp. I. Charbon.*

*Bibl.* CAMERARIUS, *de carbone* ; *Tubing.*  
1713.

THOMASSIN, dissertation sur le charbon malin  
de la Bourgogne, ou la pustule maligne ; *Dijon*  
1780, *Bâle* 1782.

CHAMBON, traité de l'anthrax ou de la pus-  
tule maligne ; *Neufchâtel et Paris* 1781.

**PLOUCQUET**, *de anthrace venenato*; *Tubing.*  
1786.

*Car.* Après une petite démangeaison suivie de pesanteur et une certaine disposition au sommeil, il s'élève au dessus de la peau une vésicule peu apparente ou un amas de pustules miliaires, toujours déprimées et circonscrites par un cercle livide ou jaunâtre, recouvrant un noyau très-dur. Il n'y a point de douleur et tout au plus un sentiment de pesanteur stupéfactive.

*Esp. II. Fièvre charbonneuse.*

*Bibl.* V. MALACARNE, *de febre carbunculosa*, *deque carbone bovillo*; *Patav.* 1797; et coll. de BRERA, vol. III, pag. 1.

*Car.* Fièvre avec apparition d'un charbon.

*Rap. A.* Peste charbonculeuse; SAUV., cl. III, ord. 1, gen. 1, esp. 5.

*S-GEN. IV. Osseuse.*

*Car.* Gangrène ayant son siège dans l'os.

*Esp. I. Nécrose.*

*Eth.* de *necros*, mort.

*Bibl.* BOUSSELIN, observation sur la nécrose;

*hist. et mém. de la soc. roy. de méd. de Par.* ;  
ann. 1780-81, pag. 295 de l'*hist.*

DAVID, observations sur la nécrose ; *Rouen*  
1782.

J. P. WEIDMANN, *de necrosi ossium adno-*  
*tatio* ; *Mogunt.* 1784.

J. F. DELZEUZES, dissert. sur la nécrose  
et la carie ; *Paris* an X.

M. FOURÉ, dissert. sur la nécrose des os ;  
*Paris* an XI-1802.

*Car.* Après la destruction du périoste, l'os  
passe au blanc terne, ensuite au jaunâtre ; il  
prend enfin une teinte plus brune, devient noir,  
sec, aride, et exhale une odeur fétide.

#### *Esp. II. Séquestre.*

*Car.* L'os nécrosé est renfermé dans un  
nouvel os.

#### *Formes gangreneuses.*

Sor. 1. Hémoptysie sphacélique ; SAUV., cl.  
IX, ord. I, gen. II, esp. 11.

2. Syncope sphacélique ; SAUV., cl. VI,  
ord. IV, gen. XXIII, esp. 14.

3. Hoquet gangrenique ; SAUV., cl. V, ord.  
I, gen. IV, esp. 21.

4. Squinancie gangreneuse; SAUV., cl. III, ord. III, gen. XX, esp. 3, var. B. — ASTRUC, lettre sur l'espèce de mal de gorge gangreneux qui a régné parmi les enfans en 1748; *Paris* 1748. — PLANCHON, description des maux de gorge épidémiques et gangreneux qui ont régné en 1765 et 1766; *journ. de méd.*, tom. XXXI, pag. 500. — W. WITHERING, *de anginâ gangrænosa*; *Edinb.* 1766. — J. TAYLOUR, *de cynanche gangrænosa*; *Edinb.* 1776; et coll. de WEBSTER, ord. III, tom. I, pag. 466. — READ, histoire de l'esquinancie gangreneuse, pétéchiale, qui a régné dans le village de Moivron, etc.; *Metz* 1777. — W. GRANTS, *a schort account of a fever and soore throat*; etc.; *Lond.* 1777. — BOOKE, *de anginâ gangrænosa*; *Giessæ* 1780. — P. A. CRAMER, *de anginæ gangrænosæ differentiis*; *Halæ* 1783. — *Voy.* tom. II. de cet ouvrage, pag. 205-6.

Si l'on veut établir un point de comparaison entre l'esquinancie gangreneuse chez l'homme et chez les animaux, on peut consulter J. BRUGNONE, *storia della squinancia cancrenosa epidemica e contagiosa*, etc.; *Turin* 1777.

5. Ulcère gangreneux, *elcosis gangrænosa*; SAUV., cl. X, ord. VII, gen. XXXIX, esp. 9.

## Gen. LXXXI. P U O S E.

*Eth.* de *pys*, pus, matière purulente; de *pytho*, je corromps.

*Syn.* Pyogenie; DANIEL, *system. ægritud.*, pag. 197.

Pyorrhée, effusion de pus; PLOUCQUET, cl. II, péritropénuses; ord. XIII.

Apostème, abcès, dépôt; SAUVAGES, cl. I, vices; ord. V, kistes; gen. XXXIX. — LINNÉ, cl. XI, vices; ord. I, humoraux; gen. CCXXXIII. — VOGEL, cl. X, vices; ord. II, tumeurs; gen. CCCLIV. — SAGAR, cl. I, vices; ord. V, kistes; gen. XL.

*Bibl.* F. QUESNAY, traité de la suppuration; Paris 1749.

J. F. FASEL, de *cacochymiâ purulentâ*; Jenæ 1758.

PH. A. BOEHMER, de *hæmorrhagiâ suppuratoriâ*; Halæ 1759.

F. W. MEYER, de *abscessu ad coxam in febribus in lentam degenerantibus*; Gotting. 1759.

R. A. VOGEL, de *abscessu lapillos quosdam continente*; Goetting. 1762.

J. GRASHUYS, de *generatione puris*, etc.; Amstelod., edit. nov. 1764.

A. MURRAY, *de puris absque prægressa inflammatione origine*; Goetting. 1766; et coll. de MURRAY, tom. I, pag. 141. — coll. de SCHROEDER, tom. II, pag. 46c.

PH. A. BOEHMER, *de genesi materiæ purulentæ absque præviâ inflammatione*; Halæ 1768.

PETRI, *tentamina quædam circa generationem puris*; Strasb. 1778.

E. DARWIN, *experiments establishing a criterion between mucaginous and purulent matter*; Lichfield 1780.

J. CH. S. SÄLMUTH, *de diagnosi puris*; Gotting. 1783.

**Car.** Production de pus avec des symptômes obscurs ou manifestes, tels que des frissonnemens irréguliers, du mal-aise, un pouls dérangé, une gêne, une douleur ou une inflammation; et donnant lieu à une matière contenue dans une poche ou kiste, infiltrée dans le tissu cellulaire d'une partie, ou épanchée dans une capacité.

**Var. A.** Puose (*idiopathique*) avec amas de pus dans la partie qui a été le siège du mal.

**Abcès, apostema abscessus; SAUV., loc. cit., esp. I.**

B. Puose ( *métastatique* ) avec amas de pus dans une partie étrangère au siège du mal , mais provenant de ce siège.

Dépôt , métastase.

Apostase , *apostema apostasis* ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

C. Puose ( *métapostasique* ) avec collection de pus dans une autre partie que celle où l'inflammation a eu lieu , et sans indices de métastase ou de dépôt.

*Esp. I. Primitive.*

*Car.* Matière purulente formée sans inflammation préalable , au moins reconnoissable à des signes manifestes.

*Rap. A.* Apostase ; DELIUS , *system. ægritud.* pag. 198.

*B.* Abscès spontanés des auteurs.

*Esp. II. Secondaire.*

*Car.* Pus formé après une inflammation vive ou lente.

*Rap. A.* Anasarque purulente ; SAUV. , cl. x , ord. II , gen. VII , esp. 9.

*B.* Syncope apostématique ; SAUV. , cl. VI ; ord. IV , gen. XXIII , esp. 2.

C. Cœliaque

( 65 )

C. Cœliaque purulente ; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVII, esp. 2.

*S-esp.* I. Abscès dans le cerveau.

*Bibl.* CAMERARIUS, *de vomica cerebri*; *Tubing.* 1711.

NEBEL, *de abscessibus cerebri a causâ externa ortis*; *Heidelb.* 1790. — *De apoplexiâ ex abscessu cerebri lethali*; *Heidelb.* 1790.

*Car.* Après une encéphalite vive ou lente, il y a frissonnemens irréguliers, assoupissement mêlé d'abord d'un délire morne ; et souvent sortie du pus par les oreilles ou par le nez.

*Rap. A.* Céphalite spontanée ; SAUV., cl. III, ord. III, gen. XIX, esp. 3.

*B.* Céphalite cérébelleuse ou du cervelet ; SAUV., *ibid*, esp. 8.

#### *Formes.*

*Sor.* I. Tétane hémiplegique ; SAUV., cl. IV, ord. II, gen. VII, esp. 9.

*S-esp.* II. Abscès dans l'œil.

*Syn.* Hipopyon ; VOGEL, cl. X, vices ; ord. II, tumeurs ; gen. CCCLVI.

*Tom. IV.*

5

*Car.* Après une ophtalmitie vive ou lente ; la douleur cesse et l'œil, tuméfié, offre un aspect jaunâtre ou blanchâtre.

*Rap. A.* Apostème synchyse ( œil fondu, dissolution du vitré ) ; SAUV., cl. I, ord. I, gen. XXXIX, esp. 3.

*B.* Apostème hypopium ; SAUV., *ibid*, esp. 5. — COSCHWIZ, *de hypopio* ; Halæ 1728. — MAUCHART, *de hypopio, gravi ac intricato affectu oculi* ; Tubing. 1742 ; et coll. de REUSS, vol. I, pag. 48. — P. BASSUEL, *de hypopio* ; Paris. 1757. — C. P. LEPORIN, *de hypopio* ; Gotting. 1778. — PFEIFFER, *de hypopio* ; Erlang. 1784.

*A.* Caligue par hypopion ; SAUV., cl. VI ; ord. I, gen. II, esp.

*C.* Apostème diapyèse ; SAUV., cl. I, ord. I, gen. XXXIX, esp. 5. — MAUCHART, *de empyesi oculi, seu pure in secunda oculi camera stagnante* ; Tubing. 1742 ; et coll. de REUSS, vol. I, pag. 175.

*D.* Apostème onyx ; SAUV., *ibid*, esp. 6. — Onyx ; VOGEL, cl. X, vices ; ord. II, tumeurs ; gen. CCCLV.

*A.* Ophtalmie par l'unguis ; onyx des Grecs ; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XIV, esp. 19.

( 67 )

— MAÜCHART , de ungue oculi , seu pure inter  
 corneæ lamellas collecto ; *Tubing.* ; 1742 ; et  
 coll. de REUSS , vol. I , pag. 114.

*S-esp.* III. Abscès dans l'oreille.

*Voy.* C. A. DE BERGEN , de morbis auris  
 externæ ; *Franc. ad Viad.* 1754. — *De morbis*  
*auris internæ ; ibid.*

*S-esp.* IV. Abscès dans l'antre maxillaire.

*Voy.* JOURDAIN , traité des dépôts dans le  
 sinus maxillaire , etc. ; *Paris* 1761. — Ré-  
 flexions sur les dépôts du sinus maxillaire ;  
*journ. de médéc.* , ann. 1764 , vol. XXI , pag.  
 57. — 1.<sup>er</sup> Mémoire pour servir de base au trai-  
 tement le plus convenable des abcès , des fistu-  
 les et des caries de l'une et de l'autre mâchoires ;  
*journ. de médéc.* , 1770 , tom. XXXII , pag.  
 165-251. — Mém. et observ. sur les abcès ,  
 les fistules , les ulcères et les caries de la voûte  
 du palais ; *journ. de médéc.* , 1772 , vol. XXXVII ,  
 pag. 457.

*Car.* Après des fluxions plus ou moins dou-  
 loureuses et opiniâtres , que l'on n'impute que  
 trop souvent à des dents gâtées , il survient  
 une tumeur sur la voûte du palais , dans le  
 corps des gencives , etc. , qui contient un pus

plus ou moins épais , se faisant jour quelquefois par le nez , par une alvéole , etc.

*S-esp. V.* Abscess dans la gencive.

*Rap. A.* Apostème parulie ; SAUV. , cl. I , ord. V , gen. XXXIX , esp. 7.

*Voy.* SCHELAMMER , *de parulide* ; Jenæ 1692 ; et tom. III de cet ouvrage , pag. 175.

*B.* Stomacace purulent ; SAUV. , cl. IX , ord. I , gen. III , esp. 4.

*S-esp. VI.* Abscess dans l'amygdale.

*Car.* Les symptômes inflammatoires de l'esquinancie ont cessé ; l'abscess formé dans l'amygdale est le plus souvent sensible à la vue.

*Voy.* M. FLORMAN , *kongl vetenskaps akademiens nya handlingar* , vol. XI , ann. 1790. Un matelot s'étoit plaint , depuis quelque temps , d'une difficulté d'avaler et de respirer , lorsqu'il mourut suffoqué. A l'ouverture du cadavre , on trouva une poche remplie de pus de la grosseur d'une noix , qui occupoit presque toute la partie postérieure du larynx , s'étendoit jusqu'au cartilage cricoïde et s'élevoit tellement dans le larynx , qu'il le bouchoit presque totalement. Le cartilage cricoïde étoit percé et le pus , amassé entre la substance du cartilage

et la membrane qui le tapisse , formoit une tumeur assez grosse pour intercepter le passage de l'air.

*S-esp.* VII. Absès dans la poitrine.

*Var.* A. Vomique , *apostema vomica* ; SAUVAGES , cl. I , vices ; ord. v , kistes ; gen. XXXIX , esp. 10. — SAGAR , cl. I , vices ; ord. v , kistes ; gen. XLII , esp. 7.

*Bibl.* VATER , *de vomica pulmonum* ; Jena 1700.

L. HEISTER , *de vomica pulmonum pleuropneumoniam excipiente* ; Helmstad 1758.

C. F. KALTSCHMID , *de vomicis* ; Jen. 1759.

F. J. OBERKAMP , *diss. inaug. sistens idiopathiam vomicae pulmonis lapsum excipientis* , etc. ; Heidelbergæ 1759.

A. E. BUCHNER , *diss. inaug. sistens solutionem empyematis per mictionem purulentam* ; Halæ 1762.

R. A. VOGEL , *de vomica pulmonum sine cystide* ; Goetting. 1762.

C. CH. ASELMAYER , *de empyemate singulari* ; Erlang. 1763.

F. A. KELLER , *de empyematis singularis historia et epicrisi* ; Argent. 1769.

**TRILLER**, *de differentiâ vomicarum operatarum et apertarum*; *Witterb.* 1769.

**KOLLER**, *epicrisis super vomicam ruptam nunc callosam fistulosam*; *Frib.* 1778.

*Car.* Abscès produit dans le poumon et fermé; continuation de la dyspnée et de la toux après l'époque marquée pour la résolution de la pneumonie; hecticie pyrétique, difficulté de se coucher sur le côté où se trouve l'abcès.

*Formes.*

**Sor. I.** Nausée apostemato-cardiaque; **SAUV.**; cl. IX, ord. II, sect. II, gen. XII, esp. 9.

2. Orthopnée vomiquée; **SAUV.**, cl. V, ord. II, gen. IX, esp. 7.

3. Pleurodynie vomiquée; **SAUV.**, cl. V, ord. II, gen. XI, esp. 21.

4. Paralysie vomiquée; **SAUV.**, cl. VI, ord. III, gen. XVIII, esp. 10.

*Var. B.* Empyème; **SAUVAGES**, cl. V, essouffemens; ord. II, oppressifs; gen. XIV. — **LINNÉ**, cl. VIII, suppressoires; ord. I, suffocatoires; gen. CLIX. — **VOGEL**, cl. X, vices; ord. II, tumeurs; gen. CCCLVIII. — **CULLEN**, cl. I, pyrexies; ord. II, phlegmasies; gen. XI, suites. — **SAGAR**, cl. VIII, anhélation; ord.

II, suppressives ; gen. XIII. — MACBRIDE, cl. I, universelles ; ord. VII, anhélation ; gen. V.

*Bibl.* MULLER, *de empyemate* ; *Altd.* 1705.

FISCHER, *de empyemate* ; Erford 1728.

*Car.* Epanchement de pus dans le thorax ; dyspnée, toux, difficulté de rester dans une situation horizontale, avec hecticie pyrétique, et souvent un sentiment de fluctuation : après les signes de vomique et la douleur de poitrine diminuant ou cessant.

*Rap. A.* Empyème péripleurique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. I.

*B.* Empyème vomiqué ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

*Voy.* tom. III de cet ouvrage, pag. 450.

#### *Formes.*

*Sor.* 1. Orthopnée empyématique ; SAUV., cl. V, ord. II, gen. IX, esp. 13.

2. Phthisie péripleurique ; SAUV., cl. X, ord. I, gen. II, esp. 11.

3. Phthisie vomiquée ; SAUV., *ibid*, esp. 18.

*S-esp.* VIII. Abscess dans le thymus.

*Rap. A.* Phthisie thymique ; BAUMES, traité sur la phthisie pulmonaire, tom. I, pag. 25.

*S-esp. IX. Abscès dans le péricarde.*

*Rap. A. Nausée apostématique ; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XII, esp. 9.*

*B. Palpitation par un abcès du péricarde ; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XV, esp. 4.*

*S-esp. X. Abscès dans l'estomac.*

*Voy. SANDIUS, de raro ventriculi abscessu ; Regiom. 1701.*

*EYSEL, scrutinium apostematis ventriculi ; Erford 1703.*

*Rap. A. Vomissement stéatomato-gastrique ; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XIII, esp. II.*

*B. Dyspnée stomacale ; SAUV., cl. V, ord. II, gen. XIII, esp. 13.*

*S-esp. XI. Abscès dans le pancréas.*

*Rap. A. Colique pancréatique ; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXII, esp. 13.*

*S-esp. XII. Abscès dans le mésentère.*

*Rap. A. Colique mésentérique ; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXII, esp. II.*

*S-esp. XIII. Abscès dans le foie.*

*Voy. G. RITSCH, de hepatis abscessibus a læsionibus capitis ; Halæ 17.....*

J. F. WEISSENBORN, *von den eitergeschwuren derleber, etc.*; Erfurt 1786.

*Rap. A.* Hépatite suppurante; SAUV., cl. III, ord. III, gen. XXIII, esp. 6.

*B.* Jaunisse purulente; SAUV., cl. X, ord. VI, gen. XXXII, esp. 7.

*S-esp. XIV.* Abscès dans la rate.

*Voy. CH. H. MERK, de anatomia et physiologia lienis ejusque abscessu feliciter curato, etc.*; Giessen 1785.

*S-esp. XV.* Abscès dans le rein.

*Rap. A.* Pyurie; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXVIII.

*B.* Pyurie rénale; SAUV., *ibid*, esp. 1.

*C.* Ischurie néphropyique; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XIX, esp. 8.

*D.* Ischurie urétéropyique; SAUV., *ibid*, esp. 16.

*S-esp. XVI.* Abscès dans la vessie.

*Rap. A.* Ischurie cystopyique; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XIX, esp. 23.

*B.* Ischurie cystoproctique; SAUV., *ibid*, esp. 27.

*C.* Ischurie uréthropyique; SAUV., *ib.*, esp. 35.

( 74 )

*S-esp.* XVII. Abscès dans le scrotum.*Rap. A.* Apostème empyocèle ; SAUV., cl. I, ord. v, gen. XXXIX, esp. 8.*S-esp.* XVIII. Abscès dans les doigts.*Rap. A.* Apostème des phalanges ; SAUV., cl. I, ord. v, gen. XXXIX, esp. II.*S-esp.* XIX. Abscès dans les glandes.*Rap. A.* Bubon purulent ; J. J. PLENCK, *nov. syst. tumor.*, pag. 62.*S-esp.* XX. Abscès dans les muscles.*Voy.* SCHOENMETZEL, *de musculis psoa et iliaco suppuratis* ; Heidelberg. 1776.*Rap. A.* Maladie psoadique ; R. BECK-WITH, *de morbo psoadico* ; coll. d'Édimbourg, 1784, diss. 12.**Gen. LXXXIII. ELCOSE.***Eth.* d'elcos, ulcère.*Car.* Solution de continuité.**S-GEN. I. Plaie.***Eth.* de troma, plaie ; *plaga, vulnus.**Syn.* Plaie, *vulnus* ; SAUVAGES, cl. I, vices ; ord. VII, plaies, *plagæ* ; gen. LXIII. — LINNÉ,

cl. XI, vices ; ord. II , dialytiques ; gen. CCXLI.  
 — VOGEL , cl. X , vices ; ord. VI , dissolutions ;  
 gen. CCCCLXV. — SAGAR , cl. II , plaies , *plagæ* ;  
 ord. I , solutions ; gen. I.

*Bibl.* G. CH. DETHARDING , *de febribus vul-*  
*nerariis* ; Rostoch 1754.

Z. SCHMIDT , *de vulnere in genere* ; Vindob.  
 1767.

C. DE LINNÉ , *suturæ vulnerum* ; Upsal.  
 1772 ; et *amœnit. academ.* , vol. IX , pag. 223.

S. HAHEMANN , *anleitung alte scheden , und*  
*faule geschwure grundlich zuheilen* , etc. ;  
 Leips. 1784.

J. MOORE , *a dissertation on the process*  
*of nature* , etc. ; Lond. 1789.

*Car.* Solution récente dans la continuité d'une  
 partie molle , le plus souvent béante et ensan-  
 glantée , effet de quelque violence.

*Esp. I. Plaie ( instrumentique )* à la-  
 quelle concourent seulement des corps durs qui  
 ne sont point mus par l'action du feu.

*Var. A.* Plaie superficielle , n'intéressant que  
 le tissu d'une partie.

*B.* Plaie profonde , intéressant le tissu de  
 plusieurs parties.

## Plaies pénétrantes.

*S-esp. I.* Plaie (*divisive*) faite avec un instrument tranchant, sans dilacération remarquable.

*Rap. A.* Amputation, *amputatura* (plaie produite par la séparation d'un membre ou d'une partie); LINNÉ, cl. XI, vices; ord. II, dyalitiques; gen. CCXLI.

*S-esp. II.* Plaie (*piquante*) faite avec un instrument délié et pointu.

*Rap. A.* Piqûre, *punctura* (solution de continuité non accompagnée d'écartement des lèvres); SAUV., cl. I, vices; ord. VII, plaies; gen. LXIV. — SAGAR, cl. II, plaies; ord. I, solutions sanglantes; gen. II.

A. Piqûre simple; SAUV., *loc. cit.*, esp. I.

B. Piqûre avec écharde; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

*S-esp. III.* Plaie (*déchirante*) occasionnée par rupture ou par déchirement d'une partie.

*Rap. A.* Rupture (solution d'une partie solide, molle, interne et avec hémorragie); LINNÉ, cl. XI, vices; ord. II, dyalitiques; gen. CCXXXVIII. — VOGEL, cl. X, vices; ord.

VI , dissolutions , §. I , apospasmés ; gen.  
CCCCLXVI.

B. Morsure ( plaie produite à l'aide des dents  
et avec déchirement ) ; LINNÉ , cl. XI , vices ;  
ord. II , dyalitiques ; gen. CCXLV.

S-esp. IV. Plaie ( *contundante* ) ; faite  
avec quelque corps non divisant et accompagnée  
de contusion.

Rap. A. Contusion , *contusura* ( solution  
des fibres sans dissolution de substance ) ;  
LINNÉ , cl. XI , vices ; ord. I , dyalitiques ;  
gen. CCXXXIX.

S-esp. V. Plaie ( *virulente* ) faite avec un  
corps chargé de quelque principe malfaisant.

Var. A. Plaie de la tête.

Voy. G. DEASE , *observations on wounds  
of the head*, etc. ; Dublin 1776.

V. LACOSTE , dissert. chirurg. sur certains  
accidens qui accompagnent les plaies de tête ,  
considérés plus particulièrement sous le rap-  
port de l'application du trépan ; Paris an X.

A. Colobome ( plaie des paupières ) ; LAUTH ,  
pag. 44.

B. Rupture du cœur.

Voy. D. MUMMSEN , *de corde rupto* ; Lips.  
1764.

A. MURRAY , *de rupturâ cordis* ; Upsal. 1785.

C. Rupture de l'œsophage.

A. Pleurodynie par rupture de l'œsophage ;  
SAUV. , cl. v , ord. II , gen. XI , esp. 20.

Histoire de la maladie du baron de *Was-  
senaer* ; H. BOERHAAVE , *atrocis nec descripti  
prius morbi historia* , etc. ; *Lugd-Batav.* 1724.  
— ZIMMERMANN , traité de l'expérience en  
médec. , tom. III.

D. Plaies de l'abdomen.

Voy. FABRICIUS , *de lethalitate vulnorum  
ventriculi* ; coll. de SCHLEGEL , vol. II , p. 196.

E. Rupture de l'abdomen.

Accouchement fait par une crevasse de l'ab-  
domen ; AL. MONRO *senior* , *essays and obser-  
vations , physical and literary read before a  
society in Edimburgh* , etc. ; vol. II , pag. 338 ,  
art. 24.

A. Plaies du bas-ventre ; A. MARRIGUES ,  
dissert. anatomique et chirurgicale sur les plaies  
du bas-ventre ; *Paris* 1778.

F. Plaies des intestins.

Voy. G. E. HAMBERGER, *de rupturâ intestini duodeni*; Jenæ 1746.

L. H. L. HILCHEN, *de vulnerum in intestinis lethalitate*; Giessæ 1763.

G. Plaies de la rate.

Voy. J. CH. POHL, *de lethalitate vulnerum lienis*; Lips. 1772; et coll. de SCHLEGEL, vol. II, pag. 185.

H. Rupture de l'utérus.

Voy. PISTOR, *dissert. fœtus e rupto utero in abdomine prorumpens*; Argent. 1726.

BEHLING, *dissert. super casum uteri in partu rupti*; Altdorf 1736.

QUELLMALZ, *de rupturâ uteri*; Lips. 1756.

H. N. CRANTZ, *de rupto in partûs doloribus a fœtu utero*; Lips. 1756.

STEIDELE, *de rupto in partûs utero*; coll. de WASSERBERG, tom. I, pag. 64.

SCHROETER, *de uteri rupturâ*; Rinteln. 1780.

GEHLER, *de utero in partu rupto*; Lips. 1783.

A. DOUGLASS, *observations on a extraordinary case of ruptured uterus*; Lond. 1785.

I. Rupture des corps caverneux.

Voy. C. B. TRYE, *medical communications*, etc., vol. II, Lond. 1790, art. XVII.

## K. Plaies des articulations.

Voy. P. BRUNEAU , dissert. sur les plaies des articulations ; Paris an XI-1802.

L. Rupture musculaire ; *de rupturâ musculari ; theses anatomico-chirurgicæ* ; Paris 1788.

## M. Plaie des tendons.

Rupture du tendon d'Achille ; voy. les auteurs de chirurgie.

## N. Plaie des membranes.

*Formes ou effets traumatiques.*

Sor. 1. Hémoptysie traumatique ; SAUV. , cl. IX , ord. 1 , gen. II , esp. 12.

A. Hémoptysie hirudinique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 13.

2. Hématémèse traumatique ; SAUV. , cl. IX ; ord. 1 , gen. IV , esp. 3.

A. Hématémèse hirudinique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 4.

3. Hématurie traumatique ; SAUV. , cl. IX ; ord. 1 , gen. V , esp. 14.

A. Hématurie violente ; SAUV. , *loc. cit.* ; esp. 2.

4. Hémorrhôis proctocélique ( par la chute du fondement

fondement, *ab exaniâ* ) ; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. IX, esp. 4.

5. Asphyxie traumatique ; SAUV., cl. VI, ord. IV, gen. XXIV, esp. 14.

6. Hépatirrhée par blessure ; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. VIII, esp. 3.

7. Vomissement traumatique ; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XIII, esp. 22.

A. Vomissement céphalalgique ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 23.

8. Démence traumatique ; SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XVIII, esp. 4.

A. Démence par un coup ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 9.

9. Tremblement traumatique ; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIV, esp. 17.

10. Tétanus traumatique ; SAUV., cl. IV, ord. II, gen. VII, esp. 11.

11. Trisme traumatique ; SAUV., cl. IV, ord. I, gen. II, esp. 2.

12. Apoplexie traumatique ; SAUV., cl. V, ord. V, gen. XXXI, esp. 2.

13. Carus traumatique, cl. V, ord. V, gen. XXX, esp. 5.

14. Convulsion par coup à la tête ; SAUV., cl. IV, ord. III, gen. XIII, esp. 4.

A. Convulsion par piqûre du nerf; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

15. Eclampsie traumatique; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XVIII, esp. 9.

16. Épilepsie traumatique; SAUV., cl. IV, ord. IV, gen. XIX, esp. 13.

17. Dyspnée traumatique; SAUV., cl. V, ord. II, gen. VII, esp. 12, var.

A. Dyspnée galénique ( effet de l'expérience que fit GALIEN en coupant les nerfs diaphragmatiques ); SAUV., *loc. cit.*, esp. 16.

18. Orthopnée traumatique; SAUV., cl. V, ord. II, gen. IX, esp. 14.

19. Dysphagie des nourrissons; SAUV., cl. VII, ord. III; gen. XVII, esp. 6.

20. Gastrodynie xiphoïdique; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXI, esp. 12.

21. Rachialgie traumatique; SAUV., cl. VII, ord. V, gen. XXIX, esp. 7.

22. Paralysie traumatique; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XVIII, esp. 4.

23. Hémiplégie traumatique; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XIX, esp. 9.

24. Paraplégie traumatique; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XX, esp. 4.

25. Amaurose traumatique; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. IV, esp. 1.

26. Dipoplie traumatique ; SAUV., cl. VIII, ord. I, gen. III, esp. 8.

27. Aphonie traumatique ; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XV, esp. 6.

28. Mutité traumatique ; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XIV, esp. 2.

29. Ischurie hydrocélodée ; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XIX, esp. 40.

30. Pneumatose traumatique ; SAUV., cl. X, ord. II, gen. VI, esp. 2.

A. Pneumatose fébrile ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4, var.

31. Tympanite de SWART ; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XVII, esp. 6.

32. Carditie traumatique ; SAUV., cl. III, ord. III, gen. XXI, esp. 2.

33. Érysipèle symptomatique ; SAUV., cl. III, ord. I, gen. VII, esp. 6.

34. Ophthalmie trichiaise ; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XIV, esp. 2.

35. Angine spasmodique ; SAUV., cl. V, ord. II, gen. X, esp. 18.

*Esp. II. Plaie par des armes à feu ; LAUTH, nosolog. chirurg., pag. 19.*

*Syn. Sclopétoplaie ; SAGAR, cl. II, plaies ; ord. I, solutions sanglantes ; gen. III,*

*Bibl.* J. A. LOUBET, traité des plaies d'armes à feu; *Paris* 1753.

DUFOUART, *de intumescentiâ partium imprimis vulnerum sclopetor, instantib.*; *Paris* 1763.

HAZON en 1735, BORIE en 1754, DESLON en 1776, *an in vulneribus ex catapultis globulos plumbeos relinquere aliquando præstat*; *Paris*.

PERCY, manuel du chirurgien d'armée, etc.; sur le traitement des plaies et spécialement de celles d'arme à feu, etc.; *Paris* an III.

MEHÉE, traité des plaies d'arme à feu, etc.; *Paris* an VIII.

BERTIN, dissert. sur l'emploi des incisions dans le traitement des plaies d'armes à feu; *Paris* an X.

*Car.* Solution de continuité faite par un corps dur et contondant quelconque, mis en mouvement par la poudre à canon : pour l'ordinaire avec contusion dans un degré plus ou moins considérable, déchirement même au-delà de l'endroit frappé, inflammation violente et souvent suppuration, irritation, ébranlement; comme aussi avec stupeur dans toute la

machine , et presque jamais hémorragie , à moins que le corps qui a fait plaie n'ait ouvert un gros vaisseau.

*S-esp. I. Plaie simple.*

*Car.* Plaie d'arme à feu faite dans les chairs avec perte de substance , contusion nerveuse ou stupeur.

*S-esp. II. Plaie avec corps étranger.*

*Car.* Plaie d'arme à feu ne traversant point la partie , et dans laquelle se trouvent les corps qui ont été mus , une portion des vêtements , ou les corps détachés ou formés par un effet des plaies.

*S-esp. III. Plaie compliquée.*

*Car.* Plaie d'arme à feu , dans laquelle , outre ses effets communs , il y a hémorragie , contusion à l'os , fracture ou fracas à un ou à plusieurs os , contusion ou déchirement des tendons , des aponévroses , des ligamens ; lésion de quelque viscère.

*S-GEN. II. Fracture.*

*Eth.* du mot latin *fractura* ; en grec *katagma*.

*Syn.* Fracture ; SAUVAGES , cl. I , vices ; ord. VII , plaies ; gen. LXVII. — LINNÉ , cl. XI , vices ; ord. II , dialitiques ; gen. CCXXXVI. — VOGEL , cl. X , vices ; ord. VI , dissolutions , §. I , apospasmes ; gen. CCCCLXVIII. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. VIII , dialises ; gen. CL. — SAGAR , cl. II , plaies , ord. IV , solutions anormales ; gen. XXI.

*Bibl.* A. COCCHIO , *Græcorum chirurgici libri* ; SORANI , *unus de fracturarum signis* ; ORIBASI , *duo de fractis et de luxatis* , etc. ; Florentiæ 1754.

J. C. KRANTZ , *de fracturâ ossium ut vulnus sanandâ* ; Lips. 1756.

F. M. DISDIER , *de fracturâ ossium* ; Paris. 1759.

P. POTT , *observations on the nature and consequences of wounds and contusions of the head , fractures of the skull concussions of the brain* , etc. ; Lond. 1760. — *Some few general remarks on fractures and dislocations* ; Lond. 1768. — *Observations on the nature and consequences of those injuries to which the head is liable from external violence* , To which are added some few general remarks on fractures , etc. ; Lond. 1768. Ce

dernier ouvrage en franç., par LASSUS : *Nouvelle méthode de traiter les fractures et les luxations* ; Paris 1771.

TH. KIRKLAND , *observations upon M.<sup>r</sup> POTT'S-general remarks on fractures , etc.* ; Lond. 1770.

A. MARRIGUES , *dissert. physiol. et chirurg. sur la formation et les différens vices du cal dans les fractures , etc.* ; Paris 1783.

A. BONN , *descriptio thesauri ossium morbosorum hoviani : adnexa est dissertatio de callo , etc.* ; Amsterd. 1783. — *Tabulæ ossium morbosorum , præcipue thesauri hoviani ; fasc. I et II ; Amstelod.* 1785. ( Il n'y est presque question que des fractures. )

A. COLIN , *idées générales sur les fractures* ; Paris an X-1802.

*Car.* Solution de continuité d'une partie dure, opérée par quelque violence avec déplacement, et n'offrant d'autre indication que la coalition des parties divisées.

*Rap. A.* Fissure , *fissura* ; SAUVAGES , cl. I , vices ; ord. VII , plaies ; gen. LXVIII. — VOGEL , cl. X , vices , ord. VI , dissolutions ; §. I , apospasmes ; gen. CCCCLXIX. — SAGAR , cl. II , plaies ; ord. IV , solutions ; gen. XXII.

Fente d'un os sans déplacement.

*Voy. G. CH. REICHEL, de ossium cylindraceorum fissuris; Lips. 1764.*

*Esp. I. Fracture simple.*

*Car.* Un os seul est rompu transversalement; obliquement ou comminutivement; souvent avec chevauchement.

Vice dans la configuration d'un membre; sensible à la vue ou au tact, avec crépitation lorsqu'on remue l'os malade; dans le cas de chevauchement, le membre est raccourci.

*S-esp. I. Fracture composée.*

*Car.* Rupture d'un os à différens endroits; ou rupture de plusieurs os propres à un membre.

*Rap. A. Fractures simultanées par convulsions; journ. de méd. par BACHER, vendém. an II, tom. I, pag. 201.*

*S-esp. II. Fracture compliquée.*

*Car.* Rupture d'un os avec des indications aussi ou plus urgentes que la coalition.

*Var. A. Fracture des os de la tête; PLATNER, de curatione fracturarum, etc. in calvâ; opusc. medic., tom. II, pag. 73. — J. DA FON-*

SECA DE MATTOS, *de fracturâ cranii*; Lugd. Batav. 1753. — F. G. LE VACHER, *de fracturâ cranii, quæ dicitur contrafissura*; Paris 1762.

B. Fracture des vertèbres du cou; CH. G. LUDWIG, *de paraplegiâ ex fracturâ vertebrarum colli*; Lips. 1767.

C. Fracture de la clavicule; H. F. BRETTE, *dissertation sur la fracture de la clavicule*; Paris an X-1802.

D. Fracture de l'olécrâne; BOTTENTUIT, *de fracturâ olecranii*; Paris. 1786.

E. Fracture des côtes; F. M. DISDIER, *de costarum fracturâ*; Paris. 1764.

F. Fracture du sternum; J. C. MERTRUD, *de fracturâ sterni*; Paris. 1761.

G. Fracture des os du bassin; MARET, *observations*; *mém. de l'acad. de Dijon*, vol. II, pag. 85.

H. Fracture du femur; CH. G. LUDWIG, *de collo femoris ejusque fracturâ*; Lips. 1755. — J. LE BAS, *de femoris fracturâ*; Paris. 1762. — N. PAPILLON, *de fracturâ cruris*; Paris. 1766. — BRUMINGHANSEN, *uber den bruch des schenkelbein-halses uberhaupt*, etc.;

*Wurzbourg* 1789. — RICHERAND, dissertation anatom. chirurg. sur les fractures du cou du femur ; *Paris* an VII.

I. Fracture de la rotule ; P. CAMPER , de *fracturâ patellæ et olecrani* ; *Franequeræ* 1754, la Haye 1789. — B. MANZOTTI , dissert. chirurg. sur une nouvelle méthode de traiter les fractures de la rotule , de l'olécrâne et du métatarse , etc. ; à *Sainte-Radegonde* 1790 ; en italien.

K. Fracture du peroné ; F. CH. JUNCKER , de *inflammatione pedis et abscessu femoris , sub curatione fracturæ fibulæ ortis* ; *Hal. ad Sal.* 1769.

### S-GEN. III. Ulcère.

*Eth.* d'elcos ; en latin , *ulcus* ou *hulcus* , ulcère.

*Syn.* Ulcère ; SAUVAGES , cl. I , vices ; ord. VII , plaies ; gen. LXXI. — LINNÉ , cl. XI , vices ; ord. III , ulcérations ; §. suppurations ouvertes ; gen. CCL. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. VIII , dyalises ; gen. CXLVI. — SAGAR , cl. II , plaies ; ord. III , solutions ; gen. XII.

*Bibl.* M. L. VERNAGE , *utrum in inveteratis*

*ulceribus remediis internis potius quam externis instituenda curatio* ; Paris. 1752.

G. E. HAMBERGER, *ulcerum pathologia* ; Jenæ 1753.

F. CH. JUNCKER, *diss. inaug. sistens monita circa curationem ulcerum rebellium* ; Halæ 1759.

Traité des tumeurs et des ulcères, etc. ; Paris 1759.

PH. A. BOEHMER, *de ulcerum externorum sanatione difficili ob illorum cum morbis viscerum complicationem* ; Halæ 1762.

B. BELL, *a treatise on the theory and management of ulcers, with a dissertation on white swellings of the joints* ; Edinburgh 1778.

— En allem. ; Leips. 1779. — En franç., par BOSQUILLON : traité théorique et pratique des ulcères ; Paris 1788. — Par MM. ADET et LAGNIGAN ; Paris 1789.

L. V. F. AMARD, *dissert. sur les ulcères en général* ; Paris an XI-1802.

*Car.* Solution de continuité dans une partie molle du corps, d'où il sort du pus, de la sanie, ou quelque autre matière viciée ; par une cause interne ou externe.

*Rap.* A. Helcome ( ulcère sur la surface

interne ou externe de la cornée ); PLENCK ;  
*de morb. ocul.*, pag. 101.

A. Helcydrion ( ulcère superficiel ).

B. Coïloma ( ulcère cave ).

C. Encauma ou épicauma ( ulcère sordide et  
ardent ).

D. Botryon ( ulcère avec caroncule ).

E. Argema ( ulcère marginal ). — Argemon ;  
VOGEL, cl. X, ord. II, §. II ; gen. CCCCXCVIII.

Voy. MAUCHART, *de ulceribus corneæ* ; Tu-  
bing. 17 ; et coll. de REUSS, vol. , pag. .

B. Ægylops ( ulcère dans le grand angle de  
l'œil, ayant son siège hors le sac lacrymal ) ;  
PLENCK, *ibid*, pag. 56. — VOGEL, cl. X,  
vices ; ord. II, dissolutions ; §. II, ulcérations ;  
gen. CCCCXCIX.

A. Larmoyement ægilopique ; SAUV., cl. IX,  
ord. III, gen. XXI, esp. 5.

C. Ozène ( ulcère sordide de l'intérieur du  
nez ) ; LINNÉ, cl. XI, vices ; ord. III, ulcéra-  
tions ; gen. CCLIV. — VOGEL, cl. X, vices ;  
ord. II, dissolutions ; §. II, ulcérations ; gen.

D. — J. G. GUNZ, *progr. proponens observa-  
tionem ad ozænam maxillarem ac dentium  
ulcus pertinentem* ; Lips. 1753.

D. Intertrigue, *intertrigo* ( excoriation de

la peau, humide et rouge, par l'âcreté de la sueur ou de l'urine); VOGEL, cl. X, vices; ord. II, dissolutions; §. II, ulcérations; gen. DII.

E. Rhacose, *rhacosis* (excoriation du scrotum relâché); VOGEL, cl. X, vices; ord. II, dissolutions; §. II, ulcérations; gen. DIII.

F. Ulcère de l'utérus; G. BROUGHTON, *de ulcere uteri*; *Edinburgh* 1755. — J. G. ROEDERER, *de ulceribus utero molestis*; *Gotting.* 1758.

G. Ulcère intestinal; PH. F. GMELIN, *diss. inaug. proponens rariorem ulceris intestinalis casum et epicrisin*, etc.; *Tubing.* 1759.

H. Ulcère du rectum.

Tenesme ulcérique; SAUV., cl. IX, ord. II; gen. XIX, esp. 6.

I. Ulcère des extrémités; W. ROWLEY, *the method of curing ulcerated legs without rest*, etc.; *Lond.* 1773.

*Esp. I. Ulcère simple.*

*Syn.* Ulcère purulent simple, 1.<sup>re</sup> espèce de BELL, *loc. cit.*, trad. de BOSQUILLON, pag. 104, sect. II.

*Car.* Affection locale avec un degré très-léger de douleur et d'inflammation, fournissant toujours une matière d'une nature bénigne et d'une consistance convenable.

*Var. A.* Ulcération, *exulceratio* ( excoriation ulcéreuse suppurante ); SAUVAGES, cl. I, ord. VI, gen. LXXII. — SAGAR, cl. II, ord. III, gen. XIII.

*B.* Rhagade, *rhagas* ( solution de continuité sèche dans les bords des parties ); SAUVAGES, cl. I, ord. VII, gen. LXXV. — LINNÉ, cl. XI, ord. II; gen. CCXLIX. — VOGEL, cl. X, ord. VI, gen. CCCCLXVII. — SAGAR, cl. II, ord. IV, gen. XIX.

*Esp. II. Ulcère vicié.*

Ulcère simple vicié; 2.<sup>o</sup> esp. de BELL, *loc. cit.*, pag. 142, sect. III.

*Car.* Ulcère s'écartant plus ou moins de l'ulcère simple.

*Rap. A.* Cacoethes ( ulcère superficiel, s'étendant de proche en proche, humide et pérenne ); LINNÉ, cl. XI, ord. II, gen. CCLI.

*B.* Phagedæne ( ulcère serpentant mais ne détruisant que la peau ); VOGEL, cl. X, ord. VI, gen. CCCCLXXXVIII.

**C. Nome, noma** (ulcère rongéant les chairs et les tégumens, parvenant à cicatrice); LINNÉ, cl. XI, ord. II, gen. CCLII. — VOGEL, cl. X, ord. VI, gen. CCCCLXXXIX. — *Voy.* G. LUND, *kongl vetenskaps akademis handlingar*, etc.; vol. XXVI, pag. 36, art. 4. — P. BIERCHEN, *intra-des-tal on ktastskadors*, etc.; Stockolm 1772, pag. 85.

**D. Thériome, therioma** (ulcère dans lequel la chair se putréfie et, rendue molle, cadavéreuse, exhale une odeur infecte); VOGEL, cl. X, ord. VI, gen. CCCCLXXXVI.

**S-esp. I. Sanieux.**

**Car.** Ulcère avec écoulement aqueux, limpide, quelquefois verdâtre; connu sous le nom de *sanie*.

**S-esp. II. Ichoreux.**

**Car.** Ulcère fournissant une matière légèrement rouge, aqueuse et généralement très-âcre, corrosive même, appelée *matière ichoreuse*.

**S-esp. III. Sordide.**

**Car.** Ulcère donnant une matière assez vis-

queuse et glutineuse , souvent d'un rouge tirant sur le brun , et ressemblant un peu au marc de café ou à des grumeaux de sang mêlés avec de l'eau : matière désignée par l'épithète de *sordide* , toujours acrimonieuse et beaucoup plus fétide que la matière purulente.

*Var. A.* Ulcère érysipélateux ; J. ROLLO , *traité du diabète sucré* , trad. franç. , pag. 76.

*Car.* Après une indisposition d'un ou de deux jours , et l'érysipèle ayant régné ou régnant encore , l'ulcère simple change d'aspect ; de rouge qu'il étoit , il devient brun ou pourpre ; un pus séreux ou jaunâtre succède à l'écoulement blanc et épais. L'ulcère est en outre environné d'une inflammation qui s'étend au loin sur la peau et qui , dans plusieurs cas , est accompagné de rayes rougeâtres ou d'une seule , qui se portent vers une glande lymphatique , engorgée et devenue douloureuse.

*Var. B.* Ulcère d'hôpital ; J. ROLLO , *traité du diabète sucré* , pag. 77 et suiv.

*Car.* Sur un ulcère qui s'avance vers la cicatrisation , il se forme un petit ulcère , très-distinct , de couleur brunâtre ; ses bords sont dentelés , son milieu est inégal et tuberculeux ,  
il

Il en découle une matière d'une odeur particulière. L'ulcère s'agrandit, il fournit un pus blanchâtre entremêlé de stries brunâtres, se complique de fièvre et, ou prend un caractère gangreneux, ou se couvre d'une matière blanchâtre et collante.

*Car. III. Ulcère fongueux.*

Ulcère fongueux; 3.<sup>e</sup> espèce de BELL, *loc. cit.*, pag. 152, sect. IV.

*Car.* Ulcère sur lequel poussent des fongosités ou des excroissances contre nature, communément molles et spongieuses, avec très-peu de douleur.

Hypersarcose des auteurs de chirurgie.

Sycose; VOGEL, cl. X, ord. VI, gen. CCCXC.

Fungus articulaire; J. F. MULLER, *de fungo articulari cum annexâ ejusdem argumenti observatione*; Gotting. 1780.

*Esp. IV. Ulcère cavé.*

Ulcère fistuleux; 4.<sup>e</sup> espèce de BELL, *loc. cit.*, pag. 160, sect. V.

*Bibl.* J. MAULL, *de diversâ fistularum naturâ et curatione*; Duisb. 1773.

Tom. IV.

*Var. A.* Sinus, clapier; SAUVAGES, cl. I; vices; ord. VII, plaies; gen. LXXIII. — VOGEL; cl. X, vices; ord. VI, dissolutions; §. II, exulcérations; gen. CCCCXCII. — SAGAR, cl. II, plaies; ord. III, solutions insanglantes; gen. XV.

*Car.* Cavité ulcérée dont le fond, qui est ample et souvent multiplié, se termine par un orifice étroit.

*Var. B.* Fistule; SAUVAGES, cl. I, vices; ord. VII, plaies; gen. LXXIV. — LINNÉ, cl. XI, vices; ord. III, ulcérations; gen. CCLV. — VOGEL, cl. X, vices; ord. VI, dissolutions; §. II, exulcérations; gen. CCCCXCI. — SAGAR, cl. II, plaies; ord. III, solutions insanglantes; gen. XIV.

*Car.* Ulcère sinueux à orifice étroit et calleux.

*S-esp. I.* Fistule lacrymale.

Fistule lacrymale; PLENCK, *de morb. ocul.*; pag. 57.

*Bibl.* J. CH. VOGEL, *de fistulâ lacrymalî, eamque sanandi methodis; Gryphiswaldiæ* 1756.

P. POTT, *observations on that disorder of*

*the carner of the eye commonly called fistula lacrymalis ; Lond. 1758. — Observations on the fistula lacrymalis ; Lond. 1763. En allem. ; Dresden 1771.*

*SCHULZE, de fistulam lacrymalem sanandē methodo ; Argentor. 1780.*

*P. DUTROUILH, dissert. sur la fistule lacrymale ; Paris an X-1802.*

*Car.* Un ou plusieurs ulcères situés dans le grand angle de l'œil, au dessous de la commissure interne des paupières ; précédés d'une inflammation érysipélateuse dont le foyer est dans le grand angle, et qui s'étend sur tout le côté de la face ; tension et douleurs dans cette partie ; engorgement œdémateux des paupières et des parties les plus voisines ; *ulcères avec plus ou moins de callosités* ; écoulement sur la joue d'un véritable pus mêlé avec les larmes.

*Var. A. Première espèce de M. L'ÉVEILLÉ ; trad. franç. des malad. des yeux par SCARPA, tom. I, pag. 131. Tumeur molle, fluctuante, douloureuse, d'un rouge noir et sans ulcération ; issue par les points lacrymaux d'un pus abondant, fétide, noirâtre et strié de larmes lors de la compression ; narine sèche ; altération*

de la partie postérieure du sac et de l'os unguis, reconnue par l'introduction méthodique de la sonde d'*Anel*.

B. *Seconde espèce* de M. L'ÉVEILLÉ, *loc. cit.*, pag. 134. Ulcère dans le grand angle de l'œil; destruction de la partie postérieure du sac, sans ouverture communicante dans le nez; écoulement sur la joue des larmes et d'un pus abondant, ichoreux, fétide, contour de l'ulcère, violet, douloureux; altération de l'os unguis, distincte à l'aide du stylet boutonné d'*Anel* introduit dans l'ulcère; narine sèche.

C. *Troisième espèce* de M. L'ÉVEILLÉ, *loc. cit.*, pag. 135. Un ou plusieurs petits ulcères situés dans le grand angle de l'œil, au dessous de la commissure des paupières; communication dans le sac lacrymal, dont on ne sent pas la partie postérieure désorganisée; écoulement continuel, sur la joue, de larmes mêlées avec un pus blanc, épais, sans odeur; contour de l'ulcère avec ou sans callosités, mais douloureux au toucher, avec ou sans affection chronique des paupières; narines sèches.

D. *Quatrième espèce* de M. L'ÉVEILLÉ, *loc. cit.*, pag. 135. Tumeur lacrymale avec ou sans

ulcère extérieur ; destruction d'une partie de l'os unguis ; communication immédiate du sac lacrymal dans les fosses nasales ; écoulement subit par le nez de toute la matière contenue , lorsqu'on comprime la tumeur ; larmoyement moins considérable dans ce cas que dans les trois autres précédens.

*S-esp. II. Fistule de la cornée.*

*Bibl. MAUCHART , de fistulâ cornæ ; Tubing. 1742 ; et coll. de REUSS , vol. I , pag. 195.*

*Car. Ulcère sinueux et calleux formé sur la cornée.*

*S-esp. III. Fistule à l'anus.*

*Bibl. P. BRASDOR , de ani fistulâ ; Paris. 1762.*

*P. POTT , remarks on the disease commonly called a fistula in ano ; the second edit. ; Lond. 1767.*

*Car. Ulcère sinueux et calleux formé dans le voisinage du rectum.*

*Var. A. Fistule dans le tissu graisseux de la peau ; 1.<sup>re</sup> espèce de M. D'YVOIRY , décou-*

verte sur la fistule à l'anus ; *essai de médec. théor. et pratiq.* ; Genève 1782 , tom. 1 , pag. 59.

*Car.* Fistule superficielle , presque toujours la suite d'un furoncle , donnant un pus blanchâtre et en petite quantité.

B. Fistule du sphincter de l'anus ; 2.<sup>e</sup> espèce de M. D'YVOIRY , *loc. cit.* , pag. 61.

*Car.* Fistule peu profonde , à ouverture quelquefois imperceptible , avec tenesme et douleurs vives.

C. Fistule du tissu cellulaire du rectum ; 3.<sup>e</sup> espèce de M. D'YVOIRY , *loc. cit.* , pag. 62.

*Car.* Fistule plus ou moins profonde , avec duretés , callosités et clapiers ; fournissant d'abord un pus blanchâtre , lactiforme , ensuite un pus ichoreux et verdâtre.

D. Fistule du rectum ; 4.<sup>e</sup> espèce de M. D'YVOIRY , *loc. cit.* , pag. 88.

*Car.* Même caractère que la *Var. C* , y ayant , outre l'ouverture externe , un trou plus ou moins grand à travers la substance du rectum , qui permet au pus de passer de la fistule dans cet intestin.

*S-esp.* IV. Fistule urinaire.

*Car.* Ulcère sinueux ou ouverture plus ou moins étroite qui traverse les parois de la vessie, et d'où l'urine s'écoule dans les parties voisines, goutte à goutte, souvent sans l'action de la vessie, sans mouvement dans le malade pour uriner, quelquefois dans les mouvemens du corps, par la pression des viscères abdominaux.

*Var.* A. Cysto-vaginale : fistule urinaire communicant directement dans le vagin.

B. Cysto-intestinale : fistule urinaire communicant directement dans un intestin.

C. Cysto-périnéale : fistule urinaire s'ouvrant directement dans le périnée.

*Formes.*

*Sor.* I. Énurèse fistulique ; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXVI, esp. 8.

*S-esp.* V. Fistule périnéo-urétrale.

Ulcère sinueux et calleux, intéressant le périnée et l'urètre.

*Car.* L'urine ne s'écoule des ouvertures fistuleuses que par intervalles, après qu'elle a été expulsée de la vessie.

*Esp. V. Ulcère calleux.*

Ulcère calleux; 5.<sup>e</sup> espèce de BELL, *loc. cit.*, pag. 167, sect. VI.

*Bibl.* A. NIETZKI, *de callorum circa ulcera ortu, effectu, præservatione et curatione; Halæ 1762.*

*Car.* Ulcère dont les bords, au lieu de se contracter et de diminuer la grandeur de la plaie, se tiennent écartés, se rident et acquièrent enfin une épaisseur contre nature, qui quelquefois les élève beaucoup au dessus du niveau des parties voisines. Cet ulcère est souvent avec des veines variqueuses.

*S-GEN. IV. Carie.*

*Eth.* du latin *caries*, carie, vermoulure.

*Syn.* Carie; SAUVAGES, cl. I, vices; ord. VII, plaies; gen. LXXVII. — LINNÉ, cl. XI, vices; ord. III, ulcérations; gen. CCLVI. — VOGEL, cl. X, vices; ord. II, dissolutions; §. II, ulcérations; gen. CCCXCIII. — CULLEN, cl. IV, locales; ord. VIII, dyalises; gen. CLI. — SAGAR, cl. II, plaies; ord. III, solutions; gen. XVII.

Arthrocaecæ ; SAUVAGES , cl. I , vices ; ord. VII , plaies ; gen. LXXVIII. — LINNÉ , cl. XI , vices ; ord. III , ulcérations ; gen. CCLVII. — SAGAR , cl. II , plaies ; ord. III , solutions ; gen. XVIII.

*Spina ventosa* des auteurs ; voy. tom. III de cet ouvrage , pag. 353.

*Bibl.* ADOLPHI , de *spinâ ventosâ* ; Halæ 1705.

WALDSCHMID , *diss. sistens ægrum , spinâ ventosa laborantem* ; Kilon. 1718.

FOURNIER , de *carie ossium* ; Monspel. 1736.

HAMBERGER , de *spinâ ventosâ* ; Jenæ 1746.

C. F. KALTSCHMID , de *raro spinæ ventosæ casu* ; Jenæ 1755.

J. RANCHERT , de *carie ossium* ; Lugd.-Bat. 1756.

G. F. SIGWART , *diss. inaug. carie consumptæ tibie notabilis jactura* , etc. ; Tubing. 1756.

E. A. NICOLAI , de *carie ossium in genere* ; Jenæ 1762.

T. G. TIMMERMANN , de *spinâ ventosâ , morbo chirurgico-medico* ; Rintel 1765.

D. PERELLET , *diss. sistens casum de carie ossium cum epicrisi subjunctâ* ; Argent. 1770.

H. P. LEVELING , de *carie cranii militis*

*quondam venerei, postea epileptici, tandem apoplexia defuncti; Ingolst. 1774.*

GRULL, *de rancore et morbis ex rancido; Lugd.-Batav. 1777.*

METZGER, *de spinâ ventosâ in vertebra dorsi visa; Regiom. 1787; et opus medic., fascic. I.*

CH. P. JOFFRION, *dissert. sur la carie des vertèbres et les abcès par congestion; Paris an' IX-1801.*

*Car.* Solution ichoreuse d'une partie dure.

*Rap. A.* Elcose; SAGAR, cl. III, cachexies; ord. VII, cachexies anomales; gen. XL.

*Esp. I. Humide.*

*Car.* Production d'une matière, tenue, brune ou noire, et d'une couleur grasseuse, d'une odeur particulière et très-fétide.

*S-esp. I. Vermoulue.*

*Car.* Ulcère sinueux de l'os.

*S-esp. II. Hypersarcosique.*

*Car.* Carie avec hypersarcose.

*S-esp. III. Phagédénique.*

*Car.* Destruction purulente des fibres osseu-

ses , à la place desquelles il se forme une substance carniforme spongieuse.

**Sphacèle de l'os.**

*Esp. II. Sèche.*

*Car.* L'os , quoique malade et susceptible d'exfoliation , est assez ferme , uni , et rend peu ou point de matière.

*Esp. III. Adipocirée.*

*Car.* L'os malade est transformé en un tissu adipocireux.

6.<sup>e</sup> espèce de carie de NOEL ; *journ. de médéc.* , ann. 1779 , vol. LI , pag. 131.

*Formes elcosiques.*

*Sor.* 1. Hématemèse pancréatique ( par un ulcère du pancréas ) ; SAUV. , cl. IX , ord. I , gen. IV , esp. 6.

2. Phlegmatie ulcéreuse ( enflure des jambes et des pieds , accompagnée d'ulcères érysipélateux ) SAUV. , cl. X , ord. II , gen. VIII , esp. 6.

3. Syncope métastatique ( par la répercussion du pus d'un ulcère ) ; SAUV. , cl. VI , ord. IV , gen. XXIII , esp. 20.

4. Anosmie ozénique ( par un ulcère du nez ); SAUV., cl. VI, ord. I, gen. V, esp. 2.
5. Paraphonie ulcéreuse ( par un ulcère du gosier ); SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XVII, esp. 4.
6. Dysecœe fistulo-tympanique ( par un ulcère fistuleux du tympan ); SAUV., cl. VI, ord. I, gen. VII, esp. 6.
7. Manie ulcéreuse ( par une métastase du pus d'un ulcère externe ); SAUV., cl. VIII, ord. III, gen. XX, esp. 4.
8. Phthisie métastatique ( par la métastase du pus d'un ulcère externe ); SAUV., cl. X, ord. I, gen. II, esp. 9.
9. Dysphagie nauséuse ( par une exulcération de l'œsophage ); SAUV., cl. VII, ord. III, gen. XVII, esp. 9.
10. Gastrodynie métastatique ( par un ulcère de l'estomac, du pancréas ou du foie ); SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXI, esp. 5.
11. Pyrose ulcéreuse ( par un ulcère au pylore ); SAUV., cl. VII, ord. III, gen. XVIII, esp. 5.
12. Lientérie gastro-ulcérique ( par un ulcère de l'estomac ); SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVIII, esp. I.
13. Ptyalisme purulent ( par un ulcère avec

carie des sinus maxillaires ); SAUV., cl. IX,  
ord. III, gen. XXIII, esp. 12.

14. Coryza virulente (provenant d'un ozène);  
SAUV., cl. VII, ord. I, gen. IV, esp. 3.

A. Coryze sanioso-purulente (par un ulcère  
placé dans les sinus frontaux); SAUV., *ib.*,  
esp. 5.

**Gen. LXXXIV. CANCER.**

*Eth.* de cancer, en grec *carcinoma*, *car-*  
*cinome*.

*Syn.* Cancer; BOERHAAVE, *aph.* 492. —  
VOGEL, cl. X, vices; ord. II, tumeurs; gen.  
CCCLXXV. — CULLEN, cl. IV, locales; ord.  
VI, tumeurs; gen. CXXXII.

Carcinome; SAUVAGES, cl. I, vices; ord.  
III, tumeurs; gen. XX. — LINNÉ, cl. XI,  
vices; ord. III, ulcérations; gen. CCLIII. —  
SAGAR, cl. I, vices; ord. I, tumeurs;  
gen. XXV.

*Bibl.* STAHL, *de cancro*; Halæ 1699.

GENDRON, *recherches sur le cancer*; Paris  
1701.

CRAUS, *de carcinomate*; Jenæ 1713.

G. M. QUADRIO, *nuovo methodo per cu-*

*fare securamente ogni canchero coperto e specialmende le ghiande scirroze delle mamelle e di altre parti di corpo, etc.; in Venezia 1750.*

L. M. POUSSE, *an tumoris cancrozi radi-  
citus ablati regeneratio rursus chirurgiæ tra-  
denda; Paris 1750.*

D. W. TRILLER, *de nociya cancri invete-  
rati extirpatione novis exemplis demonstratâ;  
Viteb. 1752; et opusc. med., tom. I, pag. 56.*

T. LAMBERGEN, *lectio inaug. sistens ephemeriden persanati carcinomatis; Groning.  
1754; et coll. de HALLER, tom. II, pag. 1.*

PH. F. GMELIN, *specifica methodus recen-  
tior cancrum sanandi, etc.; Tubing. 1757;  
et coll. de HALLER, tom. VI, pag. 236.*

PH. A. BOEHMER, *de cancro occulto et  
aperto; Halæ 1761.*

L. G. LE MONIER, *an cancer ulceratus ci-  
cutam eludit? Paris 1763.*

J. BURROWS, *a new practical essay on can-  
cers, etc.; Lond. 1767.*

F. X. DE MARC, *de cancro et spinâ ven-  
tosa curabilibus; Viennæ 1767.*

VAN GESSCHER, *proeve over de voornaamste  
langdûurige gezwellen, etc.; the Amsterdam  
1767.*

R. A. VOGEL, *de curatione cancri occulti et aperti, per aquam calcis vivæ potam præstitâ*; Gotting. 1769.

FRANCKE, *de cancro*; Jena 1770.

BIERCHEN, *intrades tal on ktaflskadors, etc.*; Stockolm 1772.

J. M. GAMET, *nouvelle théorie sur les affections cancéreuses, etc.*; Paris 1772. — *Traité des affections cancéreuses, etc.*; Paris 1777.

HILL, *cases in surgery, particulary of cancers, etc.*; Lond. 1773.

DUPRÉ DE LILLE, *traité sur le vice cancéreux*; Paris 1774.

MÉRULLA, *riflessioni sulla natura cagione e cura dei cancri, etc.*; in Firenze 1775.

B. PERYLHE, *dissert. academ. de cancro, etc.*; Antuerpiæ 1775. — *Diss. académ. sur le cancer*; Paris 1776. — Coll. de SCHLEGEL, tom. 1, pag. 181.

J. O. JUSTAMOND, *an account of the methods pursued in the treatment of cancerous and schirrhous disorders and other indurations*; Lond. 1780.

ADAIR CRAWFORD, *expériences et observations sur la matière des cancers, etc.*; philo-

*sophical transactions*, etc.; tom. LXXX, part.  
1, art. XXII.

P. CAMPER, *verhandeling over der vaaren  
art von kankerwording*, etc.; *Amsterd.* 1780.

MARTINET, observations médico-chimiques  
sur le cancer; *Paris* 1781-83.

J. FLORES, spécifique nouvellement décou-  
vert dans le royaume de Guatimala, pour la  
guérison radicale du cancer et d'autres maux  
plus fréquens ( en espagnol ); *Madrid* 1782.

STEPHAN, *de signis cancri*; *Leips.* 1783.

J. CLERKE, *dissert. med. inaug. quædam de  
cancro complectens*; *Edinb.* 1784; et *diss. med.  
Edinburg.*, 1784.

JÆNISCH, *abhandlung von dem krebs und  
von der besten heilart desselben*, etc.; *Peters-  
bourg* 1784.

*Raccolta di vari opuscoli publicati fin ora  
intorno all'uso delle lucertole per la guarig-  
gione di cancri ed altri mali*, etc.; *Napoli*  
1785.

FEARON, *a treatise on cancers*, etc.; *Lond.*  
1784; 3.<sup>e</sup> édit. 1790.

PH. J. ROUX, mémoire renfermant quelques  
vues générales sur le cancer; *œuvr. chirurg.  
de DÉSAULT*, tom. III, nouv. édit., *Paris*  
an XI-1803, pag. 406.

Car.

*Car.* Tumeur squirrodée douloureuse, surmontée d'aspérités, de varices, et dégénérant en un ulcère horrible, avec des bords épais, durs, renversés, d'un rouge pâle, ou livides; et une suppuration ichoreuse, très-fétide et rongeante.

*Rap. A.* Carcinôme; VOGEL, cl. x, ord. VI, gen. CCCCLXXXVII.

*B.* Ulcère cancreux; BELL, *traité des ulcères*, pag. 195.

*Esp. I. Cancer squirreux.*

*Car.* Né d'un véritable squirre, il forme d'abord une tumeur lisse qui devient ensuite un peu raboteuse à sa surface, est communément ronde, consistante, et fournit, à l'instant où elle s'ouvre, une petite quantité d'eau ou de sérosité.

*Rap. A.* Cancer véritable; BIERCHEN, *loc. cit.*, esp. 1, pag. 7.

*B.* Vrai cancer ou cancer dartreux; GAMET, *loc. cit.*, art. 1, pag. 23.

*Esp. II. Cancer fongueux.*

*Car.* Quoique provenu d'un fungus dur et presque cartilagineux, il acquiert une étendue

et une grosseur beaucoup plus considérables que le précédent ; ses progrès sont rapides, il y vient des élévations mollasses et livides ; il se crève avec violence et souvent en plusieurs endroits, qui répandent une grande quantité d'eau rousse sanguinolente.

*Rap. A.* Cancer fongueux ; BIERCHEN, *loc. cit.*, pag. 17.

*B.* Cancer scorbutique ; GAMET, *loc. cit.*, art. 11, pag. 28.

*Esp. III. Cancer spongieux.*

*Car.* Il y a constamment une carie pour principe, fait des progrès lents sans causer de douleurs, prend ensuite promptement un accroissement incommode. La peau présente des pores fort ouverts et noirs, comme s'il y avoit de poudre à tirer ; en certains endroits, elle paroît comme musculieuse, et cartilagineuse en d'autres : la chaleur y est grande.

*Rap. A.* Carcinome spongieux ; ACREL, *historia tumorum rariorum circa carpum et involâ manûs obvenientium ; comment. societ. reg. scient. Gotting.*, ann. 1779, vol. 11, 1780, pag. 112.

*B.* Cancer spongieux de LANGE, *biblioth.*

*chirurg. de RICHTER ; gazette salulaire , ann. 1788 , n.º XLVII.*

*Esp. IV. Cancer croûteux.*

*Car.* Il s'étend et détruit de proche en proche , ressemble à la dartre rongeanle , se déclare par une seule tache , fait de progrès lents , forme une seule croûte ou écaille qui , en tombant , laisse une apparence furfuracée , se recouvre d'une écaille plus large et plus épaisse , qui tombe et se forme de nouveau jusqu'à ce qu'enfin il se fait une véritable croûte ; enfin , l'ulcère cancéreux se déclare , mais , au lieu de creuser , il s'étend superficiellement.

*Rap. A. Cancer fongueux ou croûteux ; J. HILL , cases in surgery , particulary of cancers , etc. ; Lond. 1773.*

*B. Carcinome phagédénique ; SAUV. , cl. I , ord. III , gen. XX , esp. 4.*

*Esp. V. Cancer ulcéreux.*

*Car.* Il a l'apparence d'un ulcère superficiel douloureux , à bords dentelés.

*Rap. A. Cancer des ramoneurs , poireau de la suie ; PERCIVAL POTT , chirurgical obser-*

vations, etc.; Lond. 1775. — Œuvres chirurgicales, etc.; Paris 1777.

I.<sup>o</sup> Variétés dues au siège.

A. Cancer facial ou du visage; *noli me tangere* des anciens.

B. Cancer palpébral : cancer de la paupière; LAUTH, *nosolog. chirurg.*, gen. 59.

Ophthalmie cancéreuse; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XIV, esp. 15.

Caligue cancéreuse; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. II, esp. 9.

C. Cancer nasal : tumeurs carcinomateuses au nez; *mém. de l'académ. roy. de chirurg.*, tom. III, pag. 511 des *mém.*

D. Cancer lingual; BUXTORF, *acta helvetica*, vol. VII, pag. 101, art. 12.

Voy. J. N. ROHLWS, *abhandlung vom zungenkrebs*, etc.; Lüneb. 1787.

E. Cancer labial : cancer ouvert à la lèvre inférieure; TODE, *biblith. medic. chirurg.* — Observation sur un carcinome au cou et un cancer aux lèvres, etc.; SCHOENHEIDER, *acta Hauniens.*, tom. I, pag. 33.

F. Cancer mammaire.

*Nota bene.* Le plus grand nombre des traités ou observations relatives au cancer, concernent celui du sein ou des mamelles : on peut néanmoins consulter plus particulièrement.

G. F. SIGWART, *disput. inaug. sistens historiam rariorem mammæ cancrisæ sanguinem menstruum fundentis, methodo simpliciore sanatæ*; Tubing. 1763; et coll. de FRANK, vol. X, pag. 64.

PALUZZI, *relazione sincera della portentosa guarigione di un cancro esistente nella mammella sinistra, etc.; in Firenze 1770.*

LERCHE, *de cancro mammarum*; Gotting. 1778.

G. BELL, *thongts on cancer of the breast, etc.*; Lond. 1788.

A. Cancer du mamelon (espèce de cancer des mamelles moins commun; ASTRUC, *malad. des femmes*; Paris 1770, tom. V, pag. 153.

G. Cancer du pylore; H. P. LEVELING, *de pyloro carcinomatoso*; Ingostald 1777.

H. Cancer utérin: cancer de la matrice. Ménorrhagie ulcéreuse; SAUV., cl. IX, ord. I, gen. VI, esp. 9.

I. Cancer du rectum.

Tenesme carcinomatique; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XIX, esp. 7.

K. Cancer de la verge; DÉSAULT, *journ. de chirurgie*, tom. II, pag. 82-88.

### II.<sup>o</sup> Variétés dues au degré. G. F. C.

#### A. Cancer occulte.

Il vaut mieux ne pas traiter ceux qui ont des cancers occultes; car, en les traitant, on les fait plutôt périr; mais si on ne les traite pas, ils vivent plus longtemps. HIPPOCRATE, *aph.*, sect. VI, 38.

Espèce inconnue ou mal décrite de cancer; JUSTAMOND, *loc. cit.*

#### B. Cancer ulcéré: ulcération du cancer squirreux.

### III.<sup>o</sup> Variétés dues à l'origine. A. C.

A. Carcinome verruqueux (provenant d'une verrue); SAUV., cl. I, ord. III, gen. XX, esp. 1.

B. Carcinome myrmécique (venu à la suite de quelques points variqueux); SAUV., *ibid*, esp. 2.

C. Carcinome loup (provenant d'une loupe); SAUV., *ibid*, esp. 3.

### *Conclusion de la quatrième classe.*

Plus la *classe* des OXIGÉNÈSES, sous le rapport des deux grandes sections qui la partagent, a eu d'extension, proportionnellement à l'importance de l'oxygène dans les phénomènes de la nature ; plus la *classe* des AZOTÈNES a dû être restreinte, puisque l'action prédominante de l'azote, dans le système des êtres vivans, s'accompagne, du plus au moins, avec la désoxygénation de ce même système. Cependant l'azote et son composé gazeux agissent encore moins d'une manière malfaisante, par eux-mêmes, que par leur union avec d'autres principes et notamment avec des substances composées diverses. Aussi un air dont l'eudiomètre n'annoncera pas des qualités délétères, n'en sera pas moins nuisible, lorsque le gaz azote, qui en forme la plus grande partie, aura pu se saturer de quelques substances propres à exciter, dans les corps vivans, des fermentations assimilatrices et des dépravations considérables.

Combien la *classe* des HYDROGÉNÈSES (*classe III*) et celle des AZOTÈNES (*classe IV*) offrent entr'elles des points de rapprochemens

par les effets généraux et particuliers qui en résultent ! La *syphilis* ( *gen.* LXXVIII de la nosologie générale et le dix-huitième de la *classe* III ) termine les *genres* qui composent la *classe* des HYDROGÉNÈSES ; le *scorbut* ( *gen.* LXXIX de la nosologie générale et le premier de la *classe* IV ) commence ceux qui entrent immédiatement dans la *classe des* AZOTENÈSES.

Il a été un temps où le *scorbut* formoit le fond et constituoit l'essence d'un très-grand nombre de maladies. C'étoit principalement la manière de voir d'EUGALENUS. Cet auteur a manifestement méconnu la vraie nature du *scorbut* ; il n'a point vu, n'en déplaisé à ceux qui ont voulu rapporter l'altération qu'éprouvent les corps vivans dans cette maladie, au vice à peu près exclusif des solides, que, pour constituer le *scorbut*, il falloit un certain état des humeurs d'abord, ensuite des solides ; et que la dépravation des fluides qui y conduit, peut être plus ou moins avancée, sans pour cela que cette affection morbifique soit manifeste et réelle. Quoique les idées sur ce point de doctrine se soient infiniment améliorées, un grand nombre de médecins très-judicieux n'ont pas pu renoncer à ce sentiment que, dès que les fluides

animaux ont perdu la consistance qui leur est naturelle, qu'ils approchent, quoique d'une manière assez éloignée, du terme de leur dissolution et qu'ils ont acquis une disposition évidente à l'alcaescence; la *diathèse putride* a lieu. Ils ont paru fondés à adopter cette manière de voir, en considérant, par exemple, que les animaux forcés à la course ont leurs fluides dans un état de liquéfaction analogue à celui qu'éprouvent les liqueurs animales, lorsqu'elles sont sur le point de subir la fermentation putride; que plusieurs maladies, même de celles qui ont de fortes apparences inflammatoires dans leurs commencemens, finissent par être putrides; qu'un pareil état pathologique se montre spontanément chez ceux qui vivent principalement d'alimens tirés du règne animal: HALLER ayant en effet très-bien aperçu que les animaux carnivores, quoique fort robustes et cruels, ont leur lymphe vasculaire toujours plus dissoute et moins concrecible que celle des herbivores et des frugivores, etc. Certaines *fièvres pétéchiales*, l'*hémorrhagisme tacheté*, le *scorbutisme* ou l'*affection scorbutique*, le *scorbut*, tant des *fièvres putrides* que de savans médecins ont considéré comme un *scorbut aigu*, n'offrent-ils pas un

ensemble d'affections morbifiques qui se lient par des rapports frappans de causes et d'effers, et montrent que, parmi elles, le *scorbut* n'est qu'un mode particulier auquel se rattachent des phénomènes assez frappans pour être rassemblés sous un caractère générique.

On sait que les équipages hollandais sont beaucoup moins sujets au *scorbut* que les équipages anglais; que le *scorbut* de ceux-ci est plus putride et participe davantage de la corruption et de la dissolution des humeurs; tandis que le *scorbut* des Hollandais paroît dépendre plus de la viscosité et de l'épaississement du sang, et montrer plus de tendance à se terminer par les différens genres d'infiltrations et d'hydropisies. Or, indépendamment de ce que le tempérament propre à chacune de ces nations peut avoir d'influence sur ce point, on ne sauroit douter que cette différence ne vienne sur-tout de celle de la nourriture. Il est connu que les Anglais nourrissent presque uniquement leurs équipages à la mer, de salaisons et notamment de viandes salées; et que les équipages hollandais font, au contraire, leur nourriture ordinaire des végétaux farineux et des légumes secs.

MM. ROLLO et TROTTER ont cherché à éclaircir la nature du *scorbut* ; ils ont pensé que cette maladie présenteoit de fortes apparences de désoxygénation ; et , lorsqu'on voit que , dans le *scorbut* , les acides et le suc des plantes crucifères ont un effet marqué , on ne peut trop faire attention aux deux états du système dont il vient d'être fait mention d'après les expériences comparatives des auteurs anglais et hollandais qui ont écrit sur cette maladie.

Il suffit de faire connoître le *scorbut* pour indiquer la liaison naturelle qui se trouve entre ce genre de maladie et la *septose* ( *gen. LXXX* de la nosologie générale et le deuxième de la classe IV ). A la vérité , la *fièvre putride* , qui constitue une *espèce* naturelle de ce genre , a été rapportée au *stuporisme* ( *gen. XIX* ), par la considération qu'une de ses causes ordinaires est une émanation animale , véritable gaz corrupteur dont l'affinité avec certaines parties élémentaires des corps vivans est très-grande. Le traitement montre toutefois d'une manière bien sensible le rapport qui se trouve entre le *scorbut* et la *septose pyrétique* , puisque , tandis que les acides végétaux corrigent efficacement l'altération humorale qui existe dans

le *scorbut*, les acides minéraux, pourvu qu'ils soient administrés à fortes doses, détruisent avec le même avantage l'état spécifique des humeurs dans la *fièvre véritablement putride*.

La *gangrène* (*gen.* LXXXI de la nosologie générale et le troisième de la *classe* IV) forme une condition plus tranchante encore dans la série des altérations putrides qui sont propres aux corps vivans. Sans doute la *gangrène* n'est le plus souvent qu'une maladie consécutive à l'inflammation ou à ce qu'on appelle *un violent étranglement*; et on a fait avec raison la remarque, que si l'on établisoit un *genre* des maladies essentiellement gangreneuses, il comprendroit toutes les gangrènes qui, sans inflammation préliminaire bien tranchée, attaquent par contagion ou spontanément diverses parties, mais sur-tout la peau ou le tissu cellulaire; et que ce *genre*, quoiqu'il n'eût pas les caractères ordinaires et peut-être essentiels des phlegmasies, devroit cependant être rangé dans cette *classe* à laquelle il paroît impossible de se dispenser de la rapporter (a). La

---

(a) Voy. considérations sur la nosologie, etc., suivies d'observations pour servir à l'histoire des pustules gangréneuses, par G. L. BAYLE; Paris an X, pag. 102.

*gangrène*, dans cet ouvrage n'est pas présentée sous ce rapport. Autant j'ai pris à tâche de réunir les maladies qui tendent à se confondre par leurs indications générales, quelles que soient les nuances du traitement qui leur est approprié; autant j'ai senti qu'il falloit isoler les maladies dont le point de vue médical étoit entièrement opposé aux *genres* auxquels des considérations inexactes tendent à les faire associer. La *gangrène* et quelques-uns des *genres* suivans m'ont paru précisément dans ce cas: aussi n'ai-je pas fait de difficulté de les présenter séparément pour que leur nature pût être mieux approfondie.

Ce que je viens de dire relativement à la *gangrène*, s'applique très-bien à la *puose* (*gen. LXXXII* de la nosologie générale et le quatrième de la *classe IV*). Le pus, que l'on est si porté à confondre avec les matières muqueuses plus ou moins dégénérées, ne se produit jamais essentiellement; mais il y a, dans sa formation, des circonstances tellement particulières, que, pour les approfondir, il faut les isoler et en former un ensemble.

*L'elcose* (*gen. LXXXIII* de la nosologie

générale et le cinquième de la *classe IV* ) et le *cancer* ( *gen. LXXXIV* de la nosologie générale et le sixième de la *classe IV* ) se lient trop naturellement avec la *puose* , pour qu'il soit nécessaire d'insister sur ce point. M. DE LA ROCHE ; en parlant de la putréfaction ou du pouvoir antizymique du principe vital , dit, dans son *analyse des fonctions du système nerveux* , qu'il est des cas dans lesquels la putréfaction va plus loin dans l'état vivant que dans l'état inanimé ; et il cite , en preuve de cette opinion , l'odeur si fortement putréfactive que donne le *cancer ulcéré*. Sans doute , la putréfaction est un changement sur lequel nous n'avons que fort peu d'idées nettes , ainsi que l'a très-bien fait observer M. le professeur PROUST. Nous n'apercevons pas plutôt de dérangemens dans l'organisation d'une matière animale ou végétale , de la lividité , de l'infection , qu'aussitôt nous croyons qu'elle commence ; et nous confondons , sans nous en apercevoir , ces phénomènes , qui appartiennent à un genre de putréfaction peu connue , avec les effets de celle qui doit être la vraie seule et qui consiste dans la résolution finale d'un composé , de manière à ne plus laisser apercevoir aucune trace des radicaux qui l'ont organisé.

Mais, pour revenir à notre objet, personne, avant M. ADAIR CRAWFORD, n'avoit pensé à faire des expériences et des observations sur la matière des *cancers* et sur les fluides aériens dégagés des substances animales par la distillation et la putréfaction. Ce savant médecin, en multipliant ses recherches sur ce point, a vu que cette matière étoit un vrai gaz ammoniacal, qu'il appelle *ammonia hepatisata*, composée conséquemment d'hydrogène et d'azote; ce qui met en évidence que, dans les *cancers* ainsi que dans les maladies putrides, il se trouve dans les corps vivans les circonstances favorables à la réunion des produits de la putréfaction. On a donc eu raison d'avancer que la théorie fondée sur les principes de la chimie animale, l'est également sur l'expérience et sur l'observation.

Ces produits sont aussi propres au vrai *cancer* qu'aux *ulcères cancroïdes* et aux *ulcères putrides* (a) en général, quoique néanmoins il existe quelques modifications qu'on n'a pas bien saisies, quoiqu'on ait cherché à fixer par leur

---

(a) Voy. observations sur l'ulcère putride, par M. GILLESPIE ? *London medical journal*, part. IV; *A Year* 1785.

diagnostic, la différence qu'ils offrent au praticien. M. PERYLHE est un de ceux qui se sont le plus attachés à les différencier sous ce dernier rapport. Il a vu que les *ulcères* qui peuvent prendre un aspect cancéreux, ou par le mauvais traitement, ou par la nature de la partie affectée, ou par le vice des humeurs, sont ceux qui se forment après la suppuration du *bubon*, du *polype* et du *sarcome*. Mais, en faisant entr'eux une exacte comparaison, il a reconnu que les *ulcères cancroïdes* se rapprochent du vrai *cancer*, en ce qu'ils sont très-difficiles à guérir; qu'ils sont accompagnés d'une douleur âcre; qu'ils ont leurs bords renversés, gonflés et leur circonférence ou contour, variqueux; qu'au lieu de pus, ils ne répandent qu'une petite quantité de sanie d'une fort mauvaise odeur, et deviennent très-souvent caverneux; qu'ils s'étendent en rongant, et causent pour l'ordinaire une mort certaine s'ils sont abandonnés à eux-mêmes ou mal-traités, moins promptement toutefois que le vrai *cancer*, dont ils diffèrent actuellement par des signes propres, très-bien analysés par l'auteur que je viens de citer. En effet, quoique ces *ulcères cancroïdes* soient difficiles à guérir, on y parvient pourtant et quelquefois par la méthode ordinaire, insuffisante  
contre

les *cancers*. Les douleurs qui les accompagnent ne sont ni si profondes ni si brûlantes et si lancinantes que dans le *cancer*. Ils fournissent quelquefois, par intervalles, un pus assez louable; ils s'étendent plus lentement que le *cancer vrai*, et plutôt en largeur qu'en profondeur; quelquefois ils s'arrêtent d'eux-mêmes et rentrent dans la classe des *ulcères bénins*, dont ils étoient sortis; on y voit, enfin, fréquemment des excroissances, ce qui est rare dans le *cancer vrai ulcéré*, à moins qu'il n'en survienne à quelque partie modifiée par des détersifs et des balsamiques efficaces.

Faire ainsi ressortir le diagnostic des maladies, n'est point un objet étranger à un ouvrage nosologique, destiné à en consacrer le caractère. Je voudrais parler également du *cancer occulte* qu'HIPPOCRATE a nommé et que M. JUSTAMOND pense qu'on n'a pas bien décrit; mais ces développemens doivent être consignés dans l'ouvrage pratique dont celui-ci ne fait qu'offrir les bases.

Lorsqu'en effet on veut considérer l'immense tableau des maladies auxquelles l'homme se trouve sujet, combien n'en trouve-t-on pas le nombre effrayant et propre à rebuter l'homme

le mieux disposé à en rechercher la nature ? Une bonne méthode peut seule faire entrevoir que ce nombre est réellement moins grand qu'il ne le paroît au premier aspect. N'y a-t-il pas une foule de maladies qui ne sont que des modifications apportées aux causes matérielles ou essentielles , par le siège et par diverses circonstances accidentelles ou occasionnelles ; Mais ces modifications ne faisant point varier essentiellement le traitement , il en résulte que , pour la pratique médicale , à laquelle doivent se rapporter toutes nos classifications , ces maladies ne constituent que des *formes* et rentrent dans les divisions du *genre* auquel elles appartiennent. Cette réflexion indique la nécessité qu'il y a eu de faire précéder ma *nologie clinique* par ces *fondemens de la science méthodique des maladies*.

---

( 132 )

---

## EXPOSÉ MÉTHODIQUE

*Des classes, des genres, des espèces,  
et des formes des maladies.*

### CLASSE CINQUIÈME.

**C**HERCHER à connoître l'homme sous tous les rapports qui peuvent en varier l'organisme, c'est chercher à étudier la nature entière. Il n'est pas donné à l'intelligence humaine de saisir tous les points d'une étude si vaste ; nos perceptions ont leurs bornes, et la lecture de cet ouvrage fera peut-être ressortir cette vérité plus que les réflexions que je pourrais faire sur ce point. Mais si l'on considère que j'écris à une époque où les connoissances de chimie animale sont encore peu avancées, malgré les efforts de quelques hommes, heureusement organisés pour le progrès des sciences ; on sentira que le vice de ce travail tient peut-être moins à son plan et à son exécution,

qu'à son objet même. Il est des cadres qu'on ne peut bien remplir que lorsque plusieurs savans ont long-temps travaillé d'après les mêmes vues ; et malheureusement on est souvent porté à rejeter, sous prétexte d'innovation, des idées propres à reculer les limites de son art. Quel que soit le sort qui soit réservé à celles que je développe dans ce livre, je les donne avec sincérité, pouvant dire avec KLEIN : *scribo fide medicâ , probâque pietate ; qui meliora habet , eodem det animo.*

Ainsi, après avoir considéré autant qu'il a été possible les effets du calorique, de l'oxigène, de l'hydrogène et de l'azote, il reste à examiner l'action du phosphore et des substances dans lesquelles ce principe entre comme radical : tel est l'objet de cette *cinquième et dernière classe.*

### PHOSPHORENÈSES.

*Eth.* Cette dénomination, analogue à celle des autres *classes*, est composée de deux termes, dont l'un est *phosphore*, dérivé lui-même de *phos*, lumière et *phoros*, qui porte, ou *phero*, porter; et de *nosos*, maladie.

Le phosphore, substance nouvelle pour les hommes, indécomposée, conséquemment élémentaire encore, due au hasard qui la fit ressortir des expériences tentées par un alchimiste, contenue dans plusieurs corps de la nature, soit organisés, soit inorganiques, et que nulle part on ne rencontre pure et isolée., doit mériter d'être sérieusement considérée, relativement à l'étiologie des maladies.

Corps véritablement eudiométrique, le phosphore possède des qualités physiques qui ont été parfaitement appréciées. Il a une saveur âcre et désagréable, une odeur d'ail très-sensible; il n'éprouve qu'une légère altération par la lumière et de la part du gaz oxygène très-pur; mais il brûle très-facilement, lorsqu'il est fondu et exposé à l'action de ce gaz avec dégagement d'une lumière très-vive et de beaucoup de calorique; sur-tout il brûle toujours dans l'air atmosphérique à la plus basse température, à la faveur d'une dissolution préalable dans le gaz azote.

Le corps humain en est abondamment pourvu, et il y produit des effets aussi différens que variés; soit, lorsque se dégageant des corps qui le contiennent, il donne lieu à cette pro-

priété générale , exprimée par la dénomination de *phosphorescence* ; soit , lorsque , isolé , il tend assez fortement à se combiner avec l'oxygène , à l'aide duquel il produit un oxide ou un acide , soit enfin lorsque , combiné avec la chaux et autres matières , il donne lieu à des substances salines , nécessaires aux corps vivans , mais qui lui deviennent nuisibles lorsqu'elles entrent dans des combinaisons extraordinaires ou qu'elles pèchent , dans le système animal , par excès ou par défaut.

Nul doute que le phosphore et les substances dans lesquelles ce principe combustible entre , n'exercent sur certains êtres vivans une action puissante. J'ai déjà montré ( *tom. III de cet ouvrage , pag. 311 et suiv.* ) le phosphore , dans son union avec le gaz hydrogène , produire des effets déterminés ; et j'ai indiqué , dans mon *essai d'un système chimique de la science de l'homme* , pag. 84 , combien cette substance , que quelques-uns veulent être composéé , influe sur les forces musculaires et sur leur tonicité plus ou moins permanente. M. ALPHONSE LEROY , ayant pris deux ou trois grains de phosphore solide , incorporés dans un peu de thériaque , ressentit d'abord une chaleur brû-

lante dans la région de l'estomac. Cet organe lui sembloit rempli de gaz, qui même s'échappoit par la bouche. Horriblement tourmenté et ayant en vain essayé de se faire vomir, il ne trouva du soulagement que dans l'eau froide bue de temps en temps. Enfin, les douleurs se calmèrent; mais, le lendemain, il se développa, par toute l'habitude du corps, une force musculaire étonnante et un besoin presque irrésistible d'en essayer l'énergie. Enfin, l'effet de ce médicament cessa à la suite d'un priapisme violent. Ce dernier phénomène avoit été vu par M. PELLETIER sur des canards qui avoient bu de l'eau phosphorée: ces oiseaux périrent tous; mais le mâle couvrit toutes les femelles jusqu'au dernier instant de sa vie (a).

De semblables faits se renforcent par ceux qui constatent que toutes les préparations phosphorées, qu'on a bien sobrement encore introduites dans la médecine, et notamment l'éther phosphoré, ont eu des succès dans les divers cas où l'énergie vitale étoit prête à s'éteindre. Les maladies avec atonie de la fibre,

---

(a) Mémoires de la société médicale d'émulation, tom. 1, pag. 170. — Bulletin des sciences, mars 1798, pag. 94. — Essai d'un système chimique, pag. 85.

avec état paralytodé ou paralytique et infiltration plus ou moins imminente, ont été combattues avec avantage à l'aide d'un médicament qui joint, à une faculté vivement stimulante, une énergie d'action très-prompte.

On n'en inférera pas avec fondement de cette manière d'agir du phosphore, que ce principe entre matériellement comme agent de quelques-unes de nos fonctions, et comme cause essentielle de plusieurs affections morbides, sur-tout des tétanodées. Mais lorsque le phosphore détermine des effets caractéristiques sur l'organe moteur, quand, agissant d'une manière trop intense, il excite des maladies de nature tonique; on ne peut guère se refuser à lui faire jouer un rôle dans l'économie vivante, livrée à ses mouvemens naturels ou subjuguée par des principes que l'excès seul a rendu morbifiques. Le phosphore, comme on ne sauroit en douter aujourd'hui, dont l'affinité avec l'oxigène est très-grande, qui ne laisse pas que d'avoir de l'attraction pour l'hydrogène et sans doute avec le carbone, quoique cette dernière affinité, pour être très-petite, ne soit pas encore bien constatée; le phosphore, dis-je, contracte avec le carbone, avec l'hydrogène et avec l'a-

zote , une union qui le rend susceptible de contribuer à la production des substances végétales et animales. Mais l'état de santé n'en exige qu'une certaine quantité , et un degré déterminé de mélange et de composition , en deçà et en delà desquels le phosphore peut influer sur la production des maladies : car , ainsi qu'une variation sensible dans les proportions des principes qui entrent dans un composé , sert à produire des combinaisons diverses , conséquemment des corps nouveaux ; de même le dégagement ou la combinaison plus intime des élémens de nos parties , soit solides , soit fluides , contribue à la perte de l'équilibre des fonctions du système et , par suite , à une lésion souvent assez prononcée pour mériter le nom de *maladie*.

Le phosphore , brûlé par l'oxygène , donne lieu à l'oxide de phosphore , à l'acide phosphoreux , à l'acide phosphorique qui , combiné avec des substances connues , forme les phosphates de chaux , de soude , d'ammoniaque , répandus dans les solides et dans les fluides de nos corps.

Dissous dans le gaz hydrogène , le phosphore , exhalant alors une odeur insupportable

de poisson pourri ou alliée fétide, s'enflammant sitôt qu'il a le contact de l'air, et brûlant avec une grande rapidité, forme un gaz si nuisible à la respiration, que les animaux qu'on y plonge, périssent sur-le-champ. Mais il est des rapports plus directs à l'étiologie des maladies, sous lesquels le phosphore mérite d'être considéré; et c'est lorsque ce principe constitue l'acide phosphorique et les substances composées qui en dérivent.

La chaux, combinée avec l'acide phosphorique, forme le phosphate de chaux, auquel les os doivent leur solidité, et les substances molles une partie de leur consistance. Les grandes maladies du système osseux doivent donc être liées avec les divers états du phosphate de chaux; et ce n'est point une simple conjecture que de chercher les causes essentielles des maladies dans un vice de mixtion des parties élémentaires des solides ou des fluides, ou dans leur quantité respective. En effet, que deviennent les os, lorsque le phosphate de chaux abandonne le parenchyme mou de ces organes, ou ne s'y dépose point dans une proportion convenable? Leur ramollissement plus ou moins complet, les diverses espèces

ou les différentes *formes* de *rachitis* n'en dépendent-ils pas d'une manière immédiate? Car, en analysant, d'après les faits, les circonstances qui tiennent aux sécrétions, on voit sans doute que leurs désordres aboutissent à un excès ou à un défaut. La production du phosphate calcaire ne serviroit de rien, si, secrété et déposé par une véritable précipitation sur la substance molle des os, ce phosphate ne servoit aux usages pour lesquels la nature l'a primordialement destiné.

Tout vient confirmer cet aperçu médical. Le sérum du lait contient du phosphate de chaux tout formé, et le célèbre FOURCROY, à qui l'on doit cette remarque, a très-bien fait sentir que le lait que la nourrice donne à son enfant frêle et délicat, contient, par une admirable prévoyance, la matière solidifiable de ses os, dans une proportion correspondante à l'accroissement rapide que ses organes prennent dans le premier âge de la vie.

Mais le phosphate de chaux, qui n'est pas tout employé à la formation et à la réparation des os, doit s'évacuer. C'est ce qui arrive à l'aide des urines, même à l'aide de la transpiration, après que ce phosphate de chaux

neutre est passé à l'état de phosphate acide de chaux ou de phosphate calcaire avec excès d'acide phosphorique. Cette circonstance est extrêmement remarquable ; puisque, si l'acide phosphorique surabondant peut tenir en dissolution le phosphate de chaux et favoriser sa sortie hors du corps, il peut nuire essentiellement à l'ossification par sa surabondance et en mettant consécutivement obstacle à la production d'un phosphate doué des proportions requises. Telle est la théorie de l'*ostéomalaxie*, du *rachitis* ; de ces maladies dans lesquelles on a vu le phosphate de chaux sortir du corps dans une proportion égale à la perte de dureté du système osseux.

Il existe des observations qui prouvent que la sueur a déposé à la surface du corps une matière terreuse qui n'étoit autre chose qu'un phosphate de chaux, tenu en dissolution par un excès d'acide phosphorique.

Qu'elle est véritablement belle cette harmonie qui existe entre les besoins progressifs de l'économie vivante ! Dans l'enfance, l'ossification est encore incomplète ; les épiphyses sont multipliées dans le système osseux ; et les excréments ne contiennent point de phosphate

calcaire. Ce système s'organise complètement : le phosphate de chaux, introduit par les aliments, devient inutile, il sort par les diverses excréctions chargées de le transmettre au dehors; et si cette évacuation ne se fait point de la manière proportionnée à la production d'une matière salino-terreuse dont il est ici question, les maladies qui se lient avec la déviation de ce phosphate, se déclarent et l'ordre du système se trouve interverti.

Et qu'on ne croie point que la chaux, que l'acide phosphorique ne s'introduisent pas journellement dans les corps vivans ! MM. VAUQUELIN et ALEXANDRE BRONGNIART ont trouvé la chaux dans la farine, et ont calculé qu'une personne qui ne mangeroit qu'une livre de pain par jour, auroit mangé près de deux livres de chaux au bout de l'année. M. DELAVILLE assure que la sève évaporée du chou fournit une quantité considérable de sulfate de chaux, et que la sève de rave donne des résultats à peu près semblables. M. CADET s'est convaincu, en analysant avec soin le chocolat, pour la confection duquel on a employé la préparation ordinaire, que 5 hectogrammes ( 1 livre ) de cette substance, si communément employée

comme aliment, contient, dans le *minimum* de la proportion, 24 décigrammes ( 48 grains ) de chaux et 20 décigrammes ( 36 grains ) de fer. Ces expériences, indépendamment de plusieurs autres dont on pourroit les renforcer, prouvent donc bien que la chaux est introduite assez abondamment dans le corps des animaux pour servir à la nourriture de ses organes et à l'intégrité de ses fonctions; mais que surabondant dans plusieurs circonstances, elle influe manifestement sur les altérations toujours cruelles, souvent funestes, qui peuvent s'établir.

N'y eût-il que la production des *calculs*, quelquefois formés par des phosphates ou des oxalates de chaux, que les observations qui viennent d'être faites seroient pleinement justifiées? On peut les appuyer par le résultat des faits qui établissent que, quand le phosphate de chaux entre en trop grande quantité dans la composition des parties molles, il les rend cassantes ou susceptibles de se déchirer. M. WALTER a prononcé que ce qui donne lieu aux *anévrismes spontanés*, est la quantité de phosphate calcaire qui s'accumule dans la tunique musculieuse des artères; de là, la disposition

qu'elles ont à se rompre par un effet de l'effort du sang contre les parois du vaisseau qui le contient, ou par l'action de toute cause accidentelle assez forte pour produire cet effet. M. WALTER n'a pas prouvé ce fait par le raisonnement, mais par des observations concluantes; en déposant, devant l'académie de Berlin, des tumeurs anévrismatiques dont les parois étoient sensiblement imprégnés de phosphate calcaire, dans le lieu de leur déchirure.

Ce vice, dans la proportion du phosphate de chaux qui entre dans la composition des parties, bien suivi dans ses diverses conséquences, donne à l'opinion de M. VALLI sur les causes de la vieillesse, ou du moins sur l'état qui la constitue et sur les moyens d'en arrêter les ravages, un air de probabilité, même de vérité.

Il est effectivement connu que, dans la vieillesse, les parties molles acquièrent une rigidité qui les rend peu propres aux différentes fonctions pour lesquelles la nature les a destinées. Ce phénomène ne peut dépendre et ne tient véritablement qu'aux accumulations lentes et graduelles du phosphate ou du carbonate cal-

caires dans la plupart des solides , tels que les os , les gros troncs artériels et veineux , les aponévroses , les tendons , etc. On sait qu'en raison de cette disposition prédominante , les vieillards sont éminemment sujets à la *goutte* , aux *calculs* , aux *tophus salino-terreux* , à la *cystirrhée* ou *catarre muqueux* de la vessie , etc. , et que ces faits pathologiques font plus qu'appuyer ce qui a été avancé relativement aux phénomènes naturels du dernier âge de la vie humaine.

Qu'on veuille en accuser , ainsi que l'a fait un médecin très-instruit , M. ALIBERT , les lois primordiales attachées à la constitution des êtres vivans : ce n'est pas sans doute soulever le voile depuis si long-temps fixé sur des opérations qui ne se dérobent pas toujours , du moins en totalité , à l'intelligence humaine. Mais on aime à se laisser captiver par l'attrait des systèmes , que néanmoins on se fait gloire de poursuivre pour en démontrer le faux brillant ; on s'attache à des théories de convenance que scelle l'autorité d'un homme célèbre ; et , une fois bien subjugué sous l'empire de l'opinion , on rejette des explications qui paroissent fondées sur la nature des choses ou sur le  
pouvoir

pouvoir plus ou moins facilement appréciable  
des forces organisatrices.

D'après les observations les mieux faites , le phosphate calcaire est ou neutre ou acidule. 100 parties de phosphate neutre de chaux contiennent 0,41 d'acide phosphorique , et 0,59 de chaux. 100 parties de phosphate acidule contiennent 0,54 d'acide phosphorique et 0,46 de chaux. L'acide phosphorique qui se trouve dans les phosphates , est composé de phosphore 0,33 , et d'oxigène 0,67. Ces proportions sont les mêmes pour tous les états analogues du phosphate calcaire ; ainsi la vie et les forces vivantes ne paroissent pas influer sur sa formation.

Les liens qui unissent l'acide phosphorique et la chaux sont très-forts , puisqu'aucunes bases , excepté la baryte et la strontiane , ne font subir au phosphate calcaire aucune altération. Mais , suivant que l'a fort bien rappelé M. BOUILLON-LAGRANGE , les acides sulfurique , nitrique , muriatique , aceteux , oxalique décomposent en partie cette matière saline , et jusqu'au point seulement où ils ont enlevé à l'acide phosphorique environ les 0,40

de la chaux qui existe dans une masse quelconque de phosphate calcaire.

En traitant le phosphate neutre de chaux ou les os par l'acide phosphorique, on les dissout très facilement; comme en versant de l'eau de chaux sur une dissolution de phosphate acide, on reforme aisément du phosphate calcaire neutre. Ce sont des vérités qui résultent d'un travail exact entrepris par MM. FOURCROY et VAUQUELIN. De là on peut tirer ces conséquences, que l'acide phosphorique peut dissoudre plus ou moins complètement les os dans le corps vivant; que la chaux peut s'y trouver en des proportions excédentes; et que la prédominance de l'un ou de l'autre de ces principes peut et doit entraîner des maladies dont l'étiologie, faute d'être sagement étudiée, a échappé jusqu'ici à l'attention: les auteurs que je viens de citer en ont fait la remarque. La connoissance de la dissolubilité du phosphate de chaux dans les acides les plus foibles, celle des propriétés du phosphate acide de chaux appliqué à la physique animale, peuvent répandre le plus grand jour sur la cause du ramollissement des os et des maladies qui attaquent les articulations. C'est sur ce point de

vue que M. BERTHOLET avoit tourné ses vues pour donner la théorie de la *goutte* ; et il a été suivi par M. BARTHEZ , du moins quant à ce qui concerne la cause humorale spécifique de cette maladie. Il me paroît , a dit cet homme célèbre (a) , que l'état goutteux du sang est un vice de sa mixtion qui intercepte , à des degrés différens , la formation naturelle de ses humeurs excrémentielles ; de sorte que ces humeurs étant plus ou moins altérées , subissent une décomposition spontanée qui y fait prédominer la substance terreuse. Ce qui paroît venir à l'appui de cet énoncé , est l'observation rapportée par SAUVAGES , d'un homme sujet à la *goutte* , quoiqu'il ne bût que de l'eau et qu'il se donnât beaucoup d'exercice à la chasse , qui avoit coutume d'être délivré du paroxisme de sa goutte par un crachement abondant d'une espèce de poudre sableuse , grenue , dure , semblable à du tartre , qui crépitoit sous les doigts , et que le malade mouchoit aussi en grande abondance. On trouve , *tom. III de cet ouvrage , pag. 263 et suiv.* , quelques idées sur l'étiologie de la *goutte* et du *rachitis* , qui prou-

---

(a) Traité des maladies gouteuses , tom. 1 , pag. 40 , §. XIII.

vent que ceux qui ont cherché à en déterminer la cause, ne se sont pas toujours garantis des inconséquences d'opinion dans lesquelles ils sont évidemment tombés.

Il n'en est pas moins vrai toutefois que, faute d'avoir étudié les phénomènes qui sont propres aux corps vivans, sous le point de vue chimique qui leur est convenable, on s'est arrêté à des explications plus ou moins hypothétiques, dont les difficultés ont été ôtées par l'intervention des *lois primordiales du principe vital*. Ce n'est pas néanmoins en vain que certains principes paroissent plus adhérens à un ordre particulier d'organes. M. CABANIS en a fait la remarque (a) : les parties qui semblent être le réservoir spécial du phosphore, sont le cerveau et ses appendices, ou plutôt le système nerveux tout entier ; car c'est à la décomposition commençante de la pulpe cérébrale, que sont dues ces lumières phosphoriques qu'on observe si souvent, la nuit, dans les amphithéâtres ; et c'est principalement autour des cerveaux mis à nu ou de leurs débris

---

(a) Rapp. du physique et du moral de l'homme, tom. 1, pag. 415.

épars sur les tables de dissection , qu'elles se font remarquer. Or , un assez grand nombre d'observations ( c'est toujours M. CABANIS qui parle ) me font présumer que la quantité de phosphore qui se développe après la mort , est proportionnelle à l'activité du système nerveux pendant la vie. Il m'a paru que les cerveaux des personnes mortes de maladies caractérisées par l'excès de cette activité , répandoient une lumière plus vive et plus éclatante : ceux des maniaques sont très-lumineux ; ceux des hydropiques et des leuco-phlegmatiques le sont beaucoup moins.

Ainsi le phosphore paroît influencer fortement sur les actes de l'économie vivante ; et comme tel , doué d'une action excitatrice , prêt à porter l'énergie , la combustion et peut-être la flamme dans les différentes parties du système ; et comme acide , avec la faculté de s'unir à la chaux , de la dissoudre et de consolider ou d'intervertir le tissu naturel de ses parties. Réduite à ce dernier point de vue , la *classe* des PHOSPHORENÈSES comprend un petit nombre de *genres* des maladies. Si les affections morbifiques par excitation en sont bannies , quoique toutefois la *goutte* appartienne aux

( 150 )

PHOSPHORENÈSES, ce n'est point que le phosphore ne soit un principe très-actif. Je l'ai souvent montré sous ce rapport : aussi M. GAILLARD a-t-il avancé que le radical de l'acide phosphorique étoit le principe de l'irritabilité, et la cause de plusieurs maladies, parmi lesquelles la *goutte* tient un rang distingué ; a-t-on avancé, avec une apparence de raison, que c'est parce que les matières animales contiennent une grande quantité de phosphore ou acide phosphorique, ainsi que la matière glutineuse du froment et autres plantes céréales, et quelques crucifères, que ces substances sont si nutritives, qu'elles donnent beaucoup plus de force à l'animal que les autres substances nutritives qui ne contiennent ni phosphore, ni acide phosphorique ; enfin que, le poisson contenant beaucoup de phosphore, les peuples qui s'en nourrissent multiplient beaucoup : remarque rappelée par M. DE LA MÉTHÉRIE.

Mais ayant déjà placé dans les *classes* précédentes, soit par rapport à la prédominance d'action des principes qui ont mérité la première considération, soit eu égard au concours des principes qui agissent, peut-être même à l'impossibilité de classer isolément les

effets du calorique, du phosphore, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote et des divers phosphures oxidés d'azote, d'hydrogène, etc., il n'a dû rester, pour former cette cinquième classe, que les genres qui suivent :

LXXXV. *Rachitis.*

LXXXVI. *Ostéonisme.*

LXXXVII. *Arthritis.*

LXXXVIII. *Trichose.*

LXXXIX. *Dermisme.*

XC. *Décrépitude.*

Gen. LXXXV. *RACHITIS.*

*Eth.* de *rachis*, mot grec qui signifie *épine du dos.*

*Syn.* *Rachitis*; SAUVAGES, cl. X, cachexies; ord. IV, tubérosités; gen. XX. — LINNÉ, cl. X, difformes; ord. I, amaigrissantes; gen. CXXIII. — VOGEL, cl. VIII, cachexies; gen. CCCXII. — CULLEN, cl. III, cachexies; ord. II, intumescences; sect. IV, solides; gen. LXXXIII. — SAGAR, cl. III, cachexies; ord. IV, tubérosités; gen. XXI.

*Bibl.* F. GLISSON, *tractatus de rachitide, seu morbo puerili Rikets dicto*; Lond. 1650.

— *Lugd.-Batav.* 1672. — *Hagæ Comitis* 1682.

— En anglais, par PH. ARMIN, 1657; et par  
CULPEPER, 1657.

J. CH. STOCK, *de rachitide*; *Jena* 1752.

J. P. BUCHNER; *de rachitide perfectâ et im-  
perfectâ*; *Argent.* 1754; et coll. de HALLER,  
tom. VI, pag. 285.

L. J. B. COSNIER, *an rachitidi rubia tinc-  
torum?* *Paris.* 1758.

G. V. ZEVIANI, *della cura de bambini at-  
tacati dalla rachitide*; *Verona* 1761.

S. JAY, *de rachitide*; *Lugd.-Batav.* 1762.

J. G. ROEDERER, *de rachitide*; *Goetting.*  
1762.

F. O. DEWEZ, *de rachitide*; *Viennæ* 1764.

J. S. DONNER, *de gibbositate*; *Goetting.* 1765.

C. TACCONI, *de rachitide observationes*; *de  
Bononiensi scientiarum et artium instituto atque  
academiâ comment.*, tom. V, *Bonon.* 1767,  
*pars II, art. 6, pag. 81.*

J. G. LEINDENFROST, *dissertatio inaugu-  
ralis exhibens nonnullâ de rachitide*; *Duisb.  
ad Rhen.* 1771.

CH. LUDWIG, *tractationis de distortâ spinâ  
dorsi pars prima: de distorsionis differentiis*;  
*advers. medic.*, vol. II, 1771--72. — *Tracta-  
tionis de distortâ spinâ dorsi ejusque pars se-*

*cunda : de causis ejus distorsionis, ibid, pag. 127. — Tractationis de distortâ spinâ dorsi pars tertia : de remediis hujus distorsionis, ibid, pag. 128.*

LE VACHER DE LA FEUTRIE, traité du rachitis, ou l'art de redresser les enfans contrefaits; Paris 1772.

V. FERRARINI, *de rachitide*; Ferrariæ 1776.

MAGNY, mémoire sur le rachitis ou maladie de la colonne vertébrale, etc.; Paris 1780.

S. MOORE, *de rachitide*; Edinb., coll. de WEBSTER, tom. III, 1781, ord. v, maladies anomales, pag. 72.

W. TRNKA DE KRZOWITZ, *historia rachitidis, omnis ævi observata medica continens*; Viennæ 1787.

J. F. L. CAPPEL, *versuch uber die sogenante englische krankheit*, etc.; Berlin et Stettin 1788.

PH. JONES, *an essay on crookedness or distorsions on the spine*, etc.; Lond. 1788.

R. HAMILTON, observations sur les affections scrophuleuses, etc., avec des remarques sur le skirrhe, le cancer et le rachitis (en angl. *observations on scrophulous affections*, etc.); Lond. 1791.

A. PORTAL, observations sur la nature et sur le traitement du rachitisme, ou des cour-

bures de la colonne vertébrale, et de celles des extrémités supérieures et inférieures; *Paris* 1797 an V.

A. PUJOL, essai sur la nature du vice rachitique et sur les indications essentielles et accessoires que ce vice offre à remplir; *œuvres diverses de médecine pratique*, tom. IV, *Castres* an XI-1802, pag. 1.

M. A. SALMADE, précis d'observations sur les maladies de la lymphe, ou affections scrophuleuses et rachitiques, etc.; *Paris* an XI-1803.

*Car.* Difformité par un vice des os, pour l'ordinaire avec une tête grosse, de la précocité dans les facultés intellectuelles, amaigrissement ou flaccidité des chairs.

*Esp. I. Nouveux.*

*Car* Protubérance des épiphyses de certains os, avec rabougrissement de la stature, asthénie et disposition souvent insurmontable au repos, sans courbure au moins notable des os longs.

*Rap. A.* Rachitis nouveux; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

Le nouage, la chartre, le rachitis commençant de BOERHAAVE, le rachitis de la 1.<sup>re</sup>

enfance ; *encyclopédie méthodique* , part. *médecine* , mot *âge* , tom. I , pag. 359.

*Esp. II. Tortueux.*

*Car.* Distorsion plus ou moins forte des os longs ou d'une suite d'os faisant les fonctions d'un os long , comme le rachis ou l'épine , précédée et accompagnée d'un état douloureux quelquefois du rachitis noueux , et donnant lieu à des difformités plus ou moins grandes dans le tronc et les membres.

*Rap. A.* Rachitis anglais , *rachitis britannica* ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2. — Rachitis de la 2.<sup>e</sup> enfance ; *encyclop. méthod.* , *loc. cit.*

*Esp. III. Ostéomalacique.*

*Syn.* Ostéomalacie ; A. DUNCAN , *medical commentaries for the year 1790* ; vol. V , *Edinb.* 1791.

*Bibl. (a)* MORAND , histoire de la maladie

---

(a) *Voy.* l'histoire de l'académie royale des sciences , ann. 1760. — L'histoire de *Bernarde d'Armagnac* , par LAMBERT , D. M. ; *Toulouse* 1700 ; *Mercure* de mars et avril de la même année. — L'histoire de *Pierre Siga* , par ABRAHAM BAUDA , dans son ouvrage intitulé :

singulière et l'examen du cadavre d'une femme devenue en peu de temps toute contrefaite par un amollissement général des os ; *Paris* 1752.

NAVIER, observations théoriques et pratiques sur l'amollissement des os en général, et sur celui qui a été observé dans la femme *Supiot*, etc. ; *Paris* 1755.

CH. G. LUDWIG, *programa quo observata in sectione cadaveris, cujus ossa emollita erant, proponit* ; *Lips.* 1757 ; et coll. de HALLER, tom. VI, pag. 325.

PH. A. BOEHMER, *de ossium ex viscerum læsione mollitie* ; *Halæ* 1763.

H. THOMPSON, observations sur la mollesse des os ; *medical observations and inquiries by a society of physicians in London*, vol. v.

*Car.* Ramollissement complet d'une partie ou de tout le système osseux, avec des tor-

---

*Microcosmus mirabilis seu homo in miserimum compendium redactus.* — *Acta hafniensia*, tom. III, obs. 24. — Observat. de M. ANEL, dans le premier volume de la bibliothèque choisie de médecine. — FERNEL, *de abditis rerum causis*, lib. II, cap. IX. — HOULIER, obs. 7. — VELSCHIUS SILLOGE. — NICOL. FONTANI *consultationes.* — Bibliothèque raisonnée, tom. XXXVI et XXXVII. — TH. BARTHOLIN, cent. 6, hist. 40. — *Selecta medica francofurtensia*, tom. IV. — *Transact. philosoph.*, ann. 1741, n.º 459, art. XII ; etc., etc.

tuosités singulières et facilité de contourner les membres à volonté.

L'auteur d'une dissertation publiée à Upsal, ( *que je n'indiquerai point faute d'avoir pu retrouver la note qui le concernoit* ) sur le ramollissement des os ou l'ostéomalacie, distingue ce genre en quatre espèces ; 1.<sup>o</sup> l'ostéomalacie congéniale ou héréditaire ; 2.<sup>o</sup> l'ostéomalacie des enfans ou rachitique ; 3.<sup>o</sup> l'ostéomalacie des adultes ou cachectique ; 4.<sup>o</sup> l'ostéomalacie partielle ; et voulant prouver l'existence de l'ostéomalacie héréditaire, il parle d'une famille qui réside dans une des mines de fer de Suède, et dont les ancêtres, depuis trois générations, ont produit constamment des nains avec une mollesse et une fragilité remarquable des os, d'où il est résulté les distorsions les plus difformes et les plus monstrueuses. Cette race a varié sa manière de vivre ; plusieurs de ses individus ont mené une vie agricole comme les autres habitans du voisinage qui produisent des enfans très-sains.

*Esp. IV. Diaphysique.*

*Bibl. G. C. REICHEL, de epiphysium ab ossium diaphysi diductione ; Lips. 1759 ; et coll. de SANDIFORT, tom. I, diss. I.*

*Car.* Séparation des épiphyses des os.

*Formes.*

*Sor.* 1. Plévrodynie rachitique ; SAUV. , cl. v , ord. II , gen. XI , esp. 13.

2. Torticolis gibbeux ou provenant d'une bosse ; SAUV. , cl. IV , ord. I , gen. III , esp. 4.

3. Asthme des bossus ; SAUV. , cl. v , ord. II , gen. VIII , esp. 9.

4. Dyspnée rachitique ; SAUV. , cl. v , ord. II , gen. VII , esp. 10.

5. Ophtalmie rachitique ; KOENIGSDOERFFER, *de inflammatione oculi a rachitide cum tuberculis in internâ palpebræ tunicâ* ; Halæ 1751.

6. Goutte rachitique ; SAUV. , cl. VII , ord. I , gen. I , esp. 14.

*Nota bene.* Le rachitis des Kalmouks , SAUV. *loc. cit.* esp. 4 , et le rachitis des chatrés , SAUV. *loc. cit.* esp. 7 , ne sont point des maladies.

*Gen.* LXXXVI. O S T É O N I S M E .

*Eth.* du mot grec *osteon* , os.

*Car.* L'os se rompt sans cause apparente , ou sa surface s'élève en tumeur.

*Esp. I. Fragilité.**Car. Fracture spontanée de l'os.*

*Observation.* Mademoiselle M. B....., parfaitement bien constituée jusques à l'âge de 15 ans, et née d'une famille dans laquelle le rachitisme est inconnu, en jouant avec quelques jeunes amies, tomba et se cassa la cuisse. On remédia à cet accident et il n'y eut aucune difformité dans le membre. Quelques mois après, pareille circonstance arriva; la même cuisse se fractura sans qu'une violence extérieure parût y contribuer. Mais, ce qu'il y a de remarquable dans ce cas, est que cette demoiselle, dans l'espace d'environ trois ans, se cassa spontanément quatre fois le même os de la cuisse, et trois fois l'os femur de l'autre membre sans autres accidens particuliers. Cette demoiselle, toutefois, resta impotente et est morte d'un cancer au sein, à la mamelle gauche, de nature scorbutique, à l'âge d'environ 60 ans.

*Voy.* W. GOODWIN, observations sur la fragilité des os; *journ. de méd. de Lond.*, tom. V, part. II, pag. 68.

*S-esp. I. Friabilité.*

*Car* Sécheresse des os avec facilité de se réduire en poudre.

*Voy.* SAILLANT, mémoire historique sur la maladie singulière de la *veuve Mellin*, dite la *femme aux ongles*, etc.; Paris 1776. — MORAND, *journ. de méd.*, tom. XLV, pag. 216.

SAILLANT, mémoires et observations sur une maladie peu connue, à laquelle on pourroit donner le nom de *goutte médullaire*, espèce de *spina ventosa*; *journ. de méd.*, tom. LVIII, pag. 148 et 255.

*Esp. II. Exostose.*

*Bibl.* J. JUNCKER, *de extososibus*; Halæ-Magdeb. 1756.

A. DEL VALLE SALDANA, *de exostosibus*; Traj. ad Rhen. 1762.

A. MATANI, *de osseis tumoribus observationes*; Colon. Agripp. 1765.

S. LAURIN, *de genesi et morbis ossium*; Viennæ 1765.

*Car.* Tumeur propre de l'os, avec dureté, solidité, immobilité.

*Var. A.* Tophus.

Exostose en forme de nœud.

*Esp. III.*

*Esp.* III. *Périostose.*

*Syn.* Hypérostose.

*Car.* Tumeur d'une dureté moyenne, immobile, pour l'ordinaire indolente, quelquefois avec douleur.

*Gen.* LXXXVII. *ARTHRITIS.*

*Eth.* d'arthron, mot grec : articulation.

*Syn.* *Arthritis* ; SAUVAGES, cl. VII, douleurs ; ord. I, vagues ; gen. I. — LINNÉ, cl. IV, douloureuses ; ord. II, extrinsèques ; gen. LX. — VOGEL, cl. IV, douleurs ; gen. CXXIX. — SAGAR, cl. IV, douleurs ; ord. I, vagues ; gen. I.

Podagre ; BOERHAAVE, *aph.* 1254. — CULLEN, cl. I, pyrexies ; ord. II, phlegmasies ; gen. XXIV.

*Bibl.* G. MUSGRAVE, *de arthritide symptomaticâ* ; Oxoniæ 1703. — *De arthritide anomala sive internâ*, *dissert.* Oxon. 1707 ; Geneyæ 1715-23.

J. F. RICHTER, *de arthritide* ; Franc. *ad Viad.* 1750.

*Tom.* IV.

XL

J. G. DE HAHN, *historia podagræ*, etc.;  
Norimb. 1751.

FAHRENHOLZ, *de præcipuis causis cur morbi  
arthritici Goslaricæ incolis sint tam familiares?*  
Helmst. 1751.

A. E. BUCHNER, *de nexu podagræ cum cal-  
culo renum et vesicæ*; Halæ 1752.

H. LUDOLFS, *de arthritide, tanquam in-  
flammationis specie*; Erfurth 1752.

CH. L. LIGER, *traité de la goutte*, etc.;  
Paris 1753.

J. CH. STOCK, *de podagrâ mulierum*; Jenæ  
1753.

J. B. VON BUCHWALD, *de rationali æthio-  
logiâ rheumatismi et arthritidis, unâcum me-  
thodicâ nosologiâ utriusque affectus ad normam  
Sauvagesianam confectâ*; Hafniæ 1754.

COSTE, *traité pratique sur la goutte*, etc.;  
Amsterdam 1757; Berlin 1762-68.

G. CRINE, *the menagement of the gout*,  
etc.; 2.<sup>e</sup> édit., Lond. 1758.

J. HILL'S, *management of the gout*, etc.;  
Lond. 1758.

LOUBET, *lettres sur la maladie de la goutte*;  
Paris 1758.

J. F. REGIUS, *de podagrâ*; Regiom. 1759.

- S. C. F. CALVET, *de arthritide*; Aven. 1759.
- E. A. NICOLAI, *de genuinâ arthritidis notionem*; Jena 1760.
- TH. V. ZELST, *libellus singularis de podagrâ et dolore colico, scorbutico simili, pictonico æmulo, per sex annos durante, subito in podagram mutato, victo et curato*; Lausanov. edit. 1760.
- G. A. KOERBER, *de arthritide*; Gotting. 1760.
- A. E. BUCHNER, *de verâ podagræ sede et fomite*; Halæ 1761.
- J. CAVERHILL, *a treatise on the cause and cure of the gout*; Lond. 1764.
- M. A. TULLINGER, *de podagrâ*; Vind. 1765.
- J. BERKENHOUT, *de podagrâ*; L. B. 1765.
- TYCHORSKI, *de verâ sive proximâ causâ podagræ*; Lugd.-Batav. 1765.
- A. WESTPHAL, *diss. ægroti arthritide laborantis historiam exhibens*; Grifhysw. 1766.
- J. A. ROLLINI, *dissertazione sopra la gotta, etc., terza edizione*; in Mantoua 1766.
- PH. G. SCHROEDER, *de cognatione inter arthritidem et calculum*; Goetting. 1767; et J. A. MURRAY, *opusc. medic.*, vol. I, Gotting. 1785, pag. 189.
- F. WARNER, *a sull and plain account of the gout, etc.*; Lond. 1768.

PH. A. BOEHMER, *de usu salutari extracti aconiti in arthritide, observationibus comprobato; Halæ ad Salam 1768.*

PAULMIER, *traité méthodique et dogmatique de la goutte, etc.; Angers et Paris 1769.*

PONSART, *traité méthodique de la goutte et du rhumatisme, etc.; Paris 1769.*

CH. LUDWIG, *observationes de materiæ arthriticæ evolutione; advers medic. pract., vol. II, 1771, pars I, pag. I, art. I. — Commentatio de arthriticis doloribus ex incremento corporum oriundis, ibid, pag. 194.*

G. GADOGAN, *à dissertation on the gout; etc.; Lond. 1771-72. — En franç., Paris 1772.*

*Some remarks on Gadogan's diss. on the gout and all chronic diseases jointly considered; Lond. 1771.*

J. JAY, *reflections and observations on the gout; Lond. 1772.*

J. WILLIAMS, *advice to people afflicted with the gout, etc.; Lond. 1773.*

D. SMITH, *observations on d.<sup>r</sup> WILLIAMS treatise upon the gout; Lond. 1774.*

R. HULME, *a safe and easy remedy proposed for the relief of the stone and gravel, and scurvy, and gout, etc.; Lond. 1778.*

J. SCOTT, *an inquiry in tho the gout, etc.*; Lond. 1779.

G. STEVENSON, *a successful method of treating the gout by blistering, etc.*; Lond. 1779.

G. GRANT, *some observations on the origin, progress and method of treating the atrabilious temperament and gout, etc.*; Lond. 1780.

F. HOFFMANN, *de podagræ naturâ, variisque medendi viis*; Jena 1780.

P. H. JØGER, *de arthritide*; Halæ 1780.

S. NICOLT, *de arthritide*; Edinb.; et coll. de WEBSTER, tom. II, 1781, ord. IV, *morbi nervosi*, pag. 255.

J. A. MURRAY, *de materiâ arthriticâ ad verendâ aberrante disquisitio*; Gotting. 1785.

*A treatise upon gout, etc.*; Lond. 1786.  
— *A treatise upon gravel and upon gout*; Lond. 1787.

I. NIEDERHUBER, *sydenhams abhandlung vom podagra, etc.*; Landshurt 1792.

TH. JEANS, *a treatise on the gout, etc.*; Lond. 1792. — En allem., *Breslaw* 1794.

P. J. BARTHEZ, *traité des maladies gouteuses*; Paris an X-1802.

B. DUTILLEUL, *manuel des goutteux, ou*

dissertation médicale sur l'arthrite ou la goutte ;  
Paris an XI-1802.

*Car.* Après un dérangement plus ou moins marqué de l'estomac , il y a douleur , pour l'ordinaire dans une petite articulation , avec fièvre , anxiétés , recrudescence et une durée de deux à trois semaines. La maladie est sujette à retours.

*Esp. I. Arthritis vif.*

*Car.* Se déclarant au printemps , en automne et dans les changemens brusques de la température , au milieu de la nuit , avec une fièvre vive chez les hommes et quelques femmes robustes ; il parcourt ses temps avec assez de rapidité et d'ordre , et se dissipe insensiblement après plusieurs jours avec tumeur , prurit et desquamation de la partie.

*Rap. A.* Douleur podagrique et arthritique vraie ; HOFFMAN , tom. II , pag. 339.

*B.* Affections spasmodico-goutteuses ; JUNKER , tab. XLVI.

*S-esp. I. Régulier.*

*Car.* Avec inflammation vive des parties externes , et régularité des symptômes.

*Rap. A.* Goutte podagre ; SAUV. , *loc. cit.* ;  
esp. I.

*B.* Fièvre podagrique ; VOGEL , cl. I , ord.  
II , sect. II , art. II , gen. LXIX.

*C.* Goutte rachialgique ( succédant à la co-  
lique végétale ) ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. II.

*S-esp. II.* Irrégulier.

*Car.* Avec succession plus ou moins prompte  
des symptômes annonçant la mobilité de la  
matière morbifique , et le déplacement du siège  
de la maladie.

*Rap. A.* Goutte errante ( consistant dans  
l'inflammation d'une partie interne qui n'a pas  
été précédée de l'inflammation des articula-  
tions , ou qui a cessé tout à coup , si elle a  
eu lieu ) ; CULLEN , *loc. cit.* , esp. IV.

*Voy.* J. F. NEHAUS , *de arthritide vagâ in  
ducatu Westphaliæ endemiâ* ; Giessæ 1752.

PH. G. SCHROEDER , *de arthritide vagâ* ;  
*Gotting.* 1768.

*Esp. II.* *Arthritis lent.*

*Car.* Survenant dans toute saison , et le jour  
comme la nuit , avec peu de fièvre et fré-  
quemment quelques symptômes nerveux , chez

les personnes d'une constitution foible et spasmodique ; il se manifeste par des engourdissemens articulaires avec gonflement , rougeur , douleur , difficulté des mouvemens qui persistent même après l'attaque.

*Rap. A.* Douleurs goutteuses ; HOFFMANN , tom. II , pag. 317.

*B.* Goutte asthénique primitive ; A. J. LANDRÉ-BEAUVAIS , doit-on admettre une nouvelle espèce de goutte , sous le nom de *goutte asthénique primitive* ? Paris an VIII.

*S-esp. I.* Régulier.

*Car.* Avec inflammation peu marquée des parties externes , mais sans anomalie dans la marche des symptômes.

*Var. A.* Goutte d'hiver ; SAUV. , *loc. cit.* ; esp. 2.

*B.* Goutte d'été ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 4.

*C.* Goutte chlorotique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 5.

*D.* Goutte asthmatique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 9.

*S-esp. II.* Irrégulier.

*Car.* Avec inflammation articulaire , avortée

ou peu soutenue que remplace quelque affection interne.

*Rap. A.* Goutte atonique ( elle se manifeste par l'atonie de l'estomac ou d'une autre partie interne ; elle survient sans l'inflammation des articulations , à laquelle on doit s'attendre ou qui annonce communément la goutte , ou bien elle n'est accompagnée que de douleurs légères des articulations et de peu de durée , auxquelles succèdent souvent tout à coup la dyspepsie ou d'autres symptômes d'atonie ) ; CULLEN , *loc. cit.* , esp. II.

*B.* Goutte rentrée ( elle commence par l'inflammation des articulations , qui cesse tout à coup , et est en même temps suivie de l'atonie de l'estomac ou d'une autre partie interne ) ; CULLEN , *loc. cit.* , esp. III.

#### *Formes.*

1. Anasarque rachialgique ; SAUV. , cl. X , ord. II , gen. VII , esp. 8 ( douteuse ).
2. Ascite arthritique ; SAUV. , cl. X , ord. III , gen. XIV , esp. 9.
3. Amphimérine arthritique ; SAUV. , cl. II , ord. II , gen. VI , esp. 22.
4. Tierce arthritique ; SAUV. , cl. II , ord. III , gen. X , esp. 5.

5. Quarte arthritique ; SAUV. , cl. II , ord. II , gen. XI , esp. 11.
6. Contracture arthritique ; SAUV. , cl. IV , ord. IV , gen. IV , esp. 7.
7. Cataphore arthritique ; SAUV. , cl. VI , ord. V , gen. XXIX , esp. 4.
8. Léthargie arthritique ; SAUV. ; cl. VI , ord. V , gen. XXVIII , esp. 5.
9. Carus arthritique ; SAUV. , cl. VI , ord. V , gen. XXX , esp. 6.
10. Apoplexie arthritique ; SAUV. , cl. VI , ord. V , gen. XXXI , esp. 5.
11. Palpitation arthritique ; SAUV. , cl. IV , ord. III , gen. XV , esp. 10.
12. Toux arthritique ; SAUV. , cl. V , ord. V , gen. V , esp. 19.
13. Asthme arthritique ; SAUV. , cl. V , ord. II , gen. VIII , esp. 5.
14. Cholera arthritique ; SAUV. , cl. IX , ord. II , gen. XV , esp. 10.
15. Odontalgie arthritique ; SAUV. , cl. VII , ord. II , gen. XVI , esp. 6.
16. Gastrodynie métastatique ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XXI , esp. 19.
17. Néphralgie arthritique ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XXV , esp. 3.

18. Rachialgie arthritique ; SAUV., cl. VII, ord. V, gen. XXIX, esp. 4.
19. Paralyse rhumatique ; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XVIII, esp. 3.
20. Hémiplégie arthritique ; SAUV., cl. VI, ord. III, gen. XIX, esp. 5.
21. Amaurose arthritique ; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. IV, esp. 17.
22. Diarrhée arthritique ; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XVI, esp. 9.
23. Larmoyement ( *epiphora* ) arthritique ; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXI, esp. 12.
24. Ptyalisme arthritique ; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXIII, esp. 9.
25. Diabète arthritique ; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXV, esp. 6.
26. Ophthalmie métastatique ; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XIV, esp. 24.
27. Arthritis suppuré ; F. CH. JUNCKER, *de arthritide suppuratoriâ* ; Halæ ad Salam 1769.

Gen. LXXXVIII. *TRICHOSE.*

*Eth.* du mot grec *trix*, genitif *trichos*, poil ou cheveu.

*Car.* Les poils du corps sont, par leur forme

et leur position, plus ou moins éloignés de l'état ordinaire, sans apparence de trichome ( *gen. LXXVI, tom. III, pag. 489* ).

*Esp. I. Trichose ( mutable )* avec changement dans la forme ou dans la direction des poils.

*S-esp. I. Trichiaise.*

*Syn. Trichiasis*; LINNÉ, cl. XI, vices; ord. VII, difformités; *gen. CCCXVII. — VOGEL, cl. XI, difformités; gen. DXVII.*

*Car.* Direction contre nature des cils vers le globe de l'œil.

*Var. A. Distichiaise.*

Crue d'une seconde rangée de cils, qui se placent sous les naturels, et qui, dirigés vers l'œil, l'irritent.

*B. Phalangose.*

Les bords de la paupière sont tournés en dedans, et les cils qui la bordent blessent l'organe de la vue.

Phalangose ( double ou triple rangée des cils ); *VOGEL, loc. cit., gen. DXXXIII.*

*S-esp. II. Poilûre.*

*Syn. Hérissement, hirsuties*; *VOGEL, cl. XI, difformités; gen. DXXIV.*

*Car.* Génération contre nature des poils sur une partie.

*S-esp.* III. *Distrix* ; VOGEL , cl. XI , difformités ; gen. DXXVI.

*Car.* Ténuité excessive des poils.

*S-esp.* IV. *Xirasia*.

*Syn.* *Xirasia* ; VOGEL , cl. XI , difformités ; gen. DXXVII.

*Car.* Surface laineuse des poils.

*S-esp.* V. *Rodation*.

*Syn.* *Rodatio* ; VOGEL , cl. XI , difformités ; gen. DXXXII.

*Car.* Accourcissement des poils.

*S-esp.* VI. *Canitie*.

*Syn.* *Canities* ; VOGEL , cl. XI , difformités ; gen. DXXXV.

*Car.* Blanchiment des cheveux avant l'âge.

*Esp.* II. *Trichose* ( *dépilative* ) avec chute des poils.

*Syn.* *Alopécie* ( *d'alopec* , mot grec qui veut dire *renard* ) ; SAUVAGES , cl. X , cachexies ;

ord. VI, anormales ; gen. XXXVIII. — LINNÉ, cl. XI, vices ; ord. VII, difformités ; gen. XXXVIII. — VOGEL, cl. XI, difformités ; ord. DXXIX. — SAGAR, cl. III, cachexies ; ord. VII, anormales ; gen. XXXIX.

*Car.* Ophiase, chauveté, péladé.

*S-esp.* I. Madarose, *madarosis*.

*Car.* Chute des cils.

*Var.* A. Ptilose, *ptilosis*.

Madarose avec dureté calleuse des paupières.

B. Spanopogon (poils rares à la barbe et sujets à tomber) ; VOGEL, cl. XI, gen. DLVI.

*S-esp.* II. Phalacrote, *phalacrotis*.

*Car.* Chute des poils chez les phthisiques ou chez les convalescens des maladies graves.

*Nota bene.* Il existe quelques maladies rares qui consistent dans certaines affections des ongles, dans la formation de quelque substance cornée, dans une certaine corrugation de la peau, qui n'ont encore été rassemblées dans aucun système nosologique, à l'exception de celui de VOGEL qui même l'a fait fort imparfaitement ; qu'il me soit permis de les rassembler

sous la dénomination générique de *Dermisme*, en attendant qu'un examen pratique plus approfondi permette d'en apprécier la nature intime.

*Gen. LXXXIX. DERMISME.*

*Eth.* du grec *derma*, peau.

*Car.* Épaississement et corrugation morbifique de la peau, sans caractère de lèpre (*gen. LXXVII*), et souvent avec un changement de l'état des ongles.

*Esp. I. Dermisme* avec épaississement ou difformité des ongles.

*S-esp. I. Grypose.*

*Syn. Gryposis*; VOGEL, cl. XI, difformités; *gen. DXXXVII.*

*Car.* Recourbement des ongles.

*Voy.*, ci-devant pag. 160, la maladie de la veuve Mellin, dite *la femme aux ongles*.

*S-esp. II. Ungulose.*

*Car.* Ramollissement et dégénération des ongles.

*Rap. A.* Lèpre des ongles; CLOS, *Annales*

( 176 )

de la société de médecine pratique de Montpellier, tom. I, pag. 257.

*Esp. II. Dermisme avec corrugation de la peau.*

*S-esp. I. Rhimose.*

*Syn. Rhimosis ; VOGEL, cl. XI, difformités ; gen. DXLII.*

*Car. Corrugation de la peau, avec exténuation du corps.*

*Esp. III. Dermisme avec excroissances cornées.*

*S-esp. I. Dyonysisme.*

*Syn. Dionysiscus ; VOGEL, cl. XI, difformités ; gen. DLIII.*

*Car. Éminences osseuses, au nombre de deux, sortant en guise de cornes aux environs des tempes.*

*Rap. A. GASTELLIER, observation sur une végétation de substance cornée ; hist. et mém. de la soc. roy. de médéc., ann. 1776, pag. 312 de l'hist. — MOREAU, ibid, ann. 1780-81, pag. 284. — VICQ D'AZYR, ibid, ann. 1782-83, pag. 294. — Voy. aussi mém. de l'acad.*

*l'acad. roy. de chirurg*, tom. III, in-4.<sup>o</sup>, pag. 7 de l'*hist.* — *L'ancien journ. de médéc. de Paris*, tom. VIII, pag. 24; et tom. XIV, pag. 145.

*Esp. IV. Dermisme ( spino-écailleux )*  
avec production d'épines et d'écailles.

*Rap. A. L'homme porc-épic*; voy. *bullet. des scienc. de la soc. philomat.*, n.<sup>o</sup> 67, pag. 143.

*Gen. XC. DÉCRÉPITUDE.*

*Eth.* du latin *decrepitus*, décrépité, fort vieux.

*Bibl. J. B. DE FISCHER, de senio ejusque gradibus et morbis, nec non de ejusdem acquisitione*; Erford 1754.

ROBERT, de la vieillesse; Paris 1777.

J. C. POHL, de morbis ex senio; Lipsiæ 1777.

*Car.* Vieillesse extrême et infirme.

*Nota bene.* On distingue la dernière période de la vie humaine en vieillesse, caducité et décrépitude. La première est encore un état de force et de santé; la caducité est une vieillesse avancée et infirme qui mène à la décrépitude.

*Tom. IV.*

12

pitude ; celle-ci est une vieillesse extrême ; pour ainsi dire agonisante , qui mène à la mort. Le mot *décrépitude* est pris ainsi dans un sens collectif , en y attachant l'idée de quelque infirmité.

### *Conclusion de la cinquième classe.*

La *cinquième classe* de ces *fondemens de la science méthodique des maladies* , a dû être d'autant plus restreinte dans les *genres* qui la composent , qu'il y a véritablement peu de maladies isolées et dans lesquelles on ne doit reconnoître qu'un mode à peu près seul d'action.

Le *cancer* (*gen. LXXXIV*) a terminé la *quatrième classe* , remarquable par la prédominance de l'azote et par la tendance que les maladies qui le constituent ont vers la putridité , sur laquelle influent si évidemment les produits de ce principe. Dans la *cinquième classe* , on voit d'abord des effets qu'on seroit tenté de rapprocher de ceux qu'amènent les désordres morbifiques des *genres* voisins , puisqu'ils consistent en apparence en une dissolution , si on ne s'aperçoit bientôt que celle-ci

consiste simplement dans la décomposition de la matière solide des os, par un agent qui n'est rien moins que putréfiant; et que, dans les *genres* qui succèdent, on ne trouve encore que les aberrations ou les vices des systèmes d'organes qui se rapprochent par la structure et des usages presque analogues.

Ces réflexions s'appliquent particulièrement au *rachitis* (*gen.* LXXXV de la nosologie générale et le premier de la *classe* V). On a déjà vu, *tom. III, pag. 263*, les raisons qui m'ont déterminé à ne pas classer cette maladie après le genre *calcul* (*gen.* XLIX), quoiqu'on eût pu y être induit par la découverte, faite par M. TENNANT, de l'urate de soude contenu dans les tumeurs et les tophus des gouteux. Sous l'influence d'un acide particulier, qui, selon M. BONHOMME, se rapproche de la nature de l'acide végétal, s'il n'est l'acide oxalique lui-même, et qui, s'il consistoit dans l'acide phosphorique, tantôt excédant, tantôt en défaut, expliqueroit bien mieux les états divers même opposés de la maladie; le *rachitis* opère deux changemens comme simultanés dans les tissus musculaire et osseux. Les chairs deviennent molles et flasques, ce qui a fait

mettre, par quelques-uns, le *rachitis* sous la dépendance d'une simple débilité organique; les os s'amollissent, sont déjà susceptibles de difformités et d'une ossification anormale. Mais les acides ne dissolvent-ils pas la matière terreuse des os en même temps qu'ils dénaturent la fibrine: cet aliment naturel, cette matière première des muscles? Le même agent produit donc la foiblesse du système et les vices qui altèrent l'harmonie des os? Comment supposer d'ailleurs que la débilité plus ou moins radicale des organes peut occasionner une maladie pareille au *rachitis*? Existe-t-elle avec le plus haut degré de la *cachexie*, de l'*hydropisie*? Est-elle amenée par les derniers effets de l'*onanisme*, des pertes de sang et d'humeurs excessives? Les causes occasionnelles débilitantes en renforcent les effets; mais c'est parce qu'elles agissent concurremment avec l'action des causes primitives, indispensables pour la production et pour le développement de l'affection rachitique: on peut même placer cette remarque à l'appui de ce qui vient d'être énoncé. Si le *rachitis* pouvoit provenir, chez les enfans, d'une atonie profonde qui arrêtât le développement et la formation des os, comment pourroit-on croire que la même cause pût amener

le *rachitis* chez les adultes, à une époque où les os étant formés, ne peuvent être détruits que par un agent particulier de dissolution.

Plus une machine est composée, plus il entre, dans sa formation, des systèmes d'organes divers, et plus les maladies se multiplient, puisque la diversité des affections morbides tient à la différence de structure et de fonctions de chaque partie.

Les lésions des os, parmi lesquelles on distingue véritablement le *rachitis*, dont il vient d'être question, sont si variées qu'il n'a pas été possible de les renfermer toutes dans un même *genre*. Pour compléter néanmoins leur classification, il falloit en créer un auquel se rapportassent sans effort les maladies diverses qui peuvent s'offrir au praticien. L'*ostéonisme* (*gen. LXXXVI* de la nosologie générale et le deuxième de la *classe V*), renfermant la *fragilité*, la *friabilité*, l'*exostose* et autres affections analogues, a été consacré à cet effet; il fait descendre, d'une manière plus insensible, à l'*arthritisme* (*gen. LXXXVII* de la nosologie générale et le troisième de la *classe V*), que tant d'auteurs et de praticiens assimilent au *rhumatisme* (*gen. IX* et *LXIX*,

*S-gen. I* ), par rapport à une coexistence de douleur et une analogie de siège, tandis que ces maladies diffèrent à plus d'un égard,

L'*arthritisme* se rapproche d'autant plus du *rachitisme* et de l'*ostéonisme*, que l'on trouve, dans ces divers *genres*, une aberration évidente de la matière phosphato-calcaire. Déjà les médecins qui ont écrit sur la *goutte* avant que la chimie animale vint éclairer l'éthiologie des maladies, avoient annoncé que les maladies de la vieillesse, parmi lesquelles on place l'*arthritisme*, naissent presque toujours de la surabondance des humeurs excrémentielles qui restent mêlées au sang, faute d'une action suffisante dans les organes excrétoires et singulièrement dans la peau qui, chez les vieillards, est sèche et aride. BERTHOLET a réveillé l'attention des observateurs, en indiquant qu'il pouvoit prévoir une attaque de *goutte* par la quantité respective de phosphate acidule de chaux qui se trouve dans les urines; fait précieux qui n'a pas échappé au savant BARTHEZ, qui a placé dans cette circonstance l'une des causes spécifiques goutteuses, à laquelle il donne le nom d'*humorale*, et qui d'ailleurs a avancé que les goutteux ont ordinairement

de gros os et ont dans les traits du visage une forme d'ensemble qui leur est particulière, et qui constitue une espèce de physionomie goutteuse. Les causes occasionnelles, toutes de nature à entraver les excrétions qui ont lieu par les organes urinaires et par la peau, ainsi que l'a fort bien vu l'auteur d'une dissertation sur la cause prochaine et le traitement de la *goutte* (a), tendent à prouver la vérité de cet énoncé, ainsi que les résultats d'analyse faite des excrétions des goutteux.

Des maladies des os et des surfaces articulaires aux lésions morbides des cheveux et des poils, du *derme* ou du tissu cutané, il n'y a, pour ainsi dire, qu'une modification. C'est dans le *derme* ou dans ce tissu plus ou moins épais, plus ou moins composé qui enveloppe le corps de l'animal, que prennent naissance les poils qui se répandent sur sa surface. Combien peu les maladies de ces organes sont connues, faute d'avoir suffisamment apprécié la structure organique des parties qui en sont le siège. La *trichose* (*gen.* LXXXVIII de la nosologie générale et le quatrième de la *classe*

---

(a) L. F. T. FLAMMAND; *Strasbourg* an XI.

V), *genre* qu'il ne faut pas confondre avec le *trichome* (*gen.* LXXVI), quoique le *trichome ungueux*, qui en constitue l'*espèce* III, les rapproche d'une manière spéciale, et le *dermisme* (*gen.* LXXXIX de la nosologie générale et le cinquième de la *classe* V) renferment tout ce qui est relatif à leur état pathologique. Une observation, qui ne sauroit échapper, est que la plupart de ces affections sont propres à la vieillesse; aussi la *décrépitude* (*gen.* XC de la nosologie générale et le sixième de la *classe* V) ferme-t-elle naturellement et la *classe* cinquième et le système général de classification méthodique des maladies.

---

---

# CLASSE SUPPLÉMENTAIRE

OU

## A P P E N D I X

*Aux Fondemens de la science  
méthodique des maladies.*

---

ON ne regardera pas comme un grand vice de la méthode de classification des maladies que j'ai suivie dans cet ouvrage, la nécessité où je me trouve de rassembler dans une *classe supplémentaire* le très-petit nombre des *genres* de maladies qui n'a pu entrer dans les *cinq classes* qui la constituent. C'auroit été sans doute une plus grande imperfection que d'avoir voulu rapporter, à quelqu'une de ces *cinq classes*, des *genres* qui ne leur appartenoient pas, et avec lesquelles ils auroient été sans connexion naturelle. Le motif de cette *classe supplémentaire* est évident ; j'ai voulu rendre complet,

autant qu'il a été en moi, ce système nosologique, et ne rien laisser à désirer relativement aux bases d'une étude méthodique des maux qui pèsent sur l'humanité.

Les genres de cette classe supplémentaire ; en très-petit nombre toutefois, puisqu'ils se réduisent aux effets de quelques violences ou à ceux de quelques imperfections, sont les suivans :

XCI. *Ectopie.*

*S-gen.* I. *Luxation.*

II. *Diastase.*

III. *Hernie.*

IV. *Prolapse.*

V. *Inversion.*

VI. *Déviation.*

XCII. *Thlasme.*

XCIII. *Proptome.*

XCIV. *Atrétisme.*

XCV. *Adhérence.*

XCVI. *Loxarthre.*

XCVII. *Déformation.*

*Gen.* XCI. **ECTOPIE.**

*Eth.* du grec *ek*, en dehors ; *ptose*, déplacement.

*Syn.* Ectopies ; SAUVAGES , cl. I , vices ;  
ord. VI. — CULLEN , cl. IV , locales ; ord. VII.  
— SAGAR , cl. I , vices ; ord. VI.

*Car.* Déplacement sensible des parties solides.

*S-GEN. I. Luxation.*

*Eth.* du latin *luxatio* , luxation.

*Syn.* Exarthrème , *exarthrema* ; SAUVAGES ;  
cl. I , vices ; ord. VI , ectopies ; gen. LX. —  
SAGAR , cl. I , vices ; ord. VI , ectopies ; gen.  
LXVII.

Luxature , *luxatura* ; LINNÉ , cl. XI , vices ;  
ord. II , dialitiques ; gen. CCXXXVII.

Luxation , *luxatio* ; VOGEL , cl. X , vices.

*Bibl.* G. E. HAMBERGER , *de luxationibus  
et sublaxationibus* ; Jenæ 1746.

F. E. F. GUENOTTE , *diss. inaug. sistens  
casum sublaxationis vertebræ dorsi cum frac-  
turâ complicatæ post factam repositionem et  
varia dira symptomata duodecima demum sep-  
timana funestæ* ; Argentor. 1761.

F. CH. JUNCKER , *de causis luxationum in-  
ternis* ; Halæ 1761.

F. G. LEVACHER , *de variis patellæ luxa-  
tionibus* ; Paris 1761.

J. D. BARTHELEMUS , *de patellæ usu, ejusque læsionibus et curationibus*; Lugd.-Batav. 1766.

LUDWIG , *de luxatione vertebrarum colli à medico forensi circumspecte disquirendâ*; Lips. 1767.

P. POTT , *observations on the nature and consequences of those injuries to which the head is liable from external violence..... tho which are added some few general remarks on fractures and dislocations*; Lond. 1768.

P. S. J. COME D'ANGERVILLE , *de coccygis luxatione*; Paris. 1770.

A. MURRAY , *de spinæ dorsi luxationibus*; Upsal. 1780.

A. BONN , *commentatio de utero luxato*; Lugd.-Batav. et Amstelod. 1782.

*Car.* Sortie de la tête d'un os de sa cavité articulaire , avec allongement ou raccourcissement du membre , son changement de direction et de forme , et impossibilité absolue de lui faire exécuter certains mouvemens ; pour l'ordinaire accompagnée de douleur et d'impuissance de mouvoir le membre.

*Esp.* I. Luxation ( *mobile* ) avec liberté de mettre en mouvement la partie luxée.

*Esp. II.* Luxation (*immobile*) avec difficulté de mettre en mouvement la partie luxée.

*Esp. III.* Luxation (*compliquée*) avec divers accidens étrangers aux luxations simples.

I.<sup>o</sup> *Luxations par cause externe.*

*Esp. IV.* Luxation complète et simple, par cause externe ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

*Esp. V.* Luxation incomplète et simple, par cause externe ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

*Esp. VI.* Luxation incomplète instantanée par une violence externe ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

*Esp. VII.* Luxation compliquée, par violence extérieure ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

II.<sup>o</sup> *Luxations par cause interne.*

*Esp. VIII.* Luxation par convulsion ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5.

*Esp. IX.* Luxation par paralysie ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 6.

*Esp. X.* Luxation desmochannosique, ou par relâchement des ligamens ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 7.

*Esp. XI.* Luxation desmophlogique, ou par gonflement phlogodé des ligamens; SAUV., *loc. cit.*, esp. 8.

*Esp. XII.* Luxation pastacéique, ou par l'abondance d'une synovie épaisse; SAUV., *loc. cit.*, esp. 9.

*Esp. XIII.* Luxation tophacéique, ou par la concrétion de la synovie; SAUV., *loc. cit.*, esp. 10.

*Esp. XIV.* Luxation exostosique, ou par le gonflement des têtes et des cavités des os; SAUV., *loc. cit.*, esp. 11.

#### *Formes.*

*Sor. 1.* Dysphagie valsalvienne (par luxation de l'os hyoïde); SAUV., cl. VII, ord. III, gen. XVII, esp. 15.

#### *S-GEN. II. Diastase.*

*Eth.* du grec *diastasis*, distance, séparation; dérivé du verbe *diistémi*, séparer.

*Syn.* Diastase, *diastasis*; SAUVAGES, cl. I; vices; ord. VI, ectopies; gen. LXI. — SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LXVIII.

*Car.* Écartement partiel ou total des os ou des cartilages qui n'ont aucun mouvement, laissant un vide entre les parties qui devoient être unies, avec changement de situation des parties, et souvent état douloureux.

I.<sup>o</sup> *Diastase par cause externe.*

*Esp. I.* Diastase violente ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

II.<sup>o</sup> *Diastase par cause interne.*

*Esp. II.* Diastase raphique ou avec écartement des sutures ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

*Esp. III.* Diastase harmonique, ou avec écartement des harmonies ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

*Esp. IV.* Dyastase synostéochondrique, ou avec écartement des synostéochondres ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

*Esp. V.* Diastase épiphysique, ou avec séparation des épiphyses ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5. — REICHEL, *de epiphysium ab ossium diaphysi diductione* ; Lipsiæ 1759 ; et coll. de SANDIFORT, tom. 1, pag. 1.

*Esp. VI.* Diastase sychondrosique, ou

avec écartement des synchondroses ; SAUV. ; *loc. cit.*, esp. 6. — J. R. SIGAULT, discours sur les avantages de la section de la symphyse, etc. ; *Paris* 1778. — A. ROUSSEL DE VAUZESME, *de sectione symphyseos ossium pubis admittendâ*, etc. ; *Paris*. 1778. — ALPHONSE LEROY, recherches historiques et critiques sur la section de la symphyse du pubis, etc. ; *Paris* 1778. — RETZ, observations intéressantes en faveur de la section de la symphyse du pubis, etc. ; *Paris* 1778. — ALPHONSE LEROY, observations et réflexions sur l'opération de la symphyse, etc. ; *Paris* 1780. — DESGRANGES, réflexions sur la symphyse des os pubis, etc. ; *Lyon* 1781. — J. PETERSEN MICHELL, *de synchodrotomiâ pubis* ; *Amstelod.* 1783.

### S-GEN. III. Hernie.

*Eth.* en grec *kélé*, tumeur.

*Syn.* Hernie, *hernia* ; LINNÉ, cl. XI, vices ; ord. VI, procidences ; gen. CCXCII.

*Bibl.* P. G. SCHACHER, *de morbis à situ intestinorum præternaturali* ; *Lipsiæ* 1721 ; et coll. chir. de HALLER (*disput. chirurg. selectæ*) tom. III.

J. H. FREGTAG,

J. H. FREGTAG, *de oscheoentero et bubo-  
nocele Helveticæ incolis frequentibus*; Argent.  
1721; et coll. chir. de HALLER (*ibid*),  
tom. III.

B. D. MAUCHART, *de herniâ incarceratâ,  
nova encheiresi extricatâ*; Tubing. 1722; et  
coll. chir. de HALLER (*ibid*), tom. III.

D. KOCH, *de herniâ crurali*; Heidelberg.  
1726; et coll. chir. de HALLER (*ibid*),  
tom. III.

L. HEISTER, *de herniâ incarceratâ suppu-  
ratâ non lethali*; Helmstad 1738; et coll. chir.  
de HALLER (*ibid*), tom. III.

J. CH. POHL, *de herniis et speciatim de  
sarcocèle*; Lips. 1739; et coll. chir. de HALLER  
(*ibid*), tom. III.

M. P. ROUSSIN DE MONTABOURG, *an in  
herniis intestinalibus, etiam cognita intestini  
prolapsi læsione, operatio celebrandâ?* Paris.  
1742; et coll. chir. de HALLER (*ibid*),  
tom. III.

D. J. G. GUNZ, *de entero-epiplocele*; Lips.  
1746; et coll. chir. de HALLER (*ibid*),  
tom. III.

J. F. LECHAT DE LA SOURDIÈRE, *an chi-  
rurgiæ herniarum curationi musculorum sterno-  
mastoideorum tensio noceat?* Paris. 1748; et

Tom. IV.

coll. chir. de HALLER (*ibid*) ; tom. III.

G. PFANN , *de entero-oscheocele antiquâ restitutione sacci herniosi feliciter peractâ , absque bracherio et sectione curatâ* ; Erlang. 1748 ; et coll. chir. de HALLER (*ibid*) , tom. III.

B. D. MAUCHART , *de epiplo-enterocele crurali incarceratâ* , etc. ; Tubing. 1748 ; et coll. chir. de HALLER (*ibid* , tom. III.

J. BRENDEL , *de herniarum natalibus* ; Goetting. 1751.

C. C. DEJEAN , règles et observations très-importantes pour les personnes attaquées des hernies , etc. ; Paris 1755. — Ouvrage touchant les hernies ou descentes , etc. ; Paris 1763.

P. POTT , *an account of a particular kind of rupture , frequently attendant upon new-born children* , etc. ; Lond. 1757.

R. B. SABATIER , *theses anatomico-chirurgicæ de herniâ incarceratâ* ; Paris. 1757.

C. F. KALTSCHMID , *de intestino in herniâ incarceratâ a chirurgo incaute læso* ; Jena 1759.

BLAKAY , instructions pour prévenir et guérir les descentes ou hernies ; Paris 1760.

P. CAMPER , des causes des diverses hernies chez les enfans nouveaux nés ; *verhandelinger*

*uitgegeeven door de Hollandse, etc. ; te Harlem 1761-62 , pag. 235.*

PH. A. BOEHMER, *de herniis incarceratis ; Halæ 1761. — De herniis abdominalibus ; Halæ 1780.*

C. F. KALTSCHMID, *de herniis , speciatim oscheocele verâ ; Jenæ 1762.*

J. T. KLINKOSCH, *programa quo divisionem herniarum novamque herniæ ventralis speciem proponit ; Pragæ 1764.*

R. A. VOGEL, *dissert. inaug. sistens herniarum communia attributa et partitionem ; Gotting. 1764.*

W. BLAKEY, *observations concerning ruptures , and the treatmen ; Lond. 1764.*

CH. G. TIMMERMANN, *de herniis animadversiones ; Rinteln. 1768.*

LEBLANC, *nouvelle méthode d'opérer les hernies ; Paris 1768.*

BALIN, *l'art de guérir les hernies ou descentes ; Paris 1768 , 1779 , 1785.*

F. G. MELZER, *de herniâ crurali incarceratâ ; Argentor. 1769.*

J. F. MECKEL, *tractatus de morbo hernioso congenito singulari et complicato ; feliciter curato ; Berolin. 1772.*

P. SWETNER, *diss. inaug. sistens casum de*

*herniâ crurali incarceratâ et lethiferâ*; Gottinge  
1772.

GAUTHIER, dissert. sur l'usage des caustiques pour la guérison radicale et absolue des hernies, etc.; Paris 1774.

BORDENAVE, mémoire sur le danger des caustiques, pour la cure radicale des hernies; Paris 1774.

A. G. RICHTERS, *vorlesung von den eingeklemmten brüchen*; Gottingen 1775. — En français, par ROUGEMONT, traité des hernies; Bonn 1788.

E. SANDIFORT, *icones herniæ inguinalis congenitæ*; Lugd.-Batav. 1781.

D'AIMÉ, avis aux mères et aux nourrices sur l'art et les moyens de prévenir les ruptures aux enfans du bas âge, avec une dissertation sur les hernies, etc.; Charleville 1783.

LE ROUGE, avis très-important aux personnes attaquées de hernies, etc.; Paris 1785.

JUVILLE, traité des bandages herniaires, etc.; Paris 1786.

A. MURRAY, *animadversiones in hernias incompletas*, etc.; Upsal. 1788.

CHAUSSIER, table synoptique des hernies; suivant la nomenclature méthodique de l'anatomie; Paris

( 197 )

CH. DESCHAMPS, dissertation sur l'étranglement de la hernie inguinale par les retrécissemens du sac herniaire; *Strasbourg* an XI-1803.

*Car.* Passage d'un viscère de la cavité où il est naturellement placé, dans une cavité contre nature, avec tumeur molle, élastique, rénitente, plus ou moins saillante et volumineuse, d'une forme variable, et dont le volume augmente par les efforts, diminue par le repos, par la pression, au moins pour l'ordinaire.

*Variétés dependantes de l'état du sac herniaire.*

A. Hernie enkystée : tumeur dont l'enveloppe est fournie par les parties contenantes intègres.

B. Hernie akystée : tumeur dont les enveloppes naturelles ont été rompues, et que constitue la partie déplacée à nu.

*Esp. I. Céphalocèle.*

*Eth.* du grec *kephale*, tête; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Encephalocèle; SAUVAGES, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LVII. — SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LV.

( 198 )

Hernie du cerveau ; FERRAND , *mém. de l'académ. roy. de chirurg.* , tom. v , pag. 60.

Hernie encéphalique ou encéphalocèle ; CHAUSSIER , tab. synopt. des hern.

*Car.* Hernie dans quelque partie de la tête , et occasionnée par une portion du cerveau , avec tumeur ordinairement molle , indolente , que recouvre un prolongement de la méninge.

*S-esp.* I. Encéphalocèle simple ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

*Var.* A. Hernie bregmatique ( située au sommet de la tête ) ; CHAUSSIER , *loc. cit.*

B. Hernie occipitale ( formée par le cervelet sortant par le trou occipital ) ; CHAUSSIER , *loc. cit.*

C. Hernie temporale ; CHAUSSIER , *loc. cit.*

*S-esp.* II. Encéphalocèle hydrocystique.

*Car.* Hernie du cerveau avec épanchement de sérosité : hydro-encéphalocèle ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

*S-esp.* III. Encéphalocèle hydro-rachique.

*Car.* Hernie du cerveau avec épanchement ,

compliquée de *spina bifida*; SAUV., *loc. cit.*,  
esp. 3.

*Esp. II. Ophtalmocèle.*

*Eth.* du grec *ophthalmos*, œil; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Ceratocèle ( du grec *keras*, corne, et  
*kélé*, tumeur ).

Staphylome de plusieurs.

Exiris; SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ec-  
topies; gen. XLV.

*Bibl.* MAUCHART, *de staphylomate, vexato  
nomine, affectuque oculi difficili ac intricato*;  
Tubing. 1748.

A. G. RICHTERS, *vorlesung vom staphyloma*;  
Gottingen 1771 ( le staphylome de RICHTERS  
est un vrai leucome ).

GUNZ, *de staphylomate.....*

*Car.* Passage de l'iris par une ouverture faite  
à la cornée, donnant lieu à un tubercule noi-  
râtre plus ou moins prominent.

*Rap. A.* Ptose de l'iris; PLENCK, *de morb.  
ocul.*, pag. 125.

*Variétés dues au degré.*

A. Ptose récente par une large blessure de  
la cornée; PLENCK, *loc. cit.*, esp. I.

B. Prose invétérée ; PLENCK, *loc. cit.*, esp. 2.

*Variétés dues à la forme.*

C. Myocéphale, si la tumeur a la couleur et la figure d'une tête de mouche.

D. Staphylome de l'iris, si la tumeur est semblable à un grain de raisin.

E. Melon, si la tumeur est assez considérable pour dépasser les paupières.

F. Hilon ou clou, si la tumeur est dure, calleuse, et ressemble à la tête d'un clou ; PLENCK, *de morb. ocul.*, pag. 125.

*Formes.*

Sor. 1. Caligue cératocélique ; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. II, esp. 10.

2. Exophtalmie staphylomatique ; SAUV., cl. I, ord. VI, gen. XLII, esp. 11.

*Esp. III. Thoraxocèle.*

*Eth.* du grec *thorax*, enceinte antérieure de la poitrine ; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Hernie thoracique ; CHAUSSIER, tab. synopt. des hernies.

Pneumocèle ( du grec *pneumon*, poumon ; et *kélé*, tumeur ).

Pleurocèle; SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LXIII.

*Car.* Hernie occasionnée par une portion du poumon, sortant dans l'intervalle de deux côtes, et constituant une tumeur qui se gonfle et s'affaisse alternativement dans l'acte de la respiration.

*Esp. IV. Gastérocèle.*

*Eth.* du grec *gaster*, ventre; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Hernie abdominale; CHAUSSIER, tab. synopt. des hern.

Laparocèle; SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LVI.

*Bibl.* B. I. LACHAUSSE, *de herniâ ventrali*; Argentor. 1746; et coll. de HALLER, tom. III.

CH. H. PAPEN, *epistola sistens stupendam et numquam descriptam herniam dorsalem*, etc.; Goetting. 1750; et coll. de HALLER, tom. III.

J. C. JUENGEN, *de herniis abdominalibus*; Halæ 1780.

*Car.* Tumeur formée par un intestin, par

l'épiploon ou par un viscère , et située à quelque endroit de la circonférence de l'abdomen.

I.<sup>o</sup>

*Sous-espèces différenciées par le lieu du bas-ventre où se trouve la hernie.*

*S-esp. I. Épigastrocèle.*

*Eth.* du grec *epi*, sur ; *gaster*, ventre ; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Hernie épigastrique ; CHAUSSIER , *loc. cit.* , §. v.

*Car.* Hernie de l'épigastre , avec anxiétés , vomissemens.

*S-esp. II. Omphalocèle.*

*Eth.* du grec *omphalos* , nombril ; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Hernie ombilicale ; CHAUSSIER , *loc. cit.* , §. vi.

Omphalocèle ; VOGEL , cl. x , vices ; ord. II , tumeurs ; gen. CCCXCVIII.

Exomphalé.

*Bibl.* H. F. TEICHMEYER ; *de exomphalo*

*inflammato, exulcerato, et postea consolidato ;  
Jenæ 1738.*

*Car.* Hernie de l'ombilic, reductible, ayant la couleur de la peau, et pour l'ordinaire indolente, formée par le relâchement du péritoine et des tégumens, contenant divers organes.

*S-esp.* III. Hypogastrocèle.

*Eth.* du grec *hypo*, sous ; *gaster*, ventre ; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Hernie sous-ombilicale ; CHAUSSIER, *loc. cit.*, §. VII.

Hypogastrocèle ; VOGEL, cl. X, vices ; ord. II, tumeurs ; gen. CCCIII.

*Bibl.* J. TH. KLINKOSCH, *programa quo divisionem herniarum, novamque herniæ ventralis speciem proponit ; Pragæ 1764.*

*Car.* Hernie située sous l'ombilic, entre les deux muscles sterno-pubiens, formant une grosse tumeur.

*S-esp.* IV. Mérocèle.

*Syn.* Hernie inguinale ou fémorale ; CHAUSSIER, *loc. cit.*, §. II.

Mérocèle ou inguinale externe de quelques auteurs , communément crurale.

Mérocèle ; VOGEL , cl. X , vices ; ord. II , tumeurs ; gen. CCCXCIX. — SAGAR , cl. I , vices ; ord. VI , ectopies ; gen. LVII.

*Car.* Hernie à la partie supérieure et antérieure de la cuisse , au passage des vaisseaux cruraux ; sur-tout commune chez les femmes.

*S-esp.* V. Bubonocèle.

*Eth.* du grec *boubon* , aîne ; et *kélé* , tumeur.

*Syn.* Bubonocèle ; VOGEL , cl. X , vices ; ord. II , tumeurs ; gen. CCCXCVI. — SAGAR , cl. I , vices ; ord. VI , ectopies ; gen. LVIII.

Hernie suspubienne ; CHAUSSIER , *loc. cit.* , §. I.

Communément et improprement inguinale ou bubonocèle , puisqu'elle ne se trouve jamais à l'aîne ; bubonocèle interne ou inguinale interne de quelques auteurs.

*Car.* Hernie ayant lieu par l'anneau des vaisseaux spermaticques , de la même couleur de

la peau, et indolente lorsqu'il n'y a point d'étranglement.

*S-esp.* VI. Opodéocèle.

*Syn.* Opodéocèle; SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LIX.

Hernie sous-pubienne; CHAUSSIER, *loc. cit.*, §. III.

Communément hernie du trou ovale ou obturateur.

*Car.* Hernie au haut de la cuisse, formée par la sinuosité supérieure de l'os ischion, donnant passage aux vaisseaux, remplaçable, molle, incolore, à peine sensible lorsqu'elle est petite, ensuite élastique.

*S-esp.* VII. Ischiocèle.

*Eth.* du grec *ischion*, nom d'un os du bassin; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Ischiocèle; SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LX.

Hernie ischiatique; CHAUSSIER, *loc. cit.*, §. IV.

Ischiocèle; VOGEL, cl. X, vices, ord. II, tumeurs; gen. CCCC.

*Car.* Hernie par l'ouverture sacro-ischiatique du bassin, paroissant d'abord au pli de la fesse, s'étendant, se prolongeant plus ou moins à la face poplitée de la cuisse; rentrant lorsqu'on est couché sur ventre.

*S-esp.* VIII. Elytrocèle.

*Eth.* du grec *elythron*, vagin; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Elytrocèle; VOGEL, cl. X, vices; ord. II, tumeurs; gen. CCCCII.

Colpocèle; SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LXI.

*Car.* Hernie formée dans le vagin, repoussable, rentrant spontanément, le corps étant couché sur le dos, les fesses élevées; indolente et sans les signes des tumeurs qui peuvent provenir dans cette partie.

*S-esp.* IX. Périnæocèle.

*Eth.* du grec *perinaios*: de *peri*, autour; et *naio*, j'habite.

*Syn.* Périnæocèle; SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LXII.

*Car.* Hernie formée dans quelque partie du

périnée, molle, rentrante, incolore, souvent l'effet d'un accouchement difficile.

*S-esp. X. Oschéocèle.*

*Eth.* du grec *oscheon*, scrotum, bourses; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Oschéocèle; VOGEL, cl. X, vices; ord. II, tumeurs; gen. CCCXCVII.

*Car.* Hernie dans le scrotum.

II.°

*Sous-espèces diversifiées par la partie qui constitue la hernie.*

*S-esp. XI. Gastrocèle.*

*Eth.* du grec *gaster*, ventre; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Gastrocèle; SAUVAGES, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LII. — VOGEL, cl. X, vices; ord. II, tumeurs; gen. CCCCX. — SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LIV.

*Bibl.* P. KIRSCHBAUN, *de herniâ ventriculi*; Argentor. 1743; et coll. de HALLER, tom.

III.

*Car.* Hernie formée par l'estomac, constituant une tumeur entre le cartilage xiphoïde et l'ombilic, ou dans le nombril lui-même, augmentant après le repas, avec gastéralgie, vomitions.

*Var. A.* Gastrocèle simple ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

*B.* Gastrocèle ombilicale ; G. PH. MICHAELIS, *prolapsus ventriculi ab intestino* ; Marpurg. 1769.

*C.* Gastrocèle composée ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

#### *Formes.*

*Sor. 1.* Nausée gastrocélifique ; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XII, esp. 4.

2. Vomissement gastrocélifique ; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XIII, esp. 18.

3. Dyspnée gastrocélifique ( occasionnée par le passage de l'estomac dans la poitrine ) ; SAUV., cl. V, ord. II, gen. VII, esp. 17.

4. Orthopnée gastrocélifique ; SAUV., cl. V, ord. II, gen. IX, esp. 11.

5. Gastrodynie gastrocélifique ; SAUV., cl. VII, ord. IV, gen. XXI, esp. 20.

6. Gastrite

6. Gastrite hernieuse ; SAUV. , cl. III , ord. II , gen. XIV , esp. 7.

*S-esp.* XII. Hépatocèle.

*Eth.* du grec *hepar* , foie ; et *kélé* , tumeur.

*Syn.* Hépatocèle ; SAUVAGES , cl. I , vices ; ord. VI , ectopies ; gen. LIII.

*Car.* Hernie formée par le foie , causée par le relâchement et la diduction des parois abdominales , voisines du nombril , constituant une tumeur dure , sans indices des autres sous-espèces de hernies.

*Var.* A. Hépatocèle ventrale ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

B. Hépatocèle ombilicale ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2. — F. H. BUCHOLTZ , de *hepatothoracophalocèle congenitâ* ; Argentor. 1768.

*S-esp.* XIII. Splénocèle.

*Eth.* du grec *splen* , rate ; et *kélé* , tumeur.

*Syn.* Splénocèle ; SAUVAGES , cl. I , vices ; ord. VI , ectopies ; gen. LIV.

*Car.* Hernie formée par la rate.

*Var. A.* Splénocèle ventrale ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

*B.* Splénocèle inguinale ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

*S-esp. XIV.* Epiplocèle.

*Eth.* du grec *epi* , sur ; *pleo* , flotter , d'où on a dérivé *épiploon* ; et *kelé* , tumeur.

*Syn.* Hernies épiploïques ; CHAUSSIER , *loc. cit.* , §. 1 , suspubienne , art. II , n.° 1.

Epiplocèle ; SAUVAGÈS , cl. 1 , vices ; ord. VI , ectopies ; gen. LI.

*Car.* Hernie occasionnée par l'épiploon , passant par les anneaux des aînes , les arcs cruraux , l'anneau du nombril , les parois du vagin ou les muscles épigastriques ; se formant lentement , croissant de même , ne rentrant point spontanément , difficile à contenir quand elle est réduite ; constituant une tumeur molle , inégale , ridée , pâteuse , plate , ne rendant aucun bruit dans la pression ou la réduction , ne grossissant pas lorsqu'on retient son haleine ; et obligeant quelquefois à garder une situation courbée.

*Var. A.* Epiplocèle incomplète ou inguinale,

hernie épiploïque de l'aîne ; bubonocèle épiploïque , épiplo-bubonocèle ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

B. Epiplocèle complète, oschéocèle épiploïque , épiplo - oschéocèle ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

C. Epiplocèle crurale , hernie crurale de l'épiploon , mérocèle épiploïque , épiplo-mérocèle ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 3.

D. Epiplocèle vaginale , hernie épiploïque dans le vagin ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 4.

E. Epiplocèle ombilicale , hernie épiploïque du nombril , omphalocèle épiploïque , épiplo-omphale ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 5.

F. Epiplocèle ventrale , hernie ventrale de l'épiploon , épigastrocèle épiploïque ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 6.

G. Epiplocèle cystocélique , cystocèle ou hernie épiploïque compliquée de cystocèle , cysto-épiplocèle ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 7.

H. Epiplocèle hydrolique ou compliquée d'hydrocèle , hydro-épiplocèle ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 8.

I. Epiplocèle parorchidique , hernie compliquée contenant l'épiploon et le testicule ; J. E.

NEUBAVER, de epiplooscheocele, cujus receptaculum peritonæi mentiebatur processum, testem et epididymem simul continentem; Jena 1770.

*S-esp.* XV. Entérocele.

*Eth.* du grec *enteron*, intestin; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Entérocele; SAUVAGES, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. I.

*Car.* Hernie formée par un intestin quelconque au travers des anneaux inguinaux, des arcs cruraux, des trous ovalaires, des échancrures ischiatiques, de l'anneau ombilical, des parois du vagin ou des muscles épigastriques, avec tumeur d'abord petite, mais grossissant insensiblement; rentrant lorsqu'on la presse, mais revenant et augmentant au moindre effort; tendue, flexible, élastique, lisse, égale; faisant du bruit lorsqu'on la presse, se contractant par le froid, se dilatant par la chaleur, devenant dure lorsqu'on retient son haleine, et très-susceptible d'étranglement.

1.° *Entéroceles simples enkistées.*

*Var.* A. Entérocele incomplète ou ingui-

nale , hernie intestinale de l'aîne , bubonocèle vulgaire ou intestinale , entéro-bubonocèle ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

B. Entérocèle complète , oschéocèle intestinale , entéro-oschéocèle , entérocèle des grandes lèvres ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

C. Entérocèle appendiculaire , hernie formée par l'appendice de l'intestin ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 3.

D. Entérocèle partielle ou constrictoire , pincement de l'intestin ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 4.

E. Entérocèle crurale ; hernie crurale de l'intestin , mérocèle intestinale , entéro-mérocèle ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 5.

F. Entérocèle ovulaire , hernie intestinale du trou ovulaire des os pubis ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 6.

G. Entérocèle ischiatique , hernie intestinale de l'échancre sciatique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 7. — E. G. BOSE , *de enterocele ischiadicâ* ; Lips. 1772.

H. Entérocèle vaginale , hernie intestinale dans le vagin ; SAUV. *loc. cit.* , esp. 7.

I. Entérocèle ombilicale , hernie intestinale

du nombril, entéromphale; SAUV., *loc. cit.*, esp. 9.

K. Entéroçèle ventrale, hernie ventrale de l'intestin, hypogastroçèle intestinale; SAUV., *loc. cit.*, esp. 10.

2.<sup>o</sup> *Entéroçèles enkistées composées.*

L. Entéroçèle épiploïco-incomplète, hernie intestinale et épiploïque de l'aîne, bubonocèle épiploïco-intestinale, épiplo-entéroçèle incomplète; SAUV., *loc. cit.*, esp. 12.

M. Entéroçèle épiploïco-complète, hernie intestinale et épiploïque complète, oschéocèle épiploïco-intestinale, entéroçèle épiploïque des grandes lèvres, épiplo-entéroçèle complète; SAUV., *loc. cit.*, esp. 12.

N. Entéro-mésocolocèle, hernie intestino-mésocolique; G. L. KNOBLOCH, *de entero-mesocolocele suffocatâ*; *Lugd.-Batav.* 1767.

O. Entéroçèle cystocélique, hernie intestinale compliquée de cystocèle, cysto-entéroçèle; SAUV., *loc. cit.*, esp. 13.

P. Entéroçèle parorchidiale, hernie intestinale compliquée du déplacement du testicule; SAUV., *loc. cit.*, esp. 14.

Q. Entérocèle hydrocélifique, hernie intestinale compliquée d'hydrocèle, hydro-entérocèle; SAUV., *loc. cit.*, esp. 15.

R. Entérocèle épiploïco-crurale, hernie crurale de l'intestin et de l'épiploon, mérocèle épiploïco-intestinale, épiplo-entérocèle crurale; SAUV., *loc. cit.*, esp. 16.

S. Entérocèle épiploïco-ovalaire, hernie épiploïco-intestinale par le trou ovalaire, épiplo-entérocèle du trou ovale; SAUV., *loc. cit.*, esp. 17.

T. Entérocèle épiploïco ischiatique, hernie épiploïco-intestinale par l'échancrure sciatique, épiplo-entérocèle dorsale; SAUV., *loc. cit.*, esp. 18.

U. Entérocèle épiploïco-vaginale, hernie épiploïco-intestinale par le vagin, épiplo-entérocèle vaginale; SAUV., *loc. cit.*, esp. 19.

V. Entérocèle épiploïco-ombilicale, hernie épiploïco-intestinale du nombril, épiplo-entéromphale; SAUV., *loc. cit.*, esp. 20.

X. Entérocèle épiploïco-ventrale, hernie de l'intestin et de l'épiploon surombilicale, sous-ombilicale, ventrale, hypogastrocèle épiploïco-intestinale; SAUV., *loc. cit.*, esp. 21.

3.<sup>o</sup> *Entéroçèles par ruptures.*

Y. Entéroçèle bubonorixe , rupture inguino-intestinale ou épiploïco-intestinale ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 22.

Z. Entéroçèle merorixe , rupture cruro-intestinale ou épiploïco-intestinale ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 23.

AA. Entéroçèle omphalorixe , rupture ombilico-intestinale ou épiploïco-intestinale ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 24.

BB. Entéroçèle hypogastrorixe , rupture ventro-intestinale ou épiploïco-intestinale ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 25.

*Formes entéroçéliques.*

Sor. 1. Colique entéroçélique ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XXII , esp. 22.

2. Iléose hernieux ; SAUV. , cl. IX , ord. II , gen. XIV , esp. 6. — S. T. QUELMALZ , *de ileo ex herniâ , eâque demum cum intestino suppuratâ* ; Lips. 1750.

3. Enurèse hernieuse ; SAUV. , cl. IX , ord. III , gen. XXVI , esp. 3.

4. Entérite entéroçélique , SAUV. , cl. III , ord. II , gen. XV , esp. 5.

**S-esp. XVI. Métrocèle.**

*Eth.* du grec *metra*, matrice ; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Hystérocèle ; SAUVAGES, cl. I, vices ; ord. VI, ectopies ; gen. LV.

*Car.* Hernie formée par la matrice.

*Var.* A. Hystérocèle inguinale, hernie inguinale de la matrice, hystéro-bubonocèle ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

B. Hystérocèle ventrale, hernie ventrale de la matrice ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

**S-esp. XVII. Cystocèle.**

*Eth.* du grec *kystis*, vessie ; et *kélé*, tumeur.

*Syn.* Cystocèle ; SAUVAGES, cl. I, vices ; ord. VI, ectopies ; gen. LVI.

*Bibl.* J. SALZMANN, *de herniâ vesicæ urinaræ* ; Argent, 1732 ; et coll. chir. de HALLER, tom. III.

*Car.* Hernie causée par la vessie urinaire, au travers des anneaux des aînes, au dessus des arcs cruraux, et par le relâchement ou la diduction.

1.° *Cystocèles simples.*

*Var. A.* Cystocèle inguinale, hernie inguinale de la vessie urinaire, cysto-bubonocèle; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

*B.* Cystocèle crurale, hernie crurale de la vessie urinaire, cysto-mérocèle; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

*C.* Cystocèle périnéale, hernie de la vessie urinaire par le périnée; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

*D.* Cystocèle hypogastrique, hernie de la vessie par dessus les os pubis, cysto-hypogastrocèle; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

*E.* Cystocèle vaginale, hernie de la vessie urinaire dans le vagin; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5.

2.° *Cystocèles composées.*

*F.* Cysto-entérocélique, hernie de la vessie compliquée d'entérocéle, entéro-cystocèle; SAUV., *loc. cit.*, esp. 6.

*G.* Cystocèle épiplocélique, hernie de la vessie compliquée d'épiplocèle, épiplo-cystocèle; SAUV., *loc. cit.*, esp. 7.

*H.* Cystocèle hystéroptosique, hernie cysto-

rique avec hernie de la matrice, hystéro-cystocèle ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 8.

I. Cystocèle lombaire, cystocèle simple ilia-co-ventrale ; hernie de la vessie par la région iliaque droite ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 9.

*S-GEN. IV. Prolapse.*

*Eth.* du latin *prolapsus*, chute.

*Syn.* Prolapse ; LINNÉ, cl. XI, vices ; ord. VI, procidences ou chutes ; gen. CCXCIII. — CALLISEN, *princip. system. chirurg.*, cl. IV, ord. II.

*Car.* Déplacement d'une partie, qui n'est enveloppée ni d'un kiste, ni des tégumens, et qui est vue à nu.

*Esp. I. Exophtalmie.*

*Syn.* Exophtalmie ; SAUVAGES, cl. I, vices ; ord. VI, ectopies ; gen. XLII. — SAGAR, cl. I, vices ; ord. VI, ectopies ; gen. XLV. — CALLISEN, *loc. cit.*, gen. I.

*Car.* Chute du globe de l'œil.

*S-esp. I. Exophtalmie hydropique*, avec amas d'un liquide ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1 ; rapport de l'hydrophthalmie.

*S-esp.* II. Exophtalmie purulente ou hypopyyque ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2 ; sorte des formes de l'hypopyum.

Exophtalmie critique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 7.

Exophtalmie chémosique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 10.

*S-esp.* III. Exophtalmie douloureuse ou chancreuse ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 3 ; sorte des formes de l'algie.

*S-esp.* IV. Exophtalmie traumatique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 4.

*S-esp.* V. Exophtalmie mécanique ou par une protubérance ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 5.

*S-esp.* VI. Exophtalmie paralytique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 6 ; sorte des formes de paralytié.

*S-esp.* VII. Exophtalmie violentielle ou causée par un effort ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 8.

*S-esp.* VIII. Exophtalmie strangulatoire ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 9.

*Esp.* II. *Paraglosse.*

*Syn.* Paraglosse ; SAUVAGES , cl. 1 , vices ;

ord. VI, ectopies ; gen. XLV. — SAGAR, cl. I, vices ; ord. VI, ectopies ; gen. XLVIII. — CALLISEN, *loc. cit.*, gen. II.

*Car.* Chute de la langue.

*S-esp.* I. Paraglosse déglutitoire : elle est avec suffocation ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

*S-esp.* II. Paraglosse glossomégiste : grandeur excessive ou tumeur de la langue ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2 ; rapport du gen. LII, esp. I.

*S-esp.* III. Paraglosse exertoire : sortie de la langue ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

*S-esp.* IV. Paraglosse rétractoire ; rétraction de la langue ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

*Esp.* III. *Hypostaphyle.*

*Syn.* Hypostaphyle ; SAUV., cl. I, vices ; ord. VI, ectopies ; gen. XLIV. — SAGAR, cl. I, vices ; ord. VI, ectopies ; gen. XLVII. — CALLISEN, *loc. cit.*, gen. 3.

*Car.* Chute de la lnette.

*S-esp.* I. Hypostaphyle inflammatoire : inflammatoire de la lnette ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1 ; rapport de la glossitie, gen. LVIII, esp. III.

*S-esp.* II. Hypostaphyle laxatoire : relâchement de la lnette ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

*Formes.*

*Sor.* I. Dysphagie hypostaphylique ; SAUV. , cl. VII , ord. III , gen. XVII , esp. 19.

*Esp.* IV. Proctoptose.

*Eth.* de *proctos* , anus ; et *ptosis* , chute ;

*Syn.* Exanie , *exania* ; SAUVAGES , cl. I , vices ; ord. VI , ectopies ; gen. XLVII. — SAGAR , cl. I , vices ; ord. VI , ectopies ; gen. L.

*Car.* Chute du sphincter de l'anus et de l'intestin rectum.

*Var.* A. Bourlet ; tumeur circulaire ou gros anneau rouge formé à l'anus.

B. Boudin : tuyau plus ou moins long , formé par l'intestin renversé.

*S-esp.* I. Exanie primitive ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

*S-esp.* II. Exanie diarrhéique : occasionnée par un flux de ventre ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

*S-esp. III.* Exanie calculeuse : causée par les efforts des calculeux ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 3.

*S-esp. IV.* Exanie dystocique , causée par les efforts des femmes en travail d'enfant ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 4.

*S-esp. V.* Exanie paralytique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 5.

*S-esp. VI.* Exanie traumatique ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 6.

*Esp. V. Métroptose.*

*Eth.* du grec *métré* , mère ; *metra* , uterus ; et *ptoses* , chute.

*Syn.* Hystéroptose ; SAUVAGES , cl. I , vices ; ord. VI , ectopies ; gen. XLIX. — SAGAR , cl. I , vices ; ord. VI , ectopies ; gen. LII. — CALLISEN , *loc. cit.* , cl. IV , ord. II , gen. 5.

*Bibl.* J. A. KULM , *de uteri delapsu , suppressionis urinæ et subsequatæ mortis causâ* ; Yedani 1732 ; et coll. chirurg. de HALLER , tom. III.

PH. ADOLPH , *de prolapsu et inversione uterî ejusque vaginæ relatione* ; Halæ 1745 ; et coll. chir. de HALLER , *ibid.* , cl. IV , gen. 5.

F. CHOPPART, *de uteri prolapsu*; Paris.  
1772.

*Car.* Chute de l'uterus, avec douleurs dans les reins et dans les aînes, tenesme et incontenance ou rétention d'urine.

*S-esp. I.* Hystéroptose relaxatoire : chute de la matrice par relâchement ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

*S-esp. II.* Hystéroptose composée : descente de la matrice et de la vessie urinaire ; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

**S-GEN. V. Inversion.**

*Eth.* du latin *inversio*, renversement.

*Car.* Repliement partiel ou total des parois d'un organe l'une sur l'autre.

*Esp. I. Exocyste.*

*Eth.* d'*ex*, hors ; et *kystis*, kiste.

*Syn.* Exocyste ; SAUVAGES, cl. I, vices ; ord. VI, ectopies ; gen. XLVIII. — SAGAR, cl. I, vices ; ord. VI, ectopies ; gen. LI. — CALLISEN, *loc. cit.*, cl. IV, ord. II, gen. 5.

*Car.*

( 225 )

**Car.** Inversion de la membrane du cou et du corps de la vessie faisant chute par le conduit urinaire.

**S-esp. I.** Exocyste Noélienne : renversement de la membrane intérieure du corps de la vessie ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 1.

**S-esp. II.** Exocyste Solingénienné : renversement de la membrane intérieure du cou de la vessie ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

**Formes.**

**Sor. 1.** Dysurie cystocélique ; SAUV. , cl. IX ; ord. III , gen. XXVII , esp. 8.

**2.** Ischurie ectopocystique ; SAUV. , cl. X , ord. III , gen. XIX , esp. 26.

**Esp. II.** Exomètre.

**Eth.** du grec *ex* , hors ; et *metra* , utérus.

**Bibl.** A. WALV. , *de uteri gravidi retroversione* ; Halæ 1782.

W. COCKEL , *an essay on the retroversion of the uterus* ; Lond. 1785.

**Car.** Renversement de la matrice.

**Rap. A.** Hystéroptose utérine ; enfoncement ,

**Tom. IV.**

( 226 )

perversion, renversement de la matrice ; SAUV.,  
cl. I, ord. VI, gen. XLIX, esp. 2.

*Formes.*

*Sor. I.* Ménorrhagie hystéroptosique ; SAUV.,  
cl. IX, ord. I, gen. VI, esp. 5.

*Esp. III.* *Exelythre.*

*Eth.* du grec *ex*, hors ; *elythron*, vagin.

*Syn.* Elythroptose ; CALLISEN, *loc. cit.*,  
cl. IV, ord. II, gen. 5.

*Car.* Renversement du vagin.

*Rap. A.* Hystéroptose vaginale : relaxation,  
descente, chute, renversement du vagin ; SAUV.,  
cl. I, ord. VI, gen. XLIX, esp. 3.

*S-GEN. VI.* *Déviation.*

*Eth.* du latin *devio*, dévoyer.

*Syn.* Déviations, *deviationes* ; CALLISEN,  
*loc. cit.*, cl. IV, ord. III.

*Car.* Changement de position d'une partie  
ou d'un organe, sans hernie ou autre dépla-  
cement analogue.

**Esp. I. Blépharoptose.**

**Eth.** du grec *blepharon*, paupière; et *ptosis*, chute.

**Car.** Déviation de la paupière.

**S-esp. I.** Blépharoptose vraie : chute, relaxation de la paupière supérieure; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

**S-esp. II.** Blépharoptose lagophtalme : œil de lièvre, lagophtalmie; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

**S-esp. III.** Blépharoptose ectropium, éraillement; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

Ectropium; VOGEL, cl. XI, difformités; gen. **DXVIII.**

**Formes.**

**Sor. 1.** Epiphore par ectropium; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXI, esp. 6.

**S-esp. IV.** Blépharoptose entropium : trichiaise avec inversion des tarses; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4. *Voy.* ci-devant pag. 171.

Entropium; VOGEL, cl. XI, difformités; gen. **DXIX.**

*Esp. II. Métroloxie.*

*Eth.* du grec *metra*, utérus; et *loxos*, oblique.

*Syn.* Hystéroloxie; SAUVAGES, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LVIII. — SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LXV.

*Car.* Obliquité de la matrice, l'axe du bassin étant naturel et l'orifice de cet organe se trouvant plus ou moins dévié.

*S-esp. I.* Hystéroloxie antérieure; SAUV., *loc. cit.*, esp. 1.

*S-esp. II.* Hystéroloxie postérieure; SAUV., *loc. cit.*, esp. 2.

*S-esp. III.* Hystéroloxie latérale; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

*S-esp. IV.* Hystéroloxie sans grossesse; SAUV., *loc. cit.*, esp. 4.

*Formes.*

*Sor. I.* Dysurie hystéroloxique; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXVII, esp. 10.

*Esp. III. Parorchide.*

*Syn.* *Parorchidium*; SAUVAGES, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LIX. — SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LXVI.

Cripsorchis ; VOGEL , cl. XI , difformités ;  
gen. DLI.

*Car.* Déviation de l'un des testicules ou de  
tous les deux.

*S-esp.* I. Parorchide ventrale ou inguinale :  
testicules dans le ventre , dans l'aîne , près de  
l'aîne , descente tardive des testicules ; SAUV. ,  
*loc. cit.* , esp. I.

*S-esp.* II. Parorchide rétractile : rétrac-  
tion des testicules ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

*S-esp.* III. Parorchide intropressive : in-  
trusion des testicules dans l'aîne , intropression  
des testicules ; SAUV. , *loc. cit.* , esp. 3.

Gen. XCII. *THLASME.*

*Eth.* du grec *thlasma* , enfoncement.

*Bibl.* CAMPARDON , observations sur plusieurs  
fractures du crâne , et particulièrement sur l'es-  
pèce d'enfonçure appelée par les Grecs *thlasis*  
ou *phlasis* ; *journ. de médéc. de BACHER* ,  
tom. I , pag. 155 , 242 , 352.

*Car.* Enfoncement d'un os sans aucune so-  
lution de continuité.

## Gen. XCIII. PROPTOME.

*Eth.* du grec *proctoma*, chute, alongement.

*Syn.* *Proptoma*; SAUVAGES, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. XLVI. — SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. XLIX. — Épidose, *epidosis*; SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LXXV.

*Car.* Extension contre nature ou prolongement d'une partie, ordinairement appendiculaire.

*Esp. I.* *Proptome (labiale)* avec prolongement de la lèvre inférieure.

*Proptome de la lèvre inférieure*; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

*Esp. II.* *Proptome (auriculaire)* avec alongement des oreilles.

*Proptomé des oreilles*; SAUV., *loc. cit.*, esp. 5.

*Esp. III.* *Proptome (mammaire)* avec alongement des mamelles..

*Proptome des mamelles*; SAUV., *loc. cit.*, esp. 3.

*Esp. IV. Proptome ( préputiale ) avec  
allongement du prépuce.*

*Proptome du prépuce ; SAUV., loc. cit.,  
esp. 4.*

*Esp. V. Proptome ( clitoritique ) avec  
prolongement du clitoris.*

*Cercose , cercosis ; VOGEL, cl. XI, gen,  
DXXXV.*

*Esp. VI. Proptome ( nymphique ) avec  
prolongement des nymphes.*

*Esp. VII. Proptome ( scrotique ) avec  
relâchement du scrotum.*

*Proptome du scrotum , racosis des Grecs ;  
SAUV., loc. cit., esp. 1.*

#### *Gen. XCIV. ATRÉTISME.*

*Eth. du grec a , privatif ; et trao ou treo ,  
percer.*

*Syn. Atreta ; VOGEL, cl. XI, difformités ;  
gen. DXLIX.*

*Atrétisme ; SAGAR, cl. I, vices ; ord. VII,  
difformités ; gen. LXIX.*

*Car. Clôture des ouvertures naturelles.*

**S-GEN. I. Imparfait.**

**Car.** Il n'y a qu'un retrécissement considérable.

**Formes.**

**Sor. 1.** Dyspnée aortique; SAUV., cl. V, ord. II, gen. VII, esp. 22.

2. Iléose iléique ( par resserrement calleux de l'iléon ); SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XIV, esp. 11.

3. Dyspermatisme urétral; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXXI, esp. 1.

4. Dyspermatisme noueux; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXXI, esp. 2.

5. Dyspermatisme préputial; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXXI, esp. 3.

**S-GEN. II. Parfait.**

**Car.** Il y a une véritable clôture.

**Esp. I. Palpebral.**

**Car.** Défaut de séparation des paupières.

**S-esp. I.** Anchyloblépharon; VOGEL, cl. X, ord. VII, gen. DIV. — PLENCK, *de morb. ocul.*, pag. 17.

**Car.** Défaut de séparation des paupières.

**Var. A.** Anchylobléphare congénial; PLENK, *loc. cit.*, esp. 1.

**B.** Anchylobléphare adventice; PLENK, *loc. cit.*, esp. 2.

**C.** Anchylobléphare agglutiné ( faux ); PLENK, *loc. cit.*, esp. 3.

**Formes.**

**Sor. I.** Caligue anchyloblépharonique; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. II, esp. 2.

**Esp. II. Pupillaire.**

**Syn.** Synizésis; VOGEL, cl. X, ord. VII, gen. DV. — PLENK, *de morb. ocul.*, pag. 121.

**Bibl.** WEISSENBORN, *de pupillâ nimis coarctatâ vel clausâ*; Erford, 1773;

**Car.** Acrétion de la pupille.

**Esp. III. Caronculaire.**

**Syn.** Dacryome; VOGEL, cl. X, ord. VII, gen. DVI.

**Car.** Coalition des points lacrymaux.

*Esp. IV. Labial.*

*Car.* Défaut de séparation des lèvres, clôture de la bouche.

*Esp. V. Proctique.*

*Car.* Défaut d'ouverture de l'anus.

*Formes.*

*Sor. 1.* Iléose atrétique; SAUV., cl. IX, ord. II, gen. XIV, esp. 14.

*Esp. VI. Vaginal.*

*Car.* Clôture du vagin.

*Formes.*

*Sor. 1.* Dysurie atrétique; SAUV., cl. IX, ord. III, gen. XXVII, esp. 16.

*2.* Ischurie atrétique; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XIX, esp. 19.

*Esp. VII. Utérin:* atrétisme tincal ou de l'orifice de l'utérus; SAGAR, *loc. cit.*, esp. 9.

*Esp. VIII. Vulval:* atrétisme des bords de la vulve; SAGAR, *loc. cit.*, esp. 7.

*Formes.*

*Sor. 1.* Ischurie hystérocystique; SAUV., cl. X, ord. III, gen. XIX, esp. 28.

( 235 )

2. Ischurie urétrohyménode ; SAUV., cl. X,  
ord. III, gen. XIX, esp. 36.

*Esp. IX. Urétral.*

*Car.* Clôture de l'urètre.

*Formes.*

*Sor.* 1. Ischurie aspadiale ; SAUV., cl. X,  
ord. III, gen. XIV, esp. 44.

2. Ischurie urétérostomatique ; SAUV., *ib.*,  
esp. 17.

*Gen. XCV. ADHÉRENCE.*

*Syn.* Concrétions ; VOGEL, cl. X, vices ;  
ord. VII.

Anchylomérisme ; SAGAR, cl. I, vices ; ord.  
VI, ectopies ; gen. LXXVI.

*Car.* Union des parties qui, dans l'état na-  
turel, doivent être séparées.

*Esp. I. Digitale.*

*Syn.* Dactylion ; VOGEL, cl. XI, gen. DX.

*Bibl.* MAUCHART, de *phthisi ac synizesi seu angustia præternaturali et concretione* ;  
*Tubing.* 1745 ; et coll. de REUSS, vol. II, pag. 3,

( 236 )

*Car.* Union de deux doigts ou de plusieurs doigts entre eux.

*Esp.* II. *Symblyphare.*

*Syn.* *Symblypharum*; PLENK, *de morb. ocul.*, pag. 19.

*Car.* Concrétion de la paupière avec le bulbe de l'œil.

*Formes.*

*Sor.* I. Caligie symblypharosique; SAUV., cl. VI, ord. I, gen. II, esp. I.

*Esp.* III. *Synéchie.*

*Syn.* *Synéchie*; PLENK, *de morb. ocul.*, pag. 123.

*Bibl.* MAUCHART, *de synechiâ, seu præternaturali adhæsione cornæ cum iride*; *Tubing.* 1748; et coll. de REUSS, tom. II, pag. 110.

*Car.* Concrétion de l'iris avec la cornée ou avec la capsule du cristallin.

*Formes.*

*Sor.* I. Ophthalmie synéchisienne; SAUV., cl. VII, ord. II, gen. XIV, esp. I6.

*Esp. IV. Ancyloglosse.*

*Syn.* Ancyloglosse ; VOGEL , cl. X , ord. VI , gen. DVII.

*Car.* Concrétion de la langue avec les parties voisines , mettant obstacle à la parole , à la succion , à la déglutition.

*Esp. V. Ankylose.*

*Syn.* Ankylosis ; VOGEL , cl. X , ord. VII , gen. DVIII.

*Car.* Rigidité des articulations avec immobilité absolue.

*Formes de l'adhérence.*

*Sor.* 1. Asphyxie valsalvienne (adhérence du cœur avec les parties voisines , par maladie) ; SAUV. , cl. VI , ord. IV , gen. XXIV , esp. 15.

2. Trisme bridé ( impossibilité de remuer la mâchoire inférieure , par l'agglutination de la partie intérieure des lèvres avec les gencives ) ; SAUV. , cl. IV , ord. 1 , gen. II , esp. 11.

3. Contracture ankylosique ; SAUV. , cl. IV , ord. 1 , gen. IV , esp. 9.

( 238 )

4. Asthme ankylosique ; R. A. VOGEL , de  
*asthmate singulari ex cartilaginum costarum*  
*ossescentiâ* ; Gotting. 1773.

5. Palpitation ossificative ; SAUV. , cl. IV ,  
ord. III , gen. XV , esp. 12.

**Gen. XCVI. LOXARTHRE.**

*Syn. Loxarthrus* ; SAUVAGES ; cl. I , vices ;  
ord. VI , ectopies ; gen. LXII. — SAGAR , cl.  
I , vices ; ord. VI , ectopies ; gen. LXIX.

*Car.* Vices de position des os , formant une  
articulation , sans luxation.

*Esp. I. Loxarthre perversif* : perversion  
de la tête des os et des muscles ; SAUV. ,  
*loc. cit.* , esp. I.

*Esp. II. Loxarthre anisotonique* : pieds  
bots , bras tournés , mâchoires de travers ;  
SAUV. , *loc. cit.* , esp. 2.

*Rap. A. Loxarthre intrarticulaire* ; SAUV. ,  
*loc. cit.* , esp. 4.

*Esp. III. Loxarthre gibbeux* : bosse  
scapulaire , poitrine aillée ; SAUV. , *loc. cit.* ,  
esp. 3.

*Esp. IV. Loxarthre cagneux.*

*Car.* Extrémités inférieures en dedans ou en dehors.

*Var. A.* Varus ( cuisses en dedans ); VOGEL, cl. XI, gen. DXLIII.

*B.* Valgus ( cuisses en dehors ); VOGEE, cl. XI, gen. DXLIV.

*Gen. XCVII. DÉFORMATION.*

*Syn.* Monstruosité; VOGEL, cl. XI, difformités; gen. DXXXIX.

*Car.* Vices de forme, étrangers à ceux dont il a été question dans les genres précédens.

*Esp. I. Polymérisme.*

*Syn.* Polymerisma; SAGAR, cl. I, vices; ord. VI, ectopies; gen. LXXIV.

*Car.* Nombre excédant des parties.

Hyperartetisque, *hyperartetiscus* ( membre superflu; VOGEL, cl. XI, difformités; gen. DLVII.

*Esp. II. Artétrisque.*

*Syn.* Artetriscus; VOGEL, cl. XI, difformités; gen. DLIV.

**Car.** Manque d'un membre.

**Rap. A.** Colobome ( manque d'une petite partie dans quelque lieu du corps ); VOGEL, cl. XI, gen. DXXXIV.

**B.** Rhæas ( défaut de la caroncule lacrymale, imitant l'épiphore ); VOGEL, cl. XI, gen. DXX.

**C.** Negrendis ( manque des dents ); VOGEL, cl. XI, gen. DLV.

**Formes.**

**Sor. I.** Dysphagie labarique ( à *labario* ); SAUV., cl. VII, ord. III, gen. XVII, esp. 17.

**Esp. III. Galianque.**

**Syn.** Galiancon ; VOGEL, cl. XI, difformités ; gen. DLVIII.

**Car.** Membre plus court que le correspondant.

**Rap. A.** Cholose, *cholosis* ( claudication occasionnée par l'inégalité de longueur des jambes ) ; VOGEL, cl. XI, gen. DXXXVI.

**Esp. IV. Ischnote.**

**Syn.** *Ischnotis* ; VOGEL, cl. XI, difformités ; gen. DXLI.

**Car.**

( 241 )

*Car.* Excessive gracilité du corps.*Esp.* V. *Phoxe.**Syn.* *Phoxos*; VOGEL, cl. XI, difformités;  
gen. DXI,*Car.* Tête en pointe.*Esp.* VI. *Lagostome.**Syn.* *Lagostoma*; SAGAR, cl. I, vices; ord.  
VI, ectopies; gen. LXXII.*Lagocheilos*; VOGEL, cl. XI, difformités;  
gen. DXXII.*Bec* de lièvre.*Car.* Lèvre de la bouche fendue.*Formes.*1. Psellisme lagostomatique; SAUV.,  
cl. VI, ord. III, gen. XVI, esp. 10.2. Ophtalmie lagophthalmique; SAUV., cl.  
VII, ord. II, gen. XIV, esp. 17.*Esp.* VII. *Saniode.**Syn.* *Saniodes*; VOGEL, cl. XI, difformités;  
gen. DL.*Car.* Étroitesse du thorax.*Tom.* IV.

10

*Esp. VIII. Appelle.*

*Syn. Appella* ; VOGEL , cl. XI , difformités ; gen. DLIII. — SAGAR , cl. I , vices ; ord. VI , ectopies ; gen. LXXIII.

*Car.* Petitesse , briéveté du prépuce ou de toute autre appendice molle.

*Esp. IX. Hypospadiée.*

*Syn. Hypospadiæos* ; VOGEL , cl. XI difformités ; gen. DXLVII.

*Car.* Perforation du gland sous le frein de sa partie inférieure et non dans sa partie antérieure.

*Esp. X. Hermaphrodisme.*

*Syn. Hermaphroditus* ; VOGEL , cl. XI , difformités ; gen. DLII.

*Car.* Conformation monstrueuse des parties de la génération , au point d'imiter les deux sexes.

*Esp. XI. Leïopode.*

*Syn. Leïopodes , plancus , plautus* ; VOGEL ; cl. XI , difformités ; gen. DXLV.

*Car.* Plante du pied , non cave , mais plane.

---

## CONCLUSION GÉNÉRALE.

---

**J'**AI consacré cet ouvrage à la classification générale des maladies, soit internes, soit externes, en prenant pour base les causes et les symptômes qui peuvent les occasionner ou les caractériser. On trouvera, dans la doctrine qu'il offre, une théorie nouvelle ou une manière neuve d'expliquer et d'interpréter les faits; une nomenclature parsemée de néologismes nécessaires, enfin des points de vue qui pourront souffrir de grandes modifications, sans rien perdre de l'intérêt majeur qu'on peut leur trouver en ce moment, puisqu'ils auront été la source des vérités dont la médecine a à s'entourer pour marquer ses progrès et servir à son lustre.

Cette doctrine rapporte à l'action en excès ou en défaut de cinq substances primitives ou agissant comme telles, et qui sont le *calorique*, l'*oxigène*, l'*hydrogène*, l'*azote* et le *phosphore* ou les *substances phosphatées*, toutes

les maladies spontanées qui frappent la machine humaine.

Le calorique est la cause essentielle de la chaleur des animaux. Quand cette substance prédomine, il y a chaleur, agitation, raréfaction, dessèchement ou siccité, enfin combustion réelle ou physique. Lorsque ce principe est en défaut, il y a refroidissement, condensation, épaissement, ralentissement, infiltration ou aquosité.

C'est qu'en effet le calorique est un stimulant direct, qu'il provoque l'action des parties, préside à la formation des fluides et des gaz, est l'ame physique de tout ce qui a vie. En appréciant l'action physique du calorique sur la fibre, on a été tenté de le regarder comme la cause du mouvement musculaire (a).

Les maladies qui proviennent d'une action quelconque du principe matériel de la chaleur, ont pu donc être nommées collectivement *calorinèses*; et les sous-divisions naturelles de cette *classe*, suivant que le calorique excède

---

(a) Des causes de l'irritabilité et de l'excitabilité, *journ. de physiq.*, etc., tom. LVI, pag. 281.

ou n'est pas suffisant pour l'exercice des fonctions, *surcalorinèses* ou *descalorinèses*.

Il est bon d'observer néanmoins, qu'ici, comme dans tous les objets analogues, les termes *en excès* ou *en défaut* sont des expressions relatives, ne servant qu'à indiquer la quantité de calorique propre à déterminer des lésions apparentes, ou à influencer, d'une manière prédominante, sur la production des maladies.

L'oxigène est la cause essentielle de la force de cohésion et d'adhérence; sous ce rapport, on doit le considérer comme le principe de la vigueur corporelle et la cause de l'énergie avec laquelle s'exécutent les actions du corps. Il détermine la concrescibilité, la saveur, la couleur. Sous ce point de vue, il a besoin du concours du calorique et de la lumière; ou bien, les combinaisons de l'oxigène sont d'autant plus régulières, que ces deux dernières substances favorisent ses tendances et son action spéciale.

L'oxigène est conséquemment un excitant direct; il amène un excès matériel des forces qui, en se concentrant sur un système particulier d'organes, lui donnent, non une in-

fluence directe sur d'autres, mais une énergie d'action aussi remarquable qu'elle est morbifique.

Les maladies qui proviennent d'une manière quelconque mais prédominante d'agir de l'oxygène, méritent le titre d'*oxigénèses*, qui se sous-divisent ensuite en *suroxigénèses* et en *désoxigénèses*, selon que le principe particulier, auquel on attribue leur formation, manque ou surabonde dans l'économie des animaux.

L'hydrogène, très-souvent uni au carbone, et fort avide de calorique, est aussi essentiel à ces êtres vivans que le calorique et l'oxygène. Quand le calorique, fixant la température des parties solides ou liquides, détermine les produits chimiques qui ont lieu; lorsque l'oxygène, en se précipitant et s'incorporant dans les tissus organiques, modifie la structure des matières animales: l'hydrogène apporte les élémens de la bile, de la graisse et des humeurs analogues,

Quand ce principe prédomine, il y a formation surabondante et souvent dégénération de ces substances. Saturé de calorique, l'hydrogène occasionne une chaleur incandescente,

avec tendance à une fonte qui , plus ou moins rapide , peut aller jusques à la colliquation. Saturé de carbone , l'hydrogène cause un certain ralentissement des mouvemens organiques , détermine de la détente , et s'associe avec un degré plus ou moins fort de relâchement , avec l'adynamie.

C'est qu'effectivement l'hydrogène , n'ayant des facultés très-irritantes ou fort sédatives que par son association avec des substances étrangères , mais avec lesquelles il forme facilement des combinaisons , produit des effets variés dans les corps vivans. Aussi lorsque , dans quelques cas , il est la cause de cette chaleur sèche qui caractérise si bien les maladies auxquelles on a donné l'épithète d'*ardentes* ; dans quelques autres , il produit cette sorte d'engourdissement qu'on rencontre avec une action déterminée de l'hydro-carbonate.

Les maladies qui sont dues à la prédominance de l'hydrogène , sont des *hydrogénèses*. On ne peut pas les sous-diviser en *surhydrogénèses* et en *déshydrogénèses* , parce que toutes les affections morbifiques où il y a déshydrogénation , rentrent dans la classe des *oxigénèses*. Mais les *hydrogénèses* pourroient se par-

tager en *calorinées* et en *oxigénées*, selon que les causes secondaires des phénomènes principaux sont imputables à une action secondaire du calorique ou de l'oxigène.

L'azote, qui joue un si grand rôle dans les phénomènes de l'animalisation, agit bien différemment, selon qu'il est uni à l'hydrogène, à l'oxigène et au calorique. Principe négatif à l'égard de la respiration, principe positif dans l'assimilation animale, puisque, dans ses effets, cette assimilation n'est que la combinaison plus intime de l'azote; il doit ses principales qualités aux substances avec lesquelles il se combine plus ou moins chimiquement.

Quand l'azote prédomine, l'assimilation est promptement à son terme; la putréfaction est imminente; il y a relâchement, dissolution et production très-prochaine ou réelle des résultats immédiats de la décomposition putride.

Comme la cause efficiente de la putridité animale, l'azote est donc affoiblissant, puisque toutes les maladies essentiellement septiques sont aussi adynamiques. Si les composés azotiques exercent des propriétés excitantes, c'est une

action donnée aux parties pour en précipiter la destruction. S'il y a inflammation, la putridité et la dissolution sphacélique ne sont pas loin.

Ainsi l'azote, comme l'hydrogène, n'ont que des facultés excitantes, étrangères à leur nature, et qui rentrent dans la classe des stimulans accidentels ou indirects. Les maladies qui en proviennent sont des *azoténèses* sans sous-divisions particulières, puisque, par-tout où les influences de l'azote sont exclusives, les maladies sont putrides et analogues entr'elles. Mais cette *classe* doit être d'autant moins nombreuse, que les *genres* qui la constituent, appartiennent, sous un rapport également naturel, aux ordres des *descalorinèses*, des *désoxygénèses*, et à la *classe* des *hydrogénèses*. Aussi MM. NICOLAS et GUEUDEVILLE (a), en montrant que, dans le diabète, il y avoit un défaut d'azote, n'ont fait que confirmer l'éthiologie de ROLLO sur la suroxygénation du système dans cette maladie.

Le phosphore, par sa grande affinité avec

---

(a) Recherches et expériences sur le diabète sucré ;  
Paris an XI.

le calorique et la lumière, sur-tout par sa nature très-pénétrante seroit toujours un excitant très fort, s'il ne se rencontroit, même lorsqu'il est prédominant, combiné sur-tout avec le principe calcaire et alcalin, et associé avec l'oxygène qui le réduit en acide. Ainsi quand le phosphore surabonde dans l'économie des animaux, il y a irritation moyenne, congestion par précipitation d'une substance salino-terreuse, corrosion par infiltration d'une matière qui n'est pas exempte de quelque causticité, fonte ou destruction du phosphate de chaux: conséquemment alors diminution de cohérence et perte de cohésion des parties les plus dures.

C'est qu'en effet le phosphore, réduit en acide phosphorique, amène des résultats très-variés, suivant qu'une portion de phosphore, d'acide et de sel terreux viennent à prédominer. On ne se doute peut-être pas de la quantité des maladies sur la formation desquelles entre l'acide phosphorique; et M. CHENEVIX, dans un mémoire (a) sur les humeurs de l'œil, etc., après avoir indiqué que si l'on pou-

---

( a ) *On the humours of the eyse, etc.*; et *biblioth. britann.*, tom. XXII, *scienc. et arts*, pag. 345.

voit raisonner , avec justesse , de la matière vivante à la matière morte , on obtiendrait peut-être des résultats curieux tendant à rapprocher la formation de la cataracte , d'une coagulation de l'albumine dans les humeurs de l'œil , et paru desirer qu'on dirigeât les observations médicales vers les rapports qui peuvent exister entre cette maladie et une disposition gouteuse chez l'individu qui en est atteint : annonce que cette disposition pourroit occasionner dans la sécrétion des humeurs de l'œil , une surabondance d'acide phosphorique.

Les maladies que déterminent les différentes combinaisons du phosphore en excès , sont des *phosphorenèses*. Elles pourroient se sous-diviser en *surphosphorenèses* et en *desphosphorenèses* , selon que la substance phosphatée manque ou prédomine dans les corps vivans.

D'après ces cinq considérations générales , appliquées à la science méthodique des maladies ou à la nosologie , et sur lesquelles roule toute la doctrine de cet ouvrage ,

- Le calorique est stimulant ;
- L'oxigène est tonique ;
- L'hydrogène est tempérant ;

L'azote est affoiblissant et septique ;

Le phosphore est coagulant ou rongant.

Ce n'est pas que , dans l'étude physiologique et pathologique des animaux , on ne doive voir que ces cinq principes. Parmi les matériaux ou les substances élémentaires de leurs corps , on trouve effectivement :

Le calorique : corps simple , divisé , rare , léger , extrêmement élastique , raréfiant et producteur de la température des animaux ;

La lumière : substance simple , éclairant les objets , refrangible , *refraxible* , capable de combinaison et *colorigène* ;

L'électrique , le galvanique : modifications apparentes du calorique et de la lumière ;

L'oxigène : corps comburant , indécomposé , doué d'une très-grande avidité pour s'unir aux autres corps , créateur des oxides et des acides , aussi indispensable pour la combustion que pour la respiration ;

L'hydrogène , substance simple , combustible , génératrice de l'eau ;

Le carbone : corps combustible , simple ,

abondant dans les végétaux, ainsi que dans les matières adipeuses ;

L'azote : substance simple, combustible, l'élément le plus abondant des matières animales ;

Le phosphore : corps combustible, simple, dont l'existence est constatée par la luminosité des corps, par la quantité des composés phosphoriques ou phosphatés ;

Le soufre ; la soude ; la potasse qui existe aussi dans le corps des animaux.

Mais ces principes sont-ils les seuls qui doivent être admis et qu'il faille considérer comme formant, par leur réunion, des *combinés*, des composés, des tissus organiques, des organes ayant des facultés ou des propriétés, exerçant des fonctions ou des actes propres et spéciaux.

La matière est élémentaire ou composée, combinée ; celle-ci est secondaire ; l'autre est primitive. La matière élémentaire a dû exister avant celle qui est combinée ou composée : c'est l'arrangement de celle-là qui forme celle-ci. La matière seule et son arrangement tombent

sous les sens et contribuent à l'organisation, c'est-à-dire, à la manière dont les diverses parties d'un corps sont arrangées entr'elles pour un but déterminé. C'est l'organisation qui souffre dans la combinaison de la matière élémentaire, en prenant cette idée dans le sens relatif. L'organisation porte donc avec elle l'idée de la matière et celle de la forme.

La forme est soumise à des lois en général invariables, mais variables en particulier. La cristallisation, ou cet art de faire prendre aux corps, après les avoir fondus ou dissous, la forme régulière, polyédrique et cristalline qui les caractérise, en leur enlevant lentement la matière qui les tenoit d'abord en état liquide, nous en offre un des plus beaux modèles.

La réunion de plusieurs élémens, subordonnée à la forme, produit les combinés d'après une force particulière, connue sous le nom d'*affinité* : puissance qui, s'exerçant entre des substances d'une nature diverse, tend à les rapprocher, à les unir plus ou moins étroitement, jusques à ce qu'une force supérieure ou une affinité plus active désunisse des élémens qui alors subissent de nouvelles modifi-

cations, et contribuent à la production des nouveaux composés.

Ces combinaisons, dans les animaux, donnent lieu à des parties appelées *organes*. Il n'y a point de combinaisons régulières sans organes; il n'existe point d'organes sans facultés; il n'est point de facultés sans fonctions :

La faculté n'étant que le pouvoir qu'une partie organisée a de produire tel ou tel acte, la sensibilité, la myotilité, la mobilité sont des facultés.

La fonction n'étant que la faculté réduite en acte, la sensation et ses produits, le mouvement musculaire, la respiration, etc. sont des fonctions.

Ainsi la différence qui existe entre celles-ci et les autres, est que les facultés sont des fonctions latentes, et les fonctions, des facultés en exercice. Les fonctions tiennent essentiellement aux facultés et consistent dans un de ses actes; elles en constituent l'exercice permanent ou intercalaire; tandis que les facultés tiennent à l'organisation et consistent dans son intégrité, dans son véritable mode.

La vie est une fonction : elle a donc une faculté. De deux œufs mis sous la poule, l'un éclosra et donnera naissance à un poulet, et l'autre se changera en une bouillie putride : le premier aura la faculté vitale, tandis que le second en sera privé. De deux graines ou semences, qui placées en terre, l'une lèvera et produira une plante, quand l'autre se pourrira et s'anéantira ; la première aura la faculté vitale, et la seconde en sera dépourvue. De deux animaux dont l'un, profondément asphyxié, revient au mode commun d'existence, tandis que l'autre n'est aucunement susceptible de ce retour ; le premier, mort en apparence, a la faculté vitale, tandis que le second ne l'a point.

N'existe-t-il donc point un élément de *son propre genre*, qui constitue la vie ou du moins son essence, et qui, par son addition aux autres élémens corporels ou par sa soustraction, constitue le système ou la nature organique vivante, et le système ou la nature inorganique morte ? Cet élément est la matière vitale, *le vitalique*, s'il faut lui donner un nom analogue aux meilleurs principes de nomenclature raisonnée. Sa nature est aussi inconnue

connue que celle des autres élémens ; mais le vitalique est soumis aux mêmes lois. Il a, avec la matière organisée, une propriété d'union extrêmement forte, et c'est ce qui constitue *la ténacité d'affinité*. Cette substance peut seule procurer, dans les animaux, dans les végétaux, les combinaisons qui les distinguent et qui leur sont propres. Son point de saturation constitue le *maximum* de la faculté et de la force vitales ; son accumulation, l'excès de force ; sa diminution progressive, les divers degrés de faiblesse ; sa dissipation, la mort absolue. Mais les dernières portions du vitalique s'épuisent très-difficilement ; aussi les parties animales, même après la mort, conservent, pendant plus ou moins de temps, l'exercice de certaines facultés ; elles la perdent, quand l'animal a péri par l'action d'une cause ou d'un agent qui, par une affinité supérieure avec le vitalique, dégage cette substance des parties organisées.

Je ne mets aucun doute, quoique je ne sois pas encore en état de le prouver, qu'il n'existe un principe de vie, non celui qu'entendent les vitalistes, abstraction chimérique à laquelle on a voulu donner un nom en la personnifiant

et en lui attachant des attributs indéterminés ; mais un principe matériel qui s'unit aux élémens des corps organisés , qui en fait partie , et dont la présence est nécessaire pour que ces corps , à une température donnée , puissent exercer leurs divers actes.

Avec ce principe on explique pourquoi on est vital sans être toujours en vie. L'œuf est vital , le poulet est en vie. Celle-ci est donc la mise en action de l'organisation douée d'une quantité déterminée de vitalique. La force vitale est son attribut immédiat ; et cette force , dont les effets sont si inégaux puisqu'elle est influée par diverses circonstances qui la développent ou qui la concentrent , se modifie principalement suivant les différences d'organisation.

C'est en raison de ce , que , dans les animaux , il y a des fluides et des solides : les uns et les autres se trouvant dans une condition particulière , eu égard au principe essentiel qui adhère à leurs élémens constitutifs , ou qui en fait une partie fondamentale.

Les fluides méritent la première attention. Quoique formés en très-grande partie par l'eau , ils se concrètent , ils s'organisent de

plus en plus, et produisent des tissus primitifs, qui sont :

La gélatine : humeur composée, sans odeur, d'une saveur douce et fade, dissoluble par l'eau bouillante, et susceptible de se transformer en gelée par le refroidissement. C'est un oxide de carbone légèrement hydrogéné et azoté.

L'albumine : composé concrescible par la chaleur, par les acides, par les oxides, dissoluble par les alcalis. C'est un oxide d'hydrogène et d'azote fortement oxigéné.

La fibrine : substance compacte, extensible, indissoluble dans l'eau à toutes les températures, dissoluble dans les acides. C'est un oxide d'hydrogène et de carbone fortement azoté.

Enfin, la *phosphatine* : matière qui paroît sous les apparences d'une terre, friable ou pulvérulente ; dissoluble par les acides. C'est un oxide salin, un corps phosphoréo-terreux.

Ces tissus primitifs, réunis, composés et combinés, donnent lieu à des tissus secondaires, qu'on peut distinguer,

En gélatino-membraneux : tissus dont la surface est plus ou moins étendue, la densité lé-

gère , la texture moyenne , et qui sont alimentés par des sucs gélatino-albumineux ou gélatino-fibreux ;

En fibrino-musculaires : tissus contractiles , à texture cylindrique , réunis en faisceaux , et qui sont formés et entretenus par des sucs fibro-gélatineux ou fibro-albumineux ;

En phosphoréo-calcaires : tissus à texture ferme , granuleuse , et qui sont produits et renouvelés par des sucs terréo-gélatineux ;

Enfin , en tissus mixtes : combinaison très-composée , diversement arrangée , à structure consistante plus ou moins molle , plus ou moins dure , et que déterminent des sucs gélatineux , albumineux , fibreux , phosphateux. C'est ce qu'on nomme plus particulièrement *parenchymes* , *viscères* , *organes*.

Chaque tissu organisé possède , à titre de matière organisée , c'est-à-dire , soumise à des changemens apparens de structure et de formes , des facultés qui les distinguent autant que la différence d'organisation. La vitalité , que d'autres appellent la *force vitale* , en attachant à ce mot des idées qui s'écartent de celles qu'on lui donne dans cet ouvrage , est

un attribut générique. La vitalité, considérée sous le rapport du savant CHAUSSIER, est bien le principe d'action propre aux êtres organisés; une force intérieure sans cesse agissante, qui ajoute à toutes les propriétés physiques de la forme, du tissu, contrebalance l'attraction, les affinités chimiques propres aux corps inertes, à la matière, surmonte la tendance à la putréfaction, donne aux solides la propriété contractile, détermine la progression des fluides, imprime et entretient une vibratilité continue, un balancement alternatif de tension et de relâchement qui s'étend dans toutes les parties de l'être organisé. Mais la vitalité est une faculté de même ordre que les facultés qui appartiennent aux corps iners. Elle n'a de distinct que ce qu'elle doit à la nature propre du vitalique qui, étant une matière élémentaire, est aussi indispensable pour la formation d'un tissu vivant, que la présence de l'oxygène l'est pour la production d'un oxide. Que le vitalique exige, pour le développement des facultés attachées à un être organisé, l'intervention d'un agent qui diffère selon la nature de l'être; c'est ce que l'observation nous a appris. La chaleur de la poule fait éclore l'œuf. L'humidité et la chaleur font germer la

graine. L'ensemence du mâle développe les principes de l'embryon. Ainsi le vitalique entre comme principe matériel constituant ; un agent intermédiaire détermine la vie ; la vitalité est le grand et le premier attribut de cette double forme d'existence, l'une latente et l'autre en exercice ou développée. Le vitalique est soumis aux lois des affinités chimiques, et les actes ainsi que les propriétés des êtres organisés, en émanent d'une manière particulière.

La motilité, la sensibilité et la caloricité sont les trois facultés que le professeur CHAUSSIER dérive de la force vitale, l'*enormon* d'HIPPOCRATE, l'*impetum faciens* de KAAU-BOERHAAVE, le *physis* des Grecs, la *vis insita*, force innée, nature de quelques-uns. La motilité et la sensibilité sont les seules facultés que je regarde comme inhérentes aux tissus organisés.

La motilité, parfaitement définie par M. CHAUSSIER est la faculté du mouvement ; une propriété des solides organiques, qui consiste dans une tendance continuelle à la contraction, au resserrement, au raccourcissement, produit, entretient dans toutes les fibres, dans tous les vaisseaux, dans tous les tissus un mouvement qui détermine la progression des fluides. Cette

faculté diffère dans les tissus gélatino-membraneux et dans les tissus fibrino-musculaires. Dans les premiers, la motilité se réduit à une contraction lente, graduelle, dont l'état naturel est nommé *ton*; l'excès, *éréthisme*, *crispation*; la privation, *atonie*. Cette faculté constitue la tonicité de CHAUSSIER, le *tonos* des Grecs, la tension vitale, la contractilité fibrillaire, la force tonique.

Dans les tissus fibrino-musculaires, la motilité jouit de tous ses droits; elle conduit à une contraction prompte et rapide, dont la privation est la *paralysie*; l'excès, le *spasme*; l'alternative, la *convulsion*. En cet état, elle forme la myotilité de CHAUSSIER, l'irritabilité de HALLER, la contractilité musculaire.

La sensibilité, d'après le savant professeur dont je suis ici les idées, et dont j'adopte les définitions, est la faculté de sentir, c'est-à-dire, d'éprouver, par le contact d'un corps étranger, une impression plus ou moins profonde qui change le rythme naturel et habituel de vibratilité, de motilité propre aux parties, y imprime un ordre de mouvement plus ou moins remarquable, qui tend à les isoler, à les éloigner ou à les rapprocher de l'objet qui les touche; la sensibilité

( 264 )

qui, conforme à l'organisation, au rythme naturel de vibratilité, est *plaisir*; qui, contraire au mode d'organisation, est *douleur*, et dont la privation fait l'*insensibilité*; cette faculté, dis-je, qui, appliquée à certains organes affectibles par des agens déterminés, constitue les *sens*, et qui, dans le centre des sensations, produit l'*aperceptibilité* ou la propriété d'apercevoir, de juger, de comparer les impressions exercées sur les différens organes; la sensibilité enfin appartient aux nerfs ou à la matière nerveuse, comme la myotilité appartient aux muscles ou à la matière fibreuse. Les faits qui infirment ces vérités, ne sont ni assez saillans, ni assez nombreux pour qu'elles ne restent pas dans toute leur force.

Je retranche la caloricité des facultés des êtres organisés, parce qu'elle ne dépend point immédiatement de l'organisation, qu'elle n'émane pas directement des tissus organiques, et parce qu'elle résulte des combinaisons et des décompositions qui ont lieu à tous les instans de la vie dans les êtres qui en sont doués. On dira, par exemple, que le travail d'esprit, que l'exercice prolongé de la pensée développe beaucoup de chaleur. Mais ne se fait-il pas, dans

ces actes, une véritable consommation d'oxygène, peut-être même de galvanique, ainsi que le pensent quelques-uns, une sorte de combustion, pendant laquelle l'oxygène se fixe et le calorifique se dégage.

Dans la considération des animaux, il faut donc abstraire ce qui concerne les élémens qui entrent dans les tissus de leurs corps, et les facultés qui dérivent de la structure qui est propre à leurs tissus. Le développement de ces facultés et le concours régulier des élémens dans la formation d'un tissu, ont chacun un mode auquel se rapportent des phénomènes tantôt subordonnés les uns aux autres, tantôt prédominans; et dans la doctrine chimico-animale, cette étude des phénomènes et leur séparation sont du plus grand poids.

Si les préceptes que je viens d'exposer sont médités, il doit en découler des théorèmes importants qui agrandissent nos connoissances, les épurent et les perfectionnent. Le vitalique, la vitalité, la vie sont, l'un un élément matériel, l'autre une faculté, la dernière une fonction ou un acte; mais celle-ci, comme la faculté, n'existant que par le premier agent et par l'organisation sur laquelle il influe ma-

tériellement. Est-ce donc à tort que les anciens philosophes n'avoient point séparé la vie de la matière ; que CRYSHIPPE, ATHENÉE et les sages qui embrassèrent la doctrine pneumatique, connurent la matérialité de la vie, et la désignèrent sous le nom d'*esprit* ; et qu'en considérant cet *esprit* comme un cinquième élément, ils ne pouvoient mieux caractériser la vie par ses propriétés essentielles ?

Il ne peut point exister d'être organisé, de corps vivant, sans qu'au moment de sa formation, une portion déterminée de vitalique, l'un des élémens les plus féconds de la nature, ne s'unisse aux autres molécules primitives qui s'assemblent pour le produire. Dès ce moment, l'organisation est complète quant aux bases sur lesquelles elle repose ; elle n'est susceptible que de développement ou de perfectionnement. La mort seule peut rompre le lien qui tient combinées ces parties élémentaires ; et si les circonstances ne permettent point que les germes ainsi animés passent au mode connu d'existence, qu'on appelle *la vie*, au moins est-il certain que ces germes ne sont féconds que parce qu'il ne manque rien à leur organisation. Le caractère d'animal, de végétal tient

rigoureusement à cette perfection de la matière organisée.

Si l'organisation, qui se fait sous l'influence et par le secours du vitalique, distingue tous les tissus et leur attache des facultés; il s'ensuit qu'à telle organisation, et même à tel degré d'organisation, est attachée telle faculté et que la quantité de vitalique qui adhère aux tissus organisés varie d'après la nature et l'intensité de la faculté qui en provient. Voilà sans doute pourquoi il passe pour constant, que la vie a un centre, et que ce qui la constitue s'attache, d'une manière spéciale au cerveau et au système général des nerfs.

Le vitalique est-il susceptible d'épuration? et, comme en observant la marche de la nature, dans le passage d'un règne à l'autre et dans la succession des êtres qui les composent, il semble qu'elle tend continuellement à un fini plus parfait; peut-on dire que ce principe plus pur devient la mesure de l'intelligence, en rendant l'organisation plus régulière et plus délicate: c'est ce qu'il est impossible de déterminer. Nous savons que l'éducation modifie considérablement l'aperceptibilité, et que le système qui l'a pour objet, embrasse tout ce qui

exerce quelque empire sur les forces mécaniques et intellectuelles des animaux. Mais il est plus que probable que le vitalique subit des désagréations, et entre continuellement dans de nouveaux composés, n'y ayant ainsi aucune différence entre lui et les autres élémens qui forment les tissus des êtres organisés. Ce vitalique adhère moins aux fluides qu'aux solides ; le mouvement paroît être une condition nécessaire dans les lois qu'il suit pour entrer et pour sortir des tissus dont il fait partie ; aussi voyons-nous que les liquides sortis de leurs vaisseaux perdent leur vitalité ; comme il est constant, malgré les réclamations des solidistes, que c'est dans les liquides, dans lesquels la vitalité s'altère ou s'affoiblit plus aisément, que se trouvent les causes les plus générales et les plus fréquentes des maladies. Expliqueroit-on, par quelques-unes des raisons qui viennent d'être données, lorsqu'on a dit si généralement que la vie est dans le sang, pourquoi le sang meurt sitôt, dès qu'il est hors des voies de la circulation ?

Tant que le vitalique est inhérent aux tissus organisés, il n'est point de mort pour eux, quoiqu'ils puissent perdre leurs facultés et leurs

fonctions. D'après cela , un membre paralytique ne se corrompt pas ; un asphyxié n'éprouve pas ce commencement de décomposition qui caractérise la mort et la putréfaction , qui la signale. Mais la mort n'étant que la séparation absolue du vitalique des tissus organisés , elle a lieu lorsqu'une force supérieure , qui a agi lentement ou avec promptitude , a rompu l'affinité qui unissoit ce principe matériel avec les diverses substances élémentaires qui formoient un tout vivant dans l'animal doué de ses facultés et de ses fonctions.

Laissons dans les livres des anciens , sur les pages de la Genèse , dans les ouvrages mêmes des auteurs sacrés , les preuves de ces divers énoncés. En m'étayant des passages qui pourroient ici être accumulés , je ne ferois que repousser tout soupçon de matérialisme , d'autant plus gratuit pour ce qui concerne la doctrine répandue dans cet ouvrage , que rien n'empêche que l'auteur de toutes choses, DIEU , ait ainsi disposé la nature des animaux , et que tout ce qui les concerne , asservi à sa volonté première , ne soit qu'une telle conséquence des lois qu'il a données à l'univers. Mais en consacrant , dans la conclusion générale

de ces *fondemens de la science méthodique des maladies*, quelque développement aux principes qui y sont contenus, sur-tout en ce qui concerne la puissance vitale, j'ai essayé de prouver que l'existence entière des animaux est soumise à des lois chimiques, si par chimie il faut entendre la science des décompositions et des combinaisons, par une suite des affinités qui écartent ou qui réunissent les parties élémentaires des composés. La chimie doit donc être la science de la nature, puisque, dans son sein, tout est composition, décomposition et recomposition; et puisque la médecine s'occupe du plus intéressant et du plus composé des êtres, introduire dans leur étude, pour les mieux connoître, pour en approfondir le mécanisme, pour surprendre le mobile de leurs opérations, une science qui analyse tout avec sévérité, et qui ne discute que les faits: c'est se mettre au niveau des connaissances et profiter des lumières que les découvertes du siècle font servir à la gloire de l'esprit humain.

F I N.

( 272 )

---

# TABLE ANALYTIQUE

## DES MATIÈRES

### - DU TOME QUATRIÈME.

---

**A**VERTISSEMENT, *pag. v.*

Raisons qui ont prolongé le retard apporté à la publication de cet ouvrage, *ib.*

Motifs d'un travail entrepris sur la classification des maladies, *vj.*

Utilité d'une bonne classification, *vj-vij.*

Avantages de la méthode adoptée, *vij.*

— De celle qui se fonde sur les connoissances chimiques, *ix.*

L'auteur est le premier à les réunir et à les appliquer généralement à la pathologie, *ib.*

Leur importance justifiée par l'incertitude de plusieurs pratiques médicales, *xj.*

Et prouvée par les vices de ce qu'on appelle *expérience*, *xij-xiv.*

Les progrès de cette partie de la médecine exigent une nomenclature relative, *xiv.*

Raisons qui ont engagé l'auteur à être avare de néologismes, *xv-xvj.*

Noms nouveaux adoptés par le docteur SWEDIAUR, *xvij.*

Bases des dénominations adoptées dans cet ouvrage, *xix.*

Il n'est que le prélude d'une nosologie clinique, *xx.*

Exposé méthodique des *classes*, des *genres*, des *espèces* et des *formes* des maladies, *pag. 1.*

Classe quatrième, *ib.*

Elle est destinée aux maladies putrides, *ib.*

*Azoténèses*, 2.

Ethymologie de cette dénomination, *ib.*

Ce qu'est l'azote et ses synonymies, *ib.*

Un des ingrédients de l'air atmosphérique; 3.

Il se fixe dans les animaux, 4.

Et se dégage dans la putréfaction, *ib.*

Substance élémentaire, l'azote n'est jamais qu'un radical, 4.

Ses diverses combinaisons, 5.

Ses qualités physiques, ses propriétés, *ib.*

Résultats des effets du gaz azote, 6.

La flamme n'assainit pas l'air des lieux ravagés par des épidémies, *ib.*

Futilité des théories, prouvée par la chimie, 7.

Formation de l'oxide d'azote, 8-9.

Autres composés dans lesquels l'azote se trouve, 9.

Effets de cette substance sur l'économie animale, 10.

L'oxide gazeux d'azote influe sur elle et comment, *ib.*

Doctrine du professeur REICH sur les fièvres, 11.

Ses idées ne sont que des idées de relation, 13.

Opinions de MM. MITCHILL et SALTONSTALL sur les effets de l'oxide gazeux d'azote, 15.

Il est considéré comme le producteur de plusieurs maladies putrides, *ib.*

Sentiment

Sentiment du docteur ODIER, sur le gaz marécageux et sur le gaz putride, 16-17.

— De M. GUYTON-MORVEAU, sur la nature des miasmes contagieux, 18.

Effets différens de l'azote, proportionnés à la nature de ses combinaisons, 19.

Les maladies putrides en résultent, 20.

Et tout annonce que le sang, circulant dans ses vaisseaux, peut être frappé de putridité, 21.

De quelle nature sont le scorbut, les fièvres putrides ? 22.

Progrès de la putréfaction dans les corps vivans, *ib.*

Ses effets, 23.

Ceux des gaz putrides, *ib.*

Coexistence de plusieurs agens de la putridité, 25.

Résultat général des fièvres, 26.

Traces de la putridité dans les urines, *ib.*

Elle est indiquée par la production respective de l'acide carbonique, 27.

Comment les diverses proportions d'azote marchent en sens inverse de celles de l'oxygène, 28.

Aussi plusieurs maladies ont pu être placées indistinctement parmi les *azoténèses* et les *désoxygénèses*, 28-29.

Classe des *azoténèses* et ses genres, 29.

Le scorbut, la septose, la gangrène, la puose, l'éléphose et le cancer, 29.

Genre LXXIX. Scorbut, 29. — Ethymologie, *ib.*

— Synonymie, 30. — Bibliographie, *ib.* — Caractère,

34. — Variété A. Dues aux périodes du scorbut. —

A. Commenant, *ib.* — B. Déclaré, *ib.* — C. Accru,

*ib.* — D. Consummé, 35. — B. Dues à la couleur

Des taches , 35. — A. Scorbut livide , *ib.* — B. Pétéchial , *ib.* — C. Pâle , *ib.* — D. Rouge , *ib.* — C. Dues à la marche de la maladie , 35. — A. Scorbut lent , *ib.* — B. Aigu , *ib.*

Espèce I. Epidémique , 35. — Caractère , *ib.* — Rapports , 36.

Espèce II. Sporadique , 36. — Rapports , *ib.*

Différence qui existe entre le scorbut de terre et celui de mer , 36-37.

Formes , 37. — Sortes , 37-42.

Genre LXXX. Septose , 42. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , 43. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , 44.

Sous-genre I. Pyrétique , 45. — Caractère , *ib.* — Rapport , *ib.*

Espèce I. Vive , 45. — Caractère , *ib.* — Rapport , *ib.*

Espèce II. Latente , 46. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , 47. — Rapports , *ib.*

Sous-espèce I. Fièvre nerveuse , adynamique , sporadique , 48. — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Sous-espèce II. Fièvre nerveuse adynamique , sporadique , 49. — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Sous-genre II. Apyrétique , 49. — Caractère , *ib.*

Espèce I. Dysodie , 49. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Caractère , 50.

Sous-espèce I. Dysodie rhinique , 50.

II. Dysodie stomatique , 50.

III. Dysodie gastrique , 50.

IV. Dysodie pulmonique , 50.

V. Dysodie axillique , 50.

VI. Dysodie génitale , 51.

VII. Dysodie uréique , 51.

Sous-espèce VIII. Dysodie pédique, 51.

IX. Dysodie corporelle, 51.

Genre LXXXI. Gangrène, 51. — *Ethymologie, ib.*  
— *Caractère, ib.*

Sous-genre I. Atonique, 52. — *Synonymie, ib.* —  
*Bibliographie (a), ib.*

Espèce I. Gangrène d'hôpital, 54. — *Synonymie, ib.* — *Bibliographie, ib.* — *Caractère, ib.* — *Rapports, ib.*

Espèce II. Gangrène sporadique, 55. — *Caractère, ib.*

Sous-espèce I. Par contusion, 55.

II. Par infiltration, 55.

III. Par étranglement, 55.

IV. Par inflammation, 55.

V. Par pourriture, 55.

VI. Par compression, 55.

Sous-genre II. Excitative, 56. — *Synonymie, ib.* —  
*Caractère, ib.*

Espèce I. Fièvre gangreneuse, 56. — *Caractère, ib.*  
— *Rapports, ib.*

Espèce II. Gangrène des riches, 56. — *Caractère, ib.*

Espèce III. Gangrène des vieillards, 57. — *Bibliographie, ib.* — *Caractère, ib.* — *Rapport, ib.*

Sous-genre III. Charbonneuse, 58. — *Caractère, ib.*

Espèce I. Charbon, 58. — *Bibliographie, ib.* — *Caractère, 59.*

---

(a) O'HALLORAN, *a complete treatise on gangrene and sphacelus*; Lond. 1766.

Espèce II. Fièvre charbonneuse, 59. — Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Rapports, *ib.*

Sous-genre IV. Osseuse, 59. — Caractère, *ib.*

Espèce I. Névrose, 59. — Ethymologie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, 60.

Espèce II. Sequestre, 60. — Caractère, *ib.*

Formes gangreneuses, 60. — Sortes, *ib.*

Genre LXXXII. Puose, 62. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie (a), *ib.* — Caractère, 63. — Variété A. Idiopathique, *ib.* — B. Métastatique, 64. — C. Métapostasique, *ib.*

Espèce I. Primitive, 64. — Caractère, *ib.* — Rapports, *ib.*

Espèce II. Secondaire, 64. — Caractère, *ib.* — Rapports, *ib.*

Sous-espèce I. Abscess dans le cerveau, 65. — Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Rapports, *ib.* — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Sous-espèce II. Abscess dans l'œil, 65. — Synonymie, *ib.* — Caractère, 66. — Rapports, *ib.*

Sous-espèce III. Abscess dans l'oreille, 67. — Bibliographie, *ib.*

Sous-espèce IV. Abscess dans l'antre maxillaire, 67. — Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce V. Abscess dans la gencive, 68. — Rapports, *ib.*

Sous-espèce VI. Abscess dans l'amygdale, 68. — Caractère, *ib.* — Observation, *ib.*

Sous-espèce VII. Abscess dans la poitrine, 69. —

---

(a) CH. W. GESNER, *de generatione puris*; Jenæ 1777.

Variété A. Vomique, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, 70. — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.* — B. Empyème, *ib.* — Bibliographie, 71. — Caractère, *ib.* — Rapports, *ib.* — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Sous-espèce VIII. Abscess dans le thymus, 71. — Rapports, *ib.*

Sous-espèce IX. Abscess dans le péricarde, 72. — Rapports, *ib.*

Sous-espèce X. Abscess dans l'estomac, 72. — Bibliographie, *ib.* — Rapports, *ib.*

Sous-espèce XI. Abscess dans le pancréas, 72. — Rapport, *ib.*

Sous-espèce XII. Abscess dans le mésentère, 72. — Rapport, *ib.*

Sous-espèce XIII. Abscess dans le foie, 72. — Bibliographie, *ib.* — Rapports, 73.

Sous-espèce XIV. Abscess dans la rate, 73. — Bibliographie, *ib.*

Sous-espèce XV. Abscess dans le rein, 73. — Rapports, *ib.*

Sous-espèce XVI. Abscess dans la vessie, 73. — Rapports, *ib.*

Sous-espèce XVII. Abscess dans le scrotum, 74. — Rapport, *ib.*

Sous-espèce XVIII. Abscess dans les doigts, 74. — Rapport, *ib.*

Sous-espèce XIX. Abscess dans les glandes, 74. — Rapport, *ib.*

Sous-espèce XX. Abscess dans les muscles, 74. — Bibliographie, *ib.* — Rapport, *ib.*

Genre LXXXIII. Elcose, 74. — Ethymologie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-genre I. Plaie, 74. — Ethymologie, *ib.* —  
Synonymie, *ib.* — Bibliographie, 75. — Caractère, *ib.*

Espèce I. Plaie instrumentique, 75. — Variété A.  
Superficielle, *ib.* — B. Profonde, *ib.*

Sous-espèce I. Divisive, 76. — Rapport, *ib.*

II. Piquante, 76. — Rapport, *ib.*

III. Déchirante, 76. — Rapports, *ib.*

IV. Contundante, 77. — Rapport, *ib.*

V. Virulente, 77.

Variété A. Plaie de la tête, *ib.* — B. Rupture du  
cœur, *ib.* — C. Rupture de l'œsophage, 78. — D.  
Plaies de l'abdomen, *ib.* — E. Rupture de l'abdomen,  
*ib.* — F. Plaies des intestins, *ib.* — G. Plaies de la  
rate, 79. — H. Rupture de l'utérus, *ib.* — I. Rup-  
ture des corps caverneux, *ib.* — K. Plaies des arti-  
culationes, 80. — L. Rupture musculaire, *ib.* — M.  
Plaie des tendons, *ib.* — N. Plaie des membranes,  
*ib.*

Formes ou effets traumatiques, 80. — Sortes, 80-83.

Espèce II. Plaie par des armes à feu, 83. — Bi-  
bliographie, 84. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Plaie simple, 85. — Caractère, *ib.*

II. Plaie avec corps étranger, 85. — Caractère,  
*ib.*

Sous-espèce III. Plaie compliquée, 85. — Carac-  
tère, *ib.*

Sous-genre II. Fracture, 85. — Ethymologie, *ib.* —  
Synonymie, 86. — Bibliographie, *ib.* — Caractère,  
87. — Rapports, *ib.*

Espèce I. Fracture simple, 88. — Caractère, *ib.*

Espèce II. Fracture composée, 88. — Caractère,  
*ib.* — Rapport, *ib.*

Espèce III. Fracture compliquée, 88. — Caractère, *ib.*

Variété A. Fracture des os de la tête, 88. — B. Des vertèbres du cou, 89. — C. De la clavicule, *ib.* — D. De l'olécrâne, *ib.* — (a). — E. Des côtes, *ib.* — F. Du sternum, *ib.* — G. Des os du bassin, *ib.* — H. Du fémur, *ib.* — I. De la rotule, 90. — K. Du péroné, *ib.*

Sous-genre III. Ulcère, 90. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie (b), *ib.* — Caractère, *ib.* — Rapports, 91-93.

Espèce I. Ulcère simple, 93. — Synonymie, *ib.* — Caractère, 94. — Variété A. Ulcération, *ib.* — B. Rhagade, *ib.*

Espèce II. Ulcère vicié, 94. — Caractère, *ib.* — Rapports, *ib.*

Sous-espèce I. Sanieux, 95. — Caractère, *ib.*

II. Ichoreux, 95. — Caractère, *ib.*

III. Sordide, 95. — Caractère, *ib.* — Variété

A. Ulcère érysipélateux, 96. — Caractère, *ib.* — B. Ulcère d'hôpital, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce III. Ulcère fongueux, 97. — Caractère, *ib.*

Espèce IV. Ulcère cavé, 97. — Bibliographie, *ib.* — Variété A. Sinus, *ib.* — Caractère, *ib.* — B. Fistule, *ib.* — Caractère, *ib.*

---

(a) J. J. LE COSSE, dissert. sur la fracture de l'extrémité supérieure de l'humerus; Paris an XI. — J. R. D. DU LOCLE, dissert. sur les fractures de l'avant-bras; Paris an XI-1803.

(b) CH. A. MANGOLD, de generibus et speciebus ulcerum; Erford 1765.

Sous-espèce I. Fistule lacrymale, 98. — Bibliographie (a), *ib.* — Caractère, 99. — Variété A. Première espèce de M. L'ÉVEILLÉ, *ib.* — B. Seconde espèce, 100. — C. Troisième espèce, *ib.* — D. Quatrième espèce, *ib.*

Sous-espèce II. Fistule de la cornée, 101. — Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce III. Fistule à l'anus, 101. — Bibliographie (b), *ib.* — Caractère, *ib.* — Variété A. Fistule dans le tissu graisseux de la peau, *ib.* — Caractère, 102. — B. Fistule du sphincter de l'anus, *ib.* — Caractère, *ib.* — C. Fistule du tissu cellulaire du rectum, *ib.* — Caractère, *ib.* — D. Fistule du rectum, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce IV. Fistule urinaire, 103. — Caractère, *ib.* — Variété A. Cysto-vaginale, *ib.* — B. Cysto-intestinale, *ib.* — C. Cysto-périnéale, *ib.* — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Sous-espèce V. Fistule périnéo-urétrale, 103. — Caractère, *ib.*

Espèce V. Ulcère calleux, 104. — Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-genre IV. Carie, 104. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, 105. — Caractère, 106. — Rapport, *ib.*

Espèce I. Humide, 106. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Vermoulue, 106. — Caractère, *ib.*

---

(a) J. B. S. DUBOY, précis sur l'opération de la fistule lacrymale; Paris an XI-1803.

(b) R. A. BAFFOS, dissert. sur la fistule à l'anus; Paris an XI-1803.

Sous-espèce II. Hypersarcosique , 106. — Caractère , *ib.*

Sous-espèce III. Phagédénique , 106. — Caractère , *ib.*

Espèce II. Sèche , 107. — Caractère , *ib.*

Espèce III. Adipocirée , 107. — Caractère , *ib.*

Formes elcosiques , 107. — Sortes , 107-109.

Genre LXXXIV. Cancer , 109. — Ethymologie , *ib.*  
— Synonymie , *ib.* — Bibliographie , 109-112. — Caractère , 113. — Rapports , *ib.*

Espèce I. Cancer squirreux , 113. — Caractère , *ib.*  
— Rapports , *ib.*

Espèce II. Cancer fongueux , 113. — Caractère , *ib.*  
— Rapports , 114.

Espèce III. Cancer spongieux , 114. — Caractère , *ib.*  
*ib.* — Rapports , *ib.*

Espèce IV. Cancer croûteux , 115. — Caractère , *ib.*  
— Rapports , *ib.*

Espèce V. Cancer ulcéreux , 115. — Caractère , *ib.*  
— Rapports , *ib.*

I.° Variétés dues au siège , 116. — A. Cancer facial , *ib.* — B. Palpébral , *ib.* — C. Nasal , *ib.* — D. lingual , *ib.* — E. Labial , *ib.* — F. Mammaire , *ib.* — G. Du pylore , 117. — H. Utérin , *ib.* — I. Du rectum , *ib.* — K. De la verge , 118.

II.° Variétés dues au degré , 118. — — A. Cancer occulte , *ib.* — B. Ulcéré , *ib.*

III.° Variétés dues à l'origine , 118. — A. Carcinome verruqueux , *ib.* — B. Myrmécique , *ib.* — C. Loup , *ib.*

Conclusion de la quatrième classe , 119.

Pourquoi la classe des *azoténèses* a été restreinte par les *oxigénèses* , 119.

Points de rapprochemens entre les *hydrogénèses* et les *azoténèses*, *ib.*

Du *scorbut*, 120.

Son analogie avec certaines fièvres pétéchiâles, l'hémorragisme tacheté, le scorbutisme, etc., 121.

Raisons de la différence qui se trouve entre le scorbut des Anglais et celui des Hollandais, 122.

Liaisons entre le genre *scorbut* et le genre *septose*, 123.

La *gangrène*, 124, la *puose*, 125, en sont des suites naturelles, ainsi que l'*elcose*, *ib.*, et le *cancer*, 126.

Nature et produits du *cancer*, 126.

Modifications qu'offrent les ulcères cancroïdes et les ulcères putrides, 127.

Avantages du diagnostic et d'une bonne méthode nosologique, 129-30.

Exposé méthodique des *classes*, des *genres*, des *espèces* et des *formes* des maladies, 131.

Classe cinquième, *ib.*

Utilité de l'organisme, *ib.*

L'auteur donne sa doctrine de bonne foi, *ib.*

*Phosphorénèses*, 132.

Ethymologie du terme *phosphore*, *ib.*

Sa nature et ses qualités, 133.

Phosphorescence des corps, 134.

Effets du phosphore pris intérieurement, *ib.*

Sur-tout sur l'organe moteur, 136.

Son influence sur la production des maladies, 137.

Le phosphore brûlé par l'oxygène, 137.

Ses résultats, *ib.*

Dissous dans le gaz hydrogène, *ib.*

- Acide phosphorique, 138.
- Phosphate de chaux, *ib.*
- Ses vices, 139.
- Etiologie du *rachitis*, 139-40.
- Excrétions chargées de phosphate de chaux, 141.
- La chaux et l'acide phosphorique journallement introduits dans le corps, *ib.*
- Calculs formés quelquefois par des phosphates ou des oxalates de chaux, 142.
- Excès de phosphate de chaux dans la tunique musculieuse des artères produit l'anévrisme spontané, *ib.*
- Influe sur l'état organique dans la vieillesse, 143.
- Les explications simples ne satisfont pas toujours, 144.
- Etat du phosphate calcaire, 145.
- L'acide phosphorique agit sur les os, 146.
- Opinion de quelques auteurs sur la théorie de la goutte, du *rachitis*, 147.
- Affinité du phosphore pour certaines parties du corps, 148.
- Classe des *phosphorénèses* naturellement peu nombreuse, 149.
- Raisons qui en ont exclu les maladies par excitation, 150.
- Genres de cette classe : *rachitis*, *ostéonisme*, *arthritisme*, *trichose*, *dermisme*, *décépitude*, 151.
- Genre LXXXV. *Rachitis*, 151. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, 151-54. — Caractère, 154.
- Espèce I. *Nouveux*, 154. — Caractère, *ib.* — Rapport, *ib.*

Espèce II. Tortueux , 155. — Caractère , *ib.* — Rapport , *ib.*

Espèce III. Ostéomalacique , 155. — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , 155. — Caractère , 156. — Espèces d'ostéomalacie , 157.

Espèce IV. Diaphysique , 157. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , 158.

Genre LXXXVI. Ostéonisme , 158. — Ethymologie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Espèce I. Fragilité , 159. — Caractère , *ib.* — Observation , *ib.*

Sous-espèce I. Friabilité , 160. — Caractère , *ib.*

Espèce II. Exostose , 160. — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Tophus , *ib.* — (a).

Espèce III. Périostose , 161. — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Genre LXXXVII. Arthritisme , 161. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , 161-65. — Caractère , 166.

Espèce I. Arthritisme vif , 166. — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Sous-espèce I. Régulier , 166. — Caractère , *ib.* — Rapports , 167.

Sous-espèce II. Irrégulier , 167. — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Espèce II. Arthritisme lent , 167. — Caractère , *ib.* — Rapports , *ib.*

Sous-espèce I. Régulier , 168. — Caractère , *ib.* —

---

(a) *Formes.* Sor. I. Sciatique luxatoire ; SAUV. , cl. VII , ord. IV , gen. XXXI , esp. 9.

Variété A. Goutte d'hiver, *ib.* — B. D'été, *ib.* — C. Chlorotique, *ib.* — D. Asthmatique, *ib.*

Sous-espèce II. Irrégulier, 168. — Caractère, *ib.* — Rapports, 169.

Formes 169. — Sortes, 169-71.

Genre LXXXVIII. Trichose, 171. — Ethymologie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce I. Mutable, 172.

Sous-espèce I. Trichiaise, 172. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Variété A. Distichiaise, 172. — B. Phalangose, *ib.*

Sous-espèce II. Poilûre, 172. — Synonymie, *ib.* — Caractère, 173.

Sous-espèce III. Distrix, 173. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce IV. Xirasie, 173. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce V. Rodation, 173. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce VI. Canitie, 173. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce II. Dépilative, 173. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Madarose, 174. — Caractère, *ib.* — Variété A. Ptilose, *ib.* — B. Spanopogon, *ib.*

Sous-espèce II. Phalacrote, 174. — Caractère, *ib.*

Affections des ongles et de la peau, 174.

Genre LXXXIX. Dermisme, 175. — Ethymologie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce I. Dermisme avec épaissement ou difformité des ongles, 175.

Sous-espèce I. Grypose, 175. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce II. Ungulose , 175. — Caractère , *ib.*  
— Rappports , *ib.*

Espèce II. Dermisme avec corrugation de la peau ,  
176.

Sous-espèce I. Rhimose , 176. — Synonymie , *ib.* —  
Caractère , *ib.*

Espèce III. Dermisme avec excroissances cornées ,  
176.

Sous-espèce I. Dyonisisme , 176. — Synonymie , *ib.*  
— Caractère , *ib.* — Rappports , *ib.*

Espèce IV. Dermisme spino-écailleux , 177. — Rap-  
port , *ib.*

Genre XC. Décrépitude , 177. — Ethymologie , *ib.*  
— Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Division des périodes de la vieillesse , 177.

Conclusion de la cinquième classe , 178.

Liaison naturelle entre les genres qui terminent la  
quatrième classe , et qui commencent la cinquième ,  
178.

Le rachitis , 179.

Raisons qui le font classer parmi les *phosphorenièses* ,  
180.

L'ostéonisme : genre de maladie qui complete les  
affections rachitiques , 181.

L'arthritisme , 182.

Il se lie facilement avec les genres précédens , *ib.*

Pourquoi la *trichose* , le *dermisme* et la *décrépitude*  
ferment naturellement cette classe , 183-84.

Classe supplémentaire ou Appendix aux fondemens  
de la science méthodique des maladies , 185.

Cette classe ne forme point contradiction dans cet  
ouvrage , *ib.*

Sept genres , l'ectopie , le thlasme , la proptome , l'atréisme , l'adhérence , le loxarthre et la déformation la constituent , 186.

Genre XCI. Ectopie , 186. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , 187. — Caractère , *ib.*

Sous-genre I. Luxation , 187. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère , 188.

Espèce I. Mobile , 188.

II. Immobile , 189.

III. Compliquée , 189.

I.° Luxations par cause externe , 189.

Espèce IV. Complete et simple , 189.

V. Incomplete et simple , 189.

VI. Incomplete instantanée , 189.

VII. Compliquée par violence , 189.

II.° Luxations par cause interne , 189.

Espèce VIII. Par convulsion , 189.

IX. Par paralysie , 189.

X. Desmochannosique , 189.

XI. Desmophlogique , 189.

XII. Pastacéique , 189.

XIII. Tophacéique , 190.

XIV. Exostosique , 190.

Formes , 190. — Sorte , *ib.*

Sous-genre II. Diastase , 190. — Ethymologie , *ib.* — Synonymie , *ib.* — Caractère , 191.

I.° Diastase par cause externe , 191.

Espèce I. Diastase violente , 191.

II.° Diastases par cause interne , 191.

Espèce II. Diastase raphique , 191.

III. Harmonique , 191.

Espèce IV. Synosthéochondrique, 191.

V. Epiphysique, 191.

VI. Sychondrosique, 191.

Sous-genre III. Hernie, 192. — Ethymologie, *ib.*  
— Synonymie, *ib.* — Bibliographie, 192-97. — Caractère, 197. — Variétés dépendantes du sac herniaire, *ib.* — A. Enkystée, *ib.* — B. Akystée, *ib.*

Espèce I. Céphalocèle, 197. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, 198.

Sous-espèce I. Simple, 198. — Variété A. Bregmatique, *ib.* — B. Occipitale, *ib.* — C. Temporale, *ib.*

Sous-espèce II. Hydrocystique, 198. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce III. Hydrorachique, 198. — Caractère, *ib.*

Espèce II. Ophthalmocèle, 199. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Rapport, *ib.* — Variétés dues au degré, *ib.* — A. Prose récente, *ib.* — B. Invétérée, 200. — Variétés dues à la forme, *ib.* — C. Myocéphale, *ib.* — D. Staphylome, *ib.* — E. Melon, *ib.* — F. Hilon ou clou, *ib.* — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Espèce III. Thoraxocèle, 200. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce IV. Gastrocèle, 201. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.*

I.° Sous-espèces différenciées par le lieu de la hernie, 202.

Sous-espèce I. Epigastrocèle, 202. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce II. Omphalocèle, 202. — Ethymologie, *ib.*

*ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, 203.

Sous-espèce III. Hypogastrocèle, 203. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce IV. Mérocèle, 203. — Synonymie, *ib.* — Caractère, 204.

Sous-espèce V. Bubonocèle, 204. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce VI. Opodécèle, 205. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce VII. Ischiocèle, 205. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, 206.

Sous-espèce VIII. Elytrocèle, 206. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce IX. Périnéocèle, 206. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Sous-espèce X. Oschéocèle, 207. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

II.° Sous-espèces diversifiées par la partie qui constitue la hernie, 207.

Sous-espèce XI. Gastrocèle, 207. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Variété A. Gastrocèle simple, 208. — B. Ombilicale, *ib.* — C. Composée, *ib.* — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Sous-espèce XII. Hépatocèle, 209. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Variété A. Ventrale, *ib.* — B. Ombilicale, *ib.*

Sous-espèce XIII. Splénocèle, 209. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Variété A. Ventrale, 210. — B. Inguinale, *ib.*

Tom. IV.

Sous-espèce XIV. Epiplocèle, 210. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Variété A. Epiplo-bubonocèle, 210-11. — B. Epiplo-oschéocèle, *ib.* — C. Epiplo-mérocèle, *ib.* — D. Epiplo-élytrocèle, *ib.* — E. Epiplomphale, *ib.* — F. Epiplo-épigastrocèle, *ib.* — G. Cysto-épiplocèle, *ib.* — H. Hydro-épiplocèle, *ib.* — I. Epiplo-parorchiocèle, *ib.*

Sous-espèce XV. Entérocèle, 212. — Ethymologie, *ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

I.° Entérocèles simples enkistées.

Variété A. Entéro-bubonocèle, 212-13. — B. Entéro-oschéocèle, 213. — C. Entérocèle appendiculaire, *ib.* — D. Constrictoire, *ib.* — E. Entéro-mérocèle, *ib.* — F. Entérocèle ovalaire, *ib.* — G. Ischiatique, *ib.* — H. Vaginale, *ib.* — I. Entéromphale, *ib.* — K. Entérocèle ventrale, *ib.*

II.° Entérocèles enkistées composées, 214.

L. Epiplo-entérocèle incomplète, 214. — M. Complète, *ib.* — N. Entéro-mésocolocèle, *ib.* — O. Cysto-entérocèle, *ib.* — P. Entéro-parorchiocèle, *ib.* — Q. Hydro-entérocèle, 215. — R. Epiplo-entérocèle crurale, *ib.* — S. Epiplo-entérocèle du trou ovale, *ib.* — T. Epiplo-entérocèle dorsale, *ib.* — U. Vaginale, *ib.* — V. Epiplo-entéromphale, *ib.* — X. Hypogastrocèle épiploïco-intestinale, *ib.*

III.° Entérocèle par ruptures, 216.

Y. Entéro-bubonorixe, 216. — Z. Entéro-mérorixe, *ib.* — AA. Entéromphalorixe, *ib.* — BB. Entéro-hypogastrorixe, *ib.*

Formes entérocéliques, 216. — Sortes, *ib.*

Sous-espèce XVI. Métrocèle, 217. — Ethymologie,

*ib.* — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Variété  
A. Inguinale, *ib.* — B. Ventrale, *ib.*

Sous-espèce XVII. Cystocèle, 217. — Ethymologie,  
*ib.* — Synonymie, *ib.* — Bibliographie, *ib.* — Caractère,  
*ib.*

1.<sup>o</sup> Cystocèles simples, 218. — Variété A. Cysto-  
hubonocèle, *ib.* — B. Cysto-mérocèle, *ib.* — C. Cys-  
to-périnéocèle, *ib.* — D. Cysto-hypogastrocèle, *ib.* —  
E. Cysto-élytrocèle, *ib.*

2.<sup>o</sup> Cystocèles composées, 218. — F. Entéro-cysto-  
cèle, *ib.* — G. Epiplo-cystocèle, *ib.* — H. Hystéro-  
cystocèle, *ib.* — I. Cystocèle lumbaire, 219.

Sous-genre IV. Prolapso, 219. — Ethymologie, *ib.*  
— Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce I. Exophtalmie, 219. — Synonymie, *ib.* —  
Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Hydropique, 219.

II. Hypopyique, 220.

III. Chancreuse, 220.

IV. Traumatique, 220.

V. Par protubérance, 220.

VI. Paralytique, 220.

VII. Violentielle, 220.

VIII. Strangulatoire, 220.

Espèce II. Paraglossé, 220. — Synonymie, *ib.* —  
Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Déglutitoire, 221.

II. Glossomégiste, 221.

III. Exertoire, 221.

IV. Rétractoire, 221.

Espèce III. Hypostaphyle, 221. — Synonymie, *ib.*  
— Caractère, *ib.*

- Sous-espèce I. Inflammatoire , 221.  
 II. Laxatoire , 222.  
 Formes , 222. — Sortes , *ib.*
- Espèce IV. Proctoptose , 222. — Ethymologie , *ib.*  
 Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Variété A. Bour-  
 ler , *ib.* — B. Boudin , *ib.*
- Sous-espèce I. Primitive , 222.  
 II. Diarrhéique , 222.  
 III. Calculeuse , 223.  
 IV. Dystocique , 223.  
 V. Paralytique , 223.  
 VI. Traumatique , 223.
- Espèce V. Métroptose , 223. — Ethymologie , *ib.*  
 — Synonymie , *ib.* — Bibliographie , *ib.* — Caractère ,  
 224.
- Sous-espèce I. Relaxatoire , 224.  
 II. Composée , 224.
- Sous-genre V. Inversion , 224. — Ethymologie , *ib.*  
 — Caractère , *ib.*
- Espèce I. Exocyste , 224. — Ethymologie , *ib.* —  
 Synonymie , *ib.* — Caractère , 225.
- Sous-espèce I. Noélienne , 225.  
 II. Solingienne , 225.  
 Formes , 225. — Sortes , *ib.*
- Espèce II. Exomètre , 225. — Ethymologie , *ib.* —  
 Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapport , *ib.*  
 — Formes , 226. — Sortes , *ib.*
- Espèce III. Exélithre , 226. — Ethymologie , *ib.* —  
 Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.* — Rapport , *ib.*
- Sous-genre VI. Déviation , 226. — Ethymologie , *ib.*  
 — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.*

- Espèce I. Blépharoptose , 227. — Ethymologie , *ib.*  
 — Caractère , *ib.*  
 Sous-espèce I. Vraie , 227.  
 II. Lagophthalme , 227.  
 III. Ectropium , 227. — Formes , *ib.* — Sortes ,  
*ib.*  
 IV. Entropium , 227.  
 Espèce II. Métroloxie , 228. — Ethymologie , *ib.*  
 — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.*  
 Sous-espèce I. Antérieure , 228.  
 II. Postérieure , 228.  
 III. Latérale , 228.  
 IV. Sans grosseur , 228.  
 Formes , 228. — Sortes , *ib.*  
 Espèce III. Parorchide , 228. — Synonymie , *ib.* —  
 Caractère , 229.  
 Sous-espèce I. Inguinale , 229.  
 II. Rétractile , 229.  
 III. Intropressive , 229.  
 Genre XCII. Thlasme , 229. — Ethymologie , *ib.*  
 — Bibliographie , *ib.* — Caractère , *ib.*  
 Genre XCIII. Proptome , 230. — Ethymologie , *ib.*  
 — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.*  
 Espèce I. Labiale , 230.  
 II. Auriculaire : 230.  
 III. Mammaire , 230.  
 IV. Préputiale , 231.  
 V. Clitoritique , 231.  
 VI. Nymphique , 231.  
 VII. Scrotique , 231.  
 Genre XCIV. Atrétisme , 231. — Ethymologie , *ib.*  
 — Synonymie , *ib.* — Caractère , *ib.*

Sous-genre I. Imparfait, 232. — Caractère, *ib.* —  
Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Sous-genre II. Parfait, 232. — Caractère, *ib.*

Espèce I. Palpébral, 232. — Caractère, *ib.*

Sous-espèce I. Anchyloblépharon, 232. — Caractère,  
233. — Variété A. Congénial, *ib.* — B. Adventice,  
*ib.* — C. Agglutiné, *ib.* — Formes, *ib.* — Sorte, *ib.*

Espèce II. Pupillaire, 233. — Synonymie, *ib.* — Bi-  
bliographie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce III. Caronculaire, 233. — Synonymie, *ib.*  
— Caractère, *ib.*

Espèce IV. Labial, 234. — Caractère, *ib.*

Espèce V. Proctrique, 234. — Caractère, *ib.* —  
Formes, *ib.* — Sorte, *ib.*

Espèce VI. Vaginal, 234. — Caractère, *ib.* — For-  
mes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Espèce VII. Utérin, 234.

Espèce VIII. Vulval, 234. — Formes, *ib.* — Sortes,  
234-35.

Espèce IX. Urétral, 235. — Caractère, *ib.* — For-  
mes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Genre XCV. Adhérence, 235. — Synonymie, *ib.* —  
Caractère, *ib.*

Espèce I. Digitale, 235. — Synonymie, *ib.* — Bi-  
bliographie, *ib.* — Caractère, 236.

Espèce II. Symblephare, 236. — Synonymie, *ib.* —  
Caractère, *ib.* — Formes, *ib.* — Sorte, *ib.*

Espèce III. Synéchie, 236. — Synonymie, *ib.* —  
Bibliographie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Formes, *ib.* —  
Sorte, *ib.*

Espèce IV. Ancyloglosse, 237. — Synonymie, *ib.*  
— Caractère, *ib.*

Espèce V. Ankylose, 237. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Formes de l'adhérence, 237. — Sortes, *ib.*

Genre XCVI. Loxarthre, 238. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce I. Perversif, 238.

II. Anisotonique, 238. — Rapport, *ib.*

III. Gibbeux, 238.

IV. Cagneux, 239. — Caractère, *ib.* — Variété

A. Varus, *ib.* — B. Valgus, *ib.*

Genre XCVII. Déformation, 239. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce I. Polymérisme, 239. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce II. Artérisque, 239. — Synonymie, *ib.* — Caractère, 240. — Rapports, *ib.* — Formes, *ib.* — Sorte, *ib.*

Espèce III. Galianque, 240. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Rapport, *ib.*

Espèce IV. Ischnote, 240. — Synonymie, *ib.* — Caractère, 241.

Espèce V. Phoxe, 241. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce VI. Lagostome, 241. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.* — Formes, *ib.* — Sortes, *ib.*

Espèce VII. Saniode, 241. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce VIII. Appelle, 242. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

Espèce IX. Hyospadiée, 242. — Synonymie, *ib.* — Caractère, *ib.*

- Espèce X. Hermaphrodisme, 242. — Synonymie, *ib.*  
 — Caractère, *ib.*
- Espèce XI. Leïopode, 242. — Synonymie, *ib.* —  
 Caractère, *ib.*
- Conclusion générale, 243.
- Doctrines fondamentales de cet ouvrage, *ib.*
- Action du calorique, 244, 251, 252.
- Manière d'agir de l'oxygène, 245, 251, 252.
- Effet de l'hydrogène, 246, 251, 252.
- Rôle joué par l'azote, 248, 251, 253.
- Influence directe du phosphore, 249, 251, 252.
- Substances simples des corps vivans, 252.
- La lumière, l'électrique, le galvanique, *ib.*
- Le carbone, 252.
- Le soufre, la soude, la potasse, 253.
- Matière élémentaire ou composée, 253-54.
- Sa forme, son affinité, 254.
- Organisation, organes, facultés et fonctions, 255.
- La vie est une fonction, elle est une faculté, 256.
- Le vitalique, son existence, 256, 265.
- Fluides et solides, 258.
- Gélatine, albumine, fibrine, phosphatine, 259.
- Tissus primitifs et secondaires, 259.
- Tissus gélatino-membraneux, 259.
- Fibrino-musculaires, 260.
- Phosphoréo-calcaires, 260.
- Mixtes; parenchymes, viscères, 260.
- Facultés attachées aux tissus organisés, 260.
- La vitalité, son essence ou son action, 261.
- Morilité, ce qu'elle est, 262.
- Sensibilité, son mode, 263.

La caloricité n'est point une faculté des corps organisés, 264.

Séparation des divers phénomènes propres aux corps vivans, 265.

Preuves inductives de l'existence du vitalique, 265-69.

Soupçon de matérialisme repoussé, 269.

Nécessité et utilité d'expliquer la médecine par la chimie, 270.

*FIN de la table analytique des matières du Tome IV.*

**AB**

ABGES, tome 4, page 61.

— Dans la genitive (2-esp. V), tome 4, page 61.

— (2-esp. I), tome 2, page 71.

— Dans l'attributif (2-esp. VI), tome 4, page 61.

— Dans l'attributif (2-esp. IV), tome 4, page 61.

— (2-esp. I), tome 2, page 71.

— Dans la positive (2-esp. VII), tome 4, page 61.

— Dans la négative (2-esp. XIV), tome 4, page 61.

— Dans la verbe (2-esp. XVI), tome 4, page 61.

— Dans le cerveau (2-esp. I), tome 4, page 61.

— Dans la foie (2-esp. XIII), tome 4, page 61.

— Dans la mesenterie (2-esp. XII), tome 4, page 61.

— Dans le pancréas (2-esp. XI), tome 4, page 61.

— Dans le péritoine (2-esp. IX), tome 4, page 61.

— Dans le rein (2-esp. XV), tome 4, page 61.

— Dans le scrotum (2-esp. XVII), tome 4, page 61.

— Dans les doigts (2-esp. XVIII), tome 4, page 61.

— Dans les glandes (2-esp. XIX), tome 4, page 61.

# TABLE GÉNÉRALE

## PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.



### A.

- A**BATTEMENT d'esprit, tome 2, page 51.
- A**BCÈS, tome 4, page 62 et 63.
- Dans la gencive ( s-esp. V ), tome 4, page 68.
  - ( S-esp. I ), tome 3, page 175.
  - Dans l'amygdale ( s-esp. VI ), tome 4, page 68.
  - Dans l'antre maxillaire ( s-esp. IV ), tome 4, page 67.
  - ( S-esp. I ), tome 3, page 176.
  - Dans la poitrine ( s-esp. VII ), tome 4, page 69.
  - Dans la rate ( s-esp. XIV ), tome 4, page 73.
  - Dans la vessie ( s-esp. XVI ), tome 4, page 73.
  - Dans le cerveau ( s-esp. I ), tome 4, page 65.
  - Dans le foie ( s-esp. XIII ), tome 4, page 72.
  - Dans le mésentère ( s-esp. XII ), tome 4, page 72.
  - Dans le pancréas ( s-esp. XI. ), tome 4, page 72.
  - Dans le péricarde ( s-esp. IX ), tome 4, page 72.
  - Dans le rein ( s-esp. XV ), tome 4, page 73.
  - Dans le scrotum ( s-esp. XVII ), tome 4, page 74.
  - Dans les doigts ( s-esp. XVIII ), tome 4, page 74.
  - Dans les glandes ( s-esp. XIX ), tome 4, page 74.

- Dans les muscles ( s-esp. XX ), tome 4 , page 74.
- Dans l'estomac ( s-esp. X ), tome 4 , page 72.
- Dans le thymus ( s-esp. VIII ), tome 4 , page 71.
- Dans l'œil ( s-esp. II ), tome 4 , page 65.
- Dans l'oreille ( s-esp. III ), tome 4 , page 67.
- Spontanés ( rapport B ), tome 4 , page 64.
- ABSTINENCE** ( B. ), tome 2 , page 256.
- ACCABLEMENT** ( variété B ), tome 2 , page 51.
- ACCIDENS** graves et dangereux , après la piquûre du scorpion d'Afrique ( A ), tome 3 , page 48.
- Mortels par la morsure de la grosse araignée de la Guyane ( B ), tome 3 , page 49.
- Très-ordinaires , procurés par la morsure de la tarantule ( C ), tome 3 , page 49.
- ACHLYS** , tome 3 , page 124.
- ACHOR** , tome 3 , page 485.
- ACHORE** écrouelleuse ( sorte 31 ), tome 1 , page 295.
- ACHORES** ( genre LXXIV ), tome 3 , page 485.
- Des adultes ( espèce II ), tome 3 , page 486.
- Des enfans ( espèce I ), tome 3 , page 485.
- ACYISIS** , tome 3 , page 79.
- ADDÉPHAGIE** , tome 2 , page 394.
- ADHÉRENCE** ( genre XCV ), tome 4 , page 235 , et tome 3 , page 388.
- Ancyloglosse ( espèce IV ), tome 4 , page 237.
- Ankylose ( espèce V ), tome 4 , page 237.
- Digitale ( espèce I ), tome 4 , page 235.
- Symblephare ( espèce II ), tome 4 , page 236.
- Synéchie ( espèce III ), tome 4 , page 236.
- ADHÉSION** ( A ), tome 3 , page 388.
- ADIAPNEUSTIE** ( synonymie ), tome 3 , page 68.
- ADYNAMIE** ( genre XVI ), tome 2 , page 41.

( 300 )

- Générale ( §. I ), tome 2, page 41.
- Particulière ( §. II ), tome 2, page 64.
- ADYPSIE ( s-esp. II ), tome 2, page 81.
- Primitive ( rap. A ), tome 2, page 81.
- ÆGILOPS ( rapport B ), tome 4, page 92.
- Ecrouelleux ( sorte 24 ), tome 1, page 193.
- AFFECTATION ( s-esp. II ), tome 2, page 277.
- AFFECTION hystérique, tome 2, page 338.
- Pituiteuse, tome 2, page 28.
- Tympanitique, tome 3, page 134.
- AFFECTIONS apoplectiques, tome 2, page 360.
- Asthéniques, tome 2, page 41.
- Carotiques, tome 2, page 360.
- Causées par l'ascaride vermiculaire, tome 2, page 102.
- Nerveuses et hypochondriaques ( B ), tome 2, page 47.
- Spasmodico-goutteuses ( rap. B ), tome 4, page 166.
- AFFLICTION ( variété A. ), tome 2, page 50.
- AGALAXIE, tome 3, page 69.
- AGALAXIS, tome 3, page 69.
- AGÉNÉSIE, tome 2, page 75, et tome 3, page 62.
- AGEUSTIE, tome 2, page 67.
- AGLACTATION, tome 3, page 69.
- AGRANDISSEMENT du foie, tome 3, page 128.
- AGRYPNIE ( genre XXVII ), tome 2, page 320.
- Hystérique ( sorte 7 ), tome 2, page 342.
- Pancréatique ( sorte 1 ), tome 3, page 103.
- Par indigestion ( sorte 9 ), tome 2, page 86.
- Pathématique, tome 2, page 274.

- Sénile ( sorte 15 ), tome 2 , page 47.
- Traumatique ( s-esp. III ), tome 3 , page 56.
- ALARME ( var. B ), tome 2 , page 306.
- ALBARAS des Arabes , tome 3 , page 497.
- ALGIE ( genre XXXVIII ), tome 2 , page 396.
- ALGOR , tome 1 , page 392.
- ALIÉNATION d'esprit par suppression des règles ;  
tome 3 , page 77.
- ALLOTRIOPHAGIE ( rapport B ), tome 1 , page 346.
- ALOPECIE ( rapport D ), tome 3 , page 499.
- ( Synonymie ), tome 4 , page 173.
- ALOPEX ( synonymie ), tome 4 , page 173.
- AMAIGRISSEMENT ( genre XLI ), tome 3 , page 63 ,  
et tome 3 , page 64.
- AMATOIRE , tome 3 , page 165.
- AMAUROSE ( espèce V ), tome 3 , page 58.
- Arthritique ( sorte 21 ), tome 4 , page 171.
- Connée ( A ), tome 3 , page 58.
- Et paralysie psoriques ( A ), tome 2 , page 120.
- Exanthématique ( sorte 17 ), tome 2 , page 120.
- Exhaustive ( sorte 22 ), tome 2 , page 48.
- Hystérique ( sorte 29 ), tome 2 , page 344.
- Intermittente , tome 2 , page 154.
- Latrinaire ( rap. B ), tome 2 , page 128.
- Narcotique ( D ), tome 2 , page 222.
- Pituiteuse ( sorte 12 ), tome 2 , page 34.
- Pléthorique ( sorte 42 ), tome 1 , page 228.
- Rachialgique ( sorte 12 ), tome 3 , page 18.
- Scrophuleuse ( sorte 13 ), tome 1 , page 291.
- Spasmodique ( sorte 19 ), tome 2 , page 331.
- Synchronisée ( sorte 1 ), tome 3 , page 403.
- Syphilitique ( sorte 27 ), tome 3 , page 520.

- Traumatique ( sorte 25 ), tome 4, page 82.
- AMBITION** ( var. A ), tome 2, page 313.
- AMBLYOPIE**, tome 2, page 64.
- Absolue ( rapport B ), tome 2, page 66.
- Crépusculaire ( rapport A ), tome 2, page 66.
- Hydrophthalmique ( rapport A ), tome 1, page 323.
- Luscitique ( rapport A ), tom. 2, page 354.
- Méridienne ( sorte 3 ), tome 2, page 329.
- Myopique ( rapport A ), tome 2, page 65.
- AMBUSTIO**, tome 3, page 346.
- AMÉNORRHÉE**, tome 3, page 75.
- Difficile ( s-esp. III ), tome 3, page 76.
- Emansive ( s-esp. I ), tome 3, page 75.
- Suppressive ( s-esp. II ), tome 3, page 76.
- Terrorique ( C. ), tome 2, page 307.
- Vermineuse ( sorte 33 ), tome 2, page 101.
- AMOUR** ( s-esp. III ), tome 2, page 311.
- De la gloire ( variété B ), tome 2, page 312.
- Sexuel ( variété A ), tome 2, page 311.
- AMOUR-PROPRE** ( variété C ), tome 2, page 312.
- ANPHIMERINE**, tome 2, page 145.
- Angineuse ( C. ), tome 2, page 205.
- Arthritique ( sorte 3 ), tome 4, page 169.
- Biliéuse, tome 2, page 163.
- Cardiaque, tome 2, page 162.
- Catarrhale, tome 3, page 409.
- Demi-quinte, tome 2, page 161.
- Epiale, tome 2, page 162.
- Fausse hémitritée, tome 2, page 161.
- Hémitritée ( rapport A ), tome 2, page 161.
- Humorale, tome 2, page 162.
- Latique, tome 2, page 30.

( 303 )

- Mfiliaire ( rapport B ), tome 3, page 379.
- Paludique, tome 2, page 163.
- Péripleumonique ( sorte 1 ), tome 3, page 80.
- Phricode, tome 2, page 162.
- Semi-quarte, tome 2, page 167.
- Singultueuse ( rapport A ), tome 2, page 146.
- Spasmodique ( rapport C ), tome 2, page 168.
- Syncopale, tome 2, page 162.
- Tussiculeuse ( sorte 4 ), tome 2, page 97.
- Variolique ( sorte 5 ), tome 3, page 222.
- AMPUTATION ( rapport A ), tome 4, page 76.
- AMYGDALES scrophuleuses ( sorte 15 ), tome 1,  
page 292.
- Squirreuses ( espèce II ), tome 3, page 139.
- AMYGDALITIE ( espèce IV ), tome 3, page 194.
- AMYGDALITIS, tome 3, page 195.
- ANACATHARSE puriforme ( B. ), tome 2, page 34.
- ANÆMIE ( genre XIII ), tome 2, page 27.
- Apparente ( rapport ), tome 2, page 27.
- ANAPHRODISIE ( espèce X ), tome 3, page 61.
- Gonorrhœique ( rapport C ), tome 2, page 75.
- Magique ( rapport K ), tome 2, page 294.
- Magique ( rapport D ), tome 2, page 309.
- Paralytique ( rapport A ), tome 3, page 62.
- Urétrale ( sorte 31 ), tome 3, page 520.
- ANASARQUE ( espèce III ), tome 1, page 314.
- Américaine ( s-esp. II ), tome 1, page 315.
- Causée par un flux ( rap. A ), tome 1, page 252.
- Diabétique ( sorte 1 ), tome 3, page 99.
- Diarrhèique ( rapport A ), tome 3, page 87.
- Dure, tome 1, page 286.
- Exanthématique ( sorte 2 ), tome 2, page 119.

- Exanthématique ( sorte 3 ), tome 3, page 222.
- Exanthématique ( sorte 1 ), tome 3, page 373.
- Fébrile ( sorte 5 ), tome 3, page 142.
- Gravidique ( sorte 5 ), tome 3, page 103.
- Hydropotique ( s-esp. I ), tome 1, page 314.
- Hystérique ( sorte 3 ), tome 2, page 341.
- Métastatique ( sorte 1 ), tome 3, page 69.
- Métastatique ( sorte 2 ), tome 3, page 76.
- Pléthorique ( sorte 8 ), tome 1, page 225.
- Purulente ( rapport A ), tome 4, page 64.
- Rachialgique ( sorte 1 ), tome 4, page 169.
- Urineuse ( sorte 2 ), tome 3, page 72.
- ANATROPE, tome 2, page 83.
- ANCHYLOBLÉPHARE agglutiné ( variété C ), tome 4, page 233.
- Adventice ( variété B ), tome 4, page 233.
- Congénial ( variété A ), tome 4, page 233.
- ANCHYLOBLÉPHARON ( s-esp. I ), tome 4, page 232.
- ANCYLOGLOSSE ( synonymie ), tome 4, page 237.
- ANCHYLOMÉRISME ( synonymie ), tome 4, page 235.
- ANESTHÉSIE hydrorachique ( sorte 1 ), tome 1, page 330.
- Mélancolique ( rapport B ), tome 2, page 51.
- Mélancolique ( B. ), tome 2, page 302.
- Néophytique ( rapport A ), tome 2, page 76.
- Pléthorique ( sorte 41 ), tome 1, page 228.
- ANÉVRISME ( espèce V ), tome 1, page 241.
- Artério-veineux ( s-esp. V ), tome 1, page 246.
- Circonscrit ou secondaire, tome 1, page 246.
- Crevassé ( s-esp. IV ), tome 1, page 245.
- Crevassé prompt ( variété A ), tome 1, page 245.
- Crevassé

- Crevassé tardif ( variété B ), tome 1, page 245.
  - Cylindroïde, tome 1, page 243.
  - Déchiré, tome 1, page 245.
  - Diffus ou primitif, tome 1, page 245.
  - Entier, tome 1, page 243.
  - Externe ou apparent ( variété A ), tome 1, page 242.
  - Faux, tome 1, page 245.
  - Herniaire ( s-esp. II ), tome 1, page 243.
  - Intact ( s-esp. I ), tome 1, page 242.
  - Interne ou invisible ( variété B ), tome 1, page 243.
  - Ischiocélique ( sorte 15 ), tome 1, page 248.
  - Mixte, tome 1, page 243.
  - Mixte des Italiens, tome 1, page 246.
  - Transudatoire ( s-esp. III ), tome 1, page 244.
  - Variqueux, tome 1, page 246.
  - Veineux, tome 1, page 246.
  - Vrai, tome 1, page 243.
- ANEVRISMES hémorragiques ( §. II ), tome 1, page 224.**
- Inhémorragiques ( §. I ), tome 1, page 242.
- ANGINA PECTORIS, tome 2, page 406.**
- ANGINE, tome 3, page 195.**
- ( S-gen. VI ), tome 3, page 416.
  - Cachée et difficile ( rapp. B ), tome 3, page 418.
  - Externe, tome 3, page 177.
  - Inflammatoire, tome 3, page 195.
  - Inflammatoire ( rapport F ), tome 3, page 419.
  - Inflammatoire des enfans ( rapport B ), tome 3, page 420.
  - Interne ( rapport C ), tome 3, page 418.

- Lowerienne , tome 1 , page 311 , et ( sorte 8 )  
tome 3 , page 152.
- Maxillaire , tome 3 , page 177.
- Pernicieuse ( rapport D ) , tome 3 , page 418.
- Polypeuse ou membraneuse , tome 3 , page 419.
- Putride maligne ( sorte 5 ) , tome 2 , page 205.
- Spasmodique , tome 2 , page 356 , et ( sorte 35 )  
tome 4 , page 83.
- ANGINES inflammatoires ( rap. B ) , tome 3 , page 196.
- ANKYLOPS ( espèce I ) , tome 3 , page 174.
- Inflammatoire ( rap. A ) , tome 3 , page 175.
- ANKYLOSIS ( synonymie ) , tome IV , page 237.
- ANOREXIE ( s-esp. I ) , tome 2 , page 81.
- Admirable ( variété B ) , tome 2 , page 81.
- Arthritique ( sorte 1 ) , tome 1 , page 301.
- Biliaise ( sorte 1 ) , tome 3 , page 337 , et ( sorte  
2 ) , tome 3 , page 479.
- Cachectique ( sorte 3 ) , tome 1 , page 310 , et  
( sorte 2 ) , tome 3 , page 142.
- De SWART ( par un défaut de bile ) ( var. C ) ,  
tome 2 , page 82.
- Exhaustive ( sorte 10 ) , tome 2 , page 46.
- Fébrile ( sorte 3 ) , tome 3 , page 171.
- Mélancolique ( rap. C ) , tome 2 , page 294 , et  
( sorte 4 ) , tome 2 , page 329.
- Néophytique ( A ) , tome 2 , page 46.
- Paralytique ( sorte 1 ) , tome 3 , page 62.
- Pituiteuse ( sorte 3 ) , tome 2 , page 32.
- Pléthorique ( sorte 13 ) , tome 1 , page 225.
- Saburrale ( variété A ) , tome 2 , page 81.
- ANOSMIE , tome 2 , page 66 , et ( espèce VII ) tome  
3 , page 59.

- Catarrhale (sorte 18), tome 3, page 415.
- Ozénique (sorte 4), tome 4, page 108.
- Polypeuse (sorte 2), tome 3, page 158.
- Siccativ (A), tome 3, page 60.
- Syphilitique (sorte 29), tome 3, page 520.
- Vermineuse (D.), tome 2, page 124.
- ANTHRACIA, tome 3, page 184.
- ANTHRACOSIS, tome 3, page 184.
- ANTHRAX (espèce IV), tome 3, page 184.
- Palpébral (variété A), tome 3, page 185.
- ANTIPATHIE (espèce VII), tome 2, page 272.
- ANTROPOPHAGIE (espèce III), tome 2, page 395.
- ANXIÉTÉS (sorte 10), tome 2, page 330.
- APATHIE (variété A), tome 2, page 52.
- APEPSIE (variété A), tome 2, page 85.
- APHONIE (espèce VIII), tome 3, page 60.
- Anévrismatique (sorte 14), tome 1, page 248.
- Antipathique (sorte 3), tome 2, page 272.
- Atonique (C), tome 3, page 60.
- Catarrhale (sorte 19), tome 3, page 415.
- Dysentérique (sorte 3), tome 3, page 438.
- Ebriétique (E.), tome 2, page 240.
- Hystérique (sorte 30), tome 2, page 344.
- Mélancolique (rap. C), tome 2, page 51, et (C.) tome 2, page 302.
- Paralytique (A.), tome 3, page 60.
- Par suppression des règles (sorte 10), tome 3, page 77.
- Spasmodique (sorte 20), tome 2, page 331.
- Traumatique (B.), tome 3, page 60, et (sorte 27) tome 4, page 83.

- Vermineuse ( sorte 32 ), tome 2 , page 100.
- APHGE confluent des enfans ( s-esp. II ), tome 3 ,  
page 423.
- Des adultes ( esp. II ), tome 3 , page 423.
- Discret des enfans ( s-esp. I ), tome 3 , page 422.
- Laiteux ( rap. A ), tome 3 , page 423.
- Malin , tome 2 , page 210.
- Scorbutique ( sorte 30 ), tome 4 , page 41.
- Syphilitique ( sorte 41 ), tome 3 , page 521.
- APHTES ( s-gen. VII ), tome 3 , page 420.
- Des enfans ( espèce I ), tome 3 , page 422.
- Fébriles ( rap. B ), tome 3 , page 423.
- APOMYTOSIS , tome 1 , page 393.
- APOPLEXIE ( s-esp. I ), tome 2 , page 365.
- Anévrismatique ( sorte 6 ), tome 1 , page 247.
- Arthritique ( sorte 10 ), tome 4 , page 170.
- Atrabillaire ( sorte A ), tome 1 , page 397.
- Biliaire ( sorte 3 ), tome 3 , page 472.
- Cataleptique ( rap. E ), tome 2 , page 360.
- Infantile , tome 3 , page 441.
- Epileptique ( rap. B ), tome 2 , page 371.
- Exanthématique ( sorte 4 ), tome 3 , page 337 , et  
( sorte 4 ) tome 3 , page 485.
- Fébrile , tome 2 , page 152.
- Foudroyante , tome 2 , page 366.
- Fulminique ( rap. F ), tome 3 , page 348.
- Hydrocéphalique , tome 441.
- Hystérique ( sorte 14 ), tome 2 , page 342.
- Inflammatoire ( sorte 3 ), tome 3 , page 191.
- Apoplexie méphitique ( rap. C ), tome 2 , page 130.
- Nerveuse ( rap. A ), tome 2 , page 363 , et ( rap.  
A ), tome 2 , page 366.

( 309 )

- Par colère ( K ), tome 2 , pag. 318.
- Par contention d'esprit ( rap. E ), tome 2 , page 294.
- Pléthorique ( sorte 24 ), tome 1 , page 226.
- Præcordiale , tome 2 , page 87.
- Puerpérale ( sorte 2 ), tome 3 , page 463.
- Séréuse ( sorte A ), tome 1 , page 397 , et ( sorte 4 ) tome 1 , page 305.
- Susprieuse ( sorte II ), tome 2 , page 86.
- Témulente ( D ), tome 2 , page 240.
- Traumatique ( sorte 12 ), tome 4 , page 81.
- Variqueuse ( variété D ), tome 1 , page 241.
- Vermineuse ( sorte 16 ), tome 2 , page 99.
- APOSTASE** ( rap. A ), tome 4 , page 64.
- APOSTÈME** , tome 4 , page 62.
- Des phalanges ( rap. A ), tome 4 , page 74.
- Diapyèse ( rap. C ), tome 4 , page 66.
- Empyocèle ( rap. A ), tome 4 , page 74.
- Hypopium ( rap. B ), tome 4 , page 66.
- Onyx ( rap. D ), tome 4 , page 66.
- Parulie ( rap. A ), tome 4 , page 68.
- Synchyse ( rap. A ), tome 4 , page 66.
- APPELLA** ( synonymie ), tome 4 , page 242.
- APPELLE** ( esp. VIII ), tome 4 , page 242.
- APPREHENSION** , tome 2 , page 54.
- ARACHNOIDÉSIE** ( s-gen. XII ), tome 3 , page 441.
- Lente ( espèce I ), tome 3 , page 442.
- Vive ( espèce II ), tome 3 , page 443.
- ARCOUSSEL** , tome 3 , page 197.
- ARDEUR** ( espèce I ), tome 3 , page 328.
- Avec dysurie , ischurie et cystirragie par les cantharides ( s-esp. IV ), tome 3 , page 51.
- ARGEMA** ( E. ), tome IV , page 92.

- ARGEMON ( E. ), tome 4 , page 92.
- ARIDURE ( espèce II ), tome 3 , page 67.
- Digitale ( s-esp. I ), tome 3 , page 67.
- Spasmodique ( rap. A ), tome 3 , page 67.
- ARROGANCE ( s-esp. III ), tome 3 , page 276.
- ARTHRITIS ( genre LXXXVII ), tome 4 , page 161.
- Lent ( espèce II ), tome 4 , page 167.
- Lent irrégulier ( s-esp. II ), tome 4 , page 168.
- Lent régulier ( s-espèce I ), tome 4 , page 168.
- Suppuré ( sorte 27 ), tome 4 , page 171.
- Vif ( espèce I ), tome 4 , page 166.
- Vif irrégulier ( s-esp. II ), tome 4 , page 167.
- Vif régulier ( s-esp. I ), tome 4 , page 166.
- ARTHROCACE ( sorte 28 ), tome 1 , page 293 ,  
et tome 4 , page 105.
- ARTROCÈLE ( s-esp. XII ), tome 3 , page 353.
- ARTHRODYNIE ( espèce I ), tome 1 , page 296.
- ARTHRODYNIE fixe ( s-esp. I ), tome 1 , page 297.
- Mobile ( s-esp. II ), tome 1 , page 298.
- ARTHRONALGIE ( espèce XIX ), tome 2 , page  
425.
- ARTHRONIE ( s-esp. XI ), tome 3 , page 352.
- ARTHROPUOSE , tome 3 , page 352.
- ASAPHIE ( rap. B ), tome 2 , page 74.
- ASCITE , tome 1 , page 332.
- Abdominale , tome 1 , page 333.
- Arthritique ( sorte 2 ), tome 4 , page 169.
- Artificielle , tome 3 , page 131.
- Causée par les flux ( rap. B ), tome 1 , page 252.
- Entre peau ( rap. ), tome 1 , page 335.
- Exanthématique ( sorte 4 ), tome 2 , page 119 , et  
( sorte 1 ) tome 3 , page 484.

- Fébrile ( sorte 1 ), tome 3 , page 456.
- Flatulento-péritonique ( rap. C ), tome 3 , page 136.
- Hépatique ( sorte 6 ), tome 3 , page 142.
- Musculo-péritonique , tome 1 , page 134.
- Opilatique ( sorte 1 ), tome 3 , page 131.
- Ordinaire ( rap. ), tome 1 , page 333.
- Ovaïrique , tome 1 , page 337 , et ( sorte 1 ) tome 3 , page 148.
- Sanguineo-utérine , tome 1 , page 234.
- Scorbutique ( sorte 7 ), tome 4 , page 39.
- Scrophuleuse ( sorte 2 ), tome 1 , page 290.
- Splénique ( sorte 6 ), tome 3 , page 144.
- Stomacale ( rap. ), tome 1 , page 334.
- Utérine ( variété B ), tome 1 , page 336.
- Utérine compliquée de mole , etc. , tome 1 , page 336.

ASPERMATISME , tome 3 , page 78.

ASPHYXIE ( espèce IV ) , tome 2 , page 59.

- Amnio-pituiteuse ( sorte 1 ), tome 2 , page 32.
- Apoplectique ( rap. C ), tome 2 , page 366.
- Carbonique ( A. ), tome 2 , page 130.
- Corporelle ( s-esp. II ), tome 2 , page 62.
- Des noyés ( variété A ), tome 2 , page 62.
- Des suffoqués ( variété B ), tome 2 , page 63.
- Frigorique ( sorte 1 ), tome 1 , page 285-393.
- Fulminique ( rap. D ), tome 3 , page 347.
- Hystérique ( sorte 5 ), tome 2 , page 341.
- Latrinaire ( rap. A ), tome 2 , page 128.
- Méphitique ( rap. A ), tome 2 , page 130.
- Néophytique ( rap. A ), tome 2 , page 62.
- Par la fumée ( rap. A ), tome 2 , page 131.
- Par le moût ( B. ), tome 2 , page 130.

- Pathématique ( A ), tome 2, page 302, et ( B. )  
tome 2, page 310.
- Pléthorique ( sorte 12 ), tome 1, page 225.
- Pulmonaire ( s-esp. I ), tome 2, page 62.
- Traumatique ( sorte 5 ), tome 4, page 81.
- Valsalvienne ( sorte 1 ), tome 4, page 237.
- ASSODE ( rap. P ), tome 2, page 153.
- ASSOUPISEMENS, tome 2, page 360.
- ASTHÉNIE, tome 2, page 42, et ( espèce I ) tome 2,  
page 41.
- Américaine ( rap. B ), tome 2, page 42.
- Américo-européenne ( sorte 2 ), tome 1, page 348.
- Corporelle ( s-esp. I ), tome 2, page 42.
- Hémorragique ( rap. C ), tome 1, page 252.
- Hydrocéphalique ( rap. A ), tome 1, page 321.
- Mentale ( s-esp. II ), tome 2, page 50.
- Native ( rap. A ), tome 2, page 42.
- Par exercice outré des facultés mentales ( variété  
A ), tome 2, page 50.
- Par exercice outré du corps ( variété A ), tome  
2, page 42.
- ASTHME ( genre XXXV ), tome 2, page 379.
- Ankylosique ( sorte 4 ), tome 4, page 238.
- Arthritique ( sorte 12 ), tome 4, page 170.
- Ascaridique ( sorte 21 ), tome 2, page 99.
- Cachectique ( sorte 6 ), tome 1, page 310.
- Calculeux ( A. ), tome 3, page 115.
- Continu ( espèce III ), tome 2, page 383.
- Convulsif, tome 2, page 382.
- Des bossus ( sorte 3 ), tome 4, page 158.
- Des boulangers ( rap. A ), tome 3, page 155, et  
( B. ) tome 3, page 115.

- Equinique ( sorte 2 ), tome 3 , page 133.
  - Exanthématique ( sorte 13 ), tome 2 , page 120 ,  
( sorte 3 ) tome 3 , page 374 , et ( sorte 6 )  
tome 3 , page 382.
  - Fièvre intermittente ( sorte 15 ), tome 2 , page 171.
  - Fiévreux , tome 2 , page 153.
  - Humide ( A. ), tome 2 , page 33 , et ( s-esp. I )  
tome 2 , page 381.
  - Humoral de BAGLIVI , tome 2 , page 33.
  - Hypochondriaque ( sorte 8 ), tome 2 , page 338.
  - Hystérique ( sorte 18 ), tome 2 , page 343.
  - Métallique , ( sorte 6 ), tome 3 , page 17.
  - Mortel par colère ( N. ), tome 2 , page 318.
  - Occulte et sec , tome 2 , page 382.
  - Paroxistique ( espèce I ), tome 2 , page 379.
  - Pituiteux ( sorte 7 ), tome 2 , page 33.
  - Pléthorique ( sorte 29 ) tome 1 , page 227.
  - Pneumode ( rap. E ), tome 3 , page 115.
  - Pneumonique de WILLIS , tome 2 , page 33.
  - Polypeux ( sorte 3 ), tome 3 , page 161.
  - Sec ( s-esp. II ), tome 2 , page 381.
  - Spasmodique ( sorte 15 ), tome 2 , page 330.
  - Stomachique ( B. ), tome 2 , page 33.
  - Suffoquant ( espèce II ), tome 2 , page 382.
  - Syphilitique ( sorte 12 ), tome 3 , page 518.
  - Variqueux ( variété E ), tome 1 , page 241.
  - Violent par les émanations de l'ipécacuanha , tome  
3 , page 34.
- ATALIE de DELIUS , tome 3 , page 61.
- ATECHNIE , tome 3 , page 61.
- ATOCIE , tome 3 , page 80.
- ATONIE , tome 1 , page 41.

- ATRETA**, tome 4, page 231.
- ATRÉTISME** (genre XCIV), tome 4, page 231.
- Caronculaire ( espèce III ), tome 4, page 233.
  - Imparfait ( s-gen. I ), tome 4, page 232.
  - Labial ( espèce IV ), tome 4, page 234.
  - Palpébral ( espèce I ), tome 4, page 232.
  - Parfait ( s-gen. II ), tome 4, page 232.
  - Proctique ( espèce V ), tome 4, page 234.
  - Pupillaire ( espèce II ), tome 4, page 233.
  - Tincal, tome 4, page 234.
  - Urétral ( espèce IX ), tome 4, page 235.
  - Utérin ( espèce VII ), tome 4, page 234.
  - Vaginal ( espèce VI ), tome 4, page 234.
  - Vulval ( espèce VIII ), tome 4, page 234.
- ATROPHIE** ( espèce I ), tome 3, page 64.
- D'abstinence ( s-esp. II ), tome 3, page 65.
  - Des enfans ( rap. B ), tome 3, page 65.
  - Des nourrices ( rap. A ), tome 3, page 66.
  - Des nourrissons ( rap. A ), tome 3, page 65.
  - Diarrhémique ( rap. D ), tome 3, page 87.
  - Essentielle ( s-esp. I ), tome 3, page 65.
  - Evacuatoire ( s-esp. III ), tome 3, page 66.
  - Hémorragique ( rap. H ), tome 3, page 66.
  - Idiopathique simple ( rap. A ), tome 3, page 65.
  - Latérale ( A. ), tome 2, page 48.
  - Morale ( s-esp. IV ), tome 3, page 67.
  - Nerveuse ( sorte 23 ), tome 2, page 48, et  
( rap. B ) tome 3, page 65.
  - Par la diarrhée ( rap. C ), tome 3, page 66.
  - Par la leucorrhée ( rap. D ), tome 3, page 66.
  - Par le ptyalisme ( rap. E ), tome 3, page 66.
  - Par le vomissement ( rap. B ), tome 3, page 66.

( 315 )

- Par un flux de sang ( rap. E ), tome 1, page 252.
- Pryalismique ( rap. B ) tome 3, page 96.
- Scorbutique ( sorte 21 ), tome 4, page 40.
- Sénile ( B. ), tome 2, page 48, et tome 3, page 65.

— Syphilitique ( A. ), tome 3, page 520.

— Vomitique ( sorte 4 ), tome 3, page 140.

AUCHITIS syphilitique ( sorte 40 ), tome 3, page 321.

AURIGO, tome 3, page 473.

AUSTÉRITÉ ( A. ), tome 2, page 256.

AVANTAGEUX [ l' ] ( s-esp. V ), tome 2, page 280.

AVARICE ( var. B ), tome 2, page 313.

AVERSION ( var. A ), tome 2, page 315.

AVORTEMENT ( genre XLVIII ), tome 3, page 105.

— Pléthorique ( sorte 47 ), tome 1, page 228.

AZOTENÈSES ( classe IV ), tome 4, page 2.

## B.

BABILLARD [ le ] ( espèce IX ), tome 2, page 283.

BACHANTISME, tome 2, page 240.

BACHIE ( rap. B ), tome 3, page 343.

BAILLEMENT gravidique ( sorte 12 ), tome 3, page 104.

BARAQUETTE [ la ], tome 3, page 410.

BERIBERI ( espèce III ), tome 2, page 251.

— Epileptiforme ( s-esp. I ), tome 2, page 252.

— Indien, tome 2, page 252.

BERLUE ( espèce I ), tome 2, page 264.

( 316 )

- Colorante ( s-esp. VI ), tome 2 , page 266.
- Diminutive ( s-esp. III ), tome 2 , page 267.
- Eloignée ( s-esp. V ), tome 2 , page 267.
- Etincellante ( s-esp. III ), tome 2 , page 265.
- Myode tome 2 , page 265.
- Réticulaire ( s-esp. II ), tome 2 , page 265.
- Scintillante , tome 2 , page 265.
- BERLUES multiplicatives ( s-esp. IV ), tome 2 ,  
page 267.
- BÉTISE , tome 2 , page 245.
- BÉVUE ( espèce II ), tome 2 , page 266.
- Anchyloblépharique ( espèce III ), tome 2 , page  
267.
- Catarrhale ( sorte 4 ), tome 3 , page 414.
- Chancelante ( s-esp. II ), tome 2 , page 266.
- D'éloignement , tome 2 , page 267.
- Ignée ( sorte 5 ), tome 3 , page 171.
- Métamorphosique ( s-esp. I ), tome 2 , page 266.
- Palpébrale ( s-esp. VI ), tome 2 , page 267.
- Paralytique ( sorte 2 ), tome 3 , page 62.
- Par colère ( H. ), tome 2 , page 318.
- Spasmodique ( sorte 9 ), tome 2 , page 330.
- Terrorique ( B. ), tome 2 , page 307.
- BIZARRERIE ( s-esp. I ), tome 2 , page 281.
- BLANCHET , tome 3 , page 422.
- BLENNORRAGIE , tome 3 , page 515.
- Vésicale ( sorte 2 ), tome 3 , page 440.
- BLENNORRHÉE , tome 2 , page 35.
- Atonique ( rap. C ), tome 3 , page 518.
- Erysipélatodée ( s-sortes II ), tome 3 , page 517.
- Lymphatique ( sorte 2 ), tome 1 , page 304.
- Muqueuse ( sorte III ), tome 2 , page 517.

- Syphillitique ( sorte 4 ), tome 3, page 515.
- Ulcéreuse ( s-sorté 1 ), tome 3, page 517.
- BLENNOSE** ( genre XV ), tome 2, page 28.
- Apyrétique ( espèce II ), tome 2, page 31.
- Fluante ( espèce III ), tome 2, page 35.
- Pyrétique ( espèce I ), tome 2, page 29.
- Pyrétique continue ( s-esp. I ), tome 2, page 30.
- Pyrétique intermittente ( s-esp. II ), tome 2, page 31.
- Pyrétique quarte ( variété B ), tome 2, page 31.
- Pyrétique quotidienne ( variété A ), tome 2, page 31.
- Pyrétique rémittente ( s-esp. I I ), tome 2, page 31.
- BLÉPHAROPHTALMIE**, tome 3, page 183.
- BLÉPHAROPTOSE** ( espèce I ), tome 4, page 227.
- Ectropium ( s-esp. III ), tome 4, page 227.
- Entropium ( s-esp. IV ), tome 4, page 227.
- Vrai ( s-esp. I ), tome 4, page 227.
- Lagophtalme ( s-esp. II ), tome 4, page 227.
- BLÉSITÉ**, tome 2, page 70.
- BOTRYON** ( D. ), tome 4, page 92.
- BOUDEUR** [ le ] ( s-esp. III ), tome 2, page 289.
- BOUDIN** ( variété B ), tome 4, page 222.
- BOUFFISSURE** vermineuse ( sorte 2 ), tome 2, page 98.
- BOUGNIAS**, tome 3, page 197.
- BOULIMIE** ( espèce I ), tome 2, page 393.
- Addéphagique ( sorte 16 ), tome 2, page 87.
- Canine, tome 2, page 395.
- Cardialgique, tome 2, page 394.
- Cardio-synopale ( s-esp. II ), tome 2, page 394.
- Convulsive ( A. ), tom. 2, page 87.
- Frigorique ( sorte 5 ), tome 1, page 394.
- Des gros mangeurs, tome 2, page 394.
- Emétique ( s-esp. III ), tome 2, page 395.

( 318 )

- Vermineuse ( sorte 23 ), tome 2, page 100, et ( sorte 3 ), tome 2, page 109.
- Voracique ( s-esp. I ), tome 2, page 394.
- BOURDONNEMENT ( espèce IV ), tome 2, page 269.
- Catarrhal ( sorte 6 ), tome 3, page 414.
- Fébrile ( sorte 6 ), tome 3, page 171.
- Oxicœïque ( s-esp. I ), tome 2, page 269.
- Vertigineux, tome 2, page 271.
- BOURGEON, ( s-esp. III ), tome 3, page 343.
- BOURLET, ( variété A ), tome 4, page 222.
- BOURRÚ [ le ] ( s-esp. I ), tome 2, page 289.
- BOUTON ( s-esp. II ), tome 3, page 341.
- BRADYSPERMATISME, tome 2, page 75.
- BRONCHOCÈLE, tome 2, page 247.
- Adipeux ( rap. B ), tome 2, page 248.
- Aqueux ( rap. A ), tome 2, page 248.
- Botrique ( rap. A ), tome 2, page 248.
- Sarcome ( rap. A ), tome 2, page 248, et ( s-esp. VII ), tome 3, page 149.
- Thyroïdien ( rap. B ), tome 2, page 249.
- Venteux ( rap. A ), tome 3, page 132.
- BROUILLON [ le ] ( s-esp. I ), tome 2, page 291.
- BRUISSEMENT d'oreilles ( variété B ), tome 2, page 269.
- BRULURE ( s-esp. V ), tome 3, page 346.
- BRUSQUERIE ( variété D ), tome 2, page 296.
- BRUTALITÉ ( variété C ), tome 2, page 296.
- BUBAS des Espagnols, tome 3, page 501.
- BUBON, ( espèce VIII ), tome 3, page 180.
- Accidentel ( s-esp. II ), tome 3, page 180.
- Judicatoire ( s-esp. III ), tome 3, page 180.
- Primitif ( s-esp. I ), tome 3, page 180.

( 319 )

- Purulent ( rap. A ), tome 4 , page 74.
- Suppuré ( s-esp. IV ), tome 3 , page 180.
- BUBONOCÈLE** ( s-esp. V ), tome 4 , page 204.
- Epiploïque ( synonymie ), tome 4 , page 211.
- Epiploïco-intestinale ( variété L ), tome 4 , page

214.

- Intestinale ( variété A ), tome 4 , page 213.

**BULIME** , tome 2 , page 394.**BULIMIE** acide ( sorte 1 ), tome 2 , page 412.**BUZICAGUA** , tome 3 , page 495.**C.****CACHEXIE** ( espèce I ), tome 1 , page 308.

- Acrimonieuse ( sorte 1 ), tome 1 , page 391.

- Aqueuse ( s-esp. I ), tome 1 , page 309.

- Ictérique , tome 3 , page 473.

- Organique ( s-esp. III ), tome 1 , page 309.

- Séreuse ( s-esp. II ), tome 1 , page 309.

**CACOCYLLIE** , tome 1 , page 309.**CACOCYME** , tome 1 , page 309.**CACOETHES** ( rap. A ), tome 4 , page 94.**CACOPHONIE** , tome 2 , page 73.**CAHUA** , tome 3 , page 495.**CAL** , tome 3 , page 154.**CALCUL** ( genre XLIX ), tome 3 , page 106.

- Biliaire , tome 3 , page 477.

- Formé ( espèce II ), tome 3 , page 111.

- Rénal ( s-esp. I ), tome 3 , page 111.

- Sablonneux ( espèce I ), tome 3 , page 111.

- Sublingual , tome 3 , page 115.

- Vésical ( s-esp. II ), tome 3 , page 112.

**CALIGUE** , tome 3 , page 124.

- Anchyloblépharionique ( sorte 1 ), tome 4 , page 133.
- Arquée ( variété D ), tome 3 , page 125.
- Blanchâtre ( variété A ), tome 3 , page 116.
- Cancéreuse , tome 4 , page 116.
- Cératocélique ( sorte 1 ), tome 4 , page 200.
- D'humeurs , tome 3 , pag 126.
- Filamenteux ( var. B ), , tome 3 , page 124.
- Hypoæme , tome 1 , page 233.
- Hyposphagme ( rap. C ), tome 3 , page 400.
- Laiteux ( variété A ), tome 3 , page 126 , et  
( sorte 5 ), tome 3 , page 464.
- Leucomatique ( variété C ), tome 3 , page 125.
- Membraneuse ( s-esp. II ), tome 3 , page 125.
- Néphélique ( variété A ), tome 3 , page 124.
- Onglélique , tome 3 , page 125.
- Par hypopion ( A ), tome 4 , page 66.
- Rhytidosique ( variété C ), tome 3 , page 126.
- Rouge ( variété B ), tome 3 , page 126.
- Sarcomateuse ( sorte 7 ), tome 3 , page 151.
- Symlépharosique ( sorte 1 ), tome 4 , page 236.
- Tacheté ( s-esp. I ), tome 3 , page 124.
- Vénérien ( sorte 35 ), tome 3 , page 521.
- CALOMNIE ( variété A ), tome 2 , page 305.
- CANCER ( genre LXXXIV ), tome 4 , page 109.
- Aqueux ( D. ), tome 4 , page 38.
- Croûteux ( espèce IV ), tome 4 , page 115.
- Dartreux ( rap. B ), tome 4 , page 113.
- De la matrice ( variété H ), tome 4 , page 117.
- De la verge ( variété K ), tome 4 , page 118.
- Des ramoneurs ( rap. A ), tome 4 , page 115.
- Du mamelon ( A. ), tome 4 , page 117.
- Du pylore ( variété G ), tome 4 , page 117.

— Du

- Du rectum ( variété I ), tome 4, page 117.
- Facial ( variété A ), tome 4, page 116.
- Fongueux ( espèce II ), tome 4, page 113, et  
( rap. A ) tome 4, page 114. — Ou croûteux  
( rap. A ), tome 4, page 115.
- Labial ( variété E ), tome 4, page 116.
- Lingual ( variété D ), tome 4, page 116.
- Mammaire ( variété F ), tome 4, page 116.
- Mammo-hydatidique ( sorte 18 ), tome 2, page 114.
- Nasal ( variété C ), tome 4, page 116.
- Occulte ( variété A ), tome 4, page 118.
- Palpébral ( variété B ), tome 4, page 116.
- Scorbutique ( sorte 33 ), tome 4, page 41, et  
( rap. B ) tome 4, page 114.
- Scrophuleux ( sorte 29 ), tome 1, page 293. —  
A la lèvre inférieure ( A ), tome 1, page  
293. — A la mamelle ( B. ), tome 1, page  
294.
- Spongieux ( espèce III ), tome 4, page 114. —  
De **LANGÉ** ( rap. B ), tome 4, page 114.
- Squirreux ( espèce I ), tome 4, page 113.
- Ulcéré ( variété B ), tome 4, page 118.
- Ulcéreux ( espèce V ), tome 4, page 115.
- Utérin ( variété H ), tome 4, page 117.
- Variqueux des paupières ( variété K ), tome 1, page  
241.
- Véritable ( rap. A ), tome 4, page 113.
- Vérolique ( sorte 45 ), tome 3, page 522.
- CANITIE** ( s-esp. VI ), tome 4, page 173.
- CANITIES** ( synonymie ), tome 4, page 173.
- CAPISTRE**, tome 2, page 355.
- CAPRICE** ( espèce V ), tome 2, page 281.

- CARBUNCULUS** ( espèce IV ), tome 3 , page 184.
- CARCINOME** , tome 4 , page 109 , et ( rap. A )  
tome 4 , page 113.
- Loup ( variété C ), tome 4 , page 118.
  - Myrmécique ( variété B ), tome 4 , page 118.
  - Phagédénique ( rapport B ), tome 4 , page 115.
  - Spongieux ( rap. A ), tome 4 , page 114.
  - Verruqueux ( variété A ), tome 4 , page 118.
- CARDIALGIE** ( s-esp. I ) tome 2 , page 409.
- Arthritique ( sorte 7 ), tome 1 , page 302.
  - Bradypeptique ( sorte 21 ), tome 2 , page 48.
  - Infantile ( variété B ), tome 2 , page 410.
  - Fiévreuse , tome 2 , page 153.
  - Flatulente ( variété A ), tome 2 , page 410.
  - Inflammatoire ( rap. E ), tome 3 , page 426.
  - Lactique ( A. ), tome 2 , page 88.
  - Organique ( variété C ), tome 2 , page 410.
  - Paralytique ( sorte 7 ), tome 3 , page 63.
  - Pituiteuse ( sorte 9 ), tome 2 , page 34.
  - Saburrale ( sorte 18 ), tome 2 , page 87.
  - Sputatoire , tome 2 , page 412.
  - Squirreuse ( sorte 3 ), tome 3 , page 140.
  - Vénénique ( sorte 3 ), tome 3 , page 11.
  - Vermineuse ( B. ), tome 2 , page 126 ; ( sorte 4 )  
tome 2 , page 109 ; et ( sorte 26 ) tome 2 ,  
page 100.
- CARDITIE** traumatique ( sorte 32 ), tome 4 , page  
83.
- CAREBARIE** , tome 2 , page 398.
- CARIE** ( s-gen. IV ), tome 4 , page 104.
- Adipocirée ( espèce III ), tome 4 , page 107.
  - De NOEL [ 6.<sup>e</sup> espèce ], tome 4 , page 107.

- Humide ( espèce I ), tome 4, page 106.
- Hypersarcosique ( s-esp. II ), tome 4, page 106.
- Phagédénique ( s-esp. III ), tome 4, page 106.
- Sèche ( espèce II ), tome 4, page 107.
- Vermoulue ( s-esp. I ), tome 4, page 106.
- CARNOSITÉS ( A. ),** tome 3, page 521.
- CARTILAGES** flottans dans l'articulation du genou,  
tome 3, page 156.
- CARUS ( s-esp. II ),** tome 2, page 364.
- Arthritique ( sorte 9 ), tome 4, page 170.
- Exanthématique ( sorte 10 ), tome 2, page 120.
- Fébrile ( rap. E ), tome 2, page 183.
- Fièvre intermittente ( sorte 8 ), tome 2, page 171.
- Frigorique ( sorte 4 ), tome 1, page 285 et 394.
- Hypochondriaque ( sorte 7 ) tome 2, page 337.
- Hystérique ( sorte 13 ), tome 2, page 342.
- Ischurique ( sorte 4 ), tome 3, page 72.
- Narcotique ( C. ), tome 2, page 232.
- Nystagmique ( sorte 12 ), tome 2, page 330.
- Par la dentelaire ( rap. A ), tome 2, page 132.
- Pathématique ( F. ), tome 2, page 312.
- Pléthorique ( sorte 23 ), tome 1, page 226.
- Solaire ( variété A ), tome 2, page 365.
- Traumatique ( sorte 13 ), tome 4, page 81.
- Variolique ( sorte 7 ), tome 3, page 222.
- Vermineux ( sorte 2 ), tome 2, page 96.
- CATALEPSIE ( espèce VIII ),** tome 2, page 359.
- Ascaridique ( sorte 1 ), tome 2, page 103.
- Délirante ( A. ), tome 2, page 275.
- Hystérique ( sorte 12 ), tome 2, page 342.
- Mélancolique ( rap. A ), tome 2, page 360.
- Ménostatique ( sorte 4 ), tome 3, page 77.

- Méphitique ( rap. B ), tome 2 , page 130.
- Par amour ( F. ), tome 2 , page 312.
- Par la fumée ( rap. B ), tome 2 , page 131.
- Vermineuse ( sorte 15 ) tome 2 , page 99 , et  
( sorte 11 ) tome 2 , page 330.
- CATAPHORE** ( s-esp. I ), tome 2 , page 363 , et  
( rap. A ) tome 2 , page 365.
- Arthritique ( sorte 7 ), tome 4 , page 170.
- Cachectique , tome 1 , page 310.
- Exanthématique ( sorte 5 ), tome 3 , page 337.
- Scorbutique ( sorte 4 ), tome 1 , page 310.
- Somnolente ( rap. A ), tome 2 , page 364.
- CATAPSIXIS** , tome 1 , page 392.
- CATARACTE** , tome 3 , page 117.
- Adhérente ( variété E ), tome 3 , page 121.
- Anti-glaucome ( variété B ), tome 3 , page 120.
- Branlante ( variété A ), tome 3 , page 122. —  
Complicquée de la dissolution du corps vitré  
( variété B ), tome 3 , page 122.
- Caséuse , tome 3 , page 122.
- Consistante ( s-esp. I ), tome 3 , page 120.
- Doublée ( variété B ), tome 3 , page 123.
- Dure , tome 3 , page 120.
- Glaucome ( variété C ), tome 3 , page 121.
- Laitieuse , tome 3 , page 122.
- Noire ( s-esp. IV ), tome 3 , page 123.
- Membraneuse ( s-esp. III ), tome 3 , page 122 ;  
et ( variété C ) tome 3 , page 123. — Secondaire  
( rap. A ), tome 3 , page 123.
- Molle ( s-esp. II ), tome 3 , page 122.
- Muqueuse ( sorte 15 ), tome 2 , page 35.
- Radiée ( variété D ), tome 3 , page 121.

- Secondaire ( variété A ), tome 3, page 123.
- Solide, tome 3, page 120.
- Vraie ( variété A ), tome 3, page 120.
- CATARRHE** ( s-gen. V ), tome 3, page 405.
- Abdominal ( sorte 28 ), tome 2, page 89.
- Bénin ( variété A ), tome 3, page 409.
- De Belle-Isle en mer, tome 3, page 177.
- De la vessie urinaire, tome 2, page 36.
- Des narinnes ( s-esp. I ), tome 3, page 408.
- Des poumons ( s-esp. II ), tome 3, page 409.
- De vessie rhumatismal ( sorte 4 ), tome 3, page 393.
- Epidémique ( espèce II ), tome 3, page 410.
- Fièvre intermittente ( sorte 26 ), tome 2, page 172.
- Putride malin ( sorte 10 ), tome 2, page 208.
- Rougeolique ( rap. C ), tome 3, page 372.
- Sporadique ( espèce I ), tome 3, page 408.
- Suffoquant ( rap. B ) tome 4, page 45.
- CATOCHE**, tome 2, page 353.
- Cervin ( rap. C ), tome 2, page 353.
- Diurne ( variété B ) tome 2, page 365.
- Holotonique ( rap. B ), tome 2, page 353.
- CATOCBUS**, tome 2, page 353.
- CAUSOS** de BOERRHAAVE et de STOLL ( rap. A ), tome 3, page 331.
- CAUSUS** ( rap. AA ), tome 2, page 155, et ( espèce I ) tome 3, page 329.
- Anginique ( s-esp. IV ), tome 3, page 332.
- Erysipélateux ( s-esp. III ), tome 3, page 331.
- Gastrique ( s-esp. I ), tome 3, page 329.
- Péripleurmonique ( s-esp. V ), tome 3, page 332.
- Sanguin ( s-esp. II ), tome 3, page 331.

CÉCITÉ de la Syrie et de l'Égypte ( B. ) tome 3, page 58.

CEINTURE [ la ] ( s-esp. I ), tome 3, page 484.

— Erysipélateuse, tome 3, page 337.

CÉNOSE ( genre XLV ), tome 3, page 91.

— Coryzée ( espèce III ), tome 3, page 94.

— Enurésique ( espèce VI ), tome 3, page 96.

— Epiphorique ( espèce II ), tome 3, page 93.

— Galactique ( espèce V ), tome 3, page 96.

— Ptyalismique ( espèce IV ), tome 3, page 95.

CÉPHALALGIE ( espèce I ), tome 2, page 397

et 398.

— Catarrhale ( sorte 14 ), tome 3, page 415.

— Fébrile ( sorte 20 ), tome 3, page 173.

— Fièvre intermittente ( sorte 18 ), tome 2, page 172.

— Fixe ( s-esp. III ), tome 2, page 399.

— Gravative ( s-esp. I ), tome 2, page 398.

— Hémorroïdale ( sorte 4 ), tome 1, page 267.

— Hystérique ( sorte 20 ), tome 2, page 343.

— Intermittente, tome 2, page 144.

— Menstruelle ( sorte 6 ), tome 3, page 77.

— Métallique ( sorte 7 ), tome 3, page 17.

— Par l'odeur du *dracontium fetidum*, tome 3, page

35.

— Pléthorique ( sorte 32 ), tome 1, page 227.

— Pulsative ( rap. A ), tome 2, page 399.

— Rhumatique ( rap. B ), tome 2, page 399.

— Syphilitique ( sorte 14 ), tome 3, page 519.

— Tensive ( s-esp. II ), tome 2, page 399.

— Trichomatique ( sorte 1 ), tome 3, page 192.

— Variqueuse ( variété G ), tome 1, page 241.

— Vermineuse ( sorte 24 ), tome 2, page 100.

CÉPHALÉE, tome 2, page 399.

- Fiévreuse , tome 2 , page 145.
- Mélancolique ( sorte 3 ) , tome 2 , page 259.
- Séréuse ( rap. A ) , tome 2 , page 399.
- Syphilitique ( sorte 15 ) , tome 3 , page 519.
- CÉPHALITIE** , tome 3 , page 189.
- Cérébelleuse ou du cervelet ( rap. B ) , tome 4 ,  
page 65.
- Egyptienne ( rap. C ) , tome 3 , page 191.
- Spontanée ( rap. A ) , tome 3 , page 190 , et  
( rap. A ) , tome 4 , page 65.
- Syriise ( rap. B ) , tome 3 , page 190.
- Vermineuse ( variété A ) , tome 3 , page 330.
- CÉPHALITIS** épidémique de 1510 , tome 2 , page  
185.
- CEPHALOCÈLE** ( espèce I ) , tome 4 , page 197.
- CERATOÈLE** ( synonymie ) , tome 4 , page 199.
- CERCOSE** , tome 4 , page 231.
- CHAGRIN** ( variété B ) , tome 2 , page 301.
- Comme passion ( variété B 2.<sup>o</sup> ) , tome 2 , page 301.
- Par caractère ( variété B 1.<sup>o</sup> ) , tome 2 , page 301.
- Prolongé , tome 2 , page 51.
- CHARBON** ( espèce I ) , tome 4 , page 58.
- CHARLATAN** [ le ] ( s-esp. II ) , tome 2 , page 287.
- CHARTRE** [ la ] ( synonymie ) , tome 4 , page 154.
- CHAUDE-PISSE** , tome 3 , page 515.
- CHEMOSIS** ( rap. C ) , tome 3 , page 192 et 400.
- CHICANEUR** [ le ] ( s-esp. I ) , tome 2 , page 290.
- CHIMÉRIQUE** [ le ] ( variété C ) , tome 2 , page 298.
- CHLOROSE** ( genre XIII ) , tome 1 , page 344.
- Adultique ( s-esp. II ) , tome 1 , page 347.
- Amoureuse ( variété A ) , tome 1 , page 347.
- Blanche ( rap. A ) , tome 1 , page 347.

- Des femmes grosses ( sorte 7 ), tome 3, page 103.
- Infantile ( rap. A ), tome 1, page 347.
- Hydrothorachique ( sorte 3 ), tome 1, page 326.
- Puérique ( espèce I ), tome 1, page 347.
- Rachialgique ( sorte 1 ), tome 3, page 17, et  
( rap. A ), tome 3, page 21.
- Tachetée ( sorte 1 ), tome 3, page 500.
- Vermineuse ( sorte 4 ), tome 2, page 98.
- Verte ( variété B ), tome 1, page 347.
- CHOLÉLITHE**, tome 3, page 477.
- CHOLÉLITHIS**, tome 3, page 477.
- CHOLERA**, tome 2, page 412.
- Arthritique ( sorte 14 ), tome 4, page 170.
- Puérique ( sorte 4 ), tome 3, page 479.
- Sec par les champignons ( B. ), tome 2, page 239.
- CHOLÉRÉE** ( s-esp. I ), tome 2, page 412.
- Crapuleuse ( sorte 20 ), tome 2, page 88.
- Fièvre intermittente ( sorte 19 ), tome 2, page 172.
- Hydatidique ( sorte 11 ), tome 2, page 112.
- Indienne ( rap. B ), tome 2, page 414.
- Inflammatoire ( rap. A ), tome 3, page 430.
- Intermittente, tome 2, page 154.
- Mortelle ( I. ), tome 2, page 12. — Par colère  
( P. ), tome 2, page 318.
- Par des œufs de brochet et de barbeau, par le noir  
de la sèche ( s-esp. VII ), tome 3, page 52.
- Sèche, tome 2, page 418.
- Spontanée ( rap. A ), tome 2, page 414.
- Vermineuse ( sorte 27 ), tome 2, page 100.
- CHOLOSE** ( rap. A ), tome 4, page 240.
- CHORÉE** ( espèce II ), tome 2, page 250.
- Instable ( sorte 5 ), tome 3, page 393.

- Intermittente (sorte 3), tome 2, page 171.
- Précipitée (rap. C), tome 2, page 373.
- Tétanique (s-esp. I), tome 2, page 251.
- Vermineuse (sorte 7), tome 2, page 98.
- CHUTE de matrice (rap. A), tome 3, page 117.
- CILLOSE (rap. E), tome 2, page 373.
- CIRSOÈLE (B.), tome 1, page 239, et tome 3, page 84.
- CITTA, tome 1, page 346.
- CLAPIER (variété A), tome 4, page 98.
- CLAQUEMENT des dents (rap. A), tome 2, page 164.
- CLAUDICATION des enfans par hydropisie dans l'articulation coxo-fémorale (sorte 1), tome 1, page 343.
- Vermineuse (sorte 41), tome 2, page 101.
- CLIGNOTEMENT (rap. F), tome 2, page 373.
- CLONISME (genre XXXIII), tome 2, page 367.
- CLOU, tome 2, page 400; tome 3, page 154; (espèce I) tome 3, page 182; et (variété F) tome 4, page 100.
- CLUNÉSIE, tome 2, page 420, et tome 3, page 181.
- COCHEMAR (espèce VIII), tome 2, page 173.
- Hypochondriaque (sorte 5), tome 2, page 337.
- Pléthorique (sorte 19), tome 1, page 226.
- Stomacal (sorte 8), tome 2, page 86.
- Tiercenaire (sorte 4), tome 2, page 171.
- Vermineux (sorte 10), tome 2, page 98.
- CŒLIAQUE, tome 3, page 89.
- Chyleuse (rap. A), tome 3, page 90.
- Laitieuse (rap. B), tome 3, page 90.

- Purulente ( rap. C ), tome 4, page 65.
- COILOMA ( B. ), tome 4, page 92.
- COLÈRE ( espèce VII ), tome 2, page 317.
- COLÉRIQUE [ le ], tome 2, page 317.
- COLIQUE ( s-esp. III ), tome 2, page 416.
- Accidentelle ( A. ), tome 2, page 88.
- Adiapneustique ( sorte 17 ), tome 3, page 415.
- Biliéuse ( variété B ), tome 2, page 418.
- Calculeuse ( rap. C ), tome 3, page 116.
- Entérocélique ( sorte 1 ), tome 4, page 216.
- De Poitou, tome 3, page 13.
- Des nourrissons, tome 2, page 417.
- Des vaisseaux ( rap. E ), tome 3, page 116.
- D'indigestion ( A. ), tome 2, page 88.
- Ecouelleuse ( sorte 10 ), tome 1, page 291.
- Fièvre intermittente ( sorte 20 ), tome 2, page 172.
- Fiévreuse, tome 2, page 154.
- Frigorique ( sorte 7 ), tome 1, page 394.
- Gravidique ( sorte 18 ), tome 3, page 104.
- Hémorroïdale ( sorte 5 ), tome 1, page 267.
- Hystérique ( sorte 25 ), tome 2, page 343.
- Inflammatoire ( rap. B ), tome 3, page 430.
- Japonnaise ( rap. C ), tome 3, page 16.
- Lactique, tome 2, page 410.
- Laponique ( sorte 2 ), tome 2, page 104.
- Méconiale ( B. ), tome 2, page 88.
- Menstruelle ( sorte 8 ), tome 3, page 77.
- Mésentérique ( sorte 2 ), tome 3, page 146, et  
( rap. A ) tome 4, page 72.
- Métallique, tome 3, page 13.
- Minérale, tome 3, page 13.
- Néphrétique, tome 3, page 107.

- Nerveuse ( rap. F ), tome 3, page 16.
- Pancréatique ( rap. A ), tome 4, page 72.
- Par méditation trop forte ( rap. H ), tome 2, page 294.
- Phlogistique ( rap. A ), tome 3, page 431.
- Pituiteuse ( sorte 10 ), tome 2, page 34.
- Pléthorique ( sorte 36 ), tome 1, page 228.
- Pulsatique ( sorte 12 ), tome 1, page 248.
- Sèche ( rap. D ), tome 3, page 16.
- Spasmodique ( variété A ), tome 2, page 417.
- Squirreuse ( sorte 3 ), tome 3, page 145.
- Stercorale ( sorte 21 ), tome 2, page 88.
- Végétale, tome 3, page 13.
- Venteuse ( variété C ), tome 2, page 418, et ( sorte 3 ) tome 3, page 135.
- Vermineuse ( sorte 29 ), tome 2, page 100.
- COLLIER [ le ] ( s-esp. II ), tome 3, page 481.
- COLOBOME ( A. ), tome 4, page 77, et ( rap. A ) tome 4, page 240.
- COLPOCÈLE ( synonymie ), tome 4, page 206.
- COMBUSTION ( genre V ), tome 1, page 282.
- Fulminique ( rap. B ), tome 3, page 347.
- COMBUSTURA, tome 3, page 346.
- CONCRÉTION ( genre L. ), tome 3, page 113, et ( synonymie ) tome 4, page 235.
- Abdominale ( espèce V ), tome 3, page 116.
- Buccale ( espèce III ), tome 3, page 114.
- Capitique ( espèce I ), tome 3, page 114.
- Lacrymale ( espèce II ), tome 3, page 114.
- Pectorale ( espèce IV ), tome 3, page 115.
- Utérine ( espèce VI ), tome 3, page 117.

- CONDYLOME** ( rap. A ), tome 3, page 152, et  
( s-esp. I ), tome 3, page 153.
- Clou ( espèce VII ), tome 3, page 154.
  - Ficus ( s-esp. II ), tome 3, page 153.
  - Ganglion ( rap. A ), tome 3, page 154.
  - Poireau ( s-esp. IV ), tome 3, page 153.
  - Thymus ( s-esp. III ), tome 3, page 153.
  - Tilus ( espèce VI ), tome 3, page 154.
- CONSOMPTION** érotique ( rap. A ), tome 3, page  
67.
- Pulmonaire de MAY ( A. ), tome 2, page 48.
  - Syphilitique ( A. ), tome 3, page 520.
- CONSTIPATION** constrictive, tome 2, page 327.
- Hypochondriaque ( sorte 11 ), tome 2, page 338.
  - Hystérique ( sorte 31 ), tome 2, page 344.
  - Inflammatoire ( rap. C ), tome 3, page 430.
  - Obstructive ( sorte 22 ), tome 2, page 88, et  
( sorte 13 ) tome 3, page 18.
  - Par foiblesse ( sorte 25 ), tome 2, page 49.
  - Par rigidité du canal intestinal ( variété A ), tome  
3, page 73.
- CONSTITUTION** écrouelleuse, tome 1, page 289.
- Epidémique de Bologne 1753 ( rap. D ), tome 3,  
page 413.
  - Epidémique de Jena, en 1791 ( variété E ), tome  
2, page 323.
- CONTINUE** non putride ( rap. H ), tome 3, page  
167.
- CONTRACTURE** ( espèce V ), tome 2, page 357.
- Ankylosique ( sorte 3 ), tome 4, page 237.
  - Arthritique, tome 1, page 301, et ( sorte 6 ) tome  
4, page 170.

- Bohémique, tome 3, page 17.
- Catarrhale ( sorte 11 ), tome 3, page 415.
- Douloureuse ( sorte 4 ), tome 1, page 301.
- Hypochondriaque ( sorte 6 ), tome 2, page 337.
- Paralytique ( sorte 1 ), tome 3, page 56.
- Rachialgique ( sorte 4 ), tome 3, page 17.
- Scorbutique ( sorte 15 ), tome 4, page 40.
- Spasmodique ( rap. A ), tome 2, page 358.
- Syphilitique ( sorte 10 ), tome 3, page 518.
- CONTRADICTION ( espèce XXI ), tome 2, page 290.
- CONTUSION ( rap. A ), tome 4, page 77.
- CONVOLVULUS, tome 2, page 415.
- CONVULSION ( espèce III ), tome 2, page 371.
- Abdominale ( rap. I ), tome 2, page 374.
- Ergotique ( C. ), tome 2, page 220.
- Fébrile ( sorte 10 ), tome 3, page 172.
- Fièvre intermittente ( sorte 11 ), tome 2, page 171.
- Gravidique ( sorte 11 ), tome 3, page 104.
- Habituelle ( rap. D ), tome 2, page 373.
- Hémitotone ( B. ), tome 2, page 48.
- Hydrocéphalique ( sorte 5 ), tome 1, page 291.
- Inanitive ( sorte 19 ), tome 2, page 48.
- Indienne ( rap. B ), tome 2, page 352.
- Intermittente ( rap. K ), tome 2, page 374.
- Néphralgique ( sorte 6 ), tome 3, page 112.
- Nigellique, tome 2, page 232.
- Onanistique ( A. ), tome 2, page 48.
- Par coup à la tête ( sorte 14 ), tome 4, page 81.
- Par forte méditation ( rap. G ), tome 2, page 294.
- Par piqûre du nerf ( A. ), tome 4, page 82.
- Pléthorique ( sorte 27 ), tome 1, page 227.

- Suédoise ( D. ), tome 2 , page 220.
- Vermineuse ( sorte 19 ), tome 2 , page 99.
- Vulnérable , tome 2 , page 356.
- CONVULSIONS belladoniques ( C. ), tome 2 , page 224.
- Cloniques , tome 2 , page 367.
- Hémorragiques ( rap. D ), tome 1 , page 252.
- Mortelles après une extrême foiblesse des jambes et une cholérée ( D. ), tome 2 , page 226.
- Par haine ( B. ), tome 2 , page 315.
- Par le gordius ( sorte 1 ), tome 2 , page 104.
- COPHOSE ( espèce VI ), tome 3 , page 59.
- Connée ( A. ), tome 3 , page 59.
- Cubique ( B. ), tome 3 , page 151.
- Méatique ( A. ), tome 3 , page 151.
- Pléthorique ( sorte 43 ), tome 1 , page 228.
- Séréuse ( B. ), tome 1 , page 305.
- Stéatomatique ( sorte 5 ), tome 3 , page 151.
- Syphilitique ( sorte 28 ), tome 3 , page 520.
- Tympanique ( B. ), tome 3 , page 59.
- COQUELUCHE , tome 2 , page 378.
- Ecrouelleuse ( sorte 7 ), tome 1 , page 291.
- COQUETTERIE ( s-esp. III ), tome 2 , page 278.
- CORPULENCE , tome 3 , page 466.
- CORS , tome 3 , page 154.
- CORYZA , tome 3 , page 94 , et ( rap. A ) tome 3 , page 407.
- Catarrhal , tome 3 , page 409.
- Fiévreux ( variété B ), tome 3 , page 409.
- Phlegmatorragique ( s-esp. I ), tome 3 , page 95.
- Variolique ( sorte 13 ), tome 3 , page 223.
- Virulente ( sorte 14 ), tome 4 , page 109.

- CORIZE** phlegmatorragique ( rap. A ), tome 2, page 36.
- Sanioso-purulente ( A. ), tome 4, page 109.
- COULEUVRE**, tome 2, page 214.
- COUP DE MARTEAU** (variété C), tome 2, page 269.
- COUPEROSE**, tome 3, page 343.
- COW-POX**, tome 3, page 224.
- CRACHEMENT DE SANG** des praticiens, tome 1, page 257.
- Pléthorique ( sorte 2 ), tome 1, page 230.
- CRAINTE** ( sorte 7 ), tome 2, page 53.
- CRAINTIF** [ le ], tome 2, page 55.
- GRAMPE** ( espèce VI ), tome 2, page 358.
- Idiopathique ( rap. A ), tome 2, page 358.
- CRÉDULITÉ** ( sorte 9 ), tome 2, page 56.
- CRÉTINISME** ( espèce IV ), tome 2, page 246.
- Ecouelleux ( sorte 3 ), tome 1, page 290.
- CRITHE**, tome 3, page 182.
- CROTALE**, tome 2, page 213.
- CROUPS** des Anglais, tome 3, page 419.
- CRUAUTÉ** ( s-esp. II ), tome 2, page 291.
- CRYMODYNIE** ( genre IX ), tome 1, page 295.
- CRYMOSE** ( genre VI ), tome 1, page 284 et 392.
- Générale ( espèce I ), tome 1, page 284 et 393.
- Particulière ( espèce II ), tome 1, page 285 et 394.
- CRIPSORCHIS**, tome 4, page 229.
- CURIOSITÉ** ( espèce XII ), tome 2, page 284.
- CYANOSE** ( genre XIV ), tome 2, page 27.
- CYNANCHE**, tome 3, page 194.
- CYNOREXIE**, tome 2, page 395.
- CYSSOTIS** ( s-esp. II ), tome 3, page 391.

**CYSTALGIE** ( espèce XIV ), tome 2, page 422.

— Vermineuse ( sorte 42 ), tome 2, page 101.

**CYSTIRRAGIE** ( espèce VIII ), tome 1, page 274.

— Forcée ( s-esp. II ), tome 1, page 277.

— Invisible ( s-esp. III ), tome 1, page 390.

— Spontanée ( s-esp. I ), tome 1, page 276. — Ré-

nale ( variété A ), tome 1, page 276. — Ver-

miforme ( var. C ), tome 1, page 276. —

Vésicale ( var. B ), tome 1, page 276.

**CYSTIRRHÉE** ( s-esp. II ), tome 2, page 36.

**CYSTITE** ( s-gen. XI ), tome 3, page 439.

— Par l'action des cantharides ( rap. A ), tome 3,  
page 440.

— Spontanée ( rap. A ), tome 3, page 439.

— Traumatique ( rap. A ), tome 3, page 440.

**CYSTO-BUBONOCÈLE** ( var. A ), tome 4, page  
218.

**CYSTOCÈLE** ( s-esp. XVII ), tome 4, page 217.

— Crurale ( variété B ), tome 4, page 218.

— Entérocélique ( variété F ), tome 4, page 218.

— Epiplocélique ( variété G ), tome 4, page 218.

— Hypogastrique ( variété D ), tome 4, page 218.

— Hystéroptosique ( variété H ), tome 4, page 218.

— Iliaco-ventrale ( variété I ), tome 4, page 219.

— Inguinale ( variété A ), tome 4, page 218.

— Lumbaire ( variété I ), tome 4, page 219.

— Périnéale ( variété C ), tome 4, page 218.

**CYSTO-ÉPIPLOCÈLE** ( synonymie ), tome 4, page  
211.

**CYSTO-HYPOGASTROCÈLE** ( var. D ), tome 4,  
page 218.

**CYSTO-MÉROCÈLE**

( 337 )

CYSTO-MEROCÈLE ( variété B ), tome 4 , page 218.

D.

DACTYLION ( synonymie ), tome 4 , page 255.

DACRYOME , tome 4 , page 233.

DANSE de Saint-Guy , tome 2 , page 250.

— De Saint-Weit , tome 2 , page 250.

DARTRE ( genre LXXIII ), tome 3 , page 480.

— Croûteuse ( espèce IV ), tome 3 , page 483 , et  
( rap. B ) tome 3 , page 483.

— Discrète ( rap. B ), tome 3 , page 482.

— Ecailleuse ( espèce III ), tome 3 , page 482 , et  
( rap. A ) tome 3 , page 483.

— Esthiomène ( rap. A ), tome 3 , page 484.

— Farineuse ( espèce I ), tome 3 , page 480 , et ( rap.  
B ) tome 3 , page 481.

— Lichen ( esp. II ), tome 3 , page 482.

— Miliaire ( rap. A ), tome 3 , page 483.

— Pustuleuse ( rap. B ), tome 3 , page 483 , et ( rap.  
D ) tome 3 , page 483.

— Rongeante ( rap. C ), tome 3 , page 484.

— Scrophuleuse ( sorte 30 ), tome 1 , page 294.

— Sèche ou farineuse ( rap. A ), tome 3 , page 482.

— Serpigo ( rap. C ), tome 3 , page 483.

— Simple ( rap. A ), tome 3 , page 481.

— Vive ( espèce V ), tome 3 , page 484 , et ( rap. B )  
tome 3 , page 484.— Zoster ( rap. B ), tome 3 , page 337 , et ( s-esp.  
I ) tome 3 , page 484.

DASYTE ( variété D ), tome 3 , page 403.

DÉBILITÉ fébrile ( rap. A ), tome 4 , page 45.

Tom. IV.

22

- DÉBILITÉS, tome 2, page 41.
- DÉCIMAINÉ ( variété F ), tome 2, page 170.
- DÉCRÉPITUDE ( genre XC ), tome 4, page 177.
- DÉDAIN ( s-esp. IV ), tome 2, page 277.
- DÉFAUT de sang, tome 2, page 27.
- DÉFIANCE ( sorte 8 ), tome 2, page 55.
- DÉFORMATION ( genre XCVII ), tome 4, page 239.
- DÉGLUTITION difficile ( rap. A ), tome 2, page 406.
- DÉGOUT de soi-même et des choses, tome 2, page 258.
- Fébrile, tome 3, page 171.
- DÉLIRE ( espèce I ), tome 2, page 345.
- Agité ( s-esp. II ), tome 2, page 346.
- Belladonique ( A. ), tome 2, page 224.
- Causé par l'amour de la gloire ( A. ), tome 2, page 312.
- Causé par une grande joie ( D. ), tome 2, page 310.
- Cicutique, tome 2, page 226.
- Critique, tome 3, page 172.
- Daturique ( B. ), tome 2, page 222.
- Doux ( s-esp. I ), tome 2, page 346.
- Fébrile ( rap. B ), tome 2, page 79, et ( sorte 8 ) tome 3, page 172.
- Fiévreux ( sorte 6 ), tome 2, page 171.
- Fort ( s-esp. II ), tome 2, page 346.
- Fulminique ( rap. E ), tome 3, page 347.
- Hystérique ( sorte 9 ), tome 2, page 342.
- Jusquiamique ( B. ), tome 2, page 223.
- Mortel, tome 2, page 231.

- Opilique ( B. ), tome 2 , page 231.
- Pathématique ( rap. A ), tome 2 , page 369.
- Puerpérique ( sorte 21 ), tome 1 , page 226, et  
( sorte 1 ), tome 3 , page 462.
- Témulent , ( C. ), tome 2 , page 240.
- Tranquille ( s-esp. I ), tome 2 , page 346.
- DEMANGEAISON** brûlante , tome 3 , page 361.
- DÉMENCE** ( genre XX ), tome 2 , page 241.
- A la suite d'une fièvre quarte ( variété A ), tome  
2 , page 245.
- Calculeuse ( rap. A ), tome 3 , page 114.
- Daturique ( A. ), tome 2 , page 222.
- Hydatidique ( sorte 6 ), tome 2 , page 112.
- Illusoire ( rap. A ), tome 2 , page 254.
- Microcéphalique , tome 2 , page 246.
- Morosique ( rap. A ), tome 2 , page 245.
- Par un coup ( A. ), tome 4 , page 81.
- Par une maladie externe de la tête ( variété B );  
tome 2 , page 245.
- Par une tumeur comprimant le cerveau ( sorte 3 ),  
tome 3 , page 150.
- Proprement dite , tome 2 , page 244.
- Psorique ( sorte 7 ), tome 2 , page 119.
- Rachialgique ( sorte 2 ), tome 3 , page 17.
- Sénile ( variété C ), tome 2 , page 245.
- Séreuse ( sorte 3 ), tome 1 , page 305.
- Traumatique ( sorte 8 ), tome 4 , page 81.
- DÉMONOMANIE** ( espèce III ), tome 2 , page 261.
- Cardiognmique ( sorte 5 ), tome 1 , page 247.
- Fanatique ( A. ), tome 2 , page 300.
- Hystérique ( rap. B ), tome 2 , page 261.
- Indienne ( A. ), tome 2 , page 231.

- Simulée ( B. ), tome 2, page 301.
- Sortilégique ( rap. A ), tome 2, page 261.
- Vampirique ( rap. C ), tome 2, page 261.
- Vermineuse ( sorte 8 ), tome 2, page 98.

DENTS [ manque des ] ( synonymie ), tome 4, page 240.

DENTITION difficile, tome 2, page 403.

DÉPOT, tome 4, pages 62 et 64.

DERMISME ( genre LXXXIX ), tome 4, page 175.

DERTRE, tome 3, page 480.

DESCALORINÈSES ( s-classe II ), tome 1, page 283.

DÉSESPOIR ( variété D ), tome 2, page 302.

DESIR ( s-esp. IV ), tome 2, page 313.

DÉSOLATION ( variété C ), tome 2, page 302.

DÉSOXIGÉNÈSES ( s-classe I ), tome 2, page 26.

DESQUAMMATION ( A. ), tome 3, page 328.

DESSECHEMENT, tome 3, page 67.

DEUTERIE, tome 3, page 83.

DÉVIATION ( s-genre VI ), tome 4, page 226.

DIABÈTES ( genre XLVI ), tome 3, page 97.

— Anglais, tome 3, page 98.

— Arthritique ( sorte 25 ), tome 4, page 171.

— Fiévreux ( sorte 29 ), tome 2, page 49.

— Hystérique ( sorte 33 ), tome 2, page 344.

— Insipide ( sorte 25 ), tome 2, page 331.

— Légitime ( A. ), tome 2, page 331.

— Sucré ( rap. A ), tome 3, page 98.

— Vineux ( F. ), tome 2, page 240.

DIAIRE, tome 3, page 164.

DIAPHRAGMESIE ( s-genre XV ), tome 3, page

- Phlegmonodée ( espèce I ), tome 3, page 453.
- Phlogosée ( espèce II ), tome 3, page 453. —
- Lente ( s-esp. I ) tome 3, page 453.
- DIAPHRAGMITIE, tome 3, page 452.
- DIAPHTORE ( variété C ), tome 2, page 85.
- DIARRHÉE ( genre XLIV ), tome 3, page 87.
- Acrisique ( sorte 26 ), tome 2, page 49.
- Alimentéuse ( espèce III ), tome 3, page 90.
- Aqueuse ( sorte 7 ), tome 1, page 303.
- Arthritique ( sorte 22 ), tome 4, page 171.
- Biliense ( sorte 5 ), tome 3, page 479.
- Charnue ( rap. C ), tome 3, page 437.
- Chilienne ( rap. D ), tome 3, page 430.
- Cholériodique ( sorte 1 ), tome 1, page 274.
- Cholique, tome 2, page 412.
- Chymeuse ( espèce II ), tome 3, page 89. — De
- TRALLES, tome 3, page 90.
- Cœliaque muqueuse ( A. ), tome 2, page 35.
- Colliquative ( variété A ), tome 2, page 391, et
- ( rap. C ), tome 4, page 46.
- Dans les exanthèmes ( rap. B ), tome 3, page 89.
- Des fièvres aiguës ( rap. A ), tome 3, page 88.
- Excrémentieuse ( espèce I ), tome 3, page 87.
- Fébrile ( rap. C ), tome 2, page 79.
- Fiévreuse ( sorte 23 ), tome 2, page 172.
- Fulminante ( I. ), tome 3, page 348.
- Hépatirrhéique ( D. ), tome 2, page 43.
- Hydatidique ( sorte 13 ), tome 2, page 113.
- Hypercathartique ( sorte 24 ), tome 2, page 331.
- Hypochondriaque ( sorte 12 ), tome 2, page 338.
- Lactique ( A. ), tome 2, page 88.
- Noire ( espèce V ), tome 3, page 91.

- Par colère ( T. ), tome 2, page 318.
- Par la dentition ( sorte 3 ), tome 2, page 404.
- Par méditation trop forte ( rap. L ), tome 2, page 294.
- Pituitaire, tome 2, page 35.
- Pituiteuse ( sorte 14 ), tome 2, page 35.
- Sanguinolente ( espèce IV ), tome 3, page 91.
- Sérouse ( s-esp. III ), tome 2, page 88.
- Stercoreuse ( sorte 23 ), tome 1, page 88.
- Variolique ( sorte 11 ), tome 3, page 223.
- Vermineuse ( sorte 34 ), tome 2, page 101.
- Vulgaire ( s-esp. I ), tome 3, page 88.
- DIASTASE ( s-genre II ), tome 4, page 190.
- Epiphysique ( espèce V ), tome 4, page 191.
- Harmonique ( espèce III ), tome 4, page 191.
- Raphique ( s-esp. II ), tome 4, page 191.
- Synchronosique ( espèce VI ), tome 4, page 191.
- Synosthéochondrique ( espèce IV ), tome 4, page 191.
- Violente ( espèce I ), tome 4, page 191.
- DIATHÈSE écrouelleuse, tome 1, page 289.
- Inflammatoire ( espèce I ), tome 3, page 164.
- DIDYMALGIE ( espèce XVIII ), tome 2, page 425.
- DIGITIE ( rap. B ), tome 2, page 358, et tome 3, page 67.
- DILATATION anévrismatique de l'oreillette gauche du cœur ( A. ), tome 2, page 317.
- DIPLOPIA ( sorte 5 ), tome 3, page 171.
- DIPLOPIE témulente ( B. ), tome 2, page 240.
- Traumatique ( sorte 26 ), tome 4, page 83.
- DISSIPATION ( s-esp. II ), tome 2, page 279.
- DISSIPÉ [ le ] ( espèce VIII ), tome 2, page 282.

- DISTICHAISE** ( variété A ), tome 4, page 172.
- DISTOCIE** pathématique ( F. ), tome 2, page 310.
- DISTRACTION** ( espèce VII ), tome 2, page 282.
- DISTRIX** ( s-esp. III ), tome 4, page 173.
- DIURÈSE**, tome 2, page 331.
- DOUBLE-QUARTE** ( rap. D ), tome 2, page 166.
- DOUBLE-TIERCE** ( rap. A ), tome 2, page 157.
- Intermittente ( variété A ), tome 2, page 157. —
- Syncopale, tome 2, page 158.
- Rémittente ( variété B ), tome 2, page 158.
- DOULEUR** à la suite d'une piqure faite par une guêpe ( B. ), tome 3, page 50.
- Avec foiblesse dans une grande articulation ( rap. A ), tome 3, page 156.
- Céphalique, tome 2, page 398.
- D'accouchement ( sorte 21 ), tome 3, page 105.
- Des dents, tome 2, page 404.
- De tête, tome 2, page 398.
- Fulgurique ( A. ), tome 3, page 348.
- Fulminique ( rap. H ), tome 3, page 348.
- Podagrique et arthritique ( rap. A ), tome 4, page 166.
- Spastico-flatulente des premières voies ( rap. A ), tome 2, page 397.
- DOULEURS**, tome 2, page 396.
- Arthritiques ( sorte 4 ), tome 3, page 360.
- Goutteuses ( rap. A ), tome 4, page 168.
- DURETÉ** ( s-esp. I ), tome 2, page 291.
- DYONYSISCUS** ( synonymie ), tome 4, page 176.
- DYONYSISME** ( s-esp. I ), tome 4, page 176.
- DYSCINIE** ( genre XXII ), tome 2, page 249.
- DYSECŒE** ( espèce VIII ), tome 2, page 67.
- Cachectique ( sorte 2 ), tome 1, page 310.

- Fébrile ( sorte 18 ), tome 3, page 173.
- Fistulo-tympanique ( sorte 6 ), tome 4, page 108.
- Hydro-tympanique ( rap. A ), tome 1, page 323.
- Monaute ( variété B ), tome 2, page 67.
- Myringique ( variété A ), tome 2, page 67.
- Par dureté de la membrane du tympan ( C. ),  
tome 3, page 59.
- Saburrale ( sorte 3 ), tome 2, page 86.
- Syphilitique ( sorte 5 ), tome 3, page 518.
- DYSENTERIE** ( s-genre X ), tome 3, page 432. —
- Atrabilaire, tome 2, page 197.
- Automnale de Newcastle ( rap. F ), tome 2, page 198.
- Du pays de Zell ( rap. K ), tome 2,  
page 198.
- Bénigne spontanée ( sorte 51 ), tome 1, page 229.
- Bilioso-contagieuse de Nimegue, en 1736 ( rap. B )  
tome 2, page 197.
- Blanche ( rap. A ), tome 3, page 437.
- Cataméniale ( sorte 2 ), tome 1, page 255.
- Cathartique ( sorte 28 ), tome 2, page 332.
- Charnue ( rap. B ), tome 3, page 437.
- Chronique ( espèce III ), tome 3, page 437.
- De la campagne de 1792, tome 2, page 197.
- De la province du Maine en 1779 ( rap. H ), tome  
2, page 198.
- De Manheim, en 1778-79-80 ( rap. P ), tome 2,  
page 199.
- Des camps ( rap. A ), tome 2, page 197.
- Des femmes grosses ( rap. A ), tome 3, page 437.
- Des Indes ( rap. E ), tome 2, page 197, et  
( rap. O ), tome 2, page 199.
- Epidémique ( rap. D ), tome 2, page 197.

De Tyrnaw ( rap. G ), tome 2 , page 198.

- Equinoxiale ( sorte 31 ), tome 2 , page 49.
  - Hépatique , tome 3 , page 91.
  - Hydrophobique ( rap. C ), tome 2 , page 272.
  - Indolente ( espèce IV ), tome 3 , page 438.
  - Miliaire ( sorte 11 ), tome 3 , page 383.
  - Non-sanglante ( espèce II ), tome 3 , page 437.
  - Parisienne ( s-esp. II ), tome 3 , page 88.
  - Rhumatique ( sorte 13 ), tome 3 , page 394.
  - Rouge ou sanguine ( A. ), tome 1 , page 229.
  - Sanglante ( espèce I ), tome 3 , page 437.
  - Scorbutique ( C. ), tome 2 , page 43 , et ( A. )  
tome 2 , page 49.
  - Syphilitique ( sorte 42 ), tome 3 , page 522.
  - Vermineuse ( rap. B ), tome 3 , page 437.
- DYSESTHÉSIE** ( espèce XI ), tome 2 , page 75.
- DYSGEUSTIE** ( espèce VII ), tome 2 , page 66.
- DYSHÆMORRHÉE** , tome 3 , page 74.
- Acidique ( s-esp. II ), tome 3 , page 74.
  - Astringente ( s-esp. III ), tome 3 , page 74.
  - Hirudinale ( s-esp. IV ), tome 3 , page 74.
  - Pléthorique ( sortes 45 et 46 ), tome 1 , page  
228.
  - Spasmodique ( sorte 22 ), tome 2 , page 331.
  - Suppléée ( s-esp. I ), tome 3 , page 74.
- DYSLOCHIE** , tome 3 , page 83.
- DYSMÉNORRHEE** , tome 3 , page 75.
- DYSODIE** ( espèce I ), tome 4 , page 49.
- Axillaire ( s-esp. V ), tome 4 , page 50.
  - Corporelle ( s-esp. IX ), tome 4 , page 51.
  - Du pied , tome 4 , page 51.

- Gastrique ( s-esp. III ), tome 4, page 50.
- Génitale ( s-esp. VI ), tome 4, page 51.
- Pédiqne ( s-esp. VIII ), tome 4, page 51.
- Pulmonique ( s-esp. IV ), tome 4, page 50.
- Rhinique ( s-esp. I ), tome 4, page 50.
- Rhinostenote, tome 4, page 50.
- Stomacale, tome 4, page 50.
- Stomatique ( s-esp. II ), tome 4, page 50.
- Uréique ( s-esp. VII ), tome 4, page 51.
- Urineuse, tome 4, page 51.
- DYSOPIE**, ( espèce V ), tome 2, pages 64 et 266.
- Colorique ( s-esp. III ), tome 2, page 66.
- Luminique ( sorte 3 ), tome 2, page 329.
- Myopique ( s-esp. I ), tome 2, page 64.
- Nyctalopique ( s-esp. II ), tome 2, page 65.
- DYSOSMIE** ( espèce VI ), tome 2, page 66.
- DYSPEPSIE** ( s-esp. VI ), tome 2, page 85, et ( variété B ), tome 2, page 85.
- Nicotianique ( B. ), tome 2, page 223.
- Par foiblesse ( sorte 12 ), tome 2, page 46.
- Vermineuse ( sorte 6 ), tome 2, page 98.
- DYSPERMATISME** ( esp. X ), tome 2, page 74.
- Apractode ( rap. A ), tome 2, page 75.
- Epileptique ( rap. C ), tome 2, page 371.
- Hyperthonique ( s-esp. I ), tome 3, page 78.
- Muqueux ( sorte 2 ), tome 2, page 32.
- Nouveux ( sorte 4 ), tome 4, page 232.
- Préputial ( sorte 5 ), tome 4, page 232.
- Refluant ( s-esp. II ), tome 3, page 79.
- Séreux ( rap. B ), tome 2, page 75.
- Urétral ( sorte 3 ), tome 4, page 232.
- DYSPHAGIE**, tome 2, page 405.

- Canine (D.), tome 3, page 151.
  - Daturique (F.), tome 2, page 222.
  - De déglutition (rap. B), tome 2, page 406.
  - Des nourrissons (sorte 19), tome 4, page 82.
  - Ecrouelleuse (sorte 9), tome 1, page 291.
  - Hydrophobique (sorte 1), tome 3, page 44.
  - Hypostaphylique (sorte 1), tome 4, page 222.
  - Hystérique (sorte 22), tome 2, page 343.
  - Labarique (sorte 1), tome 4, page 240.
  - Mécanique (rap. A), tome 2, page 406.
  - Nauséuse (A.), tome 2, page 331; (rap. A) tome 2, page 384; (sorte 1) tome 3, page 418; et (sorte 9), tome 4, page 108.
  - Œsophagienne (A.), tome 3, page 151.
  - Paralytique (sorte 6), tome 3, page 62.
  - Par sécheresse (D.), tome 2, page 224.
  - Pharyngée (sorte 4), tome 3, page 151.
  - Sarcomateuse (B.), tome 3, page 151.
  - Sèche (C.), tome 2, page 223.
  - Siccative (C.), tome 2, page 223, et (sorte 16) tome 3, page 173.
  - Spasmodique (sorte 17), tome 2, page 331.
  - Squirreuse (C.), tome 3, page 151.
  - Tussiculeuse (rap. A), tome 2, page 377; et tome 3, page 63.
  - Valsalvienne (sorte 1), tome 4, page 190.
- DYSPHONIE** (esp. IX), tome 2, page 67.
- Paraphonique (s-esp. II), tome 2, page 73.
  - Psellique (s-esp. I), tome 2, page 68.
  - Saburrale (sorte 4), tome 2, page 86.
- DYSPNÉE**, tome 2, page 383.
- Aortique (sorte 1), tome 4, page 231.

- Anévrismatique ( sorte 9 ), tome 1, page 248.
  - Calculeuse ( rap. F ), tome 3, page 115.
  - Cardiaque ( rap. A ), tome 3, page 128.
  - Fulminique ( rap. G ), tome 3, page 348.
  - Galénique ( A. ), tome 4, page 82.
  - Gastrocélique ( sorte 3 ), tome 4, page 208.
  - Gravidique ( sorte 14 ), tome 3, page 104.
  - Hydatidique ( sorte 10 ), tome 2, page 112.
  - Physconique ( sorte 3 ), tom. 3, page 131.
  - Pituiteuse ( C. ), tome 2, page 33.
  - Pléthorique ( sorte 30 ), tome 1, page 217.
  - Pneumatique ( sorte 1 ), tome 3, page 133.
  - Polypeuse ( sorte 1 ), tome 3, page 159.
  - Rachitique ( sorte 4 ), tome 4, page 158.
  - Scorbutique ( sorte 16 ), tome 4, page 140.
  - Splénique ( sorte 4 ), tome 3, page 143.
  - Stomacale ( rap. F ), tome 3, page 117, et ( rap. B ), tome 4, page 72.
  - Suffocante ( sorte 3 ), tome 3, page 158.
  - Traumatique ( sorte 17 ), tome 4, page 82.
  - Tuberculeuse ( rap. C ), tome 2, page 389.
  - Tympanitique ( sorte 2 ), tome 3, page 135.
- DYSTOCIE**, tome 3, page 79.
- Angustique ( s-esp. I ), tome 3, page 81.
  - Atocique ( s-espèce VII ), tome 3, page 83.
  - Des hydriques ( s-esp. VIII ), tome 3, page 83.
  - Due à quelque vice de position du fœtus ( s-esp. III ); tome 3, page 82.
  - Molaire, tome 3, page 101.
  - Par la mort du fœtus ( s-esp. V ), tome 3, page 83.
  - Par une mole ( s-esp. VI ), tome 3, page 83.
  - Secondinique ( s-esp. IV ), tome 3, page 82.

- Volumineuse ( s-esp. II ), tome 3, page 82.
- DYSURIE**, tome 2, page 422.
- Ardente, tome 2, page 423.
- Atrétique ( sorte 1 ), tome 4, page 234.
- Calculeuse ( sorte 7 ), tome 3, page 112.
- Caronculeuse ( A. ), tome 3, page 519.
- Chronique ( sorte 8 ), tome 1, page 302, ( et variété D ), tome 2, page 423.
- Coïtique ( variété B ), tome 2, page 423.
- Cystocélique ( sorte 1 ), tome 4, page 225.
- Diabétique ( rap. C ), tome 3, page 99.
- Hémorrhoidale ( sorte 3 ), tome 1, page 238.
- Hystérique ( sorte 27 ), tome 2, page 344.
- Hystéritique ( sorte 2 ), tome 3, page 210.
- Hystéroloxique ( sorte 1 ), tome 4, page 228.
- Insectique ( C. ), tome 2, page 126.
- Muqueuse ( rapp. A ), tome 2, page 37.
- Néonymphale ( variété C ), tome 2, page 423.
- Néphralgique ( A. ), tome 3, page 113.
- Primitive ( variété A ), tome 2, page 423.
- Rachialgique ( sorte 8 ), tome 3, page 18.
- Vénérienne ( sorte 18 ), tome 3, page 519.

## E.

- ECCHYMOSE** ( espèce I ), tome 1, page 231.
- Cornéique ( variété B ), tome 1, page 232.
- Forcée ( s-esp. II ), tome 1, page 232.
- Fulminique ( rap. A ), tome 3, page 347.
- Hémorragique ( sorte 1 ), tome 1, page 230.
- Hyposphagme, tome 1, page 232.
- Oculaire ( variété C ), tome 1, page 233.

- Palpébrale ( variété A ), tome 1, page 232.
- Par un coup ( rap. A ), tome 1, page 232.
- Spontanée ( s-esp. I ), tome 1, page 232.
- Ungulaire ( variété D ), tome 1, page 233.
- ECHAUBOULURE** ( rap. C ), tome 3, page 345.
- Blanche ( variété B ), tome 3, page 345.
- Rouge ( variété A ), tome 3, page 345.
- ECHAUFFEMENT**, tome 1, page 282.
- ECLAMPSIE** ( espèce I ), tome 2, page 367.
- Dolorique ( sorte 5 ), tome 2, page 397.
- Exanthématique ( sorte 8 ), tome 3, page 222.
- Fiévreuse ( A. ), tome 2, page 47 ; tome 2, page 162 ; et ( sorte 9 ), tome 2, page 171.
- Hydrocéphalique ( sorte 2 ), tome 3, page 443.
- Inanitique ( sorte 18 ), tome 2, page 47.
- Ischurique ( sorte 5 ), tome 3, page 73.
- Œnanthique ( B. ), tome 2, page 226.
- Otagique ( sorte 2 ), tome 3, page 405.
- Par la dentition ( sorte 2 ), tome 2, page 404.
- Phellandrique ( C. ), tome 2, page 226.
- Pléthorique ( sorte 25 ), tome 1, page 227.
- Puerpérique ( rap. A ), tome 2, page 368, et ( rap. C ), tome 3, page 81.
- Saburrale ( sorte 12 ), tome 2, page 87.
- Traumatique ( sorte 15 ), tome 4, page 82.
- Typhode ( B. ), tome 2, page 220.
- Vermineuse ( sorte 17 ), tome 2, page 99.
- ECPLEXIS**, tome 2, page 297.
- ECROUELLES**, tome 1, page 287.
- Indolentes ( degré 1 ), tome 1, page 290.
- Sourdement douloureuses ( degré 2 ), tome 1, page 290.

- Suppurées ( degré 3 ), tome 1 , page 290.
- ECTHYMATES** ( rap. C ), tome 3 , page 342.
- ECTOPIE** ( genre XCI ), tome 4 , page 186.
- ECTROPIUM**, tome 4 , page 227.
- EDÉMATIE** hystérique ( sorte 2 ), tome 2 , page 341.
- Menstruelle ( sorte 1 ), tome 3 , page 76.
- EFFÉMINÉ**, tome 2 , page 57.
- EFFROI** ( variété C ), tome 2 , page 306.
- EFFRONTERIE** ( espèce XVII ), tome 2 , page 287.
- EFFUSION** de pus , tome 4 , page 62.
- ELCOSE** ( genre LXXXIII ), tome 4 , page 74 , et ( rap. A ), tome 4 , page 106.
- ELÉPHANTIASÉ** alopécienne ( s-esp. II ), tome 3 , page 499.
- De HENSLER , tome 3 , page 499.
- De Syrie ( rap. A ), tome 3 , page 495.
- Indienne ( rap. C ), tome 3 , page 500.
- Légitime ( rap. A ), tome 3 , page 499.
- Léonine ( s-esp. III ), tome 3 , page 499 , et ( rap. A ), tome 3 , page 500.
- Lépreuse ( s-esp. I ), tome 3 , page 499.
- Molle ( s-esp. IV ), tome 3 , page 500.
- Noire ( rap. D ), tome 3 , page 495.
- Norvégienne ( rap. B ), tome 3 , page 499.
- Orientale ( rap. A ), tome 3 , page 498.
- Ou lèpre des Arabes , tome 3 , page 497.
- Savanienne ( rap. B ), tome 3 , page 500.
- Syphilitique ( sorte 43 ), tome 3 , page 522.
- Tyrienne ( rap. A ), tome 3 , page 500.
- ELÉPHANTIASIS**, tome 3 , page 497.

EMPHYSÈME

- Alopécia ( rap. A , tome 3 , page 499.
- ELÉPHANTIE des Arabes ( A. ) , tome 3 , page 501.
- ELODE , tome 2 , page 155.
- ELYTRALGIE ( espèce XVI ) , tome 2 , page 424.
- ELYTROCÈLE ( s-esp. VIII ) , tome 4 , page 206.
- ELYTROPTOSE , tome 4 , page 226.
- ELYTRORRHÉE ( s-esp. V ) , tome 2 , page 39.
- EMPHASE ( variété B ) , tome 2 , page 298.
- EMPHRAXIE ( genre LIV ) , tome 3 , page 137.
- Epiploïque ( espèce VII ) , tome 3 , page 144.
- Excroissante ( s-genre II ) ; tome 3 , page 148.
- Gastro-pylorique ( espèce III ) , tome 3 , page 139.
- Hépatique ( espèce V ) , tome 3 , page 141.
- Intestinale ( espèce VIII ) , tome 3 , page 144.
- Libre ( s-genre V ) , tome 3 , page 155. — Dans l'œsophage ( espèce I ) , tome 3 , page 155.
- Dans la vessie ( espèce IV ) , tome 3 , page 156. — Dans les articulations ( espèce VI ) , tome 3 , page 156. — Dans les bronches ( espèce II ) , tome 3 , page 155. — Dans l'estomac ( espèce III ) , tome 3 , page 156.
- Mésentérique ( espèce IX ) , tome 3 , page 145.
- Métrique ( espèce XI ) , tome 3 , page 147.
- Organique ( s-genre I ) , tome 3 , page 139.
- Ovaïrique ( espèce XII ) , tome 3 , page 147.
- Pancréatique ( espèce IV ) , tome 3 , page 141.
- Parotidique ( espèce I ) , tome 3 , page 139.
- Rénale ( espèce X ) , tome 3 , page 146.
- Splénique ( espèce VI ) , tome 3 , page 143.
- Tuberculeuse ( s-genre III ) , tome 3 , page 152.
- Verruqueuse ( s-genre IV ) , tome 3 , page 154.

## EMPHYSÈME

- EMPHYSÈME** ( sorte 2 ), tome 2 , page 205 , et  
tome 3 , page 132.
- Des poumons , tome 3 , page 133.
  - Fébrile , tome 3 , page 132.
  - Spontané , tome 3 , page 132.
- EMPORTÉ** [ l' ] , ( variété B ) , tome 2 , page 319.
- EMPROSTOTHONE** vermineux ( A ) , tome 2 , page  
99.
- EMPYÈME** ( variété B ) , tome 4 , page 70.
- Diaphragmatique ( sorte 1 ) , tome 3 , page 453.
  - Intercostale ( A ) , tome 3 , page 451.
  - Péripleurétique ( rap. A ) , tome 4 , page 71.
  - Pleurétique ( sorte 4 ) , tome 3 , page 451.
  - Vomiqué ( rap. B ) , tome 4 , page 71.
- ENCAUMA** ( C. ) , tome 4 , page 92.
- ENCAUSIS** , tome 3 , page 346.
- ENCÉPHALITIE** ( espèce I ) , tome 3 , page 180.
- Lente ( s-esp. II ) , tome 3 , page 191.
  - Vive ( s-esp. I ) , tome 3 , page 190.
- ENCEPHALITIS** , tome 3 , page 189.
- ENCÉPHALOCÈLE** ( synonymie ) , tome 4 , page 197.
- Hydro-cystique ( s-esp. II ) , tome 4 , page 198.
  - Hydrorachique ( s-esp. III ) , tome 4 , page 198.
  - Simple ( s-esp. I ) , tome 4 , page 198.
- ENCHANTIS** , tome 3 , page 152.
- ENDURCISSEMENT** du tissu cellulaire , tome 2 ,  
page 286.
- ENFLURE** par de fortes méditations ( rap. A ) , tome  
2 , page 293.
- ENGELURE** ( s-esp. VIII ) , tome 3 , page 350.
- ENROUEMENT** ( rap. A ) , tome 2 , page 73 , et  
( rap. C ) , tome 3 , page 407.

( 354 )

- ENTÉRALGIE ( espèce IX ), tome 2 , page 412.
- ENTÉRANGIEMPHRAXIS , tome 3 , page 144.
- ENTÉRITE ( s-gen. IX ), tome 3 , page 427.
- Entérocélique ( sorte 4 ), tome 4 , page 216.
- Iliaque ( rap. A ), tome 3 , page 429.
- Mésentérique ( rap. A ), tome 3 , page 457.
- ENTÉRITIS , tome 3 , page 427.
- ENTÉROCÈLE ( s-esp. XV ), tome 4 ; page 212.
- Appendiculaire ( var. C ), tome 4 , page 213.
- Bubonorixe ( variété Y ), tome 4 , page 216.
- Complète ( variété B ), tome 4 , page 213.
- Constrictoire ( variété D ), tome 4 , page 213.
- Crurale ( variété E ), tome 4 , page 213.
- Cystocélique ( variété O ), tome 4 , page 214.
- Des grandes lèvres ( variété B ), tome 4 , page 213.
- Epiploïco-complète ( variété M ), tome 4 , page 214.
- Epiploïco-crutale ( variété R ), tome 4 , page 215.
- Epiploïco-incomplète ( variété L ), tome 4 , page 214.
- Epiploïco-ischiatique ( variété T ), tome 4 , page 215.
- Epiploïco-ombilicale ( variété V ), tome 4 , page 215.
- Epiploïco-ovalaire ( variété S ), tome 4 , page 215.
- Epiploïco-vaginale ( variété U ), tome 4 , page 215.
- Epiploïco-ventrale ( variété X ), tome 4 , page 215.

( 355 )

- Epiploïque des grandes lèvres ( variété M ), tome 4, page 214.
- Hydrocélisque ( variété Q ), tome 4, page 215.
- Incomplète ( variété A ), tome 4, page 212.
- Inguinale ( variété A ), tome 4, page 212.
- Ischiatique ( variété G ), tome 4, page 213.
- Ombilicale ( variété I ), tome 4, page 213.
- Ovale ( variété F ), tome 4, page 213.
- Parorchidiale ( variété P ), tome 4, page 214.
- Partielle ou constrictoire ( variété D ), tome 4, page 213.
- Vaginale ( variété H ), tome 4, page 213.
- Ventrals ( variété K ), tome 4, page 214.
- ENTÉRO-BUBONOCÈLE ( variété A ), tome 4, page 213.**
- ENTÉRO-CYSTOCÈLE ( variété F ), tome 4, page 218.**
- ENTÉROMPHALE ( variété I ), tome 4, page 213.**
- ENTÉRO-MEROCÈLE ( var. E ), tome 4, page 213.**
- ENTÉRO-MÉSOCOLOCÈLE ( var. N ), tome 4, page 214.**
- ENTÉRO-OSCHÉOCÈLE ( variété B ), tome 4, page 213.**
- ENTERRAGIE ( espèce IV ), tome 1, page 262, et ( sorte 3 ), tome 2, page 43.**
- Hépatique ( s-sortes 1 ), tome 2, page 43.
- Méléanique ( s-sortes 2 ), tome 2, page 43.
- ENTERORRAGIE, tome 1, page 262.**
- ENTÊTEMENT ( s-esp. I ), tome 2, page 285.**
- ENTHOUSIASME ( s-esp. IV ), tome 2, page 297.**
- ENTORSE avec inflammation ( s-esp. II ), tome 2, page 426.**

( 356 )

- Avec irritation ( s-esp. I ), tome 2 , page 425.
- Avec suppuration ( s-esp. III ), tome 2 , page 426.
- ENTORSES , tome 2 , page 425.
- ENTROPIUM , tome 4 , page 227.
- ENURÈSE , tome 3 , page 96.
- Calculeuse ( sorte 10 ), tome 3 , page 113.
- Cataméniale ( sorte 16 ), tome 3 , page 78.
- Infantile ( sorte 28 ), tome 2 , page 49.
- Fistulique ( sorte 1 ), tome 4 , page 103.
- Gravidique ( s-esp. I ), tome 3 , page 97 , et ( sorte 23 ), tome 3 , page 105.
- Hernieuse ( sorte 3 ), tome 4 , page 216.
- Menstruelle ( s-esp. III ), tome 3 , page 97.
- Paralytique ( sorte 9 ), tome 3 , page 63.
- Puerpérique ( s-esp. II ), tome 3 , page 97.
- Sparganosique ( sorte 4 ), tome 3 , page 464.
- ENVIE ( variété B ), tome 2 , page 315 , et ( rap. A ), tome 3 , page 338.
- EPHELIE ( rap. B ), tome 3 , page 338 , et ( rap. D ) tome 3 , page 344.
- Jaune ( variété D ), tome 3 , page 339.
- Rousse ( variété C ), tome 3 , page 339.
- Solaire ( variété A ), tome 3 , page 338.
- EPHELIS , tome 3 , page 338 , et ( sorte 28 ) tome 3 , page 41.
- EPHÉMÈRE , tome 3 , page 164.
- Anniversaire ( s-esp. IV ), tome 3 , page 165.
- Britannique ( rap. B ), tome 2 , page 196.
- Dichomène ( s-esp. V ), tome 3 , page 165.
- Frigorique ( sorte 8 ), tome 1 , page 394.
- Laitieuse ( rap. A ), tome 3 , page 459.
- Menstruelle ( sorte 11 ), tome 3 , page 77.

- Nauséative ( rap. B ), tome 2 , page 80.
- Par la chaleur ( s-esp. I ), tome 3 , page 165.
- Par la phlogose ( s-esp. II ), tome 3 , page 165.
- Pléthorique ( sorte 48 ), tome 1 , page 228.
- Suette ( rap. A ), tome 2 , page 196.
- EPHIALTE, tome 2 , page 273.
- Hydrocéphalique ( sorte 1 ), tome 3 , page 443.
- EPHIDROSE fiévreuse , tome 2 , page 155.
- Latérale ( rap. B ), tome 3 , page 92.
- Par forte méditation ( rap. M ), tome 2 , page 294.
- Sanguine ( sorte 27 ), tome 2 , page 49.
- Scorbutique ( sorte 25 ), tome 4 , page 40.
- Spontanée ( rap. A ), tome 3 , page 92.
- Syncoptique ( rap. C ), tome 2 , page 59.
- Urineuse ( sorte 6 ), tome 3 , page 73.
- EPHIDROSIQUE, tome 3 , page 92.
- EPIALE ( rap. E ), tome 2 , page 162.
- EPIAN des Français , tome 3 , page 513.
- EPICAUMA ( C. ) tome 4 , page 92.
- EPIDÉMIE de Chemnitz en Saxe ( rap. A ), tome 3 , page 357.
- De Gottingue en 1785 ( rap. H ), tome 3 , page 358.
- De Grenoble , en l'an VIII , tome 2 , page 186.
- De Jena , en 1791 , tome 2 , page 194.
- De New-Castle-sur-Tyne , en 1778 ( rap. G ), tome 3 , page 358.
- Des troupes françaises après le siège de Gibraltar , ( rap. BB ), tome 2 , page 194.
- De 1776 et 1777 à Copenhague ( rap. C ), tome 3 , page 357.

- De 1777 à 1778 à Copenhague ( rap. D ), tome 3, page 358.
- De 1778 à Birmingham ( rap. E ), tome 3, page 358.
- De 1779 à Coventry ( rap. F ), tome 3, page 358.
- De 1783-84 à 1788, à Philadelphie ( rap. K ), tome 3, page 358.
- De 1786 à 1787, à Hohenstein ( rap. I ), tome 3, page 358.
- De 1790, à Stockholm ( rap. L ), tome 3, page 350.
- D'Heidelberg, en 1775 et 1776 ( rap. B ), tome 3, page 357.
- Du Bas-Poitou ( rap. G ), tome 3, page 414.
- Du cercle d'Iglaw, en 1771-72, tome 2, page 174.
- Dysentérique ( rap. N ), tome 2, page 199. — De 1779 ( rap. I ), tome 2, page 198. — De 1779, ( rap. M ), tome 2, page 199.
- Maligne de Breslaw ( rap. S ), tome 2, page 192.
- EPIDOSE**, tome 4, page 230.
- EPIGASTROCÈLE** ( s-esp. I ), tome 4, page 202.
- Epiploïque ( synonymie ), tome 4, page 211.
- EPILEPSIE** ( espèce II ), tome 2, page 368.
- Aprécursive ( s-esp. II ), tome 2, page 371.
- Arthritique, tome 1, page 301.
- Cachectique ( sorte 5 ), tome 1, page 310.
- Cérébrale, tome 2, page 371.
- Des enfans, tome 2, page 367.
- Du poumon de VANHELMONT, tome 2, page 382.
- Essentielle ( rap. A ), tome 2, page 370.
- Fiévreuse ( sorte 10 ), tome 2, page 171.
- Hydatidique ( sorte 8 ), tome 2, page 112.

## ( 359 )

- Miliaire ( sorte 16 ), tome 3, page 383.
- Muco-Trachéale ( sorte 6 ), tome 2, page 33.
- Par effroi ( B. ), tome 2, page 306.
- Par masturbation ( sorte 1 ), tome 3, page 86.
- Par méditation trop forte ( rap. F ), tome 2, page 294.
- Pathématique ( rap. C ), tome 2, page 309.
- Pédisymptomatique, tome 2, page 371.
- Pléthorique ( sorte 26 ), tome 1, page 227.
- Précurtive ( s-esp. I ), tome 2, page 371.
- Psorique ( sorte 11 ), tome 2, page 120.
- Rachialgique ( sorte 5 ), tome 1, page 301.
- Sacrée d'HIPPOCRATE ( sorte 5 ), tome 1, page 305.
- Stomacale ( sorte 13 ), tome 2, page 87.
- Sympathique ( sorte 13 ), tome 2, page 330.
- Tæniaire ( sorte 2 ), tome 2, page 109.
- Traumatique ( sorte 16 ), tome 4, page 82.
- Utérine ( sorte 15 ), tome 2, page 342.
- Vermineuse ( sorte 18 ), tome 2, page 99.
- EPINYCTIDE ( rap. B ), tome 3, page 344.
- Prurigineuse, tome 3, page 342.
- Vulgaire ( variété A ), tome 3, page 345.
- EPIPHORE, tome 3, page 93.
- Calculeuse ( rap. A ), tome 3, page 114.
- Froide ( rap. A ), tome 3, page 94.
- Laitieuse ( s-esp. II ), tome 3, page 94.
- Par ectropium ( sorte 1 ), tome 4, page 227.
- Rhyasique ( s-esp. III ), tome 3, page 94.
- Sanglante ( s-esp. I ), tome 3, page 94.
- EPIPLOCÈLE ( s-esp. XIV ), tome 4, page 210.
- Complète ( variété B ), tome 4, page 211.

- Crurale ( variété C ), tome 4, page 211.
- Cystocélique ( variété G ), tome 4, page 211.
- Hydrocélique ( variété H ), tome 4, page 211.
- Incomplète ( variété A ), tome 4, page 210.
- Inguinale ( variété A ), tome 4, page 210.
- Omphalique ( variété E ), tome 4, page 211.
- Parorchidique ( variété I ), tome 4, page 211.
- Vaginale ( variété D ), tome 4, page 211.
- Ventrale ( variété F ), tome 4, page 211.
- EPIPLO-BUBONOCÈLE ( syn. ), tome 4, page 211.
- EPIPLO-CYSTOCÈLE ( var. G ), tome 4, page 218.
- EPIPLO-ENTÉROCÈLE complète ( variété M ),  
tome 4, page 214.
- Crurale ( variété R ), tome 4, page 215.
- Dorsale ( variété T ), tome 4, page 215.
- Du trou ovale ( variété S ), tome 4, page 215.
- Incomplète ( variété L ), tome 4, page 214.
- Vaginale ( variété U ), tome 4, page 215.
- EPIPLO-ENTÉROMPHALE ( variété V ), tome 4,  
page 215.
- EPIPLO-MEROCÈLE ( syn. ), tome 4, page 211.
- EPILOMPHALE ( synonymie ), tome 4, page 211.
- EPIPLO-OSCHÉOCÈLE ( syn. ), tome 4, page 211.
- EPIPLOÉSIE, tome 3, page 456.
- Vraie ( rap. A ), tome 3, page 457.
- EPILOITIS, tome 3, page 456.
- EPIPLO-EMPHRAXIS, tome 3, page 144.
- EPISCHÈSES, tome 3, page 68.
- EPISCHÉSIE ( genre XLII ), tome 3, page 68.
- Adiapneustique ( espèce I ), tome 3, page 68.
- Agalectique ( espèce II ), tome 3, page 69.
- Aménorrhéique ( espèce VI ), tome 3, page 75.

- Aspermatique ( espèce VII ), tome 3, page 78.
- Constipative ( espèce IV ), tome 3, page 73.
- Dyshæmorrhéique ( espèce V ), tome 3, page 74.
- Dyslochique ( espèce X ), tome 3, page 83.
- Dystocique ( espèce IX ), tome 3, page 79.
- Ischurique ( espèce III ), tome 3, page 70.
- Stérile ( espèce VIII ), tome 3, page 79.
- EPISTAXÉS, tome 1, page 252.
- EPISTHOTONE, tome 2, page 352.
- Vermineux ( B. ), tome 2, page 99.
- EPOUVANTE ( variété A. ), tome 2, page 306.
- EROTOMANIE, tome 2, page 312.
- ERRATIQUE, tome 2, page 168.
- Décimaine, tome 2, page 170.
- Nonaine, tome 2, page 170.
- Octaine, tome 2, page 169.
- Quinte, tome 2, page 169.
- Septaine, tome 2, page 169.
- Vague, tome 2, page 170.
- ERUPTION urticaire, tome 3, page 363.
- ERYSIPÈLE ( genre LXII ), tome 3, page 332,  
tome 3, page 333, et ( rap. B ), tome 3,  
page 362.
- Apyrétique ( s-esp. I ), tome 3, page 334.
- Boutonné ( espèce II ), tome 3, page 335.
- Brûlure ( variété B ), tome 3, page 346.
- Chinoise ( A. ), tome 3, page 25.
- Chronique de TIRIUS, tome 3, page 340.
- Circulaire ou par stries ( s-esp. II ), tome 3,  
page 336.
- Contagieux ( rap. C ), tome 3, page 331.
- De la matrice, tome 3, page 458.

- De la paupière, tome 3, page 402.
- Diffus ( s-esp. I ), tome 3, page 336.
- Nerveux, tome 3, page 340.
- Nu ( espèce I ), tome 3, page 334.
- Par colère ( V. ), tome 2, page 319.
- Par terreur ( variété A ), tome 3, page 335.
- Périodique, tome 3, page 340.
- Pestilentiel ( rap. B ), tome 3, page 331.
- Phlegmoneux, tome 3, page 336.
- Phlegmonodé, tome 3, page 336.
- Pustuleux ( espèce IV ), tome 3, page 337.
- Pyrétique ( s-esp. II ), tome 3, page 335.
- Rose ( rap. B ), tome 3, page 336.
- Suintant ( rap. C ), tome 3, page 336.
- Symptomatique ( sorte 7 ), tome 1, page 310, et  
( sorte 33 ), tome 4, page 83.
- Typhode ( rap. A ), tome 3, page 331.
- Vermineux ( sorte 37 ), tome 2, page 101.
- Vésiculaire ( rap. A ), tome 3, page 336, et  
( espèce III ) tome 3, page 336.
- Zoster ( rap. A ), tome 3, page 336.

**ERYTHEMA VOLATICUM**, tome 3, page 339.

**ERYTHÈME**, tome 3, page 332.

- Brûlure ( variété A ), tome 3, page 346.
- Engelure ( rap. A ), tome 3, page 351.
- Fugace ( rap. B ), tome 3, page 335.
- Par excoriation ( rap. D ), tome 3, page 335.
- Spontanée ( rap. A ), tome 3, page 335.
- Urineuse ( rap. C ), tome 3, page 335.

**ESSERA** ( rap. E ), tome 3, page 362, et ( s-esp.  
II ), tome 3, page 363.

- ESOCHE ( espèce III ), tome 3 , page 153 , et ( rap. D ), tome 3 , page 342.
- ESPÉRANCE ( s-esp. II ), tome 2 , page 310.
- De gagner à la loterie ( variété A ), tome 2 , page 310.
- De gagner au jeu ( var. B ), tome 2 , page 310.
- ESPRIT embrouillé ( variété A ), tome 2 , page 295.
- ESQUINANCIE mercurielle ( rap. B ), tome 3 , page 21.
- Par déglutition ( rap. C ), tome 2 , page 406.
- ETERNUEMENT ( espèce VI ), tome 2 , page 376.
- ETISIE , tome 1 , page 280.
- Des nourrices , tome 3 , page 66.
- Ephidrosique ( variété B ), tome 2 , page 391 ; ( rap. G ), tome 3 , page 66 ; et ( sorte 1 ) tome 3 , page 93.
- Glandulaire ( sorte 14 ), tome 1 , page 291.
- Hydropique ( sorte 3 ), tome 1 , page 333.
- Mésentérique , tome 1 , page 292.
- Séminale ( rap. F ), tome 3 , page 66.
- Suite d'une fièvre ou d'une maladie ( rap. I ), tome 3 , page 66.
- Syphilitique ( sorte 32 ), tome 3 , page 520.
- ETOURDERIE ( var. F ), tome 2 , page 297.
- ETRANGLEMENT vermineux ( sorte 11 ), tome 2 , page 98. — Dans les hernies ( sorte 44 ), tome 2 , page 102.
- EVACUATION de sang par le nez , tome 1 , page 253.
- EVAPORÉ [ 1' ] ( s-esp. II ), tome 2 , page 283.
- EXANIE ( sorte 12 ), tome 3 , page 63 , ( syn. ) tome 4 , page 222.
- Calculeuse ( s-esp. III ), tome 4 , page 223.

- Diarrhéique ( s-esp. II ), tome 4, page 222.
- Dystocique ( s-esp. IV ), tome 4, page 223.
- Paralytique ( s-esp. V ), tome 4, page 223.
- Primitive ( s-esp. I ), tome 4, page 222.
- Traumatique ( s-esp. VI ), tome 4, page 223, et  
tome 3, page 63.
- EXANTHÈME ( rap. A ), tome 3, page 367.
- EXANTHEMIE abdominale ( sor. 29 ), t. 2, p. 89.
- Vermineuse ( sorte 39 ), tome 2, page 101.
- EXARTHÈME ( synonymie ), tome 4, page 187.
- EXCROISSANCES vénériennes ( sorte 48 ), tome 3,  
page 523.
- EXELYTHRE ( espèce III ), tome 4, page 226.
- EXIRIS ( synonymie ), tome 4, page 199.
- EXOCHÈ ( espèce IV ), tome 3, page 153, et ( rap.  
E ), tome 3, page 342.
- EXOCYSTE ( espèce I ), tome 4, page 224.
- Noélienne ( s-esp. I ), tome 4, page 225.
- Solingénienne ( s-esp. II ), tome 4, page 225.
- EXOMÈTRE ( espèce II ), tome 4, page 225.
- EXONEIROSE, tome 3, page 85.
- EXOPHTALMIE ( espèce I ), tome 4, page 219.
- Chancreuse ( s-esp. III ), tome 4, page 220.
- Chemosique ( rap. ), tome 4, page 220.
- Critique ( rap. ), tome 4, page 220.
- Douleuruse ( s-esp. IV ), tome 4, page 220.
- Hydropique ( s-esp. I ), tome 4, page 219.
- Hypopyique ( s-esp. II ), tome 4, page 220.
- Mécanique ( s-esp. V ), tome 4, page 220.
- Paralytique ( sorte 10 ), tome 3, page 63, et  
( s-esp. VI ) tome 4, page 220.
- Purulente ( s-esp. II ), tome 4, page 220.

- Staphylomatique ( sorte 2 ), tome 4, page 200.
- Strangulatoire ( s-esp. VIII ), tome 4, page 220.
- Traumatique ( s-esp. IV ), tome 4, page 220.
- Violentielle ( s-esp. VII ), tome 4, page 220.
- EXOSTOSE ( espèce II ), tome 4, page 160.
- EXPECTORATION ( rap. E ), tome 3, page 408.
- EXTASE ( variété A ), tome 2, page 298.
- Cataleptique ( rap. C ), tome 2, page 360.
- Catoche ( rap. D ), tome 2, page 360.
- Résolue ( A. ), tome 2, page 298.
- EXTRAVAGANT [ 1' ] ( var. D ), tome 2, page 299.

## F.

- FANATISME ( s-esp. V ), tome 2, page 300.
- FANFARONADE ( s-esp. VI ), tome 2, page 280.
- FANTASQUE [ le ] ( s-esp. II ), tome 2, page 281.
- FATUITÉ, tome 2, page 244.
- FAUSSE grossesse ( E. ), tome 2, page 114.
- FAUSSE hydrophobie, tome 2, page 271.
- FAUSSE ouïe, tome 2, page 270.
- FAUSSE péripleuritique de HUXAM ( variété C ),  
tome 3, page 410.
- FAUSSE petite vérole, tome 3, page 224.
- FAUSSE pléthore ( rap. ), tome 1, page 230.
- FAUX Bériberi ( rap. A ), tome 2, page 252.
- FÉBRICULE, tome 4, page 46.
- FÉNEANTISE ( variété A ), tome 2, page 56.
- FEU persan des Indous, tome 3, page 502.
- Volage ( variété E ), tome 3, page 339.
- FIERTÉ, ( s-esp. II ), tome 2, page 276.
- FIÈVRE adéno-méningée continue ( rap. A ), tome  
2, page 30.

- FIÈVRE aiguë sanguine ( rap. C ), tome 3, page  
 167, et ( rap. D ), tome 3, page 167. —  
 Stomachique et intestinale, tome 2, page 77.  
 — Amoureuse, tome 1, page 348.  
 — Angio-ténique, tome 3, page 166.  
 — Aphteuse, tome 3, page 421. — Putride, maligne  
 ( sorte 13 ), tome 2, page 210.  
 — Ardente ( rap. A ), tome 3, page 331. — Gastri-  
 que ( rap. F ), tome 3, page 330.  
 — Arthritique, tome 3, page 389.  
 — Ataxique intermittente néphrétique ( rap. V ), tome  
 2, page 154. — Par contagion ( rap. B ), tome  
 2, page 324.  
 — Avec charbon ( sorte 3 ), tome 2, page 305.  
 — Avec enflure ( rap. E ), tome 3, page 167.  
 — Biliéuse, tome 3, page 469. — Ardente, tome 3,  
 page 329.  
 — Bilioso-pituito-putride ( s-esp. I ), t. 3, page 471.  
 — Blanche, tome 1, page 348.  
 — Bulleuse, tome 2, page 211.  
 — Catarrhale, tome 2, page 29. — Bénigne des Al-  
 lemands, tome 3, page 409. — Epidémique en  
 1782 ( rap. F ), tome 3, page 413. — Ma-  
 ligne de la Franconie, tome 2, page 208. —  
 Maligne des Allemands ( variété C ), tome 3,  
 page 409. — Putride de 1768, t. 2, page 209.  
 — Cérébrale ( rap. A ), tome 2, page 323; et tome  
 3, page 442.  
 — Charbonneuse ( espèce II ), tome 4, page 59.  
 — Cholérique ( rap. D ), tome 3, page 330.  
 — Colliquative ( s-esp. VII ), tome 2, page 199. —  
 De Quesnay ( rap. A ), tome 2, page 199. —

- Primitive ou essentielle, tome 2, page 199.
- FIÈVRE contagieuse ( rap. H ), tome 2, page 184.
- Continente ( rap. F ), tome 3, pages 167 et 169.
- Inflammatoire ( rap. G ), tome 3, page 167. — Putride, tome 2, page 174.
- Continue affectant le cerveau, tome 2, page 188.
- Aiguë ( rap. F ), tome 3, page 169. — Bénigne sporadique ( rap. G ), tome 3, page 169.
- Epidémique de Corck, en 1719 ( rap. K ), tome 2, page 191. — Epidémique en 1665 à 1667 ( var. C ), tome 3, page 170. — Epidémique de 1670 ( variété D ), tome 3, page 170. — Maligne, tome 2, page 174. — Putride, tome 2, pages 79 et 174, et ( rap. D ) tome 3, page 169. — Putride de différentes années ( variété E ), tome 3, page 170.
- Critique simple ( rap. H ), tome 3, page 170.
- De camp pétéchiale épidémique ( rap. R ), tome 2, page 192.
- De Lausanne, tome 2, page 155.
- De prison ( variété B ), tome 2, page 187.
- Dépuratoire de 1661 à 1664 ( variété B ), tome 3, page 170.
- De rhume, tome 3, page 409.
- De Smyrne, tome 2, page 163.
- Double-tierce ( s-esp. III ), tome 2, page 157.
- Des camps ( variété D ), tome 2, page 189.
- Des prisons et des hôpitaux, tome 2, page 187.
- De vaisseau ( variété C ), tome 2, page 188.
- D'hôpital ( variété A ), tome 2, page 186. — De la campagne de 1792, t. 2, p. 187.

- FIÈVRE** du plus mauvais caractère en 1711 ( var. A ) ;  
 tome 2, page 322.
- Du Sénégal ( rap. D ), tome 2, page 185.
  - Dysentérique ( s-esp. VI ), tome 2, page 196, et  
 ( rap. C ), tome 2, page 197. — Putride ma-  
 ligne, tome 2, page 198.
  - Endémique et épidémique de Corck en 1708, 1718  
 et suiv. ( rap. I ), tome 2, page 191.
  - Engourdisante ( rap. B ), tome 4, page 47.
  - Ephémère, tome 3, page 164.
  - Epiale de GALIEN ( sorte 1 ), tome 2, page 31.
  - Epidémique de Leipsick, en 1718 ( rap. H ),  
 tome 2, page 191. — De 1788 dans le pays  
 de Cornouailles ( variété F ), tome 3, page  
 170. — D'Oxford, en 1785, tome 2, page 323.
  - Epiptoiique, tome 3, page 456.
  - Erratique ( s-esp. V ), tome 2, page 168.
  - Erysipélateuse ( sorte 8 ), tome 2, page 208.
  - Essereuse de ZACUTUS LUSITANUS ( rap. H ), tome  
 3, page 377.
  - Gangreneuse ( espèce I ), tome 4, page 56.
  - Gastrique, tome 2, page 77. — Aiguë, tome 2,  
 page 78.
  - Habituelle, tome 1, page 281.
  - Hectique, tome 1, page 281. — Pestilentielle ( rap.  
 D ), tome 2, page 184, et ( rap. I ), tome  
 4, page 48.
  - Hémiplégique, tome 2, page 162.
  - Hémorroïdale ( sorte 7 ), tome 1, page 267.
  - Hydrocéphalique, tome 3, page 442.
  - Iliaque d'HOFFMAN, tome 3, page 429.
  - Inflammatoire ( rap. K ), tome 3, page 167. —  
 Putride

( 369 )

- Putride ( sorte 4 ), tome 2, page 105. — Simple ( rap. I ), tome 3, page 167.
- FIÈVRE** intermittente ataxique céphalalgique ( rap. N ), tome 2, page 153. — Convulsive, tome 2, page 152. — Délirante ( rap. G ), tome 2, page 151. — Dyspnéique, tome 2, page 153. — Epileptique, tome 2, page 152. — Hydrophobique ( rap. S ), tome 2, page 154. — Péripneumonique, tome 2, page 155.
- Jaune ( s-esp. IV ), tome 2, page 194. — Des Indes occidentales ( rap. B ), tome 2, page 195.
- D'Espagne ( rap. C ), tome 2, page 195.
- Laitieuse, tome 3, page 460.
- Latique [ cachée ], tome 2, page 29.
- Lente, tome 1, page 280. — Nerveuse ( rap. G ), tome 2, page 184; tome 4, page 46; et ( rap. D ), tome 4, page 48. — Ou hectique nerveuse de 1711 ( rap. A ), tome 4, page 49.
- Lenticulaire de BONNET ( rap. B ), tome 3, page 373. — Punctulaire ou péticulaire ( rap. A ), tome 2, page 191.
- Lochiale ( sorte 2 ), tome 1, page 389.
- Lymphatique première, tome 2, page 146.
- Maligne ( s-esp. II ), tome 2, page 184, et ( rap. F ), tome 4, page 48. — Avec redoublemens soporeux ( rap. H ), tome 2, page 162. — Cacoëthe ou de mauvais caractère ( rap. E ), tome 4, page 47. — Des vieillards ( rap. H ), tome 2, page 162. — Du camp français en Bohême ( rap. Q ), tome 2, page 192. — Epidémique à Coutances, en 1772-73 ( rap. AA ), tome 2, page 193. — Hectique ( rap. A ), tome

Tom. IV,

24

2, page 183. — *In specie* (rap. G), tome 4, page 48. — Lente (rap. H), tome 4, page 48. — Pestilentielle, tome 2, page 185. — Pétéchiiale de la Bourgogne, en 1761-62 (rap. X), tome 2, page 193. — Pétéchiiale de Rintel, en 1741 (rap. P), tome 2, page 192. — Pétéchizante de 1698 (rap. F), tome 2, page 191.

**FIÈVRE** méésentérique, tome 2, page 77. — Pituiteuse (variété A), tome 2, page 30.

— Morbilleuse, tome 3, page 370.

— Mortelle (U.), tome 2, page 318.

— Nerveuse, tome 2, page 321. — Adynamique, tome 4, page 46. — Adynamique épidémique (s-esp. II), tome 4, page 49. — Adynamique sporadique (s-esp. I), tome 4, page 48. — Aiguë par contagion (rap. A), tome 2, page 324. — Epidémique à Halle, en 1787 (variété C), tome 2, page 322. — Pétéchiiale à Schelestat, en 1790-91, tome 2, page 194, et (rap. B), tome 4, page 49.

— Nosocomiale, tome 2, page 187.

— Par un violent desir du coït (s-esp. III), tome 3, page 165.

— Pemphigode, tome 2, page 211.

— Pestilentielle (rap. B), tome 2, page 183; (rap. A), tome 2, page 185; tome 2, page 200; et (rap. C), tome 4, page 47. — Des Egyptiens (rap. B), tome 2, page 185. — Maligne (rap. C), tome 2, page 185. — Maligne de 1643, tome 2, page 185. — Sans venin (rap.

- C ), tome 2 , page 183 , et ( rap. D ) , tome 4 , page 47 .
- FIÈVRE** pétéchiale ( -s-esp. III ) , tome 2 , page 190 , et tome 3 , page 365 . — Algidique , tome 2 , page 150 . — De Breslaw , en 1699 ( rap. G ) , tome 2 , p. 191 . — De 1740-41 , dans la Hesse ( rap. N ) , tome 2 , page 192 . — Epidémique de Cologne , en 1672 ( rap. C ) , tome 2 , page 191 . — Epidémique de Cremona , en 1734 ( rap. L ) , tome 2 , page 191 . — Epidémique de Leipsick , en 1757 ( rap. Y ) , tome 2 , page 193 . — Epidémique de Modène , en 1692 ( rap. E ) , tome 2 , page 191 . — Epidémique de Presbourg , en 1683 ( rap. D ) , tome 2 , page 191 . — Epidémique de quelques endroits d'Angleterre ( rap. O ) , tome 2 , page 192 . — Epidémique de Vienne , en 1757 ( rap. T ) , tome 2 , page 193 . — Epidémique en Allemagne , pendant les années 1760 et suivantes ( rap. U ) , tome 2 , page 193 . — Nerveuse de Dijon , en 1760-61 ( rap. Z ) , tome 2 , page 193 . — Vraie , tome 3 , page 366 .
- Pétéchizante de Pétersbourg , en 1735 ( rap. M ) , tome 2 , page 192 .
- Péticulaire , tome 3 , page 366 . — De Trente en 1591 ( rap. B ) , tome 2 , page 191 .
- Phlegmatique , tome 2 , page 29 . — Périodique , tome 2 , page 145 .
- Phlycténique ( sorte 14 ) , tome 2 , page 210 .
- Pituiteuse , tome 2 , page 29 . — Putride générale ( A ) ( variété B ) , tome 2 , page 30 .
- Pneumonique , tome 3 , page 198 .

- FIÈVRE** podagrique ( rap. B ), tome 4, page 167.  
 — Pourprée, tome 3, page 366.  
 — Puerpérale, tome 3, pages 428, 456 et 460.  
 — Pulcaire, tome 3, page 366.  
 — Putride, tome 2, pages 77 et 174; et ( s-esp. I ), tome 2, page 183. — Biliéuse de 1769 ( rap. E ), tome 2, page 185. — Contagieuse de 1742, tome 2, page 187. — De 1779-80 ( rap. H ), tome 2, page 185. — Des premières voies, devenue maligne, tome 2, page 80. — Epidémique de Riga ( rap. G ), tome 2, page 185. — Epidémique en 1770 et 1774 ( rap. M ), tome 2, page 184. — Gastrique, tome 2, page 78. — Générale ( rap. A ), tome 4, page 45. — Lymphatico-mésentérique, tome 2, page 29. — Maligne de la Châtellenie de Lille en Flandre, en 1758, tome 2, page 193. — Maligne du département des Basses-Alpes, tome 2, page 186. — Maligne pétéchiale épidémique et contagieuse, tome 2, page 194. — Nerveuse de 1770 ( rap. F ), tome 2, page 185. — Nerveuse des années 1720-21 ( rap. F ), tome 2, page 184. — Pétéchiale, tome 2, page 190. — Primitive, tome 2, page 174. — Sanguine, tome 2, page 174, et ( rap. A ) tome 4, page 45.  
 — Putrido-sanguine ( rap. A ), tome 2, page 174.  
 — Quarte ( s-esp. IV ), tome 2, page 164 — Continue t. 2, p. 167. — Continue maligne avec spasme, tome 2, page 168. — Continue soporeuse, tome 2, page 168. — Intermittente ( variété A ), tome 2, page 164. — Miliaire ( sorte 4 ), tome

- 3, page 382. — Rémittente ( variété B ), tome 2, page 167.
- FIÈVRE** quotidienne ( s-esp. I ), tome 2, page 143.
- Intermittente ( var. A ), tome 2, page 143.
- Rémittente accompagnée d'accidens graves et de l'éruption d'une humeur terreuse par tout le corps ( rap. KK ), tome 2, page 157 — Adéno-méningée ( rap. ), tome 2, page 31, et ( 1.<sup>o</sup> ) tome 2, page 148. — Adynamique ( 2.<sup>o</sup> ), tome 2, page 148. — Ataxique ( 3.<sup>o</sup> ), tome 2, page 148. — Bilieuse inflammatoire, tome 2, page 155. — Bilieuse putride, tome 2, page 163. — Des camps, tome 2, page 155. — Des enfans, tome 2, page 78. — Des pays humides et chauds, tome 2, page 163. — Et intermittente, tome 2, page 163. — Inflammatoire ardente, tome 2, page 155. — Putride bilieuse, tome 2, page 163. — Putride paludique, tome 2, page 163.
- Rhumatismale ( rap. B ), tome 3, page 391.
- Rouge, tome 3, page 354.
- Scarlatine ( rap. A ), tome 3, page 356. — Et fièvre urtiquée ( rap. C ), tome 3, page 362.
- Putride maligne ( sor. II ), tome 2, p. 202.
- Simple continue ( rap. E ), tome 3, page 169.
- Stercorale, tome 2, page 78. — Ardente ( rap. E ) tome 3, page 330.
- Stomachique inflammatoire ( rap. A ), tome 3, page 425.
- Svette ( s-esp. V ), tome 1, page 196.
- Syncopale humorale d'AVICENNE ( sorte 2 ), tome 2, page 31.

**FIÈVRE** synèche avec des vésicules sur la poitrine  
et sur le cou, tome 2, page 211.

— Synoque atrabilieuse du Sénégal, en 1778, tome  
2, page 186. — Putride, tome 2, page 78.

— Fierce (s-esp. II), tome 2, page 146. — Inter-  
mittente (variété A), tome 2, page 146. —

Rémittente (variété B), tome 2, page 148.

— Urtiquée, tome 3, page 361.

— Vermineuse; tome 2, page 95. — Grave (variété  
B), tome 2, page 96. — Légère (variété  
A), tome 2, page 95.

— Vésicatoriée, tome 2, page 211.

— Virginale, tome 1, page 348.

**FIÈVRES** adéno-méningées, tome 2, page 29.

— Adynamiques, tome 2, page 174.

— Ataxiques, tome 2, page 321, et (rap. A), tome  
4, page 47.

— Composées d'une période aiguë, tom. 2, page 142.

— Continentes, tome 2, page 141.

— Continues, tome 2, page 141. — Périodiques, tome  
2, page 141. — Rémittentes, tome 2, page 141.

— Rémittentes proportionnées, t. 2, p. 141.

— Epidémiques de Novi, en 1783, tome 2, page 186.

— Exacerbantes, tome 2, page 141.

— Inflammatoires, tome 3, page 185. — Biliauses,  
(suivies de pemphygue (rap. A), tome 3,  
page 387.

— Intermittentes (rap. A), tome 2, page 135. —  
Dégénérées et fièvre tierce automnale, tome 2,  
page 142. — De Vienne, tome 2, page 156.

— Malignes pétéchiales épidémiques de Stockolm, (rap.  
V), tome 2, page 193.

**FIÈVRES** périodiques pernicieuses , tome 2 , page 148.

— Pestilentielles de la baie d'Atongil au Madagascar ,  
tome 2 , page 163.

— Rémittentes ( rap. B ) , tome 2 , pages 141 et 142.

**FISSURE** ( rap. A ) , tome 4 , page 87.

**FISTULE** ( variété B ) , tome 4 , page 98.

— A l'anüs ( s-esp. III ) , tome 4 , page 101.

— Cysto-intestinale ( variété B ) , tome 4 , page 103.

— Cysto-périnéale ( variété C ) , tome 4 , page 103.

— Cysto-vaginale ( variété A ) , tome 4 , page 103.

— Dans le tissu graisseux de la peau ( variété A ) ,  
tome 4 , page 101.

— De la cornée ( s-esp. II ) , tome 4 , page 101.

— Du rectum ( variété D ) , tome 4 , page 102.

— Du sphincter de l'anüs ( var. B ) , tome 4 , page 102.

— Du tissu cellulaire du rectum ( variété C ) , tome  
4 , page 102.

— Lacrymale ( s-esp. I ) , tome 4 , page 98. — [ 1.<sup>re</sup>  
espèce de M. L'ÉVEILLÉ ] ( variété A ) , tome  
4 , page 99. — [ 2.<sup>e</sup> espèce de M. L'ÉVEILLÉ ]  
( variété B ) , tome 4 , page 100. — [ 3.<sup>e</sup> es-  
pèce de M. L'ÉVEILLÉ ] ( variété C ) , tome  
4 , page 100. — [ 4.<sup>e</sup> espèce de M. L'ÉVEILLÉ ]  
( variété D ) , tome 4 , page 100.

— Périnéo-urétrale ( s-esp. V ) , tome 4 , page 103.

— Urinaire ( s-esp. IV ) , tome 4 , page 103.

**FLATULENCE** ( s-esp. V ) , tome 2 , page 84.

— Accidentelle ( sorte 11 ) , tome 2 , page 46.

— Acide ( variété B ) , tome 2 , page 84.

— Convulsive ( A. ) , tome 2 , page 337.

— Infantile , tome 2 , page 410.

— Hypochondriaque ( sorte 3 ) , tome 2 , page 337.

- Lochiale ( sorte 1 ), tome 3, page 73.
- Nidoreuse ( variété D ), tome 2, page 84.
- FLEURS blanches, tome 2, page 38.
- FLUX désordonné et excessif des menstrues, tome 1, page 268.
- Hémorroïdal, tome 1, page 263. — Excessif, tome 1, page 263.
- Lochial désordonné et excessif, tome 1, page 273.
- Menstruel trop abondant, tome 1, page 268.
- FLUXION catarrhale de la vessie, tome 2, page 36.
- De poitrine, tome 3, page 198.
- FOIBLESSE ( sorte 3 ), tome 2, page 52.
- D'esprit, tome 2, page 52. — Par amour ( variété B ), tome 2, page 52. — Par crainte ( var. A ), tome 2, page 52. — Par indolence ( var. C ), tome 2, page 52.
- FOLETTE [ la ], tome 3, page 410.
- FOLIE, tome 2, page 345.
- Causée par le remord ( C ), tome 2, page 303.
- Impulsive, tome 2, page 245.
- Incohérente, tome 2, page 244.
- Inapte, tome 2, page 244.
- Par amour ( C ), tome 2, page 312.
- FOURBE [ le ] ( s-esp. I ), tome 2, page 286.
- FRACTURE ( s-gen. II ), tome 4, page 85.
- Compliquée ( espèce III ), tome 4, page 88.
- Composée. ( espèce II ), tome 4, page 88.
- De la clavicule ( variété C ), tome 4, page 89.
- De la rotule ( variété I ), tome 4, page 90.
- De l'olécrâne ( var. D ), tome 4, page 89.
- Des côtes ( variété E ), tome 4, page 89.
- Des os de la tête ( variété A ), tome 4, page 88.

- Du bassin ( variété G ), tome 4 , page 89.
- Des vertèbres du cou ( variété B ), tome 4 , page 89.
- Du femur ( variété H ), tome 4 , page 89.
- Du péroné ( variété K ), tome 4 , page 90.
- Du sternum ( variété F ), tome 4 , page 89.
- Simple ( espèce I ), tome 4 , page 88.
- FRACTURES** simultanées par convulsions ( rap. A ),  
tome 4 , page 88.
- FRAGILITÉ** ( esp. I ), tome 4 , page 159.
- FRAMBOISIE**, tome 3 , page 513.
- Américaine ( rap. B ), tome 3 , page 514.
- Guinéenne ( rap. A ), tome 3 , page 514.
- FRAYEUR** ( s-esp. VIII ), tome 2 , page 305.
- FRÉNÉSIE**, tome 3 , page 172.
- Aphrodisiaque ( E ), tome 2 , page 312.
- Hydrophobique ( sorte 3 ), tome 3 , page 44.
- Miliaire ( sorte 5 ), tome 3 , page 382.
- Rougeolique ( rap. A ), tome 3 , page 372.
- FRIABILITÉ** ( s-esp. I ), tome 4 , page 160.
- FRIGERAIRE**, tome 3 , page 168.
- FRIGERARIA**, tome 3 , page 168.
- FRISSON**, tome 1 , page 392.
- Fébrile, tome 2 , page 150.
- Tiercenaire ( sorte 12 ), tome 2 , page 171.
- FRIVOLITÉ** ( espèce X ), tome 2 , page 284.
- FROID**, tome 1 , page 392.
- Hypochondriaque ( sorte 1 ), tome 2 , page 337.
- FROIDURE** externe ( rap. B ), tome 1 , page 393.
- FULGURATION** ( s-esp. VI ), tome 3 , page 346.
- FUNGUS**, tome 1 , page 341.
- Articulaire, tome 4 , page 97.
- Psorique ( sorte 19 ), tome 2 , page 120.

**FUREUR** utérine, tome 2, pages 339 et 349.

**FURONCLE**, tome 3, page 182.

### G.

**GALACTIE**, tome 3, page 96.

**GALACTIRRHEE**, tome 3, page 96.

**GALACTOSE** ( genre LXX ), tome 3, page 459.

— Apyrétique ( esp. II ), tome 3, page 463.

— D'ascension ( s-esp. I ), tome 3, page 459.

— De déviation ( s-esp. II ), tome 3, page 459.

— Pyrétique ( espèce I ), tome 3, page 459.

**GALEANTROPIE** ( A. ), tome 2, page 257.

**GALE**, tome 2, page 116.

— Bénigne d'HOFFMAN, tome 2, page 119.

— Boutonnée ( s-esp. II ), tome 2, page 118.

— Canine ( rap. A ), tome 2, page 118.

— Critique ( rap. A ), tome 2, page 79.

— Dartreuse ( rap. C ), tome 2, page 118.

— Epidémique ( variété A ), tome 2, page 118.

— Humide ( rap. A ), tome 2, page 119.

— Indienne ( rap. B ), tome 2, page 118.

— Menstruelle ( sorte 17 ), tome 3, page 78.

— Miliaire ( s-esp. I ), tome 2, page 118.

— Scorbutique ( sorte 12 ), tome 4, page 39.

— Vermineuse, tome 2, page 116.

**GALIANCON** ( synonymie ), tome 4, page 240.

**GALIANQUE** ( espèce III ), tome 4, page 240.

**GANGLION**, tome 1, page 344, et ( espèce V )

tome 3, page 154.

**GANGRÈNE** ( genre LXXXI ), tome 4, page 51

et 52.

— Atonique ( s-gen. I ), tome 4, page 52.

- Charbonneuse ( s-gen. III ), tome 4, page 58.
- Des riches ( espèce II ), tome 4, page 56.
- Des vieillards ( esp. III ), tome 4, page 57.
- D'hôpital ( espèce I ), tome 4, page 54.
- Du nez emphysématique ( sorte 15 ), tome 2, page 211.
- Emphysémateuse ( A. ), tome 4, pages 55.
- Epidémique ( rap. A ), tome 4, page 54.
- Excitative ( s-gen. II ), tome 4, page 56.
- Frigorique ( sorte 1 ), tome 1, pages 285 et 394.
- Osseuse ( s-gen. IV ), tome 4, page 59.
- Par brûlure ( A. ), tome 4, page 55.
- Par compression ( s-esp. VI ), tome 4, page 55.
- Par contusion ( s-esp. I ), tome 4, page 55.
- Par étranglement ( s-esp. III ), tome 4, page 55.
- Par infiltration ( s-esp. II ), tome 4, page 55.
- Par inflammation ( s-esp. IV ), tome 4, page 55.
- Par les engelures ( rap. A ), tome 4, page 58.
- Par pourriture ( s-esp. V ), tome 4, page 55.
- Scorbutique des gencives ( E. ), tome 4, page 38.
- Sèche, tome 4, page 56. — Avec douleur gravitative ( sorte 31 ), tome 2, page 332.
- Sporadique ( espèce II ), tome 4, page 55.
- Vénénique, tome 3, page 47.
- GARGANTILLA** des Asturiens ( rap. E ), tome 3, page 499.
- GASTERALGIE** ( espèce VIII ), tome 1, page 408.
- GASTERANGIEMPHRAXIS**, tome 3, page 139.
- GASTÉROCÈLE** ( espèce IV ), tome 4, page 201.
- GASTRIALGIE** bilieuse ( sorte 7 ), t. 3, p. 480.
- GASTRITE** ( s-gen. VIII ), tome 3, page 424.
- Erysipélateuse ( rap. A ), tome 3, page 426.

- Erythématique ( rap. A ), tome 3 , page 427.
- Exanthématique ( sorte 4 ), tome 3 , page 424.
- Hernieuse ( sorte 6 ), tome 4 , page 209.
- Légitime ( rap. C ), tome 3 , page 426.
- Phlegmoneuse ( rap. D ), tome 3 , page 426.
- Stetno-costale ( sorte 14 ), tome 3 , page 394.
- GASTRITIS** ( rap. B ), tome 3 , page 426.
- GASTROCÈLE** ( s-esp. XI ), tome 4 , page 207.
- Composée ( variété C ), tome 4 , page 208.
- Ombilicale ( variété B ), tome 4 , page 208.
- Simple ( variété A ), tome 4 , page 208.
- GASTRODYNIE** ( s-esp. II ), tome 2 , page 410.
- Américaine ( A. ), tome 2 , page 48.
- Astringente ( var. C ), tome 2 , page 411.
- Attérente ( var. D ), tome 2 , page 411.
- Biliéuse ( sorte 6 ), tome 3 , page 337 , et ( rap. B ), tome 3 , page 427.
- Calculeuse ( rap. B ), tome 3 , page 116.
- Chlorotique ( sorte 6 ), tome 1 , page 348.
- Fiévreuse , tome 2 , page 153.
- Flatulente ( variété A ), tome 2 , page 411.
- Frigorique ( sorte 6 ), tome 1 , page 394.
- Gastrocélifique ( sorte 5 ), tome 4 , page 208.
- Hypocondriaque ( sorte 10 ), tome 2 , page 338.
- Hystérique ( sorte 24 ), tome 2 , page 343.
- Métastatique ( sorte 15 ), tome 2 , page 120 ; ( sorte 5 ) tome 3 , page 485 ; ( sorte 10 ) tome 4 , page 108 ; et ( sorte 16 ) tome 4 , page 170.
- Par des corps étrangers imprudemment avalés ( A. ), tome 2 , page 88.
- Pérégrinique ( rap. A ), tome 3 , page 156.

- Périodynique ( variété B ), tome 2 , page 411.
- Pulsatile ( A. ), tome 2 , page 343.
- Saburrale ( sorte 19 ), tome 2 , page 88.
- Vénénique ( sorte 4 ), tome 3 , page 11.
- Xiphoidique ( sorte 20 ), tome 4 , page 82.
- GASTRONÉVRIE, tome 2 , page 333.
- GASTROREXIE ( gen. XXXVII ), t. 2 , p. 393.
- GASTRORRAGIE ( espèce III ), tome 1 , page 260.
- Forcée ( s-esp. II ), tome 1 , page 262.
- Spontanée ( s-esp. I ), tome 1 , page 261.
- GASTROSE ( genre XVII ), tome 2 , page 76.
- Apyrétique ( espèce II ), tome 2 , page 81.
- Pyrétique ( espèce I ), tome 2 , page 77. — Grave ( s-esp. II ), tome 2 , page 80. — Légère ( s-esp. I ), tome 2 , page 79.
- GIFLES, tome 3 , page 177.
- GLAPISSEMENT ( rap. C ), tome 2 , page 74.
- GLAUCOME, tome 3 , page 126.
- De WOLHOUSE, tome 3 , page 120.
- GLOSSITE, tome 3 , page 193.
- GLOSSITIE ( espèce III ), tome 3 , page 193.
- GLOSSITIS, tome 3 , page 194.
- GLU, tome 2 , page 36.
- GOITRE ( genre XXI ), tome 2 , page 246.
- Cellulaire ( espèce I ), tome 2 , page 247.
- Hydatidique ( sorte 7 ), tome 2 , page 112.
- Mellicérique ( s-esp. II ), tome 2 , page 248.
- Séreux ( s-esp. I ), tome 2 , page 248.
- Stéatomatique ( s-esp. III ), tome 2 , page 248.
- Thyroïdien ( espèce II ), tome 2 , page 248.
- GONFLEMENT Epigastrique ( sorte 30 ), tome 2 , page 173.

- Et accès fébrile passager, par la morsure de l'a-  
raignée de cave ( A. ), tome 3, page 49.
- GONGRONA**, tome 2, page 247.
- GONORRHÉE** ( espèce II ), tome 3, page 85.
- Dartreuse ( sorte 9 ), tome 3, page 485.
- Impure ( rap. B ), tome 3, page 517.
- Indifférente ( s-esp. I ), tome 3, page 86.
- Muqueuse ( rap. A ), tome 3, page 518.
- Onéirogone ( variété A ), tome 3, page 86.
- Par irritabilité, tome 3, page 86.
- Pollution ( s-esp. III ), tome 3, page 86.
- Pure, tome 3, page 86.
- Rhumatismale ( sorte 10 ), tome 1, page 302.
- Scrophuleuse ( sorte 11 ), tome 1, page 292.
- Syphilitique ( rap. A ), tome 3, page 517.
- Vénérienne, tome 3, page 515.
- Virulente, tome 3, page 515.
- Voluptueuse ( s-esp. II ), tome 3, page 86.
- GORE**, tome 3, page 502.
- GOURMANDISE** ( variété D ), tome 2, page 314.
- GOUTTE** asthénique primitive ( rap. B ), tome 4,  
page 168.
- Asthmatique ( variété D ), tome 4, page 168.
- Atonique ( rap. A ), tome 4, page 169.
- Bahamane ( A. ), tome 3, page 394.
- Chlorotique ( sorte 12 ), tome 3, page 77, et  
( variété C ), tome 4, page 168.
- D'été ( variété B ), tome 4, page 168.
- D'hyver ( variété A ), tome 4, page 168.
- Errante ( rap. A ), tome 4, page 167.
- Exanthématique ( sorte 8 ), tome 3, page 338, et  
( sorte 14 ), tome 3, page 383.

- Fièvre intermittente ( sorte 29 ), tome 2 , page 173.
- Fiévreuse , tome 2 , page 167.
- Froide ( sorte 9 ), tome 1 , page 394.
- Mélancolique ( sorte 4 ), tome 2 , page 259.
- Podagre ( rap. A ) , tome 4 , page 167.
- Rachialgique ( sorte 18 ), tome 3 , page 18 , et  
( rap. C ), tome 4 , page 167.
- Rachitique ( sorte 5 ), tome 4 , page 158.
- Rentrée ( rapp. B ), tome 4 , page 169.
- Rhumatismale ( sorte 11 ), tome 1 , page 303.
- Rhumatique ( sorte 15 ), tome 3 , page 394.
- Scorbutique ( sorte 34 ), tome 4 , page 42.
- Syphilitique ( sorte 46 ), tome 3 , page 522.
- GOUTTE-ROSE** ( rap. A ), tome 3 , page 343.
- Dartreuse ( variété B ), tome 3 , page 343.
- Simple ( variété A ), tome 3 , page 343.
- GOUTTE-SEREINE** , tome 3 , page 58.
- Nocturne épidémique ( rap. C ), tome 2 , page 66.
- GRAIN DE GRÊLE** ( espèce I ), tome 3 , page 152.
- GRANDOMANIE** ( s-esp. IV ), tome 2 , page 279.
- GRAVELLE** , tome 3 , page 111.
- GRENOUILLETTE** , tome 1 , page 323.
- GRIPPE** [ la ] , tome 3 , page 410.
- GRONDEUR** [ le ] ( s-esp. II ), tome 2 , page 289.
- GROSSESSE** ( genre XLVII ), tome 3 , page 99.
- Dans la trompe ( s-esp. I ), tome 3 , page 102.
- Dans le bas-ventre ( s-esp. IV ), tome 3 , page 102.
- Dans le vagin ( s-esp. III ), tome 3 , page 102.
- Dans l'ovaire ( s-espèce II ), tome 3 , page 102.
- Exutérine ( espèce III ), tome 3 , page 102.
- Fétale ( espèce I ), tome 3 , page 101.
- Molaire ( espèce II ), tome 3 , page 101.

( 384 )

- Par une fausse mole, tome 3, page 102.
- Pérenne ( espèce IV ), tome 3, page 102.
- Prolongée, tome 3, page 103.
- Sarcomatique ( s-esp. IX ), tome 3, page 150.
- Vraie, tome 3, page 101.
- GRYPOSE ( s-esp. I ), tome 4, page 175.
- GRYPOSIS ( synonymie ), tome 4, page 175.
- GUTTA ROSACEA, tome 3, page 495.

## H.

- HAINE ( s-esp. V ), tome 2, page 314.
- HALE, tome 3, page 338.
- HAUTEUR, ( s-esp. I ), tome 2, page 276.
- HAUT-MAL, tome 2, page 368.
- HEBDOMADAIRE de SCHENCKIUS, t. 2, p. 169.
- HECTICIE ( genre IV ), tome 1, page 279.
- Apyrétique ( espèce II ), tome 1, page 282.
- Calculeuse ( sorte 2 ), tome 3, page 112.
- Crinonique ( rap. A ), tome 2, page 122.
- Par amour ( A. ), tome 2, page 311.
- Pyrétique ( espèce I ), tome 1, page 280.
- Scrophuleuse ( sorte 1 ), tome 1, page 290.
- HECTIQUE, tome 1, pages 280 et 281.
- Cachectique ( A. ), tome 1, page 348; ( sorte 1 ) tome 1, page 310; et ( sorte 6 ), tome 4, page 39.
- Chlorotique ( sorte 1 ), tome 1, page 348.
- Des cachectiques ( A. ), tome 3, page 514.
- Des flux ( sorte 7 ), tome 2, page 46.
- Infantile ( rap. A ), tome 2, page 80.
- Nerveuse ( rap. C ), tome 2, page 323.

Syphilitique

- Syphilitique ( sorte 1 ), tome 3, page 514.
- Vermineuse ( sorte 1 ), tome 2, page 96.
- Vespertine, tome 1, page 280, et ( rap. B )  
tome 2, page 323.
- HELCOME ( rap. A ), tome 4, page 91.
- HELICYDRION ( A. ), tome 4, page 92.
- HELMINTHÈSE ( genre XVIII ), tome 2, page 89.
- Apyrétique par l'ascaride lombrical ( s-esp. II ),  
tome 2, page 97.
- Cellulaire par le dragoneau ( s-esp. II ), tome 2,  
page 104.
- Cystique ( s-esp. II ), tome 2, page 103.
- Intestinale ( s-esp. I ), tome 2, page 102. — Par  
le dragoneau ( s-esp. I ), tome 2, page 104.
- Par des larves ( espèce XV ), tome 2, page 124.
- Par la douve ( espèce V ), tome 2, page 106.
- Par la furie infernale ( esp. IX ), tome 2, p. 115.
- Par la mite psorique ( espèce X ), t. 2, p. 116.
- Par la sangsue ( espèce XIV ), tome 2, page 123.
- Par l'ascaride lombrical ( espèce I ), tome 2,  
page 93.
- Par l'ascaride vermiculaire ( esp. II ), t. 2, p. 102.
- Par le bicorné rude ( esp. VIII ), tome 2, p. 114.
- Par le crinon ( espèce XII ), tome 2, page 122.
- Par le dragoneau ( espèce III ), tome 2, page 103.
- Par le pou ( espèce XI ), tome 2, page 121.
- Par le pou du bois ( espèce XIII ), t. 2, p. 122.
- Par le tænia ( espèce VI ), tome 2, page 106.
- Par le trichure ( espèce IV ), tome 2, page 105.
- Par l'hydatide ( espèce VII ), tome 2, page 109.
- Pyrétique par l'ascaride lombrical ( s-esp. I ), tome  
2, page 95.

( 386 )

- HEMATEDÈSE ( genre II ), tome I , page 231.
- HÉMATEMÈSE , tome I , page 260.
- Anévrismatique ( sorte 2 ), tome I , page 247.
  - Carno-sanguine ( sorte 1 ), tome 3 , page 162.
  - Cataméniale ( sorte 14 ), tome 3 , page 78.
  - Cholérique ( rap. C ), tome 2 , page 414.
  - Colérique , tome I , page 261.
  - Hémorroïdale ( sorte 2 ), tome I , page 266.
  - Hépatique ( sorte 1 ), tome 3 , page 142 , ( sorte 1 ), tome 3 , page 472.
  - Hîrudinique ( A. ), tome 4 , page 80.
  - Noire ( variété A ), tome I , page 388 , et ( B. ), tome 2 , page 45.
  - Pancréatique ( sorte 1 ), tome 4 , page 107.
  - Pléthorique ( sorte 4 ), tome I , page 224.
  - Splénique ( sorte 2 ), tome 3 , page 143.
  - Traumatique , tome I , page 262 , et ( sorte 2 ) tome 4 , page 80.
  - Vénérique ( sorte 1 ), tome 2 , page 119 , et ( A. ), tome 2 , page 223.
  - Vermineuse ( rap. B ), tome 2 , page 124.
- HÉMATEMÉSIE , tome I , page 261.
- HÉMATOCÈLE , tome I , page 234.
- HÉMATOCHEZE , tome I , page 263.
- HÉMATOME ( espèce II ) , tome I , page 233.
- Anévrismatiforme ( s-esp. III ), tome I , page 235.
  - Forcée ( s-esp. II ), tome I , page 235.
  - Spontanée ( s-esp. I ), tome I , page 233. — Abdominale ( variété C ), tome I , page 224.
  - Faciale ( variété A ), tome I , page 233.
  - Péricardique ( variété B ), tome I , page 234.
  - Scrotale ( variété E ), tome I , page 234.

- Utérine ( variété D ), tome 4, page 234.
- Vulvale ( variété F ), tome 1, page 383.
- HÉMATOPIDÈSE, tome 1, page 231.
- HÉMATORRHEE, tome 4, page 263.
- HÉMATURIE, tome 1, page 275.
- Après la transfusion ( sorte 6 ), tome 2, page 46.
- Calculeuse ( sorte 1 ), tome 3, page 112.
- Cataméniale ( sorte 15 ), tome 3, page 78.
- Déceptive ou fausse, tome 1, page 275.
- Distillante, tome 1, page 278.
- Ejaculatoire, tome 1, page 278.
- Exanthémateuse, tome 2, page 207.
- Fausse ( sorte 1 ), tome 3, page 479.
- Noire ( rap. A ), tome 3, page 129.
- Pléthorique ( sorte 6 ), tome 1, page 225.
- Rénale, tome 1, page 276.
- Traumatique ( variété B ), tome 1, page 277, et  
( sorte 3 ) tome 4, page 80.
- Urétrale, tome 1, page 278.
- Vermineuse ( A. ), tome 2, page 126.
- Vésicale, tome 1, page 276.
- Violente ( var. A ), tome 1, page 277, et ( A ),  
tome 4, page 80.
- HEMEROPATHOS ( variété B ), tome 3, page 342.
- HEMIPLÉGIE ( variété A ), tome 3, page 54.
- A la suite d'une joie imprévue ( É. ), tome 2,  
page 310.
- Anévrismatique ( sorte 13 ), tome 1, page 248.
- Apoplectique ( rap. D ), tome 2, page 366.
- Arthritique ( sorte 20 ), tome 4, page 171.
- Du côté droit, tome 3, page 57.
- Exanthématique ( sorte 16 ), tome 2, page 120.

- Intermittente ( sorte 21 ), tome 2 , page 172.
- Pléthorique ( sorte 39 ), tome 1 , page 228.
- Saturnine ( sorte 11 ), tome 3 , page 18.
- Scrophuleuse ( sorte 12 ), tome 1 , page 291.
- Sérouse ( A ), tome 1 , page 305.
- Spasmodique , tome 3 , page 56.
- Syphilitique ( sorte 24 ), tome 3 , page 520.
- Transverse ( sorte 2 ), tome 3 , page 438.
- Traumatique ( sorte 23 ), tome 4 , page 82.
- HÉMIPLÉXIE** ( variété A ), tome 3 , page 54.
- HÉMITRITÉE** de GALIEN ( rap. B ), tome 2 ,  
page 161.
- Des Grecs , tome 2 , page 158.
- HÉMOPTYSIE** , tome 1 , page 256.
- Anévrismatique ( sorte 1 ), tome 1 , page 247.
- Ascitique ( sorte 1 ), tome 1 , page 333.
- Calculeuse ( rap. A ), tome 3 , page 115.
- Cataméniale ( sorte 13 ), tome 3 , page 78.
- Catarrhale ( sorte 1 ), tome 3 , page 201 , et ( sorte  
1 ), tome 3 , page 414. — De GALIEN , tome  
3 , page 201.
- Diapédésique ( A. ), tome 1 , page 230.
- Habituelle ( rap. A ), tome 2 , page 390.
- Helvigienne , tome 2 , page 43.
- Hirudinique ( A. ), tome 4 , page 80.
- Hydrothorachique ( sorte 1 ), tome 1 , page 326.
- Hypochondrique ( s-esp. III ), tome 1 , page 260.
- Mortelle par une joie imprévue ( A. ), tome 2 ,  
page 310.
- Nerveuse abondante ( var. B ), tome 1 , page 260.
- Périodique ( sorte 1 ), tome 1 , page 266.
- Phthisique ( rap. B ), tome 2 , page 390.

( 389 )

- Pléthorique ( sorte 3 ), tome 1, page 224.
- Scorbutique ( A. ), tome 4, page 38.
- Sphacélique ( sorte 2 ), tome 2, page 43; ( sorte 4 ) tome 4, page 38; et ( sorte 1 ) tome 4, page 60.
- Splénique ( sorte 1 ), tome 3, page 143.
- Traumatique ( variété A ), tome 1, page 259, et ( sorte 1 ) tome 4, page 80.
- Tuberculeuse ( variété A ), tome 2, page 390.
- Varioleuse, tome 2, page 207.
- Vermineuse ( rap. B ), tome 2, page 123.
- HÉMORRAGIE ( genre III ), tome 1, page 248.**
- Abondante après l'extraction d'une dent ( rap. A ), tome 1, page 255.
- Critique, tome 3, page 171.
- De la bouche et du palais ( sorte 5 ), tome 1, page 231.
- Des maladies chroniques ( sorte 1 ), tome 4, p. 37.
- Des yeux, des oreilles et du sein gauche par diapedèse ( sorte 3 ), tome 1, page 230.
- Du nez, tome 1, page 253.
- Du vagin, tome 1, page 272.
- Enkistée ou anévrismatique, tome 1, page 245.
- Fébrile ( sorte 1 ), tome 2, page 170, et ( sorte 1 ), tome 3, page 171.
- Hirudineuse ( rap. A ), tome 2, page 123.
- Insalubre ( rap. A ), tome 2, page 183.
- Opératoire ( espèce X ), tome 1, page 279.
- Par les lèvres, les yeux, etc. ( E. ), tome 2, page 317.
- Par les voies urinaires, tome 1, page 275.
- Passive du nez ( sorte 1 ), tome 2, page 42.

- Pléthorique ( sorte 2 ), tome 1, page 224.
- Scorbutique par la surface du corps, tome 1, page 231.
- Variqueuse ( variété A ), tome 1, page 240.
- HÉMORRAGIES** utérines, tome 1, page 268.
- Vermineuses ( sorte 1 ), tome 2, page 98.
- HÉMORROÏDE** ( espèce III ), tome 1, page 235.
- Dure en forme de crête ( variété D ), tome 1, page 237.
- Molle ou vésiculaire ( s-esp. I ), tome 1, page 237.
- Murale ( variété A ), tome 1, page 237.
- Tumorique ( s-esp. II ), tome 1, page 237.
- Uvale ( variété B ), tome 1, page 237.
- Variqueuse ( variété A ), tome 1, page 384.
- Verruqueuse ( variété C ), tome 1, page 237.
- HÉMORROÏDES** abondantes ( rap. ), tome 1, page 266.
- Blanches, tome 2, page 40.
- Décolorées, tome 2, page 40.
- Excédentes ( rap. ), tome 1, page 266, et tome 1, page 266.
- Internes, tome 1, page 263.
- Muqueuses, tome 2, page 40. — De la vessie; tome 2, page 37.
- Régulières ( rap. ), tome 1, page 265.
- Utérines de SENNERT, tome 2, page 39.
- HÉMORROÏS** immodéré ( rap. ), tome 1, page 266.
- Modéré, tome 1, page 265.
- Régulier, tome 1, page 265.
- Proctocélique ( sorte 4 ), tome 4, page 80.
- Sanglant, tome 1, page 265.
- HEPATALGIE** ( espèce XI ), tome 2, page 410.

- Ictérique ( variété C ), tome 2 , page 421.
- Infarctive ( variété A ), tome 2 , page 420.
- Pétitienne ( variété B ), tome 2 , page 421.
- HÉPATEMPHRAXIS**, tome 3 , page 141.
- HÉPATIQUE**, tome 2 , page 420.
- HÉPATIRRHÉE**, tome 2 , page 43.
- Cholérique, tome 2 , page 43.
- Intermittente, tome 2 , page 151.
- Intestinale ( E. ), tome 2 , page 43.
- Mésentérique ( F. ), tome 2 , page 43.
- Par blessure ( sorte 6 ), tome 4 , page 81.
- Sanglante ( A. ), tome 2 , page 43.
- Scorbutique ( B. ), tome 2 , page 43, et ( sorte 11 ), tome 4 , page 39.
- HÉPATITE de VARANDÉ**, tome 3 , page 91.
- HÉPATITIE** ( espèce IX ), tome 3 , page 203.
- Aiguë, tome 3 , page 204.
- Chronique, tome 3 , pages 205 et 206.
- Cystique ( rap. A ), tome 3 , page 457.
- Erysipélateuse ( rap. A ), tome 3 , page 204.
- Lente ( s-esp. II ), tome 3 , page 205.
- Obscure ( rap. A ), tome 3 , page 206, et ( rap. B ), tome 3 , page 478.
- Pleurétique ( rap. B ), tome 3 , page 205.
- Suppurante ( rap. A ), tome 4 , page 73.
- Vive ( s-esp. I ), tome 3 , page 204.
- HÉPATITIS**, tome 3 , page 203.
- HÉPATOCELÉ** ( s-esp. XII ), tome 4 , page 209.
- Ombilicale ( variété A ), tome 4 , page 209.
- Ventrale ( variété A ), tome 4 , page 209.
- HÉPATOPARECTAME**, tome 3 , page 128.
- HÉRISSEMENT** ( syn. ), tome 4 , page 172.

- HERMAPHRODISME ( esp X ), tome 4, page 242.  
 HERMAPHRODITUS ( syn. ), tome 4, page 242.  
 HERNIA ( syn. ), tome 4, page 192.  
 HERNIE ( s-gen. III ), tome 4, page 192.  
 — Abdominale ( syn. ), tome 4, page 201.  
 — Akystée ( var. B ), tome 4, page 197.  
 — Aqueuse de l'ombilic, tome 1, page 331.  
 — Avec épiploon et testicule ( variété I ), tome 4,  
 page 211.  
 — Bregmatique ( var. A ), tome 4, page 198.  
 — Crurale avec intestin et épiploon ( variété R ),  
 t. 4, p. 215. — De la vessie urinaire ( var. B ),  
 tome 4, page 218. — De l'épiploon ( syn. ),  
 tome 4, page 211. — De l'intestin ( variété  
 E ), tome 4, page 213.  
 — Cystique avec hernie de la matrice ( variété H ),  
 tome 4, page 218.  
 — De l'intestin et de l'épiploon sous-ombilicale ( va-  
 riété X ), tome 4, page 215. — Surombilicale  
 ( variété X ), tome 4, page 215. — Ventrale  
 ( variété X ), tome 4, page 215.  
 — De la vessie avec entérocele ( variété F ), tome  
 4, page 218. — Avec épiplocèle ( variété G ),  
 tome 4, page 218. — Par dessus les os pubis  
 ( variété D ), tome 4, page 218. — Par la  
 région iliaque droite ( variété I ), tome 4,  
 page 219. — Urinaire par le périnée ( variété  
 C ), tome 4, page 218.  
 — Du cerveau ( syn. ), tome 4, page 198.  
 — Encéphalique ( syn. ), tome 4, page 198.  
 — Enkystée ( variété A ), tome 4, page 197.  
 — Epigastrique ( syn. ), tome 4, page 202.

- Epiploïco-intestinale du nombril ( variété V ), tome 4, page 215. — Par l'échancrure sciatique ( variété T ), tome 4, page 215. — Par le trou ovalaire ( variété S ), tome 4, page 215. — Par le vagin ( variété U ), tome 4, page 215.
- Epiploïque avec cystocèle ( syn. ), tome 4, page 211. — De l'aîne ( var. A ), tome 4, page 211. — Du nombril ( syn. ), tome 4, page 211. — Du vagin ( syn. ), tome 4, page 211.
- Fémorale ( syn. ), tome 4, page 203.
- Humorale ( sorte 37 ), tome 3, page 521.
- Hydatidique ( sorte 16 ), tome 2, page 14.
- Inguinale ( syn. ), tome 4, page 203. — De la matrice ( variété A ), tome 4, page 217. — De la vessie urinaire ( variété A ), tome 4, page 218.
- Intestinale avec hydrocèle ( variété Q ), tome 4, page 215. — Dans le vagin ( variété H ), tome 4, page 213. — De l'aîne ( variété A ), tome 4, page 213. — De l'échancrure sciatique ( variété G ), tome 4, page 213. — Du nombril ( variété I ), tome 4, page 213. — Du trou ovalaire des os pubis ( variété F ), tome 4, page 213. — Testiculaire ( variété P ), tome 4, page 214. — Et épiploïque complète ( variété M ), tome 4, page 214. — Et épiploïque de l'aîne ( variété L ), tome 4, page 214.
- Intestino - mésocolique ( variété N ), tome 4, page 214.
- Ischiarique ( syn. ), tome 4, page 205.
- Occipitale ( variété B ), tome 4, page 198.
- Omphalique ( syn. ), tome 4, page 202.

- Sous-ombilicale ( syn. ), tome 4 , page 203.
- Sous-pubienne ( syn. ), tome 4 , page 105.
- Suspucienne ( syn. ), tome 4 , page 204.
- Temporale ( variété C ), tome 4 , page 198.
- Thorachique ( syn. ), tome 4 , page 200.
- Ventrale de l'épiploon ( syn. ), tome 4 , page 211.
- De l'intestin ( var. K ), tome 3 , page 214.
- HERNIES** épiploïques ( syn. ), tome 4 , page 210.
- HERPES**, tome 3 , page 480.
- Collaris , tome 3 , page 481.
- Périscelis , tome 3 , page 481.
- HIÉRANOSE** ( rap. A ), tome 2 , page 372.
- HIÉROPYR** ( rap. C ), tome 3 , page 337.
- HILON** ( variété F ), tome 4 , page 200.
- HIPOPYON**, tome 4 , page 65.
- HIPPOS**, tome 2 , page 373.
- HIRSUTIES** ( syn. ), tome 4 , page 172.
- HISTÉRIE** vermineuse ( sorte 12 ), tome 2 , page 99.
- HÉMALOPIE**, tome 2 , page 266.
- HÉMORRHOIS**, tome 1 , page 263.
- HÉMORROIDIE** polypeuse ( sorte 2 ), tome 3 ,  
page 162.
- HOMME** bouillant [ P ], ( var. B ), t. 2 , p. 296.
- Porc épic ( rap. A ), tome 4 , page 177.
- HONTE** ( variété H ), tome 2 , page 303.
- HOQUET** ( espèce V ), tome 2 , page 375.
- Aphteux ( sorte 1 ), tome 3 , page 423.
- Critique ( sorte 12 ), tome 3 , page 172.
- Diarrhéique ( rap. C ), tome 3 , page 87.
- Epileptico-maniaque ( s-esp. I ), tome 2 , p. 376.
- Fébrile ( sorte 11 ), tome 3 , page 172.
- Gangrénique ( sorte 3 ), tome 4 , page 60.

- Inflammatoire ( sorte 1 ), tome 3 , page 188.
- Passager ( rap. A ), tome 2 , page 375.
- HORROR , tome 1 , page 391.
- HUMORAIRE , tome 3 , page 166.
- HYDARTROS ( espèce XV ), tome 1 , page 341.
- Cartilagineux ( s-esp. III ), tome 1 , page 342.
- Fongueux ( s-esp. II ), tome 1 , page 342.
- Simple ( s-esp. I ), tome 1 , page 342.
- HYDROA , tome 3 , page 345.
- Des Grecs ( rap. B ), tome 3 , page 377.
- HYDROCARDIE , tome 1 , page 327.
- HYDROCELE ( espèce XIV ), tome 1 , page 338.
- De la membrane des vaisseaux spermatiques ( var. B ), tome 1 , page 341.
- De la tunique vaginale du testicule ( variété A ), tome 1 , page 340.
- Par infiltration , tome 1 , page 312.
- Scrotale ( s-esp. I ), tome 1 , page 340. — Avec hernie ( variété A ), tome 1 , page 340. — Avec un sac herniaire ( var. B ), tome 1 , page 340.
- Testiculaire ( s-esp. II ), tome 1 , page 340.
- HYDROCÉPHALE ( espèce VI ), tome 3 , page 316.
- Aiguë , tome 3 , page 443.
- Avec détachement des os ( variété A ), tome 1 , page 320.
- Avec manque des os du crâne ( variété C ), tome 1 , page 320.
- Avec transparence et amollissement des os du crâne ( variété B ), tome 1 , page 320.
- Des membranes ( s-esp. II ), tome 1 , page 320.
- Des ventricules ( s-esp. I ), tome 1 , page 318.
- Du crâne , tome 1 , page 320.

- Du péricrâne ( s-esp. III ), tome 1, page 321.
- Externe, tome 1, page 311.
- Fermé ( variété B ), tome 1, page 320.
- Fongueux ( variété D ), tome 1, page 324.
- Interne, tome 1, page 318, et tome 3, page 441.
  - De WHYTT, tome 3, page 443.
  - Ouvert ( variété A ), tome 1, page 319.
- HYDROCRYPTÉ ( espèce XVIII ), t. 2, p. 343.
- HYDRO-ENTÉROCÈLE ( var. Q ), t. 4, p. 215.
  - Hydrosarcocélique ( A. ), tome 1, page 340.
- HYDRO-ENTÉRO-ÉPIPLOMPHALE ( s-esp. III ),
  - tome 1, page 331.
- HYDRO-ENTÉROMPHALE ( s-esp. II ), tome 1,
  - page 391.
- HYDRO-ÉPILOCÈLE ( variété H ), t. 4, p. 211.
- HYDRO-ÉPIPLOMPHALE ( s-esp. I ), t. 1, p. 331.
- HYDROGASTRE ( esp. XIII ), tome 1, page 331.
  - De l'ovaire ( s-esp. VI ), tome 1, page 337.
  - Des trompes ( s-esp. VII ), tome 1, page 337.
  - Épiplœique ( s-esp. III ), tome 1, page 334.
  - Péritonique ( s-esp. IV ), tome 1, page 334.
  - Purulento-péritonique ( var. B ), t. 1, p. 335.
  - Intestinale ( s-esp. I ), tome 1, page 333. — Chy-
    - leuse ( variété A ), tome 1, page 333 — San-
      - glante ( variété B ), tome 1, page 333.
    - Sanguipéritonique ( var. A ), tome 1, page 335.
    - Stomacale ( s-esp. II ), tome 1, page 333.
  - HYDROGÉNÈSES ( classe III ), tome 3, page 276.
  - HYDROGLOSSE ( espèce IX ), tome 2, page 323.
    - Compliquée ( s-esp. II ), tome 1, page 324.
    - Simple ( s-esp. I ), tome 1, page 323.
  - HYDRO-MÉDIASIE, tome 1, page 327.

**HYDROMÈTRE** (s-esp. V), tome 1, page 335.

— Ascitique (rap.), tome 1, page 336.

— Gravidique (variété A), tome 1, page 336, et  
(sorte 6), tome 3, page 103.

— Hydatidique (sorte 3), tome 2, page 112.

— Sanguine (variété C), tome 1, page 336.

**HYDROMPHALE** (espèce XII), tome 1, page 331.

**HYDRONOSE**, tome 2, page 196.

**HYDROPÈDÈSE**, tome 3, page 92.

**HYDROPHOBIE** (espèce VI), tome 2, page 271,  
et tome 3, page 38.

— Accidentelle de BADER, tome 2, page 271.

— Aiguë, tome 3, page 44.

— Lente, (variété B), tome 3, page 44.

— Rabieuse, tome 3, page 44.

— Spasmodique, tome 2, page 271.

— Sphacélique (rap. D), tome 2, page 272.

— Spontanée (rap. A), tome 2, page 271.

— Vraie (variété A), tome 3, page 44.

— Vulgaire, tome 3, page 44.

**HYDROPTALMIE** (esp. VII), tome 1, page 321.

— Aqueuse (s-esp. I), tome 1, page 322.

— Composée (s-esp. III), tome 1, page 323.

— Par augmentation de l'humeur aqueuse, tome 1,  
page 322. — De l'humeur vitrée, tome 1,  
page 323.

— Vitrée (s-esp. II), tome 1, page 323.

**HYDROPIE** (genre XI), tome 1, page 305.

— Aiguë, tome 3, page 389.

— Arsénicale (sorte 1), tome 3, page 10.

— Capacitique (§. III), tome 1, page 316.

— Cellulaire (§. I), tome 1, page 306.

- De poitrine lente ( rap. B ), tome 1, page 325.
- Des poumons, tome 1, page 311.
- Des trompes de fallope, tome 1, page 338.
- Des ventricules du cerveau, tome 3, page 441.
- Du scrotum, tome 1, page 338.
- Enkistée ( rap. ), tome 1, page 334.
- Vermineuse ( sorte 3 ), tome 2, page 98.
- Vésiculaire ( §. II ), tome 1, page 315.
- HYDROPSIES enkistées, tome 1, page 334.
- HYDROPLÈVRE, tome 1, page 326.
- HYDROPNEUMONIE, tome 1, page 311.
- HYDRORACHIS ( espèce XI ), tome 1, page 329.
- Compliquée ( s-esp. II ), tome 1, page 330.
- Fermée ( s-esp. III ), tome 1, page 330.
- Simple ( s-esp. I ), tome 1, page 330.
- HYDRORACHITIS, tome 1, page 329.
- HYDROSALPINX, tome 1, page 338.
- HYDROSTÉON ( espèce XVI ), tome 1, page 343.
- HYDROTHORAX ( espèce X ), tome 1, page 324.
- Chyleux ( variété A ), tome 1, page 326.
- Fébrile ( sorte 1 ), tome 3, page 450.
- Hydatidique ( sorte 2 ), tome 2, page 111.
- Médiastinique ( s-esp. III ), tome 1, page 327,  
et ( rap. ), tome 1, page 327.
- Omentale ( sorte 1 ), tome 3, page 144.
- Péricardique ( s-esp. IV ), tome 1, page 327,  
et ( rap. ) tome 1, page 328.
- Plévrique ( rap. ), tome 1, page 327.
- Plévro-costale ( s-esp. II ), tome 1, page 326.
- Psorique ( sorte 3 ), tome 2, page 119.
- Pulmo-plévrique ( s-esp. I ), tome 1, page 324.
- Vulgaire ( rap. A ), tome 1, page 325.

- HYDROTITE ( espèce VIII ), tome 1, page 323.  
 HYPECOUM *procumbens* ( A. ), tome 2, page 221.  
 HYPEROSTOSE ( syn. ), tome 4, page 161.  
 HYPERSARCOSE des auteurs de chirurgie, tome 4,  
 page 97.  
 HYPNOBATASE, tome 2, page 264.  
 HYPOCONDRIACISME sanguin ( sorte 20 ), tome  
 1, page 226.  
 HYPOCONDRIE; tome 2, page 333.  
 — Asthmatique ( A. ), tome 2, page 33.  
 — Biliaire ( rap. B ), tome 2, page 337.  
 — Calculeuse ( sorte 5 ), tome 3, page 112.  
 — Hystérique ( sorte 8 ), tome 2, page 342.  
 — Mélancolique ( rap. A ), tome 2, page 337.  
 — Par pollution, tome 3, page 86.  
 — Phthisique ( sorte 16 ), tome 2, page 330.  
 — Pituiteuse ( sorte 5 ), tome 2, page 33.  
 — Tympanitique ( sorte 1 ), tome 3, page 135.  
 HYPOGASTROCÈLE ( s-esp. III ), t. 4, p. 203.  
 — Epiploïco-intestinale ( var. X ), t. 4, p. 215.  
 — Intestinale ( variété K ), tome 4, page 214.  
 HYPOGASTRORIXE ( var. BB ), tome 4, page 216.  
 HYPOËME ( variété B ), tome 3, page 126.  
 HYPOPHASE ( rap. E ), tome 2, page 364.  
 HYPOSARQUE, tome 3, ( page 130. )  
 HYPOSPADIEE ( espèce IX ), tome 4, page 242.  
 HYPOSPADIÆOS ( syn. ), tome 4, page 242.  
 HYPOSTAPHYLE ( espèce III ), tome 4, page 221.  
 — Inflammatoire ( s-esp. I ), tome 4, page 221.  
 — Laxatoire ( s-esp. II ), tome 4, page 222.  
 HYPOSTASE muqueuse, tome 2, page 37, et ( rap.  
 B ), tome 3, page 518.

- HYSTÉRALGIE**, tome 2, page 424.
- Des femmes enceintes ( sorte 20 ), tome 3, page 104.
  - Fiévreuse ( rap. H ), tome 2, page 145.
  - Ménostatique ( sor. 9 ), tome 3, page 77.
  - Prurigineuse, tome 2, page 350.
  - Vaporeuse ( sorte 28 ), tome 2, page 344.
- HYSTÉRITIE**, tome 3, page 208.
- HYSTÉRIE**, tome 2, page 338.
- Chlorotique ( sorte 3 ), tome 1, page 348.
  - Emphrastique ( sorte 2 ), tome 3, page 131.
  - Fiévreuse, tome 2, page 151.
  - Leucorrhœique ( sorte 1 ), tome 2, page 39.
  - Libidineuse ( sorte 10 ), tome 2, page 342.
  - Ménorragique ( A ), tome 2, page 46.
  - Pléthorique ( sorte 21 ), tome 1, page 226.
- HYSTERITIS**, tome 3, page 208.
- HYSTÉRO-BUBONOCÈLE** ( variété A ), tome 4, page 217.
- HYSTÉROCÈLE** ( syn. ), tome 4, page 217.
- Inguinale ( variété A ), tome 4, page 217.
  - Ventrals ( variété B ), tome 4, page 217.
- HYSTÉRO-CYSTOCÈLE** ( variété H ), tome 4, page 219.
- HYSTÉROLOXIE**, tome 4, page 228.
- Antérieure ( s-esp. I ), tome 4, page 228.
  - Latérale ( s-esp. III ), tome 4, page 228.
  - Postérieure ( s-esp. II ), tome 4, page 228.
  - Sans grossesse ( s-esp. IV ), tome 4, page 228.
- HYSTÉROMANIE** de BOECLER, tome 2, page 349.
- HYSTÉROPHYSE**, tome 3, page 136.
- HYSTÉROPTOSE** ( syn. ), tome 4, page 223.
- Composée ( s-esp. II ), tome 4, page 224.
- Relaxatoire

- Relaxatoire ( s-esp. I ), tome 4, page 224.
- Utérine ( rap. A ), tome 4, page 225.
- Vaginale ( rap. A ), tome 4, page 226.

I.

- ICTÈRE**, tome 3, page 473.
- Hémorroïdal ( sorte 9 ), tome 1, page 267.
  - Spasmodique des enfans ( sorte 30 ), tome 2, page 332.
  - Vermineux ( sorte 46 ), tome 2, page 101.
- ICTERITIA**, tome 3, page 473.
- IDIOTISME** ( espèce III ), tome 2, page 245.
- Microcéphalique ( s-esp. I ), tome 2, page 245.
- ILÉOSE** ( s-esp. II ), tome 2, page 414.
- Atrétique ( sorte 1 ), tome 4, page 234.
  - Calculeux ( rap. D ), tome 3, page 116.
  - Calleux ( sorte 2 ), tome 3, page 145.
  - Hernieux ( sorte 2 ), tome 4, page 216.
  - Iléique ( sorte 2 ), tome 4, page 232.
  - Indien ( rap. B ), tome 2, page 416.
  - Inflammatoire ( rap. B ), tome 3, page 429.
  - Météorique, tome 2, page 418.
  - Pancréatique ( sorte 4 ), tome 3, page 141.
  - Physode, tome 2, page 418.
  - Pituiteux ( sorte 11 ), tome 2, page 34.
  - Spasmodique ( variété A ), tome 2, page 416.
  - Vénénique ( sorte 5 ), tome 3, page 11.
  - Vermineux ( sorte 28 ), tome 2, page 100.
  - Volvuleux ( variété B ), tome 2, page 416.
- ILÉOSIE**, tome 2, page 414.
- ILIAQUE**, tome 2, page 414.

- ILÆUS**, tome 2, page 414.  
**IMBÉCILLITÉ**, tome 2, page 241, et (esp. II)  
 tome 2, page 244.  
 — Bête (s-esp. III), tome 2, page 244.  
 — Incohérente (s-esp. I), tome 2, page 244.  
 — Niaise (s-espèce II), tome 2, page 244.  
**IMPATIENT** [1'], tome 2, page 319.  
**IMPÉTIGO** chez les latins (rap. A), t. 3, p. 494.  
**IMPLACABLE** [1'] (s-esp. IV), tome 2, page 286.  
**IMPORTANT** [1'] (s-esp. III), tome 2, page 279.  
**IMPOSSIBILITÉ** de lier les idées et les mots, tome  
 2, page 244.  
**IMPOTENCE** par forte méditation (rap. I), tome  
 2, page 294.  
**IMPRUDENCE** (espèce XIV), tome 2, page 286.  
**IMPUDENCE** (espèce XVI), tome 2, page 287.  
**IMPUISSANCE** syphilitique (sor. 30), t. 3, p. 520.  
**INCONSÉQUENCE** (espèce XI), tome 2, page 284.  
**INCUBE**, tome 2, page 273.  
**INDEPENDANT** [1'] (esp. XIX), t. 2, p. 288.  
**INDIANISCHE POCKEN** des Hollandais en Amé-  
 rique, tome 3, page 513.  
**INDOCILITÉ** (s-esp. I), tome 2, page 288.  
**INDOLENCE**, tome 2, page 57.  
**INFLAMMATION**, tome 3, page 174.  
 — Abdominale (sorte 7), tome 3, page 472.  
 — Adhésive d'HUNTER, tome 3, page 388.  
 — Aiguë du cerveau, tome 3, page 190.  
 — Chronique de l'estomac (rap. A), t. 3, p. 426.  
 — Du cerveau, tome 3, page 191.  
 — Consécutive occulte du cerveau, tome 3, page 396.  
 — Crue, tome 3, page 201.

- De la choroïde, tome 3, page 192.
- De la lnette, tome 3, page 416.
- De la rate, tome 3, page 206.
- De l'épiglotte ( variété A ), tome 3, page 417.
- De l'estomac ( rap. B ), tome 3, page 425.
- Des enfans ( rap. B ), tome 3, page 426.
- De l'iris, tome 3, page 192.
- De l'omentum, tome 3, page 456.
- De l'ovaire, tome 3, page 210.
- De l'uvée, tome 3, page 192.
- De poitrine, tome 3, page 198.
- Du globe de l'œil, tome 3, page 191.
- Du larynx et de la trachée artère, t. 3, p. 418.
- Du pancréas, tome 3, page 203.
- Du péritoine, tome 3, page 455.
- Du pharynx, tome 3, page 417.
- Du rein, tome 3, page 207.
- Et fièvre utérine, tome 3, page 208.
- Gangréneuse et promptement mortelle par la renou-  
cule des champs, tome 3, page 33.
- INFLAMMATIONS internes**, tome 3, page 185.
- Membraneuses, tome 3, page 388.
- INFLUENCE** [ 1' ], tome 3, page 410.
- INFLUENZA**, tome 3, page 410.
- INGRATITUDE** ( s-esp. III ), tome 2, page 292.
- INQUIÉTUDE** ( s-esp. VI ), tome 2, page 301.
- INSENSIBILITÉ** ( espèce XXIII ), t. 2, p. 291.
- INSOLENCE** ( espèce XVIII ), tome 2, page 287.
- INSOMNIE arthritique** ( sorte 8 ), tome 3, page 393.
- Critique, tome 3, page 172.
- Dolorique ( sorte 4 ), tome 2, page 397.
- Fébrile ( sorte 7 ), tome 3, page 172.

- INTEMPÉRIE chaude des anciens ( rap. ), tome 1 ;  
page 280.
- INTERTRIGUE , ( rap. D ), tome 4 , page 92.
- INTRIGANT [ l' ], tome 2 , page 290.
- INVERSION ( s-gen. V ), tome 4 , page 224.
- IRRÉSOLUTION ( sorte 6 ), tome 2 , page 53.
- ISCHIATOCELE ( syn. ), tome 4 , page 205.
- ISCHIOCELE ( s-esp. VII ), tome 4 , page 205.
- ISCHNOTE ( esp. IV ), tome 4 , page 240.
- ISCHURIE , tome 3 , page 70.
- Aspadiale ( sorte 1 ), tome 4 , page 235.
  - Atrétique ( sorte 2 ), tome 4 , page 234.
  - Caronculeuse ( A. ), tome 3 , page 521.
  - Cystique ( sorte 1 ), tome 3 , page 440.
  - Cystolithique ( B. ), tome 3 , page 113.
  - Cysto-phlegmatique ( C. ), tome 2 , page 35.
  - Cystoplégique , tome 3 , page 63.
  - Cystoproctique ( sorte 4 ), tome 1 , page 238 ;  
( rap. E ), tome 3 , page 117 ; ( sorte 1 ) tome  
3 , page 181 ; et ( rap. B ), tome 4 , page 73.
  - Cystopyique ( rap. A ), tome 4 , page 73.
  - Cystospastique ( A. ), tome 2 , page 331.
  - Dartreuse ( sorte 7 ), tome 3 , page 485.
  - Ectopocystique ( sorte 2 ), tome 4 , page 225.
  - Hydatidique ( sorte 12 ), tome 2 , page 112.
  - Hydrocélodée ( sorte 29 ), tome 4 , page 83.
  - Hystéro-cystique ( sorte 1 ), tome 3 , page 147 ;  
( sorte 3 ) tome 3 , page 210 ; et ( sorte 1 )  
tome 4 , page 234.
  - Mortelle ( S. ), tome 2 , page 318.
  - Néphrelmintique ( D-A. ), tome 2 , page 126.
  - Néphrétique ( sorte 1 ), tome 3 , page 208.

- Néphrolitique ( sorte 8 ), tome 3 , page 113.
- Néphro-phlegmatique ( A. ), tome 2 , page 35.
- Néphroplégique ( sorte 8 ), tome 3 , page 63.
- Néphro-pléthorique ( sorte 44 ), tome 1 , page 228.
- Néphropyique ( rap. C ), tome 4 , page 73.
- Néphrospastique ( sorte 23 ), tome 2 , page 331.
- Paradoxique ( variété B ), tome 3 , page 72.
- Par rétention des règles dans le vagin , tome 3 ,  
page 77.
- Péridegmique ( variété A ), tome 3 , page 71.
- Périnéale ( sorte 6 ), tome 3 , page 151.
- Périodique ( variété A ), tome 3 , page 71.
- Phymosique ( sorte 2 ), tome 3 , page 179.
- Pituiteuse ( sorte 13 ), tome 2 , page 35.
- Polyurique ( sorte 24 ), tome 2 , page 48.
- Rénale pituiteuse ( A. ), tome 2 , page 35.
- Retentive ( s-esp. II ), tome 3 , page 71.
- Strangurique ( s-esp. III ), tome 3 , page 72.
- Suppléée ( variété B ), tome 3 , page 71.
- Suppressive ( s-esp. I ), tome 3 , page 71.
- Urétérolithique ( A. ), tome 3 , page 113.
- Urétéro-phlegmatique ( B. ), tome 2 , page 35.
- Urétéropyique ( rap. D ), tome 4 , page 73 ; et  
( rap. C ), tome 4 , page 73.
- Urétérostomatique ( sorte 2 ), tome 4 , page 235.
- Urétreilmintique ( D-B. ), tome 2 , page 26.
- Urétrique ( sorte 2 ), tome 3 , page 208 ; et  
( sorte 33 ), tome 3 , page 520.
- Urétrohyménode ( sorte 2 ), tome 4 , page 235.
- Urétrolithique ( C. ), tome 3 , page 113.
- Urétrophlegmatique ( D. ), tome 2 , page 35.
- IVRESSE convulsive ( sorte 7 ), tome 2 , page 330.**

( 406 )

IVROGNERIE ( variété E ), tome 2 , page 314.

## J.

JALOUSIE ( s-esp. VI ), tome 2 , page 316.

— Par amour ( variété A ), tome 2 , page 316.

— Par intérêt ( variété C ), tome 2 , page 316.

— Par vanité ( variété B ), tome 2 , page 316.

JARRETIÈRE [ la ], ( s-esp. I ), tome 3 , page 481.

JAUNISSE , tome 3 , page 473.

— Accidentelle ( sorte 29 ), tome 2 , page 332 ; et  
( variété C ), tome 3 , page 476.

— Aranéique ( D. ), tome 3 , page 49.

— Calculeuse ( rap. A ), tome 3 , page 478.

— Causée par la piqûre d'un écureuil ( s-esp. II ),  
tome 3 , page 50.— Des enfans de naissance ( variété A ), tome 3 ,  
page 476.

— Des femmes grosses ( var. B ), tome 3 , page 476.

— Emphractique ( sorte 8 ), tome 3 , page 143.

— Epidémique ( variété D ), tome 3 , page 476.

— Fébrile ( sorte 8 ), tome 3 , page 473.

— Fiévreux ( sorte 28 ), tome 2 , page 173.

— Gravidique ( variété B ), tome 3 , page 476.

— Hépatique ( sorte 1 ), tome 3 , page 405.

— Hystérique ( sorte 37 ), tome 2 , page 344.

— Indienne ( A. ), tome 3 , page 476.

— Néophytique ( sorte 30 ), tome 2 , page 89 , et  
( variété A ) tome 3 , page 476.

— Par colère ( Y. ), tome 2 , page 319.

— Pléthorique ( sorte 52 ), tome 1 , page 229.

— Purulente ( rap. B ), tome 4 , page 73.

- Rabieuse ( sorte 4 ), tome 3 , page 44.
- Rachialgique ( sorte 17 ), tome 3 , page 18.
- Typhode ( A. ), tome 3 , page 473.
- Vipérique ( rap. A ), tome 3 , page 47.
- JOIE ( s-esp. I ), tome 2 , page 309.
- JUDICATOIRE, tome 3 , page 165.

## K.

- KAUSOS, tome 3 , page 329 ; ( rap. AA ), tome 2 ,  
page 155.
- KEDMATA, tome 3 , page 85.

## L.

- LACHETÉ ( variété B ), tom. 2 , page 54.
- LADRERIE, tome 3 , page 497.
- LÁGOCHEILOS ( syn. ), tome 4 , page 241.
- LAGOSTOMA ( syn. ), tome 4 , page 241.
- LAGOSTOME ( espèce VI ), tome 4 , page 241.
- LAIT répandu, tome 3 , page 463.
- LAMBSMA, tome 3 , page 87.
- LANGUE [ gonflement de la ], tome 3 , page 127.
- LANGUE [ prolongement morbifique de la ], tome  
3 , page 127.
- LANGUEUR mortelle ( A. ), tome 2 , page 303.
- LAPAROCÈLE ( syn. ), tome 4 , page 201.
- LARMOYEMENT, tome 3 , page 94.
- Ægilopique ( A. ), tome 4 , page 92.
- Ankylopé ( sorte 11 ), tome 3 , page 175.
- Arthritique ( sorte 23 ), tome 4 , page 171.
- Chaud ( rap. B ), tome 3 , page 400.

- Ophthalmique (rap. D), tome 3, page 398.
- Pathématique (sorte 32), tome 2, page 344.
- Sanglant (sorte 4), tome 1, page 230.
- Variolique (sorte 12), tome 3, page 223.
- LARYNGITE (espèce III), tome 3, page 418.
- LAXITÉ intestinale de CELSE, tome 3, page 90.
- LAXUM des méthodistes, tome 2, page 41.
- LEICHEN des Grecs (variété A), tome 3, page 482.
- LEIPODE (espèce XI), tome 4, page 242.
- LEIPODES (syn.), tome 4, page 242.
- LENTA, tome 3, page 168.
- LENTE, tome 3, page 168.
- LENTICULES, tome 3, page 365.
- Et puncticules, tome 3, page 365.
- LÉONTIASE, tome 3, page 497, et (rap. B),  
tome 3, page 500.
- LÈPRE (genre LXXVII), tome 3, page 492.
- Alopécienne de HENSLER, (rap. B), tome 3,  
page 499.
- Asturienne (rap. A), tome 3, page 495.
- Blanche (s-esp. IV), tome 3, page 496; (rap.  
B), tome 3, page 497; tome 3, page 498;  
et (rap. C), tome 3, page 499.
- D'Astracan de PALLAS (rap. C), t. 3, p. 495.
- Des Arabes, tome 3, page 497.
- Des Grecs (rap. A), tome 3, page 493. —  
Ou psora, tome 3, page 493.
- Des Hébreux, tome 3, page 497.
- Des Indes (rap. A), tome 3, page 496.
- Des ongles (rap. A), tome 4, page 175.
- D'occident de HENSLER, tome 3, page 497.
- D'orient de HENSLER, tome 3, page 493.

- Ecailleuse ( espèce I ), tome 3, page 493.
- Furfuracée ( rap. D ), tome 3, page 494.
- Herpétique ( rap. E ), tome 3, page 483, et ( rap. B ), tome 3, page 494.
- Ichtieuse ou écailleuse ( rap. B ), t. 3, p. 494.
- Léonine de HENSLER ( rap. E ), t. 3, p. 500.
- Mal mort ( rap. E ), tome 3, page 496.
- Noire ( s-esp. III ), tome 3, page 495; et ( rap. F ), tome 3, page 496.
- Noueuse ( rap. B ), tome 3, page 498.
- Psorique ( s-esp. I ), tome 3, page 494; et ( rap. C ), tome 3, page 494. — De HENSLER ( rap. E ), tome 3, page 494.
- Renaissance ( rap. D ), tome 3, page 495.
- Rose ( s-esp. II ), tome 3, page 494.
- Rouge ( rap. C ), tome 3, page 495. — De HENSLER ( rap. B ), tome 3, page 499.
- Tuberculeuse ( espèce II ), tome 3, page 497.
- Tyrienne de HENSLER ( rap. A ), t. 3, p. 500.
- LEPTOPHONIE ( rap. D ), tome 2, page 74.
- LETHARGIE ( rap. D ), tome 2, page 364; et tome 3, page 172.
- Arthritique ( sorte 8 ), tome 4, page 170.
- Céphalitique ( sorte 2 ), tome 3, page 191.
- Frigorique ( sorte 3 ), tome 1, page 285 et 394.
- Narcotique, tome 2, page 232.
- Pulmonique ( C. ), tome 2, page 34.
- LETHARGUS, tome 3, page 172.
- LEUCE des Grecs, tome 3, page 497.
- LEUCOME ( genre LI ), tome 3, pages 117 et 124.
- Cornéique ( espèce II ), tome 3, page 124.
- Crystallinique ( espèce I ), tome 3, page 117.

- Humoral ( espèce III ), tome 3 , page 126.
- LEUCOPLHEGMATIE ( esp. IV ), tome 1 , page 315,  
et tome 3 , page 131.
- Scarlatinique ( sorte 1 ), tome 3 , page 360.
- LEUCORRHÉE, tome 2 , page 38.
- Américaine ( rap. B ), tome 2 , page 39.
- Gravidique ( sorte 8 ), tome 3 , page 103.
- Indienne ( rap. C ), tome 2 , page 39.
- Nabothique ( sorte 9 ), tome 2 , page 46.
- Puerpérique ( rap. B ), tome 3 , page 81.
- Syphilitique, tome 3 , page 515.
- LEUCORRHOIS, tome 1 , page 265.
- LIENTERIE, tome 3 , page 90.
- Aphteuse, tome 3 , page 414.
- Gastro-ulcérique ( sorte 12 ), tome 4 , page 108.
- Scorbutique ( sorte 23 ), tome 4 , page 40.
- Secondaire ( rap. B ), tome 3 , page 91 ; et ( A. )  
tome 2 , page 49.
- Spontanée ( rap. A ), tome 3 , page 91.
- Vermineuse ( sorte 35 ), tome 2 , page 101.
- LIPOTHYMIE ( espèce II ), tome 2 , page 58.
- Fulminique ( rap. C ), tome 3 , page 347.
- Pathématique ( A. ), tome 2 , page 295.
- Scorbutique ( sorte 10 ), tome 4 , page 39.
- Stomachique ( rap. ), tome 2 , page 58 ; et ( sorte  
2 ) tome 2 , page 328.
- LIPPITUDE chronique ( rap. C ), tome 3 , page 398.
- LIPYRIE ( rap. A ), tome 2 , page 150.
- LITHIASE, tome 3 , page 107.
- LITHIASIS, tome 3 , page 107.
- LOCHIES immodérées, tome 1 , page 273.
- LOMBAGIE ( espèce III ), tome 1 , page 299.

- Abscédée ( rap. D ), tome 3, page 353.
  - Anévrismatique ( sorte 3 ), tome 1, page 247.
  - Arthrocace ( rap. C ), tome 3, page 353.
  - Fébrile ( sorte 2 ), tome 3, page 171; et ( sorte 1 ) tome 3, page 221.
  - Forcée ( rap. A ), tome 1, page 300.
  - Hydrothorachique ( sorte 2 ), tome 1, page 316.
  - Mésentérique ( sorte 1 ), tome 3, page 146.
  - Miliare ( sorte 2 ), tome 3, page 382.
  - Pléthorique ( sorte 9 ), tome 1, page 225.
  - Puerpérique ( rap. A ), tome 3, page 81.
  - Pseudo-ischurique ( sorte 1 ), tome 3, page 72.
  - Psodique ( rap. B ), tome 3, page 353.
  - Rhumatique ( sorte 2 ), tome 3, page 393.
  - Rhumatismale ( rap. B ), tome 1, page 300.
  - Saburrale ( sorte 1 ), tome 2, page 86.
  - Satyriastique ( A. ), tome 2, page 46.
  - Sympathique ( B. ), tome 2, page 126; et ( sorte 1 ) tome 3, page 146.
- LOMBAGO PARTUS** ( sorte 21 ), tome 3, page 105.
- LOUPE** *spina bifida*, tome 1, page 330.
- LOXARTHRE** ( genre XCVI ), tome 4, page 238.
- Anisotonique ( espèce II ), tome 4, page 238.
  - Cagneux ( s-esp. IV ), tome 4, page 239.
  - Gibbeux ( espèce III ), tome 4, page 238.
  - Intrarticulaire ( rap. A ), tome 4, page 238.
  - Perversif ( esp. IV ), tome 4, page 238.
- LUES VENEREA**, tome 3, page 502.
- LUIS INDICA**, tome 3, page 513.
- LUXATION** ( s-gen. I ), tome 4, page 187.
- Complète ( espèce IV ), tome 4, page 189.
  - Compliquée ( espèce III ), tome 4, page 189.

- Desmochannosique ( espèce X ), tome 4 , page 189.
- Desmophlogique ( espèce XI ), tome 4 , page 190.
- Exostosique ( espèce XIV ), tome 4 , page 190.
- Immobile ( espèce II ), tome 4 , page 187.
- Incomplète ( esp. V et VI ), tome 4 , page 189.
- Mobile ( espèce I ), tome 4 , page 187.
- Par convulsion ( espèce VIII ), tome 4 , page 189.
- Par paralysie ( espèce IX ), tome 4 , page 189.
- Pastacéique ( espèce XII ), tome 4 , page 190.
- Tophacéique ( espèce XIII ), tome 4 , page 190.
- LUXATURE ( sy. ), tome 4 , page 187.
- LYCANTROPIE ( B. ), tome 2 , page 257.
- LYNGODE , tome 2 , page 146 ; et ( sorte 13 )  
tome 3 , page 172.

## M.

- MAGNIFICENCE ( s-esp. I ), tome 2 , page 278.
- MALACIA ( rap. C ), tome 1 , page 346.
- MAL-AISE, Anxiétés, etc. par la poudre de cra-  
paud ( s-esp. VI ), tome 3 , page 52.
- MAL ANGLAIS des Canadiens , tome 3 , page 502.
- MAL caduc , tome 2 , page 368.
- D'Alep ( rap. B ), tome 3 , page 495.
- De gorge syphilitique ( sorte 40 ), t. 3 , p. 521.
- De la rosa ( rap. B ), tome 3 , page 495.
- De la terre , tome 2 , page 368.
- *Del sole* , tome 3 , page 339.
- De mâchoire , tome 2 , page 355.
- De mère , tome 2 , page 339.
- De Saint-Jean , tome 2 , page 369.
- De Saint-Ladre , tome 3 , page 497.

- De Saint-Lazare , tome 3 , page 497.
- De Saint-Main , tome 3 , page 497.
- Des ardens , tome 2 , page 221.
- Des comices , tome 2 , page 369.
- Des jointures des Indes occidentales de RAYMOND ( rap. D ) , tome 3 , page 500.
- Des renards ( rap. D ) , tome 3 , page 499.
- D'estomac des esclaves américains ( A. ) , tome 1 , page 348.
- D'Hercule , tome 2 , page 368.
- Français , tome 3 , page 502.
- Hystérique , tome 2 , page 339.
- Léonin des Arabes , tome 3 , page 494.
- Napolitain , tome 3 , page 502.
- Rosso , tome 3 , page 339.
- Rouge de Cayenne , tome 3 , page 498.
- Vénérien , tome 3 , page 502.
- MALADIE analogue à l'angine polypeuse ( rap. C ) ,  
tome 3 , page 410.
- Blanche d'HÉRODOTE , tome 3 , page 497.
- Bleue , tome 2 , page 27.
- Coxale , tome 1 , page 300 ; et ( rap. A ) tome 3 , page 352.
- De Job , tome 3 , page 494.
- De la femme aux ongles ( rap. A ) , tome 3 , page 492.
- Du pays , tome 2 , page 260.
- Dysentérique de Noyersg en 1779 ( rap. L ) , tome 2 , page 198.
- Epidémique de Rouvray-Saint-Denis , en 1779 ( variété B ) , tome 2 , page 322.
- Flatulente , tome 2 , page 328.

- Glanduleuse de HENDY , tome 3 , page 498.
  - Hypochondriaque , tome 2 , page 333.
  - Indienne , tome 3 , page 513.
  - Muqueuse , tome 2 , page 28.
  - Noire , tome 2 , page 44. — Atrabilieuse sénile ( D. )  
tome 2 , page 45. — Atrabilieuse succédanée  
( B. ) , tome 2 , page 45. — Critique ( C. ) ,  
tome 2 , page 45. — Sanguine accidentelle ( G. )  
tome 2 , page 45. — Sanguine essentielle et pri-  
mitive ( E. ) , tome 2 , page 45. — Sanguine  
symptomatique et critique ( F. ) , t. 2 , p. 45.
  - Symptomatique , atrabilieuse et scorbutique  
( sorte 5 ) , tome 4 , page 39. — Phénicienne  
d'HIPPOCRATE , tome 3 , page 497.
  - Psoadique ( rap. A ) , tome 4 , page 74.
  - Rare de la vessie , tome 2 , page 36.
  - Sacrée , tome 2 , page 369. — D'HIPPOCRATE ( rap.  
A ) , tome 2 , page 370.
  - Singulière ( rap. A ) , tome 3 , page 467.
  - Spasmodique terminée par la sortie d'un ver ( A. )  
tome 2 , page 125.
  - Strangulatoire ( rap. A ) , tome 3 , page 420.
  - Varenne , tome 2 , page 220 ; et ( s-esp. I ) tome  
3 , page 392.
  - Vénérienne , tome 3 , page 502.
  - Vertébrale ( sorte 27 ) , tome 1 , page 293.
- MALADIES bilieuses , tome 3 , page 468.
- De foiblesse , tome 2 , page 41.
  - Des apothicaires , tome 3 , page 12.
  - Des chimistes , tome 3 , page 12.
  - Des doreurs , tome 3 , page 20.
  - Des potiers d'étain , tome 3 , page 19.

- Des potiers de terre ( rap. G ), tome 3, page 16.
- Nerveuses hystériques, tome 2, page 339.
- Paralytodées, tome 2, page 41.
- Provenant de flux sanguins trop abondans, tome 1, page 268.
- MANIE** ( espèce II ), tome 2, page 346 et 348.
- Agalactique ( sorte 1 ), tome 3, page 70.
- Anarchique ( C. ), tome 2, page 301.
- Apoplectique scrophuleuse ( sorte 4 ), tome 1, page 291.
- Belladonique ( B. ), tome 2, page 224.
- Dafurique ( C. ); tome 2, page 222.
- Dyslochique ( sorte 1 ), tome 3, page 84.
- Hémicrânique ( A. ), tome 2, page 124.
- Humorale ( A. ), tome 2, page 347.
- Laitéuse ( sorte 3 ), tome 3, page 464.
- Menstruelle ( sorte 3 ), tome 3, page 76.
- Mentale, tome 2, page 309.
- Métastatique ( sorte 9 ), tome 2, page 120; ( sorte 1 ) tome 3, page 79; et ( sorte 3 ) tome 3, page 485.
- Nerveuse, tome 2, page 309.
- Obscure ( A. ), tome 2, page 347.
- Par amour ( D. ), tome 2, page 312.
- Par colère ( I. ), tome 2, page 318.
- Par effroi ( A. ), tome 2, page 306.
- Pathématique ( rap. B ), tome 2, page 309.
- Périodique ( s-esp. II ), tome 2, page 347.
- Ulcéreuse ( sorte 7 ), tome 4, page 108.
- Vulgaire ( s-esp. I ), tome 2, page 347.
- MARASME**, tome 3, page 64.
- Hémorroïdal ( sorte 6 ), tome 1, page 267.

- MARISQUE, tome 1, page 235.
- MARMARIGE d'HIPPOCRATE, tome 2, page 265.
- MASTODYNIE, tome 3, page 196.
- Phlegmoneuse (rap. A), tome 3, page 197.
- Pilaire (rap. B), tome 3, page 197.
- Polygale (rap. C), tome 3, page 197.
- MASTODYNITIE (espèce V), tome 3, page 196.
- Cellulaire (s-esp. II), tome 3, page 198.
- Glanduleuse (s-esp. I), tome 3, page 197.
- MASTODYNITIS, tome 3, page 197.
- MAUX de nerf, tome 2, page 324.
- MÉCHANCETÉ (s-esp. VIII), tome 2, page 304.
- MÉCONTENT [le] (espèce XX), t. 2, p. 288.
- MÉDIASTINE, tome 3, page 449.
- MÉDISANCE (variété B), tome 2, page 305.
- MÉDITABILITÉ (s-esp. I), tome 2, page 293.
- MÉFIANCE, tome 2, page 55.
- MELANCHLORE (s-esp. IV), tome 1, page 398.
- MELANCOLIE (espèce I), tome 2, page 252.
- Amoureuse (B), tome 2, page 311.
- Anglaise, tome 2, page 258.
- Argante (A.), tome 2, page 255.
- Atrabilaire (sorte 1), tome 3, page 479.
- Avec l'idée d'être Dieu, roi, riche, etc., tome 2, page 257.
- Dansante, tome 2, page 300.
- Dans laquelle on croit avoir dans l'estomac des grenouilles, dans la tête des lapins, etc. (B.), tome 2, page 256.
- Dans les fièvres (rap. B), tome 2, page 254.
- Erotomanique (variété M), tome 2, page 258.
- Hyppantropique (D.), tome 2, page 257.
- Illusoire

- Illusoire ( s-esp. I ), tome 2 , page 254. — Crain-  
tive ( variété A ), tome 2 , page 254. — Fémi-  
nine ( variété H ), tome 2 , page 257. — Gaie  
( variété I ), tome 2 , page 257. — Inanimique  
( variété B ), tome 2 , page 255. — Inanimique,  
dans laquelle on croit avoir la tête de verre,  
de glace ( A. ), tome 2 , page 255. — Inani-  
mique, dans laquelle on croit avoir les jambes  
de paille ( C. ), tome 2 , page 255. — Inani-  
mique, dans laquelle on croit être mort ( D. ),  
tome 2 , page 255. — Inanimique, dans laquelle  
on croit être une cruche ( B. ), tome 2 , page  
255. — Morbidique ( variété C ), tome 2 ,  
page 255. — Phrontique ( variété E ), tome  
2 , page 256. — Plaintive ( variété K ), tome  
2 , page 258. — Religieuse ( variété D ), tome  
2 , page 256. — Roulant sur la crainte de pro-  
curer une inondation en pissant ( C. ), tome  
2 , page 255. — Roulant sur la crainte de se  
noyer ( E. ), tome 2 , page 255. — Roulant  
sur la crainte d'être empoisonné ( A. ), tome  
2 , page 254. — Roulant sur la crainte de trop  
user ses habits ( B. ), tome 2 , page 254. —  
Roulant sur la crainte qu'Atlas ne dépose le  
monde sur ses épaules ( D. ), tome 2 , page  
255. — Stupéfactive ( variété F ), tome 1 , page  
256. — Zoantropique ( variété G ), tome 2 ,  
page 257.
- Mentale ( rap. D ), tome 2 , page 294.  
— Morique, tome 2 , page 257.  
— Nympholepsique ( variété N ), tome 2 , page 259.  
— Par enthousiasme, tome 2 , page 297.

- Profonde ( B. ), tome 2 , page 303.
- Scytique , tome 2 , page 257.
- Suicidique ( variété L ), tome 2 , page 258.
- Vulgaire , tome 2 , page 255.
- Utérine de NENTER , tome 2 , page 349.
- Zoantropique , déterminant la croyance d'être changé en coq ( E. ), tome 2 , page 257. — Déterminant la croyance d'être changé en lapin ( C. ), tome 2 , page 257.
- MELASICTÈRE** , tome 2 , page 27.
- Nuancé ( variété A ), tome 2 , page 28.
- Périodique ( variété B ), tome 2 , page 28.
- MELÆNA** , tome 2 , page 44.
- MELÆNE** atrabilieux ( A. ), tome 2 , page 45 ; et ( B. ), tome 2 , page 45.
- Hémorragique ( A. ), tome 2 , page 44.
- Première d'HIPPOCRATE ( C. ), tome 2 , page 45.
- Sanguine ( A. ), tome 2 , page 44.
- Splénique ( E. ), tome 2 , page 45.
- MÉLOMANIE** ( variété F ), tome 2 , page 299.
- MELON** ( variété E ), tome 4 , page 200.
- MEMBRANIFICATION** ( B. ), tome 3 , page 388.
- MEMBRES** gélés , tome 1 , pages 285 et 394.
- MÉNINGÉE** ( s-gen. II ), tome 3 , page 394.
- Spontanée ( espèce I ), tome 3 , page 394.
- Violentielle ( espèce II ), tome 3 , page 396.
- MÉNORRAGIE** , tome 1 , page 268.
- Abortive ( rap. ), tome 3 , page 106.
- Blanche , tome 2 , page 38.
- Des femmes grosses ( sorte 2 ), tome 3 , page 103.
- Difficile ( rap. A ), tome 3 , page 76.
- Distillante ( rap. B ), tome 3 , page 76.

- Gravidique, tome 1, page 272.
- Hystéroptosique ( sorte 1 ), tome 4, page 226.
- Immodérée, tome 1, page 270 ; et ( sorte 5 )  
tome 2, page 46.
- Incolore ( rap. A ), tome 2, page 39.
- Lochiale, tome 1, page 274.
- Pléthorique ( sorte 5 ), tome 1, page 224.
- Rouge, tome 1, page 270.
- Ulcéreuse, tome 4, page 117.
- Variqueuse ( variété B ), tome 1, page 241.
- MENTEUR** [ le ] ( espèce XV ), tome 2, page 286.
- MENTISME** ( genre XXVI ), tome 2, page 292.
- Imaginatif ( espèce I ), tome 2, page 293.
- Pathématique ( espèce II ), tome 2, page 307.
- MÉROCÈLE** ( s-esp. IV ), tome 4, page 203.
- Epiploïco-intestinale ( var. R ), tome 4, page 215.
- Epiploïque ( syn. ), tome 4, page 211.
- Intestinale ( variété E ), tome 4, page 213.
- MÉRORIXE** ( variété Z ), tome 4, page 216.
- MESCLERIE**, tome 3, page 497.
- MÉSENTÉREMPHRAXIS**, tome 3, page 445.
- MÉSENTÉRÉSIE**, tome 3, page 458.
- Lente ( s-esp. I ), tome 3, page 458.
- MESENTERITIS**, tome 3, page 458.
- MÉTASTASE**, tome 4, page 64.
- MÉTÉORISME** ( rap. A ), tome 3, page 134.
- Abdominal ( sorte 2 ), tome 3, page 432.
- Ardent, tome 3, page 36.
- Gastrique ( sorte 7 ), tome 1, page 348 ; et  
( sorte 16 ), tome 2, page 35.
- Hystérique ( sorte 34 ), tome 2, page 344.
- METOSE** ( variété A ), tome 2, page 327.

- MÉTRALGIE** (espèce XVII), tome 2, page 424.  
 — Après l'accouchement (rap. A), tome 2, page 425.
- MÉTREMTHRAXIS**, tome 3, page 147.
- MÉTRITIE** (espèce XII), tome 3, page 208.  
 — Laitéuse (rap. B), tome 3, page 209.  
 — Puerpérale (rap. A), tome 3, page 209.  
 — Typhode (sorte 2), tome 3, page 472.
- MÉTRITIS**, tome 3, page 208.
- MÉTROCÈLE** (s-esp. XVI), tome 4, page 217.
- MÉTROLOXIE** (espèce II), tome 4, page 228.
- MÉTROMANIE** (variété E), tome 2, pages 299  
 et 349.
- **D'ASTRUC**, tome 2, page 349.
- Douleuruse (s-esp. I), tome 2, page 350.
- MÉTRONÉVRIE**, tome 2, page 338.
- MÉTROPTOSE** (espèce V), tome 4, page 223.
- MÉTRORRAGIE** (espèce VI), tome 1, page 267.  
 — Gravidique (s-esp. II), tome 1, page 271. —  
   Placentique (variété C), tome 1, page 273.  
   — Utérine (variété B), tome 1, page 272.  
   — Vaginale (variété A), tome 1, page 272.
- Puerpérique (s-esp. III), tome 1, pages 273 et  
 274. — Cachée (variété B), tome 1, page  
 274. — Visible (variété A), tome 1, page  
 274.
- Virginale (s-esp. I), tome 1, page 270. — Dé-  
 terminée (variété B), tome 1, page 271. —  
 Indéterminée (variété A), tome 1, page 270.
- MÉTRORRHEE** (s-esp. IV), tome 2, page 38.  
 — Hydatidique (sorte 4), tome 2, page 112.
- MIAROLA** des Piémontais (rapport D), tome 3,  
 page 377.

- MICTALGIE** ( espèce XV ), tome 2 , page 422.  
**MIGLIARINA** ( rap. E ), tome 3 , page 377.  
**MIGRAINE**, tome 2 , page 399.  
 — Clou ( A. ), tome 2 , page 343.  
 — Corysée ( sorte 2 ), tome 3 , page 176.  
 — Des sinus ( sorte 1 ), tome 3 , page 176.  
 — Hémorroïdale ( sorte 7 ), tome 3 , page 77.  
 — Insectique ( C. ), tome 2 , page 124.  
 — Lunatique ( rap. A ), tome 2 , page 400.  
 — Oculaire ( sorte 1 ), tome 3 , page 401.  
 — Pléthorique ( sorte 33 ), tome 1 , page 227.  
**MILIAIRE** ( genre LXVII ), tome 3 , page 374.  
 — Angineux ( s-esp. III ), tome 3 , page 380.  
 — Bénin ( rap. A ), tome 3 , page 378.  
 — Blanc ( espèce II ), tome 3 , page 378.  
 — Chronique , tome 3 , page 382.  
 — Confluent ( variété A ), tome 3 , page 378.  
 — Ephidrosique ( s-esp. II ), tome 3 , page 379.  
 — Laiteux ( sorte 3 ), tome 3 , page 463.  
 — Lent ( s-gen. II ), tome 3 , page 381.  
 — Nautique , tome 2 , page 189.  
 — Pourpré , tome 2 , page 187.  
 — Puerpéral ( A. ), tome 3 , page 463.  
 — Puerpérique ( s-esp. IV ), tome 3 , page 380.  
 — Récidivant ( variété B ), tome 3 , page 378.  
 — Régulier ( s-esp. I ), tome 3 , page 378.  
 — Rouge ( espèce I ), tome 3 , page 378.  
 — Vif ( s-gen. I ), tome 3 , page 378.  
**MILLET**, tome 3 , page 422.  
**MILLOT** ( rap. G ), tome 3 , page 377.  
**MINUTIE** ( sorte 5 ), tome 2 , page 53.  
**MINUTIEUX** [ le ], tome 2 , page 53.

- MISANTROPIE** ( variété I ), tome 2 , page 304.  
**MISERERE** , tome 2 , page 415.  
**MISPACH** de MOYSE , tome 3 , page 495.  
**MOLESSE** ( variété A ), tome 2 , page 57.  
**MONSTRUOSITÉ** ( syn. ), tome 4 , page 239.  
**MORBILLES** , tome 3 , page 370.  
**MORBUS** *arenatus* ou *arquatus* , tome 3 , page 473.  
 — *Pilaris* , tome 3 , page 197.  
 — *Regius* , tome 3 , page 473.  
**MOROSITÉ** ( sorte 2 ), tome 2 , page 51.  
**MORPHEE** ( rap. C ), tome 3 , page 339.  
 — Blanche ( rap. C ), tome 3 , page 497.  
 — Brune ( rap. H ), tome 3 , page 496.  
 — Hépatique ( variété B ), tome 3 , page 339.  
 — Noire ( variété A ), tome 3 , page 339 , et ( rap. G ) tome 3 , page 496.  
**MORSURE** ( rap. B ), tome 4 , page 77.  
 — Couleuyrique ( s-esp. III ), tome 2 , page 214.  
 — Crotalique ( s-esp. I ), tome 2 , page 212.  
 — De l'ammodyte ( C. ), tome 2 , page 214.  
 — De l'aspic ( A. ), tome 2 , page 215.  
 — Des serpens , tome 2 , page 211.  
 — Du boeten ( B. ), tome 2 , page 214.  
 — Du boiquira ( A. ), tome 2 , page 213.  
 — Du chersée ( E. ), tome 2 , page 215.  
 — Du chien enragé , tome 3 , page 38.  
 — Du dryinas ( B. ), tome 2 , page 213.  
 — Du lebetin ( F. ), tome 2 , page 215.  
 — Du millet ( C. ), tome 2 , page 213.  
 — Du piscivore ( A. ), tome 2 , page 213.  
 — Du serpent à lunettes ( D. ), tome 2 , page 215.  
 — Du serpent poison ( A. ), tome 2 , page 214.

( 423 )

- Scytatique (s-esp. II), tome 2, page 213.
- MORT à la suite d'une piqure faite par une guêpe ( B. ), tome 3, page 50.
- Subite, tome 3, page 34.
- Très-prompte, tome 2, page 227.
- MORTA, tome 2, page 210.
- MORTIFICATION des orteils et des pieds, tome 2, page 332.
- MOUVEMENS convulsifs, tome 2, page 368. — De RIVIÈRE, tome 2, page 367.
- MUÉTISME ( espèce IX ), tome 3, page 60.
- Cophosique ( D. ), tome 3, page 59.
- De WEILER, tome 3, page 61.
- Glossolysique ( rap. A ), tome 3, page 61.
- Siccatif ( C. ), tome 3, page 61.
- Traumatique ( B. ), tome 3, page 61.
- MUGUET, tome 3, page 422.
- Confluent ( rap. A ), tome 3, page 423.
- Discret et bénin ( rap. B ), tome 3, page 423.
- Malin ( rap. C ), tome 3, page 423.
- MULES, tome 3, page 350.
- MULTITUDE ou plénitude, tome 1, page 220.
- MURE, tome 3, page 152.
- MUSCLES changés en graisse ( rap. B ), tome 3, page 467.
- MUSOLEPSIE, tome 2, page 299.
- MUTITE, tome 3, page 60.
- Glossolysique ( sorte ), tome 1, page 397.
- Narcotique ( E. ), tome 2, page 222.
- Spasmodique ( sorte 21 ), tome 2, page 331.
- Traumatique ( sorte 28 ), tome 4, page 83.
- MYDRIASE, tome 1, page 323.

( 424 )

- MYOCÉPHALE** (variété C), tome 4, page 200.  
**MYOCOLITIS** (s-esp. I), tome 3, page 391.  
**MYODE** (s-esp. I), tome 2, page 265.  
**MYODINIE** syphilitique (sorte 23), t. 3, p. 519.  
**MYOPIASE**, tome 2, page 64.  
**MYOPIE**, tome 2, page 64.  
**MYOSITIE**, tome 3, page 389.  
**MYSOGINIE** (variété K), tome 2, page 304.

## N.

- NARCOSE** (genre XXXII), tome 2, page 360.  
 — Modérée (espèce I), tome 2, page 363.  
 — Violente (espèce II), tome 2, page 365.  
**NARCOTISME**, tome 2, page 215.  
**NASILLEMENT** emphysématique (sorte 3), tome 3, page 133.  
**NAUSEE** (s-esp. III), tome 2, page 82.  
 — Apostématique (rap. A), tome 4, page 72.  
 — Apostémato-cardiaque (sorte 1), tome 4, page 70.  
 — Biliéuse (sorte 2), tome 3, page 337.  
 — Cacochylique (rap. A), tome 2, page 83.  
 — Compressive (sorte 1), tome 3, page 140.  
 — Gastritique (sorte 1), tome 3, page 427.  
 — Gastrocélique (sorte 1), tome 4, page 208.  
 — Gravidique (sorte 9), tome 3, page 103.  
 — Marine (sorte 5), tome 2, page 329.  
 — Néphrétique (sorte 3), tome 3, page 112.  
 — Pancréatique (sorte 1), tome 3, page 141.  
 — Tœniaire (sorte 1), tome 2, page 109.  
**NÉCROSE**, tome 4, page 56, et (esp. I), tome 4, page 59.  
 — Epidémique (rap. A), tome 4, page 56.

- Ergotique ( F. ), tome 2, page 220.
- Fébrile ( rap. B ), tome 4, page 56.
- NEGRENDIS ( rap. C ), tome 4, page 240.
- NÉPHRALGIE ( espèce XIII ), tome 2, page 422.
- Arthritique ( sorte 17 ), tome 4, page 170.
- Calculeuse ( rap. A ), tome 3, page 112.
- Fiévreuse, tome 2, page 145.
- Gravidique ( sorte 19 ), tome 3, page 104.
- Hystérique ( sorte 26 ), tome 2, page 343.
- Miliaire ( sorte 7 ), tome 3, page 382.
- Pléthorique ( sorte 37 ), tome 1, page 228.
- Rhumatique ( sorte 11 ), tome 3, page 393.
- Sablonneuse ( rap. A ), tome 3, page 111.
- NÉPHREMPHRAXIS, tome 3, page 146.
- NÉPHRITIE ( espèce XI ), tome 3, page 207.
- Calculeuse ( rap. B ), tome 3, page 112.
- Vraie ( rap. A ), tome 3, page 208.
- NEPHRITIS, tome 3, page 207.
- NÉVRALGIE, tome 2, page 396.
- NÉVROSE ( genre XXVIII ), tome 2, page 320.
- Apyrétique asthénique ( sorte 16 ), t. 2, p. 47.
- Avec affection dominante des nerfs de l'estomac, tome 2, page 333.
- Avec affection dominante des organes de la génération, tome 2, page 339.
- Hypochondrique ( esp. III ), tome 2, page 332.
- Métrique ( espèce IV ), tome 2, page 338. — Convulsive ( s-esp. II ), tome 2, page 341. — Flatulente ( s-esp. I ), tome 2, page 341. — Stercoreuse ( s-esp. III ), tome 2, page 342.
- Par haine ( A. ), tome 2, page 314.
- Pyrétique avec lésion apparente de la circulation.

( 426 )

- ( esp. I ), tome 2, page 321. — Lente ( s-esp. I ), tome 2, page 321. — Vive ( s-esp. II ), tome 2, page 324.
- Spasmodique avec lésion manifeste de l'action tonique ( espèce II ), tome 2, page 324.
- NÉVROSES**, tome 2, page 320.
- Apyrétiques ( §. II ), tome 2, page 324.
- Pyrétiques ( §. I ), tome 2, page 321.
- NEZ** morveux, tome 2, page 36.
- NIAISERIE**, tome 2, page 244.
- NOCTAMBULATION**, tome 2, page 274.
- NŒVUS**, tome 3, page 338.
- NOLI ME TANGERE** des anciens ( variété A ), tome 4, page 116.
- NOME** ( rap. C ), tome 4, page 95.
- NONAINE** ( variété E ), tome 2, page 169.
- NONCHALANCE** ( variété B ), tome 2, page 56.
- NOSTALGIE** ( espèce II ), tome 2, page 259.
- Compliquée ( s-esp. I ), tome 2, page 260.
- Simple ( rap. A ), tome 2, page 260.
- Simulée ( rap. B ), tome 2, page 260.
- NOSTOMANIE**, tome 2, page 260.
- NOUAGE** ( syn. ), tome 4, page 154.
- NOUVELLE** fièvre de 1686 ( rap. E ), tome 2, page 184.
- NYCTALOPIE**, tome 2, page 65.
- Achorique ( sorte I ), tome 3, page 487.
- D'HIPPOCRATE ( sorte 3 ), tome 2, page 329.
- NYMPHOLEPSIE**, tome 2, page 259.
- NYMPHOMANIE**, tome 2, page 349.
- Dououreuse, tome 2, page 350.
- Furibonde ( variété B ), tome 2, page 349.

- Salacitique ( variété A ), tome 2 , page 349.
- NYSTAGME ( rap. G ), tome 2 , page 373.
- Vermineux ( B. ), tome 2 , page 124.
- O.
- OBÉSITÉ, tome 3 , page 466.
- Pyrosique ( sorte 2 ), tome 3 , page 466.
- OBSERVATION sur une abstinence singulière ( rap. C ), tome 3 , page 66.
- Sur une éruption parfaitement noire ( rap. B ), tome 3 , page 369.
- OBSTINATION ( s-esp. III ), tome 2 , page 285.
- OBSTIPATION, tome 3 , page 73.
- OBSTRUCTION, tome 3 , page 137.
- Au pylore, tome 3 , page 139.
- OCTAINE ( variété D ), tome 2 , page 169.
- OCULITIS, tome 3 , page 192.
- ODAXISME, tome 2 , page 403.
- Nerveux, tome 2 , page 403.
- ODONTALGIE ( espèce V ), tome 2 , page 402.
- Arthritique ( sorte 15 ), tome 4 , page 170.
- Carieuse ( s-esp. I ), tome 2 , page 404.
- Catarrhale ( sorte 16 ), tome 3 , page 415.
- Dentaire ( II. ), tome 2 , page 404.
- Gingivale ( I. ), tome 2 , page 403.
- Gravidique ( sorte 16 ), tome 3 , page 104.
- Hystérique ( sorte 21 ), tome 2 , page 343.
- Maxillaire ( s-esp. II ), tome 2 , pages 403 et 405.
- Nerveuse ( s-esp. I ), tome 2 , page 403.
- Par la dentition ( rap. A ), tome 2 , page 403.
- Pléthorique ( sorte 34 ), tome 1 , page 227.

- Scorbutique ( sorte 19 ), tome 4, page 40.
- Stomacale ( sorte 17 ), tome 2, page 87.
- Syphilitique ( sorte 17 ), tome 3, page 519.
- ŒDÉMATIE** concrète, tome 1, page 286.
- Des femmes grosses ( sorte 4 ), tome 3, page 103.
- Laitéuse ( sorte 2 ), tome 3, page 464.
- ŒDÈME** ( espèce II ), tome 1, page 310.
- Chaud ( sorte 7 ), tome 1, page 225.
- De la gorge ( variété C ), tome 1, page 311.
- De la tête ( variété A ), tome 1, page 311.
- Des extrémités inférieures ( variété G ), tome 1, page 313.
- Des paupières ( variété B ), tome 1, page 311.
- Du genou ( variété F ), tome 1, page 312.
- Du poumon ( variété D ), tome 1, page 311.
- Du scrotum ( variété E ), tome 1, page 312.
- Enorme après la piqure du scorpion ( B. ), tome 3, page 48.
- Exanthématique ( sorte 3 ), tome 3, page 382.
- ŒSOPHALGIE** ( esp. VI ), tome 2, page 405.
- Empêchée ( s-esp. II ), tome 2, page 406.
- Libre ( s-esp. I ), tome 2, page 406.
- OMENTÉSIE**, tome 3, page 456.
- OMENTITIS**, tome 3, page 456.
- OMPHALOCÈLE** ( s-esp. II ), tome 4, page 202.
- Epiploïque ( syn. ), tome 4, page 211.
- OMPHALORIXE** ( variété AA ), t. 4, p. 216.
- OMPHALORRAGIE** ( esp IX ), tome 1, page 278.
- ONEYRODINIE**, tome 2, page 273.
- Active ( rap. A ), tome 2, page 275.
- Gravative ( rap. A ), tome 2, page 273.
- ONYCHIE**, tome 3, page 349.

- ONYX, tome 4, page 66.  
 — Des Grecs, tome 4, page 66.  
 OPHTALGIE ( espèce IV ), tome 2, page 401.  
 OPHTALMIE ( s-gen. III ), tome 3, page 396.  
 — Adnatique ( s-esp. II ), tome 3, page 399. — An-  
 gulaire ( variété B ), tome 3, page 400. —  
 Totale ( variété A ), tome 3, page 399.  
 — Aiguë ( rap. A ), tome 3, page 401. — Forte,  
 ( rap. D ), tome 3, page 191.  
 — Angulaire ( rap. B ), tome 3, page 175; et ( rap.  
 A ), tome 3, page 400.  
 — Cancéreuse, tome 4, page 116.  
 — Chemosis ( rap. A ), tome 3, page 192.  
 — Choroïdienne ( rap. B ), tome 3, page 192.  
 — Cornéique ( s-esp. III ), tome 3, page 400. — In-  
 tense ( variété A ), tome 3, page 400.  
 — Du tarse ( rap. B ), tome 3, page 398.  
 — Erysipélateuse ( variété A ), tome 3, page 402.  
 — Fièvre intermittente ( sorte 24 ), tome 2, page 172.  
 — Fiévreuse ( rap. I ), tome 2, page 145.  
 — Gastrique ( sorte 27 ), tome 2, page 89.  
 — Herpétique, tome 3, page 402.  
 — Humide ( espèce I ), tome 3, page 398, et ( rap.  
 A ), tome 3, page 398.  
 — Lagophthalmique ( sorte 1 ), tome 4, page 241.  
 — Métastatique ( sorte 20 ), tome 2, page 110;  
 ( sorte 7 ), tome 3, page 338; ( rap. B )  
 tome 3, page 402; ( A. ) tome 3, page 485;  
 et ( sorte 26 ) tome 4, page 171.  
 — Par l'unguis ( A. ), tome 4, page 66.  
 — Phlycténeuse ( variété C ), tome 3, page 403.  
 — Pléthorique ( sorte 50 ), tome 1, page 219.

- Puriforme des enfans ( var. C ), t. 3 , p. 399.
- Pustuleuse ( rap. B ), tome 3 , page 401.
- Rachitique ( sorte 5 ), tome 4 , page 158.
- Scabre ( s-esp. II ), tome 3 , page 401.
- Scrophuleuse ( sorte 19 ), tome 1 , page 192.
- Sèche ( s-esp. II ), tome 3 , page 193 , et ( esp. II ), tome 3 , page 401. — Nue ( s-esp. I ), tome 2 , page 402.
- Synéchisienne ( sorte 1 ), tome 4 , page 236.
- Syphilitique ( sorte 39 ), tome 3 , page 521.
- Taraxe ( rap. A ), tome 3 , page 399.
- Tarsienne ( s-esp. I ), tome 3 , page 398.
- Ténébreuse ( rap. A ), tome 3 , page 401.
- Tracome ( sorte 8 ), tome 3 , page 485.
- Trichiaise ( rap. D ), tome 3 , page 400 , et ( sorte 34 ), tome 4 , page 83.
- Tuberculeuse ( rap. A ), tome 3 , page 183.
- Uvéique ( sorte 2 ), tome 3 , page 122.
- Vitrée ( variété B ), tome 3 , page 401.
- OPHTALMITES , tome 3 , page 191.
- OPHTALMITIE ( esp. II ), tome 3 , page 191.
- Humide ( s-esp. I ), tome 3 , page 192.
- OPHTALMOCÈLE ( espèce II ), tome 4 , page 199.
- OPHTALMODYNNIE , tome 2 , page 401.
- Spasmodique ( rap. A ), tome 2 , page 402.
- OPINIATRETÉ ( s-esp. II ), tome 2 , page 285.
- OPISTHOTONE , tome 2 , page 352.
- OPODÉOCÈLE ( s-esp. VI ), tome 4 , page 205.
- OPPRESSION cardiaque ( O. ), tome 2 , page 318.
- OREILLONS , tome 3 , page 177.
- ORGOLET ( s-esp. I ), tome 3 , page 181.
- Chalazic , tome 3 , page 153.

- Grêle, tome 3, page 152.
- Verruqueux (espèce III), tome 3, page 155.
- ORGUEIL (espèce I), tome 2, page 276.
- ORGUEILLEUX, tome 3, page 182.
- ORIGINAL [ 1° ] (s-esp. I), tome 2, page 282.
- ORTÉTTRISQUE (espèce II), tome 4, page 239.
- ORTHOPNÉE, tome 2, page 382.
- Anévrismatique (sorte 10), tome 1, page 248.
- Antipathique (sorte 2), tome 2, page 272.
- Cardiaque (rap. C), tome 2, page 383, et (sorte 5), tome 3, page 161.
- Empyématisque (sorte 1), tome 4, page 71.
- Epidémique à Forges, en 1774 (rap. B), tome 2, page 383.
- Fiévreuse (sorte 16), tome 2, page 172.
- Gastrocélisque (sorte 4), tome 4, page 208.
- Hydropneumonique, tome 1, page 313.
- Hydrothorachique (sorte 4), tome 1, page 326.
- Hystérique (sorte 19), tome 2, page 343.
- Par les champignons (A.), tome 2, page 239.
- Polypeuse (sorte 4), tome 3, page 161, et (sorte 3), tome 3, page 160.
- Polysarcique (sorte 1), tome 3, page 466.
- Pseudo-péricipneumonique (sorte 12), tome 3, page 415.
- Scorbutique (sorte 17), tome 4, page 40.
- Spasmodique (rap. A), tome 2, page 383.
- Traumatique (sorte 18), tome 4, page 82.
- Variolique (sorte 9), tome 3, page 222.
- Vomiquee (sorte 2), tome 4, page 70.
- ORTIAIRE (genre LXIV), tome 3, page 361.
- Chronique (s-esp. III), tome 3, page 363.

- Tachetée ( espèce I ), tome 3, page 362.
- Tubéreuse ( espèce III ), tome 3, page 364.
- Vésiculaire ( espèce II ), tome 3, page 364.
- OSCHÉOCÈLE, tome 1, page 338, et ( s-esp. X )  
tome 4, page 207.
- Aqueuse ( rap. ), tome 1, page 340.
- Epiploïco-intestinale ( var. M ), tome 4, page 214.
- Epiploïque ( syn. ), tome 4, page 211.
- Flatulente, tome 3, page 137.
- Hydatidique ( sorte 15 ), tome 2, pages 114.
- Intestinale ( variété B ), tome 4, page 213.
- Malabarique ( variété A ), tome 1, page 340.
- Séminale ( rap. A ), tome 3, page 84.
- OSCHÉOPHYME, tome 1, page 338.
- OSCITANTE ( sorte 14 ), tome 3, page 173.
- OSTÉODYNIE syphilitique ( sorte 22 ), tome 3,  
page 519.
- OSTÉOMALACIE ( syn. ), tome 4, page 155.
- Cachectique, tome 4, page 157.
- Congéniale, tome 4, page 157.
- Partielle, tome 4, page 157.
- Rachitique, tome 4, page 157.
- OSTÉONISME ( gen. LXXXVI ), tome 4, p. 158.
- OSTÉOSTÉATOME ( s-esp. IV ), tome 3, page 468.
- OTALGIE ( espèce III ), tome 2, page 401.
- Catarrhale ( sorte 15 ), tome 3, page 415.
- Inflammatoire ( rap. A ), tome 3, page 404.
- Vermineuse ( A. ), tome 2, page 125.
- OTITE ( s-gen. IV ), tome 3, page 404.
- Lente ( espèce II ), tome 3, page 405.
- Vive ( espèce I ), tome 3, page 404.
- OTORRAGIE ( espèce II ), tome 1, page 255.

OTORRHÉE

- OTORRHÉE** ( sorte 3 ), tome 3, page 360.  
**OUBLI** ( espèce I ), tome 2, page 243.  
 — Céphalalgique ( sor. 3 ), tome 2, page 397.  
**Coïtrique** ( s-esp. I ), tome 2, page 243.  
 — Fébrique ( rap. G ), tome 2, page 324.  
 — Pathématique ( rap. A ), tome 2, page 31, et ( A. )  
 tome 2, page 307.  
 — Pléthorique ( sorte 15 ), tome 1, page 225.  
 — Sénile ( s-esp. II ), tome 2, page 243.  
**OUIE** dure, grave, tome 2, page 270.  
 — Tendre, tome 2, page 270.  
**OURLES**, tome 3, page 177.  
**OVAIRITIE** ( esp. XIII ), tome 3, page 110.  
**OXIGÉNÈSES** ( classe II ), tome 2, page 5.  
**OXYPHONIE** ( rap. E ), tome 2, page 74.  
**OZÈNE** ( rap. G ), tome 4, page 92.  
 — Scrophuleux ( sorte 25 ), tome 1, page 193.  
 — Syphilitique ( A. ), tome 3, page 322.  
**PANORRÉASITIS** ( espèce III )  
**PALES COULEURS**, tome 1, page 344.  
**PALPITATION** ( espèce IV ), tome 2, page 374.  
 — Aortique, tome 1, page 247.  
 — Arthritique ( sorte 11 ), tome 4, page 170.  
 — Calculeuse ( rap. C ), tome 3, page 115.  
 — Cardiogmique ( sorte 7 ), tome 1, page 147.  
 — Chlorotique ( sorte 4 ), tome 3, page 348.  
 — Fiévreuse ( sorte 13 ), tome 2, page 171.  
 — Foible ( variété B ), tome 2, page 375.  
 — Hystérique ( sorte 16 ), tome 2, page 342.  
 — Mélancolique ( sorte 2 ), tome 2, page 159.

- Mortelle (L.), tome 2, page 318.
- Ossificative (sorte 5), tome 4, page 238.
- Pancréatique (sorte 3), tome 3, page 141.
- Par un abcès du péricarde (rap. B), tome 4, page 72.
- Polypeuse (sorte 2), tome 3, page 161.
- Tremblotante, tome 2, page 375.
- Vive (variété A), tome 2, page 375.
- PANARIS** (s-esp. VII), tome 3, page 348. — 1. re variété de BELL, tome 3, page 349.
- Adipeux, tome 3, page 349.
- Cellulaire (variété B), tome 3, page 349.
- Chronique (variété E), tome 3, page 350.
- Périostin (variété D), tome 3, page 350.
- Phlegmoneux, tome 3, page 349.
- Sec de Crell, tome 3, page 350.
- Syphilitique (sorte 38), tome 3, page 521.
- Tendineux (variété C), tome 3, page 349.
- Ungulaire (variété A), tome 3, page 349.
- PANCRÉASITIE** (espèce VIII), tome 3, page 202.
- PANCREASITIS**, tome 3, page 202.
- PANCRÉATEMPHRAXIS**, tome 3, page 141.
- PANCREATICA**, tome 3, page 202.
- PANAPHOBIE**, tome 2, page 274.
- Phrontique, tome 2, page 256.
- PAPULE** (rap. A), tome 3, page 341.
- PARACUSE** (espèce V), tome 2, page 269.
- Baricoïque (s-esp. I), tome 2, page 270.
- Bruyante (s-esp. IV), tome 2, page 270.
- Doublée (s-esp. III), tome 2, page 270.
- Opposée (s-esp. V), tome 2, page 271.
- Oxicoïque (s-esp. II), tome 2, page 270.

- Willisienne, tome 2, page 270.
- PARAGLOSSE** ( espèce II ), tome 4, page 220.
- Déglutitoire ( sorte 11 ), tome 3, page 63; et  
( s-esp. I ), tome 4, page 221.
- Exertoire tome 3, page 63; et ( s-esp. III ) tome  
4, page 221.
- Glossomégiste ( s-esp. II ), tome 4, page 221.
- Rétractoire ( s-esp. IV ), tome 4, page 221.
- PARALYSIE** ( genre XL ), tome 3, page 52.
- Billaieuse, tome 3, page 18.
- Croisée ( variété F ), tome 3, page 56.
- De la tête ( variété C ), tome 3, page 55.
- Des bras ( sorte 2 ), tome 3, page 360.
- Des cuisses ( variété G ), tome 3, page 56.
- Des extrémités avec courbure de l'épine du dos  
( B. ), tome 3, page 57.
- Des membres ( variété E ), tome 3, page 55.
- Des muscles de la face ( A. ), tome 1, page  
302.
- Douloreuse ( espèce III ), tome 3, page 57.
- Du thorax ( variété D ), tome 3, page 55.
- Ecrouelleuse ( sorte 11 ), tome 1, page 191.
- Exanthématique ( sorte 6 ), tome 3, page 485.
- Fébrile ( sorte 17 ), tome 3, page 173.
- Métallurgique, tome 3, page 18.
- Miliare ( sorte 8 ), tome 3, page 381.
- Musculaire ( espèce I ), tome 3, page 56.
- Nerveuse ( espèce II ), tome 3, page 56.
- Par colère ( R. ), tome 2, page 318.
- Pléthorique ( sorte 38 ), tome 1, page 228.
- Rachialgique ( sorte 9 ), tome 3, page 18.
- Rhumatique ( sorte 12 ), tome 3, page 393; et

( 436 )

- ( sorte 19 ) tome 4 , page 171. — Guérie par l'onguent mercuriel ( B. ) , tome 1 , page 302.
- Rhumatismale ( sorte 9 ) , tome 1 , page 302.
- Scorbutique ( sorte 21 ) , tome 4 , page 40.
- Séréuse ( sorte 6 ) , tome 1 , page 305.
- Traumatique ( espèce IV ) , tome 3 , page 57 ; et ( sorte 22 ) , tome 4 , page 82.
- Variqueuse ( variété H ) , tome 1 , page 241.
- Vermineuse ( sorte 30 ) , tome 2 , page 100. —  
Des muscles du côté gauche de la face ( A. ) ,  
tome 2 , page 100.
- Vomiquée ( sorte 4 ) , tome 4 , page 70.
- PARALYSIES générales ( §. I ) , tome 3 , page 54.
- Organiques ( §. III ) , tome 3 , page 58.
- Partielles ( §. II ) , tome 3 , page 55.
- PARAPHONIE , tome 2 , page 73.
- Catarrhale ( sorte 3 ) , tome 3 , page 414.
- Nazale ( variété B ) , tome 2 , page 74.
- Polypeuse ( sorte 1 ) , tome 3 , page 158.
- Pubertique ( variété A ) , tome 2 , page 74.
- Résonnante , tome 2 , page 74.
- Sifflante ( rap. A ) , tom. 2 , page 381 ; et ( rap. C ) , tome 3 , page 196.
- Sifflement ( A. ) , tome 3 , page 414.
- Stertoreuse ( rap. B ) , tome 2 , page 366.
- Ulcéreuse ( sorte 5 ) , tome 4 , page 108.
- PARAPHRENESIE , tome 3 , page 452.
- Diaphragmatique ( rap. A ) , tome 3 , page 453.
- PARAPHROSINE , tome 2 , page 345 et 347.
- Cataleptique ( B. ) , tome 2 , page 375.
- Hystérique ( A. ) , tome 2 , page 275.

- PARAPHYMOSIS** (s-esp. II), tome 3, page 179 ;  
 et (s-esp. X), tome 3, page 351.
- PARAPHYNIE** (genre XXIX), tome 2, page 344.
- PARAPLÉGIE** (variété B), tome 3, page 55.  
 — Après une fracture des vertèbres du cou (A),  
 tome 3, page 57.  
 — Traumatique (sorte 24), tome 4, page 82.
- PARAPLEXIE** (variété B), tome 3, page 55.  
 — Intermittente (sorte 22), tome 2, page 172.  
 — Rachialgique (sorte 10), tome 3, page 18.  
 — Rhumatique, tome 3, page 57.  
 — Sanguine (sorte 40), tome 1, page 228.  
 — Syphilitique (sorte 25), tome 3, page 520.
- PARAPOPLEXIE**, tome 2, page 152.
- PARECTAMIE** (genre LII), tome 3, page 126.  
 — Cardiaque (espèce II), tome 3, page 127.  
 — Clitorique (espèce VI), tome 3, page 129.  
 — Hépatique (espèce III), tome 3, page 128. —  
 Aiguë (variété A), tome 3, page 128. —  
 Chronique (variété B), tome 3, page 128.  
 — Linguale (espèce I), tome 3, page 127.  
 — Nymphale (espèce VII), tome 3, page 189.  
 — Physconique (espèce VIII), tome 3, page 130.  
 — Rénale (esp. V), tome 3, page 129.  
 — Splénique (espèce I), tome 3, page 128.
- PARESIE**, tome 3, page 57.  
 — Gonorrhôïque (sorte 26), tome 3, page 520.
- PARESSÉ** (sorte 10), tome 2, page 56.
- PARORCHIDE** (espèce III), tome 4, page 228.  
 — Intropressivé (s-esp. III), tome 4, page 229.  
 — Rétractile (s-espèce II), tome 4, page 229.  
 — Ventrale ou inguinale (s-esp. I), tome 4, page 229.

- PARORCHIDIUM**, tome 4, page 228.  
**PAROTIDE** (espèce V), tome 3, page 176.  
 — Accidentelle (s-esp. II), tome 3, page 178.  
 — Judicatoire (s-esp. III), tome 3, page 178.  
 — Primitive (s-esp. I), tome 3, page 177.  
**PAROTIDES** symptomatiques, tome 3, page 178.  
**PARULIE** (espèce II), tome 3, page 175.  
**PARULIS**, tome 3, page 175.  
**PASSION** hystérique, fièvre intermittente (sorte 5),  
 tome 2, page 171.  
 — Iliaque, tome 2, page 415.  
**PÉDANTERIE** (s-esp. I), tome 2, page 280.  
**PÉLAGRE** (rap. D), tome 3, page 339.  
**PELLARINA**, tome 3, page 339.  
**PEMPHYGOÏDE** (genre LXVIII), t. 3, p. 384.  
 — Apyrétide (esp. II), tome 3, page 386.  
 — Bénin (s-esp. I), tome 3, page 386.  
 — Consécutif (s-gen. II), tome 3, page 387.  
 — Lochial (rap. B), tome 3, page 387.  
 — Majeur (rap. A), tome 3, page 386.  
 — Malin (s-esp. II), tome 3, page 386.  
 — Primitif (s-gen. I), tome 3, page 385.  
 — Pyrétique (espèce I), tome 3, page 386.  
**PEMPHIGUE** (espèce V), tome 3, page 385.  
 — Brésilien (rap. A), tome 3, page 387.  
 — Des camps, tome 2, page 210.  
 — Helvétien, tome 2, page 210.  
 — Indien, tome 2, page 211.  
**PERICARDESIE** (s-gen. XIII), tome 3, page 443.  
 — Erythématique (espèce II), tome 3, page 444.  
 — Phlegmonodée (espèce I), tome 3, page 444.  
**PERICARDITIS**, tome 3, page 443.

- PÉRINÉOCÈLE** (s-esp. IX), tome 4, page 206.
- PÉRIOSTOSE** (esp. III), tome 4, page 161.
- PÉRIPNEUMONIE**, tome 3, page 198.
- Ardente (rap. A), tome 3, page 332; et (A.)  
tome 3, page 472.
- Catarrhale (sorte 3), tome 2, page 31; et (va-  
riété B), tome 3, page 409.
- Gastrique (rap. B), tome 3, page 200.
- Humide, tome 3, page 200.
- Hydrophobique (rap. B), tome 2, page 272.
- Maligne (C.), tome 2, page 206.
- Phthisiquée (rap. C), tome 3, page 200.
- Pure (rap. A), tome 3, page 200.
- Putride (A.), tome 2, page 206.
- Rachialgique (sorte 15), tome 3, page 18.
- Typhode (sorte 5), tome 3, page 472.
- Vraie (rap. A), tome 3, page 200.
- PÉRIPNEUMO-PLEURÉSIE**, tome 3, page 200.
- PÉRITONÉSIE** (s-gen. XVI), tome 3, page 454.
- Abdominale (espèce I), tome 3, page 455.
- Hépto-cystique (espèce III), tome 3, page 457.
- Mésentérique (rap. B), tome 3, page 457; et  
(espèce IV), tome 3, page 457.
- Métritique (espèce V), tome 3, page 458.
- Omentale (espèce II), tome 3, page 456; et  
(rap. B), tome 3, page 457.
- Proprement dite (rap. A), tome 3, page 456.
- PERITONITIS**, tome 3, page 454.
- PERTE** de connoissance et de l'usage des jambes,  
(C.), tome 3, page 50.
- PERTES** de sang, tome 1, pages 268 et 271.
- PESANTEUR**, tome 2, page 398.

- D'estomac , vomissement , etc. , par le cayeux ( s-esp. VIII ) , tome 3 , page 52.
- De tête ( rap. B ) , tome 3 , page 407.
- PESTE** ( s-esp. VII ) , tome 2 , page 200.
- Bénigne ( rap. A ) , tome 2 , page 202.
- Charbonculeuse ( rap. A ) , tome 4 , page 59.
- D'Alep ( rap. O ) , tome 2 , page 203.
- De Bologne ( rap. L ) , tome 2 , page 203.
- De Constantinople ( rap. N ) , tome 2 , page 203.
- D'Egypte ( rap. D ) , tome 2 , page 202.
- De la Dalmatie ( rap. U ) , tome 2 , page 204.
- De la Syrie ( rap. R ) , tome 2 , page 203.
- De la Transylvanie ( rap. V ) , tome 2 , page 204.
- De l'Ukraine ( rap. M ) , tome 2 , page 203.
- De Marseille ( rap. I ) , tome 2 , page 202.
- De Milan ( rap. G ) , tome 2 , page 202.
- De Moscou ( rap. S ) , tome 2 , page 204.
- De Nimègue ( rap. H ) , tome 2 , page 202.
- Des armées russes , depuis 1769 jusqu'en 1774 ( rap. X ) , tome 2 , page 204.
- De Siam , tome 2 , page 183 ; et ( rap. E ) tome 2 , page 202.
- De Spalatro ( rap. T ) , tome 2 , page 204.
- Des Russes et des Turcs ( rap. Q ) , tome 2 , page 203.
- De Vénise et de Padoue ( rap. F ) , tome 2 , page 202.
- D'Orient ( rap. P ) , tome 2 , page 203.
- Du duché d'Holsace ( rap. K ) , tome 2 , page 203.
- Interne ( rap. C ) , tome 2 , page 202.
- Vulgaire ( rap. B ) , tome 2 , page 202.
- Intermittente ( rap. E ) , tome 2 , page 151.

- Rémittente ( rap. L ), tome 2, page 164.
- Scorbutique ( sorte 13 ) tome 4, page 39.
- Sporadique ( rap. F ), tome 2, page 324, et ( rap. E ), tome 4, page 49.
- PÉTÉCHIAIRE** ( genre LXV ), tome 3, page 365.
  - Apyrétique ( s-gen. II ), tome 3, page 369.
  - Blanche ( espèce I ), tome 3, page 367.
  - Hémorragique ( espèce II ), tome 3, page 369, et ( sorte 3 ), tome 4, page 38.
  - Noire ( espèce III ), tome 3, page 369.
  - Pyrétique ( s-gen. I ), tome 3, page 366.
  - Régulière ( espèce I ), tome 3, page 369.
  - Rouge ( espèce II ), tome 3, page 368.
- PÉTÉCHIE**, tome 3, page 365.
  - Apyrétique ( sorte 32 ), tome 2, page 49.
- PÉTÉCHIES** sans fièvre ( rap. A ), t. 3, p. 369.
- PÉTICULAIRE** ( rap. I ), tome 3, page 377.
- PÉTICULES** et pestéchiés, tome 3, page 365.
  - Ou maladie pétéchiiale, tome 3, page 365.
- PETITE VÉROLE**, tome 3, page 210.
  - Des vaches, tome 3, page 224.
  - Volante, tome 3, page 223.
- PETITES VÉROLES** confluentes simples d'HELVETIUS, tome 3, page 218.
  - Discrètes simples d'HELVETIUS, tome 3, page 218.
- PÉTULENCE** ( variété E ), tome 2, page 296.
- PEUR** ( variété A ), tome 2, page 54.
- PEUREUX** [ le ], tome 2, page 54.
- PHAGEDÆNE** ( rap. B ), tome 4, page 94.
- PHAKODES YPERITHRON** de l'antiquité, tome 3, page 495.
- PHALACROTE** ( s-esp. II ), tome 4, page 174.

- PHALACROTIS** (syn. ), tome 4, page 174.  
**PHALANGOSE** (variété B ), tome 4, page 172.  
**PHALLORAGIE** (espèce VIII ), tome 1, page 277.  
 — Distillante (s-esp. I ), tome 1, page 278.  
 — Ejaculatoire (s-esp. III ), tome 1, page 278.  
 — Soutenue (s-esp. II ), tome 1, page 278.  
**PHALLORRHEE** (s-esp. III ), tome 2, page 37.  
**PHANTASME** (genre XXIV ), tome 2, page 264  
 et 265.  
**PHARYNGITE** (espèce II ), tome 3, page 417.  
 — Lente (s-esp. II ), tome 3, page 417.  
 — Vive (s-esp. I ), tome 3, page 417.  
**PHENIGME** pléthorique (rap. C ), t. 1, p. 222.  
**PHILOPATRIDOMANIE**, tome 2, page 260.  
**PHLEGMASIES**, tome 3, page 185.  
 — Membraneuses, tome 3, page 388.  
 — Parenchymateuses, tome 3, page 185.  
**PHLEGMATIE**, tome 1, page 313; et (D.) tome  
 3, page 389.  
 — Délosiène (rap. B ), tome 1, page 313.  
 — Eléphantine (sorte 2 ), tome 3, page 501.  
 — Exanthématique (sorte 2 ), tome 3, page 221.  
 — Malabarique (B. ), tome 3, page 501.  
 — Ulcéreuse (sorte 2 ), tome 4, page 107.  
 — Vulgaire (rap. A ), tome 1, page 313.  
**PHLEGMON** (genre LVII ), tome 3, page 173  
 et 174.  
 — De la mamelle, tome 3, page 197.  
 — De l'anus (espèce IX ), tome 3, page 181.  
 — De la paupière, tome 3, page 183.  
 — De l'œil, tome 3, page 191.  
 — Des glandes inguinales ou axillaires, t. 3, p. 180.

- Du pancréas, tome 3, page 202.
- Du prépuce ( espèce VI ), tome 3, page 178.
- Du sinus frontal ( espèce III ), tome 3, page 175.
- Du sinus maxillaire ( espèce IV ), t. 3, p. 176.
- Du testicule ( espèce VII ), tome 3, page 179.
- Du thymus, tome 3, page 202.
- Escarrotique ( s-gen. II ), tome 3, page 181.
- Puogénique ( s-gen. I ), tome 3, page 174.
- Vermineux ( sorte 43 ), tome 2, page 102.
- PHLEGMONITIE** ( genre LVIII ), t. 3, p. 185.
- Lente ( s-gen. II ), tome 3, page 188.
- Vive ( s-gen. I ), tome 3, page 188.
- PHLEGMONITIS**, tome 3, page 185.
- PHLEGMONODÉE** ( espèce I ), tome 3, pages 425, 429 et 439.
- Lente ( s-esp. I ), tome 3, pages 426 et 431.
- Vive ( s-esp. I ), tome 3, pages 425 et 429.
- Des gros intestins ( variété B ), tome 3, page 429. — Des intestins grêles ( variété A ), tome 3, page 429.
- PHLEGMOSE** ( genre LVI ), tome 3, page 163.
- Apyrétique ( s-gen. I ), tome 3, page 164.
- Ephémère ( espèce I ), tome 3, page 164.
- Pyrétique ( s-gen. II ), tome 3, page 164.
- PHLOGODÉE** ( esp. II ), tome 3, pages 426, 431, 440 et ( s-esp. I ) tome 3, page 449.
- Lente ( s-esp. II ), tome 3, pages 427, 431 et 440.
- Vive ( s-esp. I ), tome 3, pages 426, 431 et 440.
- PHLOGOÉSIE** ( genre LXIX ), tome 3, page 387.
- Des membranes fibreuses ( §. I ), tome 3, page

389. — Muqueuses ( §. II ), tome 3, page 404.
- PHLOGOSE**, tome 3, page 174; et ( genre LXI ) tome 3, page 325.
- Apyrétique ( s-gén. I ), tome 3, page 318.
- Pyrétique ( s-gén. II ), tome 3, page 329.
- PHLYCTÈNE** ( rap. A ), tome 3, page 344.
- PHOSPHORENÈSES** ( classe V ), tome 4, page 132.
- PHOXE** ( espèce V ), tome 4, page 241.
- PHOXOS** ( syn. ), tome 4, page 241.
- PHRÉNÉSIE**, tome 3, page 189.
- Calenture ( sorte 1 ), tome 3, page 191.
- Dolorique ( sorte 1 ), tome 3, page 404.
- Inanitique ( sorte 30 ), tome 2, page 49.
- Par le tarantisme, tome 2, page 300.
- Synoco-pleurétique, tome 2, page 208.
- Variolique ( sorte 6 ), tome 3, page 222.
- PHRÉNISME**, tome 3, page 189.
- PHRICASME**, tome 1, page 392.
- PHRICIACIE**, tome 1, page 393.
- PHRIGODE** avec froid horrifique ( rap. D ), tome 2, page 161.
- PHTHIRIASE**, tome 2, page 121.
- De la vessie ( variété B ), tome 2, page 121.
- Inguinal ( variété D ), tome 2, page 122.
- Interne ( variété A ), tome 2, page 121.
- Pédiculaire ( variété C ), tome 2, page 122.
- PHTHISIE** ( genre XXXVI ), tome 2, page 384 et 385.
- Abdominale, tome 2, page 87.
- Asthmatique ( A. ), tome 2, page 34; et ( sor. 1 ) tome 2, page 382.

- Calculeuse ( rap. G ), tome 3, page 116.
- Catarrhale ( sorte 13 ), tome 3, page 415.
- Cellulaire ( espèce V ), tome 2, page 393.
- Chlorotique ( sorte 5 ), tome 1, page 348; et  
( sorte 5 ), tome 3, page 77.
- Chyleuse ( sorte 3 ), tome 3, page 146.
- Colliquative ( s-esp. III ), tome 2, page 390.
- Exanthématique ( sorte 10 ), tome 3, page 223.
- Fébrile, tome 2, page 87.
- Gastrique ( sorte 15 ), tome 2, page 87.
- Gutturale ( espèce I ), tome 2, page 384.
- Hémoptique ( s-esp. II ), tome 2, page 389.
- Hémorroïdale ( sorte 1 ), tome 1, page 238.
- Hépatique ( espèce III ), tome 2, page 391.
- Humide ( rap. B ), tome 2, page 389.
- Hypochondriaque ( sorte 9 ), tome 2, page 338.
- Ictérique ( sorte 4 ), tome 3, page 142.
- Impétigineuse ( sorte 4 ), tome 3, page 374.
- Métastatique ( sorte 8 ), tome 4, page 108.
- Nerveuse, tome 2, page 330.
- Ovaire ( espèce IV ), tome 2, page 391.
- Péripleurique ( sorte 2 ), tome 4, page 71.
- Pituiteuse ( sorte 8 ), tome 2, page 33.
- Psorique ( sorte 14 ), tome 2, page 120.
- Pulmonaire ( espèce II ), tome 2, pages 385 et 389.
  - De naissance ( s-esp. I ), tome 2, page 389.
  - Ecouleuse ( sorte 8 ), tome 1, page 291.
  - Fièvre intermittente ( sorte 17 ), tome 2,  
page 172. — Pituiteuse, tome 2, page 33.
  - Pléthorique ( sorte 31 ), tome 1, page 227.
  - Tuberculeuse, tome 2, page 389.
- Rachialgique, tome 1, page 302.

- Rhumático-arthritique ( sorte 6 ), t. 1, page 301.
- Scorbutoque, tome 2, page 391; et ( sorte 18 )  
tome 4, page 40.
- Sèche ( rap. A ), tome 2, page 389.
- Syphilitique ( sorte 13 ), tome 3, page 519.
- Thymique ( rap. A ), tome 4, page 71.
- Ulcéreuse ( sorte 1 ), tome 3, page 202.
- Variqueuse ( variété F ), tome 1, page 241.
- Vermineuse ( sorte 22 ), tome 2, page 100.
- Vomiquée ( sorte 3 ), tome 4, page 71.
- PHYTYRIASE ( rap. A ), tome 3, page 489.
- PHYGETHLON ( espèce III ), tome 3, page 184;  
et ( rap. G ) tome 3, page 343.
- PHYMOSIS ( s-esp. I ), tome 3, page 178; et ( s-esp.  
IX ), tome 3, page 351.
- PHYSCONIE, tome 3, page 130.
- Excroissante ( variété C ), tome 3, page 146.
- Externe ( D. ), tome 2, page 114.
- Fongueuse ( variété A ), tome 3, page 145.
- Hépatique ( B. ), tome 2, page 113; et ( rap. A )  
tome 3, pages 128 et 142.
- Hydatidique ( sorte 14 ), tome 2, page 113.
- Mésentérique ( A. ), tome 2, page 113; et ( va-  
riété B ), tome 3, page 146.
- Omentale ( rap. A ), tome 3, page 144.
- Ovaïrique ( rap. A ), tome 3, page 148.
- Polysplachnique ( C. ), tome 2, page 114.
- Rénale ( rap. A ), tome 3, page 129.
- Stéatomateuse ( s-esp. III ), tome 3, page 130.
- Syphilitique ( sorte 36 ), tome 3, page 521.
- Tégumentale ( s-esp. I ), tome 3, page 130.
- Utérine ( rap. A ), tome 3, page 147.

- Viscérale ( s-esp. II ), tome 3, page 130.
- PHYSEOSE ( genre XXV ), tome 2, page 275.
- PHYSOMÈTRE, tome 3, page 136.
- Humide ( s-esp. II ), tome 3, page 136.
- Sèche ( s-esp. I ), tome 3, page 136.
- PIAN, tome 3, page 113.
- PICA ( rap. A ), tome 1, page 346.
- Antiscorbutique ( sorte 8 ), tome 4, page 39.
- Chlorosique ( rap. B ), tome 1, page 347.
- Infantile ( rap. B ), tome 1, page 347.
- Volontaire ( variété A ), tome 1, page 347.
- PIERRE des reins et de la vessie, tome 3, page 107.
- PIQURE ( rap. A ), tome 4, page 76.
- Avec écharde ( B. ), tome 4, page 76.
- Simple ( A. ), tome 4, page 76.
- PISSEMENT de sang, tome 1, page 274.
- Vermineux ( rap. A ), tome 2, page 103.
- PITLÉ ( variété B ), tome 2, page 295.
- PLAIE ( s-gen. I ), tome 4, page 74.
- Avec corps étranger ( s-esp. II ), t. 4, p. 85.
- Compliquée ( s-esp. III ), tome 4, page 85.
- Contondante ( s-esp. IV ), tome 4, page 77.
- Déchirante ( s-esp. III ), tome 4, page 76.
- De la tête ( variété A ), tome 4, page 77.
- Des membranes ( variété N ), tome 4, page 80.
- Divisive ( s-esp. I ), tome 4, page 76.
- Instrumentique ( espèce I ), tome 4, page 75.
- Piquante ( s-esp. II ), tome 4, page 76.
- Profonde ( variété B ), tome 4, page 75.
- Simple ( s-esp. I ), tome 4, page 85.
- Superficielle ( variété A ), tome 4, page 75.
- Virulente ( s-esp. V ), tome 4, page 77.

- PLAIES** de l'abdomen ( variété D ), t. 4, p. 78.  
 — De la rate ( variété G ), tome 4, page 79.  
 — Des articulations ( variété K ), tome 4, page 80.  
 — Des intestins ( variété F ), tome 4, page 78.  
 — Des tendons ( variété M ), tome 4, page 80.  
 — Du bas-ventre ( A. ), tome 4, page 78.  
 — Par des armes à feu ( espèce II ), tome 4, page 83.  
 — Pénétrantes, tome 4, page 76.  
**PLAINIF** [ le ], tome 2, page 258.  
**PLANCUS** ( syn. ), tome 4, page 242.  
**PLAUTUS** ( syn. ), tome 4, page 242.  
**PLÉTHORE**, tome 1, page 220.  
 — Abdominale ( rap. B ), tome 1, page 221.  
 — Amputatoire ( rap. B ), tome 1, page 223.  
 — Epulaire ( rap. A ), tome 1, page 223.  
 — Evacuatoire ( rap. A ), tome 1, page 224.  
 — Lymphatique, tome 1, page 304.  
 — Suppresseur ( rap. A ), tome 1, page 222.  
 — Vraie ( rap. A ), tome 1, page 221.  
**PLEURÉSIE** ( s-gen. XIV ), tome 3, page 444.  
 — Biliéuse ( rap. A ), tome 3, page 449; et ( sorte 6 ), tome 3, page 472.  
 — Catarrhale, tome 3, page 410.  
 — Convulsive ( rap. C ), tome 3, page 449.  
 — Dorsale ( rap. A ), tome 3, page 450; et ( variété B ), tome 3, page 450.  
 — Du médiastin ( rap. A ), tome 3, page 450.  
 — Du péricarde ( rap. A ), tome 3, page 444.  
 — Du poumon, tome 3, page 200.  
 — Erysipélateuse ( rap. B ), tome 3, page 449.  
 — Fièvre intermittente ( sorte 25 ), t. 2, p. 172.  
 — Hépatique, tome 3, page 205.  
 — Humide

( 449 )

- Humide , tome 3 , page 200.
- Hydrothorachique ( sorte 3 ) , tome 3 , page 451.
- Laitieuse ( sorte 4 ) , tome 3 , page 463.
- Latente , tome 3 , page 201.
- Lente , tome 3 , page 201 ; et ( espèce II ) tome 3 , page 450.
- Médiastinique ( variété A ) , tome 3 , page 449.
- Miliaire ( sorte 13 ) , tome 3 , page 383.
- Occulte , tome 3 , page 201.
- Par colère ( X. ) , tome 2 , page 319.
- Périodique , tome 2 , page 156.
- Pestilentielle ( D. ) , tome 2 , pages 206 et 208.
- Putride ( sorte 2 ) , tome 2 , page 80 ; et ( A ) tome 3 , page 472. — Maligne ( sorte 9 ) , tome 2 , page 208.
- Rhumatique ( rap. C ) , tome 3 , page 449.
- Sèche ( rap. B ) , tome 3 , page 448.
- Splénique ( rap. B ) , tome 3 , page 207.
- Stomacale ( A. ) , tome 2 , page 97.
- Traumatique ( rap. D ) , tome 3 , page 449.
- Vermineuse ( sorte 5 ) , tome 2 , page 97.
- Vive ( espèce I ) , tome 3 , page 448.
- Vraie ( rap. A ) , tome 3 , page 448.
- PLEURIPNEUMONIE , tome 3 , page 206.
- PLEURITIS , tome 3 , page 444.
- PLEUROCÈLE ( syn. ) , tome 4 , page 201.
- PLEURODYNIE anévrismatique ( sorte 11 ) , tome 1 , page 248.
- Fébrile , tome 2 , page 156.
- Flatueuse ( sorte 1 ) , tome 2 , page 259.
- Hystérique ( sorte 23 ) , tome 2 , page 343.
- Miliaire ( sorte 1 ) , tome 3 , page 382.

Tom. IV.

29

( 450 )

- Phthisiquée ( sorte 2 ), tome 3, page 201.
- Pléthorique ( sorte 35 ), tome 1, page 227.
- Spasmodique ( sorte 18 ), tome 2, page 331.
- PLEURO-PÉRIPNEUMONIE**, tome 3, page 200.
- Erysipélateuse maligne à Eplechin dans le Tour-  
neis ( C. ), tome 2, page 206.
- PLÉVRODYNE**, tome 1, page 298.
- Vermineuse ( sorte 25 ), tome 2, page 100.
- PLÉVRODYNIE** ( espèce II ), tome 1, page 298.
- Abcédée ( sorte 2 ), tome 3, page 450.
- Arthritique ( rap. D ), tome 1, page 299.
- Catarrhale ( sorte 2 ), tome 3, page 414.
- Flatulente ( rap. B ), tome 1, page 299.
- Parapleurétique ( rap. A ), tome 3, page 450.
- Par rupture de l'œsophage ( A. ), t. 4, p. 78.
- Rachitique ( sorte 1 ), tome 4, page 158.
- Rhumatique ( sorte 1 ), tome 3, page 392.
- Rhumatismale ( rap. A ), tome 1, page 298.
- Scorbutique ( rap. C ), tome 1, page 299.
- Vomiquée ( sorte 3 ), tome 4, page 70.
- PLIQUE**, tome 3, page 489.
- En cordon, tome 3, page 491.
- Femelle, tome 3, page 491.
- [ Grande ], tome 3, page 491.
- Mâle, tome 3, page 491.
- PNEUMATOCÈLE**, tome 3, page 137.
- PNEUMATOSE** ( genre LIII ), t. 3, p. 131.
- Abdominale ( esp. III ), tome 3, page 133.
- Cutanée ( espèce I ), tome 3, page 132.
- Cystique ( esp. V ), tome 3, page 137.
- Fébrile ( A. ), tome 4, page 83.
- Hystérique ( sorte 35 ), tome 2, page 344.

- Métrique ( espèce IV ), tome 3, page 136.
- Par la morsure de l'aspic, tome 3, page 47.
- Pneumonique ( espèce II ), tome 3, page 133.
- Scrotale ( espèce VI ), tome 3, page 137.
- Spontanée ( s-esp. I ), tome 3, page 132.
- Traumatique ( s-esp. II ), tome 3, page 133; et  
( sorte 30 ) tome 4, page 83.
- PNEUMOCÈLE** ( syn. ), tome 4, page 200.
- PNEUMONIE** putride maligne ( sorte 6 ), tome 2,  
page 206.
- PNEUMONITIE** ( esp. VI ), tome 3, page 198.
- Chronique, tome 3, page 201.
- Lente ( s-esp. II ), tome 3, page 201.
- Miliaire ( sorte 10 ), tome 3, page 383.
- Vive ( s-esp. I ), tome 3, page 198.
- PNEUMONITIS**, tome 3, page 198.
- PNEUMORRAGIE** ( espèce IV ), tome 1, page 256.
- Considérable ( s-esp. II ), tome 1, page 259.
- Hydatidique ( sorte 1 ), tome 2, page 111.
- Modérée ( s-esp. I ), tome 1, page 258. — Ac-  
cidentelle ( variété A ), tome 1, page 258.
- Essentielle ( variété B ), tome 1, page  
259. — Nocturne périodique ( var. C ), tome  
1, page 259.
- Par colère ( C. ), tome 2, page 317.
- PODAGRE** ( syn. ), tome 4, page 161.
- POILURE** ( s-esp. II ), tome 4, page 172.
- POIREAU** de la suie ( rap. A ), tome 4, page 115.
- POISONS** minéraux ( sec. I ), tome 3, page 6.
- Végétaux ( sect. II ), tome 3, page 21.
- POLLUTION**, tome 3, page 85.
- Diurne ( variété B ), tome 3, page 86.

- Nocturne ( variété A ), tome 3 , page 86.
- POLTRONNERIE ( variété C ), tome 2 , page 54.
- POLYCHOLIE ( genre LXXII ), tome 3 , page 468.
- Atrabilaire ( espèce IV ), tome 3 , page 478.
- Cholélithique ( espèce III ), tome 3 , page 477.
- Ictérique ( espèce II ), tome 3 , page 473. — Claire  
( s-esp. I ), tome 3 , page 475. — Intense  
( s-esp. II ), tome 3 , page 475. — Noire  
( s-esp. III ), tome 3 , page 477.
- Pyrétique ( espèce I ), tome 3 , page 469.
- POLYDIPSIE ( espèce II ), tome 2 , page 395.
- Diarrhéique ( rap. B ), tome 3 , page 87.
- Dipsadique , tome 3 , page 46.
- Fébrile ( sorte 15 ), tome 3 , page 173.
- Fluxueuse ( sorte 1 ), tome 3 , page 438.
- Hydropique ( sorte 2 ), tome 1 , page 333.
- POLYLYMPHIE ( genre X ), tome 1 , page 303.
- POLYMERISME ( espèce I ), tome 4 , page 239.
- POLYÆMIE ( genre I ), tome 1 , page 219.
- Congestive ( espèce I ), tome 1 , page 222. —  
Artérielle ( s-esp. I ), tome 1 , page 222. —  
Cacochymique ( s-esp. III ), tome 1 , page  
224. — Veineuse ( s-esp. II ), tome 1 , page  
223.
- Raréfactif ( espèce II ), tome 1 , page 229.
- POLYPE ( genre LV ), tome 3 , page 157.
- De l'œsophage ( espèce V ), tome 3 , page 161.
- De l'oreille ( espèce II ), tome 3 , page 158.
- De matrice ( espèce VII ), tome 3 , page 162.
- Des bronches ( espèce III ), tome 3 , page 159.
- Des intestins ( espèce VI ), tome 3 , page 162.
- Des oreilles , tome 3 , page 158.

- Du cœur et de l'aorte ( espèce IV ) tome 3 ,  
page 160.
- Du nez ( espèce I ) , tome 3 , page 157. — A  
Pédicule osseux ( s-esp. I ) , tome 3 , page 158.
- Hystérique ( s-esp. I ) , tome 3 , page 163.
- Hystéro-vaginal ( s-esp. II ) , tome 3 , page 163.
- Vaginal ( s-esp. III ) , tome 3 , page 163.
- Variqueux ( variété I ) , tome 1 , page 241.
- POLYSARCIE** ( genre LXXI ) , tome 3 , page 464.
- Adipeuse ( rap. A ) , tome 3 , page 466.
- Dans la poitrine ( s-esp. I ) , tome 3 , page 466.
- Dans le bas-ventre ( s-esp. II ) , t. 3 , p. 467.
- Ecrouelleuse ( sorte 22 ) , tome 1 , page 292.
- Générale ) espèce I ) , tome 3 , page 466.
- Locale ( espèce II ) , tome 3 , page 466.
- PORCELAINE** ( s-esp. I ) , tome 3 , page 362.
- POTHOPATRIDALGIE** , tome 2 , page 260.
- POURPRE** , tome 3 , page 365.
- Bénin ( rap. A ) , tome 3 , page 368.
- De LUDWIG ( rap. F ) , tome 3 , page 377.
- Malin , tome 2 , page 190 ; et ( rap. B ) , tome  
3 , page 368.
- Ortié ( rap. A ) , tome 3 , page 362.
- Purulent ( rap. A ) , tome 3 , page 368.
- Rouge sans fièvre , tome 3 , page 381.
- Symptomatique ( rap. D ) , tome 4 , page 46.
- Vermineux ( A. ) , tome 4 , page 46.
- POURRITURE** d'hôpital , tome 4 , page 54.
- PRÉSUMPTION** ( espèce IV ) , tome 2 , page 280.
- PRESSURE** , tome 3 , page 349.
- PRÉTENTION** ( s-esp. I ) , tome 2 , page 277.
- PRÉVENTION** ( espèce XIII ) , tome 2 , page 285.

- PRIAPISME** ( espèce VII ), tome 2, page 358.  
 — Frigorique ( sorte 2 ), tome 1, pages 285 et 394.  
 — Gonorrhœïque ( sorte 11 ), tome 3, page 518.  
**PROCTALGIE** ( esp. X ), tome 2, page 419; et  
 tome 3, page 181.  
 — Brésilienne ( variété B ), tome 2, page 480.  
 — Hémorrhoidale ( rap. ), tome 1, page 265.  
 — Intertrigineuse ( variété A ), tome 2, page 420.  
**PROCTICA**, tome 2, page 419.  
**PROCTITIS**, tome 3, page 181.  
**PROCTOPTOSE** ( espèce IV ), tome 4, page 222.  
**PROCTORRAGIE** ( espèce V ), tome 1, page 263.  
 — Diarrhéique ( s-esp. III ), tome 1, page 266.  
 — Excessive ( s-esp. II ), tome 1, page 265.  
 — Modérée ( s-esp. I ), tome 1, page 265.  
 — Par colère ( D. ), tome 2, page 317.  
**PROCTORRHÉE** ( s-esp. VI ), tome 2, page 40.  
 — Hydatidique ( sorte 5 ), tome 2, page 112.  
**PROLAPSE** ( s-gen. IV ), tome 4, page 219.  
**PROPTOME** ( genre XCIII ), tome 4, page 230.  
 — Atriculaire ( espèce II ), tome 4, page 230.  
 — Clitoritique ( espèce V ), tome 4, page 231.  
 — De la lèvre inférieure, tome 4, page 230.  
 — Des mamelles, tome 4, page 230.  
 — Des oreilles, tome 4, page 230.  
 — Du prépuce, tome 4, page 231.  
 — Du scrotum, tome 4, page 231.  
 — Labiale ( espèce I ), tome 4, page 230.  
 — Mammaire ( espèce III ), tome 4, page 230.  
 — Nymphique ( espèce VI ), tome 4, page 231.  
 — Préputial ( espèce IV ), tome 4, page 231.  
 — Scrotique ( espèce VIII ), tome 4, page 231.

- PROSOPALGIE** ( espèce II ), tome 2 , page 400.  
 — Syphilitique ( sorte 16 ), tome 3 , page 519.
- PRURIT** des femmes grosses ( sorte 15 ), tome 3 ,  
 page 104.  
 — Exanthématique ( rap. A ), tome 3 , page 334.  
 — Ictérique ( sorte 1 ), tome 3 , page 477.  
 — Syphilitique ( sorte 21 ), tome 3 , page 519.
- PSELLISME**, tome 2 , page 68.  
 — Acheilos , tome 2 , page 72.  
 — Balbutiant , tome 2 , page 71.  
 — Balbutique ( variété E ), tome 2 , page 71.  
 — Emollient , tome 2 , page 70.  
 — Ischnophonique ( variété A ), tome 2 , page 68.  
 — Jottacismique ( variété G ), tome 2 , page 72.  
 — Lagostomatique ( sorte 1 ), tome 4 , page 241.  
 — Lallant , tome 2 , page 69.  
 — Lambdacismique ( rap. C ), tome 2 , page 69.  
 — Métallique ( rap. B ), tome 3 , page 21.  
 — Mogilalique ( rap. F ), tome 2 , page 72.  
 — Par grenouillette ( sorte 1 ), tome 3 , page 150.  
 — Rottacismique ( variété B ), tome 2 , page 68.  
 — Traulotique ( variété D ), tome 2 , page 70.
- PSELLOTIS**, tome 2 , page 68.
- PSEUDOBLEPSIE**, tome 2 , page 265.
- PSOITIS** ( s-esp. III ), tome 3 , page 391.
- PSORA** ( variété B ), tome 3 , page 482.  
 — Chez les Grecs ( rap. A ), tome 3 , page 494.
- PSORE**, tome 2 , page 116.
- PSOROPHTALMIE** ( variété B ), t. 3 , p. 399.
- PSYDRACIE** ( rap. B ), tome 3 , page 341 et 343.  
 — Diurne ( variété B ), tome 3 , page 339.  
 — Porcelaine ( variété A ), tome 3 , page 341.

- PTILOSE ( variété A ), tome 4, page 174.  
 PTILOSIS ( syn. ), tome 4, page 174.  
 PTOSE de l'iris ( rap. A ), tome 4, page 199.  
 — Invétérée ( variété B ), tome 4, page 200.  
 — Récente ( variété A ), tome 4, page 199.  
 PTYALISME, tome 3, page 95.  
 — Arthritique ( sorte 24 ), tome 4, page 171.  
 — Fébrile ( rap. A ), tome 3, page 95.  
 — Mercuriel ( rap. A ), tome 3, page 21.  
 — Purulent ( sorte 13 ), tome 4, page 108.  
 — Scorbutique ( sorte 24 ), tome 4, page 40.  
 — Vert ( s-esp. I ), tome 3, page 96.  
 PUANTEUR, tome 4, page 49.  
 PUDENDAGRE, tome 2, page 424.  
 — Gonorrhéique ( sorte 20 ), tome 3, page 519.  
 — Phymosique ( sorte 1 ), tome 3, page 179.  
 PULMONIE, tome 2, page 385.  
 — Par irritabilité ( sorte 20 ), tome 2, page 48.  
 PUNCTICULES, tome 3, page 365.  
 PUOSE ( genre LXXXII ), tome 4, page 62.  
 — Idiopathique ( variété A ), tome 4, page 63.  
 — Métapostasique ( variété C ), tome 4, page 64.  
 — Métastatique ( variété B ), tome 4, page 64.  
 — Primitive ( espèce I ), tome 4, page 64.  
 — Secondaire ( espèce II ), tome 4, page 64.  
 PUSILLANIMITÉ ( variété D ), tome 2, page 55.  
 PUSTULES vénériennes ( sorte 48 ), t. 3, p. 523.  
 PUTRILAGE ( C. ), tome 3, page 388.  
 PYOGENIE, tome 4, page 62.  
 PYORRHÉE, tome 4, page 62.  
 PYRETO-NEVRIE, tome 2, page 321.  
 PYROSE ( s-esp. III ), tome 2, page 411.

- Billieuse ( sorte 3 ), tome 3, page 479.
- Inflammatoire ( sorte 2 ), tome 3, page 105.
- Par la conception ( sorte 17 ), tome 3, page 104.
- Phlogistique ( sorte 1 ), tome 3, page 209.
- Phlogosique ( sorte 3 ), tome 3, page 427 ; et  
( sorte 1 ), tome 3, page 432.
- Suédoise ( variété A ), tome 2, page 412.
- Vulgaire ( rap. A ), tome 2, page 412.
- PYTHONISSISME ( variété H ), tome 2, page 300.
- PYURIE ( rap. A ), tome 4, page 73.
- Arthritique ( rap. D ), tome 2, page 37.
- Muqueuse ( rap. B ), tome 2, page 37.
- Rénale ( rap. B ), tome 4, page 73.
- Ulcéreuse ( sorte 11 ), tome 4, page 108.
- Visqueuse ( rap. C ), tome 2, pages 37.

## Q.

- QUARTE, tome 2, page 164.
- Arthritique ( rap. O ), tome 2, pages 167 ; et  
( sorte 5 ), tome 4, page 170.
- Automnale, tome 2, page 165.
- Cataleptique ( rap. H ), tome 2, page 166.
- Comateuse ( rap. I ), tome 2, page 166.
- Délirante ( rap. G ), tome 2, page 166.
- Doublée ( rap. B ), tome 2, page 165.
- Epileptique ( rap. K ), tome 2, page 166.
- Gastrique, tome 2, page 165.
- Hystérique ( rap. F ), tome 2, page 166.
- Légitime, tome 2, page 165.
- Métastatique ( rap. M ), tome 2, page 166.
- Néphralgique ( rap. L ), tome 2, page 166.

( 458 )

- Ordinaire ( rap. A ), tome 2 , page 165.
- Scorbutique ( rap. N ), tome 2 , page 166.
- Syphilitique ( sorte 7 ), tome 3 , page 518.
- Triplée ( rap. C ), tome 2 , page 166.

QUINTE ( variété A ), tome 2 , page 169.

QUOTIDIENNE , tome 2 , page 143.

- Céphalalgique ( rap. E ), tome 2 , page 144.
- Continue , tome 2 , page 145. — Des anciens ( rap. B ), tome 2 , page 30.
- Epileptique ( rap. I ), tome 2 , page 162 ; et ( rap. D ), tome 2 , page 144.
- Hystérique ( rap. D ), tome 2 , page 323.
- Insidieuse , tome 2 , page 161.
- Néphralgique ( rap. F ), tome 2 , page 145.
- Ophthalmique , tome 2 , page 145.
- Partielle ( rap. B ), tome 2 , page 144.
- Rémittente ( variété B ), tome 2 , page 145.
- Sciatique ( rap. C ), tome 2 , page 144.
- Simple ( rap. A ), tome 2 , page 144.
- Soporeuse ( rap. G ), tome 2 , page 162.
- Strangurieuse ( rap. G ), tome 2 , page 145.

## R.

RACHIALGIE , tome 3 , page 113.

- Arthritique ( sorte 18 ), tome 4 , page 171.
- Fiévreuse , tome 2 , page 154.
- Métallique ( rap. A ), tome 3 , page 16.
- Poitevine ( rap. B ), tome 3 , page 16.
- Scorbutique ( sorte 20 ), tome 4 , page 40.
- Traumatique ( sorte 21 ), tome 4 , page 82.

RACHITIS ( genre LXXXV ), tome 4 , page 151.

- Anglais ( rap. A ), tome 4, page 155.
- Des châtrés, tome 4, page 158.
- Dyaphisique ( espèce IV ), tome 4, page 158.
- Des Kalmouks, tome 4, page 158.
- Noieux ( espèce I ), tome 4, page 154.
- Ostéomalacique ( espèce III ), tome 4, page 155.
- Strumeux ( sorte 47 ), tome 3, page 522.
- Tortueux ( espèce II ), tome 4, page 155.
- RACOSIS des Grecs, tome 4, page 231.
- RADOTERIE ( sorte 4 ), tome 2, page 52.
- RAGE, tome 3, page 38.
- Par colère ( Q. ), tome 1, page 318.
- RAILLEUR [ le ] ( s-esp. I ), tome 2, page 288.
- RAMOLLISSEMENT des ongles ( sorte 8 ), tome 1, page 349.
- RANULE, tome 1, page 323.
- Scrophuleuse ( sorte 16 ), tome 1, page 292.
- RAPHANIE ( A. ), tome 2, page 219.
- REFROIDISSEMENT, tome 1, page 392.
- RÈGLES dévoyées, tome 1, page 270.
- Immodérées, tome 1, page 270.
- REGRET ( variété E ), tome 2, page 302.
- REMORD ( variété G ), tome 2, page 303.
- RÉNOPHOBIE, tome 2, page 74.
- REPENTIR ( variété F ), tome 2, page 303.
- RESSENTIMENT ( variété D ), tome 2, page 315.
- RESSERREMENT par spasme, tome 2, page 326.
- RETENTION des secondines, tome 3, page 83.
- D'urine, tome 3, page 71.
- RÉTRECISSEMENT de l'aorte pectorale, tome 2, page 327.
- Du rectum ( variété C ), tome 2, page 327.

- RÊVE ( rap. B ), tome 2 , page 274.
- RHACOSE ( rap. E ), tome 4 , page 93.
- RHÆAS ( rap. B ), tome 4 , page 240.
- RHAGADE ( variété B ), tome 4 , page 94.
- RHAGADES syphilitiques ( C. ), tome 3 , page 522.
- RHINORRAGIE mortelle par la piqure d'une abeille  
( A. ), tome 3 , page 50.
- RHIMOSE ( s-esp. I ), tome 4 , page 176.
- RH MOSIS ( syn. ), tome 4 , page 176.
- RHUMATISME ( s-gen. I ), tome 3 , page 389.
- Aigu ( rap. A ), tome 3 , page 391.
  - Aménorrhéique ( rap. B ), tome 3 , page 393.
  - Arthritique ( rap. B ), tome 1 , page 297.
  - Chronique , tome 1 , pages 295 et 297.
  - Convulsif , tome 2 , page 332.
  - Dorsal ( sorte 8 ), tome 2 , page 46.
  - Fiévreux ( sorte 27 ), tome 2 , page 173.
  - Froid , tome 1 , page 295.
  - Goutteux ( rap. A ), tome 3 , page 392.
  - Hystérique ( sorte 36 ), tome 2 , page 344.
  - Lent ( espèce II ), tome 3 , page 391.
  - Métallique ( sorte 16 ), tome 3 , page 18.
  - Miliaire ( sorte 12 ), tome 3 , page 383.
  - Nécrosique ( E. ), tome 2 , page 220 ; et ( rap. C )  
tome 4 , page 56.
  - Odontalgique , tome 2 , page 404.
  - Puerpérique ( rap. C ), tome 1 , page 297.
  - Scorbutique ( sorte 31 ), tome 4 , page 41.
  - Vague , tome 1 , page 298.
  - Vermineux ( sorte 38 ), tome 2 , page 101.
  - Vif ( espèce I ), tome 3 , page 390.
  - Vulgaire ( rap. A ), tome 1 , page 297.

- RHUME ( rap. D ), tome 3, page 407.  
 — Catarrhal ( variété A ), tome 3, page 409.  
 — Du Nord, tome 3, page 410.  
 — Epidémique ( rap. B ), tome 3, page 413.  
 RHUMES épidémiques à Nismes, en 1762 ( rap. E ),  
 tome 3, page 413.  
 RIGOR, tome 1, page 392.  
 — Frigorique ( rap. A ), tome 1, page 393.  
 RINORRAGIE ( espèce I ), tome 1, page 252.  
 — Juvenile ( s-esp. I ), tome 1, page 253.  
 — Menstruelle ( s-esp. III ), tome 1, page 254.  
 — Par colère ( B. ), tome 2, page 317.  
 — Sénile ( s-esp. II ), tome 1, page 254.  
 RINORRHÉE ( s-esp. I ), tome 2, page 36.  
 RIRE convulsif ( sorte 15 ), tome 3, page 383.  
 RODATIO ( syn. ), tome 4, page 173.  
 RODATION ( s-esp. V ), tome 4, page 173.  
 ROSE épidémique, tome 2, page 194.  
 ROUGEOLE ( genre LXVI ), tome 3, page 370.  
 — Angineuse ( espèce III ), tome 3, page 373 ; et  
 ( rap. A ), tome 3, page 373.  
 — Angino-hydrophobique ( s-esp. I ), t. 3, p. 373.  
 — Anomale, tome 2, page 210.  
 — Pourprée ( s-esp. I ), tome 3, page 373.  
 — Putride, maligne ( sorte 12 ), tome 2, page 210.  
 — Simple ( espèce I ), tome 3, page 372.  
 — Variolique ( espèce II ), tome 3, page 372.  
 — Variolodée ( rap. A ), tome 3, page 372.  
 — Vulgaire ( rap. A ), tome 3, page 372.  
 ROUGEOLLES putrides de Londres, en 1763 et 1768,  
 tome 2, page 210.  
 — Régulières de Sydenham ( rap. B ), t. 3, p. 372.

( 462 )

**ROUGEURS**, tome 3, page 343.**ROUSSEUR** des femmes grosses ( sorte 24 ), tome 3, page 105.

— Scorbutique ( sorte 28 ), tome 4, page 41.

**RUPTURE** ( rap. A ), tome 4, page 76.

— Cruro-intestinale ( variété Z ), tome 4, page 216.

— De l'abdomen ( variété E ), tome 4, page 78.

— De l'œsophage ( variété C ), tome 4, page 78.

— De l'utérus ( variété H ), tome 4, page 79.

— Des corps caverneux ( variété I ), t. 4, p. 79.

— Du cœur ( variété B ), tome 4, page 77.

— Du tendon d'Achille, tome 4, page 80.

— Inguino-intestinale ( variété Y ), t. 4, p. 216.

— Musculaire ( variété L ), tome 4, page 80.

— Ombligo-intestinale ( variété AA ), t. 4, p. 216.

— Ventro-intestinale ( variété BB ), t. 4, p. 216.

**S.****SAFATHAH** des Arabes, tome 3, page 495.**SALACISME** ( genre XXX ), tome 2, page 347.

— Féminin ( espèce II ), tome 2, page 349.

— Masculin ( espèce I ), tome 2, page 348.

**SALIVATION** aphteuse ( sorte 3 ), t. 3, p. 424.

— Calculeuse ( rap. A ), tome 3, page 114.

— Carieuse ( rap. A ), tome 2, page 405.

— Catarrhale ( sorte 20 ), tome 3, page 415.

— Des femmes grosses ( sorte 22 ), tome 3, page 105.

— Hypocondriaque ( sorte 13 ), tome 2, page 338.

— Laponaise ( sorte 14 ), tome 3, page 18.

— Nauséuse ( sorte 25 ), tome 2, page 88.

— Pyrosique ( sorte 2 ), tome 2, page 412.

- Syphilitique ( sorte 34 ), tome 3, page 521.
- Variolique ( sorte 14 ), tome 3, page 223.
- SANIODE** ( espèce VII ), tome 4, page 241.
- SARCOME** ( rap. A ), tome 3, page 148.
- Au front avec vomissement sympathique ( s-esp. II ),  
tome 3, page 149.
- Bicéphale ( s-esp. I ), tome 3, page 148.
- Charnu ( espèce I ), tome 3, page 148.
- De l'œil ( s-esp. III ), tome 3, pages 149 et 152.
- Enchantis ( s-esp. IV ), tome 3, page 149.
- Epulie ( s-esp. VI ), tome 3, page 149.
- Fongueux ( espèce II ), tome 3, page 150.
- Nata ( s-esp. VIII ), tome 3, page 149.
- Scrotal ( s-esp. X ), tome 3, page 150.
- Squirreux ( espèce III ), tome 3, page 150.
- Vulgaire, tome 3, page 148.
- SARRETTE** [ la ], tome 2, page 355.
- SATYRIASE**, tome 2, page 348.
- Aigu, tome 2, page 349.
- Chronique ( rap. A ), tome 2, page 359.
- Des jeunes-gens ( s-esp. I ), tome 2, page 348.
- Et nymphomanie proctorragiques ( sorte 3 ), tome  
1, page 266.
- Furieux ( s-esp. II ), tome 2, page 348.
- Hydrophobique ( sorte 2 ), tome 3, page 44.
- Néogamique, tome 2, page 348.
- Vénérien ( sorte 8 ), tome 3, page 518.
- SATYRIASME**, tome 3, page 497.
- SATYRIQUE** [ le ] ( variété C ), tome 2, page 305.
- SAVETIÈRE** [ la ] ( s-esp. III ), tome 3, page 482.
- SCARLATINE** ( genre LXIII ), tome 3, page 354.

- Angineuse , tome 2 , page 209 ; et ( espèce II et rap. A ) tome 3 , page 357. — Simple ( s-esp. I ) , tome 3 , page 357. — Ulcérée ( s-esp. II ) , tome 3 , page 357.
- Miliée ( espèce III ) , tome 3 , page 360.
- Ortiée ( espèce IV ) , tome 3 , page 360 ; et ( rap. D ) , tome 3 , page 362.
- Prurigineuse ( s-esp. I ) , tome 3 , page 356 ; et ( sorte 6 ) tome 3 , page 480.
- Pustuleuse ( s-gen. II ) , tome 3 , page 359.
- Squinancique , tome 2 , page 209.
- Tachetée ( s-genre I ) , tome 3 , page 356. — Régulière ( espèce I ) , tome 3 , page 356.
- Variolodée ( esp. I ) , tome 3 , page 359. — ( sorte 4 ) , tome 3 , page 472.
- Variolo-miliée ( espèce II ) , tome 3 , page 359.
- SCELOTYRBE** , tome 2 , page 250.
- Choréique ( rap. A ) , tome 2 , page 251.
- SCIATIQUE** ( espèce IV ) , tome 1 , page 300.
- Abscédée ( rap. E ) , tome 3 , page 353.
- Des femmes grosses ( sorte 3 ) , tome 1 , page 103.
- Hystérique ( sorte 1 ) , tome 2 , page 341.
- Intermittente , tome 2 , page 144.
- Nerveuse ( sorte 1 ) , tome 2 , page 328.
- Pléthorique ( sorte 10 ) , tome 1 , page 225.
- Rhumatique ( sorte 3 ) , tome 3 , page 393.
- Rhumatismale ( rap. ) , tome 1 , page 301.
- Sparganosique ( sorte 1 ) , tome 3 , page 463.
- Syphilitique ( sorte 2 ) , tome 3 , page 514.
- SCLÉROPTALMIE** ( variété A ) , t. 3 , p. 402.
- SCLOPÉTOPLAIE** , tome 4 , page 83.
- SCORBUT** ( genre LXXIX ) , tome 4 , page 29.

— Accru

( 465 )

- Accru ( C. ), tome 4, page 34.
- Aigu ( B. ), tome 4, page 35.
- Chaud ( rap. A ), tome 4, page 36.
- Chronique, tome 4, page 35.
- Commençant ( A. ), tome 4, page 34.
- Consummé ( D. ), tome 4, page 35.
- Déclaré ( B. ), tome 4, page 34.
- De mer ( rap. C ), tome 4, page 36.
- De montagne, tome 3, page 339.
- Des Alpes, tome 3, page 339.
- De terre ( rap. C ), tome 4, page 36.
- Epidémique ( esp. I ), tome 4, page 35 ; et ( rap. B ), tome 4, page 36.
- Froid ( rap. A ), tome 4, page 36.
- Lent ( A. ), tome 4, page 35.
- Livide ( A. ), tome 4, page 35.
- Pâle ( C. ), tome 4, page 35.
- Pétéchial ( B. ), tome 4, page 35.
- Rouge ( D. ), tome 4, page 35.
- Sporadique ( espèce II ), tome 4, page 36 ; et ( rap. B ), tome 4, page 36.
- SCORRE pestilentielle, tome 3, page 502.
- SCROPHULE américaine ( sorte 20 ), t. 1, p. 292.
- Périodique ( sorte 3 ), tome 3, page 514.
- SCROPHULES ( genre VIII ), tome 1, page 287.
- Constitutionnelles ( esp. I ), tome 1, page 289.
- Glanduleuses ( espèce II ), tome 1, page 290.
- Mésentériques ( sorte 17 ), tome 1, page 292.
- Ossenses ( sorte 26 ), tome 1, page 293.
- Vulgaires ( rap. ), tome 1, page 290.
- SCYTALE, tome 2, page 213.
- SÉMION de CELSE, tome 3, page 495.

*Tom. IV.*

30

( 466 )

- SEMI-TIERCE de SPIGEL , tome 2 , page 161.
- SENSIBILITÉ ( s-esp. II ) , tome 2 , page 294.
- SENSUALITÉ ( variété C ) , tome 2 , page 313.
- SEPSIS , tome 4 , page 43.
- SEPTAINE ( variété C ) , tome 2 , page 169.
- SEPTIMANE de MORGAGNI , tome 2 , page 169.
- SEPTOSE ( genre LXXX ) , tome 4 , page 42.
- Apyrétique ( s-gen. II ) , tome 4 , page 49.
- Pyrétique ( s-gen. I ) , tome 4 , page 45. — Lente ( espèce II ) , tome 4 , page 46. — Vive ( esp. I ) , tome 4 , page 45.
- SÉQUESTRE ( espèce II ) , tome 4 , page 60.
- SERPIGO des latins ( rap. D ) , tome 3 , page 484.
- SEXTAINE ( variété B ) , tome 2 , page 169.
- SIBARITISME ( variété B ) , tome 2 , page 57.
- SIFFLEMENT d'oreilles ( variété A ) , tome 2 , page 269.
- SINGULARITÉ ( espèce VI ) , tome 2 , page 282.
- SINUS ( variété A ) , tome 4 , page 98.
- SIWINS des Écossais , tome 3 , page 502.
- SODA , tome 2 , page 411.
- Miliaire , tome 3 , page 422.
- SOIF diabétique ( rap. B ) , tome 3 , page 98.
- SOMMEIL soutenu , tome 2 , page 233.
- SOMNAMBULISME ( espèce IX ) , tome 2 , page 274.
- Mélancolique ( s-esp. I ) , tome 2 , page 275.
- Vulgaire ( rap. B ) , tome 2 , page 275.
- SOMNOLENCE ( rap. B ) , tome 2 , page 364.
- SORA ( rap. E ) , tome 3 , page 362.
- SOUCI ( variété A ) , tome 2 , page 301.
- SPANOPOGON ( variété B ) , tome 4 , page 174.

( 467 )

SPASME , tome 2 , page 324 ; et ( espèce II ) tome 2 , page 326.

— Avec production prédominante de flatuosités , tome 2 , page 328.

— Cohibant ( s-esp. I ) , tome 2 , page 326. — Intestinal ( variété B ) , tome 2 , page 327.

— Dorsal ( rap. B ) , tome 2 , page 326.

— Flatueux ( s-esp. II ) , tome 2 , page 328.

— Par inanition ( A. ) , tome 2 , page 47.

SPASMES cloniques , tome 2 , page 367.

SPEDALSKHED des Norvégiens ( rap. C ) , tome 3 , page 498.

SPERMATISME ( genre XLIII ) , tome 3 , page 84.

SPERMATOCÈLE ( espèce I ) , tome 3 , page 84.

SPHACÈLE , tome 4 , page 52.

— De l'os , tome 4 , page 107.

SPHACELISME , tome 3 , page 189.

SPINA BIFIDA , tome 1 , page 329.

SPINA VENTOSA , tome 3 , page 353.

— Des auteurs , tome 4 , page 105.

SPINOLE , tome 1 , page 329.

SPLÉEN des Anglais , tome 2 , page 258.

SPLÉNALGIE ( espèce XII ) , tome 2 , page 421.

SPLÉNEMPHRAXIS , tome 3 , page 143.

SPLÉNIQUE , tome 2 , page 421.

SPLÉNITIE ( espèce X ) , tome 3 , page 206.

— Phlegmonodée ( rap. A ) , tome 3 , page 207.

SPLENITIS , tome 3 , page 206.

SPLÉNOCÈLE ( s-esp. XIII ) , tome 4 , page 209.

— Inguinale ( variété B ) , tome 4 , page 209.

— Ventrale ( variété A ) , tome 4 , page 209.

SPLÉNOPARECTAME , tome 3 , page 129.

- SQUINANCIE**, tome 3, pages 194 et 416.  
 — Brûlante (rap. A), tome 3, page 332.  
 — Du larynx (rap. E), tome 3, page 419.  
 — Dysentérique (sorte 4), tome 3, page 438.  
 — Gangréneuse (E.), tome 2, page 205 ; et (sorte 4), tome 4, page 62.  
 — Maligne (A.), tome 2, page 205.  
 — Parotidée (sorte 1), tome 3, page 177.  
 — Pharyngée (rap. A), tome 3, page 417.  
 — Purpuro-parotidée (B.), tome 2, page 205.  
 — Sifflante, tome 3, page 419.  
 — Striduleuse, tome 3, page 419.  
 — Thymique (rap. A), tome 3, page 202.  
 — Tonsillaire (rap. A), tome 3, page 196.  
 — Trachéale (rap. A), tome 3, page 418. — Spasmodique (rap. G), tome 3, page 419.  
 — Ulcéreuse (D.), tome 2, page 205.  
 — Uvulaire, tome 3, page 416.  
 — Variolique (sorte 15), tome 3, page 223.  
**SQUIRRE** (rap. A), tome 3, page 138.  
 — A la rate (rap. A), tome 3, page 143.  
 — Au foie (rap. B), tome 3, page 142.  
 — De l'utérus (rap. B), tome 3, page 147.  
**SQUIROSARQUE** (genre VII), tome 1, page 285.  
**STAPHYLOME** (syn.), tome 4, page 199.  
 — De l'iris (variété D), tome 4, page 200.  
**STÉATITE**, tome 3, page 467.  
**STÉATOME** (s-esp. III), tome 3, page 467.  
**STÉRILITÉ**, tome 2, page 75 ; et t. 3, p. 79.  
**STERNALGIE** (espèce VII), tome 2, page 406.  
**STOMACACE**, tome 4, page 37.  
 — Par la morsure de l'hémorroïde (sorte 9), tome

- 3, page 473. — Du serpent hæmorrhous, tome 3, page 46.
- Purulent ( C. ), tome 4, page 38; et ( rap. B ) tome 4, page 68.
- Scorbutique ( A. ), tome 4, page 38.
- Universel ( B. ), tome 4, page 38.
- STRABISME** ( espèce II ), tome 2, page 354.
- Astheno-spastique ( s-esp. II ), tome 2, page 354.
- Buffonien ( sorte 17 ), , tome 2, page 47 et 354.
- Caligineux ( sorte 1 ), tome 3, page 115.
- Catarrhal ( sorte 8 ), tome 3, page 414.
- Crystallinique ( sorte 1 ), tome 3, page 121.
- Equinoxial ( A. ), tome 2, page 329.
- Louchant, tome 3, page 62.
- Paralytique ( sorte 3 ), tome 3, page 62.
- Spasmodique, tome 2, page 373.
- Vulgaire ( s-esp. I ), tome 2, page 354.
- STRANGURIE**, tome 3, page 72; et ( sorte 19 ) tome 3, page 519.
- STRUMES**, tome 1, page 287.
- STUPIDITÉ**, tome 2, page 244.
- STUPORISME** ( genre XIX ), tome 2, page 127.
- Apnéique ( espèce I ), tome 2, page 127.
- Cicutaire aquatique ( T. ), tome 2, page 227.
- Lipothymique ( espèce IV ), tome 2, page 211.
- Narcotique ( espèce V ), tome 2, page 215. — Par des produits de la fermentation ( §. II ), tome 2, page 239. — Par des produits simples ( §. I ), tome 2, page 218.
- Par des plantes de la cryptogamie ( s-esp. XVI ), tome 2, page 235.

- STUPORISME** par des plantes de la décandrie ( s-esp. VII ), tome 2, page 228.
- Par de plantes de la diadelphie ( s-esp. XI ), tome 2, page 233.
  - Par des plantes de la diécie ( s-esp. XIV ), tome 2, page 234.
  - Par des plantes de la monadelphie ( s-esp. X ), tome 2, page 232.
  - Par des plantes de la monécie ( s-esp. XIII ), tome 2, page 233.
  - Par des plantes de la pentandrie ( s-esp. IV ), tome 2, page 221.
  - Par des plantes de la poliandrie ( s-esp. IX ), tome 2, page 230.
  - Par des plantes de la polygamie ( s-esp. XV ), tome 2, page 235.
  - Par des plantes de la syngénésie ( s-esp. XII ), tome 2, page 233.
  - Par des plantes de la tétrandrie ( s-esp. III ), tome 2, page 221.
  - Par des plantes de la triandrie ( s-esp. II ), tome 2, page 219.
  - Par des plantes de l'hexandrie ( s-esp. V ), tome 2, page 228.
  - Par des plantes de l'icosandrie ( s-esp. VIII ), tome 2, page 229.
  - Par des plantes de l'octandrie ( s-esp. VI ), tome 2, page 228.
  - Par des plantes narcotiques indéterminées ( §. III ), tome 2, page 240.
  - Par des plantes tirées de la diandrie ( s-esp. I ), tome 2, page 218.

- STUPORISME par la *barringtonia speciosa* ( B. ), tome 2, page 233.
- Par la bryone ( B. ), tome 2, page 233.
  - Par la *coriaria myrtifolia* ( C. ), tome 2, page 234.
  - Par l'*actæa spicata* ( A. ), tome 2, page 230.
  - Par la fève de St-Ignace ( L. ), tome 2, page 225.
  - Par la *frutillaria imperialis* ( A. ), tome 2, page 228.
  - Par la fumée ( s-esp. VI ), tome 2, page 131.
  - Par la *gloriosa superba* ( B. ), tome 2, page 228.
  - Par la grande ciguë ( P. ), tome 2, page 225.
  - Par la *jatropha umbellata* ( s-esp. XVIII ), tome 2, page 240.
  - Par la laitue ( A. ), tome 2, page 233.
  - Par l'amandier ( C. ), tome 2, page 229.
  - Par la mercuriale ( B. ), tome 2, page 234.
  - Par la *myristica fatua* ( C. ), tome 2, page 232.
  - Par l'angélique atro-purpurine ( Q. ), tome 2, page 226.
  - Par la nielle ( F. ), tome 2, page 232.
  - Par la noix vomique ( K. ), tome 2, page 224.
  - Par la petite ciguë ( U. ), tome 2, page 227.
  - Par l'arome de diverses espèces de chèvrefeuille ( C. ), tome 2, page 131.
  - Par l'arome de la *datura stramonium* ( E. ), tome 2, page 131.
  - Par l'arome de l'*adenanthera pavonica* ( I. ), tome 2, page 132.
  - Par l'arome de la dentelaire ( E. ), tome 2, page 131.
  - Par l'arome de la rose de provins ( K. ), tome 2, page 132.
  - Par l'arome de l'*upa*, des malais, des javanais ( M. ), tome 2, page 132.

- STUPORISME par l'arome du *comocladia dentata* ( A. ),  
tome 2 , page 131.
- Par l'arome du laurier-rose ( D. ), t. 2 , p. 131.
  - Par l'arome du lis ( G. ), tome 2 , page 132.
  - Par l'arome du mancenilier ( L. ), tome 2 , page 132.
  - Par l'arome du *polianthes tuberosa* ( H. ), tome 2 ,  
page 132.
  - Par l'arome du safran oriental ( B. ), tome 2 ,  
page 131.
  - Par l'*azalea pontica* ( B. ), tome 2 , page 221.
  - Par la sensitive ( A. ), tome 2 , page 235.
  - Par la *sida asiatica* ( A. ), tome 2 , page 232.
  - Par le chanvre ( A. ), tome 2 , page 234.
  - Par le *chenopodium hybridum* ( O. ), t. 2 , p. 225.
  - Par le chèvrefeuille vulgaire ( C. ), t. 2 , p. 221.
  - Par le figuier ( B. ), tome 2 , page 235.
  - Par le gaz acide carbonique ( s-esp. IV ), tome 2 ,  
page 129.
  - Par le gaz azote ( s-esp. III ), tome 2 , page 129.
  - Par le gaz carbonéux ( s-esp. V ), t. 2 , p. 130.
  - Par le gaz hydrogène ( s-esp. I ), t. 2 , p. 127.
  - Par le gaz hydrogène sulfuré ( s-esp. II ), tome  
2 , page 128.
  - Par le laurier-cérise ( A. ), tome 2 , page 229.
  - Par le *lecythis minor* ( D. ), tome 2 , page 232.
  - Par le *ledum palustre* ( A. ), tome 2 , page 228.
  - Par le *menispermum cocculus* ( D. ), t. 2 , p. 234.
  - Par le *paris quadrifolia* ( A. ), tome 2 , page 228.
  - Par le pavot ( B. ), tome 2 , page 230.
  - Par le pêcher ( B. ), tome 2 , page 229.
  - Par le *physalis somnifera* ( H. ), tome 2 , page 224.
  - Par le poivre à large feuille ( A. ), t. 2 , p. 218.

**STUPORISME** par le produit fermenté de la vigne

( s-esp. XVII ), tome 2, page 239.

- Par l'ers ( A ), tome 2, page 233.
  - Par le safran ( A. ), tome 2, page 219.
  - Par le seigle ( C. ), tome 2, page 219.
  - Par le *sium latifolium* ( R. ), tome 2, page 226.
  - Par le tabac ( F. ), tome 2, page 223.
  - Par le thé ( E. ), tome 2, page 232.
  - Par l'hêtre ( A. ), tome 2, page 233.
  - Par l'if ( E. ), tome 2, page 235.
  - Par l'ivraie ( B. ), tome 2, page 219.
  - Par l'œnanthe ( S. ), tome 2, page 226.
  - Par les *atropa* ( G. ), tome 2, page 223.
  - Par les *cerbera* ( N. ), tome 2, page 225.
  - Par les *cestrum* ( M. ), tome 2, page 225.
  - Par les *charophyllum* ( X. ), tome 2, page 228.
  - Par les *coriandrium* ( V. ), tome 2, page 227.
  - Par les *datura* ( D. ), tome 2, page 221.
  - Par les diverses espèces de champignons, tome 2, page 236.
  - Par les jusquiames ( E. ), tome 2, page 222.
  - Par les *rhododendrum* ( B. ), tome 2, page 229.
  - Par les *solanum* ( I. ), tome 2, page 224.
  - Par les *spigelia* ( A. ), tome 2, page 221.
  - Par un arôme ( s-esp. VII ), tome 2, page 131.
  - Synéqué ( espèce II ), tome 2, page 133.
  - Synoqué ( espèce III ), tome 2, page 173.
- STYMATOSE**, tome 1, page 277.
- SUDAMINA** des latins ( rap. C ), tome 3, page 377.
- SUETTE** miliaire, tome 3, page 379; et ( rap. A )  
tome 3, page 380.
- SUEUR**, tome 3, page 92.

( 474 )

- Acide ( A ), tome 3, page 383.
- Anglaise, tome 2, page 196.
- Bleuâtre ( s-esp. VIII ), tome 3, page 93.
- De sang ( sorte 6 ), tome 1, page 231; et ( A. )  
tome 4, page 40.
- Exanthématique ( rap. B ), tome 3, page 372;  
et ( sorte 9 ), tome 3, page 383.
- Jaune ( s-esp. VI ), tome 3, page 93.
- Laitieuse ( s-esp. I ), tome 3, page 92.
- Miellée ( s-esp. II ), tome 3, page 92.
- Noire ( s-esp. V ), tome 3, page 93.
- Sablonneuse ( s-esp. IX ), tome 3, page 93.
- Saburrale ( sorte 24 ), tome 2, page 88.
- Sanglante ( s-esp. VII ), tome 3, page 93.
- Verte ( s-esp. IV ), tome 3, page 93.
- Vineuse ( s-esp. III ), tome 3, page 93.
- SUFFISANCE** ( s-esp. II ), tome 2, page 281.
- SUFFOCATION** de matrice, tome 2, page 339.
- Striduleuse, tome 3, page 419.
- SUFFUSION** artério-veineuse, tome 1, page 247.
- SUFFUSIO** *auriginosa*, tome 3, page 473.
- SUGILLATION**, tome 1, page 232.
- SUPPRESSION** d'urine, tome 3, page 71.
- SUPPRESSIONS**, tome 3, page 68.
- SUPPRESSOIRES**, tome 3, page 68.
- SURDITÉ**, tome 3, page 59.
- Achorique ( sorte 2 ), tome 3, page 487.
- Ascaridique ( sorte 31 ), tome 2, page 100.
- Comatique ( rap. B ), tome 2, page 365.
- Fébrile ( sorte 18 ), tome 3, page 173.
- SUROXIGÉNÈSES** ( s-classe II ), tome 2, page 262.

- SYCOSE (variété E), tome 3, page 403; et tome 4, page 97.
- SYMBLEPHARUM (syn.), tome 4, page 236.
- SYMPTOMES analogues à ceux que procurent les cantharides, occasionnés par le méloë (s-esp. V), tome 3, page 52.
- SYNCOPALE (rap. F), tome 2, page 162.
- SYNCOPE (espèce III), tome 2, page 58.
- Antipathique (sorte 1), tome 2, page 272.
  - Apostématique (rap. B), tome 4, page 64.
  - Arthritique (sorte 2), tome 2, page 86.
  - Cardiogmique (sorte 4), tome 1, page 247.
  - Convulsive mortelle (A.), tome 2, page 226.
  - Dolorique (sorte 1), tome 2, page 397.
  - Exanthématique (sorte 5), tome 2, page 119; (sorte 4) tome 3, page 222; et (sorte 2) tome 3, page 484.
  - Fébrile (sorte 4), tome 3, page 171.
  - Fébrile, tome 2, page 151.
  - Hydrocardique (sorte 1), tome 1, page 328.
  - Hystérique (sorte 4), tome 2, page 341.
  - Inanitique (rap. B), tome 2, page 59.
  - Lanzonienne (rap. B), tome 3, page 115.
  - Métastatique (sorte 3), tome 4, page 107.
  - Mortelle par la piqûre d'une abeille (A.), tome 3, page 50.
  - Par méditation trop forte (rap. B), tome 2, page 294.
  - Plébotomique (rap. A), tome 2, page 54.
  - Pléthorique (sorte 11), tome 1, page 223.
  - Polypeuse (sorte 1), tome 3, page 161.
  - Scorbutique (sorte 9), tome 4, page 39.

- Sphacélique ( sorte 2 ), tome 4 , page 60.
- Stomachique ( A. ), tome 2 , page 329.
- Vénéénique ( sorte 1 ), tome 2 , page 204.
- SYNECHES des Grecs , tome 2 , page 141.
- SYNECHIE ( syn. ), tome 4 , page 236.
- SYNYZESIS , tome 4 , page 233.
- SYNOCHA , tome 3 , page 165 ; et ( rap. B-C ) ,  
tome 3 , pages 166 et 167.
- *Causodes* ( rap. C ) , tome 3 , page 330.
- Composée ( rap. C ) , tome 3 , page 169.
- De BURSERI ( rap. G ) , tome 3 , page 330.
- Putride ( rap. B ) , tome 3 , page 169.
- Scorbutique ( sorte 26 ) , tome 4 , page 41.
- SYNOCHUS , tome 3 , page 166 ; et ( espèce III )  
tome 3 , page 168.
- Anniversaire ( rap. I ) , tome 3 , page 170.
- Ardent ( s-esp. II ) , tome 3 , page 472.
- Avec sueur ( variété I ) , tome 3 , page 171.
- *Causonides* ( rap. B ) , tome 3 , page 330.
- Dysentérique ( variété H ) , tome 3 , page 170.
- Hyémal ( variété D ) , tome 3 , page 410.
- Imputride ( rap. A ) , tome 3 , page 166.
- Pleurétique ( variété K ) , tome 3 , page 171.
- Putride ( rap. A ) , tome 3 , page 169. — Des  
anciens , tome 3 , page 169.
- Rhumatisant ( rap. C ) , tome 3 , page 391.
- Sanguin ( variété A ) , tome 3 , page 170.
- Scorbutique ( sorte 27 ) , tome 4 , page 41.
- Simple ( rap. B ) , tome 3 , page 166. — [ 2.<sup>e</sup> dif-  
férence du ] ( rap. G ) , tome 3 , page 330.
- Soporeux ( sorte 9 ) , tome 3 , page 172.
- Spermatique ( rap. B ) , tome 3 , page 84.

- Tarentulé ( rap. E ), tome 2 , page 324 ; et ( rap. K ), tome 3 , page 170.
- Variolique ( variété G ), tom. 3 , page 170.
- SYNOQUE** ( espèce II ), tome 3 , page 165 ; et ( rap. F ), tome 3 , page 167.
- Anniversaire ( rap. D ), tome 2 , page 80.
- Catharreuse ( rap. C ), tome 3 , page 413.
- Céphalalgique ( E. ), tome 2 , page 125.
- Dysentérique ( rap. C ), tome 2 , page 80.
- Pléthorique ( sorte 49 ), tome 1 , page 229.
- Pleurétique , tome 2 , page 80.
- Psorique ( sorte 21 ), tome 2 , page 121.
- Putride , tome 2 , page 209.
- Stomachique ( rap. A ), tome 2 , page 59.
- Tragique ( rap. L ), tome 3 , page 167.
- Très-putride de Bielitz en Silésie ( rap. I ), tome 2 , page 186.
- Syphilis ( genre LXXVIII ), tome 3 , page 501.
- Indienne ( rap. A ), tome 3 , page 513.
- Pianique ( espèce II ), tome 2 , page 513.
- Vénérienne ( espèce I ), tome 3 , page 512.
- SYRIGMUS** ( sorte 6 ), tome 3 , page 171.

### T.

- TACHE** scorbutique ( sorte 29 ), tome 4 , page 41.
- TACHES** ( s-esp. I ), tome 3 , page 338.
- Diuturnes , tome 3 , page 343.
- Raboteuses , tome 3 , page 343.
- Rouges , tome 3 , page 343.
- TARANTISME** ( variété G ), tome 2 , page 299 ; et ( E. ) tome 3 , page 49.

- TEIGNE** ( genre LXXV ), tome 3, page 487.
- Ecailleuse ( s-esp. II ), tome 3, page 489.
  - Faveuse ( rap. B ), tome 3, page 488.
  - Figueuse ( s-esp. II ), tome 3, page 488 et 489.
  - Humide ( esp. I et rap. A ), tome 3, page 488.
  - Lactée ( rap. A ), tome 3, page 486.
  - Lupine, tome 3, page 488.
  - Lupineuse ( s-esp. I ), tome 3, page 488.
  - Miliaire ( rap. C ), tome 3, page 488.
  - Porrigineuse ( s-espèce I ), tome 3, page 489.
  - Sèche ( espèce II ), tome 3, page 489.
- TÉMÉRAIRE** [ le ] ( variété G ), tome 2, page 297.
- TENDRESSE** ( variété A ), tome 2, page 295.
- TENESME** ( s-esp. IV ), tome 2, page 418.
- Ascaridique ( sorte 1 ), tome 2, page 102.
  - Calculeux ( sorte 9 ), tome 3, page 113.
  - Carcinomatique, tome 4, page 118.
  - Dysentérique ( rap. A, tome 3, page 437.
  - Hémorroïdal ( sorte 2 ), tome 1, page 238.
  - Indien ( variété B ), tome 2, page 419.
  - Oriental ( variété C ), tome 2, page 419.
  - Spontané ( variété A ), tome 2, page 419.
  - Ulcérique, tome 4, page 93.
- TENTIGO** des latins, tome 2, page 349.
- TERREUR** ( variété D ), tome 2, page 307.
- TÉTANE** ( espèce I ), tome 2, page 350 ; ( rap. C ) tome 2, page 352 ; et ( rap. A ) tome 2, page 353.
- Admirable ( rap. B ), tome 2, page 360.
  - Anæsthésique ( s-esp. III ), tome 2, page 353.
  - Apyrétique ( s-esp. II ), tome 2, page 353.
  - Catarrhal ( sorte 7 ), tome 3, page 414.

- Comateux (s-esp. IV), tome 2, page 353.
- Emprostotonique (variété C), tome 2, page 352.
- Hémiplégique (sorte 1), tome 4, page 65.
- Holotonique (variété A), tome 2, page 352.
- Hystérique (sorte 11) tome 2, page 342.
- Indien (rap. A), tome 2, page 352.
- Latéral (variété D), tome 2, page 352.
- Opisthotonique (variété B), tome 2, page 352.
- Pyrétique (s-esp. I), tome 2, page 353.
- Syphilitique (sorte 9), tome 3, page 318.
- Tonique, tome 2, page 350.
- TÉTANOS**, tome 2, page 350.
- Fiévreux (rap. H), tome 2, page 151; et (sorte 7) tome 2, page 171.
- Gastrique (sorte 10), tome 2, page 86.
- Inflammatoire (sorte 9), tome 3, page 393.
- Vermineux (sorte 13), tome 2, page 99.
- Traumatique (sorte 10), tome 4, page 81.
- TETARTOPHYE**, tome 2, page 167.
- Avec amaurose (rap. E-B), tome 2, page 168.
- Avec cécité (rap. E-A), tome 2, page 168.
- Carotique (rap. D), tome 2, page 168.
- Héparalgique (sor. 7), tome 3, page 143.
- Maligne (rap. B), tome 2, page 167.
- Simple (rap. A), tome 2, page 167.
- Splénique (sorte 5), tome 3, page 144.
- TÊTE de travers**, tome 2, page 357.
- De veau (variété A), tome 3, page 500.
- THE NELLTLE RASH**, tome 3, page 363.
- THÉRIOME** (rap. D), tome 4, page 95.
- THERMINTHE** (esp. II), tome 3, page 183; et (rap. F) tome 3, page 342.

- THLASME** ( genre XCII ), tome 4, page 219.  
**THORAXIALGIE** ( sorte 23 ), tome 2, page 343.  
**THORAXOCÈLE** ( espèce III ), tome 4, page 200.  
**THYMITIE** ( espèce VII ), tome 3, page 202.  
**THYMITIS**, tome 3, page 202.  
**TIC**, tome 2, page 355.  
 — Dououreux, tome 2, page 400.  
 — Hypochondrique ( rap. H ), tome 2, page 373.  
**TIERCE**, tome 2, pages 146 et 147.  
 — Accidentelle, tome 2, page 147.  
 — Algide ( rap. B ), tome 2, page 150.  
 — Arthritique ( sorte 8 ), tome 1, page 267 ; ( rap. II ) tome 2, page 157 ; ( sorte 6 ) tome 3, page 393 ; et ( sorte 4 ), tome 4, page 169.  
 — Asthmatique ( rap. M ), tome 2, page 152.  
 — Avec aveuglement ( rap. U ), tome 2, page 154.  
 — Avec colique ( rap. R ), tome 2, page 154.  
 — Avec coqueluche ( rap. L ), tome 2, page 152.  
 — Bâtarde, tome 2, page 148.  
 — Cardialgique ( rap. O ), tome 2, page 153.  
 — Cardiaque, tome 2, page 153.  
 — Carotique ( rap. I ), tome 2, page 152.  
 — Catarrhale, tome 2, page 153.  
 — Cholérique ( rap. Q ), tome 2, page 153.  
 — Continue, tome 2, page 148.  
 — Demi-dysentérique, tome 2, page 156.  
 — Diaphorétique ( rap. X ), tome 2, page 154.  
 — Doublée ( rap. C ), tome 2, page 148 et ( rap. B ), tome 2, page 158.  
 — Dysentérique ( rap. CC ), tome 2, page 156.  
 — Emétique, tome 2, page 154.  
 — Epileptique ( rap. K ), tome 2, page 152.

— Etendue

- Etendue (rap. B ), tome 2, page 148.
- Hémiplégique (rap. T ), tome 2, page 154.
- Hystérique (rap. F ), tome 2, page 151.
- Incomplète, tome 2, page 148.
- Inflammatoire (rap. Y ), tome 2, page 155.
- Légitime, tome 2, page 147.
- Léthargique, tome 2, page 152.
- Limitée (rap. A ), tome 2, page 147.
- Maniaque, tome 2, page 151.
- Miliare (rap. EE ), tome 2, page 157.
- Onctuaire (rap. FF ), tome 2, page 157.
- Pétéchiale (rap. DD ), tome 2, page 156.
- Pétéchizante, tome 2, page 156.
- Pleurétique (rap. BB ), tome 2, page 156.
- Psorique (sorte 6 ), tome 2, page 119.
- Puerpérale (rap. GG ), tome 2, page 157.
- Putride avec abattement (rap. K ), t. 2, p. 167.
- Rémittente inflammatoire péripneumonique (rap. Z ), tome 2, page 155.
- Scorbutique (rap. HH ), tome 2, page 157.
- Soporeuse, tome 2, page 152.
- Subcontinue, tome 2, page 161.
- Subintrante (rap. C ), tome 2, page 161.
- Subsanglante ou atrabillaire (rap. C ), tome 2, page 150.
- Syncopale (rap. D ), tome 2, page 151.
- Syphilitique (sorte 6 ), tome 3, page 118.
- Triple, tome 2, page 161.
- Vermineuse (sorte 6 ), tome 2, page 97.
- TIMIDITÉ (variété E ), tome 2, page 55.
- TINTOUIN pléthorique (sorte 18 ), t. 1, p. 216.
- Saburral (sorte 6 ), tome 2, page 86.

- TONISME ( genre XXXI ), tome 2, page 350. —  
 — Général ( §. I ), tome 2, page 350. —  
 — Particulier ( §. II ), tome 2, page 354. —  
 TOPHUS ( variété A ), tome 4, page 160. —  
 TORTICOLIS ( espèce IV ), tome 2, page 357. —  
 — Catarrhal ( sorte 10 ), tome 3, page 415. —  
 — En dehors ( sorte 5 ), tome 3, page 62. —  
 — Gibbeux ( sorte 2 ), tome 4, page 158. —  
 — Huméral ( rap. B ), tome 2, page 357. —  
 — Latéral ( rap. C ), tome 2, page 357. —  
 — Spasmodique ( rap. A ), tome 2, page 357. —  
 TOURNOYEMENT de tête, tome 2, page 268. —  
 TOUX ( genre XXXIV ), tome 2, page 376. —  
 — Accidentelle ( s-esp. I ), tome 2, page 377. —  
 — Anévrismatique ( sorte 8 ), tome 1, page 248. —  
 — Arthritique ( sorte 12 ), tome 4, page 170. —  
 — Calculeuse, ( rap. D ), tome 3, page 115. —  
 — Catarrhale ( sorte 2 ), tome 3, page 69 et 409. —  
 — Des femmes enceintes ( sorte 13 ), t. 3, p. 104. —  
 — Exanthématique ( sorte 12 ), tome 2, page 120. —  
 — Gutturale ( s-esp. II ), tome 2, page 337. —  
 — Hémoptique ( rap. A ), tome 1, page 258. —  
 — Hydatidique ( sorte 9 ), tome 2, page 112. —  
 — Hystérique ( sorte 17 ), tome 2, page 343. —  
 — Indéterminée ( s-esp. IV ), tome 2, page 378. —  
 — Métallurgique ( sorte 5 ), tome 3, page 17. —  
 — Par la dentition ( sorte 4 ), tome 2, page 404. —  
 — Phthisique ( rap. A ), tome 2, page 389. —  
 — Pléthorique ( sorte 28 ), tome 1, page 227. —  
 — Polypeuse ( sorte 1 ), tome 3, page 159. —  
 — Quinteuse ( espèce II ), tome 2, page 378. —  
 — Sèche ( sorte 6 ), tome 1, page 291. — Fièvre

intermittente ( sorte 14 ), tome 2 , page 171.

— Simple ( espèce I ) , tome 2 , page 377.

— Stomacale ( sorte 14 ), tome 2 , page 87.

— Très-forte par colère ( M. ) , tome 2 , page 318.

— Vermineuse ( sorte 20 ), tome 2 , page 99 ; et ( A )  
tome 2 , page 125.

— Xérolaryngée ( s-esp. III ) , tome 2 , page 378.

TOXICOSE ( genre XXXIX ) , tome 3 , page 5.

— Accidentelle ( espèce XIV ) , tome 3 , page 50.

— Acide ( espèce I ) , tome 3 , page 7.

— Alcaline ( espèce II ) , tome 3 , page 11.

— Cuprique ( espèce VII ) , tome 3 , page 19.

— Insectique ( espèce XIII ) , tome 3 , page 48.

— Mercurique ( esp. VIII ) , tome 3 , page 20.

— Ophiologique ( espèce XII ) , tome 3 , page 45.

— Par des plantes décandriques ( s-esp. VIII ) , tome  
3 , page 28.

— Par des plantes diadelphiques ( s-esp. XII ) , tome  
3 , page 34.

— Par des plantes diandriques ( s-esp. I ) , tome 3 ,  
page 22.

— Par des plantes didynamiques ( s-esp. XI ) , tome  
3 , page 33.

— Par des plantes diœciques ( s-esp. XVI ) , t. 3 , p. 37.

— Par des plantes dodécandriques ( s-esp. IX ) , tome  
3 , page 28.

— Par des plantes ennéandriques ( s-esp. VII ) , tome  
3 , page 27.

— Par des plantes gynandriques ( s-esp. XIV ) , tome  
3 , page 35.

— Par des plantes hexandriques ( s-esp. V ) , tome  
3 , page 26.

- TOXICOSE par des plantes monœciques ( s-esp. XV ),  
tome 3 , page 35.
- Par des plantes octandriques ( s-esp. VI ), tome  
3 , page 27.
  - Par des plantes pentandriques ( s-esp. IV ), tome  
3 , page 23.
  - Par des plantes polyandriques ( s-esp. X ), tome  
3 , page 29.
  - Par des plantes polygamiques ( s-esp. XVII ),  
tome 3 , page 37.
  - Par des plantes syngénésiques ( s-esp. XIII ), tome  
3 , page 34.
  - Par des plantes tétandriques ( s-esp. III ), tome  
3 , page 22.
  - Par des plantes triandriques ( s-esp. II ), tome 3 ,  
page 22.
  - Par des poisons animaux ( sec. III ), tome 3 ,  
page 38.
  - Par la *bacchinia coccinea* ( B. ), tome 3 , page 28.
  - Par l'*abrus precatorius* ( A. ), tome 3 , page 34.
  - Par la camelée ( A. ), tome 3 , page 22.
  - Par la chaux ( s-esp. I ), tome 3 , page 11.
  - Par la chaux volatilisée et suspendue dans l'atmos-  
phère ( variété A ), tome 3 , page 11.
  - Par l'acide arsenique ( s-esp. IV ), tome 3 , page 9.
  - Par l'acide arsenique en état de gaz ( variété A ),  
tome 3 , page 9.
  - Par l'acide arsenique en substance ( variété B ),  
tome 3 , page 9.
  - Par l'acide muriatique ( s-esp. III ), t. 3 , p. 8.
  - Par l'acide muriatique en état de gaz ( variété A ),  
tome 3 , page 8.

- TOXICOSE** par l'acide nitrique ( s-esp. II ), tome 3, page 8.
- Par l'acide nitrique en état de gaz ( variété A ), tome 3, page 8.
  - Par l'acide sulfurique en état de gaz ( variété A ), tome 3, page 7.
  - Par l'acide sulfurique en substance ( variété B ), tome 3, page 8.
  - Par la colchique d'automne ( B. ), t. 3, p. 26.
  - Par la coloquinte ( F. ), tome 3, page 37.
  - Par la digitale ( A. ), tome 3, page 33.
  - Par la *echites erecta* ( F. ), tome 3, page 24.
  - Par la globulaire ( A. ), tome 3, page 22.
  - Par la gomme gutte ( A. ), tome 3, page 29.
  - Par la gratiote officinale ( A. ), tome 3, page 22.
  - Par la *guarea trichilioides* ( A. ), tome 3, page 27.
  - Par la *hura crepitans* ( D. ), tome 3, page 36.
  - Par la *momordica elaterium* ( E. ), tome 3, page 37.
  - Par la morsure de la couleuvre commune ( s-esp. VII ), tome 3, page 47.
  - Par la morsure de la dipsade ( s-esp. IV ), tome 3, page 45.
  - Par la morsure de la melanés ( s-esp. III G. ), tome 3, page 45.
  - Par la morsure de l'araignée ( s-esp. II ), tome 3, page 49.
  - Par la morsure de la scythe ( s-esp. III B. ), tome 3, page 45.
  - Par la morsure de l'aspic ( s-esp. VIII ), tome 3, page 47.
  - Par la morsure de l'atroce ( s-esp. III K. ), tome 3, page 45.

- TOXICOSE**, par la morsure de l'atropos ( s-esp. III D. ), tome 3, page 45.
- Par la morsure de la vipère ( s-esp. V ), tome 3, page 46.
  - Par la morsure de la vipère d'Egypte ( s-esp. III E. ), tome 3, page 45.
  - Par la morsure de la vipère de Rhedi ( s-esp. VI ) tome 3, page 47.
  - Par la morsure de l'haje ( s-esp. III F. ), tome 3, page 45.
  - Par la morsure de l'hébraïque ( s-esp. III H. ), tome 3, page 45.
  - Par la morsure des serpens formant le genre des amphysbènes ( s-esp. IX ), tome 3, page 47.
  - Par la morsure des serpens formant le genre des anguis ( s-esp. IX ), tome 3, page 47.
  - Par la morsure du bojobi ( s-esp. I ), tome 3, page 45.
  - Par la morsure du fer à lance ( s-esp. III A. ), tome 3, page 45.
  - Par la morsure du hannasch œsuced ( s-esp. IX ), tome 3, page 47.
  - Par la morsure du holleik ( s-esp. IX ), tome 3, page 47.
  - Par la morsure du large queue ( s-esp. III I. ), tome 3, page 45.
  - Par la morsure du malpole ( s-esp. III L. ), tome 3, page 45.
  - Par la morsure d'un canard en colère ( s-esp. I ), tome 3, page 50.
  - Par la morsure du sans tache ( s-esp. III C. ), tome 3, page 45.

- TOXICOSE** par la morsure du serpent brûlant ( s-esp. II ), tome 3, page 45.
- Par l'*anacardium occidentale* ( A. ), tome 3, page 27.
  - Par l'*anagyris foetida* ( A. ), tome 3, page 28.
  - Par l'*annonna muricata* ( F. ), tome 3, page 31.
  - Par la noix vomique ( C. ), tome 3, page 23.
  - Par l'antimoine en vapeurs ( variété A ), tome 3, page 12.
  - Par la *passerina hirsuta* ( C. ), tome 3, page 27.
  - Par la piqûre de l'abeille ( s-esp. III ), tome 3, page 50.
  - Par la piqûre des insectes arachnéides ( I. ), tome 3, page 48.
  - Par la piqûre des insectes hyménoptères ( II ), tome 3, page 50.
  - Par la piqûre du scorpion ( s-esp. I ), tome 3, page 48.
  - Par la *plumeria rubra* ( G. ), tome 3, page 24.
  - Par l'*apocynum androsæmicum* ( I. ), tome 3, page 24.
  - Par la *quilandina moringa* ( C. ), tome 3, page 28.
  - Par l'*asarum europæum* ( A. ), tome 3, page 28.
  - Par la scammonée ( B. ), tome 3, page 23.
  - Par la scille ( A. ), tome 3, page 26.
  - Par l'*asclepias gigantea* ( K. ), tome 3, page 24.
  - Par la *toxicaria americana* ( B. ), tome 3, page 22.
  - Par la violette ( B. ), tome 3, page 34.
  - Par le *calophyllum ilophyllum* ( B. ), t. 3, p. 30.
  - Par le carbonate de baryte ( s-esp. II ), tome 3, page 12.
  - Par le carbonate de baryte en substance ( variété A ), tome 3, page 12.
  - Par le cuivre en substance ( variété B ), tome 3, page 19.

- TOXICOSE** par le cuivre en vapeurs (variété A),  
tome 3, page 19.
- Par le *daphne mezereon* (B.), tome 3, page 27.
  - Par le *delphinium staphisagria* (D.), tome 3,  
page 30.
  - Par le *doliocarpus volubilis* (C.), tome 3, page 30.
  - Par le *dracontium fatidum* (B.), tome 3, page 35.
  - Par le fusain (D.), tome 3, page 23.
  - Par le laurier-rose (E.), tome 3, page 24.
  - Par l'ellébore blanc (A.), tome 3, page 37.
  - Par le mercure en substance (variété B), tome  
3, page 21.
  - Par le mercure en vapeurs (variété A), tome 3,  
page 20.
  - Par le mercure sous forme d'oxides, de muriates,  
(variété C), tome 3, page 21.
  - Par le pain de pourceau (A.), tome 3, page 23.
  - Par le plomb en substance (variété B), tome 3,  
page 13.
  - Par le plomb en vapeurs (variété A), tome 3,  
page 13.
  - Par les aconit (E.), tome 3, page 30.
  - Par les anémones (G.), tome 3, page 31.
  - Par le santal blanc (C.), tome 3, page 22.
  - Par les *arum* (A.), tome 3, page 35.
  - Par les clemates (H.), tome 3, page 32.
  - Par les *cynanchum* (H.), tome 3, page 14.
  - Par les croton (A.), tome 3, page 35.
  - Par les élébore (K.), tome 3, page 33.
  - Par les euphorbes (B.), tome 3, page 29.
  - Par les hippomane (C.), tome 3, page 36.
  - Par les *jatropha* (B.), tome 3, page 36.

**TOXICOSE** par les *lobelia* ( A. ), tome 3 , page 34.

— Par les *ranunculus* ( I. ), tome 3 , page 32.

— Par les *rhus* ( M. ), tome 3 , page 25.

— Par l'*exæcaria agallhorha* ( A. ), tome 3 , page 37.

— Par le viorne laurier-thym ( N. ), tome 3 , page 26.

— Par l'hydrocotyle vulgaire ( L. ), tome 3 , page 25.

— Plombique ( espèce V ), tome 3 , page 12.

— Rabique ( espèce XI ), tome 3 , page 38.

— Stannique ( espèce VI ), tome 3 , page 19.

— Stibique ( espèce IV ), tome 3 , page 12.

— Sulfurique ( s-esp. I ), tome 3 , page 7.

— Terre-saline ( espèce III ), tome 3 , page 11.

— Végétale ( espèce X ), tome 3 , page 22.

— Verrique ( espèce IX ), tome 3 , page 21.

**TRACHELOPHYMA** , tome 2 , page 247.

**TRACHÉSITE** ( espèce IV ), tome 3 , page 419.

**TRACHOME** ( variété B ), tome 3 , page 403.

**TRANSPORT** au cerveau , tome 2 , page 345.

**TREMBLEMENT** ( A. ), tome 2 , page 47 ; et ( esp.

I ), tome 2 , page 249.

— Artériel par une joie vive ( C. ), tome 2 , page 310.

— Cafétique ( sorte 8 ), tome 2 , page 330.

— Débilité ( s-esp. I ), tome 2 , page 250.

— Ebriétique ( A. ), tome 2 , page 240.

— Hydrocéphalique , tome 2 , page 240.

— Involontaire ( rap. B ), tome 2 , page 373.

— Métallique ( sorte 3 ), tome 3 , page 17.

— Palpitant ( s-esp. II ), tome 2 , page 250.

— Paralytodé ( s-esp. III ), tome 2 , page 250.

— Pathématique , tome 2 , page 310 ; et ( G. ), tome

2 , page 317.

— Pléthorique ( sorte 16 ), tome 1 , page 226.

- Rhumatismal ( sorte 2 ), tome 1, page 301.
- Saburral ( sorte 5 ), tome 2, page 86.
- Scorbutique, tome 3, page 17.
- Sénile ( s-esp. IV ), tome 2, page 250.
- Tendineux ( rap. C ), tome 2, page 183.
- Traumatique ( sorte 9 ), tome 4, page 81.
- Typhode ( rap. B ), tome 2, page 183.
- Vertigineux ( A. ), tome 2, page 124.
- TRICHAISE ( s-esp. I ), tome 4, page 172.
- TRICHIASIS ( syn. ), tome 4, page 172.
- TRICHOME ( genre LXXVI ), tome 3, page 489.
- Cireux ( rap. A ), tome 3, page 491.
- Cordonné ( espèce I ), tome 3, page 491.
- Ongulé ( s-esp. I ), tome 3, page 491.
- Polonais ( rap. B ), tome 3, page 491.
- Touffu ( espèce II ), tome 3, page 491.
- Villeux ( rap. A ), tome 3, page 491.
- TRICHOSE ( gen. LXXXVIII ), tome 4, page 171.
- Dépilative ( espèce II ), tome 4, page 173.
- Mutable ( espèce I ), tome 4, page 172.
- TRIPLE QUARTE ( rap. E ), tome 2, page 166.
- TRISME ( espèce III ), tome 2, page 355.
- Après l'extraction de deux dents ( rap. C ), tome 2, page 356.
- Arthritique ( sorte 3 ), tome 1, page 301.
- Bridé ( sorte 2 ), tome 4, page 237.
- Cataleptique ( s-esp. III ), tome 2, page 356.
- Catarhal ( sorte 9 ), tome 3, page 415.
- Compliqué avec la catalepsie, tome 2, page 356.
- Cynogélique ( rap. A ), tome 3, page 452.
- Diastrophique ( sorte 4 ), tome 3, page 62.
- Fébrile ( rap. D ), tome 2, page 183.

- Inflammatoire ( sorte 10 ), tome 3, page 393.
- Néophytique ( s-esp. I ), tome 2, page 355.
- Par une plaie au tendon du second orteil, par un clou ( rap. D ), tome 2, page 356.
- Par une plaie d'arme à feu à la main ( rap. E ), tome 2, page 356.
- Sardonique, tome 3, page 33.
- Scorbutique ( sorte 14 ), tome 4, page 39.
- Traumatique ( s-esp. II ), tome 2, page 355 ; ( rap. A ) tome 2, page 356 ; et ( sorte 11 ) tome 4, page 81. — Après l'opération d'un stéatome dans l'aîne ( rap. B ), t. 2, p. 356.
- Vermineux ( sorte 14 ), tome 2, page 99.
- TRISTESSE ( sorte 1 ), tome 2, page 50.
- TRITÉE, tome 2, page 148.
- TRITŒOPHYE, tome 2, page 148.
- Américaine, tome 2, page 156.
- Assode, tome 2, page 153.
- Carotique, tome 2, page 152.
- Causus, tome 2, page 156.
- De Breslaw ( rap. S ), tome 2, page 192.
- Elode, tome 2, page 154.
- Insidieuse, tome 2, page 161.
- Laitieuse ( rap. B ), tome 3, page 459.
- Lipyrique, tome 2, page 150.
- Typhode ( rap. L ), tome 2, page 184.
- TUMEUR au cou psorique ( sorte 18 ), tome 2, page 120.
- Blanche ( sorte 18 ), tome 1, page 292.
- Des paupières ( s-esp. V ), tome 3, page 149.
- Lombriculaire du coude ( A. ), tome 2, page 162.
- Par absorption ( sorte 26 ), tome 2, page 332.

- Testiculiforme ( sorte 17 ), tome 2 , page 114.
- TUMEURS** dysentériques ( sorte 5 ), tome 3 , page 438.
- Par grossesse ( sorte 25 ), tome 3 , page 105.
- Variqueuses aux grandes lèvres ( variété A ), tome 1 , page 239.
- TYLIOME**, tome 3 , page 154.
- TYLOSE** ( variété F ), tome 3 , page 403.
- TYMPANITE**, tome 3 , page 133.
- Abdominale ( s-esp. III ), tome 3 , page 135 ; et ( rap. A ), tome 3 , page 136.
- Ascitique ( sorte 26 ), tome 2 , page 88 ; et ( rap. B ), tome 3 , page 136.
- De SWART ( rap. A ), tome 2 , page 82 ; et ( sor. 31 ), tome 4 , page 83.
- Enterophysode, tome 3 , page 135.
- Gastrique ( s-esp. I ), tome 3 , page 134.
- Intestinale ( s-esp. II ), tome 3 , page 135.
- Spasmodique ( sorte 27 ), tome 2 , page 332.
- Vermineuse ( sorte 36 ), tome 2 , page 101.
- TYPHE** exhaustique ( sorte 14 ), tome 2 , page 47.
- TYPHODE** ( A. ), tome 2 , page 47.
- TYPHOMANIE** ( rap. C ), tome 2 , page 364 ; et tome 3 , page 172.
- Vermineuse ( A. ), tome 2 , page 96.
- TYPHOS** nerveux, tome 2 , page 321.
- TYPHUS**, tome 2 , page 174 et 321.
- *Ægyptiacus*, tome 2 , page 185.
- Ataxique sporadique ( rap. C ), tome 4 , page 48.
- Comateux ( rap. K ), tome 2 , page 184.
- Des camps, tome 2 , page 189.
- Des prisons, tome 2 , page 188.

( 493 )

- TYPHUS d'HIPPOCRATE** [ 1.<sup>re</sup> espèce de ] ( rap. A ) ;  
 tome 3 , page 330.  
 — Exhaustique ( rap. F ) , tome 4 , page 49.  
 — Grave , tome 2 , page 184.  
 — Ictéreux ( rap. A ) , tome 2 , page 195.  
 — Modéré , tome 2 , page 183 ; et ( rap. B ) , tome  
 4 , page 48.  
 — Nerveux ( rap. I ) , tome 2 , page 184 ; et ( rap.  
 A ) , tome 4 , page 48.

## U.

- ULCÉRATION** ( variété A ) , tome 4 , page 94.  
**ULCÈRE** ( s-gen. III ) , tome 4 , page 90.  
 — Calleux ( espèce V ) , tome 4 , page 104.  
 — Cancereux ( rap. B ) , tome 4 , page 113.  
 — Cavé ( espèce IV ) , tome 4 , page 97.  
 — Cutané , tome 3 , page 480.  
 — De l'utérus ( rap. F ) , tome 4 , page 93.  
 — Des extrémités ( rap. I ) , tome 4 , page 93.  
 — D'hôpital ( variété B ) , tome 4 , page 96.  
 — Du rectum ( rap. H ) , tome 4 , page 93.  
 — Erysipélateux ( variété A ) , tome 4 , page 96.  
 — Fistuleux , tome 4 , page 97.  
 — Fongueux ( espèce III ) , tome 4 , page 97.  
 — Gangreneux ( sorte 5 ) , tome 4 , page 61.  
 — Ichoreux ( s-esp. II ) , tome 4 , page 95.  
 — Intestinal ( rap. G ) , tome 4 , page 93.  
 — Purulent simple , tome 4 , page 93.  
 — Sanieux ( s-esp. I ) , tome 4 , page 95.  
 — Scorbutique ( sorte 32 ) , tome 4 , page 41.  
 — Scrophuleux ( sorte 23 ) , tome 1 , page 293.

- Simple ( espèce I ), tome 4, page 93. — Vicié, tome 4, page 94.
- Sordide ( s-esp. III ), tome 4, page 95.
- Syphilitique ( sorte 44 ), tome 3, page 522.
- Vicié ( espèce II ), tome 4, page 94.
- ULCÈRES** chroniques ( sorte 33 ), tome 2, page 49.
- Psoriques ( sorte 22 ), tome 2, page 121.
- Syphilitico-psoriques ( B. ), tome 3, page 522.
- ULORRAGIE** ( espèce III ), tome 1, page 255.
- Scorbutique ( sorte 2 ), tome 4, page 37.
- UNGULOSE** ( s-esp. II ), tome 4, page 175.
- UREDIO**, tome 3, page 361.
- URINE** pituiteuse ( rap. B ), tome 2, page 40, rapporté au rap. E de la page 37.
- UVULITE** ( espèce I ), tome 3, page 416.

## V.

- VACCINE** ( genre LX ), tome 3, page 224.
- Exanthématique ( s-esp. I ), tome 3, page 227.
- Impréservative ( espèce II ), tome 3, page 227.
- Inexanthématique ( s-esp. II ), tome 3, page 227.
- Préservative ( espèce I ), tome 3, page 226.
- VAGUE** ( variété G ), tome 2, page 170.
- VAINE GLOIRE** ( espèce III ), tome 2, page 278.
- VANITÉ** ( espèce II ), tome 2, page 277.
- VAPEURS** mortelles du Vésuve, tome 2, page 128.
- VARICE** ( espèce IV ), tome 1, page 238.
- Agrégée ( sorte 1 ), tome 1, page 224 ; et ( s-esp. II ), tome 1, page 239.
- Anévrismatique ou pulsante ( s-esp. IV ), tome 1, page 240.
- Lymphatique ( sorte 1 ), tome 1, page 304.

- Noueuse ( s-esp. III ), tome 1, page 240.
- Oculaire ( variété A ), tome 1, page 240.
- Solitaire ( s-esp. I ), tome 1, page 238.
- Ulcérique ( s-esp. V ), tome 1, page 240.
- Varicocélique ( variété A ), tome 1, page 239.
- VARICES** des femmes grosses ( sorte 1 ), tome 3, page 103.
- Externes ( §. I ), tome 1, page 238.
- Internes ( §. II ), tome 1, page 240.
- VARICOCÈLE** ( A. ), tome 1, page 239; et tome 3, page 224.
- VARICOMPHALE** ( variété B ), tome 1, page 239.
- VARIOLE** ( genre LIX ), tome 3, page 210.
- Catarrhale ( sorte 21 ), tome 3, page 415.
- Confluente ( espèce II et rap. A ), t. 3, p. 228.
  - A placards ( B. ), tome 2, page 207. — Cohérente ( A. ), tome 2, page 207. — Cristalline ( D. ), tome 2, page 207. — Maligne ( B. ), tome 2, page 207. — Noire ( C. ), tome 2, page 207.
- Discrète ( espèce I ), tome 3, page 217. — Bénigne ( rap. A ), tome 3, page 218. — Miliaire ( G. ), tome 2, page 208. — Siliqueuse ( F. ), tome 2, page 208. — Verruqueuse ( H ), tome 2, page 208. — Vésiculaire ( E. ), tome 2, page 207.
- Inoculée ( variété A ), tome 3, page 218.
- Lymphatique ( variété B ), tome 3, page 223; et ( rap. A ), tome 3, page 224.
- Putride, maligne ( sorte 7 ), tome 2, page 207.
- Régulière discrète de SYDENHAM, t. 3, p. 218.
- Vermineuse ( sorte 3 ), tome 2, page 97.

- VARIOLES** confluentes régulières de **SYDENHAM**,  
tome 3, page 218.
- Hermaphrodites de **FEHRIUS** (rap. C), tome 3,  
page 373.
- VARIOLEUSE**, tome 3, page 211.
- VARUS** (espèce II), tome 3, page 153; et (rap.  
C), tome 3, page 344.
- VENGEANCE** (variété C), tome 2, page 315.
- VÉROLE**, tome 3, page 502.
- VÉROLETTE**, tome 3, page 224.
- VERRUE**, tome 3, page 154.
- Agrégée (espèce II), tome 3, page 155.
- Simple (espèce I), tome 3, page 155.
- VERS**, tome 2, page 89.
- Dans la peau (s-esp. VIII), tome 2, page 126.
- Dans le cerveau (s-esp. I), tome 2, page 124.
- Dans les dents (s-esp. IV), tome 2, page 125.
- Dans les oreilles (s-esp. III), tome 2, page 125.
- Dans les organes urinaires (s-esp. VII), tome 2,  
page 126.
- Dans les poumons (s-esp. V), tome 2, page 125.
- Dans les sinus frontaux (s-esp. II), tome 2,  
page 124.
- Dans l'estomac ou dans les intestins (s-esp. VI),  
tome 2, page 125.
- De la lèpre (A.), tome 2, page 126.
- Des intestins, tome 2, page 89.
- Sortis des pustules de la petite vérole (B.), tome  
2, page 126.
- VERTIGE** (esp. III), tome 2, page 267.
- Accidentel (s-esp. II), tome 2, page 268.
- Ananitique (sorte 13), tome 2, page 47.
- Catarrhal

- Catarrhal ( sorte 5 ), tome 3 , page 474.
- Hypochondriaque ( sorte 4 ), tome 2 , page 337.
- Hystérique ( sorte 6 ), tome 2 , page 342.
- Pléthorique ( sorte 17 ), tome 1 , page 226.
- Psorique ( sorte 8 ), tome 2 , page 119.
- Psychique ( s-esp. I ), tome 2 , page 268.
- Rhumatique ( sorte 7 ), tome 3 , page 393.
- Stomacal ( sorte 7 ), tome 2 , page 86.
- Traumatique ( s-esp. III ), tome 2 , page 268.
- Variqueux ( variété C ), tome 1 , page 241.
- Vénénique ( A. ), tome 2 , page 223.
- Vermineux ( sorte 9 ), tome 2 , page 98.
- VÉSANIE , tome 2 , page 241 ; et ( genre XXIII )  
tome 2 , page 252.
- VÉSANIES , tome 2 , page 344.
- VÉSICULE ( s-esp. IV ), tome 3 , page 344.
- VIDANGES immodérées , tome 1 , page 273.
- VINDICATIF [ le ] , tome 2 , page 315.
- VIOLENT [ le ] , ( variété A ), tome 2 , page 319.
- VITILIGO , tome 3 , page 339.
- *Alba de CELSE* , tome 3 , page 498.
- VIVACITÉ ( s-esp. III ), tome 2 , page 295.
- VOLAGE [ le ] ( s-esp. I ), tome 2 , page 283.
- VOLUPTÉ ( sorte II ), tome 2 , page 57.
- VOLUPTUEUX [ le ] , tome 2 , page 57.
- VOLVULUS , tome 2 , page 415.
- VOMIQUE ( variété A ), tome 4 , page 69.
- VOMISSEMENT ( s-esp. IV ), tome 2 , page 83.
- Atrabilaire ( A. ), tome 3 , page 142 ; et ( sorte  
I ) tome 3 , page 145.
- Bézoardique ( rap. A ), tome 3 , page 116.
- Cardialgique ( rap. B ), tome 3 , page 129.

- Céphalalgique ( A. ), tome 4, page 81.
- Crapuleux ( rap. B ), tome 2, page 84.
- De sang, tome 1, page 261.
- Des femmes grosses ( sorte 10 ), tome 3, page 104.
- Dolorique ( sorte 2 ), tome 2, page 397.
- Emphrastique, tome 3, page 140.
- Fiévreux ( sorte 2 ), tome 2, page 170.
- Gastritique ( sorte 2 ), tome 3, page 427.
- Gastrocélique ( sorte 2 ), tome 4, page 208.
- Hémorragique ( sorte 1 ), tome 1, page 254; et  
tome 2, page 329.
- Hépatique ( sorte 3 ), tome 3, page 142.
- Hypochondriaque ( sorte 2 ), tome 2, page 337; et  
( sorte 3 ) tome 3, page 143.
- Iléosique ( rap. A ), tome 2, page 416.
- Laiteux ( rap. D ), tome 2, page 84.
- Marin ( sorte 6 ), tome 2, page 329.
- Néphritique ( sorte 4 ), tome 3, page 112.
- Œsophagique ( sorte 2 ), tome 3, page 150.
- Pancréatique ( sorte 2 ), tome 3, page 141.
- Par colère ( F. ), tome 2, page 317.
- Par la dentition ( sorte 1 ), tome 2, page 404.
- Pituiteux ( sorte 4 ), tome 2, page 32.
- Pléthorique ( sorte 14 ), tome 1, page 225.
- Pylorique ( sorte 2 ), tome 3, page 140.
- Rabieux ( sorte 3 ), tome 3, page 337.
- Ruminant ( rap. C ), tome 2, page 84.
- Saburral ( rap. A ), tome 2, page 183.
- Stéatomato - gastrique ( rapport A ), tome 4,  
page 72.
- Stéatomique ( -A ), tome 3, page 140.
- VOMISSEMENT sympathique, tome 2, page 329.

( 499 )

[ Sarcome au front dont la ligature excitoit un ]

( s-esp. II ), tome 3, page 149.

— Traumatique ( sorte 7 ), tome 4, page 81.

— Urineux ( sorte 3 ), tome 3, page 72.

— Vénéénique ( sorte 2 ), tome 2, page 10.

— Vermineux ( sorte 5 ), tome 2, page 98.

VRAI CANCER ( rap. B ), tome 4, page 113.

VUE courte, tome 2, page 65.

— Des jeunes-gens, tome 2, page 65.

VULNUS, tome 4, page 74.

## X.

XEROPHTALMIE ( variété A ), tome 3, page 398.

XIRASIA ( syn. ), tome 4, page 173.

XIRASIE ( s-esp. IV ), tome 4, page 173.

## Y.

YAWS des Africains, tome 3, page 502.

— Des Anglais, tome 3, page 513.

## Z.

ZONE IGNÉE d'HOFFMANN, tome 3, page 337.

*FIN de la Table générale.*


---

A NISMES, de l'imprimerie de la veuve BELLE, place  
du château, n.º 32.