

*Bibliothèque numérique*

**medic @**

**Oribase / Bussemaker, Ulco Cats.  
Dissertatio Philologico-Medica  
inauguralis exhibens Librum XLIV  
Collectaneorum Medicinalium  
Oribasii...**

*Groningen : W. van Boekeren, 1835.*

*Cote : 33046*

DISSERTATIO  
PHILOLOGICO-MEDICA  
INAUGURALIS,

EXHIBENS

LIBRUM XLIV  
COLLECTANEORUM MEDICINALIUM  
ORIBASII,

NUPER AB ANGELO MAJO ROMAE GRAECE EDITUM,  
CUM ADJUNCTA VERSIONE LATINA  
ADNOTATIONIBUSQUE,

QUAM,

FAVENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE

RECTORIS MAGNIFICI,

JACOBI HERMANNI PHILIPSE,

Jur. Utr. Doct. in Facult. Juris Prof. Ordin.

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA GRONINGANA

RITE AC LEGITIME CONSEQUENDIS,

PUBLICO OMNIUM EXAMINI OFFERT

ULCO CATS BUSSEMAKER,

AMSTELODANENSIS.

A. D. xx Junii MDCCCXXXV. Hora XII.

GRONINGAE,

Apud W. VAN BOEKEREN.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DISSERTATIO  
PHILOLOGICO-MEDICA  
INAUGURALIS

EXHIBENS

LIBRUM XLIV

COLLECTANEOBUM MEDICINALIUM

ONIBUSQUE

MUTUA AN ALIQUO MODO QUAEQUE VERTUM  
OMNIA LIBERATA VERBISQUE LATINA  
ANNOTATIONIBUSQUE

ἐν ᾧ λόγοις διέξεισιν Ὀριβάσιος ἃ ἀπαγγέλλε-  
ται· καὶ δεύτερα μὲν ἔστι τῷ χρόνῳ, προτερεύει  
δὲ τῇ χρείᾳ, ἅτε μὴ μόνον ὅσα Γαληνὸς ὀρθῶς  
ἔγραψε περιέχουσα, ἀλλὰ καὶ ὅσα αὐτῷ παρῆ-  
ται, ἄλλοις δὲ εἰς διδασκαλίαν προστίθεται.

PHOTIUS *Biblioth. Cod.* 217.

GRONINGAE

Apud W. VAN BOEKELIUM

**MATRI OPTIMAE CARISSIMAE**

**SACRUM.**

MATRI OPTIMAE CARISSIMAE

SACRUM.

## PRAEFATIO.

*Jamdiu cogitaveram atque perpenderam, quidnam eligerem, de quo conscripta dissertatione studiis meis Academicis finem imponerem. Multa certo adhuc supererant in scientia medica adeo late patenti, quae vel sedula perscrutatione vel ulteriori accuratiorique elaboratione indigebant, atque hoc modo mihi materiam praebere poterant, de qua dissererem, verum non omnia pertractari possunt a juvene, qui ante tres quatuorve demum annos medicinae studere coepit, neque omnia omnibus aequae placent omnesve iisdem aequae semper delectantur. Sic mihi semper maxime arridebant omnia, quae veterem Graecorum spectabant medicinam, quare cum praeceptore meo viro Cl. SEBASTIANO COMMINUCATA, ille mihi nuntius fuit, Romae ab ANGELO MAJO Graece editos esse nonnullos Orbasii Libros, antea plane incognitos, quos vertere et explicare mihi proposuit eaque versione uti tamquam specimine inaugurali, quod conscribere me jubebat lex. Primum laboris difficultas mihi horrorem fere incussit, sed tandem Cl. praeceptoris consiliis et adhortationibus*

eo perductus sum, ut opus aggredi auderem, quo semel inchoato adeo delectatus sum, ut illud non absolvere non possem, licet saepe in illo pertractando animadverterem, quanta mihi deessent; ne itaque obliviscaris, B. L., quicumque huncce libellum pervolveris, illum non a viro linguae Graecae peritissimo esse conscriptum, verum a juvene, qui inter gravissima medicinae studia paucas solummodo horas linguae Graecae studio quantumvis a se dilecto impendere potuit.

Inter libros Oribasii autem ab ANGELO MAJO editos duos priores vel XLIV et XLV Collect. Medic. elegi ob rationes infra in prolegomenis explicandas; cum tamen animadverterem, hos libros, si saltem omnia, quae iis continentur, rite explicarentur, adeo multa requirere, ut eorum editio vulgares dissertationis inauguralis limites longe excederet impediretque, quominus ante hujus anni ferias aestivas lauream doctoralem petere possem, unicum solummodo Lib. XLIV cum versione et adnotationibus adjunctis nunc edere decrevi, alterius vero Libri editionem aliquantulum distuli; simulac tamen vacabit, mox etiam illum edere mihi proposui, additis fortasse et fragmentis librorum Oribasii ab ANGELO MAJO editis.

Restat adhuc mihi, ut de ordine loquar, quem in edendo hocce Oribasii libro secutus sum, de ordine illo valde simplici, quo con-

*textum Graecum integrum ex ANGELI MAJI Auctorum Classicorum e Vaticanis codicibus editorum Tom. IV transtuli in dissertationem meam, apposita versione nihilque in eo mutavi, cujus non in adnotationibus mentionem feci, exceptis tamen nonnullis accentibus, quos male collocatos esse vitio typographi non erat dubium. Ubi vero translatio accentus ab alia litera ad aliam significationem verborum aliquo modo immutabat, hanc translationem etiam in adnotationibus memoravi. Adnotationes autem ad calcem contextus reposui, ne illi, quibus pleraeque res in adnotationibus legendae jam satis sunt cognitae, vel qui illas omnino omittere malunt, in legendo contextu perturbarentur. Tandem monendum est, me saepius brevitatis causa nomine Hippocratis vel Galeni citasse etiam illos libros, qui in plerisque horum auctorum editionibus leguntur, licet a permultis criticis jure merito spurii habeantur.*

*Priusquam tamen hancce Academiam relinquam, non possum, quin vobis omnibus, viri Cl., quos cum in Athenaeo Daventriensi, tum in hacce alma Musarum sede, praeceptores habui, gratias agam publicas pro omnibus egregiis scientiarum praeceptis, quae mihi tradidistis, nec non pro urbana et miti agendi ratione, qua semper erga me usi estis.*

*Inprimis vobis, viri Cl. S. E. STRATINGH et J. BAART DE LA FAILLE, plura debeo, quam verbis*



enuntiare possum; vos enim me docuistis gravissimam illam artem, quae versatur circa hominum vitam atque sanitatem; vestra etiam institutione nisus hanc artem exercere non refugiam; quidcunque igitur in illa praestitero, id vobis semper me acceptum relaturum esse credatis; liceat itaque mihi hic mea quoque vota effundere pro vestra vestrorumque salute et incolumitate!

Ante omnia vero tua erga me merita, vir Cl. A. A. SEBASTIAN, innumera sunt, nam tu mihi studiorum dux exististi, mihi hanc dissertationem conscribere suasisti nec umquam in illa elaboranda opem ferre negasti; quominus tibi itaque tantas gratias referam, quantas tibi debere me sentio, vitae impedibit brevitatis; si tamen preces meae exaudiantur, diutissime in hujus Academiae ornamentum, scientiarum et doctrinarum decus atque universam hominum salutem incolumem te servabit D. O. M.

Neque tu, doct. WIJNNE, inter fautores meos infimum occupas locum; cum mihi occasionem prae buisti, qua saepissime praeceptorum dicta ad aegrotorum lectulos comprobata vidi et pro qua tibi gratum animum obtestor, quem imo pectore semper me servaturum esse hic profiteor.

Te quoque, Doct. F. G. NOURY, hic memorare dulce me jubet officium, qui mihi anatomicas principia tradidisti, quibus omnia superstruxi, qualiacunque de medicina perspecta

habui quique amica et benevola ratione mihi  
viam saepius ostendisti, qua tutius scopum  
attingere possem; haec beneficia semper me re-  
cordaturum esse, neque res meas mihi tuis  
magis cordi esse credas precor.

Vobis tandem etiam valedicendum est, com-  
militones amicissimi, res sane moeroris plenis-  
sima; per nonnullos annos amicitiae vinculis  
conjuncti dulcem agebamus vitam et curarum  
expertem tempusque fulguris celeritatem adeptum  
esse videbatur; mox vero rerum vicissitudinibus  
diremti sollicitam aggrediemur vitam aegritudinum  
plenam, ad quas perferendas certo multam opem  
feret recordatio amicitiae, quae nos conjungit  
quamque nullum nostrum umquam obliturum esse  
vix est quod dubitem. Valetate igitur resque  
omnes vobis prospere succedant.

## PROLEGOMENA.

**J**am per multa saecula viguit mos, et adhuc a plerisque huic rei operam dantibus religiose observatur, quo scriptis cujuscunque auctoris, post ejus mortem in lucem si prodirent, praemittebatur brevior vel longior ejus vitae enarratio, consilio profecto non improbando, si consideremus, quantum quivis homo debeat patriae, aetati, qua vixerit, educationi, parentibus, amicis non solum, verum et rebus secundis aut adversis, quae durante ejus vita vel patriae vel illi ipsi acciderint, quantumque haec omnia saepe conferant ad omnes ejus animi dotes formandas vel commutandas. Sic enim nonnunquam, siquid nimis acriter vel nimis leviter vel alio saltem modo ac a ceteris auctoribus pertractetur, causam invenire possumus, quare ita neque aliter scripserit. Quae cum accurate perpenderem, lectoribus haud inutilem nec ingratum me fore putavi, si, antequam ad ipsum meum propositum transeam, pauca de Oribasii vita et scriptis referrem, ut, hisce perlectis, cum majori fructu et oblectamento legerentur omnia, quae hocce Oribasii libello continentur, inter quae, me saltem judice, haud pauca invenientur lectu dignissima.

Oribasius natus est Pergami (1) in prima saeculi quarti parte ex parentibus nobilibus, qui eum liberaliter educari curarunt juvenemque illum dimiserunt in scholas magni Zenonis, quas simul frequentavit cum Magno. His vero relictis, medicinam exercuisse videtur in patria sua et, ut ait Eunapius, quantum licet homini Deum imitari patrium Deum Aesculapium imitatus est. Postea cum a Juliano ad aulam imperatoris ductus esset, tantum ibi auctoritatem nactus est, ut post mortem principis patrono suo multam opem ferret in imperio capessendo. Ab illo inde tempore arcissimo amicitiae vinculo inter se conjuncti fuere hi duo viri et Julianus Oribasium honoribus muneribusque adeo cumulavit, ut amico etiam munus quaestoris Constantinopolitani offerret mitteretque illum Delphos ad oraculum sciscitandum, ubi illi celebre illud responsum datum est, oraculum jam deficere et nullum amplius esse (2). Juliano tamen vita defuncto ejus successores sive invidia sive nimio falsoque ad defendendam religionem Christianam ardore permoti, omnibus muneribus et opibus Oribasium privarunt eumque ex imperio Romano ejecerunt inter barbaros, verum illic quoque mox ob medicinae peritiam tantam sibi conciliavit laudem, ut instar Dei coleatur, alios ex morbis diuturnis servans, alios a

(1) Eunapius vitae sophist. ed. Boissonnadii et Wyttenbachii pag. 99—102. Suidas tamen (Tom. II. pag. 711.) refert, illum Sardibus natum fuisse, sed huic auctori eandem fidem habere non possumus ac Eunapio, Oribasii aequali.

(2) Georg. Cedrenus Chronic. pag. 304 (ed. Fabrit. fol. Paris. 1647).

mortis porta subripiens. Tandem ab imperatore revocatus uxorem duxit cum stirpe sua tum divitiis spectabilem bonaque ei ex aerario publico restituta sunt. Ex inde semper opibus et auctoritate viguisse videtur saltem usque ad initium saeculi quinti, quando Eunapius haec de illo conscripsit simulque testatus est, illum tunc adhuc cum quatuor suis filiis superstitem fuisse (1).

Durante hoc longo et satis fausto vitae decursu multos libros conscripsit, quorum maxima pars tamen adhuc desideratur.

1°. A Photio (2) laudantur Libri IV *περι πραγματείας Ιατρικής*, et Lib. VII ad eandem normam editi Julianoque imperatori dedicati, quibus libris imprimis Galeni scripta breviori sermone contrahere conatus est (3). Hos libros autem, e quibus nihil nobis superest, citare videtur ipse Oribasius in Praefatione ad LXX Libros.

2°. Jussu Juliani ex omnibus medicis antiquioribus quae sibi maxime mentione digna videbantur collegit et inde LXX libros (4) contexuit sub nomine *συναγωγών Ιατρικών*. Ex his libris primum Graece in lucem prodierunt Lib. I et Lib. V capita priora sex simul cum Lib. I ad Eunapium cap. 14 de aquis et Galeni, Rufi, Dioclis et Athenaei medicorum fragmentis de eodem argumento cum interpre-

(1) Eunapius l. l. pag. 101.

(2) Biblioth. Cod. 216.

(3) Photius l. l.

(4) Photius l. l. cod. 217. Suidas tamen (l. l.) illum LXXII Libros conscripsisse testatur.

tatione Latina cur. Augustino Riccio Romae 1543 4<sup>o</sup>; dein Joh. Bapt. Rasarius Latine edidit Lib. I—XV et XXIV—XXV cum praefatione Oribasii ad Julianum imperatorem Basil. 1557. 8<sup>o</sup>. Teste Fabritio in Bibliothecae Bigotianae Catalogo Tom. II. pag. 147 etiam memorantur Oribasii Collectaneorum medicinalium quaedam Graece edita Paris. 1556. 8<sup>o</sup>. et Antonius Verderus narrat se Gallicam vidisse versionem scriptorum Oribasii auctore Adamo de la Vallée in Bibliotheca Gallica (1). Praeterea Guil. Dundass seorsum edidit Oribasii Anatomica sive Libr. XXIV et XXV. Lugd. Bat. 1735. 4<sup>o</sup>. et in hujus opusculi praefatione testatur se adhibuisse editionem Graecam scriptorum Oribasii cur. Morelio (2), v<sup>o</sup> forsan eandem, quae memoratur in Bibliothecae Bigotianae Catalogo (Vide Supra). Graece etiam nuper prodierunt XV priores *συναγωγῶν ἰατρικῶν* Libri cur. Friderico Matthaeo publico in urbe regia Moscu professoro (3). Praeter hos libros Latine prodierunt Libri XLVIII sive de laqueis capita priora duodeviginti et Lib. XLIX sive de machinamentis e versione Vidi Vidii in Collectione scriptorum Chirurgorum Tigurina Gesneri 1555 fol. quamvis in hac editione non inveniri videatur numerus Librorum (4). Hos libros autem omnes edidit quoque

(1) Fabritius Biblioth. Graeca Tom. XII. pag. 641.

(2) Oribasii Anatomica ex Lib. Galeni cum vers. Latina J. B. Rasarii cur. G. Dundass. Praef. pag. 3.

(3) Classicorum auctorum e vaticanis codicibus editorum cur. Angelo Majo Tom. IV. Romae 1831. 8<sup>o</sup>. Praef. pag. 6.

(4) Fabritius l. l.

Henr. Stephanus inter medicae artis principes post Hippocratem et Galenum Paris 1567. fol. Insuper vero in Collectione veterum Chirurgorum Nicetae ab Antonio Cocchio octoginta fere abhinc annis edita adhuc inveniuntur Lib. XLVI et XLVII sive de fracturis et de articulis excidentibus (1). Nuper tandem Angelus Majus Graece edidit Lib. XLIV, XLV, XLVIII, XLIX, partem priorem Libri L cum titulis capitum, quae adhuc desiderantur, et duo fragmenta, alterum ex Libro LI, alterum ex incerto collectaneorum Libro in Classicorum auctorum e codicibus vaticanis editorum Tom. IV. Romae 1831, 8°. pag. 1—198 et 276—278; ex his autem Lib. XLIV et XLV sive de abscessibus et de variis tumoribus vertere et quantum possem explicare decrevi; tempus tamen mihi defuit ad alterum in lucem edendum; Libr. XLVIII et XLIX omisi, quia pro maxima parte jam Latina edita erant et argumentum mihi minus jucundum utileque videbatur, Lib. L de morbis genitalium vero quoque omisi, quoniam nimis erat mutilum, licet argumentum mihi ceteroquin satis placeret.

3°. Ex magno illius opere, quod modo memoravi, compendium excerpit in gratiam filii Eustathii Oribasius, ita ut inde orti sint Lib. IX. nomine Synopseos cogniti (2), qui Latine prodierunt ex eadem versione Rasarii simul cum ceteris Oribasii libris, uti et inter medicae artis principes H. Stephani.

(1) Angelus Majus l. l. pag. 7.

(2) Photius l. l. cod. 218.

4°. Tandem scripsit Oribasius Euporiston sive de medicamentis facile parabilibus Lib. IV. ad Eunapium (1) (verisimiliter eundem, qui ejus vitam conscripsit), qui Latine prodierunt ex versione anonymi simul cum Caelii Aureliani Libris tardarum passionum cur. J. Sichardo. Basil. 1529. fol. (2) et cum ceteris Oribasii libris ex interpretatione Rasarii, uti et inter artis medicae principes Henr. Stephani. Hos libros tamen Cl. Sprengel spurios existimat, quamvis rationem non addat (3).

5°. Scholia in Aphorismos Hippocratis, quae Oribasio tribuuntur, a plerisque viris doctis spuria habentur (4). Prodiere autem cur. J. Guintero Andernaco Basil. 1535. 8°. recusa Paris. ac Venet. 1553 et Patav. 1658. 8°. (5).

Praeter haec omnia Oribasii fragmentum de victus ratione per quodlibet anni tempus utili verisimiliter, ut mihi saltem videtur, ex aliquo supra laudatorum operum depromptum, cum Plinio Valeriano vulgavit Albanus Torinus Basileae 1528. fol. Incipit: Optimum etiam fuerit per singula anni tempora victus rationem observare (6). Hujus fragmenti autem eandem editionem quoque in Bibliotheca Academica Ulro-Trajectina prostare testatur Doctiss. C.

(1) Photius l. l. cod. 219.

(2) Fabritius l. l.

(3) Versuch einer pragmat. Geschichte der Medizin, Tom. II. pag. 261.

(4) Sprengel l. l. et Fabritius l. l. pag. 646.

(5) Fabritius l. l.

(6) Fabritius l. l. pag. 646.



J. van Cooth (1) additque illud circa veneris usum praecepta habere notatu dignissima. Oribasius de simplicibus, haud dubie etiam ex Collect. Medic. petitus, cum Octavii Horatiani Euporiston Lib. IV Physica Hildegardis de Pinguia sive Libri IV de elementorum, fluminum aliquot Germaniae, metallorum, leguminum, fructuum et herbarum, piscium denique, volatilium et animantium terrae naturis et operationibus, Theodori Physici Diætæta et Aesculapii de morborum causis, descriptione et cura prodierunt Argentor. 1533 et 1544 fol. (2).

Ex Oribasii scriptis tandem prostant excerpta de aquis et balneis Augustino Gadaldino Mutinensi interprete in opere Veneto de balneis 1553 fol. (3).

Variae fuerunt ab omni tempore de Oribasio ejusque scriptis auctorum sententiae; alii enim, uti Eunapius (4), illum laudibus extollant emulantque; alii putant, qui ei quoque esse imputandum crimen (5), ejus non insonites fuisse videntur omnes philosophi in aula Juliani degentes (6), illos nempe hunc imperatorem ceteroquin jam satis in superstitionem proclivem etiam superstitiosiore reddidisse, ita ut inanibus ritibus et caerimoniis totus se traderet; alii, uti Clericus ex illo et Aëtio hausta esse

(1) Diatribe in Diæticam veterum, Trajecti ad Rhenum 1835. pag. 64 adnot. (2).

(2) Fabritius l. l. pag. 647.

(3) Fabritius l. l.

(4) Eunapius l. l. passim.

(5) Sprengel l. l. pag. 240 et 256.

(6) Eunapius vita Maximi pag. 51—53. Libanius Epitaph. pag. 289, 291 et 318 (Tom. II. ed. Morellii. Paris. 1628. fol).

putant omnia, quae in praxi ac theoria mentione sunt digna ac praesertim in re Anatomica et Chirurgica (1); alii vero eum vocant simiam Galeni (2), quod nomen certo non meruit, nam licet Lib. XXIV et XXV Collect. Medic. fere integri ex Galeno sint desumpti et ipse Oribasius Galenum semper tamquam omnium medicorum principem citet et nonnisi summa cum reverentia de illo loquatur (3), multa quoque ex Heliodoro, Posidonio, Antyllo, Dieuche, Apollonio, Philumeno, Rufo Ephesio, Megete aliisque depromsit haud contemnenda ac nonnumquam etiam paucas observationes ipse adiecit, alii tandem illum Galeno aequiparant vel etiam praeferre videntur (4): hinc ego lubenter assentiar Freindio dicenti (5): « Ita scriptor ille, quamquam « collectoris praecipue nomen mereatur, observatio-  
« nes aliquas nobis in medicina suppeditat recentes  
« nec inutiles; quique hoc proposito ejus opera per-  
« voverit, is similia nonnulla apud antiquiores frus-  
« tra quaerenda inveniet. » quam rem inprimis libros nuper ab Angelo Majo editos probaturos esse puto.

---

(1) J. Freind *Historia medicinae a Galeni tempera usque ad initium saec. XVI. pars I. pag. 8.*

(2) J. Freind *l. l.*

(3) Conf. Praefatio Libr. IV ad Eunapium.

(4) Photius *l. l. Cod. 217.*

(5) Freind *l. l. pag. 17.*

ulant omnia, quae in Graeci ac theoriae mentione  
 hinc digne ac perspicue in re Anatomica et Chi-  
 rugica (1); alii vero eam vocant sinualem (2),  
 quod nomen certe non meriti, nam licet Lib.  
 XLIV et XXV Collat. Medic. tunc inter, ex Ga-  
 leno sint desumpti et ipse Ordinaris Galeni semper  
 aliquam omnium medicamentorum primam esse et  
 nominis auctoritas cum testatur de Hippocrate (3),  
 nulla quae ex Hippoc. Phlegm. Anglio,  
 Sierche, Apollonio, Trifoniano, Hato Episcopo,  
 Hegate affertur debeat, hanc conuenientia ad  
 conuenientiam etiam patet observatione ipse ad-  
 dit, nisi tandem libris Galeni recipiantur vel etiam  
 praeterea videatur (4); tunc ergo solentur  
 Fracisio dicunt (5): « Ita recipitur ille, quoniam  
 « collectoris praecipuum nomen tenetur, observatio-  
 « nes aliquid nobis in medicina suppeditat recentis  
 « nec inutilis; quibus hoc proposito eius opera par-  
 « uolent, in similia nonnulla quae antipathositas  
 « tra praeterea inuenietur, quam rem sapientis li-  
 « bis super ab Angelo Majo citos probatur esse  
 dato.

(1) J. Fracisio Historiae medicinae a Galeni scriptis usque  
 ad initium saec. XVI. pars I. pag. 8.  
 (2) J. Fracisio l. I.  
 (3) Collat. Praeterea lib. IV ad Rhasarum.  
 (4) Phlegm. l. I. Cap. 217.  
 (5) Fracisio l. I. pag. 17.

ORIBASII

EXTRACTUM

DE

I. DE ...

EX

ORIBASII

COLLECTANEORUM MEDICINALIUM

LIBRO LXIV.

Faint, mostly illegible text in a classical script, likely Greek or Latin, surrounding the main title.

# ὍΡΙΒΑΣΙΟΥ

## ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΩΓΩΝ

Ἐκ τοῦ βιβλίου ΜΔ.

I. Ἐκ τῶν Ἀντίλλου καὶ Ἡλιοδώρου χειρουργία ἀποστημάτων (1).

- p. 15. I. **ΕΙ** μὲν κατὰ τὴν κεφαλὴν γένοιτο ἐπιπολλῆς ἀπόστημα, ἀπλοτομήσομεν τάττοντες τὴν διαίρεσιν, οὐ κατὰ τὴν εὐθύτητα τῶν τριχῶν, ἀλλ' ἐπικάρσιον καὶ ὑποβεβλημένην τῇ τριχώσει· ὅπως ἢ οὐλὴ μετὰ ταῦτα κρύπτοιο ὑπὸ τῆς τῶν τριχῶν ἐπιπτώσεως· εἰ δὲ βύθιον κατὰ τὸν περικράνιον ὑμένα τὸ ὑγρὸν ὑποπίπτει, ὥστ' ἢ διαφθαρῆναι μέρος τι αὐτοῦ, ἢ διαγανακτῆσαι καὶ συμπαθῆσαι, τῆς μὲν εὐμορφίας ἤττονα ποιησόμεθα λόγον, τοῦ δὲ ἀσφαλοῦς προνοούμενοι, δύο διαιρέσεις ἐμβαλοῦμεν συμμετρους, ὡς πρὸς τὸ ἀπόστημα, τὴν μὲν εὐθυτενῆ, τὴν δὲ ἐπικαρσίαν, τεμνούσας κατὰ μεσότητά ἀλλήλας· ὡς τὸ σχῆμα αὐτῶν παραπλήσιον εἶναι τῷ χι γράμματι· οὕτω γὰρ ὁ περικράνιος οὐ διαγανακτῆσει πανταχόσε διαιρούμενος· εἰ δὲ κατὰ μέτωπον ἀπόστημα γένοιτο, ἐπικαρσίως διαιροῦμεν μιμούμενοι τὰς φυσικὰς ἐν τῷ μετώπῳ γραμμὰς· εἰ δὲ κατὰ ρίνα, τὴν τομὴν εὐθυτενῆ τάξομεν, κατὰ τὸ μῆκος τῆς ρίνος· εἰ δὲ κατὰ

(1) Ἀπὸ τοῦ α τῶν Ἀντίλλου χειρουργουμένων κεφάλαιον τοῦ ὁμοίου.

EX  
ORIBASHI

COLLECTANEORUM MEDICINARUM  
LIBRUS XLIV

EX ANTYLLI ET HELIOPOLI CHIRURGIA  
ABSCISSUM



I. **S**i autem in capite superficialis adest abscessus, secabimus incisuram facientes, non secundum longitudinem capillorum, sed transversam subjectam capillitio; ut integra dein late scat capillis in illam cadentibus; si autem profunde sub membrana pericranio humor occurrit, ita ut pars ejus vel corrupta sit vel male affecta vel aliquid simul passa sit, pulchritudinis quidem minorem rationem habebimus, sed saluti prospicientes, duas incisuras injiciemus aequales, alteram quod ad abscessum attinet, rectam, alteram vero transversam, se invicem in medio decussantes, ita ut figura earum similis sit literae X; sic enim pericranium facile feret se ab omni parte dissecari; si autem in fronte abscessus adest, transverse secabimus imitantes naturalia in fronte lineamenta; si autem in naso, plagam recte dirigemus secundum longitudinem nasi; si vero in genis, sub ipsis quidem oculis, lunata incisura utemur, plagae convexitatem deorsum vertentes, ut ad naturalem palpebrarum curvaturam effor-

(1) A. M. pag. 1. Cod. pag. 15.

μῆλα, εἰ μὲν ὑπ' αὐτοῖς τοῖς ὀφθαλμοῖς, μνηοειδεῖ  
 διαιρέσει χρυσόμεθα, τὸ κύρτωμα τῆς διαιρέσεως  
 κάτω στρέφοντες, ἵνα ταῖς φυσικαῖς τῶν ἐποποι-  
 ῶν περιφερείαις σχηματισθῇ· εἰ δὲ κατωτέρω, κα-  
 τὰ τὰ λεπτὰ καλούμενα τῆς γνάθου, εὐθυτενῆ  
 τομῆν διελοῦμεν· ἐπεὶ καὶ ἡ ῥυσότης ἢ κατὰ φύσιν  
 τῶν παρεῖων κατ' εὐθύτητα ἔστιν· ὅπισθεν δὲ τοῦ  
 ὠτὸς ὑγροῦ γενομένου, μνηοειδῶς περιγράψομεν,  
 μιμούμενοι τὴν βάσιν τοῦ ὠτός· τραχήλου δ' ἐπὶ  
 ἀποστήματος τεμνομένη, ἐπὶ μὲν τῶν ὅπισθεν  
 εὐθυτενῆ· διαίρεσις ἀρμόδιος, ἐπὶ δὲ τῶν ἔμ-  
 προσθεν, ἐπεὶ λιπαρὸν τὸ δέρμα διὰ τὰς ἐπικύ-  
 ψεις καὶ πολλὴν ἐπίδοσιν ἔχει, περιελοῦμεν· ἐκ  
 γὰρ τῆς εὐθυτομίας οὐ πάνυ τὶ προσπίπτει τὰ  
 σώματα, οἷα δὲ τοῦ δέρματος ἐγγαλωμένου καὶ  
 ἀφισταμένου τῶν συνεχῶν σωμάτων.

p. 16. 2. Ταῦτα δὲ ποιούμεν | καὶ ἐπὶ μασχάλῃ καὶ  
 βουβῶνος καὶ δακτυλίου, διὰ τὴν ὁμοειδεῖαν τοῦ  
 δέρματος πρὸς τὸ τοῦ τραχήλου δέρμα· ἐπὶ δὲ  
 μαστῶν (1), παχέων μὲν ὄντων τῶν ἐπικειμένων  
 τῷ πύφῳ σωμάτων, ἀπλοτομία γιγνέσθω· λεπτῶν  
 δὲ καὶ ἀνεπιτιθεῖων πρὸς κίλλησιν, ἐκτεμνέσθω·  
 τὰ μὲν οὖν ἄλλα μέρη τοῦ τιτθοῦ ἀδεῶς περιαι-  
 ρείσθω· ὃ δὲ πλησίον τῆς θηλῆς τόπος, πεφρον-  
 τισμένως μνηοειδεῖ περιαιρέσει συντηρουμένης τῆς  
 θηλῆς· ἐν δὲ τοῖς βραχίοσι καὶ τοῖς ἀγκῶσιν, ἐν  
 τε ταῖς χερσὶ καὶ δακτύλοις καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν  
 βουβῶνων κατωτέρω πᾶσιν, εὐθείας κατὰ μῆκος

(1) Ἀπὸ τοῦ γ τῶν Ἡλιοδώρου χειρουργουμένων· κενά-  
 λιον περὶ φλεγμονῆς καὶ τοπικῶν ἀποσκημάτων. Α (1)

metur. Si vero magis inferiora versus in parte malae tenui dicta, rectam incisuram ducemus; quoniam et rugae naturales genarum rectae sunt; pone aurem humor cum adsit, lunata plaga illam circumdabimus, imitantes basin auris; in collo vero si abscessus secatur, in parte posteriori quidem incisura recta convenit, in anteriori vero, cum pinguis sit cutis ob plicas et facillime cedat, extirpabimus; si enim recte secemus, nullo modo occurrunt corpora, quippe quum relaxatur cutis et recedit a proximis partibus.

2. Eadem facimus et in axilla et in inguine et in ano, quia cutis structura convenit cum ea cutis colli; in mammis autem, crassae cum sint partes puri impositae, simplex fiat plaga; si vero tenues neque conglutinationi aptae, excidantur; ceterae quidem partes mammae tute extirpantur; proximus vero papillae locus prudenter lunata incisura servata papilla; in brachiis autem et cubitu manibusque atque digitis omnibusque sub inguinibus positis, rectas secundum longitudinem plagas facimus; si autem sub scapula infra clavículas abscessus oritur, obliqua figura incisurarum adhibenda est ad normam eminentiae ossium harum partium; si vero in spina, recte secabimus, sicut musculi decurrunt; si autem in clunibus, in rotundis quidem et posterioribus partibus, rectis incisuris utimur; in partibus vero femo-



διαίρεσεις ἐγχαράσσομεν· εἰ δὲ κατ' ὠμοπλάτην ὑπὸ κλείς ἀπόστημα συμβαίη, λοξὸν τὸ εἶδος τῶν τομῶν παραληπτέον κατὰ μίμησιν τῆς ἐξοχῆς τῶν ὀστέων τούτων· εἰ δὲ κατὰ βράχιν, εὐθυτενῶς διαίροῦμεν, ὥσπερ οἱ μῦες ἐπιπεφύκασιν· ἐπὶ δὲ πυγῶν, κατὰ μὲν τὰ περιφερῆ καὶ ὀπίσω μέρη, διαίροῦμεν εὐθείαις τομαῖς· κατὰ δὲ τὰ ὑπεσταλμένα καὶ συνεγγίζοντα τοῖς μηροῖς, περιελοῦμεν· συριγγοῦται γὰρ βραδίως, εἰ μὴ περιαιροῖτο ἐκ πλάτους· ὁμοίως δὲ εἰ καὶ περὶ τὸν σφικτήρα ὕγρον γένοιτο τὸ εἶδος τῆς διαίρεσεως ἐπικάρσιον ἐπιτηδεύσθω· ταύτη γὰρ αἰ στολίδες πεφύκασιν.

3. Δεῖ δὲ (1) ἐν τῷ καιρῷ τῆς κατουλώσεως κασσιτέρινον σωλῆνα κυκλοτερῆ ἐντιθέναι, ἔξωθεν μὲν, ἄχανῃ· εἰς δὲ τὸ βάθος, περιφερῆ τμήμα μέσον ἔχοντα πρὸς τὰς τῶν πνευμάτων ἀποδόσεις· μέχρι τέλους δὲ τῆς θεραπείας ἐγκείσθω ὁ σωλῆν πρὸς τὴν ἐν διαστολῇ κατούλωσιν· ἐπὶ δὲ πλευρῶν καὶ στέρνων τὸ εἶδος τῆς διαίρεσεως ἐπικάρσιον ἐπιτηδεύε· ταύτη γὰρ καὶ αἰ πλευραὶ πεφύκασιν· ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπιγαστρίου, διὰ τὸ τὰς φυσικὰς στολίδας αὐτοῦ πάσας ἐπικαρσίους εἶναι· ἐπὶ δὲ ὀστέου καὶ καυλοῦ, τομαῖς εὐθυτενέσι χρηστέον· καὶ τὸ σύνολον, εἰδέναι χρὴ ὅτι τὰ σχήματα τῶν διαίρεσεων διδασκόμεθα ἐκ τῆς ἐπι-

p. 17. βλέψω τῆς πρόσθεν πρὸς τὸ ἀσφαλές καὶ τὸ εὐμορφον· γραμμὰς μὲν γὰρ φυσικὰς ἀπομιμούμενοι διὰ τῆς τομῆς, ἐπὶ τὸ εὐμορφον ποιούμεθα

(1) Ἀπὸ τοῦ δὲ τῶν Ἡλιοδώρου χειρονοημένων· κεφάλαιον περὶ τῶν ἐν τῇ ἔδρᾳ ἐπαγάδων καὶ κοινωμάτων.

ribus subjectis iisque proximis, extirpabimus; facile enim fistulae oriuntur, nisi late extirpetur; eodem modo autem si et circa sphincterem humor adest, directio incisurae transversa paretur; hac ratione enim plicae decurrunt.

3. Oportet autem tempore cicatricis formationis, stanneum tubum circularem immittere, a parte externa quidem, clausum, ab interna vero, rotundum foramen habentem in medio ad flatus evacuandos; usque ad finem curae loco maneat tubus, ut cicatrix inducatur sine contractione; in costis et sterno figura incisurae transversa convenit; eadem enim directione costae decurrunt; eodem modo et in epigastrio, quod naturales ejus plicae omnes sunt transversae; in scroto autem et in pene incisuris rectis utendum; et in universum scire oportet figuras plagarum nos discere ex praegressa consideratione salutis et decoris; lineamenta enim naturalia incisione imitantes, decoris rationem habemus; recte autem secantes, uti in artubus et tendinibus, saluti prospicimus, ne quid nervorum vel vasorum propter transversam incisionem dissecare cogamur; oportet nem-

τὴν ἀναφορὰν εὐθυτενῶς δὲ τέμνοντες, ὅσον ἐπὶ τῶν κώλων καὶ τῶν τευόντων, τῆς ἀσφαλείας προνοούμεθα, ἵνα μὴ τῶν νεύρων καὶ τῶν ἀγγείων ἐκ τῆς ἐπικαρσίας διαιρέσεως ἀναγκασθῶμεν διελεῖν τί χρῆ μέντοι γινώσκειν ὡς οὐκ ἐπίσης ὀφειλόντων ἀποβλέπειν ἡμῶν πρὸς τε τὸ ἀσφαλές καὶ τὸ εὐπρεπές· πανταχοῦ γὰρ προσεχέστερον τὸ τῆς ἀσφαλείας τίθημι.

4. Πάλιν ἐπὶ μὲν τῶν μικρῶν ἀποστημάτων, μιᾷ διαιρέσει χρῆσόμεθα, καθὼς λεπτότατα αὐτὰ ἑαυτῶν εὐρίσκεται τὰ σώματα· ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων, πλείοσι διαιρέσεσι χρῶμεθα· τέμνοντες γὰρ ἢ λεπτότατον τὸ δέριμα, καὶ τὸ ὑγρὸν ἐκκρίνοντες, καθίεμεν τὸν λιχανὸν δάκτυλον τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς διὰ τῆς διαιρέσεως εἰς τὸν κόλπον· ἔπειτα πανταχῇ περιάγοντες αὐτὸν, τὸ μέγεθος τοῦ κόλπου κατανοοῦμεν· εἰ μὲν οὖν ἐφ' ἓν τι μέρος ὀδηγεῖτο ὁ δάκτυλος, τῶν περίξ ἀπαθῶν ὄντων, καθ' ὅποτρα ὑγιᾶς ἢ τοῦ κόλπου, κατὰ ταῦτα κυρτώσαντες αὐτὸν καὶ περιτείναντες τὴν σάρκα, δευτέραν ἐμβαλοῦμεν διαίρεσιν, τὸ αὐτὸ σχῆμα ἔχουσαν τῇ προτέρᾳ· εἰ δὲ ὁ κόλπος ὁ περιέχων τὸ ὑγρὸν εὐθυτενῆς μὲν εἴη, τύχη δὲ πολὺ ἐπιμηκέστερος τοῦ δακτύλου, μετὰ τὴν δευτέραν διαίρεσιν κομισάμενοι τὸν δάκτυλον, πάλιν διὰ τῆς δευτέρας αὐτὸν καθήσομεν καὶ τρίτην ἄλλην ἐμβαλοῦμεν ἐπὶ τῇ δευτέρᾳ παραπλησίως· εἰ δὲ πλατὺς εἴη καὶ περιφερῆς, στομώσομεν ἢ λεπτότατος ὑποπίπτει καθέντες δὲ τὸν δάκτυλον, τὴν μὲν τινὰ διαίρεσιν κατωτέρω τῆς πρώτης ἐμβαλοῦμεν, τὴν δὲ ἀνωτέρω, εἰ τύχη κἀνταῦθα τίς

pe intelligere nos non aequali ratione spectare debere et salutem et decus; ubique enim salutis consideratio mihi majori curae est.

4. In parvis quidem abscessibus una incisura utemur, ubi tenuissima reperiuntur ipsa eorum integumenta; in majoribus autem pluribus incisuris utimur; secantes enim ubi tenuissima est cutis et humorem excernentes, per plagam digitum indicem sinistrae manus immittimus in sinum; dein quaqua versum illum circumagentes magnitudinem sinus observamus; si vero igitur ad aliquam partem ducitur digitus, sanis partibus circumdatam, ubicunque sanum est in sinu, illuc eum incurvantes et tendentes carnem circum eum, secundam injiciemus plagam, eandem figuram habentem ac prima; si autem sinus humorem continens rectus quidem est, sed digito multo longior, post secundam incisionem immittentes digitum, rursus per secundam plagam illum imponemus, et tertiam denuo secundae addemus eodem modo; si autem latus et rotundus sit, aperiemus ubi tenuissima pars occurrit; immittentes autem digitum, aliam quidem incisuram infra primam faciemus, aliam vero supra illam, si et illic aliquis se ostendat canalis et alias adhuc incisu-

διασημαίνειν υποφορά· ἄλλως δὲ ἐκ πλαγίῳ τῆς πρώτης καὶ τῆς μετὰ τὴν πρώτην, πάσας μὲν τοιαύτας ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐκτεινομένους μέρους.

18. 5. Στοχασμὸς δὲ γινέσθω μάλιστα τοῦ τὰς ὑστάτας διαίρεσεις τὰς πρὸς τοῖς πέρασι τοῦ κόλπου παρ' αὐτὴν τὴν ὑγιαίνουσαν καὶ μὴ ἀφροστικῶσαν σάρκα ἐμβάλλεσθαι· εἰ μὴ γὰρ τοῦτο γένοιτο, ἀλλ' ὑπολείποιτο τις χώρα κεκολλημένη, δυναμένη φυλάττειν ὑγροῦ τι μέρος ἐν ἑαυτῇ, μείζων ὁ κόλπος γενήσεται· τῶν ὑγρῶν διασηπόντων ἐκεῖνα τὰ μέρη, καθ' ἃ ἂν ὑφίστασθαι τύχοι· εἰ μὲν οὖν ὑπόπλατυ τὸ ἀπόστημα τύχοι καὶ μὴ πᾶν ἐξογκώμενον, εὐθυτομήσομεν· εἰ δὲ κυρτὸν ἰσχυρῶς εἴη καὶ περίογκον εἰς ὀξεῖάν τε ἀνατεῖνον κορυφῆν, περιαιρέσει χρησόμεθα· μεγάλη μὲν, εἰ καὶ αὐτὸς ὁ τόπος προκαλοῖτο τὴν περιαιρέσιν, ὡς μασχάλη καὶ βουβῶν καὶ τὰ περὶ τὸν δάκτυλον· εἰ δὲ μὴ τέτατος, ὅσον ἐφ' ἑαυτῷ, παραιτοῖτο τὴν περιαιρέσιν, τὸ δὲ ἀπόστημα διὰ τὸ ἰσχυρῶς κεκολληθῆναι, τὴν τῆς περιαιρέσεως ἀνάγκην ἀνάγκη· μικρὰ χρησόμεθα.

6. Χρὴ δὲ περιδιαίρειν τὸν τρόπον τοῦτον· μετὰ τὸ σημειώσασθαι τὸν περιαιρευθῆσομενον τόπον, διαγράψομεν τὸ βάθος μυστινοειδῶς· εἴτ' ἄγκιστρον καταπέραντες εἰς μέσον τὴν περιγεγραμμένην σάρκα, καὶ ἀνατείναντες ἰσχυρῶς διὰ τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς, πᾶν τὸ περιχαραχθὲν ἐκτεμοῦμεν· ταῦτα δὲ ποιήσομεν, κἂν τὰ ἐπεστωρεσμένα σώματα τῷ ἀποστήματι λεπτὰ ἢ νεκρωμένα εἶναι τύχοι· εὐδόκιμος γὰρ ἐφ' ἀμφοῖν τοῦτοι ἢ περιαιρέσις ἐστὶ· μέτρον δὲ τῆς περιαιρέ-

ras ad latera primae et sequentis , omnes quidem eodem modo ad eandem partem tendentes.

5. Quam maxime autem curandum , ut ultimae incisurae quae fiunt in finibus sinus ad ipsam sanam usque et non abscedentem carnem perducantur ; nisi enim haec fiant , verum relinquatur aliqua plaga sinu excavata , quae aliquam humoris partem intus servare potest , major sinus fiet , humoribus putredinem excitantibus in illis partibus , ubi desident ; si autem latiusculus sit abscessus neque valde tumeat , recte secabimus ; si vero valde sit convexus turgeatque et ad acutum evehatur cacumen , extirpatione utemur ; magna quidem , si et ipse locus praecipit extirpationem , uti axilla et inguen et quae anum circumdant ; si vero locus per se dissuadet extirpationem , abscessus tamen , quod tam graviter turget , extirpationis necessitatem adducit , parva utemur.

6. Oportet autem extirpare sequenti ratione ; postquam designatus est locus extirpandus , circumscribemus illum ad formam myrtei folii , dein unicum defigentes in media circumscripta carne illumque fortiter sinistra manu attrahentes , omne circumscriptum excidemus ; eadem et faciemus , si corpora abscessui superstrata tenuia sint et emortua ; probanda enim in ambobus his casibus extirpatio ; finis autem extirpationis sit ip-

σεως, αὐτὸ τὸ λελεπτυσμένον ἢ νενεκρωμένον ἔστω σῶμα· τοσαῦτα περὶ τῆς χειρουργίας τῶν ὑποπιπτόντων ἀποστημάτων· ἐξῆς δὲ περὶ τῆς θεραπείας λεκτέον.

II. Ἐκ τῶν Ἡλιοδώρου περὶ τῶν ἐν κατακαλίψει ἀποστημάτων. (1)

Ἐὰν μὲν οὖν ὁ πεπονηθὸς τόπος ὑποπίπτῃ χειρουργία, συνεργεῖν δεῖ τῇ πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ῥοπῇ τοῦ ἀποστήματος διὰ πυριῶν θερμῶν καὶ ἐπιστατικῶν καταπλασμάτων τε καὶ ἐμπλάστρων· τοῦ δὲ ἀποστήματος || — ὑπὸ σύρρηξιν ἀγομένης, τάναντία δεῖ ποιεῖν, καὶ συνεργεῖν τῇ εἰς βάθος ὄρμῃ πρὸς τὴν ἀναστόμωσιν· τῇ μὲν ἐπιφανείᾳ προσάγοντας τῶν στυφόντων καταπλασμάτων τῶν διὰ φοινίκων γε καὶ θαλλίας φύλλων καὶ σιδίων καὶ μήλων· πόματα δὲ δίδοντας θερμαίνοντα οἷα τὰ διὰ πετέρεος σμύρνης πιγάνης ὁποῦ· ἵνα τῆς ἐπιφανείας στελλομένης καὶ τοῦ βάθους θερμαινομένης καὶ ἐρεθιζομένης λεπτυνθῆν τὸ ἀπόστημα ἀναστομωθῇ. ἐπὶ δὲ τῶν ὑποπιπτόντων ἀποστημάτων τοῖς τῆς χειρουργίας ἔργοις τελείας ἐκπύσεως γενομένης, ἐπὶ τὴν χειρουργίαν ἤκειν δεῖ.

(1) Ἀπὸ τοῦ γὰρ τῶν χειρουργουμένων· κεφάλαιον, τίνας τῶν ἀφισταμένων τόπων ὑποπίπτουσιν χειρουργία, καὶ τίνας θύαιη καὶ φαρμακεία.

sum attenuatum et emortuum corpus; tantum de chirurgia occurrentium abscessuum; deinceps de therapia dicendum.

II. *EX HELIODORI LIBRO DE OCCULTIS  
ABSCESSIBUS.*

**S**i affectus quidem locus Chirurgiae est subjectus, favere oportet motui abscessus exteriora versus balneis calidis et impositis cataplasmatibus et emplastris; abscessus vero rupturae cum sit propior, contraria facere convenit motuique inferiora versus favere quo facilius fiat apertura; ad superficiem quidem attrahentes abscessum ope adstringentium cataplasmatum ex palmarum et thalliae foliis et ex malicorio malisque; potus dantes calidos ex pipere, myrrha et rutae succo; ut, dum superficies contrahitur et fundus calefit et irritatur, attenuatus abscessus aperiatur; in abscessibus autem, qui chirurgiae auxilium postulant, perfecta suppuratione, ad chirurgiam transire oportet.



III. Τῶν ἐν μεσοπλευρίῳ ἀποστημάτων  
χειρουργία. (1)

1. Σχηματιζέσθω ὁ κάμνων κεκλιμένος ἐπὶ τὸ ὑγιὲς πλευρόν· πρὸς δὲ τὴν διαίρεσιν αἰρεῖσθαι δεῖ μεσοπλεύριον τὸ μεσαίτατον τοῦ ὄγκου καὶ τῶν ἄλλων πλατύτερόν τε καὶ ἐκτικώτερον· ἢ δὲ διαίρεσις διδόνθω πλαγία μὲν ὑπόλοξος δὲ πρὸς τὸ τοῦ μεσοπλευρίου σχῆμα· τεμνέσθω δὲ πρῶτον μὲν τὸ δέσμα· καὶ πρὸ τῆς τοῦ ἀποστήματος στομώσεως διὰ τῶν τῆς διαιρέσεως χειλῶν ἀγκυτήρες ῥαμματίνοι διεκβαλλέσθωσαν τέσσαρες, δύο καὶ δύο· δίκαιον δὲ χρεῖαν ὑστερον εἶσεσθαι. μετὰ τὴν τῶν ἀγκυτῆρων διεκβολὴν τῷ τοῦ σμιλαρίου κόρακι στομούσθω τὸ ἀπόστημα· ἅμα δὲ καὶ τῷ δακτύλῳ διαρτάσθω τὸ καταλελειμμένον συνεχὲς σῶμα· μέγεθος δὲ τῆς τομῆς σύμμετρον ἔστω ὡς διδάκτυλον ἢ καὶ ἔτι μείζον· τῇ δὲ πρώτῃ ἐνεργείᾳ μὴ ὄλον ἐκλαμβανέσθω τὸ πύον· ἢ γὰρ ἀθρόα ἐκκρίσις τετήρηται τὸν κατὰ λειποθυμίαν κίνδυνον ἐπιφέρουσα.

2. Ἐκλιφθέντος (2) δὲ τοῦ ὑγροῦ, σπόγγον μάλα μὲν λιπῶ διαδεδεμένον ἐπὶ τὴν διαίρεσιν ἐντιθέσθω, ἵνα δι' αὐτοῦ τὸ καταλελειμμένον ὑγρὸν ἐπέρχεται· εἶτα τιλοῖς μότοις χρηστέον καὶ πτυγματίῳ διπτύχῳ ἢ τριπτύχῳ τῷ καλεμένῳ μο-  
p. 18<sup>b</sup>. νοφύλακι· κατὰ δὲ τούτῃ οἱ ἀγκυτήρες ῥαμματιζέσθωσαν τοπικοῦ κρατήματος χάριν· εἶτα ἔξωθεν ἐπιμοτούσθω ἢ τομῇ τιλοῖς οἰνελαίῳ βεβρεγ-

(1) Ἀπὸ τοῦ γ τῶν χειρουργουμένων κεφ. τοῦ ὁμοίου.

(2) Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ.

III. *DE ABSCESSUM INTER DUAS COSTAS CHIRURGIA.*

1. **D**ecumbat aegrotus in sanum latus versus; ad incisionem autem eligere oportet locum inter duas costas medium in media tumoris parte ceteris ampliore et aptiore; incisura autem fiat transversa et paululum obliqua ad formam spatii inter duas costas; secetur autem primum cutis; et antequam abscessus aperiatur, per plagae labia trajiciantur fibulae sutoriae quatuor, per quodvis labium duae. Licetbit postea harum utilitatem perspicere; fibulis immisis scalpelli mucrone aperiatur abscessus; simul digito diducantur contiguae relictae partes; plaga autem magnitudine aequalis sit duobus digitis vel et adhuc major; prima operatione ne omne excernatur pus; integrum enim effluvium periculum animi deliqui afferre observarunt.

2. **E**xcreto autem humore, spongia firmiter filo adligata plagae imponatur, ut per illam reliquus humor transeat; dein linamentis carptis utendum et linteo bis vel ter plicato motophylaxe dicto; dein fibulae connectantur ut loco fulcimentum praebeant; dein exterius circumdetur plaga linamentis carptis, vino oleo mixto imbutis extraque imponatur communis motophylax et toti pectori lana vino oleo mixto madefacta;

μένοις· καὶ ἔξωθεν ὁ κοινὸς μοταφύλαξ ἐπιτιθέσθω, καὶ ὄλω τῷ θώρακι ἕριον οἰνελαίῳ βεβρεγμένον· τῇ δὲ δευτέρῃ ἢ τρίτῃ λυέσθω· καὶ πάλιν μέρος τοῦ ὑγροῦ αὐταρκῆς κενούσθω· γινέσθω τε ταῦτα καὶ τὰς ἐξῆς, ἵνα τρισὶν ἢ πλείοσιν ἐπιβολαῖς τὸ τοῦ ὑγροῦ πλήθος πᾶν κομισθῆ.

3. Ἀλλ' ἐπεὶ τὰ ἀποστήματα ταῦτα κινδυνώδη ἐστὶ, τὸν ἀριστὸν ἰατρὸν χρὴ προγινώσκειν τὸν ὀλεθρίως ἔχοντα καὶ τὸν σωτηριῶδες· ὀλεθρίως μὲν οὖν ἔχων ὁ πάσχων μετὰ τὴν τοῦ ὑγροῦ ἔκκρισιν ἀσώδης ἐστὶ, καὶ δυσόρεκτος καὶ δύσπνης καὶ ποτε καὶ βήσσει μετ' ἀγρυπνίας καὶ ἀσθενείας τῆς δυνάμεως· καὶ τοῦ ὑγροῦ κενεμένη καθ' ἡμέραν πάλιν συλλέγεται διαφιλῆς δυσώδης· καὶ φθειρομένη τοῦ ὑπεζωκότος ὑμένος καὶ ἀπολύματα φανήσεται ἐμφερόμενα· τῷ ὑγρῷ σωτηρίως δὲ διακειμένῳ τοῦ νοσοῦντος, τὰ ἐναντία συνεδρεύει· καὶ χρὴ μετὰ τὴν παντελῆ τοῦ ὑγροῦ ἔκκρισιν τὸν λιχανὸν δάκτυλον καθιέναι, καὶ σκοπεῖν πότερον γυμναεῖσιν αἱ πλευραὶ ἢ λελιπασμέναι ἢ σκέπονται ὑπὸ σωματῶν· ἐὰν οὖν ἔτι σκέπων τῷ ὑπεζωκότι ὑμένι γινέσθω κατάντλησις δι' ὕδατος εὐκράτης· εἴτ' ἐγκλυζέσθω τὸ βάθος μελικράτω· καὶ κλινέσθω ὁ πάσχων πρὸς τὸ πάσχον μέρος· τὸ δ' ἐναπομεῖναν ἕριον περὶ μηλωτρίδα ἐλλημμένῳ ἀναρπαζέσθω· εἴτ' ἐγχυματιζέσθω μέλι λεῖον ὀμὸν ἢ μετρίως ἀπεζεσμένον· φάρμακα γὰρ λιπαίνοντα ἐπὶ τῶν ἀποστημάτων τούτων ἐστὶν ἀθέατα· τὸ δὲ μέλι διὰ βαρύτητα ὑποτρέχον καὶ τὸ ὑγρὸν ἀνακαφίζον πρὸς ἔκκρισιν ἄγει.

secundo aut tertio die solvantur fasciae et rursus sufficiens humoris quantitas evacuetur; fiat illud et sequentibus diebus, ita ut tribus vel pluribus tota humoris copia sit evacuata.

3. Sed cum hi abscessus sint periculosi, optimum medicum statim distinguere oportet perniciosum et qui bonum habebit exitum. Pernicies autem si imminet, aegrotus post humoris effusionem nausea laborat, difficulter se erigit et respirat atque subinde tussit insomnia cum virium languore correptus; et humore evacuato quotidie rursus colligitur magna copia mali odoris; atque destructa succingenti membrana ejus reliquiae quoque apparebunt humori innatantes; si vero ad sanitatem perducetur aegrotus, contraria obtinent; et oportet omni omnino humore evacuato indicem digitum imponere et inquirere num costae nudae sint an pinguedine coopertae an corporibus tegantur; si igitur etiam quid adest illas tegens, in succingentem membranam fiat infusio aquae purae; dein in fundum injiciatur mulsum; et decumbat aegrotus in latus affectum; reliquus autem humor lana circa specillum contorta extrahatur; dein instilletur mel leniter crudum vel paululum coctum; medicamenta enim pinguefacientia his abscessibus non sunt imponenda; mel autem propter gravitatem humorem subiens et sublevans eum excerni curat.

4. Μετὰ τὴν τοῦ μέλιτος ἔκχυσιν, λημνίσκοι καθιέσθωσαν· καὶ τότε ἡ τομὴ τιλοῖς μότοις διαστελλέσθω· καὶ οὕτως οἱ ἀγκιτῆρες ἀμματιζέσθωσαν· περιμοτούσθω δὲ τὰ πλησίον μέρη || —

p. 19. καὶ κατ' αὐτοῦ ὄλε τοῦ πλευροῦ σπλήνιον κεκαρωμένον ἐπιτιθέσθω· τοῦ δὲ βάρους ρευματιζομένου, κατάπλασμα στιπτικὴν ἔχον δύναμιν ἔξωθεν ἐπιτιθέσθω τοῦ σπληνίου· ταῦτα γινέσθω ταῖς ἐξῆς ἡμέραις ἕως οὗ καθαρῆ καὶ σαρκωτῆ τὸ βάρος· ἐν δὲ τῷ μέσῳ τῆς θεραπείας χρόνῳ οἱ ἀγκιστῆρες διακοπτόμενοι κομιζέσθωσαν· οὗτος ἐστὶν ἀριστος τρόπος τῆς θεραπείας ἐν αὐτῷ τῷ ὑμένι συλλεγέντος τοῦ ὑγροῦ· μεταξὺ δὲ τῶν πλευρῶν καὶ τοῦ ὑμένου συλλεγέντος μετὰ τὴν ἀσφαλὴ τοῦ ὑγροῦ ἔκκρισιν, ὀρμήσαι δεῖ ἐπὶ τὴν τῶν πλευρῶν ἐκκοπὴν· ἐκθήσομαι δ' αὐτὴν ἐπομένως.

#### IV. (III.) Περὶ ἐκκοπῆς πλευρῶν.

1. Ἐκτεμένεσθω τὰ σκέποντα τὴν πλευρὰν, ἢ τὰς πλευρὰς σώματα, ὑπὸ τε τετραγώνῃ τῆς ἐκτομῆς ὑπὸ μήκους σχηματιζομένης· πρὸς δὲ τὴν περιχάραξιν, διδύσθω μία πρώτη πλαγία διαίρεσις κατὰ μεσοπλευρίῃ ὑπὸ τὴν δεομένην ἐκκοπῆς πλευρὰν λελοξωμένη πρὸς τὸ τοῦ μεσοπλευρίῃ σχῆμα, εἰς δὲ καταπειρέσθω ἀγκιστρον, καὶ ἀναταθὲν ἐκτεμένεσθω· καὶ οὕτως αἱ πλευραὶ ψιλούσθωσαν· καὶ τῇ δεομένη πλευρᾷ ἀναιρέσεως

4. Post mellis instillationem, linamenta oblonga imponantur et tum incisura linamentis carptis diducatur; et dein fibulae connectantur; linamentis autem carptis circumdentur proximae partes et toti lateri imponatur emplastrum somniferum; fundo autem fluxione affecto, cataplasma stipticam vim habens extra imponatur emplastro; eadem fiant sequentibus diebus donec purgatus et carne tectus sit fundus; in medio autem curationis tempore fibulae quippe secantes, educantur; haec est optima curandi ratio in ipsa membrana collecto humore; inter costas vero et membranam collectus cum adsit tuto excreto humore transeandum est ad costarum excisionem; hanc autem mox explicabo.

---

#### IV. (III.) DE EXCISIONE COSTARUM.

1. **E**xcidantur quaecunque costam sive costas tegunt corpora, incisura ad figuram quadrati in longitudinem porrecti efformata; ut illa autem circumscribatur, fiat primum una incisio transversa in spatio inter duas costas oblique sub excidenda costa directa ad formam hujus spatii, in quod defigatur uncus et pars extensa excidatur; et sic costae denudentur; et costae extirpandae specilli lati vel meningophylacis lamina suppo-

πλατυμήλης ἢ μνηγγοφύλακος ἔλασμα ὑπερι-  
δέσθω ἕδρας χάριν· καὶ ἡ ἀκμὴ τοῦ τρυπάνου  
στηριζέσθω κατὰ τὸ ἐψιλωμένον μέρος τῆς πλευ-  
ρᾶς πρὸς τοῖς κατὰ φύσιν σώμασι· καὶ γινέσθω ἡ  
ἐνέργεια· κἂν ὑπότῃ τῷ ἐνεργοῦντι κενεμβατή-  
σαι, τὸ ἔλασμα τῆς μήλης παραγαγέτω ὑπὸ τὸ  
τετρημένον μέρος· ὅλον δὲ δι' ὅλη τὸ τῆς πλευ-  
ρᾶς πᾶχος τετράσθω· καὶ ἦτοι δύο τὰ πάντα  
διδῶσθω τρήματα, ἓν καὶ ἓν στενῆς οὔσης τῆς  
πλευρᾶς· ἢ δύο καὶ δύο, πλατυτέρας οὔσης.

2. Τὸν δὲ τρόπον τῆς τῶν τρημάτων δόσεως  
ἐκτίθεμεν ἐν τῷ περὶ τῶν τοῦ κρανίου λόγῳ· καθά-

Ἐκ τούτου περὶ \* καὶ τὸν τρόπον τῆς ἐκκοπῆς· διακοπτέσθω  
αυτοῦ. δὲ τῆς πλευρᾶς καθ' ἓν μέρος τὸ πλεῖον πᾶχος,

p. 20. καὶ λεπτὴ συνέχεια καταλιπέσθω· εἶτα | τότε τὸ  
ἕτερον διὰ τῶν ἐκκοπέων διαιρείσθω ὅλον· τούτῃ  
γενομένη, δακτύλοις ἢ ὀστέαγμα συνεχέσθω ἡ  
πλευρὰ, ἵνα ἡ καταλελειμμένη λεπτὴ συνέχεια  
μὴ ἐπιβολῇ τῇ τοῦ σμιλίου τοῦ ἐκκοπέως ἀκμῇ  
διακοπῇ· κἂν μὲν ἢ ἀπαλὰ τὰ τῆς πλευρᾶς ἄκρα,  
ἀρκεῖσθαι δεῖ· ἀνάμαλα δὲ ὄντα, ῥίγη ὀμαλίζειν·  
ταῦτα ποιοῦμεν ἐπὶ τῶν ὀστωδῶν πλευρῶν.

3. Ἐπὶ δὲ τῶν χονδρωδῶν, ἐκτέμνειν χρὴ καὶ  
ἀναιρεῖσθαι διὰ σμιλίου βαρυτάτη ἢ κατὰ ἐνέρ-  
γειαν ἀκμῇ σμιλίου τοῦ ἐκκοπέως· οὔτε γὰρ ἀν-  
τέρεις ἐπὶ χονδρώδους πλευρᾶς παραλαμβάνεται,  
οὔτ' ἐκκοπῇ διὰ τὴν ἀπαλότητα τῆς οὐσίας· ἐκ-  
τεμνέσθω δὲ μὴ μόνον τὸ λελιπασμένον μέρος τοῦ  
χόνδρου, ἀλλὰ καὶ τινὰ τῶν κατὰ φύσιν τῆς  
πλευρᾶς· μετὰ δὲ τὴν τῶν πλευρῶν ἀναίρεσιν,  
λημνίσκοις ἀναπληροῦσθω τὸ τῆς ἐκτομῆς κοίλω-

natur ad fulciendum ; et mucro terebrae figatur in parte denudata costae prope naturalia corpora ; et fiat operatio ; atque si accidat chirurgum ad locum vacuum pervenire , lamina specilli adducatur sub perforatam partem ; in universum autem totius costae crassities perforetur ; et sane duo omnino parentur foramina a quovis latere unum , si angusta sit costa ; vel a quovis latere duo , si latior sit.

2. Rationem autem qua foramina formentur , exponimus , ubi de morbis calvariae agimus , uti et excidendi rationem ; dissecetur autem in altera costae parte maxima crassitiei pars atque tenuis relinquatur cohaerentia ; dein tunc altera pars scalpris dissecetur tota ; hoc facto digitis vel forcipe teneatur costa , ut relicta tenuis cohaerentia una applicatione mucronis scalpri excisorii dissecetur ; atque si quidem laeves sunt costae margines , finem operationi imponere oportet ; si vero inaequales , lima laevigare ; haec facimus in costis osseis.

3. In cartilagineis autem , excidere oportet et extirpare ope scalpri gravissimi vel mucrone scalpri excisorii fortiter adhibiti ; neque enim fulcimentum in cartilagineis costis adhibetur , neque eadem excidendi ratio ac in osseis propter mollitiem substantiae ; ne autem exsecetur solummodo pinguefacta pars cartilaginis verum et nonnullae partes costae sanae ; post costarum excisionem oblongis linamentis implea-



μα' καὶ τὰ πρόχειρα μέρη τιλοῖς μότοις ἀνα-  
 πληροῦσθω· καὶ κατὰ τοῦ μοτοφύλακος ὄλη τοῦ  
 θώρακος ἔριον οἰνελαίῳ βεβρεγμένον ἐπιτιθέσθω·  
 εἴτ' ἐπιδρῦσθω· μετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν πρὸς τὴν  
 σάρκωσιν ἐγκρίνειν δεῖ ἐμπλάστρους κεφαλικάς  
 ἀνιεμένας ῥοδίνῳ· τὰ γὰρ λιπαίνοντα φάρμακα  
 ἀνοίκεια σύνεστιν, ὅτι πλευρῶν ἄκρα γεγύμνω-  
 ται· καὶ λιπαινόμενα πρὸς τοῖς ἐσχάτοις τῆς θε-  
 ραπείας συριγγοῖ τοὺς τόπους μετὰ τὴν σάρκω-  
 σιν ὑπτία οὔσα ἰσόπεδος ἢ ἔλκωσις κατελούσθω.

V. (IV.) Περὶ περιτοναίς, καὶ τοῦ μεταξύ ἐπιγαστρίας  
 καὶ περιτοναίς ἀποστήματος.

Ἐπὶ τοῦ περιτοναίς τόπου τὸ μεταξύ ἐπι-  
 γαστρίας καὶ περιτοναίς, ἢ αὐτὴ χειρουργία γιγ-  
 νέσθω· διαιρεῖται γὰρ ἕως τοῦ πύε τὰ σκέποντα  
 σώματα, τοῦ πάσχοντος ὑπτίᾳ σχηματισμένα·  
 καὶ τᾶλλα γίνεται, ὡς ἐπὶ θώρακος· ἄμεινον  
 δ' ἔστι μετὰ τὴν παντελῆ τοῦ ὑγροῦ ἔκκρισιν τὸν  
 δάκτυλον εἰς βάθος καθιέναι, καὶ διαίρεσιν εἰς  
 ὑπόρρυσιν δίδοναι· ὀλίγη δ' ὄντος τοῦ συλλεχθέν-  
 ρ. 21. τος ἢ ὑγροῦ, κατὰ μίαν ἐπιβολὴν ἢ ἔκκρισιν τοῦ  
 παρακειμένου γινέσθω, ὡς ἐπὶ τῶν ἐν ἐπιφανείᾳ  
 ἀποστημάτων.

tur cavum excisione formatum ; et proximae partes linamentis carptis repleantur ; atque super motophylace toti pectori imponatur lana vino oleo mixto imbuta ; dein firmetur ; post depurationem autem imponere oportet emplastra capitalia roseo mixta ut caro inducatur ; pinguefacientia enim medicamenta omnia non conveniunt , quoniam costae margines sunt denudatae ; et pinguefacientia sub finem curationis fistulis originem praebent in illis locis post carnis inductionem ; superior ulceratio cum sit plana , cicatrix inducatur.

---

V. (IV.) *DE PERITONAEI ET SPATII INTER  
EPIGASTRIUM ET PERITONAEUM  
ABSCESSU.*

**I**n peritoneo et spatio inter epigastrium et peritoneum eadem sit chirurgia ; dissecentur nempe integumenta usque ad pus , aegroto resupino decumbente ; et cetera fiunt uti in pectore ; melius autem est post universam humoris detractio-  
nem digitorum fundo imponere et incidere super loco unde pus defluxit ; parvus cum sit humor collectus una vice effluvium reperti fiat sicut in superficialibus abscessibus.

---

VI. (V.) Περὶ ἥπατος καὶ σπληνὸς ἀποστήματος.

Ἐπὶ τῶν ἐν ἥπατι καὶ σπληνὶ ἀποστημάτων δοκεῖ μοι δεῖν τέμνειν ἢ καίειν, διαιρείσθω δὲ τὰ ἐπικείμενα τῷ σπλάγχνῳ σώματα ἐπιγαστρῶν καὶ περιτόναιον· καὶ πλείστης οὔσης συλλογῆς διεκβαλλέσθωσαν ἀγκυτῆρες διὰ τῶν τοῦ ἐπιγαστρῶν χειλῶν· τότε τὸ ἀπόστημα διαιρείσθω, πάλιν πρὸς δύναμιν ἐκκρινομένη τοῦ ὑγροῦ· πρὸς δ' ἐποχὴν τοῦ καταλελειμμένου, ὡς δ' ἤδη ἐρρέθη, σπογγίᾳ μαλακοῦ ἐντιθεμένη· γιγνέσθω δὲ καὶ τὰ ἐξῆς οἷα ἐπὶ τοῦ θώρακος εἶρηται· ὀλίγον δὲ ὄν τὸ ὑγρὸν, σύμπαν κατὰ μίαν ἐπιβολὴν ἐκκρινέσθω· εἴωθε μὲν οὖν σαρκωμένης τῆς ἐν τῷ βάθει ἐλκώσεως, συνσαρκοῦσθαι καὶ τὰ χεῖλη τοῦ ἐπιγαστρῶν καὶ τοῦ περιτοναίου, ὥστε μὴ συνούλωσιν τῆς τομῆς γίνεσθαι· ἔαν δὲ φθᾶσιν ἐπουλωθῆναι ἢ τοῦ σπλάγχνου ἕλκωσις, ἀναιμαστέσθω τὰ τῆς τομῆς χεῖλη, καὶ ραπτέσθω πρὸς κόλλησιν· ἔαν δὲ ποτε τὸ ἐν ἥπατι καὶ σπληνὶ ἀπόστημα ἀναστομωθῆ, ὡς τὸ ὑγρὸν προχεόμενον ὑποδραμεῖν τὸ περιτόνχιον καὶ περιχυθῆναι τοῖς σπλάγχνοις, ἔαν μὲν ἢ πλήθος τὸ προκεχυμένον, ὡς ἀναλογεῖν πλήθει τῷ ἐπὶ ὕδρωτος, παρακεντήσει χρώμεθα· ὀλίγος δ' ὄντος τοῦ κεχυμένου, τοπικῆ γινέσθω διαίρεσις τοῦ ἐπιγαστρῶν καὶ τοῦ περιτοναίου· εἶτα ὅταν φθᾶν τὸ σπλάγχνον στόμωσις, ἐπιδιαίρεισθω πρὸς τὴν τοῦ ἀποστήματος ἀνασκευήν· καὶ τότε τὰ ἀκόλουθα γιγνέσθω, ὅσα μικρῶ πρῶσθεν εἶρηται.

## VI. (V.) DE HEPATIS ET LIENIS ABSCESSU.

In hepatis vel lienis abscessibus, ut mihi videtur, oportet secare vel urere, dissecentur autem primum visceri imposita corpora epigastrium et peritonaeum; et copiosa cum sit collectio, trahantur fibulae duae epigastrii labiis; dein abscessus secetur rursus pro copia humoris qui excernitur; ut autem suscipiatur pars relicta, uti jam dictum, spongia imponatur mollis; fiant autem et sequentia qualia in pectore dicta sunt; parvus cum sit humor, omnis una vice excernatur; solent enim dum caro inducitur ulcerationi in fundo, labia epigastrii et peritonaei etiam carne conjungi, ita ut cicatrix induci nequeat plagae; si autem primum cicatrix inducatur visceris ulcerationi, rursus cruenta reddantur labia incisurae et consuantur, ut dein glutinentur; si autem quando hepatis vel lienis abscessus aperiatur ut humor profusus subeat peritonaeum et circumfundatur visceribus, si magna quidem sit copia profusa, ita ut aequet copiae humoris in hydrope collectae, paracentesi utimur; si vero parva sit copia humoris effusi localis fiat incisura epigastrii et peritonaei; dein si primum claudatur viscus, rursus fiat incisio ad restituendum abscessum; et tunc congrua fiant quanta paulo ante dicta sunt.

VII. (VI.) Περὶ ἀπευθυμένα ἐντέρου ἀποστήματος  
καὶ τῶν ἐν ἄλλοις μορίοις.

Τοῦ ἀπευθυμένου ἐντέρου ἀποστάτος, ποτὲ μὲν χειρουργεῖν δεῖ, ποτὲ δὲ συνεργεῖν τῇ κατὰ βάθος συρρήξει· χειρουργεῖν μὲν, ἐν τοῖς προχείροις τόποις τοῦ ἀποστήματος ὄντος, πλησιάζον-  
 p. 22. τος | τῷ σφιγκτήρι ἀφ' ἧ ὑποπίπτοντος· συνεργεῖν δὲ συρρήξει, ἐν βάθει γινομένη· πρὸς δὲ τὴν χειρουργίαν ὑπίτιος σχηματιζέσθω ὁ πάσχων ἐπὶ παρέδρου δίφρου πρὸς αὐγῇ λαμπρᾷ, συνημμένα ἔχων τὰ σκέλη πρὸς τὸ ἐπιγάστριον, καὶ τοὺς μηρούς διεστῶτας ἀπ' ἀλλήλων· ἔστωσαν δὲ καὶ οἱ πήχεις ταῖς ἰγνύαις ὑποβεβλημένοι, καὶ πρὸς τὸν τένοντα διὰ τῶν ἀνιστόνων βρόχων ἀνειλημμένοι· μετὰ τὸν δεδηλωμένον σχηματισμὸν, τοῖς δακτύλοις ἐκτρέπέσθωσαν αἱ πρόχειροι τοῦ δακτυλίου σταλίδες· εἶτα ἄγκιστρον τῷ λιχανῷ δακτύλῳ συγκαθιέσθω εἰς τὸ τῆς ἕδρας βάθος, καὶ καταπειρέσθω εἰς τὸν ὄγκον, δι' οὗ ἀποτεινόμενον τὸ ἀπόστημα ἐκτρέπέσθω, καὶ ἐπιδιαιρέσθω παχέων ὄντων τῶν ἐπικειμένων τῷ πύῳ σωμάτων.

2. Ταῦτα τὰ ἔργα δύναται γενέσθαι ἐπὶ παιδικῶν καὶ γυναικείων σωμάτων τῶν ἀπαλοσυγκρίτων· ἐπὶ δὲ νέων περὶ σκλήρων ἀκμαζόντων ἀνθρώπων, ἐὰν μὴ δύνηται ἐκτρέπεσθαι ἡ ἕδρα, συγκαθιέσθω εἰς τὸ βάθος τῷ λιχανῷ δακτύλῳ ἢ τοῦ ἡμισπαθίου ἀκμῇ, ἢ στενῆς κατιάδος (1)

(1) Ὅτι κατιάδα φλεβοτομον καλεῖ ἐν τῷ ἰα τῶν χειρ-

VII. (VI.) *DE INTESTINI RECTI ABSCESSU  
UTI ET ALIARUM PARTIUM.*

1. Intestino recto abscedente, modo quidem manu curare oportet, modo autem rupturae internae favere. Manu autem curandum est, cum in locis aptis adsit abscessus prope sphincterem attingique possit. Favendum vero rupturae, cum profunde situs sit; ad curam manualementem autem supinus collocetur aegrotus in parva sella ad lucem claram, cruribus versus epigastrium colligatis et femoribus a se invicem distantibus; maneant et cubiti poplitibus subjecti et versus cervicem laqueis inaequaliter tensis attollantur; delineatam positionem cum adsumserit aegrotus, digitis producantur proximae ani plicae; dein unguis digito indice fundo ani imponatur et tumori infigatur, ut illius opeensus abscessus protrahatur et incisio fiat crassa cum sint corpora puri imposita.

2. Hae operationes fieri possunt in infantilibus et muliebribus corporibus quibus mollis est structura; in juvenilibus vero rigiditate pollentibus hominibus, si nequeat protrahi podex, fundo imponatur ope digiti indicis semispatulae cuspis vel tenuis catiadis (1) lamina; et ope cuspidis ab

---

(1) Quoniam instrumentum ad venam secandam *κατιάδα*

ἔλασμα καὶ διὰ τῆς ἀκμῆς ἔσωθεν ἔξω ἀγομένης  
 διαιρείσθω ὅλον τὸ ἀπόστημα· μετὰ δὲ τὴν τοῦ  
 πύου ἔκκρισιν λημνίσκῳ καθεθέντι, ἀναπληρούσθω  
 ὁ τοῦ ἀποστήματος κόλπος, καὶ τὰ ἄλλα τὰ  
 ἀκόλῳθρα γιγνέσθω· τῇ δὲ τρίτῃ καθεζέσθω εἰς  
 λεκάνην πεπληρωμένην ὕδατος θερμοῦ, καὶ προσ-  
 αντλείσθω μετὰ περιχύσεως ἑλαίου, καὶ θερα-  
 πευέσθω λημνίσκῳ πυοποιῶ Φαρμάκῳ κεχρημέ-  
 νῳ, πάντων καὶ τῶν ἄλλων ἀκολουθῶς γιγνομέ-  
 νων· μετὰ δὲ τὴν πύωσιν ἢ ἔλκωσις καθαιρέσθω  
 μέλιτι ἢ ἄλλῳ τινὶ Φαρμάκῳ καὶ ἐπουλούσθω  
 τῇ διὰ καδμείας· οἷωθε δὲ πριαπίσκον περιπλάσ-  
 σειν τῷ Φαρμάκῳ καὶ εἰς τὴν ἔδραν ἐντιθέσθαι·  
 σημεῖα δ' ἐστὶ τῆς ἐπιλώσεως ἀνωδυμία, καὶ ὅταν

p. 23. μηκέτι πύον ἐκκρίνηται. ||

3. Τοῦ δὲ ἀποστήματος ἐν τῷ βάθει γεγενη-  
 μένου, καὶ τῇ ἀφῆ μὴ ὑποπίπτοντος, συνεργεῖν  
 δεῖ τῇ ῥήξει, τοῖς δρυμντέροις κλυσμοῖς, δι' ἀφε-  
 ψύματος ὑσώπου ὀριγάνου μετὰ ἰσχάδων, καὶ  
 τῆς ὀσφύος ἅμα καταπλασσομένης μετὰ τὴν σύρ-  
 ῥηξιν· κατ' ἀρχὰς μὲν ἐγκλύζειν κρατέστερον τὸ  
 μελίκρατον· ὕστερον δὲ τὸ τοῦ Φαρμάκου ἢ τῶν  
 ῥόδων ἀφέψημα· εἰ δὲ (1) ἐν τῷ διαφράγματι τῶν

χειρουργημένων· κεφαλαίῳ περὶ φλεβοτομίας, καὶ τὴν ἀκμὴν  
 τῆς κατιάδος κόρακι· εἶπε γὰρ ἐν ἐκείνοις ὅσα ὀφείλει γί-  
 νεσθαι πρὸς τὴν παρασκευὴν τοῦ φλεβοτομουμένου ἐπά-  
 γειν· μετὰ δὲ ταῦτα τῷ κόρακι τῆς κατιάδος διαιρείσθω  
 ἢ μᾶλλον διογκωμένη φλέψ· ὁ μόντος Ροῦφος ἐν τῷ δια-  
 τριβῆι κατ' ἰτρειοῦς μονοβίβλων ὀξυβελῆς καλεῖ τὸ φλεβό-  
 τομον.

(1) Ἀπὸ τοῦ γ τῶν χειρουργημένων· κεφαλαίον περὶ  
 φλεγμονῆς διαφράγματος τῶν μυξωτήρων· (1)

interna parte extrorsum tractae dissecetur totus abscessus; post puris effluviū autem linamento oblongo imposito impleatur abscessus cavum et cetera fiant uti decet; tertio autem die imponatur aegrotus in pelvim aqua calida repletam et foveatur adfuso oleo et curetur linamento oblongo remedio suppurationi favente illito, omnia alia dum fiant uti convenit; post suppurationem autem ulceratio depuretur melle vel alio quodam remedio et cicatrix inducatur emplastro ex cadmia; solent et lignum oblongum illinere medicamento et podici imponere; cicatricem autem induci indicant et doloris defectus et ubi non amplius pus excernitur.

3. Abscessus autem profunde positus cum sit neque attingi possit, favere oportet rupturae acrioribus clysmatibus ex decocto hyssopi, origani cum caricis, dum simul coxa illinitur post rupturam; initio quidem melius est aquam mulsam injicere; dein autem clyσμα ex his medicamentis vel decoctum rosarum; si autem in septo narium parvus abscessus oriatur, incisio fiat et dein extir-

---

voat in libro XI chirurgicorum capite de venaesectione et cuspidem hujus instrumenti corvum; narrat enim in illis quaenam fieri debeant ut paratus sit ille qui venam secabit; posthac apice catiadis secetur magis tumens vena; Rufus quidem in libro unico cui titulus est: disputationes de officina medici: acutam cuspidem habens dicit instrumentum ad venas secandas.



μυξωτήρων ἀποστημάτιον γένοιτο, διαιρείσθω, καὶ τότε ἐκτεμνέσθω· ἔπειτα ἂν μὲν κατὰ φύσιν ἔχη ὁ χόνδρος, ἑάσθω· λελιπασμένος δὲ περιτεμνέσθω· καὶ τότε οἱ ἔλλυχνιωτοὶ μῶτοι εἰς τοὺς μυξωτήρας ἐντιθέσθωσαν· εἴτ' ἔξωθεν ὅλη τῆ ρίνι ἐλαιοβραχὺς ἔριον ἐντιθέσθω, συνανακεκομμένης λιβανωτοῦ μάννης· ταῖς δ' ἐξῆς ἡμέραις πυριάσθω, καὶ τὸ ἐλκῦδριον θεραπευέσθω.

4. Ἐν δὲ (1) τοῖς παρισθμίσις ἀποστήματος συστάτος, διελεῖν χρὴ διαστείλαντα τὸ στόμα τῷ στοματοδιαστολεῖ, ἢ σφηνάριον πρίνινον τάξαντα μεταξύ τῶν μύλων, καὶ τὴν γλῶσσαν καταστείλαντα σπαθομήλη ἢ τῷ γλωσσοκτόχῳ· εἰ δὲ ἐν τῷ ὄσχεῳ, ἂν μὲν ἢ παχέα (2) τὰ περιέχοντα τὸ ὑγρὸν σώματα, τοῖς κατὰ ἀπλοτομῶν ἔργοις χρῆσόμεθα πρὸς τὸ τοῦ ἀποστήματος μέγεθος· ἢ μιᾶς διαιρέσει ἢ δυσὶν ἢ τρισὶν ἀρκούμενοι, λημνίσκου τε διεκβολῆ χρώμενοι καὶ τῆ λοιπῇ διαμοτώσει· λελεπτοποιημένων δὲ τῶν σωμάτων τὴν ἐκτομὴν αὐτῶν δοκιμάσωμεν.

(1) Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ κεφαλαίου περὶ τῆς ἐν τοῖς παρισθμίσις φλεγμονῆς.

(2) Ἀπὸ τοῦ ε τῶν χειρουργουμένων κεφαλαίων περὶ τῆς τοῦ ὄσχευ φλεγμονῆς.

petur; deinceps quidem si sana est cartilago, sibi relinquatur; pinguedine vero cum tecta sit, circumcidatur; et tum linamenta carpta ad formam funalis convoluta naribus imponantur; dein exterius toti naso imponatur lana oleo madida simul impleta mica turis comminuta; sequentibus diebus foveatur et ulcusculum sanetur.

4. In tonsillis autem si oriatur abscessus, incisuram facere oportet apertum tenentem os ope instrumenti ad id facti vel parvum cuneum iligneum ponentem inter dentes molares et linguam deprimentem ope specilli lati vel singularis instrumenti ad id facti; cum autem in seroto, si crassa quidem sint corpora humorem circumdantia eandem adhibebimus agendi rationem ac in simplici incisione; pro abscessus magnitudine vel una incisura vel duabus vel tribus contenti, lineamento oblongo imposito utentes uti et linamentis carptis; tenuia autem cum facta sint corpora, eorum excisionem probemus.

## VIII. (VII.) Ἐκ τῶν Ῥούφου περὶ βεβώνος.

p. 30. Βεβών δ' ἔστι ἐπὶ ταῖς τυχεύουσιν αἰτίαις Φα-  
 νεράς παρὰ τράχηλον καὶ μασχάλης καὶ μηροῦς  
 ἀνιστάμενος ἄνευ τοῦ πυρετοῦ καὶ σὺν πυρετῷ·  
 ἀνάγκη δὲ τὸν ἐπὶ βεβώνι πυρετὸν Φρικώδη εἶ-  
 ναι· καὶ εἰ μὴδὲν ἄλλο συναίτιον ἢ, λύεσθαι βρα-  
 δίως ἄνευ κινδύνου· περὶ τούτου Δημόκριτος Φησὶν  
 ὅτι μολίβδου (1) μετὰ Φοινίκην περιεφθέντος ἢ  
 τὸ παράπαν ἀφλέγμαντος γίνεται ἢ πολλῶν δὴ  
 ῥήξει· οἱ δὲ λοιμώδεις κλυόμενοι βεβώνες θανα-  
 τωδέστατοι καὶ ὀξύτατοι· οἱ μάλιστα περὶ Λιβύ-  
 ην καὶ Αἴγυπτον καὶ Συρίαν ὄρανται γιγνόμενοι·  
 ὧν μνημονεύκασιν οἱ περὶ τὸν Διονύσιον τὸν κυρ-  
 τόν (2). Διοσκορίδης δὲ καὶ Ποσειδάνιος πλείστα  
 διεληλύθατι ἐν τῷ περὶ τοῦ κάτ' αὐτοῦ γενο-  
 μένῳ λοιμῷ ἐν Λιβύῃ· παρακολούθηον δὲ ἔφασαν  
 αὐτῷ πυρετὸν ὀξύν, καὶ ὀδύνην, καὶ σύστασιν  
 ὅλη τοῦ σώματος, καὶ παραφροσύνην, καὶ βε-  
 βώνων ἐπανάστασιν μεγάλων τε καὶ σκληρῶν καὶ  
 ἀνεκπυήτων, οὐ μόνον ἐν τοῖς εἰθισμένοις τόποις  
 ἀλλὰ κατὰ Ἰγνύας καὶ Ἀγκῶνας· καὶ τοὶ ἐνταῦθα

(1) Ἐν τῷ ἕξ βιβλίῳ, κεφαλαίῳ Ῥούφου περὶ λιθιά-  
 σεως εἰρήσεις κοκκίνη βάπτουσι τὰ φοινίκια.

(2) Ὁ Φίλων ἐν τῷ θ' περὶ βιβλιοθήκης κτήσεως καὶ  
 Ἐρμηπος (Ἐρμιππος) ἐν τῷ ε' περὶ τῶν ἐνδόξων ἀνδρῶν  
 ἰατρῶν, καὶ ὁ Σωρανός ἐν ταῖς τῶν ἰατρῶν διαδοχαῖς,  
 φασὶ δτι καὶ ὀξυτόνος εἴρηται κυρτός, ὡς φοξός διὰ σωμα-  
 τικὴν ἀσθένειαν· βαρυτόνος δὲ ὡς ἵππος πύργος, ἐπὶ ἐκ  
 μεσογαίου πόλεος τῆς Αἰγύπτου λεγομένης Κύρτου ὑπέη-  
 χεν· ἢ ὡς φασὶ τινες διὰ τὸ ἀλίσκεσθαι τοὺς ἀντιλέγοντας  
 αὐτοῦ, ὅσπερ τοὺς ἰχθύς ὑπὸ τῶν ἀλιευτικῶν κυρτῶν.

## VIII. (VII.) EX RUFII LIBRO DE BUBONE.

**B**ubo quidem propter fortuitas causas in collo vel in axilla vel in femoribus conspicua fit et sine febre et cum febre; oportet autem febrem buboni accedentem comitari horripilationem; atque si nulla alia causa adsit, facile solvi sine periculo illam oportet; de illo Democritus (1) dicit ejus inflammationem annexo ei plumbo cum palmula vel omnino cessare vel multum sane emendari; pestilentes vero qui dicuntur bubones quam maxime letales sunt et acuti, qui maxime circa Libyam et Aegyptum et Syriam observantur; quos meminerunt aequales Dionysii gibberis (2). Dioscorides autem et Posidonius plurima de hac re enarrant libro de peste quae eorum aetate in Libya adfuit; illi autem accedere dixerunt febrem acutam, dolorem, perturbationem totius corporis et delirium et bubonum apparitionem magnorum et durorum qui in suppurationem non transiebant, non solum in solitis locis verum et in poplitibus et cubitis; quamvis illic omnino tales inflammationes non soleant

(1) In libro LXV, in capite Rufi de calculorum inventionem: cocco tingunt palmulas.

(2) Philo in libro IX de bibliothecae acquisitione et Hermippus (Hermippus) in libro V de illustribus viris medicis et Soranus in medicorum successione dicunt illum et vocari *xyphos* cum accentu acuto, quia facie erat distorta ob corporis debilitatem; cum accentu gravi autem uti *xyphos xyphos*, cum ex urbe in media regione Aegypti Cyrtos dicta originem petierit; vel uti dicunt nonnulli quod ejus adversarii ab illo capiebantur uti pisces a nassis (*xyphos*) piscatoriis.

μη πάντι γιγνομένων τῶν τοιούτων Φλεγμονῶν.  
τάχα δὲ καὶ τὸ παρὰ Ἱπποκράτους βεβωνᾶδες  
πάθος τὴν εἰρημένην διάθεσιν δηλοῖ· γένοιτο δ' ἂν  
ποτε καὶ ἐν αἰδοίῳ ὁ τοιοῦτος βεβών, ὡς περ καὶ  
τὸ ἕλκος τὸ λοιμᾶδες, καὶ ὁ πυρετὸς δὴν λοιμῶ-  
δη καλοῦσι· τὸ πλεῖστον ἐπιδήμια τὰ τοιαῦτα  
p. 31. ἐστὶ, ὥστε κοινὰ εἶναι ἡλικιῶν καὶ φύσεων || ἐν  
τισιν ὥραις ἐξαιρέτως ἀπαντῶντα· ἢ δ' ἱστορία  
παντὸς τοῦ τοιοῦτου χρησίμη, ἵνα τὸν μὲν συν-  
ήθη βεβῶνα θεραπεύωμεν, ὡς οὐδὲν δύσκολον  
ἔχοντα· τὸν δὲ λοιμῶδη, μετὰ προαγορεύσεως  
καὶ προσοχῆς ἀκριβεστέρας.

#### IX. (VIII.) Περὶ τερμίνθου.

Εἶδος τί Φύματος καὶ ἡ καλεμένη τέρμινθος  
ἐστίν· ἀλλὰ τοῖς νυνὶ ἰατροῖς οὐ πάντι σύνηθες τὸ  
ὄνομα. Πραξαγόρας δὲ καὶ τὰ συμπύπτοντα αὐ-  
τῷ γράφει· ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ μαθητὴς αὐτοῦ Ξε-  
νοφῶν· Φασὶ δὲ ἀνωτάτω μὲν ἐπικεῖσθαι τῷ ἕλ-  
κει Φλυκταίναν μέλαιναν ὡς τὸ πολὺ. ἧς ἐκρωγεί-  
σης τὸ ὑποκάτω ὅμοιον ἀποσεσυρμένῳ εἶναι· τού-  
του δὲ διαιρεθέντος πύον εὐρίσκεται· τάχα δὲ  
τέρμινθος ἐκλήθη διὰ τὸ ποικίλον τῆς χροιάς, ὅτι  
καὶ ὁ καρπὸς (1) τῆς τερμίνθου ποικίλος· εἴ γε ἢ  
μὲν Φλυκταίνα μέλαινα, τὸ δὲ τῷ ἀποσύρματι  
ἴσικος ἐνερευθὲς καὶ τὸ πύον ἡσυχῆ λευκόν· μέ-

(1) Οὕτω καὶ ὁ Γαληνὸς βοίλεται ἐν τῷ περὶ χυμῶν  
Ἱπποκράτους τμήματι.

observari; fortasse autem buboniformis morbus Hippocratis constitutionem dictam indicat; aderit autem nonnumquam et in genitalibus talis bubo, uti et ulcus pestilens et febris quam pestilentem dicunt; plerumque epidemica talia sunt, ita ut communia sint omnibus aetatibus et constitutionibus in nonnullis anni temporibus praecipue occurrentia; inquisitio autem omnium hujus generis est utilis ut vulgarem quidem bubonem curemus, tamquam nihil periculosi habentem; pestilentem autem, cum praedictione et attentione accuratiori.

IX. (VIII.) *DE TERMINTHO.*

**S**pecies quaedam tuberculi etiam est ita dictus terminthus; sed hujus aetatis medicis non valde usitatum est hoc nomen. Praxagoras autem et quae in illa accidunt describit; eodem modo et ejus discipulus Xenophon; dicit autem superne ulceri incumbere vesiculam nigram plerumque illaque abrasa fundum similem esse plagae desquamatae; hoc autem disrupto pus invenitur; fortasse autem terminthus dicitur ob variegatum colorem, quoniam et fructus terebinthini variegatus est (1); si quidem vesicula sit nigra, pars plagae desquamatae similis rubra; et pus fere album; memorat et Hippocrates in Epide-

(1) Eandem sententiam quoque profert Galenus in sectione de humoribus Hippocratis.

μνηται δὲ καὶ Ἰπποκράτης ἐν ἐπιδημίαις τοῦ ἔλκους, ὡς τισὶν ἐν ποσὶ γεγενημένῳ· εἰ δὲ ποδῶν μόνων ἔστιν, ἢ οἶόν τε καὶ ἄλλη γενέσθαι τοῦ σώματος, τοῦτο οὔτε ἐκεῖνος οὔτε ἄλλος τίς διωρίσατο.

X. (IX.) Ἐκ τῶν Διοκλέως περὶ φλυκταινίδων.

Τῶν δὲ Φλυκταινίδων τῶν ἀπὸ μηδὲ μιᾶς προφάσεως ἔξωθεν ἀξιολόγου γινομένων, τὸ μὲν καλεῖται τέρμιθος, τὸ δὲ σταφυλὸν, τὸ δὲ ἐπιφυκτίς· ἐστὶ δὲ ἢ μὲν τέρμιθος, Φλυκταινίδιον μικρὸν πελιδνόν· ἢ δὲ σταφυλὴ, μέλαινα ἢ δ' ἐπιφυκτίς, ὀρφνώδες· (1) ταχὺ πυσούμενα πάντα.

XI. (X.) Ἐκ τῶν Ρούφου περὶ ἐπιφυκτίδος (2).

Αἱ δὲ ἐπιφυκτίδες ἐλκύδρια εἰσὶν ἀπὸ ταυτομάτου ἔξανθοῦντα, Φλυκταινοειδῆ, ὑπέρυθρα· ὧν ἐκρηγνυμένων, ἰχώρ ὕφαιμος ἀπαρρέει· ταῦτα μὲν ἡμέρας οὐ πᾶν ἐνοχλεῖ, φυκτὸς δὲ ἐπώδυνα ἐστὶ· διόπερ καὶ οὕτως ὠνομάσθη· καὶ ὀδύνα μείζους ἢ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ ἔλκους· ὅπῃ σιλφίῃ ὕδατι διεῖς ἐπιτίθει· ἀναξηραίνει καὶ οὐκ ἀναδάκνει· ἢ αἱματικὴν λίθον μεθ' ὕδατος τρίψας, ἐπίχριε· ἐὰν δὲ φλεγμάνῃ, τρίψον μετὰ οἴνου ἢ κώνειου λεάνας, ἐπιτίθει.

(1) Ὀρφνώδες, σκοτεινὸν λέγεται ἢ σκοτία.

(2) Ἀπὸ τοῦ περὶ τῶν ἐκτὸς παθῶν.

miis hoc ulcus tamquam in nonnullorum pedibus  
occurrent; num vero in solis pedibus observetur an  
etiam in aliis corporis partibus occurrere possit  
neque ille neque alius quisquam definivit.

X. (IX.) *E DIOCLIS LIBRO DE PHLYCTAE-  
NIDIBUS.*

Inter phlyctaenides quae sine ulla causa ex-  
terna mentione digna occurrunt, alia quidem  
vocatur terminthus, alia autem staphylon, alia  
vero epinyctis; terminthus quidem phlyctaenis  
est parva livida; staphyle vero nigra; epinyctis  
autem obscuri coloris (1) cito in suppurationem  
convertens omnia.

XI. (X.) *E RUFII LIBRO DE EPINYCTIDE.*

Epinyctides sunt ulcuscula sponte efflorescen-  
tia, pustulaeformia, subrubra; quibus ruptis  
ichor sanguinolentus effluit; haec quidem per-  
diu non multum gravant, noctu vero dolent;  
unde et nomen petierunt; et dolores majores  
sunt quam pro magnitudine ulceris expectan-  
dum esset; succum laserpitii aqua dilutum im-  
pone; exsiccet et non mordet; vel lapidem he-  
matiten cum aqua tritum inunge; si autem in-  
flammat, cum vino tere vel cicutam comminu-  
tam impone.

(1) Ὀρφῶδες tenebricosus. Ὀρφρη saltem dicuntur tenebrae.



## XII. (XI.) Περὶ φύγεθρον (1).

Καὶ τὸ Φύγεθρον ἐν τοῖς εἶδεσι τῶν Φυμάτων  
 p. 32. τίθενται οἱ περὶ τὸν Πραξαγόραν· Φασὶ δὲ συν-  
 εδρεύειν αὐτῷ ἔρευθος μετὰ οἰδήματος· ὡσπερ  
 καὶ τῷ Φύματι καὶ οὐκ ἔλασσον ἔμπυον τοῦ Φύ-  
 ματος γίνεσθαι ἐπὶ δὲ τοῦ δέρματος Φλυκτανίαν  
 ἀνίστασθαι ὁμοίαν τοῖς πυρικάυτοις· προστίθησι  
 δὲ ὅτι ὁ μολύδικοις ὅτι οὐδὲ πεπαίνεται ῥαδίως,  
 ἀλλὰ μόγις, καὶ ὅτι χρονίζει, καὶ ὅτι κακὸν ἔσται  
 ποτὲ γίνεται, καὶ μᾶλλον παιδίοις τὸ δὲ περὶ  
 βεβῶνας συνίστασθαι τὸ ἔλκος, πάντες ὁμοίως  
 λέγουσιν.

## XIII. (XII.) Ἐκ τῶν Ἀντίλλης περὶ σφρίγγων (2).

1. Αἱ σφρίγγες γίνονται τὰ πολλὰ ἐξ ἀπο-  
 στημάτων μὴ κατὰ τρόπον θεραπευθέντων· διαφο-  
 ραὶ δ' αὐτῶν εἰσὶν αἵ γε μείζους καὶ ἐπιστροφῆς

(1) Ἀπὸ τοῦ περὶ τῶν ἐκτὸς παθῶν. Ὁ Ἡλιδωρος  
 ἐν τρίτῳ χειρογραφεύοντι κεφαλαίῳ περὶ τῶν κατὰ τοὺς  
 βουβῶνας ἀποστημάτων φησὶν, ὡς οἱ μὲν φύγεθρα, οἱ δὲ  
 φύματα προσηγόρευσαν· φύγεθρα μὲν ὥσανεὶ φύματα· ἔρυ-  
 θρὰ φύματα δὲ διὰ τὴν τῶν ἀλγημάτων ἐπίτασιν, ὁμοίον  
 τι φερέει πασχόντων τῶν ἀνθρώπων.

(2) Ἐκ τῶν περὶ σφρίγγων κεφαλαίων. Φησὶν ὁ Ἀντίλ-  
 λος ὡς κατὰ μεταφορὰν ὀνομάσθαι ἀπὸ τῶν σφρίγγων τῶν  
 ἐκ τοῦ καλάμου πεπονημένων· εὐρυχωρία γὰρ τις ἐστὶν πα-  
 ραπλησία ταῖς ἐν τοῖς καλάμοις κοιλότησι· ἔστι δὲ κόλπος  
 τετυλωμένος, καὶ μὴ θινάμενος χωρὶς χειρουργίας ἢ φαρ-  
 μακίας πεθεῖν.

XII. (XI.) *DE PHYGETHRO*(1).

**P**hygethrum quoque ad species tuberculorum recensent Praxagorae discipuli; dicunt autem in illo ruborem conjunctum esse cum tumore, quemadmodum et in tuberculo; et aeque pus illud continere ac tuberculum; in cute autem vesiculam oriri similem illis quae in partibus igne adustis occurrunt; addit autem illud sordidam habere indolem neque facile maturescere sed aegre illudque diutius durare malamque nonnunquam acquirere indolem, magis etiam in infantibus; in ambitu autem inguinis ulcus oriri omnes uno ore fatentur.

XIII. (XII.) *EX LIBRO ANTYLLI DE FISTULIS* (2.)

1. **F**istulae oriuntur plerumque ex abscessibus non rite tractatis; differentiae autem earum maximae et mentione dignae sunt secundum figu-

(1) Ex libro de morbis externis. Heliodorus in tertio chirurgicorum capite de abscessibus in inguine dicit alios quidem illos *φίγηθρα* vocare, alios vero *φίματα*; *φίγηθρα* quidem eadem sunt ac *φίματα*; rubra autem sunt *φίματα* sub dolorum incrementa, dum aliquid tostioni simile patiuntur homines.

(2) E capitibus de fistulis. Dicit Antyllus metaphoricè illos sic vocari a fistulis ex arundine confectis; spatium enim quoddam adest cavitati in arundinibus simile; est autem sinus callo circumdatus, qui absque chirurgia vel medicamentis evanescere non potest.

ἄξια παρὰ τὸ σχῆμα, παρὰ τὸν τόπον, παρὰ τὸ εἶδος τοῦ σώματος· παρὰ μὲν τὸ σχῆμα, ἔπει αἱ μὲν αὐτῶν εἰσὶν εὐθυτενεῖς, αἱ δὲ σκολιαὶ καὶ τῶν εὐθυτενῶν· αἱ μὲν, κυκλοτερῆ περιειλήφασιν πόνον· αἱ δὲ, ὑπόπλατυν· καὶ τῶν σκολιῶν, αἱ μὲν μίαν καμπὴν ἔχουσιν· αἱ δὲ, πλείους· παρὰ δὲ τὸν τόπον, ἔπει αἱ μὲν ἐν κεφαλῇ, αἱ δ' ἐν τραχήλῳ, αἱ δ' ἐν μασχάλαις ἢ ἐν ἄλλῳ τινὶ μέρει τοῦ σώματος γίνονται· παρὰ δὲ τὸ εἶδος, ἔπει αἱ μὲν εἰς ὀστέα τὴν ἀποτελευτὴν ποιοῦνται· αἱ δὲ καταλήγουσιν εἰς μῦν ἢ νεῦρον ἢ Φλέβα ἢ ἀρτηρίαν, ἢ ἕτερόν τι τῶν ἀπλῶν ἢ τῶν συνθέτων.

2. Σημειωσόμεθα δὲ τὰς μὲν εἰς ὀστοῦν ἀπολγούσας, ἐκ τῆς ἀντιτυπίας καθιέντες πλατυμῆλης, ἐπὶ τῶν εὐρυτέρων· ἐπὶ δὲ τῶν στενοχώρων, μηλωτίδα ἀντιληψόμεθα γὰρ σκληροῦ σώματος ἀντιπίπτουτος καὶ ὀστώδης πρὸς δὲ καὶ ἦχη τινὸς ὁποῖος ἂν γένοιτο, συγκρούοντος ὀστοῦ πρὸς χαλκόν· καὶ οὐ μόνον γε διὰ τῆς μηλώσεως γνωσόμεθα τὸ εἰς ὀστοῦν περατοῦσθαι τὴν σύριγγα, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀδιάφθορον εἶναι τὸ ὀστοῦν ἢ διεφθορέναι, καταληψόμεθα παράγοντες μὲν γὰρ τὴν μηλωτίδα πανταχοῦ, ἂν μὲν αἰσθανόμεθα πάντοθεν ἀπολισθαίνεσθαι αὐτὴν, ὥσπερ ἀπὸ τοῦ λεία τινὸς σώματος, ἐροῦμεν ἀδιάφθορον εἶναι τὸ ὀστοῦν· ἂν δὲ κατὰ τὴν παραγωγὴν ἢ μηλωτὶς ἐνίσχηται τισὶ μέρεσιν, ἀνωμαλίας καὶ τραχύτητας ὑποσημαίνεσθαι, διεφθορέναι τὸ ὀστοῦν ἀπο-
- p. 33. Φανούμεθα ἐπὶ μὲν τοῖς τῶν εὐρυστόμων || συρίγγων τολλάκις καὶ τῇ ὄψει ὑποπίπτει τὸ ὀστοῦν,

ram, secundum locum et secundum habitum parietum canalis; secundum figuram quidem, cum aliae quidem inter illas sint rectae; aliae vero tortuosae; et inter rectas aliae quidem circularem cingunt canalem; aliae vero latiusculum; et inter tortuosas, aliae quidem unam curvaturam habent; aliae vero plures; secundum locum autem, cum aliae quidem in capite, aliae autem in collo, aliae vero in axilla vel in alia quadam parte corporis adsint; secundum habitum vero, cum aliae quidem ossibus terminantur; aliae vero desinunt in musculum vel nervum vel venam vel arteriam, vel aliud quid simplicium aut compositarum partium.

2. Certi autem fieri illas osse terminari ex renixu immissi specilli, in latioribus; in angustioribus autem, auriscalpium; percipimus enim durum corpus resistere osseumque; praeterea et sonum quemdam qualis fiet osse et aere inter se collisis; neque specilli introductione tantummodo cognoscemus fistulam ad os penetrare, verum et discemus, os esse incorruptum vel corruptum; admoventes enim auriscalpium quaqua versus, si animadvertamus quidem illud undique delabi, tamquam a laevi quodam corpore, dicemus os esse incorruptum; si vero admotum specillum retineatur nonnullis partibus, indicans inaequalitatem asperitatemque, corruptum esse os declarabimus; in fistulis quidem ampla apertura instructis saepe et visui se offert os, ita ut nulla opus sit specilli introducti-

ὥστε μηδὲ μιλώσεως δεῖσθαι· εἰ δὲ σκολιὰ τυγ-  
χάνει, καμπὴν μίαν ἢ πλείους ἔχουσα ἢ σύριγξ,  
ὥστε μὴ δύνασθαι παροδεύειν, μιλωτίδα μολυβ-  
δίνην χρῆ ποιεῖν ἢ κασιτηρίνην· εὐκαμπῆς γὰρ  
οὔσα ἢ τοιαύτη, βραδίως συσχηματίζεται ταῖς  
σύριγξι· χρησόμεθα δὲ καὶ ὑεῖα τριχί.

3. Εἰ δὲ μηδὲν τῶν τοιούτων κατασκευασμά-  
των διὰ τὴν σκολιότητα ἢ σύριγξ παραδέχοιτο,  
ἐξ αὐτοῦ τοῦ φερομένου ὑγροῦ τὴν εἰς ὄστον  
ἀπόληξιν κατανοήσωμεν· ὡς ἐπίπαν γὰρ ἀπὸ τῶν  
τοιούτων λεπτὸν καὶ ἐλαιῶδες τὸ ἐκκρινόμενον

Γρ. τὸ τέ- ὑγρὸν ἐστίν· εἰ δὲ εἰς νεῦρον τὸ τέρμα \* τῆς σύ-  
ριγγος περαίνοιτο, πρῶτον μὲν ἐκ τῆς ὀδύνης ση-  
μειωσόμεθα· νεκρώδης γὰρ ἔσται καὶ νυγματώ-  
δης, ἢ τε κίνησις ἢ ὑπὸ τοῦ νεύρου συντελεγεμένη  
χείρων καὶ δυσεργεστέρας· ἔν τε τῇ μιλώσει ψαυ-  
όμενον τὸ νεῦρον, αἰσθησιν δριμυτέραν καὶ ὀξυ-  
τέραν παρέχεται· τὸ δὲ ὑγρὸν τὸ φερόμενον λεπ-  
τὸν μὲν ἔσται παραπλησίως, ὡς καὶ ἀπὸ τῶν  
ὄστων, ἀλλ' οὐκ ἐλαιῶδες οὐδὲ λιπαρόν, ἀλλ'  
ἰχωρῶδες τὲ καὶ χολῶδες· τὰ δὲ αὐτὰ παρακο-  
ληθῶν καὶ ταῖς εἰς μῦν καθηκούσαις σύριγξι· ἐπὶ  
δὲ τῶν ἐν σαρκὶ τὴν ἀποπεράτωσιν ἔχόντων, τὸ  
ὑγρὸν παχύτερον καὶ ἀργότερον εὐρίσκεται· εἰς  
φλέβα δὲ τῆς σύριγγος κατεβρίζωμένης, τὰ αὐ-  
τὰ σημεῖα παρακοληθῶν, ὅσα καὶ εἰς νεῦρον· πλὴν  
ἀμυδρὰ πάντα καὶ τὰ τῶν ἀναλγημάτων· κίνη-  
σις τὲ οὐδὲ μία ἐμποδισθήσεται· τὰ αὐτὰ καὶ εἰς  
ἀρτηρίαν ἀπολύγοντα παρακοληθήσει· εἰ δὲ ἀνά-  
βρωσις γένοιτο ὑπὸ τῆς σύριγγος, εἰ μὲν φλεβὸς,  
αἷμα πολὺ καὶ παχὺ ἐνεχθήσεται· εἰ δ' ἀρτηρία

one; si vero tortuosa fistula unam habeat flexuram vel plures ita ut per illam transire non possit, auriscalpium plumbeum conficere oportet vel stanneum; facile enim cum flectitur tale, facile et fistulis sese accommodat; utemur autem et seta, suilla.

3. Si autem nullum hujus generis instrumentum admittit fistula ob tortuosum tramitem ex ipso educto humore intelligemus ejus terminationem in os; in universum enim ab illis tenuis et oleosus est excretus humor; si ad nervum vero penetrat finis fistulae, primum quidem ex dolore illud cognoscemus; surdus enim est et pungens motusque qui a nervo perficitur est minor et difficilior; atque sub specilli introductione attactus nervus sensum acriorem et acutiorem praebet; humor autem eductus tenuis quidem est eodem modo ac ex ossibus, verum non oleosus nec pinguis sed ichorosus et biliosus; eadem comitantur et fistulas ad musculum devenientes; in illis vero quae carne terminantur, humor crassior et magis albidus invenitur; venae autem insidente fistula, eadem signa illam comitantur ac nervo praeter hebetudinem omnem et quae dolorem spectant; atque motus nullus impeditur; eadem et fistulam in arteriam desinentem comitabuntur; si autem erosio oriatur sub fistula, si venae quidem, sanguis multus et crassus efferetur; si vero arte-

ἀναβρωθείη, λεπτόν καὶ ξανθὸν μετὰ πνεύματος πολλοῦ καὶ συριγμοῦ.

XIV. (XIII.) Ἐκ τῶν Ἀντύλλε καὶ Ἡλιοδώρε χειρουργῶν συρίγγων.

1. Εἰ μὲν τοι πλάγια εἶεν ὥστε ὑπ' αὐτὸ τὸ δέριμα τείνειν κατὰ μῆκος εὐθυτενῶς ἢ κατεσκολιωμένως· εἰ μὲν εὐρύστομοι τυγχάνοιεν, τὸν λιχανὸν καθέντες τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς, καὶ ἐπάραντες τὸ δέριμα τέμνομεν παρὰ τὸν δάκτυλον ὥστε ἀπλοτομηθῆναι τὴν σύριγγα· κὰν μὲν ἢ βραχεῖα, μία κάθεσις τοῦ δακτύλου ἐξαρκέσει· ἂν δ' ἐπιμήκης μετὰ τὸ τεμεῖν τοσοῦτον διάστημα |
- p. 34. ὅπόσον ὁ δάκτυλος ἐφικνεῖται, πάλιν ἐπικαθήσομεν αὐτὸν, καὶ πάλιν ἐπιτεμοῦμεν τὸ δ' αὐτὸ ποιήσομεν ἐκ τρίτη, εἰ τοῦτο ἀπαιτοίη τὸ μῆκος τῆς σύριγγος· μετὰ δὲ τὸ ἀπλοτομηθῆναι τοὺς τύλλας τοὺς αἰτίους τῆς συριγγώσεως, ἂν μὲν ὥσιν ἐπὶ πολλῆς, τοῖς ὄνυξιν ἀναξάναντες νεαροποιήσομεν τὸ ἔλκος· ἂν δὲ βελύτερον, προσαναξύσομεν ἀκμῇ σμιλίῃ· ἂν δὲ μεγάλοι τὲ καὶ διὰ βάρους ὑποπίπτωσι, περιελοῦμεν ὄλας· ἔπειτα τῇ ἐξῆς ἀποθεραπείαν ὁμοίαν ποιησόμεθα, οἷαν καὶ ἐπὶ τῶν χειρουργηθέντων ἐλέγομεν.
2. Εἰ δὲ μετὰ τὴν ἀνάπτυξιν, τῆς σύριγγος εὐρυτέρας καθεστῶσης, ἀπαιωροῖτο τοῦ δέρματος, περιελοῦμεν τὰ ἀφεστῶτα τῆς συμφυοῦς σαρκός· ἐπὶ δὲ τῶν σφόδρα στενοστόμων, εἰ μὴ παραδέ-

ria est corrosa, tenuis et flavus cum spiritu multo sibiloque.

XIV. (XIII.) *EX ANTYLLI ET HELIODORI CHIRURGORUM FISTULARUM LIBRIS.*

1. Si obliquae quidem sint, ita ut sub ipsam cutem tendant in longitudinem recte vel tortuose; si latam quidem habeant aperturam indicem imponentes digitum sinistrae manus et elevantes cutem secamus secundum digitum ita ut findatur fistula; atque si brevis quidem sit, digitum semel imponere sufficiet; si vero longa, postquam incidimus tantum spatium, quantum digitus attigit, rursus imponemus illum iterumque incisuram faciemus; idem faciemus tertia vice si illud postulat longitudo fistulae; post incisionem autem callum fistulae formationis causam, si superficialis quidem est unguibus radentes, recens reddemus ulcus; si vero profundior, insuper scalpemus apice scalpelli; si autem magnus profundissimusque occurrit, extirpabimus totum; dein subsequenter curam secundariam eandem faciemus quam etiam in manu tractatis diximus.

2. Si autem post aperturam, fistula latiori facta, illa dependeat a cute, extirpabimus partes recedentes a cohaerenti carne; in illis autem quae valde angustam habent aperturam, si digi-



χοιντο τὸν δάκτυλον τὸ πλατὺ μήλης καθήσομεν ἢ τὸν πυρίνα· τὰ δὲ ἄλλα ὁμοίως ποιήσομεν· πρόδηλον δὲ, καὶ ὁ ἐπὶ τῶν σκολιωμένων σύριγγων τρόπος τῆς χειρουργίας· καθεκάστην γὰρ καμπὴν ἀρξάμενοι ἀπὸ τῆς πρώτης, καθήσομεν τὸν δάκτυλον, ἢ τὸ πλατὺ τῆς μήλης· κἄπειτα διελούμεν οὕτως· εἰ δὲ μὴ πλάγιον τὸ σχῆμα τῆς σύριγγος, ἀλλ' ἄντιον, τετέστιν εἰς βάθος τείνοι, περιελούμεν κατὰ κύκλον τὴν σύριγγα, τοσοῦτον περιγράφοντες τῆς κύκλω σαρκὸς, ὥστε τοὺς τύλους ὅλως ἐκκοπῆναι· εἰ δὲ τοιοῦτον εἴη τὸ βάθος ὥστε εἰς ὀστέον καταλήγειν, ἐκτυλώσομεν ὁμοίως· καὶ ἂν μὲν αὐτὸ μόνον γεγυμνωμένον ἢ τὸ ὀστοῦν, μετὰ τὴν περιαίρεσιν τῆς σαρκὸς ξύσομεν· ἂν δὲ λελιπασμένον ἢ ετερηθονισμένον ἢ ἄλλως πως διεφθαρμένον ὑποπίπτει, μέχρι σύριγγος ἐκκόψομεν.

3. Τὴν δὲ ἐκκοπὴν ἐπὶ μὲν τῶν μικρῶν ὀστέων διὰ μόνων τῶν τετραγῶνων ἐκκοπέων καλεμένων ποιησόμεθα, παραξέοντες τὸ ὀστοῦν οὐκ ἐξεπιπολλῆς τὸ ἐφθορὸς, ἀλλὰ μέχρι σύριγγος κατιόντες, ἵνα σαρκὸς ἀναβλάστησις ἐκ τῆς σύριγγος γένηται· εἰ δέ τι τῶν μειζόνων ὀστέων, οἷον βραχίον ἢ μηρὸς ἢ πῆχυς ἢ κνήμη πεπονθὸς ὑποπίπτει, τρήσαντες τρυπάνη μέχρι σύριγγος, οὕτως τοῖς ἐκκοπεῦσιν ἀναλαβοῦμεν τὰ μέσα τῶν

p. 35. περιτρή || σεων. εἰ δὲ μέχρι μυελοῦ συμβαίη πεπονθέναι τὸ ὀστοῦν, καὶ τὴν ἐκκοπὴν μέχρι μυελοῦ ποιησόμεθα· οὐκ αὐτὸ μόνον τὸ πεπονθὸς ἐκκοπέντες, προσπεριλαμβάνοντες δὲ καὶ τι τοῦ ἀπαθοῦς, εἰς τὸ βῆθριον τὴν μετ' αὐτοῦ σάρκω-

tum non admittunt, latam specilli partem immittemus vel capitulum; cetera autem eodem modo faciemus; perspicua autem quoque methodus qua manu sanantur fistulae tortuosae; cuique enim flexurae incipientes a prima imponemus digitum vel latam specilli partem; et dein sic incisionem faciemus; si vero non obliqua est figura fistulae, verum adversa, id est, si deorsum tendat illa, extirpabimus ad figuram circuli fistulam, tantum carnis circulo circumscribentes, quantum requiritur, ut totus callus excidatur; si autem tam profunda est, ut in os desinat, eodem modo callum excidemus; atque si ipsum os denudatum quidem solummodo sit, post extirpationem carnis scalpemus; si vero pinguedine sit tectum vel teredine affectum vel alio quodam modo corruptum, quo usque tendit fistula, excidemus.

3. Excisionem autem in parvis quidem ossibus solis scalpris quadratis dictis faciemus, non leviter perstringentes superficiem ossis corrupti sed quo usque penetrat fistula descendentes, ut carnis regeneratio ex fistula fiat; si vero majus quoddam os, uti brachium vel femur vel cubitus vel crus forte sit affectum, perforantes terebra quo usque tendit fistula sic scalpris tollemus partes medias inter foramina sitas; si vero accidit os usque ad medullam esse affectum excisionem quoque usque ad medullam faciemus; non solum ipsam morbosam partem excidentes, sed in-

σιν γενέσθαι· εἰ δὲ δι' ὅλην τὸ ὄστουν διανταίως πάθοι, χρὴ τὴν μεσότητά πάσαν ἀναιρεῖν.

4. Ὅ δὲ τῆς ἐκκοπῆς τρόπος τοῖος δὲ τις ἐστίν· ἐκκοπέα χρὴ τῶν στενῶν καὶ πάχος ἱκανὸν ἔχόντων, οἷοι εἰσὶν οἱ καλούμενοι γομφωτῆρες, ἐρείσαντας κατὰ τὴν μεσότητά τοῦ διεφθορότος ὄστοῦ, ἰσχυρότερον ἐπικρούειν ἢ περ ἐν ταῖς ἄλλαις περιστάσεσιν, ἵνα καταβῆς εἰς τὸ βάθος, διαλύσῃ τὴν συνέχειαν τοῦ ὄστοῦ· καὶ ἂν μὲν εἰς ἐκκοπέου ἐξαρκέσῃ, τὰ ἐξῆς συντελεῖν· ἂν δὲ μὴ δύνηται ἀποκυλισθῆναι ὑπὸ ἑνός, καὶ δευτέρον παραληπτέον κἄν δέη ποτὲ, καὶ τρίτον διακοπέντος δὲ τοῦ ὄστοῦ, τὸ ἕτερον τῶν μερῶν αὐτοῦ κατὰ τὸ πέρασ τῶν ἀντεχόντων σωμάτων γυμνωτέον· καὶ μετὰ τοῦ γυμνωθῆναι τοσοῦτον, ὅσον παραλλάξαι προελοῦμεθα, δύο ληπτέον τελαμώνας στενοῦς \* εὐτόνου· τοῦ μὲν οὖν ἑνός τὴν μεσότητά περιβλητέον περὶ ἄκρον τὸ ὄστουν πρὸς τὸ ἐπισπάσασθαι τὸ καὶ ἐξάγειν αὐτὸ τῆς σαρκὸς δύνασθαι· τοῦ δὲ ἑτέρου τὴν διπλὴν τῆ σαρκὶ τοῦ βραχίονος περιθετέον πρὸς τὸ ἐπὶ θάτερα τείνειν· ἔπειτα μνηγιγαφύλακα ὑποβάλλοντες ἠσπάθην τῶν ξυλίνων τούτων· ἢ καὶ τι ἕτερον ὁμοιοειδὲς τούτοις σῶμα κατ' ἐπικόπῃ (1) τούτων τινὸς πρίονι ἀποπίσσομεν πᾶν τὸ ἐφθορὸς τε καὶ ὑπερέχον ἕξω τῆς σαρκὸς τοῦ ὄστοῦ· ἀκώλυτος γὰρ ὁμοῦ καὶ ἀβλαβὴς ἢ πρίσις ἔσται διὰ τὰς τῶν τελαμώνων

Γρ. λεπ-  
τούς.

(1) Κατ' ἐπικόπου φασὶ ὅταν τι ὑποβληθῆ καὶ κατ' αὐτοῦ ἡ τομὴ γένηται.

super etiam aliquid sanae partis comprehendentes, ut facilis sit hac ratione carnis generatio; si autem in universum per totam crassitudinem patiat os, oportet mediam partem totam auferre.

4. Ratio autem excidendi talis quodammodo est; scalprum oportet tenuem et idoneam crassitatem habentem, quales sunt qui *compactores* dicuntur, defigentes in medio corrupto osse, validius impellere quam in aliis circumstantiis, ut ad fundum descendens solvat cohaerentiam ossis; atque si unus quidem scalper sufficit, quae dein conveniunt simul facere; si vero nequeat ab uno extorqueri, adsumendus et secundus; atque si forte opus est, et tertius; perforato osse altera ejus pars in fine integumentorum illud retinentium denudanda; et postquam denudata est tanta pars quantam a statu sano aberrasse statuemus, duae fasciae exiguae firmaeque sunt adhibendae; alterius quidem media pars circumjicienda est intimo ossi, ut illud extrahere et e carne educere possimus, altera vero duplicata brachii carni est circumducenda, ut ad alteram partem trahatur; dein meningophylacem subjicientes vel spatham ex ligneis illis vel etiam aliud quoddam corpus ejusdem generis ac haec ut fulcramento (1) illorum quodammodo inserviat, terebra serrata excidemus omne os corruptum et extra car-

(1) Κατ' ἐπιτόπου dicunt, quando aliquid subjicitur et in illo incisio fit.

περιβολὰς καὶ τὴν τῆς σπάθης ἢ τὴν τοῦ μη-  
 νιγγοφύλακος ὑποβολήν· οὔτε τῆς σαρκὸς ὑπὸ  
 τοῦ πρίονος ἐνοχλωμένης, οἷα δὲ ὑπὸ τοῦ τε-  
 λαμῶνος ἀφελκομένης· οὔτε τοῦ ὀστοῦ ἐγκρυπ-  
 τομένα τῇ σαρκί, ἅτε ἀνατεινομένα διὰ τῆς ἐτέ-  
 ρας ταινίας.

5. Ἀποπρισθέντος δὲ τοῦ ἐτέρου μέρους, πᾶ-  
 λιν ἐπὶ τὸ ἕτερον διαβατέον· καὶ τὸν αὐτὸν τρό-  
 πον καὶ ἐκείνου τὸ διεφθορὸς καὶ ἐψιλωμένον,  
 p. 36. ἀπολυτέον· τὰ δ' αὐτὰ ποιητέον καὶ εἰ μὴ  
 διεφθορέναι τὸ ὀστέον τύχοι· περιπλεῖσθαι δὲ  
 πάντοθεν ὑπὸ τῆς σύριγγος· οὐδενὶ γὰρ τρόπῳ τὰ  
 κατὰ κύκλον περιπλεόμενα σαρκωθῆναι δυνήσεται·  
 διὸ καὶ ἐπὶ τούτων διακοπτέον πρότερον, καὶ  
 τὰ ὀστέα ἀποκυλιστέον (1)· εἶτα οὕτως πᾶν τὸ  
 περιπλεόμενον καὶ γεγυγνωμένον ἐκπριστέον· ἦν  
 δὲ ἢ σύριγξ μὴ εἰς μέσον τὸ μήκος τοῦ ὀστοῦ  
 τύχοι καθήκειν, ἀλλ' εἰς τὸ πέρασ, ὥστε λύσαι  
 τὸ ἄρθρον, πᾶν τὸ πρὸς τῷ ἄρθρῳ τοῦ ὀστοῦ  
 μέρος ἐκκοπτέον· εἰ δὲ ὅλον τὸ τοῦ βραχίονος  
 ὀστοῦν διαφθαρεῖη μελανθὲν ἢ λιπανθὲν ἢ τερηθο-  
 νισθὲν, ἀπλοτομήσαντες μεγάλην διαιρέσει, πᾶν  
 τὸ ὀστοῦν κομισόμεθα.

6. Εἰ δὲ εἰς μέσον ἄρθρον ἢ σύριγξ καθήκοι,  
 ὥστε ἐκατέρω ὀστοῦ τὸ πέρασ φθεῖραι καὶ λύσαι  
 τὴν σύνδεσιν, δυσεργαστέρα μὲν ἤδη καὶ οὐ πᾶ-  
 νυ τί εὐκατόρθωτος (2) ἢ χειρουργία· χρὴ δὲ

(1) Γρ. ἀποκυλιστέον.

(2) Γρ. δυσεργαστέρα μὲν τὴ καὶ οὐ πάντῃ δυσκατόρ-  
 θωτος.

nem eminens; non impedita enim simul et innocua erit terebrae applicatio ob fascias circumjectas et meningophylacem subjectam; dum neque caro a terebra gravatur, quippe quae a fascia retrahitur, neque os sub carne latet, quippe quod extractum est ab altera fascia.

5. Ope terebrae autem sublata altera parte, rursus ad alteram transeundum; et eadem ratione quoque ejus corrupta et denudata pars solvenda, atque eadem facienda, etiamsi non corruptum esset os; verum undique fistula illud ambiret; nulla enim ratione quae in ambitu fistula circumdata sunt carne tegi poterunt; ideo et in illis dissecandum est prius et ossa extorquenda (1); dein omne circumdatum et denudatum terebra extirpandum; si fistula non ad mediam ossis longitudinem sed ad extremam perveniat, ita ut solvat articulum, tota ossis pars circa articulum est excidenda; si vero totum brachii os corruptum esset vel nigrefactum vel pinguefactum vel teredine affectum simplici magnaue sectione usi, totum os amputabimus.

6. Si autem ad medium articulum fistula deveniat, ita ut utriusque ossis extrema pars sit vitiata atque cohaerentia soluta, difficilior jam quidem neque omnino peractu facilis (2) est chirur-

(1) Gr. αποκαυλιστέον i. e. evellenda.

(2) Difficilior maneret neque omnino peractu difficilis.

ὁμοίως ἐγχειροῦντας ἑκατέρῃ τοῦ ὀστοῦ τὸ πέρασ  
τὸ ἐφθορὰς ἅπαν κομίσασθαι ἐπὶ μὲν τοῖ γε μη-  
ροῦ κατὰ κοτύλην λελυμένου καὶ συνδιεφθορείας,  
καὶ τῆς ἐν τῷ ἰσχύϊ κοτύλης, παραιτητέον τὴν  
χειρουργίαν, διὰ τὸ μέγεθος τῶν σωμάτων πα-  
ραιτητέον δὲ καὶ εἰ εἴς τινα τῶν τοῦ γωτιαίου  
σπονδύλων ἢ σύριγγι καθήκοι, φθείρασα τὸν σπόν-  
δυλον· εἰ δὲ εἰς πλευρὰν, οὕτω ποιήσομεν ὡς ἐν  
τοῖς περὶ ἀποστημάτων εἰρήκαμεν (1).

7. Ὅταν δ' ἐν τῷ πῆχει συστή, τὰ αὐτὰ  
γίγνεσθω τοῖς ἐπὶ βραχίονος· ἀλλ' ὁ μὲν βραχί-  
ων μονοειδὲς ὀστέον ἔχει· ὁ δὲ πῆχυς διζυγῆς  
ἐστὶ μέσης οὖν τῶν δυοῖν ὀστέων τῆς ὑποφθορᾶς  
οὐσίας, ἀνάγκην ἔχει ὁ ἐνέργων τὸ ἕτερον ὀστέ-  
ον ἐκκόψαι· ἐκκόπτεσθαι δὲ τὸ λεπτότερον, εἰ  
μὲν κατὰ γένηται πρὸς καρπὸν ὑποφθορὰ τοῦ πῆ-  
χεως· εἰ δὲ ἄνω, πρὸς ἀγκῶνι τὸ τῆς κερκίδος  
ἀντιθέτως γὰρ ἔχει τὰ τοῦ πῆχεως ὀστά· εἰ  
δὲ (2) εἰς μασχάλην καθήκοι, καὶ δέος εἶη μή-  
πως ἐν τῇ περιαιρέσει ἢν ἡξιοῦμεν ἐπὶ τῶν ἀντί-  
ων συρίγγων παραλαμβάνειν, ἀρτηρίαι τῶν εὐ-  
ρώστων ἢ φλέβες ἢ καὶ νεῦρα ὑποπέσωσι, τῆς  
μὲν περιαιρέσεως ἀποστησόμεθα· πλὴν εἰ μὴ τις  
ἐθέλοι τὴν ἐπιφάνειαν μόνην περικόπτειν, καθ-  
ήσομεν || δὲ τι τῶν ἐκτυλωτικῶν Φαρμάκων, ἵν'  
ἢ χρεῖα τῆς περιαιρέσεως ὑπαντήσῃ.

p. 37.

(1) Ἀπὸ τοῦ γ' τῶν Ἡλιοδώρου χειροτονημένων, κε-  
φάλαιον περὶ τῶν κατὰ τὸν πῆχυν καθῶν.

(2) Ἀπὸ τοῦ α' Ἀντίλλου, κεφάλαιον περὶ συρίγγων.

gia; oportet autem eodem modo manus admoventes utriusque ossis extremæ parti, omne vitiatum extirpare; in femore quidem si in cavo articulari sit solutum et simul corruptum, uti et in ipsius coxæ cavo articulari, chirurgia est omittenda ob magnitudinem corporum; omittenda autem et quando ad aliquam dorsi vertebram fistula devenit, corrumpens vertebram; si autem ad costam, eodem modo agemus ac de abscessibus agentes diximus.

7. Cum autem in antibrachio adsit, eadem fiant ac in brachio; sed brachium quidem uniforme habet os; antibrachium vero duplex est; in spatio autem inter duo ossa intermedio cum adsit vitium, necesse est chirurgum alterum os excidere; excidere autem tenuius oportet, si quidem in inferiori parte versus carpum adsit vitium antibrachii; si vero in superiore versus cubitum, os radium; opposita enim ratione se habent antibrachii ossa; si autem ad axillam penetret et metus adsit ne circumcisura, quam in externis abscessibus adhibere commendavimus, arteriæ validæ vel venæ vel etiam nervi occurrant, a circumcisura abstinemus; nisi quis velit partem superficialem solam circumcidere; imponemus aliquod remedium callum delens, ut vices gerat utilitatis circumcisuræ.



8. Τὰ δὲ αὐτὰ ποιητέον καὶ ἦν κατὰ βεβῶ-  
 νος ἢ τραχήλου ἢ σύριγγος ὑποπίπτει· καὶ μὲν τοὶ  
 κἄν εἰς ὄστούν ἐνερεῖται, δέοι δὲ ἐκκόπτειν τὸ  
 ὄστούν, ἀγγεῖα δὲ ἢ νεῦρα ἐμπελάζουσι τινὰ, οὐ  
 πρότερον τὴν ἐκκοπὴν ποιητέον, πρὶν διαπυῆσαι  
 περιαιρεθείσασιν τὴν σύριγγα· μετὰ γὰρ τὴν δια-  
 πύησιν, καὶ ἀναίμακτος καὶ ἀκίνδυνος ἡ ἐκκοπὴ  
 τῶν ὀστέων γίνεται· εἰ δὲ μεταξὺ ὠμοπλάτης καὶ  
 τοῦ ὑπ' αὐτῇ σώματος ἢ σύριγγος πλαγεῖα γέ-  
 νοιτο, τῶν ἀρχαίων ἀπιγορευκότων τὴν θερα-  
 πείαν ἡμεῖς ἐγχειροῦμεν τόνδε τὸν τρόπον· κα-  
 θέμεν διὰ τοῦ στομίου τῆς σύριγγος πλατυμή-  
 λης, ἐφ' ὅσον οἶόν τε προβῆναι αὐτὴν ἔπειτα  
 καθ' ἃ μέρη ὁ πυρὴν πλάγιος, πρὸς ἅπαντα  
 στοχαζόμενοι· καὶ ταῦτα χιεζοῦμεν τὰ ἱστορι-  
 σμένα σώματα τῆς ὠμοπλάτης· καὶ εἰ μὲν ἀναί-  
 μακτος ὁ χιεσμὸς γένοιτο, ἐκκόπτομεν τὸ κατ'  
 αὐτὸ μέρος τῆς ὠμοπλάτης· ἐκκόψαντες γὰρ ἐν-  
 τευξόμεθα τῷ πυρῆνι τῆς μήλης καὶ οὕτως ἀν-  
 ακολουθεῦντες ἐκτυλώσομεν τὴν σύριγγα· εἰ δὲ  
 ὑπὸ αἰμορραγίας ἐπὶ τῷ χιεσμῷ γενομένης, ἐμ-  
 ποδισθεῖν παραυτίκα ἐκκοπῆναι ἢ ὠμοπλάτη, δεῖ  
 τὴν διαπύησιν περιμείναντας, οὕτως ἐκκόπτειν.

9. Τὰς δὲ εἰς τὸ ἄρθρον τῆς γένυος ἀποτε-  
 λευτάσας ἀπαγορεύειν ἄξιόν· ἢ γὰρ γειννιάσις  
 τῶν τε μασητήρων καὶ τῶν κροταφιδῶν μυῶν,  
 οὐδαμῶς ἀκίνδυνον τὴν χειρουργίαν ὑπογράφει· τὰ  
 δὲ κάτω μέρη τῆς γένυος ὑπὸ σύριγγος φθαρέν-  
 τα εὐθεράπευτα· ὁ δὲ τρόπος τῆς ἐγχειρήσεως,  
 ὁ αὐτὸς τῷ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὀστέων εἰρημένῳ·  
 εἰ δὲ κατὰ τὴν ὑπερώαν ἐκ τῶν ἐνδοθεν μερῶν

8. Eadem autem et facienda, si in inguine vel in collo fistula occurrat; atque si ossi quidem innitatur oporteatque excidere os et vasa aut nervi quaedam sint in propinquo, non prius excisio est perficienda quam suppuratio orta sit in circumcisa fistula; post suppurationem enim et sine sanguinis effusione et sine periculo fit excisio ossium; si autem inter scapulam eique supposita corpora fistula adsit obliqua, antiquis sanationem negantibus, nos manus admovemus sequenti ratione; imponimus per fistulae aperturam specillum latum quo usque progredi potest illa; dein in illis partibus versus quas capitulum specilli tendit, omnia spectantes, in illis etiam incisura decussata findemus corpora scapulae imposita; atque si cruenta quidem non sit incisura, excidimus suppositam scapulae partem; excidentes enim incidemus in capitulum specilli, atque sic quae dein conveniunt facientes, callum debemus fistulae; si autem sanguinis effusione sub incisione superveniente impediatur quominus statim excidatur scapula, oportet suppurationem expectantes, tunc demum excidere.

9. In articulum autem maxillae desinentes dignae sunt ut sanatio recusetur; vicinitas enim musculorum maseterum et temporalium haudquam periculi expertem praebet curationem; inferiores autem maxillae partes a fistula corruptae facile curantur; ratio autem agendi eadem est quam in aliis ossibus memoravimus; si autem in palato ab internis partibus orta fistula corrupe-

συστάσα ἢ σύριγγι φθείρει τὸ ὄστον, εἰ μὲν διὰ πάχους ἐκ τῶν ἔξωθεν μερῶν καὶ τὰ μῆλα χιάσαντες οὕτως ἐκκόψομεν τὸ ὄστέον· εἰ δὲ μὴ πᾶν φθαρεῖ τὸ ὄστον, μόνη δὲ ἢ ἔνδοθεν ἐπιφάνεια, τὸ μὲν ἐκκόπτειν ἀνεπιτήδειον. οὔτε γὰρ ὄλον αἰρεῖν ἐκεῖνο οὐ μέρος ὀλίγον πέπονθε, εὐλογον· οὔτε αὐτὸ το πεπονθὸς ἐκκόπτειν, δυνατόν· πῶς γὰρ ἂν τις διὰ τοῦ στόματος ποιοίτο τὴν ἐκκοπὴν;

10. Χρὴ τοίνυν ἐκ τῶν ἔνδοθεν μερῶν περιελόντας τὴν σάρκα καὶ γυμνώσαντας τὸ πεπονθὸς ὄστον καίειν, ὅπως ἀποστῆ λεπίς· καίειν δὲ

p. 38. | τὸν τρόπον τοῦτον χαλκοῦν αὐλίσκον κατασκευάσθαι χρὴ παραπλήσιον κατὰ τὴν κοιλότητα τοῖς καλάμισκοις καλυμένοις· τετρήσθω διανταίφ τρήματι, καὶ μὴ προσκείσθω πυθμὴν· ἐχέτω δὲ καὶ καμπὴν ὁ αὐλίσκος μὴ γαμμοειδῆ· τὸ γὰρ τοιοῦτο σχῆμα πρὸς τὴν χρεῖαν ἄθετον· ἀλλὰ μνηοειδῶς πᾶς ἐπινενεύεσθω πρὸς τὸ ἐντιθεμένον τῷ στόματι τὸ στομίον αὐτοῦ ἐνερεῖδειν εἰς τὴν ὑπερώαν ἄνω· μῆκος δὲ τοῦ αὐλίσκου τοσοῦτον ὥστε τοῦ ἐτέρου πέρατος ἐνερεῖδοντος εἰς τὸ πεπονθὸς μέρος τῆς ὑπερώας, τὸ ἔξωθεν τῶν ὀδόντων ὑπερέχειν δακτύλοις τρισὶ· ἔπειτα καυτήριον κατασκευαστέον ὁμοίωσχημον τῷ αὐλίσκῳ, πρὸς τὸ διοδεύειν δύνασθαι δι' αὐτοῦ· κατὰ δὲ τὸ ἄκρον τὸ καυτήριον μὴ πυρῆνα ἐχέτω, ἀλλὰ βάσιν ἐπίπεδον ἐξ ἀποτομῆς ἐπὶ τῆς χρεῖας οὖν ἐνθετέον τὸν αὐλίσκον εἰς τὸ στόμα· καὶ ἀνανεύσαντες αὐτοῦ τὴν καμπὴν εἰς τὴν ὑπερώαν, ὥστε ἐφιδράσθαι τῷ πεπονθῶτι τοῦ ὁστέου, πυρακτώσαντες

rit os, si profunde quidem, ab externis partibus decussata incisione fissis malis, sic excidemus os; si autem non totum corruptum sit os, verum unica interna superficies, excisio quidem non convenit; neque enim totum illud tollere idoneum est, cujus exigua pars affecta est, neque affecta pars excidi potest; quomodo enim quis per os faciet excisionem?

10. Oportet itaque ab internis partibus circumcidentes carnem et denudantes affectum os, sic urere, ut abscedat crusta; urere autem sequenti ratione; tubulum aeneum parare oportet similem quod ad cavitatem attinet illis qui parvi calami dicuntur; perforetur foramine pervio neque adsit fundus; habeat autem et curvaturam tubulus non ad figuram literae  $\gamma$ ; talis enim figura usui non est apta; sed ad figuram lunatam totus incurvetur ut ejus apertura ori impositi palato nitatur superne; longitudo autem tubuli tanta sit ut altera ejus extremitate affectae palati parti innitente, altera exterior extra dentes promineat tribus digitis; dein cauterium parandum ejusdem figurae ac tubulus, ut per eum transire possit; summum autem cauterium non habeat capitulum, sed fundum planum a resectione; sub usu igitur tubulus imponendus est ori; atque sursum vertentes ejus curvaturam ad palatum, ut incidat in affectum os, candefacientes cauterium, illud imponemus trans tubulum; et ossi illud applicantes uremus; sic enim nullum circumjacens corpus ab ustione gravabitur; non

τὸ καυτήριον καθήσομεν διὰ τοῦ αὐλίσκου· καὶ  
προσαρμόσαντες τῷ ὀστέῳ καύσομεν· οὕτως γὰρ  
οὐδὲν τῶν πέριξ σωμάτων ὑπὸ τῆς πυρώσεως ἐνο-  
χληθήσεται· οὐ μόνον δὲ ἐπὶ ὑπερώας ἐστὶν οὗ-  
τος ὁ τρόπος ὁ τῆς ὀριγανοποιίας εὐθετος, ἀλλὰ  
καὶ ἐπὶ πάντων ὀστέων, ὅσα δεῖται μὲν καύσεως,  
γεινιᾶ δὲ νεύροις ἢ ἄλλοις κυρίοις τισὶ σώμασιν.

11. Ὅσαι δὲ εἰς βρόχον καθήκουσι σύριγγος  
ἐξωθεν τὴν ἀρχὴν ἐκ τοῦ τραχήλου λαβοῦσαι, οἱ μὲν  
ἀρχαῖοι ἰατροὶ ἀπηγόρευον, ἡμῖν δὲ ἀρέσκει μυρσι-  
νοειδῶς περιελόντας αὐτάς, καὶ τοῦ βρόχου πε-  
ριγλύψαντας τὸ ἐφθορὸς, ἀπάγειν τὸ δέρμα καὶ  
ζυγοῦν. ἐνίοτε γὰρ εὐστοχεῖται τὰ περὶ τῆς κολ-  
λήσεως· τὰς δ' εἰς τὴν εὐρυχωρίαν τοῦ θώρακος  
κατιούσας, καὶ ταύτας ἀπηγόρευσαν οἱ παλαιοί·  
ἡμεῖς δὲ εἰ μὲν ὁ πνεύμων ἰσχυρῶς ὑπὸ τῆς σύ-  
ριγγος ἐνοχληθῆναι τύχοι, ἢ καὶ τοῦ ὑπεζωκότος  
ὑμένοσ πολὺ τι μέρος, καὶ αὐτοὶ παραιτησόμεθα.  
εἰ δ' ὀλίγον ὁ ὑπεζωκὸς πάθοι, ὥστε αὐτῷ μόνῳ  
p. 39. σύντηξιν γενέσθαι, παραπλησίως ἐγχορήσομεν·  
ὥσπερ καὶ ἐπὶ || τῶν εἰς βρόχον κατατεινησῶν.

12. Ἐπὶ δὲ τῶν εἰς ἔντερα, εἰ μὲν καὶ αὐ-  
τῶν τι τῶν ἐντέρων ἀναστομωθείη, δηλονότι ἀπα-  
γορεύσομεν· εἰ δὲ μόνον τὸ περιτόναιον, περιελόν-  
τες, εἰ μὲν ἐνδέχοιτο, μυρσινοειδῶς, ἐναίμως  
ἄξομεν, χρησάμενοι τῷ τῆς γαστρορραφίας τρό-  
πῳ, ἧς τὸ εἶδος ἐν οἰκείῳ τόπῳ παραδείξομεν·  
εἰ δὲ μὴ ἐπιδέχοιτο τὸ σχῆμα τῆς σύριγγος μυρ-  
σινοειδῆ περιαιρέσιν κυκλωτερῆ, περιγράψαντες  
τὸν κατὰ συνσάρκωσιν τῆς θεραπείας ἐπάξομεν  
τρόπον· περὶ δὲ τῶν εἰς φλέβαν ἢ ἀρτηρίαν, εἰ

solum autem in palato haec ratio instrumenta adhibendi est probanda, verum et in omnibus ossibus, quaecunque ustione indigent et vicina sunt nervis aliisque magni momenti corporibus.

11. Quaecunque autem ad asperam arteriam deveniunt fistulae extra a collo initium capientes, illarum sanationem quidem prisci medici denegabant, nobis vero sufficit ad formam myrtei folii illas circumcidentes et asperae arteriae circumscribentes corruptam partem, retrahere cutem et conjungere; nonnunquam enim bene succedunt quae ad conglutinationem pertinent; ad cavum autem pectoris devenientium, illarum quoque sanationem recusabant antiqui; nos autem si pulmo quidem graviter a fistula laesus sit, vel etiam substratae membranae magna quaedam pars, sanari illas posse negabimus; si parum vero substrata patiatur, ita ut solummodo sit perforata, eodem modo manus admovebimus ac fistulis ad asperam arteriam tendentibus.

12. In illis quae ad intestina penetrant, si ipsorum quidem intestinorum etiam aliquid sit apertum, certo sanationem recusabimus; si vero unicum peritoneum, circumcidentes, si liceat quidem, sub forma myrtei folii, cruenta ratione agemus, utentes gastrorrhaphiae ratione, cujus formam idoneo loco indicabimus; si autem figura fistulae non admittit circumcisuram sub figura myrtei folii, circulari incisura illam circumscribentes, adhibebimus curandi rationem carnis in-

μὲν εἴη μεγάλη, παρεδείξαμεν ἤδη ὅτι διὰ Φαρμακείας ἐκτυλοῦν καὶ ἀποθεραπεύειν χρὴ τὰς τοιαύτας· ἐπὶ δὲ τῶν μικροτέρων, ἕξῃστι μὲν καὶ περιαιρέσει. βέλτιον δὲ καὶ κούσει χρῆσθαι· οἱ τε γὰρ τύλοι ὑπὸ τῆς καύσεως ἐκδαπανῶνται· καὶ ἐν τῷ παραυτίκα μεταβάλλουσιν εἰς ἐσχάραν, ἀναίμακτός τε ἡ ἀποθεραπεία γίνεται.

13. Τὰς δὲ εἰς νεῦρον (1) περαιωνόμενας πάσας διὰ Φαρμακείας θεραπευτέον· τὰ δ' ἐν τοῖς οὖλοις συρίγγια ἐπιδιαίρεισθαι χρὴ· ἐξαπλωθέντα γὰρ θεραπεύεται ὡς ἔλκη· ἂν δὲ δυσανασχῆτῃ ὁ πάσχων, ἐξαιρέισθω ὁδούς· ἅμα γὰρ τῇ τοῦ ὀδόντος ἐξαιρέσει τὸ συρίγγιον ἀνασταλήσεται καὶ τὸ οὖλον συμπεσεῖται· ἐπὶ δὲ τῆς ἕδρας (2) Φανερᾶς μενούσης τῆς σύριγγος ἔξω τοῦ στόμακος παρὰ τῷ δακτυλίῳ, ἔνδοθεν δὲ τοῦ δακτυλίου συντετριμμένα, ὁ τῆς μηλωτρίδος πυρὴν εἰς τὸ στόμιον ἐντιθέσθω καὶ διωθεῖσθω τὸ ἔλασμα, ἕως κενεμβατήσῃ εἰς τὸν τῆς ἕδρας πόρον· εἴτ' ἐπιθεῖσθω εἰς τὴν ἕδραν ὁ λιχανὸς δάκτυλος τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς, καὶ δι' αὐτοῦ ἐκλαμβανέσθω ὁ τῆς μηλωτρίδος πυρὴν, καὶ ἀποτεινέσθω, καὶ τότε ἐκτεμνέσθω πάντα τὰ σεσυριγγωμένα, ὅλα τὰ ἐξηλειμμένα· κἂν Φανῆ τύλος ὑποκείμενος, ἀπὸ τῶν ὑγείων ἐντεμνέσθω.

14. Ἐὰν δὲ ἢ βαθυτέρα ἢ σύριγξ, συντετρι-

(1) Ἀπὸ τοῦ ἠ τῶν Ἡλιοδώρου χειρουργουμένων, κεφάλαιον περὶ τῶν ἐν οὖλῳ συρίγγων.

(2) Ἀπὸ τοῦ ὀ τῶν Ἡλιοδώρου χειρουργουμένων, κεφάλαιον περὶ τῶν ἐν ἕδρᾳ συρίγγων.

ductioni faventem; de fistulis ad venam vel arteriam penetrantibus, si magnae quidem sint, ostendimus jam tales ope medicaminum a callo purgari et sanari oportere; in minoribus vero licet quidem et circumcisura uti; melius autem ustionem adhibere; callus enim ab ustione deletur et confestim mutatur in crustam et sine sanguinis effusione fit cura secundaria.

13. Ad nervum autem penetrantes omnes ope medicaminum sunt sanandae; exiguas vero in gingivis fistulas findere oportet; plana enim facta sanantur uti ulcera; si autem aegre ferat aegrotus, extrahatur dens; simul enim cum dentis extractione fistula dilatabitur et gingiva concidet; in sede autem cum appareat fistula extra aperturam prope anum intusque anus sit perforatus, specilli capitulum aperturae immitatur; atque trajiciatur lamina, donec in vacuum perveniat sedis canalem; dein sedi imponatur digitus index sinistrae manus et ejus ope educatur specilli capitulum et attrahatur atque tunc omnia fistulosa quae sunt exsecentur, tota educta pars; atque si subjacens appareat callus, inde a sanis partibus in illo fiant incisurae.

14. Si autem profundior est fistula, perforato constrictore, vel fine intestini recti, si fieri quidem possit, specillo educatur ulceratio; atque



μένε τοῦ σφιγκτῆρος, ἢ τοῦ πέρατος τοῦ ἀπευ-  
 θυσμοῦ, ἐὰν μὲν ἢ δυνατὸν, τῇ μηλωτρίδι ἐκλαμ-  
 βανέσθω ἢ ὑποφορά· καὶ τότε ὁ μὲν σφιγκτῆρ ἀπο-  
 τεινέσθω· ὁ δὲ δακτύλιος περιαιρείσθω· σφιγκτῆρ γὰρ  
 p. 40. ὅλος διὰ βάθος περιαιρεθεὶς, οὐ συμφύεται, ἀλλὰ  
 τῆς τοῦ σκυβάλε ραιάδος αἴτιος γίνεται· ἐὰν δὲ  
 ἐκτρέπεσθαι μὴ δύνηται ὁ σφιγκτῆρ σὺν τῷ δακτυ-  
 λίῳ διὰ πάχος καὶ τὴν ἀπῆνειαν τῶν σωμάτων,  
 καθιέσθω ἢ μηλωτρίς εἰς τὸ βάθος ἕως οὗ κενεμ-  
 βατήσῃ, καὶ τῷ δακτυλίῳ καθεσθέντι γυμνὸν  
 προσπέσῃ τὸ τῆς μηλωτρίδος ἔλασμα· ἐπικόπη  
 δ' ὄντος τοῦ ἔλασματος, τὸ τῆς ὑποφορᾶς βάθος  
 ὑποδαιρείσθω, τοῦ ἀπευθυσμένου λέγω καὶ σφιγ-  
 κτῆρος.

15. Πρὸς δὲ τὴν ἐπιδαιρείσιν, τῷ λιχανῷ  
 δακτύλῳ συγκαθιέσθω ἢ τοῦ ἡμισπάθου ἀκμῆ τοῦ  
 ὑπὸ τινῶν κατεσκευαζομένη σφιγγοτόμῃ καὶ ἔσω-  
 θεν ἔξω ἀγομένη ἢ ἀκμῆ, δαιρείτω τὸ τῆς ὑπο-  
 φορᾶς βάθος· ἐπιδαιρεθέντος δὲ τοῦ σφιγκτῆρος,  
 κομιζέσθω μὲν ἢ ἀκμῆ· τῷ δὲ λιχανῷ δακτύλῳ  
 ἐκλαμβανέσθω ἔσωθεν ἔξω τὸ τῆς μηλωτρίδος  
 ἔλασμα· ἵν' ὁ σεσφιγγωμένος δακτύλιος κατὰ  
 τὴν μεσότητά γένηται τοῦ τῆς μηλωτρίδος ἔλασ-  
 ματος, καὶ πάλιν γένηται ἢ ἐκτομή κατὰ τὸν  
 ἱστορημένον τρόπον· ἀσυντρήτῃ δ' οὔσης τῆς ὑπο-  
 φορᾶς, τὸ τῆς μηλωτρίδος ἔλασμα καθιέσθω· καθιέ-  
 σθω δὲ καὶ εἰς τὴν ἔδραν ὁ λιχανὸς, ἵν' ἐκ διαδόσεως  
 τῆς ἀφῆς γινώσκῃ ὁ σημειούμενος τὸ πάχος τῶν  
 σωμάτων· κὰν μὲν ἢ λεπτὰ, συντητράσθω κατὰ  
 τὸ πέρασ ἢ ὑποφορά· συντητράσθω δὲ ἢ τῇ μη-

tunc constrictor quidem deorsum tendatur ; anus vero penitus incidatur ; constrictor enim totus , cum profunde incidatur , non coalescit , sed faecum effluvii causa fit ; si autem educi nequeat constrictor simul cum ano ob crassitiem et duritatem corporum , immittatur fundo specillum , donec in vacuum perveniat canalem et obiectum anum attingat nuda specilli lamina ; fulcimento autem dum inserviat lamina , leves fiant incisurae in fundo ulcerationis , intestini recti nempe et constrictoris.

15. Ut autem fiat incisio accedens , una cum digito indice imponatur semispatulae cuspis quae a nonnullis paratur ad fistulas incidendas ; atque ab interna parte extrorsum ducta cuspis findat ulcerationis fundum ; simul vero fisso constrictore , retrahatur quidem cuspis ; indice autem digito educatur ab interna parte extrorsum specilli lamina , ita ut anus fistulosus situs sit sub media specilli laminae parte atque iterum fiat excisio ratione modo dicta ; impervia autem cum sit ulceratio , specilli lamina immittatur ; immittatur et sedi index , ut indicatione tactus percipiat observator crassitiem corporum ; atque si tenuia quidem sint , perforentur in fine ulceratio ; perforentur autem vel specillo vel instru-

λωτρίδι, ἢ τῆ ὀξείᾳ· καὶ μετὰ τὴν σύντρησιν,  
ἐκλαμβανέσθω τὰ εἰρημένα.

16. Ἐὰν δὲ ἢ παχέα τὰ μετὰ τῆς ἔδρας  
καὶ τῆς ὑποφορᾶς σώματα, τοπικὴ γινέσθω τῆς  
σύριγγος ἀναστολή. παχύτατα γὰρ σώματα ἐκ-  
τεμνόμενα αἰμορραγίαν δυσκράτητον ἐμποιεῖ. ἅμα  
δὲ καὶ διὰ τὸ βάθος τῆς ἐκτομῆς, δυσχερὲς συσ-  
σάρκωσιν γενέσθαι· ὅταν δὲ ἢ κεχωρισμένη ἢ  
σύριγγε τῆς ἔδρας πλησιάζουσα τῷ ἰσχύῳ, πρό-  
\* Cod. δὲ. τερον αὐτὴν ἰπποτηρίῳ ἀνευρύνειν δεῖ\*, καὶ τότε  
ὄλον ἀπὸ τῆς ἐπιφανείας ἕως τοῦ βάθους ἀνα-  
στέλλειν, ἐκτέμνειν τὰ χεῖλη· ὅσον γὰρ  
ὑγιάζεται ἢ ἀναστολὴ μεμυρισμένη κατὰ τὸ βά-  
θος, ἐπὶ τοσοῦτον συντομωτέρα γίνεται ἢ συσ-  
σάρκωσις· ταῦτα φρονοῦμεν ἐπὶ τῶν εὐθειῶν συ-  
ρίγγων.

17. Ἄνω δὲ τῆς σύριγγος ἐσχηματισμένης  
p. 41. κατὰ τὸ σχῆμα καὶ τὸ βάθος τῆς ὑποφορᾶς ἢ  
ἢ ἀναστολὴ γινέσθω· ἔαν δὲ πλησιάζῃ ἢ ὑποφο-  
ρὰ τῷ τῆς κύστεως τραχήλῳ, ἐγκειμένης τῆς  
μηλωτρίδος τὴν σύριγγα, καθιέσθω διὰ τῆς οὐρή-  
θρας πρὸς τὴν ἡλικίαν καθετῆρ, ἢ ἐν τῇ χειρ-  
εργίᾳ δια τῆς ἀφῆς ἐκ διαδόσεως τοῦ καθετη-  
ρίου, ἀντιλαμβανόμενοι τοῦ τῶν σωμάτων πάχους,  
ἀσύντρητον φυλάξωμεν τὸν τῆς κύστεως τράχη-  
λον· κάτω δὲ τῆς σύριγγος ἐσχηματισμένης, καὶ  
τοῦ ἱεροῦ ὅστέα λελιπασμένη ἢ τετερηδονισμένη,  
οὐ δεῖ αὐτὸ δεδοικέναι διὰ τὸ ὄνομα· οὐ γὰρ  
ἔστι κύριον, ἀλλ' ἔαν ἐπιζητῆ ἐκκοπὴν ἐνεργεῖν,  
καθὼς ἐδηλώθη ἐπὶ τῶν ἄλλων τετερηδονισμένων  
ὁστέων. κρυπτῆς δὲ σύριγγος γενομένης ἐν δακ-

mento acuto; et post perforationem, educantur dicta.

16. Si autem crassa sunt corpora sedi et ulcerationi interposita, localis fiat fistulae explanatio; crassissima enim corpora sanguinis effluvio devictu difficili causam praebent; simul autem propter profunditatem excisionis, aegre se habet carnis inductio; quando separata fistula sedis vicina est coxae, prius illam ope hippoterii dilatare oportet atque tunc integram illam inde a superficie usque ad fundum explanare et exsecare labia; quanto enim magis sensim contrahitur apertura in fundo durante sanatione, eo brevior est carnis inductio; haec cogitamus de rectis fistulis.

17. Cum autem sursum figurata sit fistula, secundum figuram et profunditatem ulcerationis fiat explanatio; si autem vicina sit ulceratio vesicae collo, specillo fistulae imposito, immittatur per urethram pro aetate catheter, ut sub operatione dum tactus ope sentiamus catheterem, de crassitie corporum certiores facti, imperfossum servemus vesicae collum; deorsum autem cum figurata sit fistula osque sacrum pinguefactum vel teredine affectum, non illi timere oportet ob nomen; non enim magnum habet momentum sed si illud requirat, excisionem instituere, sicut descripta est in aliis ossibus teredine affectis; abdita autem cum sit fistula in ano apertura intus sita, ulce-

τυλίω τοῦ μὲν στομίου ἔνδον ὄντος· τῆς δ' ὑπο-  
 Φορᾶς πλάτος τοῦ βάθους προσαναμετρηθέντος  
 ἔσῳθεν ἀπὸ τοῦ στομίου, ἀγκίστροις ἀποτεῖναι  
 δεῖ τὴν σύριγγα καὶ ὄλκω ἐκτέμνειν.

18. Ταῦτα μὲν οὖν δύναται γίνεσθαι ὅταν ἢ  
 ἔξῳθεν τοῦ δακτυλίου ἢ κρυπτῆ σύριγγι. ὅταν δὲ  
 βαθεῖα τυγχάνῃ, τὸν σφιγκτήρα σεσυριγγω-  
 κυῖα, ἢτοι ἀπὸ τοῦ δακτύλου ἀρξαμένη, καὶ ἐπὶ  
 πολὺ κεχωρηκυῖα, ἢ ἐν τῷ σφιγκτήρι κατεσκευ-  
 ασμένη, μετὰ τὴν δεδηλωμένην σημείωσιν τῷ  
 ἑδροδιαστολεῖ (1) διοπτρίῳ λέγω, διαστεῖλαι δεῖ  
 τὴν ἕδραν, ὡς γυναικείον κόλπον· εἴθ' ὅταν Φαι-  
 νερον γένηται τὸ τῆς σύριγγος στόμιον, δι' αὐ-  
 τὸ καθιέσθω ὁ τῆς μηλωτρίδος πυρῆν, καὶ διω-  
 θείσθω εἰς τὸ βάθος ἐπικόπη τε ὄντος τοῦ ἐλά-  
 σματος, ὅλη διαιρείσθω ἡ σύριγγι τῷ ἡμισπαθίῳ·  
 ταῦτα γινέσθω ἐπὶ τῶν μονοστόμων καὶ μονο-  
 σχιδῶν συρίγγων· τῆς δὲ σύριγγος πολυστόμου καὶ  
 μονοσχιδοῦς οὔσης, πρότερον ἐκτεμνέσθω πάντα  
 τὰ Φαινόμενα στόμια· γυμνωθεῖσα γὰρ ἡ τοῦ  
 κόλπου ἀρχὴ, μονοστόμιον καὶ μονοσχιδῆ σύριγγα  
 ἐνδείξεται· ὥστε πάλιν ἡμᾶς κατὰ δευτέραν  
 ἐπιβολὴν τοῖς αὐτοῖς ἔργοις χρήσασθαι τοῖς μι-  
 κρῷ πρόσθεν εἰρημένοις· ἐπὶ δὲ τῆς μονοστόμου  
 καὶ πολυκόπου τῆ δυνάμει ταῦτα ἐστὶν ἔργα·  
 ἐκτμηθέντος γὰρ τοῦ στομίου, γυμνωθεῖσαι αἱ  
 τῶν κόλπου ἀρχαί, πολυστομον καὶ πολυσχιδῆ  
 σύριγγα ἐνδείξεται.

(1) Ἐν τούτῳ τὸν ἑδροδιαστολεῖα μικρὸν διοπτριον  
 καλεῖ.

rationis plagam integram, profunditatem cum demetiti sinus intus inde ab apertura, fistulam nempe uncis detrahere oportet et tractu excidere.

18. Haec igitur fieri quidem possunt si vel extra anum sita vel occulta est fistula; si vero profunda sit, sphincterem perforans vel quidem ab ano incipiens et multum procedens vel in constrictore sit formata, post descriptam distinctionem instrumento ad anum dilatandum (1) speculo nempe, dilatare oportet sedem, uti pudendum muliebre; dein conspicua si sit fistulae apertura, per illam immittatur specilli capitulum et impellatur usque ad fundum; fulcimento dum inservit lamina, tota dissecetur fistula ope semispatulae; haec fiant in fistulis unica apertura unicoque canali instructis; fistula vero multas aperturas cum habeat verum unicum canalem, prius exsecentur omnes aperturae conspicuae; denudatum enim sinus initium fistulam praebebit unica apertura unicoque canali instructam; ut rursus nos secunda operatione eandem adhibeamus agendi rationem ac paulo ante descripsimus; in fistula vero unica apertura verum multis sinibus instructa quantum fieri potest haec sunt facienda; excisa enim apertura, denudata sinuum initia fistulam praebebunt multis aperturis multisque canalibus instructam.

---

(1) Hic instrumentum ad anum dilatandum parvum speculum vocat.

19. Κοινότερον δὲ ἐπὶ τούτων ἐξετάσαι δεῖ,  
 p. 42. πότερον τὰ μεταξὺ τῶν ὑποφορῶν σώματα λεπ-  
 τὰ ἔστιν ἢ παχέα ἵνα ἔαν ἢ λεπτὰ, συντημη-  
 θῆ πάντα καὶ γένηται μία ἔλκωσις· ἔαν δὲ πα-  
 χέα, ἐκάστη ὑποφορὰ καθ' ἑαυτὴν ἀνασταλῆ.  
 ἔαν δ' ἢ μὲν τις ὑποφορὰ ἄνω ἢ ἐσχηματισμέ-  
 νη, ἢ δὲ κάτω· ἄλλη δὲ πλαγία κεχωρισμένη,  
 κατὰ πολὺ τῶν συρίγγων παχέων ὄντων τῶν  
 μεταξὺ σωμάτων, ἐκάστη ὑποφορὰ καθ' ἑαυτὴν  
 ἀναστέλλεσθαι ὀφείλει· αἱ χειρουργαὶ εἰσὶν αὐ-  
 ται· μεθ' ἧς θεραπείαι ἐγκρινέσθωσαν ἀναξηραί-  
 νουσαι μὲν ὁστέον γεγυμνωμένον, λιπαίνουσαι δὲ  
 ὅταν ἢ ἐσκεπασμένα τὰ ὀστέα· τοῦ δὲ δακτυλίου  
 κατὰ πλείονα μέρη καθ' ὅλον τὸν κύκλον περιη-  
 ρημένα, ἵνα μὴ Φιμὸς γένηται· ἐν μὲν ταῖς πρῶ-  
 ταις ἡμέραις πριαπίσκος ἐντιθέσθω· ἐν δὲ ταῖς  
 ἐσχάταις πρὸς τὴν κατούλωσιν σωλὴν μολύβου  
 ἢ κασσιτήρινος γινέσθω, καὶ ἐντιθέσθω μέχρι  
 κατούλώσεως· καὶ μετὰ τὴν κατούλωσιν δὲ συμ-  
 φέρει βραδύναι τὴν τοῦ σωλήνος ἔνθεσιν πρὸς  
 ἀσφαλῆ καὶ βεβαίαν θεραπείαν (1)· καὶ ἐν δακ-  
 τύλοις ἀποστηματικά συρίγγια γίνονται, ὡς ἐπί-  
 παν ἐν ταῖς συναρθρώσεσιν· ἐφ' ὧν δεῖ, ἦτοι τὸ  
 ἀποστημάτιον, ἦτοι τοῦ συρίγγου τὸ στόμιον  
 κατὰ τετράγωνον σχῆμα τέμνειν· κἄν μὲν ἢ  
 ἀλιπῆ τὰ ὀστέα, μηδὲν περιεργάζεσθαι· λι-  
 πασμοῦ δὲ ὄντος, ἐκκόπτειν τὰς τῶν σκυταλί-  
 δων κεφαλίδας σμιλωτοῖς ἐκκοπεῦσι· εἴτ' ἐντι-

(1) Περὶ τῶν γυγνομένων κατὰ τοὺς δακτύλους· αὐτοῦ  
 ἐκ τῶν Λεωνίδου κεφαλαίων.

19. Magis generaliter autem in his inquirendum est, num corpora ulcerationibus interposita sint tenuia an crassa; ut, tenuia cum sint, simul omnia incidantur et fiant unica ulceratio; crassa vero cum sint, quaeque ulceratio seorsum explanetur; si autem alia ulceratio quidem sursum sit figurata, alia vero deorsum, alia autem oblique decurrens valdeque crassa sint corpora fistulis interposita, quaeque ulceratio seorsum explanari debet; operationes sunt hae; post quas curationes adoptentur exsiccantes quidem os denudatum, pinguefacientes vero si tecta sint ossa; ano autem pro maxima parte in toto ambitu circumsecto, ne impervius fiat; primis quidem diebus lignum oblongum imponatur; ultimis vero versus cicatricis inductionem tubus sit plumbeus vel stanneus et imponatur usque ad cicatricis inductionem; post cicatricis autem inductionem confert quoque tubi impositionem proferre, ut tuta sit curatio validaque; in digitis etiam parvae oriuntur fistulae abscessibus similes, ut in universum in articulis; in quibus oportet aut parvum abscessum aut ostiolum fistulae, ad figuram quadratam secare; atque si sicca quidem sint ossicula, nihil facere; pinguedo vero cum adsit, excidere ossiculorum longorum capitula ope scalpellorum excisoriorum vulgaribus scalpellis similium; dein imponere exigua linamenta carpta; et tunc motophylacem parvum vino

... (1)  
... (2)



θέναι μοτάρια τιλτά' και τότε μοτοφυλάκιον οινελαίω βεβρεγμένον και ἐπιθεῖν δεσμιδίω στενῶ' συνεπιθεῖν δὲ τὸν πλησίον δάκτυλον, ἵνα στηρίζεται ὁ κεχειρουργημένος· τῷ δὲ μεγάλῳ τῷ ἀντίχειρι νερθήκιον ἢ Φιλύριον σανίδιον συνεπιθεδέσθαι στηριγμοῦ χάριν.

20. Τῶν (1) δὲ ἐν τῷ ὁσχεῶ συρίγγων, ἢ μὲν κατὰ τὰ ἐμπρόσθια μέρη βαρυνθεῖσα (2) συντετρήσει τὸν ἐλυτροειδῆ χιτῶνα· ἢ δὲ κατὰ τὰ ὀπίσθια, τὰ κατὰ τὴν πρόσφυσιν· τοῦ μὲν οὖν ἐλυτροειδοῦς χιτῶνος συντετρημένα, ἅμα τῇ καθέσει διὰ τῆς συντρήσεως κετεμβρατεῖ ἢ μηλωτρίς· ὅταν δὲ ἐπεραιοθῇ τῷ διδύμῳ, νύξασα τοῦτον, σφοδρότατην ποιεῖ ὀδύνην· ἐπὶ δὲ τῆς κατὰ ὀπίσθεν μέρη ὁμοίως νυσσομένα τοῦ διδύμου, γίνεται ἀλγηδών· σχηματοποιεῖσθαι δὲ ὑπτίος ὁ πάσχω· ἔπειτα διωθεῖσθαι || τὸ ἔλασμα· ἐπικόπῳ τὲ χρώμενος αὐτῷ, ὅλην τὴν σύριγγα ἐξάπλω και ἐκτύλω· τῆς δὲ σύριγγος κατὰ τὰ ὀπίσθια μέρη γεγεννημένης, και τοῦ διδύμου κεκομμένα, ἀνάγκην ἔξομεν τῇ τῶν σκεπόντων σωμάτων ἀναστολῇ. και τὸν κεκακωμένον διδύμον ἀφελεῖν, διακρίσεως τῆς αὐτῆς γινομένης, και τῆς τῶν ἀγγείων ἀποσφίγξεως, ὡς πρόσθεν ἐδηλώθη.

p. 43.

(1) Ἐκ τοῦ αὐτοῦ.

(2) Γρ. βαρυνθεῖσα.

oleo mixto imbutum et adligare fasciola angusta ; simul autem adligare proximum digitum ut fulciatur qui a nobis tractatur ; magno autem pollicis assiculum ferulaceum vel tiliagineum simul adligare fulcimenti causa.

20. E fistulis in scroto alia in anterioribus partibus invadens (1) perforabit vaginalem tunicam ; alia vero in posterioribus partibus, partes juncturae vicinas ; vaginali quidem tunica igitur perforata, simulac per foramen immittitur, in vacuum locum pervenit specillum ; si autem testiculo insideat ; laedens illum, vehementissimum efficit dolorem ; in fistula autem posteriores partes afficiente eodem modo laeso testiculo, dolor adest ; decumbat supinus aegrotus sub operatione ; dein inducatur lamina ; tamquam fulcimento autem illo utens, totam fistulam explana et a callo purga ; fistula vero cum adsit in posterioribus partibus testiculusque affectus, necessitas nobis incumbit tegentia corpora explanandi ; et vitiatum testiculum extirpandi, diremptione eadem adhibita eademque vasorum constrictione, uti antea indicatum est.

---

(1) Gr. βαθυθρεσσα i. e. excavans.

## XV. (XIV.) Ἐκ τῶν Μέγητος (1) περὶ συρίγγων.

1. Θεραπεία δὲ τῶν συρίγγων ἢ μὲν διὰ Φαρμάκων, ἢ δὲ διὰ χειρουργίας, τρίτη δὲ ἢ διὰ τῶν βρόχων· χρήσις δὲ Φαρμάκων ξηρῶν ἢ κολυρίων ἢ ἐγχύτων ἢ ἐμπλαστῶν ἀποθήκειν δυναμένων, ἢ καυστικῶν· χειρουργία δὲ δύναται τεμεῖν, καῦσαι, περιελεῖν, ξύσαι, ὄστουν ἀνελέσθαι, τὸν χόνδρον ἐκλύψαι· τούτων δὲ τὸ μὴ καθ' αὐτὴν αὐτάρκης καὶ περιαιρέσις καὶ καύσις· τὰ δὲ ἄλλα ἐπὶ τούτοις ποιητέα, ἢ Φαρμάκοις γυμνῶσαι τὸ πεπονηθὸς ὄστουν δυναμένοις, ἢ τὸν χόνδρον· οἱ δὲ βρόχοι τὰς ἐνέδρας ἀπλᾶς οὔσας ἰῶνται, καὶ τινὰς τῶν πολυσχιδῶν ὀπίστας μὲν οὖν τῶν συρίγγων ἀπλαί τε εἰσὶ, καὶ ἐν σαρκὶ μὴ ἐνευρυσσωμένη μὴδὲ κοίλῃ καὶ ἀκινήτῃ, ἢ ἐπ' ὀλίγον συγκινεμένη, καλῶς ἂν θεραπεύοιντο Φαρμάκῳ· κἄν μὲν τύχωσιν ἐξ ὀλίγου τοῦ χρόνου ἐγγινόμεναι, ἐμπλαστοῖς ὅσαι τραυματικαὶ εἰσι, δι' ἀλόης ἢ στυπτηρίας ἢ ἰοῦ καὶ λεπίδος, καὶ τῶν μεταλλικῶν λεγομένων· τοῦ γὰρ ἐμπλαστοῦ Φαρμάκου σκωλήκιον ἀναπλάττοντα ἐντιθέναι, ὅσον μὲν (2) διασφηνῶσαι, μὲχρι αἷμα καθαρὸν ἀπέιη· εἶτα τὸ αὐτὸ Φάρμακον σπλήνιον ποιήσαντα ἐπιτιθέναι καὶ σπόγγον ὑπὲρ αὐτὸ ὄξει διά-

(1) Ὁ Γαληνὸς ἐν τῷ 5 τῆς Θεραπευτικῆς οἰδάνιον τὸν Μέγητα εἶναι φησί· ἄλλοι δὲ μαθητὴν αὐτὸν εἶναι Θεμισωνοῦ ἀναγράφουσι.

(2) Γε. μή.

XV. (XIV.) *E MEGETIS* (1) *LIBRIS DE FISTULIS.*

1. Cura autem fistularum partim fit ope medicaminum, partim ope manus, tertio autem ope laqueorum; adhibentur autem vel medicamenta sicca vel collyria vel infusa vel emplastra consumere quae possunt vel urentia; chirurgia autem potest secare, urere, extirpare, scalpere, os remove, cartilagine exscalpere; eorum autem per se non sufficiunt et extirpatio et ustio; reliqua vero insuper sunt facienda medicamentis quae vel os affectum denudare possunt vel cartilagine; laquei autem fistulas ani simplices sanant et nonnullas multifidas; quaecunque sane quidem fistulae simplices sunt et in carne sitae non rugosa neque cava et immobili vel quae parum tantummodo movetur, pulvere sanabuntur medicamentis; atque si paulo ante quidem natae sint, emplastris; quae a vulnere originem petunt ope aloës vel aluminis vel violae et squamae aeris vel illorum quae metallica dicuntur; ex illinendo enim medicamento vermiculum formans imponere oportet quantum quidem (2) ad instar cunei partes ambientes findit, donec sanguis purus exeat; dein idem medicamentum linamento illinentem super-

(1) Galenus in Libro VI de methodo medendi Sidonium vocat Megetem; alii autem illum discipulum esse Themisonis memoriae tradunt.

(2) Gr. μή i. e. non.

βροχόν· λύειν δὲ διὰ πέμπτης, καὶ διαιτῶν κρέας ὀπτὸν καὶ ἄρτον πεπονημένον, οἶνον δὲ πίνειν σάρκα αὐξήσαι δυνάμενον, καὶ κατακείμενον προαλείφεισθαι· ἀρμόσει δὲ ἂν πόρρω τοῦ θώρακος ἢ σύριγγι γένηται, δι' ἡμερῶν νῆστις ἕμετος, καὶ διὰ ραφανίδων ἐπιτηδεύομενος.

2. Ἄριστον δὲ Φάρμακον σύριγγι τὸ ἔμδον κολλύριον· ἔστι δὲ ἰοῦ ξυστοῦ δραχμαὶ δύο, καὶ θυμιάματος ἀμμωνιακοῦ ὄβολοι δύο· ὁ μὲν ἴδὸς ξηραίνεται· τὸ δὲ ἀμμωνιακὸν ὄξει διεθὲν, ὡς κόμμι ἐπιχυθὲν τῷ ἰῶ, καὶ μιγὲν ἀναπλάττεται καθιέναι δὲ χρῆ μέχρῃ αἷμα σταθιρὸν ἀποκριθῆναι· ἀπαντᾶ δὲ ὁ τύλος περὶ τῷ κολλυρίῳ· | χρῆ δὲ τὸ κολλύριον ἐνιέντα καταπλάσσειν τοῖς ἀνωτέρω γεγραμμένοις, ὅσα ψύχειν δύναται ἢ στύφειν ἡρέμα· τὰ γὰρ πλησίον τῆς σύριγγος, φλεγμαίνειν ποιεῖ· ποιεῖ δὲ καὶ τὸ καυστικὸν Φάρμακον, ὅταν βρέξας τίς ἔτι αὐτὸ πάπυρον ἢ σπόγγον ἐσκελετευμένον καθῆ· παρελθὼν γὰρ ἔκαυσε τὴν σύριγγα· ἐπ' ἀμφοῖν δὲ, κολλυρίῳ τε καὶ τοῦ καυστικοῦ, ἐγκλύζειν χρῆ τοῖς ἀνακαθαρτικοῖς περὶ ὧν εἴρηται.

3. Ἀποθήκει δὲ καὶ σκίλλα τιλτὸν ἐνεψθεῖσα κονία, ἣ χρώνται οἱ τοὺς πηλοὺς ἐργαζόμενοι· τήκει γὰρ ἐρρωμένως καὶ αἱμάττει (1)· καὶ Φάρμακα ὑγρὰ ἐκχεόμενα, τὰ μὲν ὡς ἔχει, τὰ

(1) Γε. καὶ αἱματεῖ.

imponere et spongiam super illud aceto madidam; solvere autem quinto quovis die et vesci carne assa et pane elaborato, bibere autem vinum carnem augere quod potest et insuper ungere quae jam adest; convenit autem si porro pectoris adsit fistula, quovis die vomitus jejunos et opè radicalium excitatus.

2. Optimum autem medicamentum in fistulis est meum collyrium; constat vero ex violarum rarsarum drachmis duabus et suffimenti ammoniaci obolis duobus; violae quidem exsiccantur; ammoniacum autem aceto dilutum tamquam gummi violis infusum et mixtum figuratur; demittere autem oportet donec sanguis firmus excernatur; undique enim callus collyrio obviam venit; oportet autem collyrium immittentem illinere medicamentis supra enumeratis quanta refrigerare et adstringere possunt sensim; in partibus enim fistulae vicinis inflammationem excitat; facit autem illud et causticum medicamentum, si quis madefaciens etiam ipsam chartam vel spongiam siccata demittat; praeteriens enim adurit fistulam; praeter utrumque autem et collyrium et causticum injectiones facere oportet depurantium de quibus jam dictum est.

3. Consumit autem et squilla vulsa cocta in pulvere, quo utantur qui lutum tractant; consumit enim valide et sanguinem educit; et medicamenta liquida effusa alia quidem uti se habent, alia vero cum vino, nonnulla autem cum aceto, cum diuturnae sint et callo obductae fis-

δ' οἶνω, ἔστι δ' ὅτε ὄξει, χρονίων καὶ διατύλων  
 οὐσῶν τῶν συρίγγων· καὶ ξηρὰ δὲ φάρμακα ὅταν  
 προανοίξῃ τίς ἰπποτηρίω τὴν σύριγγα, ἐμφυ-  
 σώμενα διὰ καλάμῃ, τὰ μὲν τήκει, ἅ δὲ ἐκά-  
 θάρην· ἔστι δὲ ἅ στεγνωτικά ὄντα τὸ ρεῦμα ἐπέ-  
 σχε· ξηρανθὲν δὲ τὸ ἕλκος κατούλωσεν· οἶδα  
 δὲ καὶ τοῖς σηπτοῖς φαρμάκοις, ὡσπερ καὶ τοῖς  
 καυστικοῖς, τύλης ἀφανισθέντας· ἔχριον δὲ τὸ  
 σεπτὸν περὶ τρύχας υἱίας συνδῶν αὐτάς, ἢ ἀλί-  
 σχοιον χρίων, παρήγον εἰς τὴν σύριγγα τέλος  
 γὰρ, τὸ μὴ ὑγιὲς τῆς σαρκὸς μηδὲ οἰκείον, ἐξα-  
 γαγεῖν· τὴν δὲ συγγενῆ ἀνακαθήραντες ἑάσαι  
 συνελθεῖν· τὸ δὲ λινὸν ἐπιτήθειον ταῖς ἐνέδραις  
 σύριγγιν ἀμφιστόμοις ἢ ἐν στόμα ἐχοῦσαις.

4. Χρὴ δὲ αὐτὸν διατρήσαι· ἔστω δὲ σοι μη-  
 λωτρίς ἐπ' ἄκρου τρήμα ἔχουσα, οἶον αἰ βελό-  
 ναι, τὸ κύαρ (1), ἢ οἶον ἕλικα πρὸς τῷ πέρατι,  
 καὶ εἰς σχῆμα κοχλίας βινοθήτω· εἰ γὰρ διὰ τοῦ  
 στόματος διεῖραι χρὴ τὸ λινὸν, καὶ ἐρρωμένως,  
 ἔστραμμένον, ὅσον δίστροφον ἢ τρίστροφον· κἄν  
 μὲν ἀμφίστομος ἦ, καθιέναι διὰ τοῦ ὀρωμένου  
 στόματος τὴν μηλωτρίδα σὺν τῷ λινῷ, καὶ διὰ  
 θατέρου, καὶ ἐντὸς εἰς ὃ περατοῦται ἢ σύριγγε,  
 στόματος ἐκλαβόντα τὸ ἄκρον τῆς μηλωτρίδος  
 σὺν τῷ λινῷ, καὶ διὰ θατέρου, καὶ ἐντὸς εἰς  
 ὃ περατοῦται ἢ σύριγγε, τὴν μὲν ἀρχὴν τῆς  
 ἀριστερᾶς χειρὸς τοῖς δυσὶ δακτύλοις, λιχα-

(1) Κύαρ ἢ κό τῆς βελόνης τρήμα, ὡς Ἑλλάδος, ἢ  
 τῆς πολλῆν χρῆσιν συναγαγεῖν δείκνυσαν ἐν τῷ κ σιδηροῦ  
 ἡ γρηται θί Ἰαποκράτης τῆ ἡξεί.

tulae; sicca autem medicamenta quoque si prae-  
 vie quis hippoterio fistulam aperuerit, inflata ope  
 calami, alia quidem consumunt, alia vero depu-  
 rant; adsunt autem quae adstringentia cum sint  
 fluxionem cohibent; exsiccatum autem ulcus ci-  
 catrice tegunt; scio autem et callum sublatum  
 esse adhibitis medicamentis putrefacientibus uti et  
 urentibus; illinebam autem putrefaciens circum  
 setas suillas colligans illas vel mariscum illinens  
 adducebam in fistulam; finis enim erat ut par-  
 tem carnis non sanam neque idoneam educerent;  
 normalem vero depurantes coalescere sinerent;  
 filum autem convenit in fistulis ani duabus vel  
 unica apertura instructis.

4. Oportet autem illud perforare; sit autem  
 tibi specillum in apice foramen habens, quale  
 acus, aperturam (1) nempe, vel quale annulus in  
 fine, etiam sub forma conchae nasum tuentis;  
 si quidem per illud foramen adnectere oportet  
 filum et fortiter contortum, ita ut bis vel ter  
 sit contortum; atque si utrimque habeat aper-  
 turam, demittere trans conspicuam aperturam  
 specillum cum filo et trans alteram, et intus quo  
 usque penetrat fistula, educentem per apertu-  
 ram apicem specilli cum filo et trans alte-  
 ram et intus quo usque penetrat fistula; initi-  
 um quidem ipsum sinistrae manus duobus di-

(1) *Kóag* vel acus foramen, uti Helladius, quod multam uti-  
 litatem afferre ostendit in vicesimo libro; Utitur et Hippocra-  
 tes vocabulo.



νῶ τε καὶ μεγάλῳ, κατασχέειν μηδὲν ἐφελ-  
 κώμενον, μὴ ὄλον σοι τὸ λινὸν διεκπέση διὰ  
 τοῦ || ἐντὸς τρήματος· τὸ δὲ μετὰ τοῦτο  
 καθ' ἐκάστην μηλωτρίδα ἀνακομίζον· ἔσται γὰρ  
 σοι τοῦ λινοῦ τὸ μὲν ἔξω ἀπαιωρούμενον ἄ-  
 κρον· τὸ δὲ, διὰ τοῦ ἐντὸς καὶ τῆς ἕδρας ἐξη-  
 λειμμένον· σύνδει οὖν αὐτὰ πρὸς ἀλλήλα ἀγκύλη·  
 τὴν σάρκα μὲν σφίγγων χαλαρώτατα χρῆσθαι  
 τῷ λινῷ· περιπατεῖτω δὲ, καὶ λυέσθω διὰ ἡμε-  
 ρῶν· μὴ πολλὰ δὲ ἐσθιέτω, μηδὲ ὡσπερὶ μηδὲν  
 κακὸν εἶχε διαιτάσθω.

5. Χρῆ δὲ τὸ λινὸν ἄπαξ ἢ δις τῆς ἡμέρας  
 διέλκειν, μὴ λυομένου τοῦ βρόχου· προσέχειν  
 δὲ τὸν νοῦν ὡς μὴ λάθῃ σαπὲν τὸ λινὸν, ἀλλὰ  
 διὰ τρίτης αὐτὸ ἀλλάττειν· λύσαντα γὰρ χρῆ  
 τὴν ἀγκύλην, λινὸν νεαρὸν τῆ ἔξω ἀρχῆ τοῦ πα-  
 λαιοτέρου προσθεῖν, καὶ τὸ ἐντὸς ἔλκειν, μέχρι  
 παρελθὸν τὸ νεαρὸν διὰ τῆς σύριγγος ὄλης τὴν  
 ἐτέραν ἀρχὴν διὰ τῆς ἕδρας περιβάλλῃ· εἶτα συν-  
 δεῖν ὁμοίως καὶ ταῦτα ποιεῖν· δύναται δὲ τὸ λι-  
 νὸν καὶ ὁ περίπατος τὴν πρὸ τῆς σύριγγος ἐπι-  
 φάνειαν ἅμα τὲ διαιρεῖν, καὶ τὸ διαιρεθὲν ἐπό-  
 μενον καταλοῦται· οὗτος ὁ τρόπος μακρὸς μὲν  
 ἔστιν ἐν θεραπείᾳ, ἄλλως δὲ ἀνώδυνος· τοῖς δὲ  
 βυλομένοις θάττον τῷ λινῷ θεραπεύεσθαι προσή-  
 κει· πρίζειν τὴν σάρκα· ἐμπρίζεται γὰρ, ἀλλὰ  
 μετ' ὀδύνης· καθιέναι δὲ εἰς τὴν νύκτα σπόγγια  
 ἐσκελετευμένα, ὑφ' ὧν τεινόμενον τὸ δέρμα λεπ-  
 τὸν ἔσται· τὸ δὲ λινὸν εὐπετῶς δι' αὐτοῦ καὶ τῆς  
 σαρκὸς αἰσθήσεται· ἐὰν δὲ ἐπιταχύνειν βυληθείης,

gitis, indice et magno, retinere nullo modo attrahentem, ne totum tibi filum excidat per interius foramen; posthac sane quovis die specillum educ; erit enim tibi fili altera extremitas extra dependens; altera vero per interiores partes et per anum exterius relictæ; colliga igitur illa inter se ope lori; carnem enim adstringens laxissime utere filo; deambulet et lavetur quovis die; ne autem multum edat neque degat ac si nihil mali haberet.

5. Oportet autem filum semel vel bis de die transducere, non soluto laqueo; animum autem attendere, ne occulte putrefiat filum, sed tertio quovis die illud mutare; soluto enim loro oportet filum novum extremitati extra sitæ veterioris adligare et intus sitam attrahere, donec præteriens per fistulam ab altera ejus parte ano circumdetur novum; dein colligare eodem modo ac eadem facere; potest autem filum et ambulatio partes ante fistulam conspicuas incidere; simul et pars locum incisum sequens cicatrice obtegatur; illa quidem methodus longa est in arte sanandi, ceteroquin autem dolore caret; illis vero, qui citius filo curari volunt convenit carnem quasi serra secare; hac ratione enim secat sed cum dolore; immittere autem noctu spongas exsiccatas a quibus tensa cutis tenuis erit; filum autem facile per illam et carnem percipitur; si vero accelerare velis, illine

χρίε τῶν γεγραμμένων τινὶ Φαρμάκων τὸν σπόγγον ἅμα δὲ τῷ πάχει καὶ τῇ ὀδύνη προσθήσεις.

XVI. (XV.) Ἐκ τῶν Ἀρχιγένους περὶ γαγγραιῶν (1).

- p. 48. 1. Τὸ μὲν γαγγραινούμενον αὐτὸ μὲν ἐστὶ πελιδνόν· ἔχει δὲ κύκλω μηλίζοντα, καὶ πελιούμενα, τρεπόμενά τε εἰς τὸ χλωρόν· τὸ δὲ περὶ τῷ χλωρῷ λευκὸν τὲ καὶ ῥυσσόν, καὶ τὸ περὶ τούτοις μετέωρον καὶ ἀτρέμα ὑπερυθρόν· μετέπειτα δὲ τὸ μὲν χλωρὸν πελιοῦται, τὸ δὲ λευκὸν χλωρὸν γίνεται, τὸ δ' ἔρυθρόν ἀπολευκαίνεται, τὸ δὲ πελιδνὸν κατὰ τὴν ἀφὴν ἀναίσθητον καὶ ξηρὸν γίνεται· ἔπειτα μελαιίνεται καὶ σήπηται· ἐπὶ δὲ μεγέθει Φλεγμονῆς καὶ τραύματος σομφότης τε καὶ ψόφος οἶονεὶ πνεύματος ὑπίοντος γίνεται· ἀτὰρ καὶ Φλυκτίδες ἐπαίρονται· καὶ ἡ μὲν ἐπινέμεται κατὰ τὸ συνεχές, ἡ δὲ διεσπαρμένη· εἰ μὲν οὖν ἐκ βάθους προηγησαμένη περιωδυνία γίνηται, πολλὴν δ' ἔχει σομφότητα καὶ οἷς ἄνωθεν εἰς βάθος κάτεισιν· οἷς δ' ἐν ἐπιφανείᾳ μένει, ψόφος μὲν οὐδὲ εἰς Φλυκτίδες δ' ἐπαίρονται· πᾶσα δ' ἐστὶ χαλεπὴ καὶ δυσκράτητος.

- p. 49. 2 Ὡς ἐν τοιαύτῃ οὖν διαθέσει τὴν ἔμφασιν ἀπολείψασαν πόσης σωτηρίας ἐκληπτέον ὅσον ἢ τὴν ἐπιφανείαν ἐν νεωτέρῳ σώματι καὶ μὴ γηραιῷ· καὶ τὴν ἐν σαρκώδεσιν ἢ βεβῶσιν ἢ μα-

(1) Ἀπὸ τοῦ α βιβλίου τῆς συνόψεως τῶν χειρουργομένων, μετὰ τὸ β βιβλίον, κεφάλαια τοῦ ὁμοίου.

spongiam aliquo ex enumeratis medicamentis; simul et celeritatem et dolorem augebis.

XVI. (XV.) *EX ARCHIGENIS DE GANGRAENIS.*

1. **G**angraena affecta pars ipsa quidem est livida; habet autem in ambitu circum se partes malorum colorem referentes et lивescentes vergentesque in colorem viridem; circum virides partes autem positae sunt albae et rugosae et circum has tumentes et paulatim leviter rubescentes; dein autem pars viridis quidem fit livida, alba vero viridescit rubraque albescit, livida autem ad tactum fit insensilis et sicca; dein nigrescit putrefitque; magna autem si sit inflammatio vulnusque conditio fungosa et sonus qualis spiritus subeuntis adest; sed vesiculae quoque exsurgunt; atque alia quidem distribuitur in partibus proximis, alia vero disperse; si igitur e fundo quidem progressa sit gravis dolor adest et conditio valde fungosa uti et apud illos quibus a superioribus partibus ad fundum descendit; apud quos vero in superficie manet, sonus quidem nullus; vesiculae vero exsurgunt; quaevis autem gravis est et sanatu difficilis.

2. Sic in tali conditione eligenda est explicatio omnem fere salutis spem rejiciens, quatenus non affecta sit superficies in corpore juniore neque senili; etiam illae quae in partibus carnis vel

σχάλαις ἢ ἐν κυρίοις σύνεγγυς τόποις δύσκολος, καὶ ἢ ἐπὶ πλέον πελιωμένη βραδύ δὲ μεταβάλλουσα εἰς μέλαν· χαλεπὸν δὲ καὶ τὸ μηδὲν ἐν ταῖς κατασχέσεσιν αἷμα ρεῖν, ἀλλ' οἷον ἐξυδατωμένον, συμφύτης τὲ ἐν ταῖς πίεσεσι γινομένη· οὕτως δὲ τὸ πάθος ὄξύ καὶ χαλεπὸν ἔστιν, ὡς τε μήτε ἀρχαῖς μήτε μεσότητος εὐρίσκεισθαι θεραπείας· πλὴν κοινῶς πάντας φλεβοτομητέον· ἔστεγνωμένης δὲ κοιλίας, κενωτέον καὶ κατασχεαστέον, τό τε νενεκρωμένον περιχαρακτέον, οὗ τὸ βάθος ἢ τοῦ αἵματος μὴνύει ρύσις· τὸ δὲ κατασχεασθὲν ἀλλ' ἐλαίῳ ἀνατριπτέον σφοδρῶς καὶ ἐφ' ἱκανόν· ἔπειτα καταπλάσσειν φλοιῶν ῥαφάνῳ σὺν αἰρίνῳ ἀλεύρῳ ἢ θερμίνῳ ἀλεύρῳ, μετὰ νίτρῳ ἀφροῦ· καὶ τοῦ μὲν ἀλεύρου δύο μοῖραι, μία δὲ τοῦ νίτρου· μετὰ δὲ ὄξους δριμυτάτου καταπλαστέον καὶ πύρινον δὲ ἄλευρον σὺν δαφνίσι καθαραῖς· περίχρηστοι δὲ ἢ τε σφραγίς διεθεῖσα ὄξει, καὶ ἢ διὰ τῶν οἰσυπηρῶν, καὶ πᾶσα ἢ ταύταις ἀνάλογος· κατάντλημα δὲ συνεχὲς οὔρον δριμύ θερμόν· ῥαφάνῳ ἀφέψημα ἢ πράσῃ ἢ ἀγριελαίων ἢ βάτῃ ἢ κορίνῃ ἢ ὄξει σκιλιτικοῦ· ἐνεργεῖ δὲ μᾶλλον θερμόν.

3. Στάσις δὲ λαβούσης τῆς νομῆς, ἐπὶ τὰς ἀνακαθαίρουσας δυνάμεις ραδιστέον· πάμπολλαι δ' εἰσὶν, ἐξ ὧν παραδείγματος χάριν ὀλίγας παραθήσω· φακὸς γὰρ ἐφθός καὶ κατ' ἰδίαν καὶ σὺν ῥαῖς, λεπυχάνοις λείοις σὺν μέλιτι ὀρόβου τὲ ἄλευρον ὁμοίως σκευασθὲν, καὶ αἶραι, καὶ πρά-

inguinibus vel axillis vel propriores nobilibus partibus inveniuntur graves sunt atque illa quae valde est livida uti et quae lente mutatur in colorem nigrum; grave autem quoque est si nullus in retentionibus sanguis effluit, sed fere dissolutus fungosaque conditio sub pressione adsit; adeo autem vitium acutum et grave est, ut neque initium neque media pars curae inveniri possit; praeterquam quod generaliter omnibus vena est secanda; adstricta autem alvo, evacuandum est et laxandum et emortua pars circumscribenda, cujus profunditatem indicat sanguinis effluxus; pars autem scarificata sale tenui et oleo fricanda vehementer et diu; dein cataplasma imponere e cortice brassicae cum farina loliacea vel farina e lupinis cum spuma nitri; atque farinae quidem duae partes, una vero nitri; cum aceto autem acerrimo est illinendum et farina triticea cum baccis laurinis puris; omnino autem adhibenda sphragis aceto diluta et medicamentum ex lana succida et quodvis his simile; fomentum autem cum his maxime conveniens est urina acris calida; brassicae decoctum vel porri vel oleastrorum vel rubi vel coriandri vel aceti squillitici; magis autem agit calidum.

3. Ubi autem sisti incipit incrementum morbi, ad depurantes potentias transeundum; permultae autem adsunt, e quibus exempli gratia paucas apponam; lens enim cocta et seorsum et cum malo Punico, in tunicis cepae detritis siccis melleque; et farina ervi eodem modo parata et lolia et marrubium

σιον καὶ σταφίς ἐγγεγαρτισμένη, καὶ μαλάχης ἀγρίας Φύλλα, μετὰ μελικράτου ἀρνόγλωσσον, ἢ τε αἰγυπτία, πᾶσα τὲ χλωρὰ δύναμις ῥοδίνη διεθείσθαι μετὰ δὲ τὴν ἐκπτώσιν τῶν ἀπαλλοτριωθέντων, ταῖς πυοποιαῖς καὶ πληρωτικαῖς χρηστέον· καὶ τὰ μὲν ὑπὲρ τὸ ἔλκος καταπλαστέον τοῖς ἀποκρουόμενοις, | τὰ δὲ ἔλκη ἀδήκτοις θεραπευτέον.

p. 52. XVII. (XVI.) Ἐκ τῶν Ρούφου περὶ ἔρυσιπέλατων. | (1)

p. 53. "Ὅσα δὲ ἐπὶ ἔλκεσιν ἔρυσιπέλατα γίνεται, κακῆθη πάντα· καὶ τὰ ἀφανιζόμενα ὡσαύτως, καὶ οἷς πυρετοὶ συνεδρεύουσιν· οὐκ ἀγαθὸν δὲ οὐδὲ τοῦ στήθους κατακεχυμένον ἀφανίζεσθαι μετὰ δυσπνοίας καὶ νυσταγμοῦ καὶ μῆλων ἐρεύθους· εἰς γὰρ περιπνευμονίαν τὰ τοιαῦτα ὄρμα, καὶ διὰ ταχέων ἀποκτείνει.

p. 62. XVIII. (XVII.) Ἐκ τῶν Ἀπολλωνίου πρὸς δοθιήνας.

Νίτρον λεῖον ἀναλαβὼν ῥητίνη, εἰς ὀθόνιον ἐμπλάσσω, ἐπιτίθει. Ἄλλο. Μάνναν ἀναλαβὼν ῥητίνη, καὶ εἰς ὀθόνιον ἐμπλάσσω, ἐπιτίθει. Ἄλλο. Ἰσσωπον τρίψας μετ' ἀλφίτη ἐν ὕδατι βεβρεγμένου κατάπλασσε. Ἄλλο. Σταφίδας ἐγ-

(1) Ἀπὸ τοῦ περὶ τῶν ἐκτὸς καθῶν.

et uva passa nucleo privata, et malvae agrestis folia, cum mulso plantago et Aegyptia omnisque copia herbarum virentium oleo rosaceo diluta; postquam autem exciderunt partes degeneratae remediis pus facientibus et implentibus utendum; partes quidem supra ulcus illinendae remediis repellentibus; ulcera vero remediis haud mordacibus sunt curanda.

---

XVII. (XVI.) *E RUFII LIBRIS DE ERYSIPELATIBUS.*

**Q**uaecunque autem in ulceribus crysipelata oriuntur, malae indolis omnia; et evanescentia eodem modo et quibus febres accedunt; neque bonum vero si in pectore diffusum evanescat cum respirandi difficultate et somnolentia et genarum rubore; ad peripneumoniam enim haec ducunt et cito necant.

---

XVIII. (XVII.) *EX APOLLONII ADVERSUS FURUNCULOS.*

**N**itrum contusum cohibitum resina, linteo illitum impone. Aliud. Micamthuris cohibitam resina et linteo illitam impone. Aliud. Hyssopum tritum cum polenta aqua madida, illine. Aliud. Uvas passas nucleo privatas et tritas, salis





contusi aequali parti misce et illine illud, vel dissipat vel frangit. Aliud. Adipem caprinum vel bubulum cum sale tritum impone. Aliud. Origanum et sal comminuta myrrhae mixta impone, confestim ad maturitatem perducit. Myrrhae et organi aequales partes mixtas et aqua adfusas adhibe. Aliud. Caricas coctas et resinae mixtas impone. Aliud. Tamaricis fructum cum avium adipe comminutum impone.

conlati sequuntur partem miscere et illius libellum, vel  
 distillat vel sanguis. Aliud. Adipem caprimum  
 vel buphrum cum sale tritum imponere. Aliud.  
 Organum et sal concrementa myrtus mixta in  
 pane, conlectum ad materiam perferat. Myr-  
 rhan et organum adipes partes mixtas et ap-  
 plicare adhibere. Aliud. Caries coctas et res-  
 tuc mixtas imponere. Aliud. Amara fructum  
 cum vitum adipe comminuitur imponere.

ADNOTATIONES  
IN  
ORIBASII  
COLLECTANEORUM MEDICINALIUM  
LIB. XLIV.



**P**ag. 2. in titulo Ex Oribasii cet. Nonnemo fortasse mirabitur, hic non legi Lib. XLIV sed e Lib. XLIV, verum in hac re Angelum Majum sum secutus, qui in hac librorum Oribasii editione omnia, quae e Galeno erant desumta, omittens, quia videlicet jam edita erant, hunc titulum adhibere maluit. Hinc etiam in paginis codicis, quas in margine adnotavi, nonnunquam lacuna observabitur, ut e. g. pag. 32 ubi pag. 23 Cod. sequitur pag. 30.

Ibid. Ἀντίλλου καὶ Ἡλιοδώρου. Antyllus erat chirurgus ex secta pneumatica, qui, quantum ex fragmentis superstitionibus concludere possumus, haud mediocrem laudem meretur et multum contulit ad chirurgiam et diaeticam emendandam. Praeter varia fragmenta ab Oribasio, Aëtio et Paulo Aegineta nobis servata, omnia ejus opera interierunt,

nisi excipias Librum *περὶ ὕδροκεφάλων* in collect. veter. chirurg. Nicetae legendum. Omnia vero, quae ex ejus scriptis supersunt, collegit et seorsum edidit C. Sprengel sub titulo: *Antylli veteris chirurgi τὰ λείψανα* praeside Curtio Sprengel, ventilanda exhibet Panagiota Nicolaïdes 4°. Halae 1799.

Heliodorus quoque chirurgus erat ex secta pneumatica, vixit Trajano regnante; loquitur enim de illo Juvenalis sat. 6. vs. 372. Maxima pars ejus operum desideratur; nonnulli tamen libri hujus auctoris servantur in collect. veter. chirurg. Nicetae, nempe: *περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τραυμάτων*, *περὶ τερηδονισμοῦ κρανίου*, *περὶ ὀστέδους ἐκφύσεως*, *περὶ ἀκρωτηριασμοῦ*, *περὶ τῶν κατὰ τοὺς δακτύλους συμβαινόντων*. Insuper adhuc in edit. operum Hippocratis et Galeni cur. Renat. Charterio invenitur ejus Liber *περὶ ἐπιδέσμων*.

Pag. 2. lin. 1. *ἀπόστημα*. Quo melius intelligatur hocce verbum, hic addam definitiones ejus apud alios veteres auctores inveniendos; Galenus de meth. med. ad Glauconem Lib. II. cap. 9 dicit: *ὀνομάζουσι δ' οὕτω τὰς διαθέσεις ἐκείνας, ἐν αἷς ἀλλήλων ἀφίσταται τὰ πρότερον ἀλλήλων ψάλλοντα σώματα*; in Definit. med. vero N°. 387: *ἀπόστημα ἐστὶ μεταβολὴ σωμάτων ἐκ φλεγμονῆς εἰς πύον*. Paulus Aegin. autem Lib. IV. cap. 18: *ἀπόστημα τοίνυν*, inquit, *ἐστὶ φθορὰ καὶ μεταβολὴ σαρκῶν ἢ τοι σαρκώδων, οἶον μυῶν, φλεβῶν, ἀρτηριῶν*. Ceterum ex eodem fonte, ex quo Oribasius omnia petiit, quae hoc capite continentur, hausisse videtur Paulus Aegin. Lib. VI.

cap. 4: *περὶ ἀποστήματος*, sed illa, quae hoc capite continentur, etiam multum conveniunt cum Celsi Lib. VII. cap. 2.

Pag. 4. lin. 2. *ἐποποιῶν*. Hic pro *ἐποποιῶν* legi *ἐπωποιῶν* quoniam *ἐπόποιος* ab *ἔπος* et *ποιέω* hic mihi nequaquam convenire videtur; *ἐπόποιος* vero vel *ἐπόποιον* derivari possit ab *ἐπὶ* et *ὤψ* ideoque significet partes oculos tegentes, i. e. palpebras, quamvis ceteroquin, quantum scio, tale verbum nusquam alibi occurrat.

Ibid. 2. lin. 6. *κίλλησιν*. Hic pro *κίλλησιν* legi *κόλλησιν*.

Pag. 6. lin. 10. *σφικτῆρα*. Hic pro *σφικτῆρα* haud dubiè legendum est *σφιγκτῆρα*.

Ibid. 3. lin. 2. *σωλήνα*. Vulgo quidem ab antiquis auctoribus, qui de chirurgia egerunt, verbo *σωλήν* indicatur instrumentum rotundum, oblongum, cavum, in quod membrum fractum, crus, aut femus imponitur eoque continetur, uti dicit Anut. Foësius in Oecon. Hippocr. ad vocem *σωλήν*, atque eo sensu occurrit apud Hippocratem Lib. de officina medici et de fracturis variis in locis, apud Galenum de meth. med. Lib. VI. Cap. 5, apud Paul. Aegin. Lib. VI. Cap. 106 et apud Celsum Lib. VIII. Cap. 10. § 5, ubi tale instrumentum accuratius describit sub nomine canalis; verum quoniam illud in abscessu circa anum adhiberi nequit, vix dubitavi, quin hic vox *σωλήν* significatione sua magis generali sit interpretanda ideoque vertenda voce Latina *tubus*. Ceterum cum hoc loco omnino

conf. Aëtius Tetrab. IV. II. 9. de abscessibus sedis quod caput, licet ex Leonida petatum, tamen ex hoc capite fere ad verbum transcriptum videtur.

Pag. 10. 5 lin. 15. δάκτυλον. Nisi δάκτυλος hic idem significet ac δακτύλιος, certo legendum est δακτύλιον, cum jam auctor § 2 inter loca, quae extirpationem abscessuum postulant, enumeraverit nates et vicinium ani, nihil vero dixerit de digitis.

Ibid. 6. lin. 13. μυρσινοειδώς. Aëtius Tetrab. IV. II. 32 (e versione Jani Cornarii) sequenti modo circumscribit hanc plagae formam: » Resectio autem ad myrtei folii formam fiat, longa videlicet » et angusta ” quam ceteroquin in iisdem casibus commendat ac Oribasius hoc loco.

Pag. 12. II. lin. 4. καταπλάσματων τε καὶ ἐμπλαστῶν. Quid intersit inter Cataplasma, emplastrum aliaque hujus generis verba, satis dilucide nos docent, quae de hac re apud Celsum, Oribasium et Actuarium leguntur. Celsus enim Lib. V. Cap. 17. § 2: » Malagmata vero, inquit, atque emplastra » pastillique, quos τρογίσκους Graeci vocant, cum » plurima eadem habeant, differunt eo, quod malagmata maxime ex floribus eorumque etiam surculis, emplastra pastillique magis ex quibusdam » metallicis fiunt. Deinde malagmata contusa abunde » mollescunt: nam super integram cutem injiciuntur: laboriose vero conteruntur ea, ex quibus » emplastra pastillique fiunt, ne laedant vulnera, » cum imposita snnt. Inter emplastrum autem et » pastillum hoc interest, quod emplastrum utique

» liquati aliquid accipit: in pastillo tantum arida  
 » medicamenta aliquo humore junguntur.” et in fine  
 ejusdem: » Tum emplastrum imponitur, pastillus  
 » illinitur, aut alicui molliori, aut cerato miscetur.”  
 Oribasius Collect. Medic. Lib. X. cap. 31 (e versione  
 Rasarii) » Empasmata, ait, cataplasmata et diapas-  
 » mata differunt. Empasmata enim sunt quae, ut  
 » immoderati sudores, aut alia per halitum digestio  
 » cohibeatur, aut ut cutis extremitas scarificetur, aut  
 » pruritu tentetur, adhibentur: cataplasmata autem  
 » dicuntur, quae ulceribus superdantur: diapasmata  
 » vero, quae ad suavem odorem cuti conciliandum,  
 » aut toti corpori tribuendum, aut partibus, ut alis  
 » et feminibus, accommodata sunt.” Actuarius de  
 » meth. medendi Lib. V. Cap. 1 (e versione Junii  
 » Alexandrini Tridentini) » Eorum vero, inquit,  
 » quae extus admoventur, quaedam sunt unguenta,  
 » suntque quae illita tantum opem ferre feruntur:  
 » alia sunt emplastra, quae linteis expansa, vel  
 » tenuibus pellibus inducta, imponuntur: alia ap-  
 » pellantur ἐπιθέματα, quae nequaquam proprio  
 » lentore, sed externis fasciis constricta adhaerent:  
 » alia sunt velut triturae, quae pulveres (et ξηρία  
 » Graecis) dicuntur.”

Ibid. lin. 9. Φοινίκων γε καὶ θαλλίας φιλλων καὶ  
 σιδίων καὶ μήλων. Φοίνικες haud dubi sunt palmae,  
 quarum multas species enumerat Theophrastes Hist.  
 Plant. Lib. II. cap. 8, dum Dioscorides Mat. med.  
 Lib. I. cap. 149 et 150 seorsum agit περὶ Φοίνικος  
 Θηβαϊκοῦ et Φοίνικος ἐλάτους; loquitur et Aelianus



περὶ Φοινίκων τῶν χαμαιζήλων quae esculentae erant (De Nat. Animal. Lib. XIV. cap. 13). Quid vero fuerit θαλλία, determinare non audeo; vulgo quidem vox θαλλία significat ramum virentem, verum hoc loco mihi peculiarem plantae speciem indicare videtur. Σιδία vel σίδας (Lat. malicorium) sunt putamina malorum Punicorum vel granatorum (Graece σίδη vel ζοιά Punica Granatum Linn.); μήλα sunt fructus μηλέας mali (Pyrus Malus Linn). De proprietatibus adstringentibus horum medicamentorum etiam agunt Theophrastes l. l. multisque aliis in locis, Dioscorides Lib. I. cap. 148—151 et 153 Plinius Hist. Nat. Lib. XXII. cap. 5 et 6. Galenus de Simpl. medicam. temper. ac facult. Lib VIII. cap. 17. § 8. Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. I. Euporist Lib. II. cap. I. Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3, quin etiam malicorio vim adeo adstringentem tribuit Galenus Lib. de succedaneis medicam., ut illud in locum aluminis scissilis succedere posse putet. De malis Dioscorides Lib. I. cap. 159. Plinius Nat. Hist. Lib. XXIII. cap. 7. Galenus de simplic. medicam. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 12. § 16. Oribasius, Aëtius et Paulus Aegin. l. l. omnes uno ore affirmant illorum facultates differre pro variis speciebus, quarum nonnullae enumerantur a Plinio l. l. et a Celso Lib. IV. cap. 19.

Ibid. γε. Pro γε mihi hic legendum esse videtur τε.

Ibid. lin. 11. τὰ διὰ πεπέρεως, σμύρνης, πίγαρον ὀπού. Nisi hic πίγαρον idem significet ac apud

alios auctores *πήγαγον* (saepe enim a Graecis scriptoribus aevi serioris commutantur literae *η* et *ι*) haud dubie legendum est *πήγαγου*. Ceterum de his tribus medicamentis conf. Theophrastes Hist. Plant. Lib. IX. cap. 4 et 22, Dioscorides Lib. I. cap. 77, II. cap. 189 et III. cap. 51 et 53, Plinius Hist. Nat. Lib. XII. cap. 7, XX. cap. 13 et XXIV. cap. 16, Galenus de simplic. medicam. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 16. § 11 et 18 et cap. 17. § 30, Oribasius, Aëtius et Paulus Aegin l. l.

*Πεπέριως* plerique hi auctores tres distinguunt species *longum*, *album* et *nigrum*, quas tamen ab eadem arboris proficisci putant. Cl. Dierbach vero (Die Arzneimittel des Hippocrates pag. 156) putat piper antiquorum, illud saltem quod in libris revera ad magnum Hippocratem referendis memoratur, non esse fructum illarum plantarum, unde piper hodiernum petimus, verum Piperis Aethiopiae vel Unonae Aethiopiae Dunal.

*Πήγαγον* cujus duae species *ἀγρίον* et *ἡμίρον* recensentur a Galemo est Ruta hortensis Linn. De *πηγάγου ἀγρίω* etiam agit Dioscorides Lib. III. cap. 53.

*Σμύρνη* (myrrha) omnibus est cognita, verum adhuc dissentiant de planta, unde originem petit; Dierbach (l. l. pag. 224) autumat illam ab Amyris Kataf Forsk. oriri. Galenus praeter myrrham vulgarem etiam memorat *σμύρνην βοϊκήν*.

*Ὅπος* hic verti significatione sua magis generali, licet teste Galeno de simplic. medic. temper. ac

facult. Lib. VIII. cap. 15. § 12 saepius magis in specie hoc verbo indicetur succus Cyrenaeus vel Medicus vel Syriacus i. e. laser vel succus variarum specierum Laserpitii (σιλπίου); apud Aelianum De Nat. Anim. Lib. IX. cap. 32. ὀπός significat opium vel Papaveris succum, testante Schneidero in adnot. sua ad hunc locum.

Pag. 14. l. 14. τῇ δὲ πρώτῃ ἐνεργείᾳ μὴ ὄλον ἐκλαμβανέσθω τὸ πύρον. Hic male, ut mihi videtur, invenitur colon post vocem ἐνεργείᾳ.

Pag. 14. lin. 17. λειποθυμίαν. Quo melius intelligatur, quid sit λειποθυμία, hic afferam nonnulla, quae de hac re apud Aretaeum et Aëtium exstant. Aretaeus de causis et signis morb. diuturn. Lib. I. cap. 7. Ἐκλυσιν δὲ, inquit, γουράτων καὶ αἰσθησίου πρόσκαιρον νάρκην καὶ ἀψυξίην καὶ κατάπτωσιν λειποθυμίην καλέομεν. Aëtius vero discrimen inter lipothymiam et syncopen sequenti modo describit Tetrab. II, I, 101: »Differt autem lipothymia a »syncopa, quod lipothymia derepente incidit, sensu »et motu hominem privans; et omnino non sudant: »syncope vero et vigilantes et dormientes invadit et »omnino cum sudoribus qui syncoptici appellari »solent.»

Ibid. 2. lin. 4. τιλοῖς μότης. Ab Hesychio (ed. Alberti Tom. II. pag. 624.) sequenti modo describitur verbum μοτά, pro quo apud reliquos auctores legitur μοτοί. τὰ πληροῦντα τὴν κοίλην τῶν τραυματίων ἕσκη, dum Auctor Isagoges, quae Galeno adscribitur, cap. 20 quinque recenset species μότην

apud medicos usurpari solitas : στρεπτός, ξυστός, τιλτός, έλληγμιωτός et πριαπισκωτός, ex quibus tamen tres priores frequentius occurrunt quam reliquae, et maxime cum carpia nostra convenire videntur. Ab hac voce μοτός etiam nonnullae aliae formantur, uti μοτώσις (Hippocr. de artic. pag. 806 ed. Foësi) linamentorum impositio; έμμοτος, qui curatione ope linamentorum indiget (Hippocr. de artic. pag. 822 Epidem. Lib. V. pag. 1149 et multis aliis in locis) vel linamenta madefaciens (Paul. Aegin. Lib. VI. cap. 34) multaeque aliae. Parum autem a μοτοίς differre videtur άγνη όθονίου, quae ab Erotiano sequenti modo describitur : τὸ παρ' ήμίν λεγόμενον ξύσμα, έξ όν γίνεται μοτός ό καλωήμενος ξυστός et ex qua etiam pessi conficiebantur (Hippocr. De morbis mulierum Lib. II. pag. 665); forsitan voce άγνη όθονίου in universum indicabant ramentum lintei, dum variae species μοτών significabant varias figuras penicillorum, in quos illud ramentum contorquebatur. Praeterea apud Hippocratem (Epidem Lib. VI. sect. 7. Aphorism. 3.) μοτώματος ξυστροφή laudatur ad haemorrhagias sistendas. Libro tamen de morbis pag. 477 et 483 vox μοτός alio sensu occurrit, nam hic μοτός κασσιτέρινος κοίλος dicitur tubus stanneus ad pus e pectoris cavitate educendum, ibid. vero pag. 482 μοτός κασσιτέρινος στερεός instrumentum stanneum ad canalem quemdam occludendum.

Ibid. lin. 6. μονοφύλακι. Nisi hic μονόφυλαξ opponatur τῷ κοινῷ μοτοφύλακι, haud dubie hic legendum est μοτοφύλακι, quae vox etiam occurrit

\*

apud Paulum Aegin. Lib. VI. cap. 34, dum *μονόφυλαξ*, quantum scio, apud nullum alium auctorem reperitur. Ceterum cum hac § omnino conferri merentur Paulus Aegin. l. l. et Aëtius Tetrab. IV. II. 32.

Pag. 16. 3. lin. 9. *τοῦ ὑπεζωκότος ὑμέρος*. *ὑπεζωκῶς ὑμήν* est membrana serosa, quae hodie dicitur pleura, cujus descriptio anatomica invenitur apud Galenum de anatom. administ. Lib. VII. cap. 2, quem exscripsit Oribasius Collect. Medic. Lib. XXXIV. cap. 12; eadem vero membrana a Caelio Aureliano Chron. V. cap. 10 dicitur hypozygos.

Ibid. lin. 14. *λελιπασμένα*. Vox *λελιπασμένος* hoc loco, uti et saepius infra, aliquam ossium vel cartilagineum degenerationem significat, de qua conf. infra adnot. ad pag. 50. 5 lin. 15.

Ibid. lin. 15. *ἐάν οὖν ἐτι σκέπων*. Hic inter voces *ἐτι* et *σκέπων* interpolavi vocem *τι* et vocem *σκέπων* mutavi in *σκέπον* vel *σκειπών*.

Ibid. lin. 17. *μελιράτω*. Quamvis *μέλιρητον* apud Hippocratem semper significet aquam mulsam, hic tamen verti mulsum, quoniam me latebat, an hic subintelligeretur *οἶνω* vel *ὕδατι* vel *γάλακτι*; in aliis tamen locis, ubi apposita particula *τὸ* satis patebat, substantivum neutrum subintelligi, verti aquam mulsam.

Ibid. lin. 22. *Φάρμακα λιπαίοντα*. Ni fallar, *φάρμακα λιπαίοντα*, quae hic memorantur, nullo modo differunt a *φάρμακοις* vel *ἐμπλαστοῖς λιπαροῖς* i. e. medicamentis vel emplastris pinguibus sive leni-

bus, quae pinguibus rebus constant, cujusmodi emplastra enumerantur a Galeno de medicam. Composit. secundum loca Lib. I. cap. 8. Celso Lib. V. cap. 19 § 25—28. Scribonio Largo Lib. de composit medicam cap. 222 et 223 et Marcello Empirico Lib. de medicam. cap. 31, dum illa etiam memorat Plinius Lib. XXIII. cap. 6 et Lib. XXXIII. cap. 9.

Pag. 18. 4 lin. 1. *λήμισκοι*. *Λήμισκος* erat species *μότων*, uti patet ex Galeno *τῶν Ἱπποκράτους γλωσσῶν ἐξηγήσεις* in voce *ἐμπύους μοτοῦς*. Celsus (Lib. VII. cap. 28) *λήμισκον* Latine nuncupat implicitum in longitudinem linamentum, quem sequitur Janus Cornarius in versione sua Pauli Aegin. Lib. VI. Cap. 62.

Ibid. lin. 5. *σπληνίον*. *Σπληνίον* est panniculus, cui medicamenta illinuntur ad emplastra formanda. Quomodo autem se habere debeant haec splenia, nobis enarrat Hippocrates de offic. medici pag. 745.

Ibid. in titulo IV (III). Hoc capnt, uti et omnia sequentia, duos numeros in titulo habet, quorum alter parenthesi continetur et numerum indicat, quo apud Angelum Majum capita designantur; ibi vero duo occurrunt cap. III, quia totum fere cap. III hujus editionis cum ultima cap. II. parte e codice exciderat, ita ut editor in praefatione sua (pag. 7) Oribasii Lib. XLIV etiam mutilum et laciniatum dicat; sexto tamen post cetera impressa mense folia, quae codici deerant, rursus invenit et pag. 276 sqq. Tom. IV Classicorum auctorum e

codicibus vaticanis editorum inseruit. Ceterum cum toto hoc capite conf. Celsus Lib. VII. cap. 4. § 2.

Ibid. 1. lin 8. ἀναταθέν. Ante hanc vocem inserendam esse putavi particulam τὸ.

Pag. 20. lin. 1. μηριγοφθακος. De hoc instrumento conf. Celsus Lib. VIII. cap. 3.

Ibid. lin. 2. τρυπάνου. Jam Hippocrates (Lib. de capitis vulneribus pag. 912 et 913.) duas enumerat terebrarum species *πρίονα χαρακτὸν* vel *χοινικίδα* et *πρίονα*, quarum illum idem instrumentum dicit Sprengel (Pragmat. Gesch. der Medizin Tom. I. pag. 416) ac noster *trepan*, hanc vero idem ac nostra *tryphine*. Hic vir Cl. porro refert *πρίονα* idem esse instrumentum ac *τρύπανον περιητήριον*, quod memoratur Lib. de internis affectionibus pag. 544 quodque ibi commendatur ad costam perforandam, si saltem vera sit conjectura Foësi (Oecon. Hippocr. ad vocem *τρύπανον*) hic pro *τρύγλητήριον* legendum esse *περιητήριον*, quae jam inde valde fit verisimilis, quod ceteroquin explicatio vocis *περιητήριον* (*τρύπανον τῷ εὐθεῖ καὶ ὀξεί*) apud Galenum in Exegesi ad nullum Hippocratis locum referri possit. Hoc instrumentum autem ego potius idem esse putem, ac alterum genus terebrarum Celsi, de quo dicit (Lib. VIII. cap. 3.) illud simile esse ei, quo fabri utuntur, cum ob ejus usum, tum ob explicationem Galenicam hujus vocis, quam modo attuli. Celsus vero l. l. primum describit modiolum sive *χοινικιον*, quod magis et cum hodiernis terebris et cum *πρίονι χαρακτῶ* Hippocratis convenire videtur, dein transit ad duas

alias *τρούπανου* species, quarum alteram supra memoravimus; altera vero a Galeno de meth. med. Lib. VI. cap. 90 dicitur *τρούπανον ἀβάπτιστον*; omnem tamen sive modioli sive terebrarum sive *πρίονος* usum operationi ope scalprorum postponendum esse dicit Galenus l. l.; Paulus Aegin. autem refert illam methodum a recentibus vituperari.

Ibid. lin. 6. *μήλης*. Vox *μήλη* mihi in universum omnes specilli species significare videtur, quemadmodum et hic auctor *μήλην* idem vocat instrumentum, quod supra lin. 1 *πλατυμήλην* dixerat, licet Galenus Comment. II. in Hippocr. Lib. de articulis tamquam species *ὕπαλειπτρον* enumeret *τὰς μίλας*, *τὰς σπαθομίλας* καὶ *τὰ διαπρίονα* et Erotianus (*τῶν παρ' Ἱπποκράτει λέξεων συναγωγή* ad vocem *μήλην*) *ὕπαλειπτρον* (sic enim legendum esse cum Foësius putem, non vero *ὕπαλιπτρον*) Hippocratis dicat *ἣν ἡμεῖς μήλην καλοῦμεν*. Apud Hippocratem autem quatuor occurrunt *μήλης* species:

1°. *τὴν μήλην διαστομωτίδα*, quam vocem Galenus in Exegesi explicat *διαστολέα* i. e. specillum dilatans vel speculum uteri.

2°. *τὴν μήλην ἰσχυρὴν*, quam vocem Galenus l. l. explicat *τὴν τραυμάτικὴν μήλην*.

3°. *τὴν μήλην ἐξωτίδα*, quam vocem Galenus l. l. explicat *μηλωτίδα* quae etiam dicitur *μηλωτρίς*. Licet cum ex etymologia vocis, quippe quae a *μήλη* et *οὖς* derivatur, tum ex Galeni Lib. III. de medicam. compos. secund. locos cap. I. satis appareat, hanc speciem revera nihil aliud esse, nisi specillum auri-



culare, saepissime tamen in multarum aliarum partium affectionibus adhibetur ac in aurium, ubi nempe requiritur specillum tenue vel angustum, quemadmodum et a Celso Lib. VII. cap. 30 § 3. specillum oriculare et a Scribonio Largo de composit. medic. cap. 227 auriscalpium memoratur in cura haemorrhoidum.

4°. τὴν μὴλὴν πλατεῖαν, quam vocem Galenus in Exegesi explicat τὴν σπαθομήλην, quaeque mihi idem videtur ac πλατυμήλη, ὑπάλειπτρον, μὴλη ὑπάλειπτρις i. e. specillum latum vel specillum ad illinendum; huc mihi quoque pertinere videtur illa species, quae a Galeno et Erotiano κατ' ἐξοχὴν dicitur μὴλη.

Ibid. 2. lin. 6. ἔκκοπέων. Ἐκκοπεύς est scalper excisorius, cujus tres species distinguit Galenus de meth. med. Lib. VI. cap. 6. τοὺς κοίλους ἔκκοπεῖς, αὐτὸς κυκλικούς ὀνομάζουσι, quos vero Paulus Aegin. Lib. VI. cap. 90. dicit κυκλικωτοὺς, τοὺς φακοειδῆς, i. e. lenticulares et τοὺς στενοὺς ξυστήρας. Praeterea Paulus Aegin l. l. adhuc memorat τοὺς ἀντιθέτους et τοὺς μηλωκοὺς ἔκκοπεῖς.

Ibid. lin. 7. ὀστάργα. Tale instrumentum citat quoque Galenus de meth. med. Lib. VI. cap. 6 et Paulus Aegin. Lib. VI. cap. 90 atque hic praeterea refert illius loco etiam adhiberi posse ὀδοντάργραν vel τριγολαβίδα. Memorat illud et Celsus Lib. VIII. cap. 4. sub nomine forcipis.

Pag. 22. lin. 5. ἐμπλάστρους κεφαλικάς. Galenus de meth. med. Lib. VI. cap. 6 dicit medicamenta sicca ita vocari, quoniam in affectionibus capitis

emplastra sicca plerumque conveniebant; hujusmodi autem emplastra multa eorumque vires descripsit Aëtius Tetrab. IV. III. 13.

Ibid. lin. 6. *ῥοδίνω*. Hac voce indicatur oleum rosaceum, sive oleum ex floribus Rosae Centifoliae Linn., cujus variam confectionem nos docent Dioscorides Lib. I. cap. 53. Galenus de medicam. composit. secund. loca Lib. III. cap. 1. Oribasius Collect. Medic. Lib. V. cap. 33. Euporist Lib. IV. cap. 130 et Nicolaus Myrepsicus de composit. medic. sect. XXXIX. cap. 7. Ceterum de rosae virtutibus et proprietatibus conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. I. cap. 22. Lib. VII. cap. 7 et Lib. VI. cap. 6, ubi nonnullas enumerat Rosae species, inter quas Centifolia erat pulcherrima, Cyrenaïca vero odoratissima, Dioscorides. Lib. I. cap. 130. Plinius Nat. Hist. Lib. XXXI. cap. 4. Galenus de Simpl. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 17. § 5, Oribasius Collect. Medic. Lib. XII, XIV. cap. 10 et XV. cap. 1 et Euporist. Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I-I et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. V. in titulo *ἐπιγαστροῦ καὶ περιτοναίου*. *Ἐπιγαστροῦ* sequenti modo circumscribit Rufus Ephesius: *ἐπιγαστροῦ* super ventrem posita cutis appellatur; eum autem exscripsit Oribasius Collect. Medic. Lib. XXV. cap. 1. *Περιτοναίου* vero descriptio anatomica et physiologica invenitur apud Galenum de usu partium Lib. IV. cap. 9, quem sequitur Oribasius Collect. Medic. Lib. XXIV. cap. 20. Pag. 24. VI. in tit. *Ἡπατος καὶ σπληνὸς ἀποστή-*

ματος. Multa de his abscessibus memoratu digna, praecipue quod ad prognosin attinet, exstant apud Aretaeum de sign. et curat. diuturn. morb. Lib. I. cap. 13 et 14.

Ibid. lin. 3. σπλάγγω. Hic haud dubie legendum est σπλάγγω.

Pag. 26. lin. 6. ἡμισπάθιον et paulo ulterius κατιάδος. Instrumentum κατιάς vel καθιάς dictum etiam occurrit apud Paulum Aegin. Lib. VI. cap. 73 et 74 ibique hanc vocem vertit Janus Cornarius voce Latina acicula; cap. 73 autem adhibetur illud ad abscessum uteri aperiendum; cap. 74 vero ad infantis hydrocephalo affecti calvariam perforandam in utero sub partu, et hoc loco in eadem operatione adhiberi posse πολυπιόν σπάθιον vel σκολοπομαχαίριον dicit auctor; Lib. VI. cap. 40 tamen, ubi de venaesectione agit, κατιάδος nullam mentionem facit. Si contextum nostrum cum his locis Pauli conferamus, verosimile mihi videtur, κατιάδα fuisse instrumentum ab altera parte (ἔλασμα) latius et obtusum, ab altera vero in mucronem acutum et pungentem desinens, neque huic opinioni repugnat, quod illud instrumentum hic in adnotatione vocatur φλεβότομον ideoque ad venaesectiones instituendas adhibitum est, nam apud Oribasium Medic. Collect. Lib. VII. cap. 10 et Aëtium Tetrab. I. III. 13 disertis verbis legimus, venam secari vel punctum vel caesim. A κατιάδος autem mihi omnino differre videtur κατιάδιον, quod memorat Aretaeus De curat. diuturn. morb. Lib. I. cap. 1. cujusque loco

etiam adhiberi posse dicit *στορνύνην* vel pennae anserinae caulem crassiorem quodque eo inserviebat, ut narium venae internae quasi serra discinderentur et sic sanguis ex iis emitteretur ad dolorem capitis sedandum; ex his igitur patet illud instrumentum fuisse serratum.

De *ήμισπαθίω* Conf. infra adnotatio ad vocem *συριγγότομον*.

Pag. 28. lin. 3. *λημνίσκω καθεθέντι, ἀναπληροῦσθω τοῦ ἀποστήματος κόλπος*. Pro *καθεθέντι* hic legendum esse puto *κατατεθέντι* et praeterea comma, quod hic pone *καθεθέντι* invenitur, delevi.

Ibid. lin. 12. *καδμεία*. *Καδμεία* est materia, quae in fornacibus ope ignis ex lapidibus et terris aes continentibus parabatur, quando parietibus et camerae fornacis adhaerebat (Plinius Hist. Nat. Lib. XXXIV. cap. 10); teste Galeno (de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. IX. cap. 3. § 11) in insula Cypro etiam occurrebat in montibus nulla artis ope parata atque haec species omnibus aliis erat praefenda; licet Dioscorides (Lib. V. cap. 84) dicat illos, qui hoc putant, decipi similitudine inter cadmiam et nonnullos lapides. Enumerat hic etiam sequentes cadmiae species *βοτρυτήνην, ὄνυχίτην, ζωνίτην, πλακώδην, ὀστρακίτην, ἀκιστίδην* et speciem, quae parabatur cremando lapide Pyrite; praeterea Plinius et loquitur de capnitide. Ceterum de omnium harum specierum virtute conf. Dioscorides, Plinius et Galenus l. l., Oribasius Collect. Medic.

Lib. XIII. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. II. cap. 57 et Paulus Aegin Lib. VII. cap. 3.

Ibid. οἰωθε. Hic haud dubie legendum est εἰωθε.

Ibid. πριαπίσκον. Quo melius intelligatur haec vox, liceat mihi hic afferre verba Oribasii Collect. Medic. Lib. XLIX. cap. 5. § 3 invenienda, ubi πριαπίσκον ejusque utilitatem sequenti modo describit: Πριαπίσκος λέγεται ὁ αὐτὸς καὶ στυλίσκος, ἔτι τὸ σκαλμὸς ἔγρονε οὗτος, πρὸς ἀντέρσεις τοῦ περιγαίου τῆς ἐν τοῖς καθαρτισμοῖς γενομένοις ἔστι δὲ ὁ πριαπίσκος ξύλον ὀκτωδακτυλῆϊον περιφερὲς κατὰ τὸ πλεῖον αὐτοῦ μέγεθος, κατὰ δὲ τὸ λοιπὸν μέρος εἰς τετράγωνον.

Ibid. Not. lin. 6. ἰτρείοις. In hac voce vitium irrepsisse jam exinde mihi patere videtur, quod praepositio κατὰ hic cum dativo usurpatur ideoque non nimis audacem me esse putem, si ἰτρείοις mutem in ἰατρειῶν, quod hic optime convenit; in univ-  
sum autem et haec nota et sequentes mihi non magnam lucem contextui afferre videntur.

Ibid. 3. lin. 3. κλισμοῖς. Vix dubium videtur, quin κλισμὸς hic idem significet quod apud alios auctores vulgo dicitur κλίσμα.

Ibid. δρυμντέροις. Haud dubie pro δρυμντέροις hic legendum est δρυμντέροις.

Ibid. lin. 4. ὕσσώπον, ὀρίγανον, ἰσχάδων et pag. 30. lin. 7. λιβανωτοῦ. Quenam planta fuerit ὕσσώπος antiquorum inter pharmacologos nondum constat; ὀρίγανον verisimiliter erat Origanum Creticum Linn. vel Origanum Heracleoticum Ghini (Dier-

bach die Arzneim. des Hippokr. pag. 174). Galenus (de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 15. § 13) quatuor hujus medicamenti species enumerat: *Ἡρακλειοτικήν*, de qua etiam loquitur Dioscorides Lib. III. cap. 32, *ἀργίαν* vel *πάνακες* *Ἡράκλειον* vel *κονίλην*, ex qua etiam conficiebatur *δοποπόναξ* (Galenus ib. cap. 16 § 4), *τραγορίγανον* et *ονιτίδα*; *ισχάδες* sunt fructus siccae Ficus Caricae Linn. (Dierbach Flora Apiciana § 18.), licet Theophrastus Hist. Plant. Lib. IX. cap. 10 hac voce pira indicare videatur; Dioscorides autem Lib. I. cap. 182—184 praeter vulgarem ficum distinguit *συκὴν ἐν Κεῖρω* et *συκὴν ἀργίαν*; Plinius vero Nat. Hist. Lib. XV. cap. 18 viginti novem hujus arboris species enumerat. *Ἀβανωτοῦ* quoque multae erant species, quae nomina petebant a regionibus, unde advehebantur (Plin. Nat. Hist. Lib. XII. cap. 15); omnes tamen hae species, uti videtur Cl. Dierbach (l. l. pag. 223) oriebantur ab Amyris Kafal Forsk. vel a *Boswellia serrata* Stackh. Ceterum de horum medicamentorum viribus et proprietatibus conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. II. cap. 7, IV. cap. 8, VI. cap. 2, IX. cap. 4 et de causis plant. Lib. I. cap. 21 et V. cap. 12 et 13, Dioscorides Lib. I. cap. 81—84 ubi seorsum agit de *φλοιῶν λίβανου*, de *μάννη λίβανου* et de *αἰθάλη λίβανωτοῦ*, et cap. 182—184 et Lib. III. cap. 30 et 32, Plinius l. l. uti et Lib. XXI. cap. 10, Galenus l. l. Lib. VIII. cap. 20. § 8. cap. 15. § 13. cap. 18. § 43 et 44, et

Lib. VII. cap. 11. § 13, Oribasius Collect. Medic. Lib. XII et XV. cap. 1, Euporist. Lib. II. cap. 1, et Paulus Aegin Lib. VII. cap. 3.

Pag. 30. 4. lin. 1. *παρισθημίοις*. De tonsillarum abscessibus conferantur Celsus Lib. VII. cap. 12. § 2, et Paulus Aegin Lib. VI. cap. 30; hicce etiam memorat *γλωσσοκάτοχον*, verum de *στοματοδιαστολέως* apud nullum alium auctorem quidquam inveni; Paulus Aegin. praeterea adhibet singulare instrumentum ad hos abscessus incidendos, quod vocat *ἀγκυλότομον* qualiaque semper duo adesse debent, alterum pro tonsilla dextra, alterum pro sinistra.

Ibid. lin. 3. *πρίνιον*. *Πρῖνος* est Quercus Ilex Linn., de cuius viribus conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. III cap. 17 Dioscorides Lib. I cap. 144 Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 4 § 11 et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. 4. lin. 7—10. *τοῖς κατὰ ἀπλοτομίαν ἔργοις χρησόμεθα πρὸς τὸ τοῦ ἀποστήματος μέγεθος· ἢ μία διαίρῃσει ἢ δυοῖν ἢ τρισὶν ἀρκούμενοι*. Colon, quod hic invenitur pone *μέγεθος*, mihi tollendum esse videtur.

Pag. 32. in tit. *Ρούφου*. Haud dubie hic tractatus adscribendus est Rufo Ephesio, non vero Rufo Menio, de quo nihil compertum habemus, nisi quod citatur a Galeno (de composit. medicam. sec. genera Lib. VII. cap. 12.).

Rufus Ephesius autem medicus erat, qui praecipue tamen anatomen excoluit. De tempore, quo

vixerit, dissentiunt scriptores, cum Tzetzes eum medicum reginae Cleopatrae fuisse tradit (Chil. Lib. VI. sect. 44. vs. 300). Suidas vero (Tom. III. pag. 266) cum plerisque aliis eum ad Trajani tempora refert. Ex ejus operibus praeter nonnulla fragmenta in Collect. Nicetae invenienda adhuc supersunt :

I. De appellatione partium corporis humani Lib. III, quos primum edidit Graece Jac. Goupylus Paris. 1554. 8°. Latine vertit Junius Paulus Crassus et cum Aretaeo edidit Venet. 1552. 4°. recusus Paris. 1554 forma minori ex recensione ejusdem Goupyli. Prodierunt et inter artis medicae principes H. Stephani 1551. fol. et ex secunda Crassi recognitione 1555 et Basil. 1581. 4°.

II. De vesicae renumque affectionibus Liber ab extrema parte mutilus.

III. De medicamentis purgantibus. Hos Libros edidit cum ceteris Rufi Libris et Sorani de utero ac pudendo muliebri fragmento Goupylus Paris. 1554. 8°. atque eodem anno Latine forma minori. Prodierunt et inter artis medicae principes Stephani.

Novam editionem Graeco-Latinam Rufi ad MS. Bernense recensitam molitus est Martinus Bogdanus teste Thoma Bartholino (medic. epist. cent. IV. pag. 37). Testante Fabritio (Biblioth. Graeca Tom. III. pag. 103) Rufi de venereis et de ossibus memorat Labbeus Biblioth. nova MSS. pag. 126.

Perierunt autem sequentes Rufi Libri :

1°. Libri V *περὶ διαίτης*, quos memorat Suidas l. l.

2°. Libri IV *περὶ βοτανῶν* carmine hexametro



conscripti, quos laudat Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI in Praefat.

3°. Θεραπευτικὰ βιβλία, quae laudat Galenus ibidem.

4°. περὶ μελαγχολίας. Laudantur a Galeno Lib. de atra bile in initio.

A Suida l. l. adhuc memorantur.

5°. Lib. I. περὶ διαίτης πλειόντων.

6°. Lib. I. περὶ τραυματικῶν φαρμάκων.

7°. Lib. I. περὶ ούκων.

8°. Lib. I. περὶ ἀρχαίας ἰατρικῆς.

9°. Lib. I. περὶ γάλακτος.

10°. Lib. I. περὶ οἴνου.

11°. Lib. I. περὶ μέλιτος.

Ibid. βουβῶνος. Hac voce Galenus in universum glandularum tumores acutos designasse videtur, uti patet ex Lib. XIII. de meth. med. cap. 5: ὄνομαζουσι δὲ τοὺς ἐξαρθέντας ἀδένας βουβῶνας; alio loco tamen de meth. med. ad Glauconem Lib. II. cap. 1. glandularum hos tumores distinxit in βουβῶνας, φήματα vel tubercula et φυγέθλα vel panos, uti et Paulus Aegin. Lib. IV. cap. 22 et Actuarius de meth. med. Lib. II. cap. 12.; qui tamen non consentiunt, siquidem ab illo βουβῶν dicitur ἢ φλεγμονή, φῶμα vero ἢ πρὸς ἐκπύρσιν ἐπιγενομένη φλεγμονή τοῦ ἀδενός; ab hoc vero contrarium perhibetur.

Ibid. lin. 6. Δημόκριτος. Ut mihi videtur, Democritus, qui hic citatur, est Abderitanus celebris ille philosophus, qui paulo ante Hippocratem vel eodem fere tempore ac ille vixit. Hicce Democritus

autem, licet praecipue philosophiae operam dedisset, tamen auctor fuit nonnullorum librorum medici argumenti, quapropter nonnulli eum quoque auctorem habent libri *περὶ γυμνῶν*, qui vulgo Hippocratis operibus adnumeratur (Fabricius Biblioth. Graeca Tom. XIII. pag. 143.)

Ibid. lin. 7. *μολίβδου*. *Μολίβδου* est plumbum, de cuius virtutibus medicis conferantur Dioscorides Lib. V. cap. 95—98, ubi seorsum agit de *μολίβδῳ πεπλυμένῳ*, de *μολίβδῳ λελαμμένῳ*, de *μολίβδου σκωρία*, de *μολυβδοειδὶ λίθῳ* et de *μολίβδαίγῃ* (secundum Dierbach Die Arzneim. des Hippokr. molybdas plumbi oxydati) Galenus de simplic. medicam. temper. ac facult. Lib. IX. cap. 3. § 23. Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. Not. (1). *Ἐν τῷ ξε' βιβλίῳ κεφαλαίῳ Ῥουφον περὶ λιθιάσεως ἐθήσεις κοκκίνῳ*. Ut mihi videtur, pro *ἐθήσεις* legendum est *ἐθήσεος* et punctum inserendum ante *κοκκίνῳ*.

Ibid. lin. 2. *κοκκίνῳ*. *Κόκκινον* conficiebatur e *κόκκοις*, quorum duae erant species: *κόκκοι Κνίδιοι* et *κόκκοι βαφικοὶ* (Dioscorides Lib. IV. cap. 48 et 173. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 10. § 33 et 34. Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3). *Κόκκοι Κνίδιοι* autem, testibus Dioscoride et Paulo Aegin., erant fructus *θυμelaίας*, dum quicumque illos fructus dicunt *χαμελαίας* foliorum similitudine decipiuntur; Plinius vero Lib. XIII. Nat. Hist. cap. 21. *θυμει-*

*λαίαν* et *γαμαιλαίαν* eandem esse fruticem dicit; teste Sprengel autem (Pragmat. Gesch. der Medizin (Tom. I. pag. 516) erant fructus *Daphnes Gnidii* externa cortice privati; de arbore vel frutice vero, unde *κόκκοι βαφικοί* petebantur, agit Dioscorides Lib. IV. cap. 48. eorumque varias species enumerat, quarum Galatiatica et Armeniaca erant optima, dein autem sequebantur Asiatica et Cilix, vilissima erat Hispanica. De virtutibus medicis autem *κόκκων* conferantur auctores supra laudati l. l.

Ibid. Not. (2) lin. 1. *φίλων*). Uti patet e Stephano Byzantino (de urbibus et populis ad vocem *κυστός*) Philo, de quo hic mentio fit, est Herennius Philo Byblius Grammaticus, qui vixit Domitiano regnante et inter alia conscripsit Lib. XII. *περί κτησεως και εκλογής βιβλίων* (Fabricius Biblioth. Graeca Tom. III. pag. 120), quos hic innuere videtur hujus adnotationis auctor. Hic Philo autem nequaquam confundendus est cum Philone Tarsensi medico, cujus celebre medicamentum anodynum ab illo *φιλωνείον* dictum versibus descriptum cum explicatione invenitur apud Galenum de medic. compos. sec. loc. Lib. IX. cap. 4.

Ibid. lin. 2. *Ερμηπος* (*Ερμιππος*). Quisnam hoc nomen emendaverit, nescio ideoque haec mittam. Ni fallar autem, hic sermo est de illo Hermippo, qui, testante Fabritio, commentationes conscripsit in Homerum, Theophrastum aliosque et de quo (Biblioth. Graeca, Tom. II. pag. 174) dicit: Perierunt Hermippi aliique Jonsio laudati scriptores de sectis vitisve philosophorum.

Ibid. lin. 3. Σωρανός. Praeter Soranum Coüm, quem memorat Soranus junior in vita Hippocratis et Soranum Cilicem, quem memorat Suidas (Tom. III. pag. 354) quique multo sunt antiquiores, duo alii fuerunt Sorani medici ambo Ephesi nati:

1°. Soranus antiquior e secta methodica, a quo Hallerus putat Caelium Aurelianum omnia fere, quae scripsit, depromsisse, ita ut pene nihil fecisse videatur Caelius, nisi quod Sorani opera Latine vertisset (Praefat. ad editionem suam hujus auctoris pag. 12—14). Hicce Soranus autem primum Alexandriae versatus est, dein Romae medicinam exercuit, Trajano et Hadriano regnantibus, deque eo Suidas l. l. testatur, illum *πλείστα καὶ κάλλιστα* scripsisse. Ex hujus scriptis adhuc in collect. Nicetae nobis servantur: Libri *περὶ σημείων καταγμάτων τοῦ κρανίου* et *περὶ ἐπιδήσεων*, qui liber etiam invenitur in editione operum Hippocratis et Galeni cur. Renato Charterio. Praeterea a Caelio Aureliano citantur hujus auctoris Libri de adjutoriis (Acut. Lib. II. cap. 29). Lib. causarum quos *αἰτιολογουμένους* appellavit (Chron. Lib. I. cap. 3) Lib. II de coenotetis (Chron. Lib. IV. cap. I) et Lib. de febribus (Acut. Lib. II. cap. 33), a Galeno vero (de compos. medicam. sec. loc. Lib. I. cap. 8) *μόνο-βιβλος φαρμακευτικός* et Lib. IV. *περὶ φαρμακείας*.

2°. Soranus junior, de quo hic sermo esse videtur, scripsit vitas medicorum et de sectis atque syntagmatis libris X distributa (Fabritius Biblioth. Graeca Tom. XII. pag. 684); illi quoque adscri-

\*

benda est vita Hippocratis, quae in plerisque hujus auctoris editionibus legitur; citantur et a Suida l. l. IV ejus Libri *περὶ γυναικείων*, unde fortasse depromptum est fragmentum Sorani de utero ac pudendo muliebri, quod adhuc exstat (Conf. supra Nota ad verbum *Ρούφου*), quod tamen Sprengel (Pragmat. gesch. der Medizin. Tom. II. pag. 50) Sorano methodico adscribere videtur; illi quoque tribuenda sunt quae ex Sorano inveniuntur apud Aëtium Tetrab. IV. 4.

Ibid. lin. 5 et 6. *βαρυτόνος δὲ ὡς ἕπτος πύργος, ἐπὶ ἐκ μεσογαίου πόλιος τῆς Αἰγύπτου λεγομένης Κώρτου ὑπήρχεν.* Vix dubium videtur, quin hic pro *ἐπὶ* mendose legatur *ἐπὶ*.

Ibid. lin. 7 et 8. *διὰ τὸ ἀλίσκεσθαι τοὺς ἀντιλέγοντας αὐτοῦ, ὅσπερ τοὺς ἰχθύς ὑπὸ τῶν ἀλιευτικῶν κρητῶν.* Vocem *ὅσπερ* hic in *ὥσπερ* mutandam esse putavi.

Ibid. VIII. lin. 17. *παραφροσύνην.* Haec vox significat omnem mentis perturbationem in exacerbatione febris vehementis, uti patet ex Galeni Comment. in Hippocr. Aphorism. 14 Lib. VII: *ἡ μὲν γὰρ παραφροσύνη γνωρίζεται, φθεγγομένων τε καὶ πραττόντων οὐδενός ἐγόμενα λόγον* et ex ejusdem Comment. in Hippocr. Proorrheth. Lib. I. 1, ubi variae species hujusmodi delirii vel desipientiae enumerantur: *τὸ δ' ἐν ἀκμῇ σφοδροῦ πυρετοῦ παραφρονῆσαι παρακόψαι τε, καὶ παραχθῆναι, καὶ παραληθῆσαι, καὶ αὐτὸ δὴ τοῦτο παραφρονῆσαι καλοῦσι.* Ex his παραληθῆσαι videtur indicare delirium mite, uti patet ex

Aretaei de causis et signis diut. morb. Lib. I. cap. 6, ubi describitur discrimen inter λήρησιν et μανίην; ibi tamen λήρησις potius significare videtur amen- tiam senilem (Heinroth Lehrb. der Störungen des Seelenlebens. Tom. I. pag. 85): τῆδε τῆ μανίη οὐδέν τι ἴκλον ἢ λήρησις, γήραος ἢ ξυμφορῆ· αἰσθήσις γάρ ἐστι νάρκη καὶ γνώμης νάρκωσις ἢδε τοῦ νοῦ ὑπὸ ψύξιος· μανίη δὲ θερμὸν τι καὶ ξηρὸν τῆ αἰτίη, καὶ παραγώδες τῆσι προήξει· ἢ μὲν γε λήρησις ἀρχομένη ἀπὸ γήραος, οὔτε διαλείπει, καὶ ξυναποθνήσκει· μανίη δὲ καὶ διαλείπει καὶ μελεδῶνι ἐς τέλος ἀποπαύεται.

Pag. 34. lin. 12. Ad finem hujus capituli de bubone monere liceat, me ideo nullas adnotationes in illud conscripsisse, saltem in illius partem, quae de peste agit, quia ante hos duos annos de hac re libellum edidit F. Osann sub titulo: de loco Rufi Ephesii medici apud Oribasium servato, sive de peste Libyca disputatio, qua viro summo ac perillustri C. G. Hufeland gratulatur Gissae 1833. 4°. Illa autem disputatione vir doctiss. probare conatus est, pestem, de qua hic agitur, fuisse eundem morbum, qui adhuc fere quotannis in Aegypto aliisque regionibus Orientalibus grassatur, neque umquam in antiquitate exstitisse pestem, quam non comitabantur bubones communemque patriam pestibus, si non omnibus, certe plurimis Africam fuisse. Primum tamen percontatur, qua aetate regnaverit pestis, de qua hic loquitur Rufus, quique fuerint Posidonius et Dioscorides, qui hic memorantur. Asserit autem huncce Posidonium fuisse Posidonium Apameensem Stoï-

cum, qui in Rhodo philosophiam docebat, cujus que opera quae supersunt collegit ediditque Janus Bakius, quique (teste Strabone Geograph. Lib. XVII. pag. 830) refert, in Libya et Aethiopia saepe pestem oriri ab aestu et siccitate lacubus coenosis factis et locustis innumeris irruentibus; huncce virum enim doctrina insignem etiam medicinae haud imperitum fuisse credit indeque eundem illam esse putat ac ille Posidonius, qui citatur ab Apollonio Citiensi vel Mure in ejus praefatione Libri τῆς περὶ ἀσθενῶν πραγματείας in collect. Nicetae servati; Dioscoridem vero, de quo hic agitur, fuisse Dioscoridem Alexandrinum Phacam dictum Erasistrateum, qui, teste Suida (vol. I. pag. 604), aetate Cleopatrae vixit: ex his omnibus concludit vir doct., hic sermonem esse de illa epidemia, quae a. U. C. 628. Africae oras maritimas devastavit, de qua breviter mentio fit in Livii Epitomat. Lib. LX, de qua vero disertius egit Julius Obsequens De prodigiis 90, omnium tamen disertissime Orosius V. 10. ed. Paris. 1510 (Osann. l. 1.)

Hoc opusculum autem Doct. Osann. etiam laudatur in Diario Bibliothek der Praktischen Heilkunde von C. W. Hufeland dicto (Julius 1833) ibique versio invenitur hujus capituli Rufi inde a verbis οἱ δὲ λοιμῶδεις usque ad verba κατὰ ἰγνίας καὶ ἀγκῶνας, in qua versione auctor secutus est emendationem contextus a Doct. Osann. propositam, qua vocem λοιμῶ (pag. 32. lin. 14) mutavit in λοιμοῦ, quam et ego secutus sum. In hac versione tamen vitium

mihî irrepsisse videtur, quia ibi vox ἀνεκπυήτων vertitur voce Germana *eiternde*, nam ego ἀν hic loco non habui ἀποκοπήν praepositionis ἀνά, verum solummodo ἀ privantem ideoque verti *quae in suppurationem non transeunt*, cui meae sententiae etiam favet, quod plerique auctores, qui de peste egerunt, cum antiqui tum recentiores suppurationem bubonum inter bona signa recensent (Procopius de Bello Persico Lib. I. cap. 79 ed. Hoeschelii, de Wolmar Abhandlung über die Pest mit einer Vorrede von Hufeland. Berlin 1827.)

Mirum etiam mihi videtur, Doct. Osaun in supra laudato ejus opusculo nullo modo investigare, quis fuerit Dionysius Cyrtos vel gibber; negari sane nequit, Dionysium tali cognomine ornatum a nullo alio auctore citari, nisi ab unico Stephano Byzantino (de urbibus ac populis ad vocem κυρτός), ubi illum ab Herennio Philone citari dicit, neque cognomen κυρτῶν illi datum fuisse ob deformitatem corporis, verum ob urbem, unde originem petebat, sed ab aliis auctoribus citantur varii Dionysii medici, inter quos, licet aliis vel nullis cognominibus ornatos, tamen forsitan unus alterve ab hoc nullo modo differet. Lib. II enim Antidot. cap. 11, quod caput, uti ex titulo patet, ex Asclepiade petum videtur, Galenus citat antidotum, quod Dionysio Milesio auctori adscribitur; Lib. IV vero de medic. composit. sec. gen. cap. 13, qui locus etiam ex Asclepiade videtur transcriptus, citat medicamentum Dionysii Samii adversus ulcera sanatu difficilia; Comment. in Hippocr. Aphorism,



69 sect. IV. citatur Dionysius quidam, qui commentaria in eosdem aphorismos conscripsisse videtur; a Plinio Nat. Hist. Lib. XXV. cap. 2 mentio fit Dionysii Crateuae, qui librum conscripsit de usu herbarum effigiesque addidit, quemque idem Plinius citare videtur Lib. XV. cap. 11 et 20; memorat et Plinius (Lib. XXXII. cap. 7) Sallustium Dionysium; ab Athenaeo porro (Deipnosoph. XIV. pag. 648) laudantur Lib. IV. *περὶ γεωργικῶν* Dionysii cujusdam Itucaei; a Celso (Lib. VI. cap. 6) laudatur Dionysii collyrium et cap. 19 ejusdem medicamentum ad haemorrhoidas; a Caelio Aureliano (chron. Lib. II cap. 13) Dionysius articularum constrictionem in haemorrhagiis commendasse dicitur; tandem a Scribonio Largo de composit. medicam. cap. 212 citatur medicamentum quiddam Dionysii chirurgi, nam hic sermo non esse potest de Dionysio methodico, Galeni aequali, de quo loquitur Galenus (de meth. med. Lib. I. cap. 7) et saepius in celebri illa Epistola ad Caecilianum de puero epileptico, quem primum tractaverat Dionysius ille. Si autem plura de his omnibus comperta haberemus, forsitan omnes Dionysii ad tres quatuorve redigi possent, quorum nonnulli uti Samius et Milesius certo vel ante Asclepiadem vel eodem tempore ac ille vixerunt, ideoque verosimiliter aetate non longe distabant ab aetate Posidonii et Dioscoridis, quae omnia si accuratius probari possent, exinde novum argumentum peteretur pro sententia Doct. Osann; vel, si hanc opinionem tamquam satis comprobata consideremus, accuratius determinari

posset Dionysii aetas ea re, quod Rufus Ephesius ejus aequales vel discipulos (utroque modo enim verti posse verba *οἱ περὶ τὸν Διονύσιον* mihi videntur) pestem saepius jam memoratam meminisse vel ejus mentionem fecisse (nam et significatio verbi *μνημονεύουσιν* mihi hic anceps videtur) refert, si solummodo constaret, ad quemnam Dionysium referri deberet cognomen *κνυτός*.

Ne autem haec adnotatio nimis longa fiat, obiter tantummodo mentionem faciam Disputationis de origine pestis, quae legitur (Revue Médicale Janvier 1834) auctore Doct. Lagasquie, qui anno 1828 cum doct. Pariset, praeside hujus expeditionis, Doctiss. Dumon et Guillou et Ornatiss. d'Arcet, Félix et Bosc in Aegyptum adjacentesque regiones missus est a Sereniss. de Martignac, tunc temporis rerum internarum in Gallia administrationi praefecto (*ministre de l'intérieur*), ut naturam pestis perscrutarentur et explorare tentarent, qua ratione ejus propagatio cohiberi vel potius universus morbus extirpari posset, qui dein per biennium in his regionibus degit, ut munere sibi oblato fungeretur; frustra tamen pestem quaesivit in Aegypto, verum illam invenit in urbe Syriaca Tripoli, ubi per tres annos vere saevit. In hac disputatione autem auctor, qui omnes viros Doctiss. Ornatissque supra enumeratos secum in Aegyptum missos secum etiam consentire dicit, vulgarem adhuc opinionem de origine pestis profert, morbum nempe, quem hodie pestem dicimus, numquam occurrisse ante illam epi-

demiam, quae anno p. Chr. n. 542 et sequentibus magnam orbis terrarum partem devastavit cujusque historiam nobis enarrat Procopius de bello Persico Lib. I. pag. 77—80.

Pag. 32. VIII in tit. τεμίνθον ibid. lin. 1. φύματος ibid. lin. 6. φλυκταιναν pag. 36. IX. in tit. φλυκταινίδων ibid. lin. 3 σταφυλόν ibid. lin. 4. φλυκταινίδιον ibid. lin. 5. σταφυλή ibid. lin. 6. επιρυτίς et pag. 38. XI. in tit. φυέθρον. Magna confusio regnare videtur in significatione harum vocum apud varios auctores, ita ut defini fere nequeat, quid quaeque earum apud quemque auctorem significet.

Φύμα apud antiquiores e. g. Hippocratem in universum omnem tumorem praeter naturam erumpentem significat, atque hoc sensu etiam hanc vocem adhibuisse videntur discipuli Praxagorae (pag. 38. lin. 1). Hac ratione etiam vocem φύμα explicat Galenus Comment. in Hippocr. Lib. VI Epidem. sect. 1 Aphorism. 12: ἀπὸ τῶν ἐν τῇ γῆ φνομένων, οἱ ἀνθρώποι φήματα κεκλήκασιν τοὺς παρὰ φύσιν ὄγκους ὅσοι τοῦπίπαν ἀνευ τῆς ἐξωθεν αἰτίας γίνονται, μάλιστα οὖν ὀνομάζουσι οὕτω τὰ πρὸς τὸ ἐκτὸς τόπον ἐπιγεγόμενα. Aliis tamen in locis φύμα peculiarem affectionem glandularum significare videtur, uti apud Hippocr. Aphor. 26. sect. III, ad quem locum etiam Galenus in Comment. suo sequentia monet: λέγονται δ' ἐξαιρέτως ἔνια φήματα φλεγμοναί τινες αὐτόματα τάχιστα μὲν γεννώμεναι, τάχιστα δ' εἰς ὄξυ ὑψηλὸν αἰρούμεναι, τάχιστα δὲ καὶ ἐκπυύσκουμναι, καὶ

πλείστη γε καὶ ἡ τοιούτων γένεσις ἐστὶν ἐν βουβῶνι,  
καὶ μασγάλῃ, ὅτι καὶ ἀδένες ἐνταῦθα πολλοὶ φύσιν  
ἔχοντες, εἰς ἑαυτοὺς ἐτοιμῶς δέχεσθαι τὰ περιττά. Huc  
quoque pertinent quae inveniuntur apud Actuarium  
de meth. med. Lib. II. cap. 12 et Paulum Aegin. Lib.  
IV. cap. 22, quae loca jam citavi ad vocem βουβῶν;  
cum hoc autem omnino convenit Galenus de meth.  
med. ad Glauconem Lib. II. cap. 1. Tertio loco  
φύματα aliquando parvos abscessus significare vi-  
dentur, quemadmodum apud Celsum Lib. II. cap.  
8, ubi Latine vertit Hippocratis Aphor. 81 sectionis  
IV: hic enim legitur: » minuti abscessus, quos  
φύματα Graeci vocant; » alio loco vero Lib. VI. cap.  
2 dicit: » Tubercula, quae φύματα Graeci vocant.»

Eadem significatione generali, qua Hippocrates E-  
pidem. Lib. VI. sect. 1 Aphor. 12 adhibet vocem  
φύμα Diocles in contextu nostro (cap. X) adhibere  
videtur vocem φλυκταίναν; aliis locis vero φλυκ-  
ταίνα indicare videtur vesiculas illis similes, quae  
ustione oriuntur; Hesychius saltem (Tom. II. pag.  
1514) vocem φλυκταίναν explicat: τὸ ἀπὸ πυρός φύ-  
σημα γινόμενον ἐν τῷ σώματι; hoc sensu autem  
occurrit apud Oribasium Euporist. Lib. III. cap. 23,  
Actuarium de meth. med. Lib. VI. cap. 8 et Celsum  
Lib. V. cap. 28. § 15. Ab his autem omnino differre  
videntur φλυζάκια, quae Celsus l. l. sic circumscibit:  
φλυζάκιον autem paulo durior pustula est subalbida,  
acuta, ex qua ipsa, quod exprimitur humidum est.  
De hoc φλυζάκιῳ etiam loquitur Hippocrates Coac.  
Praenot. sect. II. N<sup>o</sup>. 114. Seniores auctores vero

hanc affectionem *ψυδράκιες* vel *ψυδράκια* dixisse videntur; Galenus enim (in Exeg. ad vocem) *φλυζάκια* explicat voce *ψυδράκια*; et illae pustulae, quae ab Alex. Trall. de arte medica Lib. I. cap. 5, Aëtio Tetrab. IV. I. cap. 128 et Actuario de meth. med. Lib. VI. cap. 1 memorantur sub nomine *ψυδράκιων* vel *ψυδρακίων* eadem esse videntur ac Hippocratis et Celsi *φλυζάκια*. Willan tamen (Die Hautkrankheiten und ihre Behandlung übersetzt von L. Friese. Tom. I. pag. 9), ubi de pustulis agit, a se invicem distinguit phlyzadium et psydracium, phlyzadium dicens pustulam satis magnam cum fundo inflammato vivide rubro, quae tandem transit in crustam crassam coloris obscurioris; psydracia vero parvas eminentias, quae in crustas imbricatas (blatterig) transeunt quaeque plerumque acervatim occurrunt et confluent ruptaeque humorem tenuem, aquosum emittunt. Vix dubitandum videtur, quin *φλυκτανία* (nisi fortasse haec vox mendose legatur pro *φλυκταίνα*), *φλυκταινίς* et *φλυκταινίδιον* idem significant ac *φλυκταίνα*. *Τέρμινθοι* a Galeno in Exeg. ad vocem dicuntur οἱ τῷ τοῦ τέρμινθου καρπῷ παραπλήσιοι κατὰ τὸ δέγμα συνιστάμενοι παρὰ φύσιν ὄγκοι. Ceterum hujus affectionis descriptiones, quae inveniuntur apud Oribasium Synops Lib. VII. cap. 46, Aëtium Tetrab. IV. II. cap. 62 et Paulum Aegin Lib. IV. cap. 24 parum a nostra differunt. Ultimo loco Paulus locum Oribasii, de quo hic agimus, innuere videtur, dum hoc caput sequenti modo incipit: Ὁ μὲν Ὀριβάσιος φύματος εἶδος φησὶ τὴν τέρμινθον.

Inter recentiores autem M. G. (Dictionnaire des sciences médicales Tom. XLIV. pag. 563) terminthum veterum habet affectionem scorbuticam vel syphiliticam, licet ante nostrae aerae saeculum XV nulla certa saltem scorbuti vel syphilidis vestigia demonstrari queant; Cl. Puchelt vero (Das System der Medizin in Umrissen dargestellt Tom. II. pag. 103) illum nullo modo a carbunculo differre putat, fortasse quia descriptio terminthi parum differt a definitionibus *ἀνθρακος*, quae apud Galenum (Definit. med. N°. 384 et Comment. in Hippocr. Aphorism. 45. Sect. VI) occurrunt, nam *ἀνθραξ* veterum eadem affectio videtur ac anthrax vel carbunculus recentiorum. Paulus Aegineta tamen *ἀνθρακος* et *τερμίνθους* diversas habet affectiones, siquidem Lib. IV. cap. 24. de his agit, cap. 25. vero de illis. *σταφυλήν* vel *σταφυλίον* (sic enim mihi legendum esse videtur, non vero *σταφυλόν*, ita ut *σταφυλίον* sit diminutivum *σταφυλῆς*) unicus Diocles memorare videtur; omnes vero alii auctores Graeci hac voce designant vel uvulam inflamatam vel uvulam sanam; Rufus tamen Ephesius (de appell. part. corp. hum. Lib. I. cap. 8) et Galenus (de compos. medic. sec. loc. Lib. VI. cap. 8) hujus vocis usum in significatione uvulae sanae vituperant.

*Ἐπιγονκίς*, quae etiam memoratur ab Hippocrate Prorrheth. Lib. II. pag. 95 et a Plinio Nat. Hist. Lib. XX. cap. 6, fere eodem modo ac hic describitur a Celso Lib. V. cap. 8. § 15. Oribasio

Synops. Lib. VII. cap. 37. Aëtio Tetrab. IV. II. cap. 61 et Actuario Lib. de meth. med. II. cap. 11. *Φυγέθλον* vel *φυγέθρον* (Latine panum) a Celso fere eodem modo describitur (Lib. V. cap. 8. § 10), praeter quam quod illud etiam in cervice et in alis occurrere dicit. Galenus vero (de meth. med. ad Glaucōnem Lib. II. cap. 1) Paulus Aegin (Lib. IV. cap. 22) et Actuarius de meth. med. (Lib. II. cap. 12) *φυγέθλον* dicunt *ἀδένων τὸ λεγόμενον φλεγμονώδες ἐρυσίπελας ἢ ἐρυσσιπελατώδης φλεγμονή*. Heliodorus tamen (uti patere videtur ex adnotatione (1) ad pag. 37) *φῶμα* et *φυγέθλον* unam eandemque affectionem habet.

Pag. 34. IX. lin. 8. *Πραξαγόρας*. Praxagoras fuit medicus ex antiqua schola dogmatica, qui non ita longe inde ab Hippocrate interjecto temporis spatio floruit. Fuit praeceptor Herophili, uti testatur Galenus (de differentiis pulsuum Lib. IV. cap. 3) et omnium primus voci *σφυγμῶ* (pulsus) illam tribuit significationem, qua illam nunc etiam adhibemus indeque primus quoque fuisse videtur, qui pulsatione arteriarum usus est tanquam signo prognostico vel diagnostico morborum (Galenus de placitis Hippocratis et Platonis Lib. VI. cap. 1). De ejus scriptis parum constat; a Caelio Aureliano tamen citantur. Libri IV curationum (Acut. Lib. III. cap. 4.) Libri II peregrinarum passionum (Acut. Lib. II. cap. 10.) Libri III de morbis (Chron. Lib. V. cap. 2.) Ibid. lin. 4. *Ξενοφών*. Dubitari potest, num Xenophon Coüs, de quo hic verosimiliter sermo est,

et qui citatur a Diogene Laërtio (Lib. II. segm. 59) fuerit idem ac Xenophon Erasistrateus, qui citatur in Isagoge inter scripta Galeni quae recensetur cap. 10; si enim fuerit discipulus Praxagorae Xenophon simulque Erasistrati assecla, certo pertinet ad antiquissimos hujus viri sectatores, qui eodem tempore ac ille vel jam paulo ante illum vixerunt, quoniam eundem habuit magistrum ac Herophilus, qui etiam eodem tempore ac Erasistratus vel paulo ante illum floruit; inde Sprengel solummodo unum enumerat Xenophontem Coëum Erasistrateum (Pragmat. Gesch. der Medizin Tom. I. pag. 571); Fabritius vero duos distinguit Xenophontes: Erasistrateum et Coëum (Biblioth. Graeca Tom. XIII. pag. 45 et 46). Praeterea Xenophon etiam sine cognomine citatur a Galeno (de diebus decretoriis Lib. II. cap. 7) et Caelio Aureliano (Chron. Lib. II. cap. 13); ceterum de Xenophontis aut Xenophontum vita scriptisve vix aliquid mentione dignum memoriae traditum est.

Ibid. Not. (1). lin 2. *τμήματι*. Fortasse hic quidem legendum est *μνηματι* (Commentatione), nisi exiderit vox *τρίτω*; legitur enim in tertio Comment. ad Librum Hippocratis de humoribus, quae Galeno adscribitur: terminthi vero sunt eminentiae in cute consistentes, rotundae, colore ex nigro et viridi, similes ciceris fructui. Haec explicatio tamen petita videtur ex Dioscoride Alexandrino, nam Paulus Aegin Lib. IV. cap. 24: *Διοσκορίδης δὲ ὁ Ἀλεξανδρεὺς φησὶ: τερέβινθοι εἰσὶν ἑπεροχαὶ ἐπὶ τοῦ χρωτὸς συνίσταμεναι, στρογγυλαί, μελανόχλωροι, ἐοικυῖαι τερέ-*



*βίνθου καρπόν.* Ex hoc loco patere videtur, auctorem commentationis in Hippocr. lib. de humoribus hic pro *τερεβίνθου* legisse *ερεβίνθου* (Cicer).

Ibid. IX. lin. 10. *τερεμίνθου.* Terebinthina vel certe Terebinthina Cypria Dioscoridis (Lib. I. cap. 91) erat resina, quae destillabat ex Pistacia Terebintho Linn.; Dierbach tamen (Die arzneimittel des Hippocr. pag. 220) dubitat, num Terebinthina, quam memorat Hippocrates, oriatur ab eadem arbore vel a Pino Abie. Ceterum de hujus arboris facultatibus conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. IV. cap. 5 et Lib. III. cap. 15, ubi distinguit inter Terebinthum masculam et feminam, Dioscorides l. l. Galenus de simpl. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 17. § 4 et cap. 19. § 1. Oribasius Medic. Collect. Lib. XV. cap. 1. Euporist Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. l. et Paulus Aegineta Lib. VII. cap. 3.

Pag. 36. lin. 1. *Ἰπποκράτης ἐν ἐπιδημίαις.* Rufus hic verosimiliter respicit Aphorism. 28. Sect. 3. Lib. VI, ubi fere eadem dicuntur ac loco supra memorato Libri de humoribus atque ubi fere eadem Galenus in Comment. sua ad hunc librum monet ad vocem *τέρεμίνθος* ac Pseudo Galenus in Comment. ad Lib. de humoribus, praeter quam quod Galenus *τερεβίνθου* non mutavit in *ερεβίνθου*.

Ibid. X. in tit. *Διοκλῆος.* Diocles erat medicus celeber ex antiqua schola dogmatica, qui brevi post Hippocratem vixit. Multos libros conscripsisse videtur, e quibus tamen nihil nobis superest, nisi Epistola ejus ad Antigonum regem, quae tamen a

Schulze (teste Sprengel Pragmat. Gesch. der Medizin Tom. I. pag. 484) nonnullisque aliis spuria habetur, quia parum differt ab Epistola ad Antiochum regem, quae sub nomine Hippocratis venit et Marcelli Libro de medicamentis praefigitur. Invenitur autem illa Epistola apud Paulum Aegin. Lib. I. cap. 100 et praeterea prodiit cum versione Librorum Alex. Tralliani Basil. 1541 fol.; Latine etiam vertit Nicolaüs Petrejus et ad calcem Meletii Philosophi de natura hominis vulgavit Venetiis 1552. 4°. Ex versione Antonii Mizaldi denique Paris. 1573. 8°. prodiit cum Arnoldi Villanovani ad regem Aragonum de salubri hortensium usu et variis ejusdem Mizaldi de Sena herba, de artificiosa comparatione hortensium fructuum, olerum, uvarum hortoque medico. Et ad scholae Salernitanae calcem Francof. 1612. 12°. atque Hagae Comitum 1683. Graece et Latine adhuc exstat ad calcem Syllogarum Physicarum Michaëlis Neanovi 1591. 8°. (Fabricius Biblioth. Graeca Tom. 12. pag. 462 sqq. et 585, ubi etiam ipsa illa epistola legitur).

Citantur autem a variis auctoribus sequentes Dioclis libri nunc deperditi:

- 1°. Libri *ὑγιεινῶν*, ad Plistarchum, quos citat Galenus de alimentorum facultatibus Lib. I. cap. 1.
- 2°. Lib. de passionibus, causis et curationibus. Citat illum Caelius Aurel. Acut. Lib. II. cap. 3. multisque aliis in locis.
- 3°. Anatomica, quos citat Galenus Comment. II. in Hippocratis Librum de natura hominis.

- 4°. Ἀρχίδαμος, quem citat Galenus de simplic. medicam. temper. ac facult. Lib. II. cap. 5.
- 5°. *περὶ τῶν κατ' ἰητροῦν*, quem citat Erotianus in voce ἀμβην.
- 6°. Ῥιζοτομικόν, quem citat Scholiastes ad Nicandri theriaca vs. 647.
- 7°. *περὶ πυρίων*, quem citat Eutocuis in Archimede de Sphaera (teste Fabricio l. l.), nisi hic alium Dioclem respiciat.
- 8°. Prognosticon Liber, qui citatur a Caelio Aureliano Chron. Lib. IV. cap. 8.
- 9°. *περὶ γυναικείων* Librum, quem citat Galenus Comment. in Hippocratis de Epidem. Lib. I.
- 10°. De egestionibus, quem citat Caelius Aurelianus Chron. Lib. IV. cap. 8.
- 11°. *περὶ λαγάνων*, qui citatur a Galeno Comment. IV in Librum Hippocratis de articulis.
- 12°. *περὶ ἐβδομάδων*, qui citatur a Galeno eodem loco.
- 13°. *περὶ ἐπιδέσεων*, qui citatur a Galeno Comment. III in eundem Hippocrat. Librum.
- 14°. De febribus, qui citatur a Caelio Aurel. Acut. I. 12.
- 15°. De alimentorum praeparatione, quem citat Oribasius Collect. medic. IV. 3.
- 16°. *περὶ θαλασίμων φαρμάκων*, qui citatur ab Athenaeo Deipnosoph. XV. pag. 320.
- Non possum, quin tandem et hic referam singularem hujus viri opinionem tantam apud omnes medicos celebritatem nactam, quam nobis tradit

Galenus (de differentiis pulsuum Lib. III. cap. 6) omnem nempe sudorem esse signum conditionis praeternaturalis.

Ibid. lin. 6. ὀρφνώδες. Nisi hic subintelligatur particula *τι*, haud dubie legendum est ὀρφνώδης.

Ibid. Not. (1). Quoniam adnotatio haec, quemadmodum hic legitur, nullam fere explicationem patitur et eadem fere inveniuntur apud Erotianum ad vocem ὀρφνώδες, verisimile mihi videtur, illam ex Erotiano esse transscriptam cum omissione vocum ὀρφνη γέ: ibi enim legitur: Ὄρφνώδες) σκοτεινόν. Ὄρφνη γέ λέγεται ἡ σκοτία.

Ibid. XI. lin. 6. σιλφίου lin. 8. αἱματικὴν λίθον pag. 9. κώνειον. Σίλφιον erat laser vel succus laserpitii; quae nam vero planta fuerit Laserpitium antiquorum, nondum inter viros doctos constat; uti testatur enim Cl. Dierbach, (Die Arzneim. des Hippokr. pag. 203) laserpitium Cyrenaicum multi oriri putant a Ferula tingitina vel Laserpitio gummiifero, laserpitium Medicum vero a Ferula assa foetida; Dierbach ipse tamen credit, utramque speciem ab eadem arbore oriri atque secundum della Cella quidem a Thapsia Silphium, quae tamen a Gussone et de Candolle modo varietas habetur Thapsiae Garganicæ; nuper vero pro lasere antiquorum habuerunt Laserpitium Derias Pacho, quae forte eadem est (Dierbach Flora Apiciana pag. 74 et 75). Plinius (Nat. Hist. Lib. XIX. cap. 3) laserpitii refert species tres: Cyrenaicum, Medicum et Syriacum, quod et magydaris dicebatur, quocum consentit Theo-

\*

phrastus, qui (Hist. Plant. Lib. VI. cap. 3) differentiam inter laserem et magydarin describit; Dioscorides vero tres supra laudatas species enumerat, verum etiam addit magydarin, quae in Libya nascitur (Lib. III. cap. 93).

*Αιματιτῆς λίθος* (sic enim legendum mihi videtur, non vero *αίματικῆν*) etiam ab aliis auctoribus commendatur, praecipue in oculorum morbis; a Plinio autem (Nat. Hist. Lib. XXXVI. cap. 16) species magnetis dicitur; an vero fuerit eadem materia, quae et hodie dicitur lapis haematitis, concludere non audeo.

*Κώνιον* vel *κόνιον* erat Conium maculatum Linn.; teste Dioscoride (Lib. IV. cap. 79) maxima efficacissimaque vis erat Creticae, Megareae, Atticae et quae in Chio ac Cilicia nascitur. De his tribus medicamentis autem conf. Theophrastus l. l. et Lib. VI. cap. 11. Lib. VIII. cap. 2 et Lib. IX. cap. 8 et 15 et Lib. de lapidibus, Dioscorides l. l. et Lib. V. cap. 44. Plinius l. l. et Lib. XXIV. cap. 13. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 10. § 67, Lib. VIII. cap. 18. § 16, Lib. IX. cap. 2. § 2. Oribasius Collect. Medic. Lib. XII, XIII et XV. cap. 1 et Euporist. Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. l. et I. II. cap. 13. Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Pag. 38. XII. lin. 3. φασὶ δὲ συνεδρνεῖν αὐτῷ ἔρυνθος μετὰ οἰδήματος ὥσπερ καὶ τῷ φύματι καὶ οὐκ ἔλασσον ἔμπνον τοῦ φύματος γίνεσθαι. Colon ante ὥσπερ mihi hic delendum esse videtur.

Ibid. lin. 7. *ὅτι ὁ μολύδικοσ.* Vix dubium mihi videtur, quin hic vitium irrepserit atque *μολύδικον* sit legendum pro *μολύδικος* et *ὁ* vel *τὸ* pro *ὁ*, sed praeterea vox *μολύδικος* mihi plane est incognita; hanc ob rem illam derivari a *μολύνω* polluo et verti sordidae indolis.

Ibid. XIII. in tit. *συρίγγων.* Eodem modo fere ac in adnotatione ad hanc vocem definitur illa, definitur quoque ab Aëtio Tetrab. IV. II. cap. 55. Paulo Aegin. Lib. IV. cap. 49 et Actuario de meth. med. Lib. IV. cap. 16, eadem etiam adhibita comparatione; et totum Caput, de quo nunc agimus, fere iisdem verbis expressum invenimus apud Aëtium l. l. Galenus vero (de tumoribus praeter naturam cap. 5) *ἔτι δὲ καὶ ἡ σύριγξ*, inquit, *ὀνομαζομένη στενὸς καὶ προμήκης κόλπος, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις κόλποις προστελλομένη τε καὶ αὐθις ἀφισταμένη δι' ἐπιρροὴν περιττωμάτων, ὡσπερ ἐκεῖνοι;* Auctor vero Definit. med. N°. 421. *Σύριγξ ἐστὶν ὑποφορὰ τυλώδης, στενὴ καὶ ἐπιμήκης: ἔσθ' ὅτε καὶ σκολιωμένη ἀναπούλωτον ἔχουσα τὸ στόμιον, δι' οὗ ὑγρὸν κατὰ τινὰς καιροὺς ἐκκρίνεται.* Celsus fistulam sequenti modo definit: id nomen est ulceri alto, angusto, calloso (Lib. V. cap. 28. § 12), qui locus omnino cum hoc capite conferri meretur.

Pag. 40. lin. 3. *ἐπεὶ αἱ μὲν αὐτῶν εἰσὶν ἐϋθυτενεῖς: αἱ δὲ σκολίαι καὶ τῶν ἐϋθυτενῶν: αἱ μὲν,* Punctum pone *ἐϋθυτενεῖς* mihi in comma mutandum esse videtur et colon pone *ἐϋθυτενῶν* tollendum.

Pag. 42. lin. 10. *κατανοήσωμεν.* Vix dubium videtur, quin hic pro *κατανοήσωμεν* legendum sit *κατανοήσομεν.* *ὅτι ἴσιν ὁ δὲ συνέθεται ὅτι κατανοήσωμεν*

Ibid. lin. 12. in marg. *Γρ. τὸ τέλος.* Hujusmodi adnotationes infra saepius occurrunt variamque lectionem indicare vel explicationi codicis inservire et ab aliquo grammatico profectae esse videntur; plerumque tamen lectio harum notarum paulum a lectione contextus differt; nonnumquam etiam infra inveniuntur in margine adnotationes, quibus adscriptae sunt literae Cod.; has emendationes habui editoris.

Ibid. lin. 21. *τὰ δὲ ἀντὰ παρακολούθῳν καὶ ταῖς εἰς μῦν καθηκούσαις σὺργεῖ.* Hic pro *παρακολούθῳν* mihi legendum esse videtur *παρακολούθει*, quemadmodum et infra lin. 26, licet mihi vix verisimile videatur sic legi ob vitium typographi vel illius, qui codicem transcripsit, quoniam bis idem mendum hic occurrit.

Ibid. lin. 22. *σαρκι.* *Σάρξ* apud Hippocratem fere semper significat musculos, uti patet ex Galeni Comment. II. in Hippocratis Lib. de fracturis: *ὅς ἡμεῖς μὲν εἶπομεν, ἐν τῷ προγεγραμμένῳ λόγῳ τοὺς ὀνόμασε σάρκας, συνήθει χρώμενος τῇ προσηγορίᾳ.* Rufus Ephesius vero huic voci tribuit significationem magis generalem; Lib. I. enim de appell. part. corp. hum. cap. 35: *Σάρξ* autem, inquit, in visceribus illud est, quod inter vascula concretum reperitur, subtegmen quoddam ac veluti receptaculorum texturæ fartum, quo inania ejus spatia compleantur. In

musculis *σαρξ* pars fibrosa ac firma est et quae in ulceribus ossiumque cavis recens concrevit. Prima tamen significatio a Rufo voci *σαρκι* tributa tempore Galeni non amplius usitata fuisse videtur, nam Lib. X. de meth. med. cap. 11. sequentia dicit Galenus: *ἀλλὰ τὰ μὲν ἐν τοῖς σπλάγγνοις, οἷα ἥπατι καὶ νεφροῖς καὶ σπλῆνι καὶ πνεύματι, παρεγγύματα καλοῦσι· τὰς δ' ἐν ἐντέροις, καὶ γαστρὶ καὶ στομάχῳ καὶ μήτρα ἀγωνίμους ἀπολείπουσι.* Galenus igitur hac voce mihi magis indicare videtur telam cellulosa, cui sententiae favere videtur locus in Comment. I. Galeni ad Hippocratis librum de fracturis inveniendus, ubi describit texturam musculorum: *ὁ γὰρ τοῦ μῦς ὅλος ὑπὸ τῆς φύσεως γεννᾶται ταῖς ἕνεσι ταύταις, ἐπιπηγνυμένης ἐν κύκλῳ τῆς ἀπλῆς σαρκός, καὶ αὐτῆ τοῦ μύος ἐστὶν ἡ ἰδιὰ οὐσία* atque hac significatione etiam hic vox mihi adhiberi videtur, dum pus quod ex *σαρκός* effluit fistula dicitur *παχύτερον καὶ ἀργότερον.*

Pag. 44. XIV. § 1. Cum hac § omnino conferatur Celsus Lib. VII. cap. 4. § 1.

Ibid. lin. 33. *τύλλους*. Certo pro *τύλλους* hic legendum est *τύλους*.

Pag. 46. lin. 1. *τὸ πλατὺ μῆλης*. Vix dubium videtur, quin hic inter *πλατὺ* et *μῆλης* inserendum sit *τῆς*. *Τὸ πλατὺ τῆς μῆλης* autem erat cochlearculum in extremitate nonnullorum specillorum certae cujusdam mensurae capax, quo nonnumquam utebantur antiqui ad quantitatem medicaminum determinandam, uti patet ex Hippocr. Lib. de rat.



vict. in morb. acut. in fine, ubi adversus hydro-  
pem anasarcam commendantur *λέπιδος μῆλαι τρεῖς*  
*τῷ πλάτει*. Galenus in Exeg. et hanc vocem expli-  
cat *τῷ κναθίσκῳ τῆς ὀφθαλμικῆς μῆλης*. *Κναθίσκος*  
autem *μῆλωτρίδος* etiam occurrit apud Nicol. Myreps.  
Sect. XLVIII. Cap. 6., ubi tamen Leonhardus Fuch-  
sius, qui hunc auctorem Latinitate donavit, hanc  
vocem non rite intellexisse videtur, quoniam in ad-  
notatione sua ad hunc locum dicit: »generatim ve-  
ro *κναθίσκος* Graecis specillum significat.” Haec pars  
autem Latine dicebatur aversum specillum vel auri-  
scalpium, uti patet ex Marcelli de medicamentis Cap.  
31: »Auriscalpio averso, quam partem *κναθίσκον*  
Graeci vocant.”

Ibid. lin. 2. *πυρῖνα*. Aliis in locis capitulum spe-  
cilli etiam dicitur *πυρῖν*.

Ibid. lin. 15. *τετερηδονισμένον*. *Τερηδών* erat mor-  
bus ossium, qui sequenti modo a Galeno definitur in  
Definif med. N°. 395: *τερηδών ἐστίν ὀστοῦ κατάτρησις*  
*ἀπὸ φθορᾶς · τὸ δὲ ὄνομα τῷ πάθει ἀπὸ τῶν συμβεβη-*  
*κότων τρημάτων; οἷον εἰ τις τρηδὼν οὖσα*. *Τερηδών*  
autem vel *τρηδών* significatione primaria indicabat  
vermem ligna corrodens, uti patet ex Hesychio (Tom.  
II. pag. 166) et Suida (Tom. III. pag. 449).

Ibid. 3. lin. 2. *τετραγώνων ἐκκοπέων*. Cujusmodi  
fuerint hi *τετραγῶνοι ἐκκοπέες* uti et *γομφωτῆρες*, qui  
infra pag. 48. lin. 5. memorantur, definire nequeo,  
quoniam apud nullum alium auctorem occurrunt,  
quantum scio; ob adjectivum *στένων* tamen conji-  
cere licet *γομφωτῆρες* non multum differre a *ξυστήρες*,  
de quibus supra diximus.

Pag. 48. lin. 15. *μετά τοῦ γυμνωθῆναι.* Hic, ut mihi videtur, pro τοῦ legendum est τό.

Ibid. lin. 22. *σπάθην.* Σπάθη apud Oribasium Collect. Medic. Lib. XLIV. Cap. 4., uti et apud Celsum Lib. VIII. cap. 15. significabat instrumentum oblongum, quo utebantur ad membra luxata reponenda vel quod saltem partem constituebat machinamentorum ab antiquis ad hanc rem adhiberi solitorum; ideo hic mihi videtur instrumentum ejusdem figurae, verum multo brevius minusque.

Ibid. *ἔπειτα μηνιγγοφιλιακα ὑπερβάλλοντες ἢ σπάθην τῶν ξυλίων τούτων ἢ καί τι ἕτερον ὁμοιοειδές τούτοις σῶμα κατ' ἐπικόπον τούτων τινός.* Colon post τούτων mihi tollendum esse videtur. Verba κατ' ἐπικόπον, duce adnotatione (2), verti ut *fulcimento inserviat*; vulgo autem τὸ ἐπίκοπον dicitur mensa, in qua laniæ carnes concidunt, quacum hic aliquo modo conferri videtur spatha vel meningophylax.

Pag. 50. lin. 15. *μελανθὲν ἢ λιπανθὲν ἢ τερηδομισθὲν.* De his morbis ossium conferatur Celsus Lib. VIII. cap. 2; hicce auctor enim ibi distinguit duos ossium morbos: cariem vel teredinem et nigritiem, quorum uterque tamen eo incipiebat, quod os pingue fiebat. Ossa pinguefacta (*λιπανθέντα*) videntur igitur esse ossa carie vel necrosi in primo stadio affecta; caries veterum videtur idem esse morbus, qui et nunc dicitur caries, cum Celsus l. l. mollietiam semper tamquam princeps signum affert, quo ossa carie affecta a sanis distinguuntur; nigrities forsitan erat necrosis vel saltem illa species necrosis,

quae nigro colore est tincta ; non semper certe mol-  
lia fuisse videntur ossa ; quae ab antiquis μελανθέρτα  
dicebantur.

Ibid. Not. (2) δυσσεργέστερα μένη τε καὶ οὐ πάντῃ  
δυσκατόρθωτος. Haec lectio mihi lectioni contextus  
postponenda esse videtur.

Pag. 52. 7. lin. 16. τῶν ἐκτυλοτικῶν φαρμάκων.  
Talia medicamenta nonnulla enumerantur a Paulo  
Aegin. Lib. IV. cap. 49.

Pag. 54. lin. 9. πλαγῆα. Πλαγῆα hic videtur  
esse femininum cuiusdam adjectivi πλαγῆς vel πλά-  
γειος, quod idem significat ac πλάγιος, licet tale  
adjectivum nusquam alibi occurrat, nisi solummodo  
hic legendum sit πλάγια vel etiam πλατεῖα.

Ibid. lin. 12. πλατυμήλης. Hic haud dubie pro  
πλατυμήλης legendum est πλατυμήλην vel τὸ πλατὺ  
τῆς μήλης.

Ibid. lin. 15. ἐστορισμένα. Vix dubium videtur  
quia hic pro ἐστορισμένα legendum sit ἐστορέσμένα.

Ibid. 9. lin. 3. τῶν τεϊμασητήρων καὶ τῶν κροτα-  
φικῶν μυῶν. De situ horum musculorum conf. Ru-  
fus Ephesius de appell. part. corp. hum. Lib. I.  
cap. 20.

Pag. 56. lin. 1. εἰ δὲ κατὰ τὴν ὑπερώαν ἐκ τῶν  
ἐνδοθέν μερῶν συστάσα ἢ σιγίξ φθείρει τὸ ὀστούν,  
εἰ μὲν διὰ πάχους ἐκ τῶν ἔξωθεν μερῶν καὶ τὰ μῆλα  
χιάσαντες, οὕτως ἐκκόψομεν τὸ ὀστέον. Hic mihi  
comma inserendum esse videtur pone πάχους.

Ibid. 10. lin. 6. καλαμίσκοις. Quam figuram ha-  
buerint hi καλαμίσκοι, definire non audeo ; quia apud

nullum alium auctorem occurrere videntur, licet illam jam aliquo modo ex ipso nomine conjicere possumus.

Pag. 58. lin. 5. ὀριγανοποιίας. Loco ὀριγανοποιίας hic mihi legendum esse videtur ὀριγανοποιίας.

Ibid. 11. lin. 1. ὄσαι δὲ εἰς βρόχον καθήκουσι σύριγγος. Vix dubium mihi videtur, quin hic pro βρόχον legendum sit βρόγγον et pro σύριγγος σύριγγες.

Ibid. lin. 13. εἰ δ' ὀλίγον ὁ ὑπεζωκῶς πάθοι... παραπλησίως ἐγχορήσομεν ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν εἰς βρόχον κατατεινουσῶν. Hoc loco vocem ἐγχορήσομεν mutavi in ἐγγειρήσομεν et colon ante ὥσπερ delevi.

Ibid. 12. lin. 5. γαστρορῆαφίας. Hujus operationis methodus legitur apud Galenum de meth. med. Lib. VI. cap. 4., quem secutus est Paulus Aegin. Lib. VI. cap. 52.

Ibid. lin. 6. εἰ δὲ μὴ ἐπιδέχοιτο τὸ σχῆμα τῆς σύριγγος μυρσαιοειδῆ περιαιρέσειν κυκλωτερῆ, περιγράψαντες, τὸν κατὰ συνσάρκωσιν τῆς θεραπείας ἐπάξομεν τρόπον. Comma pone κυκλωτερῆ mihi tollendum esse videtur.

Pag. 60. lin. 5. τυλοὶ. Liceat mihi hic inserere definitionem τυλου apud Paulum Aegin. Lib. VI. cap. 77. invenienda: ὁ δὲ τυλὸς ναστὴ τις ἐστὶν καὶ λευκὴ καὶ ἄνικμος σὰρξ, διὸ καὶ ἀνώδυνος, μῆτε φλεβὸς μῆτε νεύρου διατείνοντος εἰς αὐτήν.

Ibid. 13. lin. 2. τὰ δ' ἐν τοῖς σὺλοις συρίγγια. De his fistulis conferatur Aëtius Tetrab. II. IV. cap. 26.

Ibid. lin. 7. ἐπὶ δὲ τῆς ἕδρας φανερώσας μενούσης τῆς σφριγγος. De ani fistulis earumque incisione etiam legantur Aëtius Tetrab. IV. II. cap. 11, Paul. Aegin. Lib. VI. cap. 78 et Actuarius de meth. med. Lib. IV. cap. 6.

Pag. 62. 15. lin. 3. σφριγγότομον. Instrumentum, de quo hic agitur, erat falcatum, uti patet ex Paulo Aegin. Lib. VI. cap. 78., ubi dicitur δρέπανον σφριγγόστομον et secundum Sprengel (Pragmat. Gesch. der Medizin Tom. II. pag. 132) capitulo instructum; nisi tamen verba apud Paulum legenda cap. 52. (teste Jano Cornario in adnot. sua ad illud valde corrupta) sint depravata, omnia σφριγγότομα non erant falcata, nam illic sermo est de σφριγγώμασι ὀρθοῖς, licet apud Galenum de meth. med. Lib. VI. cap. 4., unde hoc Pauli caput exscriptum esse videtur, legatur τὰ καλουμένα σφριγγότομα; addit porro Galenus τὰ δ' ἀμφήγη τῶν μαχαίριων, ἢ κατὰ τὸ πέρας οξεία παντὶ τρόπῳ φευκτέα, unde colligere possumus σφριγγότομα neque ancipita fuisse, neque cuspide acuta instructa; itaque ex his omnibus mihi etiam vero satis simile videtur, ἡμισπάθον vel ἡμισπάθιον in universum ab antiquis vocari scalprum acuta cuspide carentem unaque acie instructum; videtur enim et in fine hujus capituli ἢ οξεία opponi τῷ ἡμισπάθῳ, subaudita fortasse voce σμίλη; ad fistulam ani occultam vero perviam reddendam Paulus adhibet κοπάριον, quod forte nullo modo ab ὀξείας differt.

Pag. 64. 16 lin. 8. ἱπποτηρίῳ. Vix mihi dubium videtur, quin hic de instrumento aliquo fiat sermo,

licet, quantum scio, apud nullum alium auctorem hoc nomine instrumentum quoddam indicetur ideoque ejus figura determinari non queat; apud Galenum tamen de medic. compos. sec. gen. Lib. IV. cap. 7 et Aëtium Tetrab. III. II. cap. 22. citatur malagma Ipoterium inscriptum, de quo sequentia Philagrii verba affert hicce: » Pharmacum accom-  
 » modatum ac prosperi successus, cujus periculum  
 » feci in hydropicis, splenicis et affectionibus inve-  
 » teratis: deprimit enim tumorem." *καθ' ἑαυτὴν ἰσχυρὸν*

Ibid. 17. lin. 6. *καθετήρ*. *Καθετήρ* erat instrumentum oblongum, cavum, rectum, incurvum, quod adhibebatur ad medicamenta in vesicam urinariam infundenda, uti colligere possumus ex Galeni de meth. med. Lib. V, ubi saepius hujus instrumenti fit mentio. Explicatio enim hujus vocis, quae hodie in Galeni Exeg. legitur, (teste Foësius Oecon. Hippocr. ad vocem *καθετήρ*) ad loca corrupta pertinere videtur, quoniam in illo loco Hippocr. (de morbis mulierum Lib. II. pag. 659), ad quem unice haec explicatio referri possit, in optimis MSS. non legitur *καθετήρ*, verum *καθετήριον*. Quomodo autem in vesicam immitti debeat illud instrumentum, nos docet Paulus Aegin. Lib. VI. cap. 59. *καθ' ἑαυτὴν ἰσχυρὸν*

Ibid. lin. 9. *ἵνα . . . . ἀσύντροχον φυλάξωμεν τὸν τῆς κύστεως τράχηλον*. Variæ erant partes, quas lædere aut incidere quam maxime verebantur antiqui quasque tamen satis tuto lædi vel incidi posse recentiorum docuit experientia. Ad has partes imprimis pertinet vesica urinaria, uti patet, cum ex hoc loco, tum ex variis

antiquorum locis, ubi de lithotomia agunt, quam vel plane rejiciunt ob metum, ne fistula remaneat, uti Aëtius Tetrab. III. III. cap. 5, vel nonnisi in gravissimis casibus, ubi mortis periculum imminet, instituere commendant, postquam prius tentaverant, an calculi etiam concussione totius corporis aegroti in urethram propelli et ex illa ope vulsellae extrahi possent, verum etiam in delineationibus hujus operationis, quae apud illos leguntur, ubique hunc metum deprehendimus. Celsus enim Lib. VII. cap. 26, de illa agens: » Neque vero festinanter in hac » re, inquit, agendum est; sed ita, ut quam ma- » xime id tuto fiat. Nam laesa vesica nervorum dis- » tentiones cum periculo mortis excitat." Nihilomi- nus tamen incisuram ipsius vesicae calculo paulo majorem facere jubet, » quia calculus iter, cum vi » promitur, facit, nisi accipit. Ex quo et sanguinis » profusio et distentio nervorum fieri potest, quae » si quis evasit, multo tamen patientiorem fistulam » habiturus est, rupta cervice, quam habuisset, in- » cisa." Paulus Aegin. autem, qui hanc operationem adeo negligenter describit, ut dubitemus, an cutem ceteraque integumenta seorsum, an simul cum collo vesicae findat, Lib. VI. cap. 60 valde metuit, ne nimis magnum vesicae infligat vulnus, dicens l. l. : *ὥστε τὴν τομὴν ἔξωθεν ἐνρυχωρίαν ἔχειν, ἐνδοθεν δὲ μὴ πλέον ἢ ὥστε τὸν λίθον δυνηθῆναι δι' αὐτῆς ἐκπεσεῖν.* Aretaeus de curat. acut. morb. Lib. II. cap. 9. modo obiter hujus operationis mentionem facit. Huic autem metui verisimiliter suam etiam

originem debet lithotomia ope apparatus magni. Porro ad partes, quibus incisis adeo timebant veteres, recensendus quoque est sphincter ani, ut patet ex § 14. hujus capituli et ex variis auctoribus, quos citavi ad pag. 60. § 13. lin. 7 l. l.

Ibid. lin. ult. et seqq. *κρυπτῆς δὲ σύριγγος γενομένης* cet. usque ad *καὶ ὄλκῳ ἐκτέμνειν*. Primo ad spectu sensus horum verborum aliquantulum videtur obscurus, verum si *τὴν σύριγγα* consideremus tamquam explicationem verborum *τῆς δ' ὑποφορᾶς πλάτος* ideoque haec referamus ad verbum *ἀποτεῖναι*, si porro colon pone *ὄντος* mutemus in comma, sensus, ut mihi videtur, multo fit clarior; vocem *ὄλκῳ* autem, quae mihi primum instrumentum quoddam significare videbatur, nunc consideravi tamquam rationem explicans, qua incisio fieri debeat; tale instrumentum enim apud nullum alium auctorem memoratum inveni.

Pag. 66. 18. lin. 4. *δακτυλον*. Vix dubium videtur, quin hic pro *δακτυλον* legendum sit *δακτυλίον*.

Ibid. lin. 5 η. Si hoc loco pro η legamus ἦ, haec verba mihi multo meliorem sensum praebere videntur.

Ibid. lin. 7. *τῷ ἐδροδιαστολεῖ διοπτρίῳ λέγω*. Tale instrumentum ad anum vel vaginam dilatandam explorandamque jam occurrit apud Hippocratem sub nomine *κατοπτῆρος* Lib. de fistulis pag. 884 et de haemorrh. pag. 893; Galenus enim in Exeg. ad vocem: *τῷ καλουμένῳ ἐδροδιαστολεῖ*, inquit, ὡσπερ



γε καὶ δίοπτρα ὁ γυναικῶν διαστολῆς et Erotianus ad vocem *κάτοπτρον* (ubi fortasse legendum est *κατοπτήρ*) dicit *τὴν μηλωτὴν*, ubi haud dubie de *μηλῆ διαστομοτριδί* est cogitandum. Paulus Aegin. etiam variis in locis speculum ani vel vaginae dicit *δίοπτραν*, uti Lib. III. cap. 65, Lib. VI. cap. 73 et 78; erat autem forceps, cujus rami ope cochleae distendebantur (Sprengel Pragmat. Gesch. der Medizin Tom. II. pag. 131). Ceterum omnia, quae hac §. continentur usque ad verba *ταῦτα γινέσθω ἐπὶ τῶν μονοστόμων* cet., fere iisdem verbis expressa leguntur apud Paul. Aegin. Lib. VI. cap. 76, ubi citantur ex quodam Leonidae libro; dum etiam Aëtii Tetrab. IV. II. cap. 11, quod de fistulis ani agit, in titulo ex Leonida peti- tum dicitur, unde ego mihi satis tuto concludere posse videor, libros Heliodori vel Antylli, ex quibus Oribasius haec depromsit, aetate Aëtii et Pauli Aeginetae jam deperditos vel saltem his auctoribus incognitos fuisse ideoque illos de fistulis ani Leonidam consuluisse, qui etiam sua de hac re scripta ex Antyllo vel Heliodoro exscripserat. Hinc etiam verba *αὐτοῦ ἐκ τῶν Λεωνίδου κεφαλαίων* ex adnotatione ad calcem hujus pag. excidisse et nescio quo casu fortuito ad notam ad calcem sequentis pag. translata esse videntur; verba enim *ἐν τούτῳ*, quae nunc satis inepta hic legi videntur, tunc a quolibet statim intelligentur, qui sciat, apud Paulum Aegin. l. l., ubi verba Leonidae citat, legi: *τῷ ἐδροδιαστολεῖ, τῷ μικρῷ δίοπτρῳ λέγω*. Haecce methodus ta-

men, sive ejus auctor fuerit Antyllus, sive Heliodorus, Paulo Aegin. non multum probanda videtur, quia *ἐδροδιαστολεῖς* saepius potius tenebras effundit, quam lucem affert. Erat autem Leonidas unus ex novissimis scholae pneumaticae sectatoribus Galeno etiam serior, quem citat in fragmento ab Aëtio l. l. nobis servato; citatur autem a Caelio Aureliano Acut. Lib. II. cap. 1. et ab auctore Isagoges, quae Galeno adscribitur, cap. 4. De ejus operibus nil nisi fragmenta exstant apud Aëtium et Paulum Aegin., inter quae multa inveniuntur lectu haud indigna.

Pag. 68. lin. 15. *φίμος*. *Φίμος*, uti dicit Galenus (Definit. Med. N°. 415), *ἔστιν ἡ τῶν πόρων φυσικῶν κατάκλεισις* atque hoc sensu etiam vox occurrit apud Paulum Aegin. Lib. III. cap. 73, licet Lib. VI. cap. 55. hac voce indicetur atresia praeputiî, quae alioquin, uti et hodie, dicitur *φίμοσις*.

Pag. 70. lin. 5. *ναρθήμιον ἢ φιλιόριον σανίδιον*. *Νάρθηξ* erat Ferula communis Linn. vel Ferula glauca Linn; *φιλιρέα* vero erat verosimiliter Tilia Europaea. De viribus ac proprietatibus autem harum plantarum egerunt Theophrastus Hist. Plant. Lib. VI. cap. 2. Lib. I. cap. 20. Lib. III. cap. 10. et Lib. VI. cap. 7. Dioscorides Lib. III. cap. 91. et Lib. I. cap. 125. Plinius Nat. Hist. Lib. XX. cap. 23. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 13. § 4. Oribasius Collect. Medic. Lib. XII. et Lib. XV. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Vox *νάρθηξ* tamen saepe alio sensu occurrit sig-

nificatque assiculum ad membra fracta fulcienda vel firmanda et in eodem situ retinenda, qui ad hunc usque diem etiam ferula dicitur, forsitan quia antiquitus ex ligno ferulaceo confici solebat. Quomodo autem se habere debeant, legimus apud Hippocr. de offic. medici pag. 745.

Ibid. 20. lin. 3. τὸν ἐλυτροειδῆ χιτῶνα. De hac tunica, uti in universum de omnibus testiculi integumentis, conferantur Celsus Lib. VII. cap. 18. et Rufus Ephesius de appell. part. corp. hum. Lib. I. cap. 32 et Lib. II. cap. 15.

Ibid. lin. 16. τὸν κεκακωμένον δίδυμον ἀφελεῖν. De extirpatione testiculorum conf. Paulus Aegin. Lib. VI. cap. 78, qui duas hujus operationis tradit methodos, τὴν κατὰ θλάσιν et τὴν κατ' ἐκτομὴν; hic tamen auctor mihi non agere videtur de extirpatione ob morbum aliquem, uti patet ex initio hujus capituli: σκόπον ἐχούσης τῆς ἡμετέρας τέχνης, ἀπὸ τοῦ παρὰ φύσιν ἐπὶ τὸ κατὰ φύσιν ἐπανάγειν τὰ σώματα, τῆς ἐναντίας ὁ ἐυννησμός ἐπαγγελίας τετύχηκεν ἰατρῶν ἑπειδὴ καὶ ἄκοντες πολλὰς ὑπὸ τινῶν ὑπερεχόντων εὐνοχίζειν ἀναγκαζόμεθα, uti et ratione, quare primam methodum vituperat: οἱ γὰρ τεθλασμένοι ποτὲ καὶ συνοσίας ὀρέγονται.

Pag. 72. in tit. Μέγης. Meges erat chirurgus eruditissimus (uti dicit Celsus Lib. VII. Praef.) ex secta methodica, qui vixit ultimo ante aeram nostram saeculo; Sidonius dicitur a Galeno de meth. med. Lib. VI. cap. 6., qui locus verosimiliter respicitur in annotatione ad calcem hujus pag. De ejus operibus

fere nihil amplius exstat; citatur tamen a Celso Lib. V. cap. 28. a Galeno de compos. medicam. sec. loc. Lib. V. cap. 3. a Plinio Lib. XXXII. cap. 7. et a Scribonio Largo de medicam. compos. cap. 202.

Ibid. Lin. 3. *κολλυρίων*. Collyrium Foësius (Oecon. Hippocr. ad vocem) dicit medicamentum longum, rotundum, et in oblongam formam compactum cohaerensque ex succis, liquoribus, seminibus, fructibus et metallicis compositum, quod in usum asservabatur. De illo autem hic afferre liceat mihi quae apud Oribasium leguntur Collect. Medic. Lib. X. cap. 23: » Quae collyria proprie dicuntur; ea » oculis adhibentur; laevigata vero quae communi- » ter integra nominantur, alia opponuntur, alia » imponuntur: apponuntur autem utero: imponun- » tur vero fistulis et sinibus; quaeque utero ad- » hibentur, purgationes provocant, et foetum edu- » cunt, » atque deinceps: » Debent autem collyria » longitudinis quatuor digitorum esse eorumque fi- » gura caudae muris esse similis. Sunt etiam li- » namentis aut filo oblongo appendenda, ut, quum » temporis quod satis sit permanserint, avelli foras » queant. » Conf. tamen et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 16.

Ibid. lin. 18. *ἀλόης ἢ στρυπτηρίας ἢ ἰοῦ καὶ λεπιδος*. Aloë Hippocratis aetate nondum cognita fuisse videtur; Galenus etiam plantam, unde oritur, non noverat, (de medic. simpl. temper. ac facult. Lib. VI. cap. I. § 23) licet Plinius illam jam de-

\*

scripsisset (Nat. Hist. Lib. XXVII. cap. 4); variae erant species hujus medicamenti, inter quas optima erat Indica; conf. autem Dioscorides Lib. III. cap. 25. Galenus et Plinius l. l. Oribasius synops. Lib. I. cap. 17 et VII. cap. 11. Medic. Collect. Lib. XI et Lib. XV. cap. 1. Euporist. Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. et I. II. cap. 196. Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3 et 4. Actuarius de meth. med. Lib. V. cap. 8 et Rufus Ephesius de medicam. purgant.

Στυπτηρία, cujus tres species *σχιστή*, *στρόγγυλη* et *ύγρα* enumerantur a Galeno (de medicam. simpl. temper. ac facult. Lib. IX. cap. 3. § 30) cujusque alias etiam species alii auctores memorant, etsi non iisdem semper nominibus utantur, erat Alumen nativum Waller (Dierbach Die Arzneim. des Hippokr. pag. 246); conf. autem de illo Dioscorides Lib. V. cap. 123. Plinius Hist. Nat. Lib. XXXV. cap. 15. Oribasius Collect. Medic. Lib. XIII. et Lib. XV. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. II. cap. 74 et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ἰὼν erat Viola odorata Linn., cujus varietates colore distinguuntur ab antiquis; Theophrastus enim (Hist. Plant. Lib. VI. cap. 6 et 7) distinguit *λευκόν* et *μελάν*; Plinius vero (Nat. Hist. Lib. XXI. cap. 19) album et luteum et Oribasius Collect. Medic. Lib. XI. album, qui et *λευκοῖος* dicebatur, luteum et purpureum; ceterum de ejus viribus ac proprietatibus conf. Theophrastus l. l. Dioscorides Lib. IV. cap. 122. Plinius l. l. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 9. § 3. Oribasius l. l. et Lib.

XV. cap. 1., uti et Euporist. Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Λεπίς Latine dicitur *squama aeris*, a Cl. Dierbach vero (l. l. pag. 253) *Kupferschlacke*; de ejus viribus ac proprietatibus egerunt Dioscorides Lib. V. cap. 89. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. IX. cap. 3. § 16. Oribasius Collect. Medic. Lib. XIII. Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. lin. 23. σπόγγον ὑπὲρ ὄξει cet. Σπόγγον erat spongia officinalis, de cujus proprietatibus, usu atque viribus conf. Dioscorides Lib. V. cap. 138. Plinius Nat. Hist. Lib. IX. cap. 45, ubi variae ejus species enumerantur et Lib. XXXI. cap. 11. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. XI. cap. 2. § 11. Oribasius Collect. Medic. Lib. IX. cap. 23 et Lib. XIII. Euporist. Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. II. cap. 73 et I. III. cap. 170 et Paulum Aegin. Lib. VII. cap. 3. De ὄξους (aceti) viribus medicis vero conf. Dioscorides Lib. V. cap. 21. Plinius l. l. Lib. XIV. cap. 21. Galenus l. l. Lib. VIII. cap. 15. § 10. Oribasius Collect. Medic. Lib. XIV. cap. 10. Lib. XV. cap. 1 et Euporist. Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. Paul. Aegin. l. l. et Actuarius de meth. med. Lib. VI. cap. 1.

Pag. 74. lin. 2. ἄρτον πεπονημένον. Haud incongruens mihi videtur, hic nonnulla monere de variis speciebus panis apud veteres usitatis, licet exinde mihi nondum satis dilucide pateat, quid fuerit ἄρτος πεπονημένος, quae species, quantum scio, apud

nullum alium auctorem occurrit; haud dubie tamen pertinebat ad panis species aliqua cura paratas et fortasse quidem idem erat ac *ἄρτος κλιβαρίτης*. Ordinar autem a pane triticeo atque in hac re Galenum (De Alimentorum facult. Lib. I. cap. 2) ducem sequar, qui varias species enumerat, quae, cum materie, unde conficiebantur, tum ratione, qua parabantur, a se invicem distinguebantur. Itaque, quod ad materiam attinet, memorat

1°. *ἄρτον σιλιγνίτην*, omnium purissimum, qui parabatur ex siligine, i. e. farina e praestantissima quadam tritici specie etiam siligine dicta, quae a Plinio (Nat. Hist. Lib. XVIII. cap. 8) dicitur tritici deliciae. Antiquis autem praeter hanc cognitae erant tres tritici species *πυρόν* sine cognomine Hippocratis vel similaceum Oribasii (Medic. Collect. Lib. I. cap. 2); *πυρόν τριμηνιαῖον* (Hippocr. de morbis mulierum Lib. I. pag. 623) et *πυρόν σιτάριον* omnium praestantissimum. Has tres species autem Cl. Dierbach (Die Arzneim. des Hippokr. pag. 24) omnes oriri putat a Tritico vulgari Séringe, quod etiam patere videtur ex Oribasio l. l., qui refert has species in se invicem transire pro ratione soli, in quo coluntur: Cl. Spengel tamen (Theophrastus Naturgeschichte der Gewächse II. 295) Triticum sitanium refert ad Triticum Gaertnerianum Clem.

2°. *ἄρτον σεμιδαλίτην* (panem similagineum), qui ex similagine i. e. purissima et tenuissima farina parabatur quemque etiam laudat Hippocrates (de victus ratione Lib. II. pag. 356). Hae duae species autem dicebantur *καθαροί*.

3°. *ἄρτον αὐτοπυρίτην* vel *αὐτόπυρον* vel *συγκομιστόν* (panem cibarium vel confusaneum), qui fiebat ex farina a furfure non separata, quique sub utroque nomine etiam occurrit apud Hippocr. (de internis affect. pag. 542, de victus ratione Lib. II. pag. 356 multisque aliis in locis). Haec species vero medium tenebat inter *καθαροῦς* et *ἑνπαροῦς*.

4°. *ἄρτων ἑνπαρῶν* (panum sordidorum) species, quae nunc sequuntur, non seorsum pertractat Galenus; vilissima autem *ἄρτος πιτύρας* (panis furfuraceus), qui parabatur ex tritico tenuissima farina excussa.

5°. Superest *ἄρτος ἄζυμος* i. e. panis sine fermento, in quo parando etiam caseus addebatur; hoc autem festis diebus vescebantur rustici, verum decoctu adeo erat difficilis, ut urbanorum ventriculus illum omnino ferre non posset; hujus etiam mentionem facit Hippocrates (de victus ratione Lib. II. pag. 356.)

Quod vero ad parandi methodum attinet, distinguit Galenus

1°. *ἄρτον κλιβανίτην* i. e. testu assatum, omnibus aliis speciebus praefendum, praecipue si ignis, ad quem parabatur, nec nimis ardens neque nimis remissus fuisset; laudatur et ab Hippocrate eodem loco.

2°. *ἄρτον ἰπνίτην* i. e. in furno coctum, *κλιβανίτην* inferiorem; memoratur ab Hippocrate ibidem; ille tamen a Dieuche (apud Oribasium Collect. Medic. Lib. IV. cap. 5) *κλιβανίτην* praefertur.



3°. ἄρτον ἐσχαρίτην, panis in foco aut craticula assatus, qui nunc sequitur, memoratur ab Hippocrate ibidem.

4°. ἄρτον τῷ τῆς ἐστίας ὀστράκῳ ὀπιηθέντα i. e. panis qui super foci pavimento assabatur; ἐσχαρίτην erat equiparandus.

5°. ἄρτον ἐγκουφίην i. e. panem sub cineribus assatum, omnibus aliis speciebus postponendum, quem etiam memorat Hippocrates l. l. multisque aliis in locis. Teste Erotiano (ad vocem) parabatur ex aqua, palmulis pinguibus et farina.

Praeter has species autem Hippocrates etiam loquitur de

1°. ἄρτω διπυρίτῃ (pane bis ignem experto) (Lib. de internis affect. pag. 546), quem memorat etiam Oribasius (Collect. Medic. Lib. I. cap. 9).

2°. ἄρτω ἐξόπτῳ (pane exassato) (ibid. pag. 542 multisque aliis in locis).

3°. de ἄρτω ὀβελιαίῳ vel ὀβελία (pane veru tosto vel assato) (Lib. II. de victus ratione pag. 356.)

4°. ἄρτω πυρῶν σιτανίων τῷ χύλῳ τῶν πιτύδων ἐξυμωμένῳ (pane ex sitanio tritico furfurum succo fermentato) (de victus ratione Lib. III. pag. 374.)

Porro Galenus l. l. cap. 5 agit de ἄρτω πλυτῷ (pane loto) qui cum lacte parabatur et in aqua supernatabat.

Praeter triticum autem antiqui ad panificia adhibebant hordeum, tipham, olyram et zeiam vel zeam; omnes tamen eo consentiunt, quod panis triticeus omnibus aliis speciebus praestabat, secundum vero locum occupabat panis hordeaceus.

Hordei autem jam Hippocrati tres species cognitae erant: *κριθή* sine cognomine, quae Cl. Dierbach (l. l. pag. 9) esse videtur Hordeum vulgare Linn.; *κριθή τριμηνιαίος*, quae eidem viro Cl. (l. l.) esse videtur Hordeum distichum Linnei; loquitur autem de illa specie Hippocrates de morbis mulierum Lib. I. pag. 608; *κριθή ἀγγλήϊς*, quam memorat Hippocrates Lib. III. de morbis pag. 496, quaeque Cl. Dierbach videtur esse Hordeum Hexastichon Linn., Cl. Sprengel vero (Theophrast's Naturgeschichte der Gewächse II. 304) Hordeum nigrum Willd; ab Oribasio tamen (Collect. Medic. Lib. I. cap. 11) duae solummodo hordei species enumerantur; ex hordeo autem eadem fere diversae panis species conficiebantur ac e tritico (Galenus l. l. cap. 10). Quod ad *tipham*, *olyram* et *zeam* attinet, non multum a se invicem differre videntur, quoniam auctores, qui de alimentis scripserunt ante Galenum, ut Diocles et Mnesitheus illas inter se confudisse videntur, uti ipse testatur (l. l. cap. 13); ipse tamen hoc discrimen inter illa adesse statuit, quod *zea olyrae* praestat, *olyra* vero *tiphae*; hinc fortasse Cl. Dierbach (l. l. pag. 16) et *olyram* et *zeam* originem petere putat a Tritico *Spelta* Linn. vel saltem a specie ab hac non multum differente; de *Tipha* autem ne mentionem quidem facit; de hac tamen idem videtur esse dicendum. Praeter haec semina autem Galenus eodem loco quoque memorat *ζεόπυρον*, unde in Bithynia et *γυμνόκριθον*, unde in Cappadocia panem conficiebant; quae vero fuerint

haec semina, plane ignoro. Hic locus mihi maxime idoneus videtur, ut loquar

De ἀρτω γόνδριτη, quem memorat Hippocrates (Lib. de victus ratione pag. 350). Erat autem panis, qui conficiebatur e γόνδρου (alica) i. e. (teste Foësius Oecon. Hippocr. ad vocem), »id, quod ex zea de-  
»corticata et in grana plura contusa, leguminis loco  
»cum jusculis coctum editur." Parabatur tamen alica nonnumquam etiam ex aliis seminum speciebus, uti patet ex Galeno (l. l. cap. 6) et Oribasio Collect. Medic. Lib. IV. cap. 1., ubi de proprietatibus et de confectione alicae agitur.

Tandem teste Galeno (l. l. cap. 14 et 15) in annonae caritate vel seminum supra enumeratorum penuria e βρόμου (avena) κέγγρου (milio) et ελώμου (panico) panis conficiebatur, ita tamen ut ex his tribus panis speciebus panis ex avena esset optimus, e panico vero vilissimus.

De βρόμω Cl. Dierbach (l. l. pag. 17) adhuc dubitat, num fuerit Avena sativa Linn. necne; illa saltem species, de qua agit Theophrastus, a Cl. Sprengel (l. l. II. pag. 303) habetur Avena Orientalis Schreber. Liceat autem mihi hic observare Plinium, quod ad panem ex avena paratum, a Galeno longe differre videri (Nat. Hist. Lib. XXII. cap. 25), nam de hoc pane loquens, »Panis hic ipse, inquit, innumeras pene continet medicinas."

Teste Cl. Dierbach (l. l. pag. 18) κέγγρος ex vulgari sententia habetur semen Panici miliacei Linn. ipseque etiam hanc opinionem fovit, donec sibi oc-

currisset ingenio cultus quidam Graecus, qui forte fortuna sibi oblata planta ex specie Sorghum vulgare Persoon vel Holcus Sorgha Linn. statim : » Haec est κέγγρος, inquit, » qui frequenter colitur in insulis Archipelagi.”

... *Ἐλνμος* denique erant semina Panici Italici Linn.

De vino antiquorum ejusque proprietatibus, uti et de vitium cultura, conf. Plinius Nat. Hist. Lib. XIV. cap. 1—19. Oribasius Collect. Medic. Lib. V. cap. 6 et 7, quorum ille ex deperdito quodam Galeni libro est desumptum et Paulus Aegin. Lib. I. cap. 95.

De carne variorum animalium eorumque visceribus conf. Galeni de alimentorum facult. Lib. III. cap. 2 et sqq. Oribasius Collect. Medic. Lib. II. cap. 28 et sqq. et Paulus Aegin. Lib. I. cap. 84 et sqq.

Ibid. lin. 6. *ῥαφανίδων*. *Ῥαφανίδες* erant radices Raphani sativi Linn., quae Latine dicebantur radiculae vel raphani. De harum proprietatibus et viribus autem conf. Theophrastus Lib. VII. Hist. Plant. cap. 9, ubi quatuor distinguit species, Corinthium, Cleonaeum, Liotalassum et Boeoticum, Dioscorides Lib. II. cap. 187 et 188, ubi seorsum agit de *ῥαφανίδι ἀγρίῳ*, ἢν *Ῥωμαίων ἀμορακίαν καλοῦσι*, de quo etiam agunt sequentes auctores, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 17. § 2. Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1. Euporist Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ex accurata autem diaetae definitione, quam in fine hujus § legimus, jam satis tuto concludere potuissimus, Megetem scholae methodicae fuisse asseclam, si illud nobis ex aliorum auctorum testimoniis, nondum cognitum fuisset.

Ibid. 2. lin. 2. δραχμαί. lin. 3. ὀβολοί. Antiqui fere eadem ac nos pondera adhibebant vel certe eodem modo illa dividebant; nonnulla tamen pondera ab illis enumerantur, quae hodie non amplius in usu sunt. (Galenus de ponderibus ac mensuris Lib. cap. 3 et 11. Paulus Aegin. Lib VII. cap. 25). Hi auctores enim unciam dicunt duodecimam librae partem, drachmam vel holcam octavam unciae partem, scrupulum (γραμμα) quartam drachmae partem, obolum dimidium scrupulum, siliquam (κεράτιον) tertiam oboli partem vel secundum alios decimam octavam drachmae, granum (Graece σιτάριον) quartam siliquae partem, areolum (χαλκόν) octavam oboli partem. Unicus locus, e quo aliquo modo, licet tamen non valde accurate, concludere possumus, an his nominibus idem pondus designarent, ac hodierni, est Q. Rhemii Fannii Palaemonis de ponderibus ac mensuris Carminis vs. 10 et sqq.

Semina sex alii siliquis latitantia curvis

Attribuunt scrupulo, lentis veraciter octo,

Aut totidem speltas numerant, tristesve lupinos

Bis duo:

Non tamen semper idem horum seminum pondus fuisse videtur, uti ipse addit Fannius vs. sqq. V. X.

sed si par generatim his pondus inesset,

Servarent eadem diversae pondera gentes :

Nunc variant. Etenim cuncta non foedere certo

Naturae, sed lege valent hominumque repertis.

Ibid. lin. 3. *Θυμιάματος ἀμμωνιακοῦ*. Erat Gummi ex quadam ferulae specie, quae ab antiquis *ἀγασυλλίς* dicebatur, quae vero a recentioribus vulgo habetur *Ferula Orientalis* Linn. (Dierbach Die Arzneim. des Hippokr. pag. 200). Dioscorides (Lib. III. cap. 98) et Oribasius (Collect. Medic. Lib. XI) duas distinguunt species *θράσυμα* vel purum et *φυσῶμα*, quod lapillis erat permixtum. De ejus viribus autem conf. Dioscorides l. l. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 1. § 37. Oribasius l. l. Synops. Lib. II. cap. 56 et Euporist Lib. II. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. et Paul Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. lin. 5. *κόμμι*. *Κόμμι*, inquit Galenus, (de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 10. § 40) *δάκρυόν ἐστιν ἐπιτηγνόμενον τοῖς στελέχεσι τῶν γεννώντων αὐτὸ δένδρων*. Plinius autem (Nat. Hist. Lib. XIII. cap. 11) optimum peti dicit ex Spina Aegyptiaca. De gummi viribus et proprietatibus autem conf. Galenus l. l. Plinius l. l. uti et Lib. XXIV. cap. 11. Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1. Aëtius Tetrab. I. I. et I. II. cap. 196 et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. lin. 9. *ὅσα ψύχειν δύναται*. Remedia refrigerantia varia enumerata inveniuntur apud Oribasium Synops. Lib. I. cap. 7—11 et Collect. Medic. Lib. XIV. cap. 19—22.

Ibid. lin. 12. *πάπυρον*. Πάπυρος erat *Cyperus Papyrus* Linn., ex cuius foliis chartam conficiebant antiqui; de illa autem, uti et de ejus viribus medicis egerunt Theophrastus Hist. Plant. Lib. IV. cap. 9. Dioscorides Lib. I. cap. 115. Plinius Nat. Hist. Lib. XIII. cap. 4 et Lib. XXIV. cap. 12. Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 16. § 3. Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. 3. lin. 1. *σιλίλα*. Σιλίλα est medicamentum usitatissimum e bulbis *Scillae maritimae* Linn.; de illo autem conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. VI. cap. 11 et 12, Dioscorides Lib. II. cap. 202. Plinius Nat. Hist. Lib. XX. cap. 9, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 18. § 23, Oribasius Collect. Medic. Lib. X. cap. 13. et Lib. XII, Euporist. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3. Ex hoc medicamento autem parabant acetum squilliticum, de cuius confectione et usu egerunt Dioscorides Lib. V. cap. 25, Oribasius Collect. Medic. Lib. V. cap. 25, Actuarius de meth. med. Lib. V. cap. 7 et Nicolaüs Myreps. de composit. medic. Sect. XXXVII. cap. 13, uti et vinum squilliticum, quod memorant Dioscorides Lib. V. cap. 26 et Actuarius l. l. Lib. V. cap. 7.

Ibid. *τίλτον*. Quid auctor sibi velit hac voce, mihi non satis dilucide patet: verisimile tamen mihi videtur *τίλτον ἐνεψευθεῖσα* significare: adeo vehementer vel diu cocta, ut inde squillae tunicae divellantur.

Ibid. lin. 2. *κορία*. Vulgo quidem apud antiquos auctores medicos vox *κορία* significat lixivium, i. e. ut Galeni verbis (De simpl. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 10. § 41) utar: τὸ οἶον περιπλυμὲ τῆς τέφρας, de quo conf. Galenus l. l., Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1 et Euporist. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3; hujus autem lixivii variae erant species, inter quas usitatissima fuisse videtur *κορία τῆς συκῆς* (lixivium ficulnum), quod parabatur ex cinere ficuum et *τιθυμάλλων* (teste Cl. Dierbach Die Arzneim. des Hippokr. pag. 141. Euphorbia Chamaecias Linn.), de quo egerunt Dioscorides Lib. I. cap. 186, Galenus l. l., Oribasius Collect. Medic. Lib. XIV. cap. 23. et Paulus Aegin. l. l.; hic auctor (Lib. III. cap. 2 et Lib. V. cap. 56) adhuc memorat *κορίαν πιλοποιείκην* (lixivium pileatorium), de cujus confectione tamen nihil refert et Lib. VII. cap. 3 *κορίαν πρωτόστακτον*, cui etiam calx admixta erat quodque praecipue in Clysteribus adhibebatur. Verum enimvero si vox *κορία* hic vertatur voce *λιξιβίο*, vix aliquem sensum habere videntur verba: ἢ γρῶνται οἱ τοὺς πηλοῦς ἐργαζόμενοι; possint quidem ita explicari, ut *κορία* partem constitueret materiae, qua intus vasa fictilia obducebant figuli (ὁ τ. π. ἐ.), quo melius resisterent rebus acerbis, quae in illis coqui vel torreri continerive deberent (*verglazen*), sed haudquaquam constat, antiquos figulos vasa fictilia tali materia obduxisse; Plinius certe (Nat. Hist. Lib. XXXV. cap. 12), ubi de fi-



gulis eorumque arte agit, talis materiae ne mentionem quidem facit. Hanc ob causam vocem *κορία* verti *pulvere* et *κορίαν* habui vel quandam terrae speciem, qua utebantur figuli ad vasa fictilia conficienda, vel materiem aut pulverem quemdam, quo obducebantur muri ex luto extracti, quale parietum integumentum etiam ab Hippocrate (Epidem. Lib. VII. pag. 1212) dicitur *κορίημα*.

Pag. 76. lin. 7. *τοῖς σηπτοῖς φαρμάκοις* et lin. 8. *τοῖς καυστικοῖς*. De his medicamentis egit Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. V. cap. 15, quem exscripsit Oribasius Collect. Medic. Lib. XIV. cap. 57. Multa autem hujusmodi medicamenta enumerantur a Celso Lib. V. cap. 8, Oribasio Synopsis Lib. II. cap. 44 et 48 et Aëtio Tetrab. IV. I. cap. 52.

Ibid. lin. 9. *σεπτόν*. Hic pro *σεπτόν* legi *σηπτόν*.

Ibid. *τριγας*. Haud dubie pro *τριγας* hic legendum esse videtur *τριγας*.

Ibid. *άλίσχοινον*. Quoniam, quantum scio, haec vox apud nullum alium auctorem occurrit, vocem *άλίσχοινον* hoc loco mutavi in *δλόσχοινον*, quem inter species junci recensent Plinius Nat. Hist. Lib. XX. cap. 18, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 18. § 50, Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3, dum illud etiam ad apparatus piscatorium pertinere dicit Aelianus (Nat. Anim. Lib. XII. cap. 43), licet a Theophrasto (Hist. Plant. Lib. IV. cap. 13) et Dioscori-

de (Lib. I. cap. 16), ubi varias enumerant junci species, illius nulla fiat mentio, nisi hic alio nomine eadem planta indicetur.

De curandis fistulis autem ope medicaminum deque medicamentis huic rei accommodatis conf. Galenus de meth. med. ad Glauconem Lib. II. cap. 10, Celsus Lib. V. cap. 28. § 12, Oribasius Synops. Lib. VII. cap. 30 et Euporist. Lib. IV. cap. 45. Aëtius Tetrab. IV. II. cap. 55 et Paulus Aegin. Lib. IV. cap. 49.

Ibid. lin. 13. τὸ δὲ λιγὸν ἐπιτήδειον. cet. De fistulis ani ope laquei curandis conferri merentur Hippocratis Lib. de fistulis et Paul. Aegin. Lib. VI. cap. 88.

Ibid. Not. (1) lin. 1. *Κίαρ* cet. Haec adnotatio verisimiliter ideo conscripta est, quod vox *κίαρ* eo tempore, quo vixit ejus auctor, jam erat obsoleta; Heychius saltem etiam (Tom. II. pag. 203) hujus vocis affert explicationem, quae eodem fere redit. Erat autem haud dubie Helladius Grammaticus alteruter eorum, quos citat Photius in Biblioth. quorumque antiquior erat.

Helladius Besantinois Aegyptius, qui, Licinio et Maximiano regnantibus, floruit et de quo agit Photius l. l. Cod. 279, ubi ex ejus *χρηστώμαθειῶν* excerpta leguntur quatuor, quae Latine versa et notis illustrata a Jo. Meursio edita sunt Trajecti 1686. 4° et recusa Tom. X. Antiquit. Graecarum Gronovian. (Fabr. Biblioth. Graeca Tom. VII. pag. 62.)

Recentior autem erat Helladius Alexandrinus, The-

odosii junioris temporibus clarus, ejus λεξέως παντοίας χρήσιν κατὰ στοιχείον memorat Photius l. l. Cod. 145 et Suidas (Tom. I. pag. 707).

Ibid. τὸ τῆς βελόνης τρίπημα, ὡς Ἑλλάδιος, ὁ τὴν πολλὴν χρῆσιν συναγαγεῖν δείκνυσιν. Hic pro ὁ legi ὁ.

Ibid. 4. lin. 4. κοχλίου ἑνοθήτω. Hic pro ἑνοθήτω legendum esse putavi ἑνοθήτου, quia hoc adjectivum mihi pertinere videbatur ad vocem κοχλίου atque κόχλιον ἑνόθητον habui instrumentum quiddam, licet illud apud nullum alium auctorem, quantum scio, occurrat, neque ergo aliquid de ejus forma vel usu referre possim. Verti autem vocibus Latinis *concha nasum tuente*, quia vox ἑνόθητος mihi a nullis aliis vocibus melius derivari posse videbatur quam a ῥις et ὀθέω.

Pag. 78. 5. lin. 9. ταῦτα. Hic pro ταῦτα mihi legendum esse videtur ταυτά.

Pag. 80. XVI. in tit. Αρχιγένους. Archigènes erat medicus per totam antiquitatem celeberrimus, natione Syrus Apameënsis (Gal. Isagoge cap. 4) Philippi filius, discipulus Agathini atque Romae medicinam exercuit, Trajano regnante, (Suidas Tom. I. pag. 345); sectae pneumaticae erat adsecla (Galenus de diff. puls. Lib. III. cap. 1 et IV. cap. 11). Hicce auctor a Galeno dicitur obscurus, in verbis novator et in definiendo nimis subtilis, ita ut ipse eum nonnumquam intelligere vix posset (de diff. puls. Lib. II. cap. 4 et 7 et Lib. IV. cap. 1); negligentius medicamenta describere solebat (de me-

dic. composit. sec. loc. Lib. II. cap. 1), multa tamen reliquit ἀξιόλογα συγγράμματα (Galenus ibid.). Ejus scripta omnia fere interierunt, exceptis solummodo duobus libris, qui in collect. veter. chirurg. Nicetae servantur, nempe :

1°. περί ὑποδραμόντος αἵματος περί τῆς τῶν ῥαφῶν διαστάσεως et

2°. περί ἀφαιρεθησομένων μερῶν.

Citantur praeterea in Galeni operibus

3°. περί ἔλλεβόρου χρήσεως Lib. I. (Comment. I. in Hippocr. Lib. de humoribus.)

4°. περί ἰκαστορίου χρήσεως Lib. I. (de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. XI. cap. 1. § 15.)

5°. Lib. ἐνθα δίδασκει μνήμης βεβλαμμένης ἀνάκτησιν (de locis affectis Lib. III. cap. 5.)

6°. ἐπιστολικά βιβλία XI. (ibidem.)

7°. βιβλία τῶν χρονίων παθογνωμονικῶν (de locis affect. Lib. III. cap. 12.)

8°. περί πεπονθῶτων τόπων Lib. III. (de locis affectis Lib. III. cap. 1.)

9°. περί τῶν πυρετῶν σημειώσεως Lib. X. (Lib. II. de crisis cap. 8.)

10°. περί ἐννοίας τοῦ πυρετοῦ Lib. I. (ibidem.)

11°. Ἐν μέγα βιβλίον περί σφυγμῶν, in quod Galenus commentarium scripsit hodie deperditum (de diff. puls. Lib. IV. cap. 1 et 11.)

12°. περί τῶν κατὰ γένος φαρμάκων Lib. II. (de medic. composit. sec. loc. Lib. V. cap. 1 et Lib. VIII. cap. 1.)

13°. Teste Fabricio (Biblioth. Graeca Tom. XII.

\* I. I. Fabricius

pag. 780) adhuc MS. exstat Archigenis et Philagrū de calculis in renibus cum remediis ad calculosos. — Ibid. γαγγραιῶν. Γαγγραινα (Definit. med. N<sup>o</sup>. 436) dicitur μεταβολή τοῦ χρωτός τοῦ κατὰ φύσιν ἐκάστου ἐπὶ τὸ ἀλλότριον, καὶ νέκρωσις μεθ' ἐλκώσεως, καὶ δίχα ἐλκώσεως. Lib. de tumoribus praeter naturam ver o cap. 8 Galenus illam magnis inflammationibus accedere dicit; Comment. autem IV. in Hippocr. Lib. de articulis mediam affectionem inter magnam inflammationem et σφάκελον; Lib. de tumoribus praeter nat. cap. 11 illud discrimen inter sphacelum et gangraenam statuit, quod sphacelus ad ossa penetrat, gangraena vero non, licet Hippocr. (Libr. de artic. pag. 828) dicat: ἀτὰρ καὶ γαγγραινοῦσθαι ἰνέεται κνήμην καὶ τὸν πόδα. Actuarius vero (de meth. méd. Lib. II. cap. 12) sequenti modo differre gangraenam et sphacelum dicit: » Ap- » pellamus autem γαγγραιναν alicujus partis ob in- » flammationis, qua conflictatur, magnitudinem, » mortificationem, non quae jam confirmata sit, » sed quae etiamnum fiat; nam quum jam pars » emortua est, sideratio et σφάκελος Graecis affectus » nominatur, qui est gangraenae terminus." De gangraena autem ejusque cura, quae ab omnibus auctoribus, uti et hic ab Archigene, valde dicitur difficilis, conf. Galenus de tumor. praeter nat. Lib. cap. 8. Comment. IV. in Hippocr. Lib. de artic. et Comment. in Hippocr. Aphorism. 50. sect. VII, Celsus Lib. V. cap. 26. § 34, Oribasius Synops. Lib. VII. cap. 27, Paul. Aegin. Lib. IV. cap. 19 et Actuarius l. l.

Ibid. 2. lin. 2. Ὡς ἐν τοιαύτῃ οὖν διαθέσει τῆν ἔμφρασιν ἀπολείπουσαν πόσης σωτηρίας ἐκληπτέον ὅσον τὴν ἐπιφάνειαν ἐν νεωτέρῳ σώματι καὶ μὴ γηραλαίῳ. Nisi haec verba valde sint corrupta, haud dubie de iis valet effatum Galeni de ratione dicendi Archigenis, quod supra attulimus (adnot. ad vocem *Αρχίγ*); si tamen πόσης mutemus in ποσῆς, ante vocem ἐπιφάνειαν inseramus particulam οὐ, si porro vocem ὅσον consideremus tamquam adverbium et in fine subintelligamus vocem πέπληγε, vel similem quandam, sensus, ut mihi videtur, multo fit clarior; eo modo certe confeci versionem meam horum verborum.

Ibid. lin. 4. καὶ τὴν ἐν σαρκώδεσιν . . . δύσκολος. Hic pro δύσκολος legendum esse putavi δύσκολον atque subintelligendam vocem θεραπεύεσθαι vel similem quandam, nisi particula τὴν mutanda sit in ἡ.

Pag. 82. ἐν ταῖς κατασχεσίσειν. Quid sibi velit auctor hisce verbis, nondum mihi satis dilucide patet; habui illa explicationem verborum τὰ μηδὲν αἷμα ἔειν, ita ut aliquo modo redundare videantur.

Ibid. lin. 12. ἀλι λέπτω καὶ ἐλαίῳ. Sal (sal culinare, murias sodae) antiquorum erat vel fossile vel petebatur ex lacubus salinis, in nonnullis regionibus obviis (Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. XI. cap. 2. § 4 et Plinius Nat. Hist. Lib. XXXI. cap. 7) vel etiam a nonnullis fluminibus, teste Plinio l. l., uti Oxo et Ocho in Bactria advehebatur; de eo autem ejusque usu conf. Dioscorides Lib. V. cap. 126—129, ubi seorsum agit de ἀλὸς ἄγνη, de ἄλμη et de ἀλὸς ἄνθους, Plinius

l. l. et cap. 9, Galenus l. l. Lib. IV. cap. 21. Lib. IX. cap. 3. § 2. et Lib. XI. cap. 2. § 4—8 (§ 5. autem agit de *άλῶν κεκαυμένων*), Oribasius Collect. Med. Lib. XV. cap. 1, Euporist. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. II. cap. 43—46 et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3. *ἔλαιον* erat oleum ex fructibus Oleae Europaeae Linn., cujus tres species distinguit Plinius (Nat. Hist. Lib. XV. cap. 1) orchiten, radion et pausiam; olei vero ipsius Galenus tamquam singulares species enumerat *ὠμότριβες* et *ὀμφάκινον*, quae verisimiliter ex olivis immaturis parabantur. De oleo autem olivisque, uti et de amurca atque in universum de olea legantur Theophrastus de Caus. Plant. Lib. I. cap. 23 et Lib. VI. cap. 11 et 12 multisque aliis in locis, Dioscorides Lib. I. cap. 29—32, 134 et 138—140, Plinius l. l. cap. 1—8 et Lib. XXIII. cap. 3, Galenus l. l. Lib. VI. cap. 5. § 4, Oribasius et Paulus Aegin. l. l. et Aëtius Tetrab. I. I. De usu vero diaetetico olivarum conf. Plinius l. l., Galenus de alim. facult. Lib. II. cap. 27, ubi etiam mentio fit *ἐλαίων δρυοπετών*, *ἀλμάδων* et *κολυμβάδων*, Oribasius Medic. Collect. Lib. I. cap. 54 et Lib. II. cap. 49, ubi distinguit inter olivas albas et nigras et Paul. Aegin. Lib. I. cap. 82. *ῥάφανος* est vetus nomen Atticum brassicae; semper enim eo utitur Theophrastus (Hist. Plant. Lib. VII. cap. 4. multisque aliis in locis); distinguit hoc loco tres species: *λειόφυλλον*, *ὄν λειόφυλλον* et *ἀγρίαν*; Galenus vero (de

alim. facult. Lib. II. cap. 44.) Athenienses ante sexcentos annos brassicam *ῥάφανον* vocasse refert, suo tempore vero illam dici *κράμβην*. Hoc olus autem ab omnibus fere antiquis maximis laudibus celebratur; sic Chrysippus (teste Plinio Nat. Hist. Lib. XIX. cap. 8) integrum librum de illo conscripsit, mirasque ejus laudes canit Porcius Cato, qui jam tres ejus species noverat, quibus multas adhuc addit Plinius, quae tamen omnia solummodo varietates esse videntur Brassicae oleraceae Linn. Praeter brassicam tamen esulentam antiqui etiam loquuntur de brassica sylvestri et de brassica marina, quarum utilitas solummodo erat therapeutica et Dioscorides Lib. IV. cap. 81 et 192, ubi illam etiam *κυνόμορον*, *κυν-αγγον*, *κυνίαν* et *λιπόζωστιν ἀγρίαν ἄρρηνα* vocari dicit, Plinius Nat. Hist. Lib. XXXII. cap. 5, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 1. § 53; Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3. praeterea agunt de *ἀποκύνω* sive *κυνοκράμβη* (brassica canina), quae et hominibus et canibus erat venenum. De omnium specierum usu autem cum diaetetico tum therapeutico, uti et de brassicae cultura conf. Theophrastus l. l., Dioscorides Lib. I. cap. 146—148, Galenus l. l. et de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 10. § 48—50, Plinius l. l. et Lib. XX. cap. 9, Oribasius l. l. et Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. l. l. et Lib. I. cap. 74. *ἰβίδ. αἰρίνω ἀλευρω ἢ θερμίνω ἀλευρω. Αἶρα erat*



*Lolium temulentum* Linn., de quo conferri merentur Theophrastus Hist. Plant. Lib. VIII. cap. 7, Dioscorides Lib. II. cap. 122, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 1. § 10, Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1 et Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3.

*Θέρμος* erat Lupinus pilosus (Dierbach Die Arzneim. des Hippokr. pag. 38), de cujus proprietatibus et usu cum diaetetico tum therapeutico conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. VIII. cap. 11. Dioscorides Lib. II. cap. 132 et 133, ubi seorsum agit de *θέρμῳ ἀγρίῳ*, Plinius Nat. Hist. Lib. XVIII. cap. 14. Galenus l. l. Lib. VI. cap. 8. § 3 et 4. et de alim. facult. Lib. I. cap. 23, Oribasius l. l. et Collect. Medic. Lib. I. cap. 21, Aëtius l. l. et Paul. Aegin. l. l. et Lib. I. cap. 79.

Nomen *ἀλευρον* autem in universum adhibebatur de farina tenuiori, farina crassiori *κρίμων* dicta. (Galenus Exeg. verb. Hippocr. ad vocem *ἀλεψιτα*.)

Ibid. lin. 15. *νίτρον ἀφροῦ*. *Νίτρον* vel *λίτρον* veterum est Natrum nativum (Dierbach die Arzneim. des Hippokr. pag. 240), quod petebatur e lacubus nitrosis in variis regionibus obviis, ut refert Plinius (Nat. Hist. Lib. XXXI. cap. 10), ubi varias nitri enumerat species; tenuissima autem nitri pars dicebatur *ἀφρόν νίτρον*; Galenus tamen (de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. IX. cap. 3. § 5) praeterea distinguit inter *ἀφρόν νίτρον* et *ἀφρόλιτρον*, quorum illud farinae triticeae simile, hoc vero con-

gelatum et coactum dicit. De nitro autem et de spuma nitri conf. Dioscorides Lib. V. cap. 131 et 132, Plinius l. l. et Lib. XXXVI. cap. 26, Galenus l. l. Lib. IX. cap. 3. § 5 et 18 et Lib. XI. cap. 2. § 6, Oribasius Synops. Lib. II. cap. 56, Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1., Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. II. cap. 49, 50 et 61 et Paul. Aegin. Lib. VII. Cap. 3.

Ibid. lin. 17. *πίρινον*. De usu tritici diaeteticó jam diximus in adnot. ad vocem *ἄρον*. De ejus usu therapéutico vero, uti et de cultura conf. Theophrastus Hist. Plant. per totum Lib. VIII., qui de frumentaceis et leguminosis agit, Caus. Plant. Lib. III. cap. 26 multisque aliis in locis, Dioscorides Lib. II. cap. 107, Plinius Nat. Hist. Lib. XVIII. cap. 10. et Lib. XXII. cap. 25, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 16. § 42, Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1., Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. lin. 18. *δαφνίσι*. *Δαφνίδες* erant fructus Lauri nobilis Linn. Hujus plantae autem Theophrastus variis in locis et Dioscorides Lib. II. cap. 106. praeter vulgarem speciem etiam distinguit *δάφνην Ἀλεξανδρείαν*, quae dicebatur et *Ἰδαία* vel *ὑπόγλωττος* vel *ζάλειαν* vel *στεφάνην*; Plinius vero (Lib. XV. cap. 30) praeter has undecim adhuc enumerat species, quarum singulis vulgo plura erant nomina. In universum autem de hac planta ejusque usu medico conf. Dioscorides et Plinius l. l., Gale-

nus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 4. § 4, Oribasius Collect. Medic. Lib. XI., Eupor. Lib. II. cap. 1., Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. σφραγίς. Σφραγίς vel σφραγίς αἰγός (testibus Discoride Lib. V. cap. 113 et Galeno de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. IX. cap. 1. § 2) erat species terrae in insula Lemno obvia, quae inde nomen petebat, quod sacerdotes illi sigillum Dianae imprimebant illamque sic in alias regiones mittebant; dicebatur autem et γῆ Ἀημνία et μίλτος Ἀημνία ob colorem rubrum, qui secundum Dioscoridem l. l. oriebatur a sanguine hircino, qui huic terrae admiscebatur a sacerdotibus, quod cum referret Galenus (l. l.) in ipsa insula Lemno degens, omnes adstantes incolae illum irriserunt. De hujus terrae parandi ratione et virtutibus autem conf. Theophrastus Lib. de lapidibus pag. 399 (ed. Heinsii Lugd. Bat. 1613 fol.), Dioscorides et Galenus l. l., Oribasius Collect. Med. Lib. XV. cap. 1., Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. II. cap. 4 et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3. Aderant praeterea varia medicamenta composita, quae et σφραγίδες dicebantur, fortasse ob similem agendi rationem: sic Celsus Lib. V. cap. 20. § 2. citat sphragidem Polyidae, cap. 26. § 23. sphragidem Polybi et Marcellus Lib. de medicam. cap. 8. sphragidem Antigoni, Paulus Aegin. vero (Lib. VII. cap. 12) et Actuarius (de meth. med. Lib. VI. cap. 5) describunt sphragidem quamdam omisso nomine auctoris.

Ibid. lin. 19. *οἰσυπηρών* et lin. 21. *οὖρον*. *Οἰσυπηρά* erat lana succida vel lana non depurata, cui omnes ovium sordes adhuc adhaerebant, quod medicamentum a multis veteribus quam maxime laudatur. Egerunt autem de illa Dioscorides Lib. II. cap. 84, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. XI. cap. 1. § 29, Oribasius Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. II. cap. 159 et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Quemadmodum stercus variorum animalium, sic etiam urinam tamquam medicamentum adhibebant veteres, de cujus viribus conf. Dioscorides Lib. II. cap. 99, Galenus l. l. Lib. X. cap. 2. § 15 et Paulus Aegin. l. l.

Ibid. ἡ πράσου ἢ ἀργιέλαιον ἢ βάλτου ἢ κορίου. *Πράσον* erat Allium Porrum Linn., de cujus virtutibus cum diaeteticis tum therapeuticis conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. VII. cap. 1 et 2, Dioscorides Lib. II. cap. 179, Plinius Nat. Hist. Lib. XIX. cap. 7 et Lib. XX. cap. 6, ubi distinguit inter porrum sectivum et porrum capitatum, Galenus de alim. facult. Lib. II. cap. 71, ubi etiam agit de ἀμπελοπράσω, Oribasius Collect. Medic. Lib. II. cap. 27, Aëtius Tetrab. I. I, Paulus Aegin. Lib. I. cap. 76 et Lib. VII. cap. 3. et Actuarius de spirit. anim. nutrit. Lib. cap. 6.

<sup>2</sup> *Αργιέλαιον*, qui dicebatur et *κότινος* vel *ελαία Αἰθιοπική* erat oleaster vel olea sylvestris, de cujus viribus egerunt Theophrastus l. l. passim, Dioscori-

des Lib. I. cap. 137, Plinius l. l. Lib. XXIII. cap. 4 et Oribasius l. l. Lib. XI.

*Βάρος* erat verisimiliter Rubus Fruticosus Linn. (Dierbach die Arzneim. des Hippokr. pag. 44); tamquam alimentio solummodo fructu, tamquam medicamento vero fere omnibus hujus plantae partibus utebantur antiqui, uti patet ex Theophrasto Hist. Plant. variis in locis, Dioscoride Lib. IV. cap. 37 et 38, ubi seorsum agit de *βάρων Ἰδαίας*, Plinio Nat. Hist. Lib. XXIV. cap. 13 et 14, qui praeter *Ἰδαίαν* etiam duas alias rubi species recenset, Galeno de alim. facult. Lib. II. cap. 13. et de simplic. medic. temper. ac. facult. Lib. VI. cap. 2. § 4, Oribasius l. l. Lib. XI et Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius l. l. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3.

*Κόριαν* vel *κορίαννον* erat Coriandrum sativum Linn., de quo conf. Theophrastus l. l. passim, Dioscorides Lib. III. cap. 71, Plinius l. l. Lib. XX. cap. 20, Galenus de simplic. medic. temper. ac. facult. Lib. VII. cap. 10. § 43, Oribasius Collect. Medic. Lib. XI, Lib. XIV. cap. 10, Lib. XV. cap. 1 et Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius et Paulus Aegin. l. l.

Ibid. 3. lin. 4. *φακός*. Hac voce vulgo apud veteres designatur lenticula palustris, dum *φακοί* in num. plurali significabant lentes (Ervum Lens Linn. vel Cicer Lens Willd). De horum vegetabilium proprietatibus cum diaeteticis tum therapeuticis autem conf. Theophrastus Hist Plant. variis in

locis, Dioscorides Lib. II. cap. 129, Plinius Nat. Hist. Lib. XXII. cap. 25, Galenus de alim. facult. Lib. I. cap. 18 et de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 21. § 1 et 2, Oribasius Collect. Medic. Lib. I. cap. 17 et Lib. XV. cap. 1, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I, Paul. Aegin. Lib. I. cap. 79 et Lib. VII. cap. 3 et Actuarius de spir. anim. nutrit. Lib. cap. 5.

Ibid. lin. 5. *ζοῶς*. De usu malorum Punicorum tamquam medicamento jam egimus supra in adnot. ad vocem *σιδίων*, de eorum facultatibus autem tamquam alimenti egerunt Galenus de alim. facult. Lib. II. cap. 24 et Oribasius Collect. Medic. Lib. II. cap. 51.

Ibid. *λεπυχάνοις*. *Λεπύχανοι* erant tunicae detritae cepae (*προμμύου*), cujus multas species enumerat Theophrastus Hist. Plant. Lib. I. cap. 10 et Plinius Nat. Hist. Lib. XIX. cap. 6, quae omnes tamen, uti videtur Cl. Dierbach (Die Arzneim. des Hippokr. pag. 103), oriebantur ab Allio Cepa Linn. (Cepa rotunda Dodonaei) vel ab Allio Fistuloso Linn. (Cepa oblonga C. Bauhini). Plura autem de hac planta ejusque utilitate cum inter medicamenta tum inter alimenta leguntur apud Theophrastum l. l. et Lib. I. cap. 10, uti et Caus. Plant. Lib. VI. cap. 18 multisque aliis in locis, Dioscoridem Lib. II. cap. 181, Plinium l. l., Galenum de alim. facult. Lib. II. cap. 71 et de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 10. § 58, Oribasium Collect. Medic.

Lib. II. cap. 27 et Lib. XV. cap. 1, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius l. 1, Paulus Aegin. Lib. I. cap. 76 et Lib. VII. cap. 3. et Actuarius l. I. cap. 6.

Ibid. μέλιτι. De melle ejusque eximiis facultatibus, uti et de apibus conf. Theophrastus fragm. de melle pag. 475, Dioscorides Lib. II. cap. 101—103, Plinius Nat. Hist. Lib. XI. cap. 5—21 et Lib. XXII. cap. 24, Galenus de alim. facult. Lib. III. cap. 39, de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 12. § 9, Oribasius Collect. Medic. Lib. II. cap. 62 et 63 et Lib. XV. cap. 1, Aëtius l. 1, Paul. Aegin. Lib. I. cap. 96 et Lib. VII. cap. 3 et Actuarius l. I. cap. 8.

Ibid. ὀρόβου. Ὀροβοί erant fructus Ervi Erviliae Linn. vel Viciae Erviliae Willd., quae, testibus Plinio (Nat. Hist. Lib. XVIII. cap. 15) et Galeno (de alim. facult. Lib. I. cap. 29), vulgo solummodo pecorum pabulo inserviebant, quibus tamen in anno-nae caritate etiam vescebantur homines, licet egregium essent medicamentum, quod fere brassicae equiparabant; egerunt autem de illo Dioscorides Lib. II. cap. 131, Plinius l. l. et Lib. XXII. cap. 25, Galenus l. l. et de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 15. § 14, Oribasius Collect. Medic. Lib. II. cap. 26, Lib. IV. cap. 8 et Lib. XV. cap. 1, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius l. l. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. λεπυγάνοις λείοις σὺν μέλιτι ὀρόβου τε ἄλευ-  
ρον ὁμοίως ἀκτυασθέν. Melius mihi visum est, colorem

quod hic pone  $\tau\epsilon$  invenitur, ante  $\delta\rho\theta\beta\omicron\nu$  transferre; posset tamen et loco remanere, quando  $\acute{\alpha}\lambda\epsilon\nu\rho\omicron\nu$  significabit farina triticea.

Ibid. lin. 6.  $\pi\rho\acute{\alpha}\sigma\iota\omicron\nu$ . A quonam specie Marrubii peteretur  $\pi\rho\acute{\alpha}\sigma\iota\omicron\nu$  antiquorum, non constat (Dierbach Die Arzneim. des Hippokr. pag. 171). De eo autem ejusque proprietatibus conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. VI. cap. 2, ubi duas ejus species distinguit, Dioscorides Lib. III. cap. 119, Plinius Nat. Hist. Lib. XX cap. 22, qui illud et lino-strophon vel philopeda vel philochares dici refert, Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 16. § 35, Oribasius Collect. Medic. Lib. XV. cap. 1, Epor. Lib. II. cap. 1, Aëtius et Paul. Aegin. l. l.

Pag. 84. lin. 1.  $\sigma\tau\alpha\phi\iota\varsigma$ .  $\Sigma\tau\alpha\phi\iota\delta\epsilon\varsigma$  erant uvae passae vel fructus siccatae Vitis viniferae Linn., de quibus fructibus eorumque viribus cum diaeteticis, tum therapeuticis egerunt Dioscorides Lib. V. cap. 4, Plinius Nat. Hist. Lib. XIV. cap. 1 et sqq. et Lib. XXIII. cap. 1, Galenus de alim. facult. Lib. II. cap. 10 et 11, Oribasius Collect. Medic. Lib. I. cap. 41 et 42 et Lib. XV. cap. 1, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius l. l. et Paul. Aegin. Lib. I. cap. 81 et Lib. VII. cap. 3.

Ibid.  $\mu\alpha\lambda\acute{\alpha}\chi\eta\varsigma$   $\acute{\alpha}\gamma\chi\iota\alpha\varsigma$ . Malva sylvestris verisimiliter erat eadem planta, quae et hodie adhuc dicitur Malva sylvestris Linn., malva vero sativa Malva rotundifolia Linn. (Dierbach l. l. pag. 73). Hac autem et inter medicamenta et inter alimenta ute-



bantur antiqui; illius vero usus unice erat therapeuticus, quae omnia accuratius descripta leguntur apud Theophrastum Hist. Plant. variis in locis, Dioscoridem Lib. II. cap. 144, Plinium Lib. XX. cap. 21, Galenum de alim. facult. Lib. II. cap. 42 et de simplic. med. temper. ac facult. Lib. VII. cap. 12. § 3, Oribasium Collect. Medic. Lib. II. cap. 1, Aëtium l. 1. et Paul. Aegin. Lib. I. cap. 74 et Lib. VII. cap. 3.

Ibid. lin. 2. *μελικράτου*. De mulso at aqua mulsa eorumque proprietatibus conferri merentur Dioscorides Lib. V. cap. 16 et 17, Plinius Nat. Hist. Lib. XXII. cap. 24 et Alex. Trall. Lib. II. cap. 6.

Ibid. *ἀρνόγλωσσον*. Jam Dioscorides Lib. II. cap. 153 duas enumerat plantaginis species: majorem et minorem; narrat autem Plinius Nat. Hist. Lib. XXV. cap. 8, Themisonem hanc plantam omnium primum in medicina adhibuisse integrumque de illa librum conscripsisse. De illa autem ejusque viribus et proprietatibus conf. Theophrastus Hist. Plant. Lib. VII. cap. 11, ubi illam et *στελεφύρον* dicit, Dioscorides et Plinius l. l., Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VI. cap. 1. § 60, Oribasius Collect. Medic. Lib. XI et Lib. XV. cap. 1, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I. et Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. lin. 3. *αἰγυπτία*. Verisimiliter hic subauditur vox *γῆ*; de *γῆ* enim *Αἰγυπτία* loquuntur etiam Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. IX. cap. 1. § 2, Oribasius Eupor. Lib. II. cap. 1

et Aëtius Tetrab. I. II. cap. 3. Videtur sane eadem esse ac *κίανος Αιγύπτιος*, de quo agit Theophrastus Lib. de lapidibus pag. 399.

Ibid. lin. 5. *ταῖς πνοποιαῖς καὶ πληρωτικαῖς*. De hujusmodi medicaminum facultate egit Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. V. cap. 3, 6, 9 et 16; ea vero enumerata invenias apud Celsum Lib. V. cap. 4 et cap. 26. § 30, Scribonium Largum de composit. medic. cap. 216—219, Aretaeum de curat. acut. morb. Lib. I. cap. 7, Oribasium Collect. Medic. Lib. XIV. cap. 37, Aëtium Tetrab. IV. II. cap. 34, Paul. Aegin. Lib. III. cap. 22 et Actuarium de meth. med. Lib. VI. cap. 9.

Ibid. lin. 7. *τοῖς ἀποκρονομένοις*. De his medicamentis egit Galenus l. l. cap. 17; enumerantur vero a Celso Lib. II. cap. 33, Scribonio Largo l. l. cap. 91 et 92, Oribasio Synopsis Lib. II. cap. 45, Aëtio Tetrab. I. II. cap. 230 et Paulo Aegin. Lib. IV. cap. 25.

Ibid. *ἀδήκτοις*. De his medicamentis conf. Galenus de medic. composit. sec. loc. Lib. IV. cap. I.

Ibid. XVII. in tit. *ἐρυσίπελάτων*. Ἐρυσίπελας (Definit. Med. N°. 383) dicitur *ἐρεθτος μετὰ διαπύρου φλογώσεως, ἔσθ' ὅτε πύρετον καὶ φρίκας ἐπιφέρων, vel ὄγκος ὀδυνηρός ἀπὸ χολώδους αἵματος ἔχων τὴν γένεσιν*; cum ultima autem definitione consentit Galenus de meth. med. ad Glauconem Lib. II. cap. I; de meth. med. vero Lib. XIV. cap. 1—3 et de tumoribus praeter naturam cap. 9 erysipelas a fluxione biliosa oriri dicit; ex Lib. autem de meth. med.

ad Glauconem l. l. et de meth. med. l. l., ubi discrimen describit inter *ερυσίπελας* et *φλεγμονήν* satis patet, illum erysipelas dicere eundem morbum, qui et hodie hoc nomine indicatur; dicit enim, colorem erysipelatis esse flavum vel pallidum, inflammationis vero rubrum; erysipelas esse affectionem solius cutis, inflammationem vero pro maxima parte suppositarum cuti partium; in erysipelate pulsationem deesse, in inflammatione vero semper adesse; in erysipelate pressione ruborem evanescere, verum mox redire, in inflammatione vero haec non fieri; erysipelatis duas esse species cum ulceratione et sine ulceratione, inflammationem vero uniformem esse morbum. Iisdem in locis Galenus etiam distinguit affectiones inter erysipelas et inflammationem intermedias, quas dicit *ερυσίπελας φλεγμονώδες* vel *φλεγμονήν ερυσιπελατώδην* vel *ερυσίπελας καὶ φλεγμονήν μεμιγμένα*, quemadmodum et Lib. de tumoribus praeter naturam l. l., ubi agit de differentia inter erysipelas, herpetem, oedema et scirrhum, loquitur de *σκήζω φλεγμονώδει* et de *φλεγμονή σκήζώδει*, de *οιδήματι φλεγμονώδει*, et de *φλεγμονή οιδηματώδει* cet. Nomen tamen erysipelatis non unice de cutis affectione adhibitum fuisse, patet ex Aëtio Tetrab. II. II. cap. 26 et Paul. Aegin. Lib. III. cap. 7 de erysipelate cerebri; praeterea Paulus Aegin. Lib. III. cap. 46 etiam memorat erysipelas hepatis et Alex. Trall. Lib. V. cap. 2. erysipelas pulmonis et rursus (Definit. med. N°. 302) sermo est de erysipelate uteri. De erysipelate autem in universum legi me-

rentur Celsus Lib. V. cap. 26 § 31 et 33, Orisbasius Synops. Lib. VII. cap. 32, Aëtius Tetrab. IV. II. cap. 59, Paulus Aegin. Lib. IV. cap. 17 et 21 et Actuarius de meth. med. Lib. II. cap. 12 et Lib. IV. cap. 16.

Ibid. lin. 3 πυρετοί. Quoniam omnes febris definitiones in libris veterum medicorum cum Graecorum tum Latinorum inde ab Hippocrate usque ad Actuarium obvias recensere omnesque febrium species ab illis enumeratas referre nimis longum foret (qui enim hanc materiem rite pertractare vellet, opus valde laboriosum nec brevi temporis spatio absolvendum suscepisset), unicam Galenicam febris definitionem Comment. ad Hippocr. Epidem. Lib. VI. Sect. I Aphor. 17, qui de discrimine febrium agit, inveniendam hic afferre sufficiat. Hic enim Galenus, ουσία δὲ πυρετῶν ἐστὶ, inquit, οὐ καθ' Ἱπποκράτην μόνον καὶ τοὺς ἀρίστους ἰατροὺς, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν κοινὴν πάντων ἀνθρώπων ἐγγύαιαν, ἢ παρὰ φύσιν θερμοασία, μάλιστα μὲν εἰς ὅλον ἐκτεταμένη τὸ ζῶον· εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ πάντως, ἤτοι γὰρ ἐν τοῖς πλείστοις μέρουσιν, ἢ ἐν τοῖς κυριωτάτοις.

Ibid. lin. 5. δυσπνοίας. Hanc vocem omnem respirandi difficultatem significare, jam indicat ipsa etymologia vocis, uti dicit Galenus (de respir. difficult. Lib. I. cap. 1) atque eo sensu de δυσπνοίας Lib. III. conscripsit Galenus, ubi in varias rationes inquirat, qua respiratio laedi possit harumque laesionum causas investigat omniaque, quae apud Hippocratem de hac re inveniuntur, colligit explicatque. Nonnumquam tamen arctiori sensu adhibetur haecce

\*

vox atque aliquam asthmatis speciem significare videtur, uti patet ex Galeno de medic. compos. sec. loc. Lib. VII. cap. 6: καλοῦσι δὲ οὕτως (τοὺς ἰδίως δυσπνοιικούς ὀνομαζομένους) ὅσοις ἐμπέλησται τὰ βρόγχα τοῦ πνεύμονος ὑγρῶν παχέων τε καὶ γλίσχρων. De his dyspnoicis autem egerunt Celsus Lib. IV. cap. 4. § 2, Aëtius Tetrab. II. IV. cap. 57, Paul. Aegin. Lib. III. cap. 29 et Actuarius de meth. med. Lib. I. cap. 17. Utamque autem significationem hujus vocis complectitur Definit. 262. auctor Definit. medic. Δυσπνοιῖκοι εἰσὶν, ἐφ' ὧν οἰοῦναι στενοχωρούμενον ἐκπνεῖται τὸ πνεῦμα καὶ εἰσπνεῖται. ἢ, δυσπνοία βλάβη τις ἀναπνοῆς ἐστίν.

Ibid. νυσταγμοῦ. Νυστάζειν proprie significat nictitare, verum, quia somniculosi vulgo capite nictitare solent, saepius jam apud Hippocratem (e. g. de prisca medic. pag. 12. Epidem. Lib. VII. pag. 1215) νυσταγμὸς in universum somnolentiam indicat.

Ibid. περιπνευμονίαν. Περιπνευμονία vel περιπλευμονία vel πλευμονίς (Hippocr. Lib. de intern. affect. pag. 533) ab antiquis, quemadmodum et hodie, dicebatur pulmonis inflammatio, uti patet ex Definit. med. N°. 259: περιπνευμονία ἐστὶ φλεγμονή πνεύμονος μετὰ πυρετοῦ ὀξέος καὶ δυσπνοίας, et Aretaeo de causis et signis acut. morb. Lib. II. cap. 1; ἣδε ἐστίν, ἣν καλέομεν περιπνευμονίην, φλεγμονή τοῦ πνεύμονος ξὺν ὀξείῳ πυρετῷ, εὔτε ξύνεστιν αὐτέοισι βάρος τοῦ θώρηκος, ἀπορίη, ἣν μούνος φλεγμὴν πνεύμων. De hoc morbo autem egerunt Hippocrates multis in locis, quae collegit Foësius (Oecon. Hippocr. ad vocem περιπνευμονία), Celsus Lib. IV. cap. 7,

Caelius Aurel. Acut. Lib. II. cap. 26—29, Aretaeus l. I., Aëtius Tetrab. II. IV. cap. 66 et Paulus Aegin. Lib. III. cap. 30.

Ibid. XVIII. in tit. Ἀπολλωνίου. Varii fuerunt Apollonii medici, variis cognominibus distincti, de quibus tamen adeo pauca nobis cognita sunt, ut nemo adhuc eos recte in ordinem digerere vel determinare potuerit, quot fuerint, quo tempore quisque eorum vixerit, quid scripserit quidve ad universam rem medicam augendam vel emendendam contulerit. Licet hac ratione sane uni viro permulta cognomina tribuantur, in Apollonium tamen, qui scripsit *περὶ ἐπιπορίστων* et de quo hic etiam sermo esse videtur, mihi cognomina *βιβλάς*, Antiochenus (an pater vel filius, determinare non audeo), Pergamenus (uti enim dicit Fabritius (Biblioth. Graeca Tom. XIII. pag. 75), posset Antiochiae natum, verum diu Pergami versatum esse vel ratione inversa), Mus, Herophileus et Empiricus omnia competere videntur, quam conjecturam protulit jam Fabritius l. I. Si enim Apollonium Biblam et Apollonium Murem a se invicem dirimamus, uti placuit Cl. Sprengel, cum illo quoque varia loca in Galeni libris de medic. composit. sec. loc. et sec. gen. obvia, ubi citatur Apollonius sine cognomine ex ejus Libris *περὶ ἐπιπορίστων* modo Apollonio Biblae, modo Apollonio Muri, modo vero Apollonio Archistratori tribuere deberemus (Sprengel Pragmat. Gesch. der Medizin Tom. I. pag. 560 et 598 et Tom. II. pag. 76) et utrumque Apollonium Murem et Apollonium Archistratorem

auctorem habere Librorum *περὶ εὐπορίστων*, quam sententiam de illis profert Cl. Sprengel l. l., utroque loco eundem Galeni locum citans (de composit. medic. sec. loc. lib. I. pag. 167); ubi etiam nullum cognomen adhibet ille auctor. Mibi tamen vix credendum videtur, duos existisse Apollonios, qui *περὶ εὐπορίστων* scripserunt; illud enim si verum esset, miro modo illos inter se confudisset Galenus, quod sane de tali auctore expectandam non esset, verum ratio, quare Galenus semper reticeat cognomen auctoris *περὶ εὐπορίστων* Librorum mihi potius inde petenda videtur, quod ejus aetate cuivis satis notum erat, quisnam Apollonius hos Libros conscripsisset; Herophileus autem dicitur auctor hicce a Galeno (de medic. composit. sec. loc. Lib. III. cap. I, multisque aliis in locis); cognomen Herophilei parum a cognomine Empirici differre atque sectatores Herophili sensim magis magisque ad scholam empiricam versisse res est satis nota et praeterea patet ex loco Isagoges cap. 4, ubi proles scholae Herophileae dicitur Empirica; Apollonio autem Muri adscripsi Libros supra laudatos ob testimonium Celsi, qui Apollonium Murem de facultatibus medicamentorum scripsisse refert (Lib. V. Praef.); illum autem habui eundem ac alterum Antiochenum, quia Antiocheni ambo inter Empiricos recensentur (Isagoge l. l.). Secundum sententiam igitur Fabritii hujus auctoris sequentes libros variis locis citatos videmus:

1°. Libr. *περὶ εὐπορίστων*, qui citantur a Galeno

(de medic. composit. sec. loc. et sec. gen. saepissime) et ab Oribasio (Praef. ad Euporist. Lib. I.)

2°. Libr. *περὶ χαρμητῆρων*, quos citat Galenus Comment. II in Hippocr. Epidem. Lib. III. aegrot. 8.

3°. Libr. XXIX de secta Herophili, quos citant Galenus (de different. pulsuum Lib. IV. cap. 10) et Caelius Aurel. (Acut. Lib. II. cap. 13).

4°. Forsan illi quoque tribuendus est Lib. *περὶ μύρων*, quem citat Athenaeus (Deipnosoph. Lib. XV, pag. 688).

5°. *προφυλακτικὰ θαλασσίμων* Apolloniū Muris, quae citat Galenus, (Antidot. Lib. II. cap. 8) etiam ex quodam ejus Libro de antidotis deprompta videntur.

Praeter huncce Apollonium autem adhuc sequentes a variis auctoribus citantur :

II. Alter Antiochenus, sive pater sive filius ; pater autem vel *ὁ πρεσβύτερος* memoratur ab Erotiano (ad vocem *ἀμβην*) ; junioris vero fascia quaedam invenitur apud Galenum Lib. de fasciis cap. 101.

III. Appollonius Citiensis, cujus Liber *ἐκ τῆς περὶ ἀρθρῶν πραγματείας* adhuc servatur in Collect. Nicetae, idem Liber *περὶ ἀρθρῶν* fortasse, quem citat Erotianus (ad vocem *ἀμβην*). Praeterea adhuc citantur :

1°. Libri XVIII ad explicandas Hippocratis voces, (Erot. Praef.)

2°. Libri II de Epilepticis (Cael. Aurel. Chron. Lib. I. cap. 4.)

(303)



Si autem nostra ratiocinatione dubium factum sit, num Apollonius Mus revera idem fuerit ac Citiensis, inde etiam labefactatur opinio Doctiss. Osann, pestem, de qua egit Rufus Ephesius, fuisse illam epidemiam, quae a. U. C. 628 in Africa grassata est, quoniam viri doctissimi integra argumentatio et computatio de aetate Posidonii ac Dioscoridis eo nititur, quod Apollonius Mus fuerit idem ac Citiensis, verumtamen nihilominus semper constabit, ante Rufi (i. e. ante Trajani) aetatem regnasse pestem, quae nullo modo ab hodierna peste differt symptomatibus suis (conf. ipsius Osann opusc. et supra adnot. nostra).

IV. Apollonius ὁ θῆρ, Herophileus, qui vulgo idem habetur ac ὁ ὄφις. Citatur ab Erotiano (ad vocem ἀμβην et praef.) et Galeno (Lib. de fasciis cap. 104); illum autem respicere videntur Caelius Aurel. (Acut. Lib. II. cap. 28) et Oribasius (Synops. Lib. I. cap. 14). Scripsit hicce auctor excerpta ex Bacchii Tanagraei Lexico vocum Hippocraticarum (Erot. Praef.)

V. Apollonius Tyrius Herophileus, qui citatur a Strabone (Geograph. Lib. XVI. cap. 2. § 24. pag. 341) et teste Cl. Sprengel a Galeno (lib. de fasciis), ubi tamen in editione Renat. Charterii agitur de Apollonio τῷ θηρῖ, nisi haec vox emendatio sit Charterii, neque etiam absonum esset, conjicere, Apollonium τὸν θηρῶν et Apollonium Tyrium eundem fuisse. Quaeritur porro a Cl. Sprengel (l. l.), an hicce Apollonius sit idem, qui de sequelis morsuum serpentum scripsit (Scholiast. ad Nicandri Theriaca vs. 303.)

VI. Apollonius Memphites; idem ac Apollonius ὁ ἀπὸ Στρατωνός (quod cognomen Sprengel (Pragmat. Gesch. der Medizin Tom. I. pag. 570) explicat *discipulum Stratonis*, non vero, ut vulgo fit, *filium Stratonis*) erat Erasistrateus (Isagoge cap. 10) scripsitque de plantis (Scholiast. ad Nicand. Theriaca vs. 52 et 559), et περὶ ἀρθρῶν (Erot. ad vocem ἀμβήν.); citantur porro ejus quatuor pulsus definitiones (Galenus de differ. pulsum Lib. IV. cap. 17), ejus collyrium (Aëtius Tetrab. II. III. cap. 220) et ejus epithema auriculare (Nicol. Myreps. de composit. medicam. Sect. XLVIII. cap. 11).

Citatur et a Caelio Aurel. (Chron. Lib. III. cap. 8 et Lib. IV. cap. 8) et verisimiliter ab Oribasio (Collect. Medic. Lib. VII. cap. 19).

VII. Apollonius Archistrator, cujus pastillus citatur a Galeno (de composit. medicam. sec. loc. Lib. V. cap. 12); illum autem Cl. Sprengel auctorem dicit Librorum περὶ εὐπορίστων (l. l. Tom. II. pag. 76) atque eundem habere videtur ac Apollonium Pergamenum, quem nos supra eundem diximus ac Apollonium Murem.

VIII. Claudius Apollonius, cujus medicamentum ad rabiosorum morsus citat Galenus (Antidot. Lib. II. cap. 11).

IX. Apollonius Glaucus, cujus Libros de interioribus citat Caelius Aurel. (Chron. Lib. IV. cap. 8.)

X. Apollonius Organicus, cujus medicamentum ad carbunculos citatur a Galeno (de composit. medic. sec. gen. Lib. V. cap. 15).

XI. Apollonius Pitanaeus, qui citatur a Plinio (Nat. Hist. Lib. XXIX. cap. 6.)

XII. Apollonius Thespianus (Galenus apud Fabritium l. l. pag. 76.)

XIII. Quaeritur, num Apollonius, qui citatur ab Apulejo (Metamorph. Lib. IX. pag. 268. ed. Juliani Floridi) fuerit unus ex supra enumeratis vel alius quisquam omnium novissimus.

XIV. Autumat denique Fabritius (l. l. pag. 76) apud Galenum (Lib. I. de meth. med. cap. 7) loco *Apollonidae* legendum esse *Apollonii*, Apolloniumque Cyprium methodicum, de quo hic agitur, eundem esse putat ac Apollonius ille, qui bis citatur in Galeno adscripto Libro de virtute Centaureae.

Ibid. *δοθιήνας*. *Δοθιήν* a Paulo Aegin. (Lib. IV. cap. 23) dicitur *ὄγκος ἀποστηματώδης ἐν παχέων χυμῶν, ἐν τοῖς σαρκώδεσι μάλιστα τόποις συνιστάμενος*. Celsus autem furunculum sequenti modo circumscribit: (Lib. V. cap. 28. § 8) » Furunculus vero » est tuberculum acutum cum inflammatione et dolore; maximeque ubi jam in pus vergit. Qui » ubi adaptus est, subter apparet pars carnis in » pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra, » quem ventriculum quidam furunculi nominant.» Galenus vero (Lib. de tumor. praeter naturam cap. 16) illum refert ad affectiones *φλεγμονώδεις* et de medic. compos. sec. loc. Lib. V. cap. 3 duas distinguit furunculi species; quarum alteram constituunt varosi, duri et concoctu difficiles, alteram vero, quibus aliquando febres accedunt, tumor in

magnitudinem excrescit et in pus mutatur. Scripserunt etiam de furunculis Oribasius Synops. Lib. VII. cap. 41 et Euporist. Lib. III. cap. 53 et Actuarius de meth. med. Lib. II. cap. 12, Lib. IV. cap. 16 et Lib. VI. cap. 6.

Ibid. lin. 1. ὑγιήνη. Resinam multarum arborum adhibebant antiqui; praeter Terebinthum autem, de qua jam locuti sumus, enumerat Plinius (Nat. Hist. Lib. XVI. cap. 10) scandulum, pinum, pinastrum, abietem, piceam, laricem, tedam et taxum, quae omnes ad genus Pinum pertinere videntur; passim tamen et occurrunt resina Lentiscina vel mastix (e Pistacia Lentiscus Linn.), Cyparissina (e Cupresso sempervirente Linn.) aliaeque species multae, de quibus omnibus plura leguntur apud Theophrastum Hist. Plant. Lib. VIII. cap. 2, Dioscoridem Lib. I. cap. 92 et 93, Plinium l. l., Lib. XIV. cap. 21 et Lib. XXIV. cap. 6, Galenum de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. VIII. cap. 17. § 4, Oribasium Synops. Lib. II. cap. 61, Collect. Medic. Lib. XII et Lib. XV. cap. 1, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtium Tetrab. I. I. et Paulum Aegin. Lib. VII. cap. 3.

Ibid. ὀθόνιον. Ὀθόνια in universum indicant lintea. Lintea autem, quae a medicis adhibentur (teste Hippocrate de medici offic. pag. 744) esse debent κοῦφα, λεπτά, μαλθακὰ, καθαρὰ, πλατέα, μὴ ἔχοντα συρράφας, μὴδ' ἐξεστίας, καὶ ὑγιέα ὥστε ταυνεῖν φέρειν, καὶ ὀλίγω κρέσσω.

Ibid. lin. 2. *μάνναν*. Quoniam medicamentum purgans manna dictum solummodo occurrit apud novissimos auctores Graecos, uti Actuarium (de meth. med. Lib. V. cap. 8), de illo hic haud dubie non est sermo; hinc putavi hic subaudiri vocem *λίβανου* ideoque verti *micam thuris* i. e. (ut dicit Actuarius l. 1. Lib. VI. cap. 5) » quod ex confracto in » magnis oneribus thure succutitur: in ea siquidem » feruntur exigua confracta frustula corticis thuris.” De hac mica thuris autem conf. Dioscorides Lib. I. cap. 83, Oribasius Collect. Medic. Lib. XI, Paulus Aegin. Lib. VII. cap. 3 et Actuarius l. 1.

Ibid. lin. 4. *ἀλφίτου*. *Ἀλφίτου* apud Hippocratem omnem farinae speciem significare refert Galenus (Exeg. ad vocem), quia (Lib. de morbis mulierum pag. 607) memorantur *ἀλφίτα* triticea et (Lib. de intern. affect. pag. 545) *ἀλφίτα* e lentibus et ervis tostis. Apud alios auctores vero (e. g. Galenum de alim. facult. Lib. I. cap. 11) haec vox significat farinam hordei leviter tosti vel frixi, (Lat. *polenta*), licet tamen Dieuches (apud Oribasium Collect. Medic. Lib. IV. cap. 6) etiam loquatur de polenta ex avena hordeaceae postponenda. De polenta autem conf. Galenus l. 1., Oribasius Collect. Medic. Lib. IV. cap. 1 et 6 et Lib. XI et Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. I et Paulus Aegin. Lib. I. cap. 73 et Lib. VII. cap. 3.

Pag. 86. lin. 3. *στέαρ αἰγείου ἢ βόειον* et lin. 9 *ὄρνιθίου στέατος*. Antiqui multorum animalium

adipem inter medicamenta recensent: sic Galenus (de simplic. medic. temper. ac facult. Lib. XI. cap. I. § 2) enumerat adipem suillum, bubulum, caprinum, anserinum, gallinaceum, vitulinum, leoninum, viperarum, ursorum, vulpium et piscium marinorum et fluviatilium; praeterea Plinius (Nat. Hist. Lib. XXIX. cap. 5) struthiocamelinum; Oribasius (Collect. Medic. Lib. XII.) ovillum, agninum et cervinum; Aëtius (Tetrab. IV. III. cap. 3) pantherinum et hyaenarum; Paulus Aegin. (Lib. IV. cap. 32) pardalium et phasianorum. De illis adipibus autem conf. Dioscorides Lib. II. cap. 88—94, Plinius l. l., Oribasius l. l. et ibid. Lib. XII, Lib. XIV. cap. 60 et Lib. XV. cap. 2, Eupor. Lib. II. cap. 1, Aëtius Tetrab. I. II. cap. 152 et Paul. Aegin. l. l. et Lib. VII. cap. 3. Praeterea omnes hi auctores etiam distinguebant adipem animalium marium et femininarum, juniorum et veterum, domesticorum et sylvestrium, uti et recentem adipem et veterem, ita ut Aëtius Tetrab. IV. II. cap. 44 commendet adipem quadraginta annorum cum oleo adversus ulcera maligna. De usu vero adipis inter alimenta scripserunt Galenus de aliment. facult. Lib. III. cap. 11, Oribasius Collect. Medic. Lib. II. cap. 38 et Paulus Aegin. Lib. I. cap. 85.

Ibid. lin. 8. *μυρίκης*. *Μυρίκη* erat Tamarix Gallica Linn. (Dierbach Die Arzneim. des Hippokr. pag. 94), de qua planta ejusque viribus egerunt Theophrastus Hist. Plant. variis in locis, Dioscorides Lib. I.

cap. 116, Plinius Nat. Hist. Lib. XXIV. cap. 9,  
 Galenus de simplic. medic. temper. ac facult. Lib.  
 VII. cap. 12. § 28, Oribasius Collect. Medic. Lib.  
 XIV. cap. 10 et Lib. XV. cap. 1, Aëtius. Tetrab.  
 I. I. et Paul. Aegin. Lib. VII. cap. 3.

TANTUM.



THESES.

I.

*Omniū epidemiarum, quas nomine pestis (λοιμοῦ) memorant antiqui auctores Graeci et Latini, bubo constans erat syntoma.*

II.

*Perperam a Cl. SPRENGEL (Pragmat. Geschichte der Medizin Tom. II, pag. 76) APOLLONIUS ARCHISTRATOR dicitur auctor librorum περὶ εὐπορίστων.*

III.

*Syphilis propago vel mutata forma leprae (elephantiasis ARETAEI aliorumque antiquorum) est habenda, neque ejus origo aliunde est quaerenda.*

IV.

*Recte statuunt, qui virus gonorrhœicum a syphilitico distinguunt.*



THESES.

V.

*Arteriae, durante circulatione normali, non contrahuntur.*

VI.

*Nutritio cartilaginum articularium non fit ope vasorum, verum absorptione ex ambienti synovia.*

VII.

*In arte rhinoplastica integumenta brachii melius ad novum nasum formandum adhibentur quam frontis.*

VIII.

*In ossium fracturis applicationem fasciarum, ferularum similiumque differre praestat, donec partium mollium inflammatio sit sedata.*

IX.

*Si in nova pupilla formanda iridectomia institui possit, haec operatio semper iridodialysi est praeferenda.*

X.

*In partu facie praevia versio numquam est instituenda.*

## THESES.

## XI.

*Medico forensi incumbit officium cadavera etiam putrida secandi vel explorandi.*

## XII.

*Ubi inquirendum est, an aliquis, epilepsiam prae se ferens, revera hoc morbo sit affectus, necne, numquam ad methodos dolorificas confugere necessarium est.*

## XIII.

*Illam sensatio, qua homines, licet nullum dolorem nullamve molestiam vel aegritudinem accurate definiendam percipiant, tamen aegrotos se esse sentiunt, residet in intestino tenui.*

## XIV.

*In inflammationibus exsudativis dictis, uti in angina membranacea, in febre puerperali, et. usus Mercurii dulcis omnibus aliis remediis est praefereendus.*

## XV.

*Recte Hippocrates (Aphorism. 31 sect. II):  
« Si cui ex morbo cibum probe sumentis corpus  
« nihil proficit, malum.»*

## THESES.

## XVI.

*Embryotomia, quae in quocunque casu mortis infantem ponit certam, pertinet ad operationes rarissimas quidem, verum in hodierno quoque artis obstetriciae statu necessarias.*

## XVII.

*Instrumentum illud, quod nuperrime Cl. BAUDELOQUE jun<sup>r</sup> nomine cephalotribe proposuit quodque in casu indicatae excerebrationis, perforatorii vices adimpleret, melius mihi convenire videtur in casu infelicissimo, quo caput, avulso corpore infantis, in utero remanserit.*

## AD CONTEXTUM ET VERSIONEM.

## ADDENDA ET EMENDENDA.

P. 5. 2. l. 14 pro spina l. *dorso* — P. 8. l. ult. pro *τίς* l. *τις* — P. 11. 6. l. 3 pro *folii*, l. *folii*; — P. 12. II. l. 1 pro *χει*- l. *χειρ*- — Ibid. l. 2 pro *ρουργία* l. *ουργία* — Ibid. l. 6 pro *ἦ* l. *τῆ* — P. 15. III. in tit. dele vocem *de* — P. 16. 3. l. 13 pro *καθιέν* l. *καθιέναι* — P. 17. 3. l. 17 pro *mulsum* l. *aqua mulsa* — P. 20. l. 8 pro *ἦτοι* l. *ἦτοι* — Ibid. in marg. pro *αυτοῦ* l. *αὐτοῦ* — P. 21. l. 6 pro *sane* l. *vel* — P. 22. V. l. 1 pro *τὲ* l. *τε* — P. 23. l. 6 pro *roseo* l. *oleo rosaceo* — P. 25. l. 17 pone vocem *aperiatur* insere vocem *ita* — P. 29. 3. l. 5 pro *Clysmata ex his medicamentis vel decoctum rosarum* l. *horum medicamentorum vel rosarum decoctum* — P. 30. l. 4 pro *τότε* l. *τότε* — P. 34. IX. l. 4 pro *μαθητῆς* l. *μαθητῆς* — P. 36. XI. l. 7 pro *ἀναδάκ*- l. *ἀναδάκ*- et *ibid.* l. 8 pro *νεῖ* l. *κνεῖ* — P. 39 in tit. pro *Libro* l. *libris* — P. 40. l. 8 pro *αὶ* l. *αἱ* — P. 44. XIV. l. 1. 16 pro *τὲ* l. *τε* — Ibid. 2. l. 2 pro *εὐρυτέρας* l. *εὐρυτέρας* — P. 46. l. 15 pro *στερηδονισμένον* l. *τετερηδονισμένον* — Ibid. 3. l. 7 pro *μηρος* l. *μηρός* — P. 48. Not. (1) pro *ἕταν* l. *ἕταν* — P. 50. Not. (2) l. 1 pro *τὲ* l. *τε* — P. 52.

Not. (2) pro 'Απὸ l. 'Απὸ — P. 55. l. 12 pro illa  
 l. *illud* — P. 56. l. 3 pro πᾶν l. πᾶν — Ibid. 10.  
 l. 11 pro στομίον l. στόμιον — P. 58. 12. l. 1  
 pro ἔντερα l. ἔντερζ — P. 61. 13. l. 3 pro plana  
 l. *planæ* — Ibid. l. 4 pro facta l. *factæ* — P.  
 63. 15. l. 14 pro perforentur l. *perforetur* et eo-  
 dem modo ibid. l. 15 — P. 64. l. 1 pro ὑποφορᾶς  
 l. ὑποφορᾶς — P. 68. l. 25 pro κᾶν l. κᾶν — P.  
 70. 20. l. 10 pro σχηματιζέσθω l. σχηματιζέ-  
 σθω. — P. 74. 2. l. 14 pro σύριγγα, l. σύριγγα —  
 P. 76. l. 4 pro ἐκά- l. ἐκαθ- et l. 5 pro θάρην l.  
 αρην — P. 78. 5. l. 11 pro τὲ l. τε et eodem modo  
 P. 80. XVI. l. 4 — P. 80. 2. l. 2 pro ἀπολει-  
 πουσεν l. ἀπολείπουσεν — P. 83. 3. l. 4 pro  
 lens l. *lenticula palustris* — Ibid. pro siccis l.  
*comminutis* — P. 83. l. 18 pro sphragis l. *terra*  
*Lemnia* — P. 85. l. 2 pro mulso l. *aqua mulsa* —  
 Ibid. pro Aegyptia l. *terra Aegyptiaca* — Ibid.  
 XVIII. l. 2 pro micamthuris l. *micam thuris* —  
 P. 87. l. 6 pro organi l. *origani*.

### AD ADNOTATIONES.

P. 3. l. 19 pro femus l. *femur* — P. 5. l. 3  
 pro et in fine ejusdem l. *et in fine ejusdem cap.* —  
 Ibid. l. 26 pro dubi sunt palmae l. *dubie sunt*

*palmulae* et pone haec verba insere *vel fructus Phoenicis Dactyliferae Linn.* — Ibid. l. 27 et saepius infra pro Theophrastes l. *Theophrastus* — P. 10. l. 10 pro XXXIV l. XXIV — Ibid. l. 20 et sqq. dele adnot. ad vocem *μελικράτω* — P. 11. l. 16 bis pro *σπληνίον* l. *σπλήνιον* — P. 13. l. 7 pro recentibus l. *recentioribus* — P. 17. l. 9 pro *ἀναπληρουσθω* l. *ἀναπληρούσθω* — P. 19. l. ult. pro § 8 cap. 15 § 13 cap. 18 l. § 8, cap. 15 § 13, cap. 18 — P. 26. l. 10 pro Tetrab. IV. 4 l. Tetrab. IV. IV. — P. 26. l. 14 pone vocem *ἐπὶ* insere *et pro βαρυτόνως βαρυτόνος* — P. 38. l. 11 pro Abie l. *Abiete* — Ibid. l. 27 pro *Διοκλέος* l. *Διοκλέος* — P. 39. l. 20 pro Tom. 12 l. Tom. XII — P. 40. l. 13 pro Comment. in Hippocratis de Epidem. Lib. I l. *apud Fabritium l. l.* — P. 41. l. 11 et eodem modo l. 12 *ἔρφνη γέ* l. *ἔρφνη γε* — P. 43. l. 3 pone vocem *ὁ* insere *nisi ὁ omnino sit delendum* — Ibid. l. 22 pro *τινας* l. *τινάς* — P. 46. l. 19 pro Definif. l. Definit. — Ibid. l. 21 pro *τρημάτων*; l. *τρημάτων*, — Ibid. pone lin. ult. adde *ibid. lin. 7. βραχίον. Hic pro βραχίον mihi legendum esse videtur βραχίων* — P. 48. l. 4 pro *δυσεργέστερα* l. *δυσεργεστέρα* — P. 49 pone l. 23 insere *ibid. lin. 10. Φλέβαν. Haud dubie pro Φλέβαν hic legendum est Φλεβὰ* — P. 50 l. 26 pro *σμίλη* l. *σμίλη* — P. 56. l. 22 pone *et* insere vocem *e* — Ibid. l. 23 pro vituperat l. *vituperet* — P. 59. l. 19 pro Paulum l. *Paulus* — P. 65. l. 8 pone vocem conf. insere

*Theophrastus Hist. Plant. Lib. III. cap. 17, Lib. IV. cap. 15, Caus. Plant. Lib. III. cap. 16—22 et Lib. V. cap. 5 et 13 multisque aliis in locis — Ibid. l. 10 pro ille l. illud — Ibid. l. 14 pro Galeni l. Galenus — P. 71. l. 20 pro alte- l. alter- et l. 21 pro ruter l. uter — P. 74. l. 3 pro γαγγραίνων l. γαγγραίνων — P. 74. l. 5 pro ἄλλότριον l. ἀλλότριον — P. 76. l. 26 p. 4 l. 14 — P. 79. pone lin. 20 insere : *ibid. Hic pro πύρινον δὲ mihi legendum esse videtur πύρινόν τε* — P. 81. l. 1 pro οἰσυπηρα l. οἰσυπηρά — P. 82. l. 5 pro alimentio l. alimento — P. 88. l. 22. pro οἰδήματε l. οἰδήματι — P. 89. l. 17 pro ἔστι l. ἔστι — P. 92. l. 9 pro expectandam l. *expectandum.**

### AD THESES.

**Thes. XVI. l. 1 et 2 pro mortis infantem l. mortem infantis.**