

*Bibliothèque numérique*

medic@

**Vésale, André. Paraphrasis in Nonum  
librum Rhazae ad Regem  
Almansorem, de affectuum  
singularum corporis partium  
curatione**

*Basel, Winter, 1537.*

*Cote : 71827*



(c) Bibliothèque interuniversitaire de santé (Paris)  
Adresse permanente : <http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?71827>

 P A R A -

P H R A S I S I N N O .

N V M L I B R V M R H A Z A E M E D I C I A R A -

b i s C l a r i s s . a d R e g e m A l m a n s o r e m , d e

a f f e c t u u m s i n g u l a r ũ c o r p o r i s p a r -

t i u m c u r a t i o n e , A n d r e a

V v e f a l i o B r u x e l l e n -

s i a u t o r e .

*Le Vignon M. Ruy*

R e r u m a c v e r b o r u m i n h o c o p e r e m e m o -

r a b i l i u m d i l i g e n t i s s i m u s

I N D E X .




71,827

B A S I L E A E ▶

1537.





ORNATISSIMO  
 CLARISSIMOQUE VIRO D. NI-  
 colao Florenti, inuictis. CAROLI  
 Cæsaris Medico peritissimo, Do-  
 mino suo & Patrono, An-  
 dreas Vvesalius Bru-  
 xelensis, S.



ECTE nimirum ueteres non pa-  
 rum interesse iudicauerunt, uir do-  
 ctissime, qua quis ratione in arti-  
 bus ac scientijs uersaretur, hoc est,  
 exactam ne in illis seruaret metho-  
 dum, & à primis ad secunda, ac sic deinceps ad pro-  
 xime semper consequentia debito transfiret ordine:  
 an uero prout unumquodq; se casu obtulisset, ita  
 uel primum, uel secundum ab eo haberetur. Quod  
 cum tu minime ignorares, meq; aliquot ab hinc an-  
 nis, Medicinæ studio operam daturum intelligeres,  
 operæ precium fore duxisti, præclarissimam quan-  
 dam longeq; utilissimam studendi in arte Hyppo-  
 cratica mihi præscribere rationem: cui quidem sum-  
 ma, quæ potui, diligentia semper insistens miram di-  
 ctu, quanto meo commodo, nullisq; adeò ambagi-  
 bus, ad

bus, ad eam tandem peruenerim Medicinæ partem, quæ curatiua dicta, cæteris (cum ob hanc & illæ discantur) tum præstantior est, tum ad usum longe etiam accommodatior. Atq; hic adeo multum mirari cœpi, communem nostræ temporis plurimorum Medicorum in abigendis morbis rationem, tantum à Græcorum, doctissimorumq; hominum modo euariatam, ac Barbarorum Arabumq; perpetuo (propè dixerim) uestigijs tam pertinaciter inherentem. Vnde nec abs re fore duxi, ne quid illorum omnino nos fugiat, unà cum Græcis (quos tuo exquisitissimo iudicio semper præferre consueuisti) Arabes quoq; hac in parte paulo diligentius conferre. Hanc etiam rationem excellentissimi PARISIENSES MEDICI suis tyronibus plurimum commendauerunt, sic fore sperantes, ut propediem uetus illa, & ab Hippocrate autore profecta iactura, magna cum mortalium utilitate prorsus reuocata, passim uigeat, sumpto paulatim artem hanc exercitantium opera incremento. Cum igitur sic tuo & meorum clarissimorum præceptorum consilio obsequutus, Rhazæn ex alijs primum in manus sumpsissem, ac maiori cum studio ad Græcorum scripta, tanquã ad lapidem Lydiũ, examinassem (eum namq; inter reliquos suæ gentis in curandi artificio primas tenere,

## N V N C V P A T O R I A

tenere, à præceptore meo D. IACOBO SYL-  
 VIO, eruditissimo sanè Medicæ artis professore  
 subinde audieram) ita profecto placuit, ut dignum  
 censerem, qui sordibus ereptus, & elegantiori latini  
 sermonis cultu circumdatus, à delicatioris quoq; au-  
 ris lectore reciperetur: maxime quod omnes ferè lo-  
 cales morbos in tam exiguo opusculo persecutus sit,  
 quodq; non nisi in paucissimis à Græcorum decre-  
 tis declinarit. Ut hinc etiam quidam adstruere sint  
 conati, hunc Rhaꝛæ librū è Græca in Arabicam  
 conuersum linguam, ac sic deinceps Rhaꝛæ nomen  
 illi præfixū. Sed manifestè reclamare uidentur tum  
 incognita Græcis medicamina, tum ipse dictionis  
 stylus et character, adeo horridus et incultus, quē  
 admodum est Arabum uniuersus, ut nihil omnino  
 cum Græcorum illi concinnitate & elegantia con-  
 ueniat: nec perinde facile aut in Græcū, aut in La-  
 tinum sermonem transfundi se sinat. Atq; hæc co-  
 gitanti mihi sæpius, in diuersa distractus est animus:  
 nunc quidem ad hoc urgens, ut quod æquum iudi-  
 cassem, id ipsum aggrederer: nunc uero rei difficul-  
 tate perpensa, ab hoc ipso rursus deterrens. Nam  
 præter ea quæ dicta etiam nunc sunt, non ne uel mo-  
 lestissimum est, tot medicaminum, aliarumq; uocum  
 interpretationem ad susceptum negotiū omnino ne-  
 cessariam

## EPISTOLA

cessariam addiscere? Siquidem pauca admodum in eius libri translatione remedia inuenias, quæ non uel uiciatè scripta, uel obscuris quibusdam, aut etiam Arabicis dictionibus appellata sint. Sed uicit tandem publica utilitas, priuato commodo (si modo laborum fuga commodum dici mereatur) longe semper anteferenda. Neq; uero parum subsidij polliceri uidebantur, qui difficillimæ simplicium medicamentorū scientiæ instaurationi incubuerunt. Quod fermè duodecim iam annos foelicissima quæq; medicorum ingenia nec infeliciter tentarunt: ut perrarus admodum alicuius nominis Medicus extiterit, qui nō aliquid posteris, quod ad hanc scientiam pertineret, relinquere sit conatus. Huc enim omnes tam nobis exoptandis sudoribus contendebant, ut uidelicet pharmacopolarum officinas Barbaris uocibus, ne dicam falsis pharmacis infertas, pristinae integritati restituerent. His igitur motus causis, atq; horum adeo exemplo, Rhazæ uersionē castigare aggressus sum, ut & immenso labore cæteros medicinae candidatos liberarem, & ipse posthac autor ad hominū manus emendatior perueniret, repurgatis non solum medicamentorū Barbaris, Latinisq; auribus incognitis uocibus, sed tota etiam orationis serie in melius commutata, ut quæ prius squalida & inculta essent,

essent, nec propter obscuritatem percipi possent, nunc quatenus fieri possit, & res ipsa ferat, splendeant, minusq; adeo Lectori negotium exhibeant. Verum nec hic quidem (quod forte ab interprete desideraretur) uerbum semper uerbo reddere conatus sum: imò potius paraphrasten egi, liberè quæ ad rem necessaria iudicavi subinde adijciens: & quædam fusiore, quæ nimirum obscuriora uisa sunt, oratione explicans. Vnde etiam uereor, nostras lucubratiunculas à quorundam uilitigatorum morsibus tutas minime futuras, ut qui nihil à sua horrida barbarie emutatum enouatumq; uelint, nec quicquam quod ipsi nō didicerint, pensi habeant. Repertus enim frugibus, gladem defendunt: nec cum Gryllo in hominem redire uolunt ne aliquando fastuosa illorum inscitia, uulgo turpiter innotescat. Quocirca uir præstantissime, primum hunc iuuenilem conatum, tua nominis celebritate commendatum, editionis aleam subire uolui: utpote melius ita à calumnijs tutum fore sperans. Siquidem tuam singularem in Græcorum & Arabum scriptorum Medicinæ cognitionem, & raram ac inauditam philosophicarum rerum scientiam, reliquasq; præclaras animi tui dotes, tales alienæ uirtutis ofores reueriti, pristinæ Hippocraticæ artis studiosorum conatibus male oblo-



## EPISTOLA

qui ac detrahere desinent. Tibi autem eum debeo,  
quod summus ad medicinam, & ad alias meliores di-  
sciplinas, mihi autor extiteris: nec adhuc cesses, sub  
inde me doctissimis tuis literis ad ea studia incitare,  
tuoq; patrocínio (quo ubiq; plurimum uales) apud  
alios prouehere. Rogo itaq;, ut hoc meorum studio-  
rum præludium, hilari atq; exporrecta fronte, con-  
tra istos male feriatos defendendum suscipias, ac per-  
ocium quid in eo præstiterim uideas, donec maiora,  
& tuæ excellenti doctrinæ digniora parauero. Vale,  
Medicorū omnium decus: & nostro Imperatori

Augustiss. CAROLO, quo hoc præsertim  
tempore carere orbis Christianus  
non potest, diu feliciterq; ui-  
uito. Bruxellis, Cal.

Febru. Anno

1537.

## RERVM AC VERBO-

RVM HOC OPERE

memorabilium

INDEX.

## A



Brotanū.	189	Ani scissuris ac fistulis medentia.	193
Aceti in dētium.	97.99	Anginæ curatio.	97.99
doloribus pe-		Apoplexiæ signa.	13
ftis.	84	à sanguinis copia. eo.	
Acetosa herba.	126	à pituitoso humore.	14
Acetum neruis inimicum.	213	Aqua oculi.	64
Albugo oculo innata.	52	Aquæ intercutē origo.	
Alchitra.	152	182. eiusdem curatio.	
Amplexicaulis herba.	137	Armenij lapidis puluis.	165
Anacardina cōfectio.	19	Arquati curatio.	142
Anacardinū mel.	20.99	Articulorū tophi.	214.215
ανασάρικα hydrophis species, eiusq; curatio.	145	Ascarides qui, & contra eos medicamē.	189.190
Αγκυλόγλωσσος.	96	Ασκήσις hydrops, eiusq; curatio.	142.145
Ani fistulæ.	195.196	Asininum lac.	84
Ani procidentia.	198	Affa arbor.	29.123
		Άδμα.	102
		Auditorio meatui.	fi
		a s quid	

## I N D E X.

quid inciderit, quomodo euellendū. 76	ctus	107
<b>A</b> uditus grauitas ex for-	Βλασφασίσιον	55
dibus. 73. à crudis hu-	Blitum	177
moribus. 74. ex ficci-	Bombyx cruda	115
tate. 75. ab expurgato	Burungium	189
humore per crifim.	Brassica capitata	28
codem.	<b>C</b>	
Auripigmentum 57	Cæcitas nocturna	65.
Auris ulcus 72	Cali	175
Aurium cera 73. 74	Callonymus piscis	65
Aurium dolor ex inflam-	Cameli urinæ usus	82
matione. 69. à crassis	Cancer in naribus à po-	
uiscosisq; humeri-	lypo diuersus	81
bis. 70. ex flatuoso	Cancer uulua	102
spiritu 71	Candentis filii usus in	
Aurium sonitus ac tinni-	dentium doloribus. 86	
tus 72	Caninus appetitus ab	
Aurium uermes 76	acido succo. 135. ab im-	
<b>B</b>	modica transpiratione,	
Alaninum oleum. 11	aut calido succo.	
Βαίρυακ	136.	
Been incognitæ uete-	Cannabis, siue canabit.	
ribus radices. 38	28.	
Βιχινγὸ globuli 100	Capitis dolor ex san-	
Bilem atram gignentis	guine. 1. ob bilis co-	
cibi qui 34	piam. 2. ex pituita. 3. 7	
Bilem atram purgantia	ex uentriculi uitio. 7.	
catapotia 37	ex insolatu 7.	
Birfen thoracis affe-	ad Capitis feruidum cru-	
	ciatum	

## I N D E X.

ciatum emplastrū . 5.	Cholera morbus	135
ad frigidum	6 Κιολάμια	87
Cataporia ad uentrē de ijciendum	Coccia cataporia Κόκκια eodem, & 4.	35
Cataporia de hermoda ctylis	Celiacus ex iocinoris obstructione, &c.	163
Cataporia ex bdellio. 193. 164.	ex uentriculi & graci lium intestinorum ui tio	163
Cataporia ex rheobar- baro feni	143 Κόλλια eiusq; curatio.	149.
Cataporia purgandæ bi lis atræ	37 Colicus ex flatu. 152. à bi lioso humore	155
Catapotiorum coccio- rum compositio	4 Colicus ex sanguine	156
Catapotiorum ex aloë. compositio	4 Columellæ curatio.	90
Catapotiorum fetido- rum compositio	18 Collyrium album. 44. 46.	
Catarrhus siue destilla- tio ex frigido aëre. 39	Collyrium de cerussa	185.
cū calida intēperie. 40	Collyriū Eleyfier. 49. 51	
Cathera	174 Collyrium ex aris flo- re	57
Cazi electuarium	164 Collyrium ex fellibus.	61. 64. 65.
Cera aurium	34. 37 Collyrium ex plumbo.	49. 50.
Cerussa albū R̄afis. 222	Collyrium ex thure. 50	
de Cerussa collyriū. 185	Collyrium polychre- ston	51.
Charta babylonica	168	
Cheieri, uiolæ luteæ. 223	61	
Χίμορις	19	
Cherua	19	

Collyrium

## I N D E X

Collyrium rubrum. 54.		<b>D</b>	
uiride 55.57		Damnocochia	176
Comitialis morbus. 25		Dentes eradicantia &	
ex obstructione.eod.		confringentia medi-	
per cōsortium. 26. ex		camenta	87.
uentriculi uitio.27. ex		Dentium dolor, ex in-	
cerebri pituita. 28. ex		flammatione. 84. ex	
sanguinis copia. eo-		frigidi humoris afflu-	
dem.		xu	85
Comitialis morbi cum		Dentiū refractioni me-	
ephialte consortiū.30		dentia	88
Condylomata 192		Dentiū stupori meden-	
Congelati qui 17		tia	88
Conuulsio oris 23		Destillatio siue Catar-	
Conuulsio, quæ <i>αυτομή</i>		rhus ex frigido aëre	
Græcis. 24 (119.		39.	
Coraceus bolus 118.	<i>Διακνήτης</i>		186
Cordis palpitatio. 113. ex		Diacalaminthes electu-	
calore.eodem. à frigi-		arium	163
da causa 114		Diacydonium	124
<i>κίψυρα</i> 42		Diamoschi cōfectio. 107	
Costinum oleum 19		Diarrhæa ex bilis co-	
Cotoneorum malorū		pia	164
pharmacum. 124		Diomedæaues. 27	
Crocus orientalis. 45		Dysenteria, eiusq; cu-	
Cyrenaicus liquor. 29.		ratio	169
sive Cyrenaicus suc-		<b>E</b>	
cus 86		Ebur combustum pro	
Cubeq; quid. 114, 115, 119		spodio	112
Cuscuta herba. 157		Electuarium Cazi	164
		Electua-	

## I N D E X.

Electuarium de styra-	descriptio	38
ce	167	Expunctionis cruentæ
Electuariū diacalamin-	ac purulentæ cura-	
thes	163	tio
Electuarium ex baccis	Extremarum partiū do-	
lauri	153	lores
Electuarium ex cumi-		F
no	122	Ferri stercoris compo-
Electuarium ex gallia	sitio. 123. siue ex ferri	
moschata	149	stercore cōfectio. 191
Electuariū Exhilarans	Filicula	33.38.211
dictum, eiusq; descri-	Filtrum	148
ptio.38.& usus.39	Fistulæ ani	195.196
Electuarium ex thu-	Fistulæ angulorum ocu-	
re	162	li maiores
Electuaria sub antidoti		G
nomine	153	Gallia moschatæ cōfe-
Eleifer collyrium. 49.51		ctio
Elephantia curatio. 220		Gallia moschatæ
Emplastrū de spica. 139		150
Ἐπιδαμνία	25	Gibbi incipientis cura-
Ἐπιδαμνία	30	tio
Ephialtæ cum comi-	Gingiuarum dolor. 84	218
tiali morbo confor-	Gingiuarum sanguine	
tium	30	humentium cura-
Epithema ad uentris	Grauedo, eiusq; cura-	
profluuium	169	tio
Epithymi decoctum. 33	Gurgulionis laxatio, si-	42
Ἐχάρου	79	ue procidentia. 90
Exhilarantis electuarij	Gutturi inharentiū de-	
		pulsio

## I N D E X.

pulsio	91.92	gida	138
<b>H</b>		Iocinoris inflammatio-	
<b>H</b> alcyonium	35	nis abscessus ue cura	
<i>Αιμόφοροι</i>	105	tio	140
Hæmorrhoides	190	Iozulapon	41
Hellebori usus ad ster-		Iurubæ	40
nutationes	23	Iuleb uiolatum	33.41
Herbæ refrigerantes.	48	<b>K</b>	
<i>Ἰπποκρά</i> hydropis speci-		<b>K</b> anabel	189
es, eiusq; curatio.	145.	Kebekengi	87
Hyrudinum gutturi in-		<b>L</b>	
hærentiū curatio.	91	<b>L</b> ac acidum, lac scif-	
Humeralis uena que.	44	sum	166.187
Hydromel ad colicos		Lactis muliebris usus.	35
dolores ex flatib.	157	Lacca.	139. (44.60.
<i>Ἰψωλ</i> , aqua intercutē.	142	Lachrymis oculorū cu-	
<b>I</b>		randis quæ faciunt.	
<i>Ἰκτιφορ</i>	140	58.59.	
<i>Ἰλιος</i> , a frigido humore,		Laconicum prima bal-	
eiusq; curatio.	149	nei domus.	7.22.71. 86
Incubo ex obstructione		Lactaria herba	87
30. ex sanguine.	31.	<i>Ἰ</i> Lapidis in uesica sectio	
pituitæ copia. eodem.	178.		
Insolatus	7	Lapidi in uesicæ cerui-	
Intestini plenioris & te-		ce hærenti quomodo	
nioris morbi	149	medendum	174
Iocinoris dolor ex in-		Laserpitium	86
temperie, aut humo-		Lateralis dolor	104
re calido.	136.	<i>Δευραία</i>	166
perie, aut materia fri		Lepidion	18
		Leihargo	

## I N D E X.

Lethargo cōferentia, 16	Lumborum rubor siue exulceratio 228
Διυκοφλιγματία 145	M
Lienis dolor ex inflam- matione. 147. à frigi- do humore. 148. ex flatu. eodem.	Μαλίβαβρορ 115
Liēteria à calido humo- re 160	Māna, melaërium 41. 44. 98
Lienteria à cœliaco affe- ctu quid differat 161	Massacumia 53
Lienteria à crudo & fri- gido succo 161	Medicamē acre. 194. 196
Lienteria ex naturaliū facultatū imbecilli- tate. 162	Mel aërium, manna. 41. 44. 98.
Linguae obleso sensui ac deficienti motui quo modo succurrēdum. 94.	Melancholia ex propio- cerebri affectu 35
Linguae pustularum cu- ratio 97	Melancholia naturalis & sanguinea 36
Linguae tumor 96. 97	Melancholiæ initium. 32
Linguae ulcera 88	perfectio 32
Linimenti ad ophthal- miam descriptio. 45	Melancholiæ per con- fortium curatio 32
Linodera herba 137	Melancholiæ tribus spe- cieb. coīa quæ. 36
Lippitudo, οφθαλμία 43	Menstrua quomodo si- stenda. 199. quomo- do cienda. 200. (80.
Lucij piscis fel 65	Mestzeberegi unguētū Mingentibus pus quæ conducant 180. 185
Lūbricis in ano aut uen- tre natis quæ adhibē- da 183	Miua 124
	Mixæ 40
	Molæ uteri curatio. 206
	Μολίβαλε Χυλόε 202
	Muraba 100
	Nardini



## I N D E X.

<b>N</b>		Oculorū uibices, & cruentæ suffusiones. 58
Nardini olei confectio. 131		Oculorum unguis. 56
Narium crustæ ac ulceræ. 79		Oculis incidentia quomodo educenda 51
Nariū polypus, siue farcoma. 80, cancer. 81.		Ocymi maioris succus 78
Nemen 134		Oesipus 201
Neruorum resolutio. 17	ὀϊσηματικα	145
Nigellæ usus 82		in Oesophagum prolapforum remedia. 93
Κοκκαλλη 65		Oleum scorpionū. 177
<b>O</b>		Olfaciendi facultas oblæsa. 82. eiusdem restitutio 83.
Oculi abscessus signa 47	ὀφθαλμια	43
Oculi angulorū fistulæ maiores 76		Oris distortio, siue conuulsio; ob pituitæ infarcionem. 23. ex siccitate 24
Oculi humiditati cōducens puluis. 60		Oris ulcera 88
Oculi inflammationis nondum suppurantis curatio. 48. item iam suppurantis, & ulceris curatio. eodē.		<b>P</b>
Oculi suffusio. 62. siue aqua 64		alleata curatiōes. 197
Oculi album 47		Palpebrarum pili oculos iritantes. 61. 54
Oculorum anguli carunculis pruritu uexatis laborantes. 55		Palpebrarum scabrics
Oculorum ulcera. 47		Palpebrarum tumor. 61
		Παράλυσος. 17. à pituita. eodem. ab extrema causa. 20. ex humoris obfusio-

## I N D E X.

cōfusiōnē influxu. 21.	Phrenitidis incipientis	
Pastilli de balauftijs. 166	indicia. 10	
Pastilli de caparibus. 148.	†διοις 111	
Pastilli ex acidæ spinæ baccis. 137	Pillulæ bechicæ 100	
143. 44.	Pillulæ de raued 145	
Pastilli ex chamælea. 143. 44.	Pillulæ ex styrace 102	
Pastilli ex camphora. 141.	Piper calidum 18	
Pastilli ex cancamo. 139	Pituitam ducens phar-	
Pastilli ex rheobarbaro Seni 138	macum 168	
Pastilli ex rosis 120. 121	†λιουίδς 104	
Pastilli ex spica 132	Pleuritidis nothæ cura-	
Pastilli ex spodio, astrin-	tio 107	
gentes 165	Podagræ, ac reliquorū	
Pastilli ex succino 183	articul. morborū re-	
Pastilli ex thure 134	media 210	
Pastilli tenefmo dicati. 167.	Polychrestō collyrium. 51.	
Pæoniæ radice puluis	†πολυπύριον 33. 38	
ad sternutationes 28	Polypus à cancro nariū	
†σπικνυμοις 108	diuersus 81	
Philonis Tarfei anody-	Polypi curatio 80	
non 155	†περὶ πύριον 56	
Philonium ileosis salu-	Pulmonum inflamma-	
tare 155	tio 108	
Phrenitis quando perfe-	Pulicaris herba 201	
cta puranda 11	Puluis ad ducendū uen-	
	trem 159	
	Puluis Armenij lapidis 165	
	Puluis citrinus. 46. al-	
	b bus.co-	

## I N D E X.

bus: eodem.		Ribes. 6. 160. ueteribus	
Punicorum malorum		incognitum	96
pulis	163	Ricini fruticis oleū.	158
Pupilla	66	S.	
Pupillæ dilatatio, à ficci		S Abot. piscis.	65
tate .66. ab humoris		Saccarum	38
copia. eod. à plaga. 67.		Sacer morbus	25
R		Sal Indicus	38
Radicū decoctarū iuris		Sandalum lignum uete	
preparatio	140.	ribus incognitum	5
Radice, scissuræ	193	Sandalinū cerorum.	141
Ramech cōpositio.	90	Sanguinis à naribus	
Ramicum genera.	208	profluuium	77
Ranarū uiridium usus		Sanguinis sreatu aut uo	
88.		mitu eiecti curatio	
Ranulæ curatio	97	109	
Ranunculus	87	Sanguinē aut pus min-	
Rasis album, cerussa. 222		gentibus, quæ utilia	
Regius morbus. 140. à		183.	
meatum obturatio		Sapa	192
ne	141	Sarcomatis narium cu-	
Renum & uesicæ cal-		ratio	80
culus	175	Saxifragia	176
Renum inflammatio		Scabrics palpebrarum	
179. 181		Scirrhi. 182.	(54.
Renum Scirrhii curatio		Scirrhii renū curatio. 181	
181.		Scirrhii uentriculi cura-	
Resina cedrina	152	tio	130
Rhob Arabibus quid		Scissuræ, scissuræ	193
187		Scorpionū cineres, eo-	
		rumis	

## I N D E X.

rumq; preparatio.	Splenis dolori remedia
176	147
Scorpionum oleum.	Spuma maris
177	55
Σκorpion	Σταφύλι καρπου
Σκόβαλον	8
Sebel	Sternutamenta
54-57	23.40
Sebeste	40
Secretorum liber falso	Sternutationis reme-
Galeno inscriptus.	dium
53	335
Seitaragi	Stomachicorum medi-
18	camentorū que cras-
Sementina	situdo esse debeat
189	124
Seminum decoctū.	Struthia
158	124
Sericæ	Struthium ad sternuta-
40	tiones mouendas.
Singultientibus qua-	23
re tumor incutiatur.	Stupor a frigido succo
135.	21
Singultus a flatu & cru-	de Styrace electuarium
do succo.	167
133. ex sicci-	Succini usus
tate	32
134	de Succino pastilli
Sisimbrij semen	183
134	Suffusio oculorū.
Sopor, ex cerebri pitui-	62.64
ta	Sumen, eiusq; promi-
16	nentia.
Σπασμός	142
24	Supini decubitus noxa
Spinachia herba	40
100.	Surditas unde
177	75
Spirandi difficultas.	Συναγχμη. 97. ex sanguinis
102	copia. eod. a pituitoso
Spiritus compressione	succo
singultui ac sternuta-	98
tioni succurri.	135
135	Syphon
	174
	b 2 Syru-

## I N D E X.

Syrupus acetosus	114	Tussis à caliditate & sic-	
Syrupus acidus	99.	citate. 100. à pituitæ	
Syrupus cotoneorū ma-		copia	101
lorum acetosus	125	ad Tussim, decoctū	40
<b>T</b>		Tussis ex catarrho	41.
Tabis curatio	111	sicca & humida, eod.	
Taguid auis	27	Τυμπαυτης	146
Tamarind. inter medica-		eiusdēq; curatio, eod.	
mina ueteribus inco-		<b>V</b>	
gnita	2	Aricum curatio.	219
Telephion	173	Vena humeralis.	44.
Tenefmus 167. à putri pi-		Ventriculi frigiditati cō-	
tuita	169	ducens electuarium	
Terra sigillata uera offi-		115.	
cinas nostras carere		Ventriculi imbecillitas,	
110. 111.		ob frigidam distem-	
Thapsia Indica	18	periem	120
Theriaca ad dentiū do-		Ventriculi œdema.	132
lorem	86	Ventriculi oris dolor ac	
Thoracis recremētis eij-		inflammatio. 127. ab-	
ciēdis medicamē. 104		scessus	131
Τρόμαλ & μυστιης	87	Ventriculi scirrhi cura-	
Tophi articularū.	214.	tio	130
215.		Ventris profluuij reme-	
Tremor ex frigido suc-		dia	160
co. 21. ex uino. eodē.		Vermiū in ano aut uen-	
Tremoris præsidia eadē,		tre nascentium origo	
quæ stuporis	22	188.	
Tunicula. 54. (es. 4.		Vertigo à sanguinis co-	
Turbit, tithymali speci-		pia. 8. ob stomachi ui-	
		tium 9. ex	

## I N D E X.

tium.9.ex propria ce	pua medicamina.
rebri pituita 10	174.
Vesicæ calculi seu lapi-	Vrinam inuiti reddend-
dis signa 175	tes, quibus curandi.
Vesicæ inflammatio.	187.
179.181	Vrinarij meatus, <i>δυσπύ-</i>
Viola luteæ, cheieri 223	179
Violatum iuleb 33.41	Vine 173
Vilus debilitas 59	Vteri exulceratio, abscef-
Vitis morbi curatio.	sus & cancer 203
219.	Vterimola 206
Vnguentū de sene.194.	Vuæ laxatæ attollendæ
Vnguentū mordax.80	ratio 91
Vnguentū viridis descri-	Vulsella 92
ptio 80	Vulvæ inflammatio 202
Vnguis oculorum 56	Vulvæ procidentia.198.
Volubilis maior 87	199.
<i>ὄσπρυς</i> 179	Vulvæ scissuræ.201. siue
Vrinæ ardor 182	cancer 202.203
Vrinæ difficultas à par-	Vulvæ stragulatio. 204
tium debilitate.170.	X
ab externa causa.171.	Xylocaractæ 113
à corpore urinæ mea-	164.
tum obturante 172	Z
Vrinæ suppressæ preci-	Zulapon 157.

F I N I S.

I N O N U M L I B R U M

**R O D O C V S V E L S I V S**

**Hagiensis.**

**Nostris docti iuuant, placuerunt Barbara quondam,**

**Hoc Arabum dicitur puluerulenta cohors.**

**Inter quos topici Rhazes medicaminis autor,**

**Emicat, excellens utilitate sua.**

**Sed male quod uersus, patria cum gente legatur,**

**Displicet, at post hac gravior extiterit.**

**Quod tibi Vesali merito tribuisse queamus,**

**Laus te certa manet, tu modo perge, sequor.**



PARAPHRASIS IN

NONVM LIBRVM RHAEZAE

AD REGEM ALMANSOREM DE AFFECTUUM SINGULARUM

OPUS

PER

FRANCISCUM DE VINO

Capitulum I

De affectu cordis

De affectu hepatis

De affectu splenis

De affectu pulmonum

De affectu vesiculae felleae

De affectu intestini

De affectu vesicae urinariae

De affectu urethrae

De affectu penis

De affectu vaginae

De affectu uteri

De affectu ovariorum

De affectu testium

De affectu prostatae

De affectu glandulae coxae

De affectu glandulae vesiculae

De affectu glandulae thyroideae

De affectu glandulae parathyroideae

De affectu glandulae pinealis

De affectu glandulae pituitariae

De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae


De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae

De affectu glandulae thymicae







¶ PARAPHRASIS IN  
NONVM LIBRVM RHAZAE ME-  
dici Arabis clariss. ad regem Almanso-  
rem, de affectuum singularum corporis  
partium curatione, Andrea Vve-  
salió Bruxellensi autore.

¶ De capitis dolore.

Caput I.



Quando capitis ardori eius <sup>Ex san-</sup>  
dē tensio & grauitas, oculo- <sup>guine.</sup>  
rumq; ac faciei rubor adfu-  
erint, & reliquū corpus ta-  
ctu calidū, pulsusq; magnus  
præcipue in tēporibus sentiatur, hume-  
ralis uena partis dolentis, aut eius quā  
potissimum dolor exercet, supra cubitū  
secanda est. Deinde aqua rosacea unā  
cū aceto ac oleo rosaceo sumēda, quæ  
A simul

*ut plurimum ad reliqua quartā ac in partem accipimus.* simul tamdiu, donec debitam crassitiem recipiant, agitata, ac niue aut fonte refrigerata, capiti ab alto sunt infundēda. Aeger autem à carniū esu, uino reliquisq; sanguinē augentibus arcebitur, ac lentes cum posca & croco decoctas, aut lenticulam solam aqua incoctam, & olera frigida, elixa uel cruda, & infrigidantes fructus edet. Aluum porro ex myrobalanis citrinis, prunis, \* tamarindis, & saccharo albissimo ducere expedit. Verum si hæc nō suffecerint, altheæ semen aceto infusum, donec iustam viscositatem obtineat, in mortario, pistillo contundito, ac in emplastri formam linteo inductum capiti applicato. Quin etiam ex herbæ pulicaris semine aceto macerato, utiliter ad eundem modum cataplasma capiti induces. Si iam comprehensis notis pulsus ueloces adsint, tactuq; ingens percipiatur calor, nullo tamen rubore facies aut oculi suffundantur, neque ulla notabili tensione laborent, statim inter initia uentrem medicaminibus

*Suerrois in cr medica- rina ueteri us incogni a numerat.*

*ob bilis co- iam.*

*lunil A*

*minibus*

## RHAZAE DE MOR. CVR. 3

minibus bilem flauam purgantibus sol- Nonnulli ne  
uere, deinde cōmemoratis localibus præ gant, super  
sidijs uti, consilium est. Verum præter us compre  
hæc naribus oleum uiolarum, aut cucur- hensa medi  
bitæ domesticæ, aut nymphææ, aut florū camina bil  
falicum infundetur, & horum oleorum ducere.  
singula per se niue refrigerata, ab alto ca  
piti instillabuntur, & ager paulo ante cō  
memorata uictus ratione cibabitur. Odo  
rabit uero camphoram, aquā rosaceam,  
falices, uiolas, & quæ his refrigerandi fa  
cultate respondent. Quod si post horū  
usum morbus plurimū inualuerit, incre  
ueritq̃, sumito opij & camphoræ singu  
lorum pondus duorum granorum hor  
dei, ac oleo iosmini dissoluta auribus &  
naribus modice tepentia immittito.

Porro si graui capitis dolore nihil eo- Ex pituita  
rum, quæ de ruboris suffusione dixi in fa  
cie aut oculis conspiciatur, morbusq̃ in  
uerustatem protractus fuerit, inter initia  
leuioribus purgantibus auxilijs tentatis,  
uenter catapotijs coccijs, à grani (quod  
Græci κόκκου appellant) magnitudine sic

A 2 uocat

4

## PARA. IN NONVM

uocatis, ducendus est. Quorum compositionem ipse in hunc modum instituit. Pulueris picrae drachmae decem, cucurbitae syluestris drachmae tres cum scrupulo, scammonij drachmae duae cum semisse; \*turbit, stichados, singulorum drachmae quinque; rediguntur haec in catapotia, quae decem distinctis uicibus in robustissimis corporibus porriguntur, caeteris autem pro uirium ratione. § Quoniam autem praesens compositio, propositi Noni libri commentatoribus suspecta est, existimantibus interpretem loco duorum scrupulorum cum semisse scammonij, uerisse drachmas duas & semissem, huic loco Galeni compositionem catapotiorum ex aloe, interscribendam putauit. Habet autem ea, Libro primo secundum locos, in hunc modum: Cucurbitae syluestris pars una, aloe & scammonij, singulorum duae. His ego (scribit Galenus) absinthij succi partem unam admisceo, antea uero mastichen quoque Chiam & bdellium indidi. Sic etiam Quintus utebatur. Galenus & Alexander co-

*ostri est  
titihymali  
ecies.*

*Quid si de  
m nune  
o catapo  
a Rhazes  
hibenda  
oluisse?*

*ia tamen  
esues  
icolai.*

## RHAZAE DE MOR. CVR. §

der cotoneorū succo hæc excipiunt, Paulus aqua, Oribasius brassicæ succo. Ac quia huiuscemodi catapotia instar granigeris finguntur, à multis coccia quoque appellata sunt. Dantur Galeno & Paulo numero undecim, Alexandro quindecim. § Post deiectam autem aluum, capiti oleum iosminum & balaninum infundenda, eadem auribus quoque & naribus immittenda sunt. Ad hæc ægro odoris gratia, confectio \*galliæ moschatae appellata, naribus obijcienda, & moschi pauxillum nariū foraminibus inspirandum est. Cæterum si malum multum increscat, molestetque, sumito euphorbij & castorei utriusque sesquiobolum, & in olei iosmini momento solutum, naribus & auribus instillato. In uehemēti capitis dolore, qui cū æstu est, emplastrū infra scriptum, fronti & temporibus utiliter applicabis. Emplastrum ad ingentem capitis feruidum cruciatum: Accipito lactucarū semen, glaucij præparati succum, \*lignū quod sandalum appellamus, & rubrum

\*Pastilli  
sunt, ex or  
ente, ad no.  
aduecti a  
rabie  
algalia.

\*Veteribus  
incognitū.

innotob

A 3 & albū,

6 PARA. IN NONVM  
 & album, nucem Indicam, rofas, singula  
 æquis portionibus, opij momentum: his  
 aceto & rofarum aqua conspersis ac ma-  
 ceratis, informato emplastrum, & fronti  
 superinducito, deinceps illi conduplica-  
 tam fasciam, aceto & rosacea aqua imbu-  
 tam, superponito, eaq; tepefacta rursus  
 aliam, huiuscemodi refrigerati liquori in-  
 tinctam illigato. Linimentum discuti-  
 ens & digerens, ad dolorem qui cum fri-  
 gore est, efficax. Castorei, euphorbij, pi-  
 peris, sinapis, styracis, rutæ, marubij, sin-  
 gulorum pares modi: hæc exiccata, & in  
 puluerem subacta, & per cribrum secreta  
 commisceto, atq; illis uino ueteri consper-  
 sis informato pastillos ad solem exiccand-  
 os: ac quando usus postulauerit, uno il-  
 lorum uino ueteri, aut oleo castino cha-  
 mæmelino uel detrito, frontē & tempora  
 idētidē illinito. Vel unū in minori liquo-  
 ris portione dissolue, ac instar emplastri  
 fronti subinde inducito. Hoc enim lini-  
 mentū, seu emplastrū, omni uetusto capi-  
 tis dolori est q̄ accommodatissimū, nō mo-  
 do fronti

## RHAZAE DE MOR. CVR. 7

do fronti ac temporibus admotum, sed in aurem quoque inditum, praesertim si in aliquo iam comprehensorum oleorum dissolutus pastillus fuerit. Aegrotanti uero uinum uetus, circa mali declinationem, non tamen affatim, praebeto. Caeterum quando ingens capitis dolor, septimanam totam perdurans, hominem affligit, in laconicum primam balnei domum, aut balnea aquarum medicamentosarum, exicandi uis praedictarum, aeger deducendus est, ac capiti infundenda aqua, in qua chamamelum, & sampuchus, & stichas Arabica seu Gallica, & serpillum, si mul omnia, aut singula per se ebullierint.

Hec ad dolorem ex facie

Porro si caput indies ante cibum indoluerit, ac post ingestos cibos conualuerit, laboranti ante tempus quo corripere consuevit, succurrendum est, exhibendo panis offulas, succo mali punici, aut immature uuae, aut alijs uirtute in refrigerando & astringendo his paribus, immerfas.

Ob uentriculi uitium.

Si dolor capitis ob diutinam in sole moram, concitatus fuerit, huic facile

Ex insolatione

A 4 aceto



## 8 PARA. IN NONVM

aceto & rosaceo bene refrigeratis, subuenire poteris. At si dolor his non remittitur, alijs intensius refrigerantibus, ut polygonij ac plātaginis succis aceto dilutis, propellendus est. Quod si præterea ingens capitis dolor perseverat, ac intenditur, neque ullis præsijs cedit, sitque metus, egrum visu priuatum iri, ob fluxum humorum in oculos: arteriæ, quæ per tempora repunt, opportune ut sanguinis quantum satis est fundant, inciduntur, ac manuali arte quicquid illarum denudatum est, laqueis interceptum aufertur. Verum postremum illud præter præsentis libri institutum, hoc in loco tractatur.

in fine. 13.  
Methodi, et  
apud Paulū  
i. 6. ca. 4.  
75.

De uertigine, quam Græci σκόρτωμα uocant.  
Caput II.

et sanguinis  
opia.

Cum alicui ea quæ foris sunt, in gyrum circumagi uidentur, & oculi te nebris obruuntur, & cōcidere æger uult; quumque eodem tempore, quo scilicet malo ægrotus tenetur, facies & oculi rubore suffusi sunt, ac uenæ post aures reptantes  
fangui-

## RHAZAE DE MOR. CVR. 9

sanguine turgidæ cernuntur, \* eas tum in  
 cidere, cucurbitulasq; collo et tibijs agglu- \* Galenus  
 tinare expedit. Cæterum si hæ uenæ in- & Paulus  
 conspicuæ lateant, faciesq; rubore suffun- arterias in  
 datur, ex axillari sanguis minuendus, & tersecant.  
 cucurbitulæ tibijs affigendæ sunt. In  
 utrisq; autem his uertiginis speciebus iã  
 commemoratis, ad repellendum humo-  
 rum affluxum, capiti rosaceum cum ace-  
 to est infundendum. Ventrem uero my- Variat hic  
 robalanorum citrinarum decocto, supe- Arculanix  
 rius ad capitis dolorem descripto, deijce emplar ab  
 re utile est. Cibos quidem calidos, & san- alijs.  
 guinis copiam augentes, ægrotus auer-  
 sabitur, ac aridis & refrigerantibus enu-  
 trietur. Porro quum neque faciei ocu- Ob stoma-  
 lorumq; rubor, neq; febris, uertiginosis chi uertum.  
 adfunt, perpendendū est, an ne oris uen-  
 triculi euersio, an nausea hominem infe-  
 stet. Quæ si ægrotanti affuerint, primum  
 uomitum leniter iritato, deinde quantita-  
 tem coccijs catapotijs præcedenti Capite  
 inscriptam præbeto, & à frigidioribus æ-  
 pituitam coaceruantibus cibis ægrotan-  
 tibus

A 5 tem

*Ex propria cerebri pituita.* tem arceto. Verum si neq; oris uentriculi subuersio, neq; cibi fastidium adsint, nullaq; calorís nota appareant, aluum subinde catapotijs coccijs soluito. Cibos ad hæc frigidos omnino ægrum auerfari iubeto: & gargarizationem, quæ eliciendæ pituitæ sit, præparato. Naribus item portionem aliquam inscribendorum ad atonitum morbum, ut struthij puluerẽ, inspirato, quo caput & calefacias, & sternutationes irites. Nec inutiliter quoque ad eundum usum, caput excalefacientibus unctionibus inunges.

¶ De phrenitide. Cap. III.

*Paulus & Alex. acuta habent.*

**Q**Vando febris \* continens homotomos ægrum inuadit, unà cum uehementi capitis & oculorum grauitate: præterea si multus rubor faciei & oculorum, & dolor distendens capitis, & horror quidam lucis, pulsusq; solito uelocior ac frequentior adfuerint, phrenitidis incipientis certissima indicia adesse iudicabuntur. Si autem ad hæc lingua aspera & nigra, uel sub-

## RHAAE DE MOR. CVR. 11

uel subflaua fiat, perturbeturq; adeo intellectus, ut æger mente alienetur & deliret, multisq; uigilijs excrucietur, phrenitis perfecta putabitur. Aegro itaq; priusq; enarrata illa symptomata omnia concurrant, uenæ sectione, ac uentris solutione, ex \* fructuum uidelicet mirobalanorum, tamarindorum & prunorum succo, succurrendum est. Alimentum autem eius sit aqua cum hordeo elixa, eaq; semel aut bis in die propinata, pro consuetudine quam dum sanus esset habuit. Capiti quidem acetum cū rosaceo ab alto, ad compescendum humorum impetum, infundatur. Cæterum si ægotantem crebræ uigiliæ urgent, sumito uiolarum exiccatarum, corticum papaueris albi, hordei corticibus liberi, seminis lactucarum, radicum mandragoræ, singulorum tantum quantum manu una apprehendere potes. hæc simul in ænea olla, quam aqua impleueris, tantisper dum aqua rubescat decoquito. Deinde aquam iam tepidam capiti

*Vt plurimū  
ex sanguine  
in tenui me-  
ninge.*

*\*Medicamē  
ad uentris so-  
lutionem, in  
dolore capi-  
tis ex san-  
guine, intelli-  
git.*

## 12 P A R A. I N N O N V M

capiti instillato: & sit caput ad peluim, in quam aqua recipiatur, inclinatum. Item deinceps huiuscemodi decoctū, in aëneo uase ad ignem modice recalefactū, capiti superfundito. Hoc sanè singulis diebus crebro factum, magnum subsidium refrigerando, ac affluentem humorem reprimendo, ægro adfert. Caput præterea oleo uiolaceo muliebris lacte contemperato, irrigandum: quo etiam lana mollis imbuta, capiti applicanda est.

Ratio mittendi sanguinis.

Porro si ægri uires inter morbi initia ualidæ constantesq; esse conspiciantur, sanguis protinus ex humerali uena supra cubitum mitti debet, & is copiosior. At si manum desipiens non porrigat, metusq; sit secundū uacuationem, sanguinis profluuij, dum manū æger subinde ob mentis turbationem iactitet, recta in fronte uena diuisa, una uice quod satis est aufereamus. Si uero uires languidæ dissolutæq; sint, aliam curandi rationem, qua morbū depellamus, aggrediemur. Sic q; remitte malo, à uenæ sectione temperabimus.

De apo-

**S**I aliquis ueluti sopore oppressus decu-  
 bit, & sine somno naturali stertit, cūq;  
 pungitur non sentit, certum est eum apo-  
 plexia teneri. Est sanè huius morbi mag-  
 nitude æstimanda, secundum quod forti-  
 ter aut debiliter stertit & respirat æger.  
 Quum itaq; illi ob summam spirandi dif-  
 ficultatem, spuma ab ore prorumpit, nul-  
 lis remedijs ipsi subueniri potest. Verum  
 si leniter stertit, & liberius æger respirat,  
 morbus lenior mitiorq; existit. Præsens  
 quidem affectus aut mox oppressum suf-  
 focationis modo iugulat perimitq;, aut  
 noxiō humore è cerebro in nervos dela-  
 pso, in illorū resolutionem desinit. Quo  
 circa his symptomatibus ægrotantem af-  
 fligentibus, considerandum est, an ægri  
 facies multū aut cruenta, aut liuida, aut  
 subuiridis fieri incipiat: uti euenire solet,  
 sanguine in membro aliquo uinculis, aut  
 quauis constrictione retento. Siquidem  
 tunc sanguinem ilico ex duabus uenis iu-  
 gularibus, aut duabus humeralibus inci-  
 lis, minuere opportunum est. Porro

Rara fit, se-  
 cundum. 10.  
 Aphor. 6.  
 parte, creti  
 caexpulsio.  
 A sanguinis  
 copia.

## 14 PARA. IN NONVM

*A pituitoso  
humore.*

*Acris infu-  
sio, ac sar-  
guinem ali-  
quando edu-  
cens.*

Porro si ad hunc modum res se non habeat, sed dum æger aërem inspirat, auditur in thoracis & asperæ arteriæ capacitate aëris sonitus & murmur, siq; his pituita indicantia signa adsunt, hic clyster utiliter ei infundetur. Accipit aut, cucurbitæ syluestris, cyclaminis, cētaurij minoris, alterius cyclaminis speciei, hellebori albi, singulorū tm̄ quantū manu una cōprehendere potes: omnia simul tribus libris aquæ, ad duarum consumptionem decoquuntur, deinde per colum trasfunduntur: atq; ex huius decocti semilibra, clyster in anum inditur. Qui si cito ab ano elabatur, rursus repetitur, ac donec humorum copia unā cum clystere deiciatur, infunditur. Naribus adhæc struthium & ueratrum album detritum, leni spiritu crebrius inspiretur. Est præterea ore per uim aperto conandum, ut anacardiam confectionem cum mulsa, per os ad uentriculum subinde ægrum deglutire procuremus: atq; eius negotij singulis diebus sollicitudo habenda est. Præ-

sentis

## RHAZAE DE MOR. CVR. 15

sentis autem medicamenti pondus erit, sesquidrachma potui oblata. Eius uero descriptio, Capite de neruorū resolutiōe habetur. Frixorium quoque ferreum candens, capiti identidem tam prope admo- uendum, ut capilli etiam aegroti aduri uideantur. Cæterum si his rationibus affectus non discutitur, in medicando maiorem operam nauabimus. Et enim caput rademus, & sinapi & castoreo in aceto acerrimo detritis oblinemus. In priori quidem propositi affectus specie, post de tractum sanguinem fortiter brachia intercipere iuuat, iniiciendo scilicet uincula brachiorum parti, qua cum scoptulis illis articulatio est, similiter quoque tibiarum partes graciliores uinciri ex usu est. Quinetiam ad reprimendum sanguinis affluxum, qui huius affectus autor esse consuevit, caput rosaceo oleo, & aceto ex uino preparato, perfundere præstat. Si itaque apoplexia detentus, corpore plethorio conspiciatur, morbusq; non adeo uehemens existat, primum

*Aliqui igni-  
ta galea ad  
id uiuntur.*



primum ad sanguinis reuulsionem pedis uenam, deinde deriuandi gratia, eam qua in narium extremo apparet, incidemus.

¶ De sopore. Cap. V.

Ex cerebri  
pituita.

**S**I quis cum profunda animi in somnū delatione iacet, & tamen si urgeatur sentit & mouetur, uerum oculos semper oclusos habet, at quos si alius illi in clamentur, aperit, atq; ilico sopore oppressus ocludit, is sopore laborat. Quem affectū clysteribus acris, supra Capite de apoplexia descriptis, curare profuerit. Ori quoq; laborantis mulsā infundenda, quā ut per fauces dimittat, sollicitare oportet. siquidem ea agro alimenti loco præbentur. Caput ad hæc tribus primis diebus, aceto cum rosaceo irrigabitur. Verum post tertium diem sternutationes, struthij & ueratri albi puluere inspirato iritabimus. Caput quoq; non inutiliter rademus, & sinapi cum aceto & castoreo perfricabimus.

Hæc lethargo omnia cōferunt, & ad hæc Graeci uenam fecerunt.

De con-

## RHAZAE DE MOR. CVR. 17

De congelatis, quibus semper oculi inconni-  
uantes manent. Cap. VI.

**C**ongelatum ac rigidum merito ali-  
quem iudicabimus, quum quasi in  
somnia solutus decumbit, nec ab ahsi-  
dētibus incitatus mouetur, nec etiā pun-  
ctus sentit: & licet oculi patent, cilia ta-  
men eius immota ac rigida permanent.  
Subueniendum quidem huic malo me-  
dicamentis sopore dicatis. At præter il-  
la, oleum iofminum capiti infundatur,  
in cuius singulis libris, uncia euphorbii  
adiecta sit. Præterea caput ipsum ex ca-  
storeo & euphorbio in oleo iofmini læ-  
uigatis, illinatur.

Ob refrigeratiū corpo-  
ris habitū.

Cōferūt qui  
dē æque ca-  
lida, sed nō  
æque sicca.

De neruorum resolutione, quæ ῥελευσις  
dicitur. Cap. VII.

**Q**uam aliquis ad motum omnino  
impotens est, ita ut unum aut plu-  
res artus commouere minime queat: siq̄  
unā ipsorum sensus abolitus fuerit, illū  
resolutionē unius pluriumue artuum ten-  
tari pronunciamus. Huius quidem ma-  
li curationem, catapotiorum fœtidorum

A pituita, a  
nimalis fā-  
cultatis du-  
ctus occu-  
pante.

B à me

## 18 PARA. IN NONVM

à me compositorum oblatione, auspica-  
bimur. Ea accipiūt, pulueris hierę picrę  
drachmas decem, syluestris cucurbitę  
carnis interioris drachmas quinque, eu-  
phorbij drachmas duas cum semisse, ca-  
storei, piperis, succi Cyrenaici, sagape-  
ni, opopanacis, \* thapsię Indicę, sina-  
pis, singulorum drachmam unam : cen-  
taurij minoris, succi cucumeris agrestis,  
utriusq; drachmas quinq;. gummi rutaę  
succo diluuntur, quibus alia excepta in  
catapotia digeruntur, † quę decem dosi-  
bus exhibenda sunt. Quorum una por-  
tione deuorata, \* triduum à medicami-  
num usu æger conquiescet, ac eo tempo-  
re cicerum decocto, & oleo, et sinapi enu-  
trietur. Postea alteram dosim assumat,  
huic ubi tertia successerit, aliquātulo tē-  
poris interuallo ad uires recolligendas,  
à medicamentorum usu æger rursus ab-  
stineat. Cibi conueniunt speciebus cali-  
dis, & incidentibus feminibus cōditi ac  
preparati : cuius notę est piper, & huic  
caliditate paria, & caro minutim cōcisa,  
& in

\* Scitaragi  
Mar. inter-  
pret. lepi-  
dion.

† Fortasse  
legēdū, quo-  
rum decem  
una dosi ex-  
hibēda sūt.

\* Aliq tres  
hebdoma-  
das sribi  
uolunt.

## RHAZAE DE MOR. CVR. 19

& in frixorio frixa: uel alioqui alij ad cō-  
 coctionem expediti, & non recrementi-  
 tij. Potus autem mulsa sit. Iam membra  
 quoq; resoluta, oleo costino utiliter inun-  
 guntur, quod recipit, costi unciā unam,  
 piperis, pyrethri, euphorbij, singulorum  
 tertiam unius unciæ partem, castorei se-  
 munciam, omnia in semilibra † olei uio-  
 læ luteæ, quæ antiquis parietibus incre-  
 scit, aut olei narcissi læuigatur: atque ita  
 membris deficientibus inuncta, multum  
 iuuant. Porrò diebus singulis, quibus à  
 catapotiorum supra descriptorum usu  
 æger liber est, exhibendæ sunt drachmæ  
 duæ subsequētis confectionis: quam ab  
 anacardi cuiusdã arboris Indicæ fructu,  
 anacardinã appellant. Zingiberis, pyre-  
 thri, nigellæ, piperis nigri, piperis longi,  
 seminis petroselinæ Macedonici, singulo-  
 rum drachmæ uiginti: myrrhæ, rutæ sic-  
 cæ, liquoris Cyrenaici, aristolochiæ, bac-  
 carum lauri, castorei, thapsiæ Indicæ, si-  
 napis, gentianæ, singulorum, drachmæ  
 quinq; anacardorum succi, qui ob simi-

† Al. cher-  
 ua. i. ricini  
 fruticis.

B 2 lem

20 PARA. IN NONVM

lem mellis consistentiam, mel anacardinum dicitur, drachmas quinque, irrorentur omnia oleo nucum, & melle decocto ac despumato excipiantur. Medicamentum hoc nervorum resolutioni, apoplexiae, oris contorsioni, tremori, alphis tum albis, tum nigris, scorpionum ictibus, convulsioni, quae humiditati fertur accepta; & in summa, omnibus frigidis affectibus, quammaxime accommodum censeatur. Siquidem hoc medicamentum devoratum sudores elicit, febrimque sua mirifica calefaciendi potentia aegro conciliat. Verum si forte propinatum, aegrotantem sanitati non restituerit, ab omni medicamine ipsum decem dies abstinere, ex usu erit; interim tamen victus ratione (quae cum studio ad-

*Ab externa causa.*

hiberi debet) exacte instituta. Deinde rursus viribus collectis, ad mali curationem praescripta ratione properabimus.

§ Caeterum si resolutio ex plaga, aut casu ab alto, aut incidente quopiam corpore, subito facta sit, omni curationis spe adempta, affectus (utpote nervo, aut musculo,

sculo, aut tendone per trāsuerfum disru-  
pto) incurabilis permanebit. Si uero nō  
subito malum ex his causis excitatū sit,  
sed processu temporis paulatim & pede-  
tentim augeatur, tum loco læso empla-  
strum hoc adhibeatur, quod recipit, fari-  
nam foenogræci, glandem unguentariā,  
nucleos ceraforū syluestriū, & dome-  
sticorum, semē ricini fruticis, bdellium,  
ammoniacū, adipem aratis, ceram, oleū  
lilij, hæc simul contusa & cōmista, in for-  
mam emplastrī, quod læsę parti induci-  
tur, rediguntur.

*Ex humo-  
ris ob con-  
fusione in-  
fluxu.*

*Hoc in prin-  
cipio inuti-  
le, sed ces-  
sante fluxu  
præstātissi-  
mum est.*

De stupore ac tremore. Cap. VIII.

**S**I quis aliquod suorum membrorum  
ita affectum sentit, ut sæpe pedes no-  
stri afficiuntur, dum obstupescunt, mem-  
brū hoc stupore implicitū affirmamus.  
Quoniā aut dispositio hæc si lōgius pro-  
rogatur, in resolutionē ob causarū uici-  
nitatē trāsit, eius curā haud differemus.  
Quocirca quoque huius mali remedia nō-  
nullam cum neruorum resolutione dica-  
tis præidijs affinitatem fortiuntur. Nam

*Stupor, à  
frigido suc-  
co.*

B 3 si

si recens affectus fuerit, ac præter frigidã  
 intemperiem duntaxat modicum humo-  
 rem pituitosum admixtũ habuerit, sola  
 ad huiuscemodi affectum idonea uictus  
 ratioe, oleiq; costini inunctione, illi sub-  
 ueniri poterit. Verum si inueterauerit,  
 maiorq; morbus ob pituitosi succi copiã  
 extiterit, præter hæc æger catapotijs foeti-  
 dis purgabitur, eiusq; intemperies ana-  
 cardini confectionis usu, & ratione ui-  
 ctus calidior & sicciore, ad temperiem  
 reducetur. Cæterum tremori eisdem  
 præsijs, quibus stupori succurris, sub-  
 ueniendum est. At si ex liberaliori uini  
 usu obortus tremor sit, æger sibi à uino  
 temperabit. Similiter si ex aquæ è niue  
 solute potu, in hunc affectum æger inci-  
 derit, ab ea quoq; abstinebit, ac in laconi-  
 cum primam balnei domum ualde cale-  
 factã, quousq; sudor copiosus erumpat,  
 properabit, aut balneis aquarum natura-  
 lium opportune utetur, atq; crebro in so-  
 le utiliter apricabitur.

*Tremor ab  
 eadẽ causa,  
 sed minori.*

*De oris distortionẽ. Cap. IX.*

*Oris*

**O**Ris conuulsione aliquē affligi cen-  
semus, si quando illi os ad alterum  
latus contorquetur, & oculum ad quem  
illud conuellitur, occludere nequit: pre-  
terea si expirare iussus, flatus ab altera tā-  
tum parte prorūpat, effleturq;. Curatio-  
nem uero eius, alui deiectione per cata-  
potiorum foetidorum propinationē ag-  
grediemur, & cibum aegrotanti, & potū  
incidētem, ac calefaciētem, ut Capite de  
neruorum resolutione persecuti sumus,  
instituemus. Item indies mane priusquā  
cibū aeger capiat, ex sinapi & syrupo ace-  
toso gargarizationē porrigemus. Et in  
tenebrosam domū deducto egro, iubebi-  
mus, ut nucem myristicam parte ea qua  
affectus est, ore retineat. Naribus etiam  
ad iritandas sternutationes, struthiū de-  
tritum inspirabimus. Præterea oleo co-  
stino aegri ceruicis uertebras, & faciem,  
& frontem perungemus. Adhæc singu-  
lis diebus anacardini cōfectionis sesqui-  
drachmam, non inutiliter eger assumet.  
Quod si his remedijs affectus non cedit,

Ob pituitæ  
infarctionē.

Vtuntur ho-  
die ad mo-  
uēdas ster-  
nutationes  
helleboro  
confuso.  
i. dicitur  
cōditiuum  
legere est.

mandi

B 4 uentris



uentris solutionem, ac plane eandē cum iam comprehensa curationem repetemus. De ea porro oris cōuulsione, quæ nō subito, sed paulatim oritur, haud quam mihi sermo est: siquidem huiusmodi, non nisi in perniciofa phrenitide, alijsq; morbis acutis, morte iam imminēte, inuadit egrotantem, atq; tunc ea conuulsio ex siccitate originem ducit.

De conuulsione, quæm σπασμὸν Græci uocant. Cap. X.

**C**Um cuiusdam particula aliqua contracta ad suam cōuellitur originē, siue quum plures ex instrumentarijs partibus ita afficiuntur, conuulsas eas esse iudicamus. Conuulsio autē omnis, aut statim, aut pedetentim apprehendit. Cōuulsioni quidē subito exoriēti, eadem curandi ratio, quam resolutioni ex usu esse precepimus, adaptāda est. Priuatim tamen in hac, partim pluribus manuum frictionibus, partim frequētiori olei castani inunctione utimur. Quæ uero non repente inuadit, sed lente aridam aestuantemq; febrim,

Exrepletione.

Exuacuitate.

febrim, aut largas deiectiones, aut copiosum uomitum, aut ingēs sanguinis profluuium, aliamue magnam inanitionem aut ariditatē, subsequitur, mala est, atq; ad curandū contumax conuulsio. Nihilominus qualiscunq; sit morbus, eius tamen curā aggrediemur, ac agro hordei decoctum, & iuscula pinguia, emollientiaq; & frumētaceas sorbitūnculas administrabimus. Ac deinceps in aquæ reptētis foliū, ægrotantem deducemus, & egelido oleo uiolaceo, & oleo ex semine cucurbite domesticæ, neruorum maxime exortus cōuulsioe implicitos, inungemus. Præterea ut folio diūtius immoretur, oleoq; uiolaceo illinatur, hortabimur, & uinum modicū perquam aquosum potui porrigemus, cibisq; humidioribus ægrotantem enutriemus.

De morbo comitali, ἐπιληψία dicto. Cap. XI.

**M**Orbo sacro comitaliue quempiā Ob obstructionē, impedimentū, concidit, ac quasi concussus diētē spiritus animæ conuellitur, sed ita ut principis animæ fa-

cul

B 5 cultatis

*Per consor-  
tium alicuius  
particulæ.*

*\* His alia  
pro humo-  
rum varia-  
te, ab auto-  
ribus misc-  
tur.*

cultatis noxa concomitetur. Quod si cū  
his indicijs oris spuma, peculiaris admo-  
dum huius mali nota, apparet, aut urina  
& stercus præter uoluntatem excernun-  
tur, aut genitura profluit, dispositio dete-  
rior uehementiorq; existimatur. Porro si  
eger priusquã malo corripatur, præsen-  
tit quasi auram seu spiritum ex particula  
quapiã sursum ferri, ac caput petere, un-  
de postea syncopi corripitur & concidit;  
necessum erit, simulatq; aurã hanc sub-  
nasci sentiat, antequã in terrã collapsus  
cõuellatur, ut eam partem à qua aura ef-  
fertur, superius fortiter uinculis intercia-  
piat ac constringat, siquidem eo pacto  
instantem accessionem propellet, aut fal-  
tem mitiorem ac minus uehementẽ effi-  
ciet. Intermedio quidẽ tẽpore, quo acces-  
sionib. æger uacat, purgatiõẽ ex catapo-  
tiss \* cõccis sollicitãdus est: & pars cõta-  
gionẽ impartiens, sinapi, pipere, euphor-  
bio in melle anacardino simul læuigatis  
inungenda, tantisper dum uesiculæ obo-  
riantur, & tenui sanie plenæ crepent, ac  
liquor

liquor in illis collectus profluat. Nec cicatrice obducantur, donec quicquid in illis coaceruatū sit, promaneat, nam hæc huius affectus certissima curatio est. Postremo etiā cucurbitulæ cum modica cutis incisione, parti consortij lege affectū inferenti, affigantur. Si autem æger priusquā morbus eum inuadat, nauisæ, uel uentriculi erosione, palpitationemq; patiatur, & dein accessio subsequatur, sepe uomitum porrectis his, quæ uomitibus ciendis sunt idonea, iritabimus: quo facto, ut medicamen amarū in potu frequenter sumat, hortabimur. Ventriculo quoq; emplastrum ex spica, rosis rubris, mastiche & thuris cortice, uino odorato subactis, imponendum. Vniuersa autem uictus ratio, ægro talis præscribi debet, quæ sit quàmminime excrementitia, qualis est tum caro in frixorio frixa, & \* profundioribus uasis incocta: tum auis palatū dentatū habens, Arabibus \* taguid appellata, tum aliarum auium in collibus degentium, & hædorū caro. Porro si

Ex uentricu  
liuitio.

Postimus  
aliquādo o-  
leum masti-  
chis, aut co-  
toneorū ad-  
dere.

\* Manar. ui-  
tratis habet.

\* Pli. li. 10.

c. 44. Dio-

medes hu-

ius generis

auis uoca-

re uidetur.

**Ex cerebri** ægro sensuum obfuscatio, motricisq; fa-  
**pituita.** cultatis imbecillitas ac torpor superuene-  
 rint, nullaq; cōmemorata in alijs huius  
 affectus speciebus indicia adfuerint, la-  
 borāti catapotia coccia subinde sunt of-  
 ferenda. Et cibos quoq; incidētes ac exte-  
 nuātes, è quorū numero antè dicti sunt,  
 præbere competit. Gargarizatio ad hæc,  
 ut & sternutationes antea comprahēsis  
 iritata, (eliciendæ pituitæ gratia,) haud  
 parum conferunt. Proinde naribus pæo-  
 niæ radicis puluis, atomorū instar contu-  
**Ex sangui-** sus, utiliter inspirabitur. Caterū si eger  
**nis copia.** comitiali morbo affectus, faciem & ocu-  
 los rubētes, uenasq; tumidas habeat, fan-  
 guinis ex uena malleolū interiorē per-  
 reptante extractio, strenue ei ob remissio-  
 nem auxiliatur. Quinetiā ex furis, appo-  
 sitis cucurbitulis, sanguis non inutiliter  
 uacuabitur, & caput opportune oleo ro-  
 faceo cū aceto irrigabit. A uino uero, ce-  
**¶ Alias ca-** pis, allio, sinapi, porris, apio, fabis, ꝑ can-  
**rabit, hoc** nabi, & breuiter ab his quæ caput uapo-  
**st, brassica** rem emittendo grauant ac implent, eger  
**expitata.** arcebitur.

arcebitur. Electuarium ad omnem morbum comitialē efficac. Pyrethri, sefelis, stichados, singulorū drachmæ decem, agarici drachmæ quinq; cardamomi recentis & acuti acriorisq; \* liquoris Cyrenaici præstantissimi, aristolochiæ rotundæ, singulorū sesquidrachma, exprimito ex scilla succum, ac eum æquali mellis portione cōmixtum decoquito: illoq; simplicibus medicamentis exceptis, formato electuariū. Huius, nucis auellanae instar, cum liquore quopiam medicamentorū uim ad caput dirigente, indies æger mane, & tribus horis post frugalē cœnam, assumet, & à crassioribus cibis interim abstinebit. Electuarium hoc, seu antidotus, omnib; morbi comitalis differētijs probe auxiliatur: si modo unam à Galeno descriptā excipias, quæ scilicet ex sanguine ducit originē, cuius & nos quoq; iam supra meminimus. Huic sanē affectui sanguinis primū ex uena interiorum maleolū perreptante, deinde ex axillari aut humerali missiōnem, præsentaneum

\*Hodie officine assano fetidā uocant.

neum remediū adferre saepe uidimus. Vt  
ctus autem ratio hoc malo implicito, in-  
stituenda est ex his, quæ sanguinem mi-  
nuunt atq; refrigerant. Quocirca carne,  
uino, reliquisq; dulcibus abstinendum,  
& acidorum fructuū succus ad debitam  
crassitudinem decoctus, loco potus por-  
rigendus est. Item capiti quoq; ea quæ re-  
frigerandi uim possident, quæq; sangui-  
nis impetum reprimunt, non inutiliter  
superaccōmodabuntur.

De incubone, qui ἐπιάλτης Græce  
dicitur. Cap. XII.

Ab organo-  
rum faculta-  
tis animalis  
modica ob-  
structione.

**C**VM quis in somno ponderosum  
quiddam sibi incumbere imagina-  
tur, & uox eius supprimitur, aut incerta  
indiscretaq; editur, incubone correptus  
dicitur. Cui malo mox per initia succur-  
rendū est. Nam si diutius se prorogaue-  
rit, crebroq; eos per noctem oppresserit,  
grauius aliquod nunciatur malū, ut apo-  
plexia, infania, & morbus comitalis.  
Quæ enim comitiales interdiu, eadem  
epihaltici dormientes noctu patiuntur.

Proinde

Proinde si sanguineo colore, uenisq; tur- Ex sanguine.  
gidis æger fuerit, ex malleoli uena san-  
guinem detrahemus, ac furæ cucurbitu-  
las cum cutis incisiōe ad sanguinis reul-  
sionem agglutinabimus. Præterea labo-  
rantem à uini potu, & dulcium ciborum  
esu (in primis ab hiis quæ copiosum fan-  
guinem gignūt) dehortari commodum  
erit. Si notæ cōtrariæ pituitam indican- A pituita  
copia.  
tes adfuerint, aluū catapotijs coccijs du-  
cere, & agro uictus rationem extenuan-  
tem, ac incidētē instituere, utile erit. Exer-  
citia quoq; & inferiorū partium frictio-  
nes, haud paruum momentum ad huius  
morbi depulsionem adferunt.

De melancholia. Cap. XIII.

**S**I alienæ cogitationes ac æstimatio-  
nes absq; euidenti causa, aliquē occu-  
pauerint, & inter cætera animi pathema-  
ta, metus, mœstitia, odiumq; hominum  
præualuerint, illi melācholiæ inīitū ad-  
se asserimus. Cæterū quādo malum usq;  
adeò inualuerit, ut quæ animo concipit,  
proloquatur, & sermonē & operationes  
incon-



inconstātes inturbatosq; ædat, melan-  
 cholica quæ apparent signa, eam perfe-  
 ctam esse fatentur. Quæ itaq; huiuscemo-  
 di uanæ imaginationes, & metus, animi  
 q; angustia detinent, priusquā increse-  
 re augetereq; cœperint, illi omnino sub-  
 ueniendū est: quoniā si hæc symptoma-  
 ta excreuerint, difficilem, ac plane contu-  
 macem curationem admittent. Quapro-  
 pter si melācholiæ comites sint uētris do-  
 lor & inflatio, ineptus ac uitiatus corpo-  
 ris color, praua concoctio, uomitus ru-  
 ctusq; acidi, flatuosorum spirituū copia,  
 & sputorum multitudo, curationē à ue-  
 næ axillaris, aut eius quæ inter minimū  
 digitum & anularem sinistrae manus re-  
 pit incisione auspicabimur. Et si sanguis  
 effluens, ater crassusq; cernitur, multum  
 sanguinis: sin autem tenuis & boni colo-  
 ris conspicitur, minimū extrahendū erit.  
 Nisi forte crassiolem mox fluxurū suspi-  
 cemur. Laborātem uero, his quæ aluum  
 leniunt & humectant, ex quorū genere  
 iuscula ex carne hœdorum, & iuniorum  
 ueruecum

*Cura eius  
 que per cō  
 sortium fit.*

*Græci po-  
 tius uenas  
 incubito se-  
 cant.*

ueruecum confecta sunt, nutriri compe-  
 tit. In balneū quoq; dulcis aquæ (in quo  
 tamen non diu desidebit) deducēdus æ-  
 ger erit. Post hæc, subsequenti decocto  
 epithymi à me conscripto, prospere ute-  
 ris. Habet autem se in hunc modū. My-  
 robalanorum Indicarū drachmæ decē,  
 filiculæ (quam πολυπόδιον Græci uocāt)  
 drachmæ quinque, senæ drachmæ † nouē, † Alibi  
 turbīt drachmæ quatuor, stichados drach- octo.  
 mæ decem, uuarum passarum ab acinīs  
 mundatarū tantundē, epithymi Creten-  
 sis drachmæ decem, omnia excepto epi-  
 thymo in tribus libris aquæ, ad sesquili-  
 bræ consumptionē, decoquito, his actis,  
 adijcito epithymū, ac statim ab igne de-  
 coctum amoueto, & tantisper dum refri-  
 geretur in eo epithymum madere finito,  
 & illis simul refrigeratis, manibusq; con-  
 tritis, ius percolato. Deinde sumito aga-  
 rici scrupulos duos, aloës drachmā unā,  
 sacchari sedrachmā, hellebori nigri ses-  
 quiobolum, excipito hæc melle, aut \* iu- \* Constat  
 leb uiolato, informatoq; catapotia, ac tri uiolis, aqua,  
 bus et saccharo.

201111b

C

bus

bus horis ante decocti propinationem,  
 pro uirium robore porrigito, & deinde  
 præscriptum decoctum ægrotanti exhi-  
 beto. Postea \* triduum totū eger ad uires  
 \* Aliqui he-  
 bdomadas  
 tres scribi  
 uolunt.  
 recolligendas conquiescet. Interpositis  
 quidem diebus, quibus à medicaminum  
 usu abstinebit, paulo antè dictis aluū le-  
 nientibus cibus enutriendus est; & potui  
 uinum tenue & lucidū, beneq; odorum  
 præbendū. Dehinc rursus æger comme-  
 morata ratione euacuāndus est. Quinetiā  
 tertio quoq; & quarto interpositis inter-  
 uallis, per inferiora huiuscemodi purga-  
 tionē moliemur. Interim tamen ægrotus  
 à bilem atram gignentibus cohibeatur,  
 cuius generis caprarū magnarū caro est,  
 & ferina, & uaccina, & suilla, & sale con-  
 dita caro, & caseus uetus, & fabæ, & in-  
 primis lenticūla, oleraq; uniuersa hume-  
 ctandi uim nullā possidētia. fugiat quo-  
 que uina crassa & nigra, exercitia & uigi-  
 lias, caueatq; ne uel fame, uel siti excrucie-  
 tur. Sed his cōtraria, uinum tenue, perlu-  
 cidum beneq; odorum, & frequentes ac  
 diutinos

diutinos somnos, illi iniungere competit. Prospiciendum etiam lieni his remedijs, quæ in sequentibus Capite de intumescētis splenis præsijs, prosequemur. Similiter os quoque uentriculi corroborandum est, medicamentis his, quorū mentionem faciam, ubi ad uentriculi affectus deuentum fuerit. Cum autem nulli ex commemoratis antea circa uentriculum affectibus, aut certe pauci melancholiæ eueniunt, sed si post phrenitidē, aut capitis ictum, aut diutinam in sole moram, aliquem ea occupauerit, mox inter initia sanguis ex humerali uena eliciendus est, & capiti istidem præsijs, quæ his affectibus, proprie dicata sunt, prospiciendum. Ad hæc caput, modice feruefacta aqua irrigandum, & insuper oleum rosaceū, aceto ex uino confecto dilutum, ab alto superfundendum. Similiter & lac muliebri capiti ægri immulgeri prodest. Naribus quoque oleum seminum cucurbitæ domesticæ, & muliebri lac, recte indetur. Quinetiam in balneum, humectandi facultatem possidens,

Cap. 70.

Cap. 63. &amp;

64.

Ex proprio

cerebri affe

ctu.

om aucto

1000, 1000

1000, 1000

C 2 sidens,

fidens, subinde æger deducetur, & ibidē  
 aqua tepēs liberaliter capiti infundetur.  
 Præterea egrotans omnia odora, frigida  
 facultate prædita, crebro naribus oppor-  
 tune obijciat. § Cæterum si modo duo-  
 rum præscriptorū affectuum, eius uideli-  
 cet qui per consortium est, & qui ex pro-  
 prio cerebri affectu dependet, nulla indi-  
 cia melancholiam concomitentur: inter  
 initalia uenam, quæ ex humerali ac axillari  
 dextri brachij communis est, incidēs, san-  
 guinemq; præscripta ratione ex cōsisten-  
 tia ac colore examinabis. Deinceps reli-  
 quam medendi atque alendi rationē, in  
 priori melancholiæ specie comprehen-  
 sam præscribens, ægrotanti subuenies.  
 Posteaquam uero hæc auxilia tētaueris,  
 aliquot diebus ægrum à medicaminum  
 usu quiescere sinēs: & deinde recollectis  
 uiribus, ut prius curationem, tantisper  
 dum ab omni malo liberetur, aggredie-  
 ris. Verum uniuersum studiū, quod  
 in melancholicis considerandum existit,  
 eò spectat, ut pinguiores corpulentio-  
 resq;

*Vtrinq; am-  
 bigentis cu  
 ratio, ex me-  
 lancholia sci-  
 licet natura  
 li, et san-  
 guinea.*

*Tribus me-  
 lanch. specie-  
 bus cōia.*

resq̄ crebris balneis potabilis aquæ, et uictu boni succi & humectate, & cum decenti animi delectatione, reddatur, siquidem ilico, simul atq̄ pingues obesiq̄ red diti sunt, à proposita noxa liberantur. Proinde cibi illis quàmmaxime idonei censentur, ueruecina caro, hœdina, gallinacea, & panis similagineus. Furfuraceus nanq̄, nulla ratione ijs aptus, utilis ue putatur. Vinũ autem conuenit tenue ac pellucidum, quoniã crassius nigrũq̄ illis ineptum est. Præter hæc, lac etiam recter emulcũ, & adhuc tepens his confert. Similiter et saxatiles pisces recentes, & sesama saccharo preparata, atq̄ oleũ amygdalinum, ex usu sunt. Ad hæc cantilenas, mimosq̄ ridicularum rerum eos audire, & alias res præ oculis habere, quibus maxime capiuntur, exhilaranturq̄, & multi somni, hoc morbo correptis præsidio sunt. Contra ex graui & frequenti cogitatione, solitudine, uigilijsq̄ multis, graues illis noxæ eueniũt. Catapotia bilem atram purgantia, quæ decoctum

C 3 paulo

## 38 PARA. IN NONVM

paulo ante descriptū ob nauseam respuē  
tibus porriguntur. Epithymi Cretensis  
drachmæ uiginti, filiculæ (quam Græci  
*πολυπόδιον* uocant,) agarici, utriusque  
drachmæ decem, hellebori nigri drach-  
mæ quinq; \* faccari tantundem, fticha-

\* Sic Ma-  
nar. salē In  
dicum in-  
terpreta-  
tur.

dos drachmæ septem, pulueris hieræ pi-  
cræ drachmæ quindecim, finguntur ex  
his catapotia, & offeruntur eorū drach-  
mæ tres, uel minus pro uirium ratione.

Cæterum diebus, quibus à medicamētis

æger liber quiescit, electuarij exhilarans

inscripti, portionē opportune assumet.

† Alij Ga-  
ry. legunt.

Hoc accipit, melissæ, corticum citri, † ca-  
ryophylorum, galliæ moschatae, masti-

i. uel uere  
incogni-  
te ueterib.  
radices, sed  
in officinis  
prostantes.

ches, croci Oriētalīs, cinnamomi, nucis

myristicæ, cardamomi, peōniæ, \* been

albi & rubri, zedoariæ, doronici, § semi-

nis ocimi maioris, feminis ocimi caryo-

philati, singulorum pares portiones, mo-

sci quantum pendet decima pars denarij

unius, insuper sumito myrobalanos che-

bulas numero uiginti, & emblicas nume-

ro triginta, has conterito, & in tribus li-

bris

bris aquæ ad duarum librarum euapora-  
tionem concoquito, & per colum traijci-  
to. Iam percolato iuri, adijcito mellis li-  
bram unam, & dein rursus decoquito,  
quousq; uniuersa aqua euaporatu absu-  
matur. postremo tribus huius cocti mel-  
lis partibus, partem unam prædictorum  
medicaminū in puluerem detritorū, adij-  
cito. Cum autē usus postulauerit, huius  
antidoti, nucis auellanæ instar, offero.  
Sanè electuariū hoc, animi hilaritatē,  
coloris iucunditatem ac amœnitatē, bo-  
namq; concoctionem creat, adhæc cani-  
ciem quoq; retardat.

*Frigidis  
festibus  
quàm ido-  
neum.*

*De distillatione, raucitate, & grauedine.*

*Caput XIII.*

**C**VM aliquis post balnei usum, aut  
exercitium, aut aliam quampiam  
occasionem calefacientem, caput in aëre  
ambiente frigidiorē, & uentis aquilonijs  
flantibus detexerit, & inde naribus & pa-  
lato pruritus ac titillatio, nimirū in spon-  
giolis ossibus, & commotio sternutatio-  
nesq; prouenerint, adhibeat linteum ca-

*Ab aëre fr-  
gido cere-  
brū comp-  
mente.*

C 4 Iefactum



lefactum capiti: atq; id tantisper, dum calorem in profundū capitis penetrare sentiat, relinquat. Deinde nigellam naribus odoris gratia admoueat: & eius etiā puluere, aut struthij nariū foraminibus inspirato, sternutationes prouocet. Præterea ne peccans humor in dorsalē medullam fluat, supinum decubitus uitet: multam quoq; ciborum ingestionem, præsertim uaporosorum, ac uini potum fugiat.

*Cum calida  
intēperie.*

Quod si affectus linthei excalefacti usque nihil remittat, sanguinē humerali uena secta mittere, ac uētem remedijs aluum lenientibus atq; emolliētibus ducere expedit. Tale est subsequens decoctū, quod tussē & thoracis asperitate correpto, aluiq; solutione indigēti, potui datur. Accipit autē \* sericas numero uiginti, \* myxas triginta, uuarum pasarum ab acinis liberatarū drachmas decem, uiolarū exicatarum drachmas quatuor, dulcis radicis à cortice liberæ, & nonnihil contusæ drachmas quinque, ficus caricas decē, omnia in tribus libris aquæ, ad duarum absumptionem

\* Sic uiu-  
bas, & sebe-  
ren inter-  
pretor.

sumptionem decoquuntur, deinde per  
colum traiciuntur: & in percolato hoc  
decocto cassiæ fistulæ drachmæ septem,  
manne (quam antiqui mel aërium appel  
lant) drachmæ decem dissoluuntur. Cæ  
terū, si neq; uenæ humeralis incisio, neq;  
alui deiectio præsentis affectui opem attu  
lerint, & materia quoq; in thoracē deflu  
xerit: ad hæc si cum tussē febris infestaue  
rit, ilico uenā axillari, aut ea quæ ex axil  
lari & humerali communis est, secta, san  
guinem mittes, & à carnium & uini usu  
ægrum arcebis. Item quādiu ingens ca  
lor, tussisq; aspera & arida perseverauer  
int, potui porriges hordei decoctū, aut  
iuleb uiolatū (Græcis iozulapon appel  
latum) quod ad hunc modum cōficitur.  
Violarum uncia tres, in tribus sextarijs  
aquæ per diem macerantur: excolatæq;  
aquæ, libræ tres sacchari adijciuntur. Ve  
rum calore se remittente, tussēq; sicca in  
humidam uersa, ut iam æger expuat: in  
fra scriptum decoctum unā cum iam nar  
rato iuleb uiolato indies tantisper, dum  
pectus

pectus expurgetur, & tussis aeger liberetur, uoxq; pristinae claritati restitatur, propinandum est. Quod decoctum accipit, ficus caricas quinq; sericas decē, myxas uiginti, uuarum passerum albarū ab acinis mundatarū drachmas decem, dulcis radicis, cui cortex ablatu sit, drachmas quinq; omnia donec tabuerint aquae incocta, per colum trañciuntur. Huius decocti quotidie uncia tres, admixtis iuleb uiolati drachmis quinq; exigēte usu porriguntur. Porro si inueterauerit tussis, molestaq; esse perrexerit: eurationem

Cap. 55. eius, ut Capite de tussis praesidijs persequar, aggredieris. Caeterū si defluxus humorū ad nares, Latinis grauedo, Graecis *λόρυξ* appellatus, perseuerauerit: suffitibus per infumibulum, aut calamum in naribus transmissis, cohibebitur. Proinde si humor, qui ad nares decumbit, tenuis, acris, mordax, suppalidusq; extiterit, suffumigationem ex \*sulphure, aceto macerato posteaq; resiccato, tētabimus. Aut si libet, ex hordeo fabisue decortica

\* Legendū  
puto siarsu-  
re, cū Auic.  
non sulphu-  
re, cum Me-  
sue.

tis

tis, acetoq; cōmaceratis, ac deīde exicca-  
tis, aut ex saccharo cādido, sandaloq; al-  
bo, suffitu prādicta ratione utemur. At  
si nullā caloris notam facies prae se ferat,  
suffumina ex costo, uel thure apparabi-  
mus, nā & hęc quoq; fluxus reprimunt.

Opportune  
hos suffitus  
purgatio  
præcedet

De lippitudine, quæ οφθαλμία Græcis  
uocatur. Cap. XV.

**Q**Vando adhærescens oculi mēbra-  
na, quæ natura alba est, ob sangui-  
nis affluxum cruenta apparet, & ex ocu-  
lis lachrymæ resudant, atq; in maioribus  
oculi angulis sordes quædam colligun-  
tur, ægrum lippitudine infestari certum  
est: quæ pro symptomatum numero ue-  
hemētiaq; modo grauis, modo lenis exi-  
stit. Verū inter huius uitij species, deterri-  
ma ea esse fertur, quæ oculorū alba adeo  
inflata tumidaq; habet, ut nigredinem  
(quæ corneæ pars tota est, adhærēte mē-  
brana non obtecta) obtegere, palpebras  
q; inuertere uideatur. Mox itaq; per oph-  
thalmiæ curationis initia, uenam hu-  
meralem patienti oculo oppositam, in  
\* extrema

\* Puto, illā  
non ex sola  
cōstare hu-  
merali, sed  
ex ea & cō-  
muni factā.

\* extrema manu pollicis uicinam, aut su-  
pra cubitum, secare iuuat: nisi leue ma-  
lum fuerit. Siquidem tunc ē directo par-  
tis læsę, secta humeralis uena, ut & in cō-  
sistēte fluxus, opē fert. Quocirca quan-  
to uehementior affectus est, tanto maio-  
rem sanguinis copiam detrahēre decet.  
Post sanguinis autem detractionem, al-  
uus myrobalanis citrinis, manna (ueteri-  
bus mel aëriū appellata) & fructuum  
quorundam, ut prunorum, tamarindo-  
rum succo, ducenda est. Aeger quidem à  
carne, uino, & cibis dulcioribus arcen-  
dus: parcior quoq; uictus illi præscriben-  
dus est. Quod si hæc inefficacia fuerint,

\* Id in aug-  
mēto cōmo-  
dū, in prin-  
cipio solare  
percutiētia  
conueniūt.

\* collyrium album lacte mulieris puellā  
lactantis leuigatum, oculis illinetur. At  
si sordiū multitudo in oculis collecta sit,  
specillo lana molli inuoluto, ac aquæ ro-  
sate immerso, oculum à suis sordibus li-  
berare cōpetit. Dehinc puluis albus in-  
spargendus, oculisq; mollis lana \* mu-  
liebri lacte imbuta, cum laxa fascia (ne  
puluis lachrymis eluatur) illiganda est.

\* Huius la-  
tis natura  
pud Plin.  
li. 28. ca. 7.

Deinde

Deinde oculis ita molliter astrictis, & ægro in tenebrosam domum deducto, omni studio & conatu somnum illi conciliabimus, summopere cauentes, ne in affectum oculum, aut capite depresso & inclinato decumbat. Sint itaque omnia capitibus indumēta laxiora, ac minus stricta: nec diu pronus, imò potius supinus cubet. Porro si à uenæ sectione, atq; alui deiectione, oculus leuior, & dolor eius sedatus, & \* tumor mollior, & lachrymæ imminutæ fuerint, balneum subinde æger conscendat. Siquidem hoc morbi reliquias dissipabit, ac depellet. Cæterū humidis sordibus oculisq; grauitate permanentibus, puluerem citrinum accommode oculo inspirabis. Ex horum remedium genere, quod lippitudine uexatis multum conducit, etiā est linimentum subscriptū, epithematis instar fronti ac palpebris accommodatum. Quod recipit: Glaucij præparati succi, rosarū, aloës, lycij, sandali rubri, nucis Indicæ, croci \* Orientalis, singulorū aquas portiones.

\* Id in quibusdā exemplaribus deest.

Epithema ad palpebrarum tumorem confer sol.

\* Ita à cnicis id Rhazes distinguit.

tionēs, ex quibus omnib. inter se coriandri succo commixtis, finguntur collyria: & ubi usus expostulauerit, unum illorū coriandri aut intybi succo, aut rosacea aqua læuigatum, dictis iam partibus inungitur. Hoc remedio si eger usus fuerit, superis fauentibus, sanitati restituetur.

Collyriū album: Cerussæ ablutæ drachmæ decem, sarcocollæ crassioris drachmæ tres, tragaganthæ drachma una, opij sedrachma, hæc iuuenulæ lacte detrita in collyria, lenticulæ instar digerūtur. Puluis citrinus: Sarcocollæ crassioris drachmæ decem, aloës drachmæ dug, croci tantundem, myrrhæ drachma, lycij drachmæ duæ, his in pollinem subactis, ubi usus erit, puluis oculo inspirabitur. Puluis albus, Sarcocolla alba & pinguis, lacte mulieris potissimum iuuenulæ macerata, in umbra tantisper dum exiccetur, relinquatur, deinde exactissime conteratur: & singulis eius pulueris drachmis decē, adijciantur glaucij succi drachmæ duæ, hæc rursus in puluerem tenuissimum

simum detrita reponuntur, postulantēq;  
usu oculo insparguntur.

De oculorum ulceribus. Cap. XVI.

**A**bscessum oculo innatum praesenti-  
giunt, ingens & uehemens puncti-  
lis ac pulsabilis dolor, multae profluentes  
ab oculis lachrymae, & uniuersus oculi  
aut abhaerescens membrana sola, cruore  
suffusa: quorum ruborem apertis oculis,  
aut inuersis palpebris, intueri licet.  
Deinde in oculo unus locus altero sanguinolentior,  
aut in cornea conspicua parte locus aliquis albus  
apparens, oculi quoque abscessum indicat. Caterum ad  
praesentis affectus auxilia instituenda ad-  
mouendaque, Medico in oculorum aegritudinibus  
profligandis exercitatissimo, & natura sagaci,  
opus est. Veruntamen nos curationis capita & summam,  
atque praecipuam medicaminum rationem, prosequemur.  
Dicimus itaque, ulcera in cohaerente membrana  
(quam oculi albi nonnulli appellant) oborta,  
non ita esse perniciose periculosaue, ut sunt ea quae  
corneae



corneæ parti adnata mēbrana non obtēctæ innascuntur. At omnium perniciosissimum ulcus est, quod corneæ è pupillæ regione euenit, siquidē hoc ulcus pupillæ procidentia subsequi quàm ocysime solet. Huius itaq; inflammationis curationem, à uenę humeralis incisione auspiciabimur, sanguinis copiam quoad fieri poterit, imminuentes, dein ad alui solutionem properabimus. Et æger à carniū & uini dulcis usu arcebitur, solarūq; interim refrigerantium herbarū, ut intybæ, portulacæ, lactucæ esu, atq; aquæ potu contentus uiuet. Oculo uero per initia, collyrium album muliebri lacte detritū, immittendum erit. Quod si modo doloris pulsatis uehementia, cæteraq; symptomata remitti uideantur, spes est morbum sine suppuracione solutum iri. At si pulsatis dolor post detractum sanguinem, & deiectum uentrem, atq; collyrij albi usum, neque quiescat, neque remittat, exigua spes superest, inflammationē illam sine puris collectione curari posse.

Quare

*Inflāmatio  
nis nondum  
suppurātis  
curatio.*

*Iam suppu-  
rātis inflā.  
& ulceris  
curatio.*

Quare tunc oculo collyriū ex thure inducendum est, & hapsus aliquis ex mollilana admotus, illigādus est. Verū priusquam inflammatio suppurecat, oculū leniter ne dolore excruciet, absq; hapsulanae constringere decet. Nec tūc quoq; à collyrij ex thure usu abstinere cōpetit: quoniam tantisper dum inflāmatio suppuretur, illud illinere confert. Pure uero iam nato, collyrium ex plumbo, quousq; cauitas tota abscessus impleatur, uniuersaq; caro regeneretur, quā conuenientissimū erit. Hæc autem præsidia abscessu non magno existente, opportune tentantur. Nam si magnus pupillæq; uicinus abscessus sit, operæ precium erit, collyrium Eleisier, mox ad finē capitis subscribendum, cydoniorum malorum nucleorum læuigatum oculo accommodare, ac eodem tempore hapsum quoq; ex tenera lana, molliter oculo alligare decet, ne ulceris occasiōe pupilla procidat. Proinde ad hæc supinus decubitus, depresso nonnihil capite, & à uehementio-

D re

re motu ocium & quies ægro conueniunt; Cæterum carne iam in abscessus ac ulceris loco regenerata, uniuersaq; cauitate impleta, relinquetur in oculo alba quædam cicatrix: quæ si profundius ulcus fuerit, crassior: si uero in corneæ tantum superficie extiterit, tenuior superficialiæq; erit. Cicatrix tamen illa seu calculus, si remotius ab oculi pupilla ulcus constitit, nihil incommodi adferre potest. Sin autem pupillæ uicinior, post ulceris curationem, alba cicatrix relicta fuerit, uicinitatis ratione uisionem abolebit. Quapropter tum illis præsidijs, quibus albugines absterguntur tollunturq;, utendum erit. *Collyrium ex thure.* Collyrium ex thure, Ammoniâ, sarcocollæ, utriusq; drachmæ quinque, thuris drachmæ decem, croci drachmæ duæ, omnia læuigata, ac fœnogræci succo excepta, in collyria digeruntur. *Collyrium de plumbo.* Collyrium de plumbo. Plumbi usti & loti, stibij, pompholygis ablutij, aris usti, gummi Arabici, tragacanthæ, singulorū drachmæ septem: opij sedrachma, hæc simul

## RHAAZAE DE MOR. CVR. 51

mul contrita, per tenuissimum pannum sericum cernuntur, & puluere aqua pluuiali consperso, informantur ex eo collyria. Collyrium deperditam ulceris oculi carnē regenerans, & pupillae proidentiam prohibens, & relictam cicatricē seu callum extenuās, abstergensq; Cadmia<sup>Collyrium polychreston, carnis generatō.</sup> abluta, pompholygis loti, serussae, stibij, thuris, singulorum drachmae duae, myrrhae drachma una, sarcocollae crassioris sesquidrachma, cinnabaris, aloes, opij, singulorum drachma una, finguntur ex his collyria. Collyrium autem Eleifer<sup>Collyrium Eleifer.</sup> uocatum, quo ex ulcere proidentia pupillae metuētes utimur, in hunc modum se habet: Stibij, lapidis haematitis, utriusque drachmae decem, acaciae drachmae tres, aloes drachma una, his cydoniorū nucleorum succo subactis, informantur collyria: ac dum usus expetit, oculo accommodantur.

*Ad ea quae oculis incidūt educēda. Ca. XVII.*

**S** I pilus, festuca, aut quid aliud oculo fortuito inciderit, sumito specillū re-

**D 2** *sina*

sinapinea illitum, uoluitoq; per oculū,  
& adtrahet id quod oculo illapsum est.  
Idem succinum attritu calefactum, ocu-  
loq; admotum præstat.

De albugine oculo innata. Cap. XVIII.

**Q**Væ oculis innascitur albugo, cicatrix est, post ulcerum curationem, dum eorum continui solutio restituitur, relicta. Quæ si in puerorum oculis oboriatur, facilioris curæ erit, quàm in seniorum. Siquidem in senibus facta albugo, haudquaquam curationē admittit, nisi perquam tenuis & superficiaria ac nublula instar extiterit. Præsentem porrò affectum, præsidijs his discuties. Postq; æger balneo corpus emolliente egressus fuerit, aut facie quàm minime prona, uaporē aquæ calidæ, aut fœnogræci tepentis decocti, tantisper dum ipsa rubeat, receperit, infra scripti pulueris portionem oculo insparges. At si id remediū uenas turgidas ac sanguinolentas effecerit, doloremq; inflammatorium concitauerit, ab eo cōquiesces, donec hi affectus oculi remissi

*Etiaſi ſenio-  
rum nō cu-  
ramus, ad  
ficiū tamen  
eas tingu-  
mus.*

remissi fuerint, dein idem subsidium repetes. Medicamen præstantissimum, albuginem probe detergēs, citoq; discutiens: quo ego in exterendis albuginibus, neq; efficacius, neque generosius, aut ulli par comperi. Accipe massacumiæ (quod ex plumbo, uitro, silice conficitur, quo scilicet fictilia uasa illinunt) halcyonij, quod alij spumam maris uocant, stercoreis magnæ lacertæ, nitri naturalis non factitij, sacchari albißimi, singulorum pares portiones, dein fume acori, chelidonij \*utriusque drachmas decem, & decoque in libra una aquæ, ad trium partium cõsumptionem: postea percolato, & hoc decocto comprehensas medicinas subigito, & liquore imbibito, in umbra exiccãdas seponito, ac denuo contritas, & ut prius asperfas exiccato, id ubi quater præstiteris, rursus omnia, ut prius exiccato, cõteritoq; ac oculo puluerem inspargito. Si quidẽ hoc medicamen nulli in detergendis albuginibus, ut dixi, est secundum, nam crassiores albugines, etiam bruto-

*Descriptũ  
est ex libro  
Secretoriũ,  
qui falso Ga  
leno ascribi  
tur.*

*\* Aliq ad  
dunt foeni  
culum.*

D 3 rum,

rum, ut equorum & bouum oculis innatas, extergit.

De scabrie & tunricula. Cap. XIX.

Ab erodēte humore.

A suffuso sanguine in adherētē tunica.

**C**um palpebram inuersam, interius rubro colore suffusam, & asperam inaequalemq; aspexeris, scabie ea molestatur. Et quando super oculorū alba & nigredinem, quiddam tuniculæ instar, uenis multis cruentis & turgidis contextum cernis, affectus adest, qui Arabibus à tunicæ forma Sebel dicitur. Sanè utraque hæc uitia grauiā sunt, & diuturna, atque ad curādum contumacia. Nihilominus tamē inter initia, dum ager sanus est, nec affectus inualuit, uenæ sectione brachij & frontis, & alui solutione utatur. Et ab esu palmularum, & sesami melle præparati, & temulētia abstineat. Præterea uacuum corpore, nec cibis distentum ægrotantem subinde ad balnea deducere, identidem quoque laborātī oculo collyrium rubrum illinere, profunt.

Collyrium rubrum, Lapidis hæmatitis, æris floris cremati ac loti, utriusq; drach-

ma

mæ tres, æris usti drachmæ duæ, croci  
drachma una, myrrhæ tantundem, pipe  
ris lōgi sedrachma, posteaquam uino ue  
teri ea læuigaueris, redigito in collyria.  
Præter ista collyrium uiride, Capite de  
ungui descriptū, si illinatur, opem fert.  
Quod si morbi hi in uetustate prorupe  
rint, scabies, inuersa palpebra & instru  
mento (quod à palpebrarum rasura *ελε  
φαρόξυστον* Græci appellant) per summa  
derasa, tunica uero suppuratione & con  
coquētium usu perfanari debent. At ho  
rum curationem præsentis libri metæ,  
quum ad manualetm artem pertineat,  
haudquaquam admittunt.

*Ad maiorum angulorum carunculas pruritu  
uexatas. Cap. XX.*

**S**Vmito intybum tenellum ac uirens,  
& eo manibus exacte contrito, infor  
mato globulos paruos instar oculi, & o  
leo uiolaceo circumlitos, ac oculis clau  
sis superaccommodatos, ægrotanti som  
num inituro, illigato. Verum rosaceum  
pposito affectui generosius est, citiusq̃

C 4 auxiliū

Horum cu  
ratio latiβ.  
lib. 4.  
Secundū lo  
cos.

A mordac  
succo.



auxilium præstat. At si hæc inualida fuerint, accipito lentes excorticatas, rhus obsoniorū, rosas rubras, & mali punici acinorum succum, hæc trita sapa, hoc est decocto uino, conspergito, ac in morem emplastri pruriginoso angulo inducito. Quod si ne hæc quidem suffecerint, humeralem agrotantis uenam primum incidito: deinde eam, quæ recta in frõte repit, ac eas quæ ad maiores oculi angulos sunt. Ventrem quoque subinde medicaminibus bilem flauam ciētibus deijcito. Item egrum identidem ad reprimendum humorum acrimoniam, in balnea dulcis aquæ deducito.

*De ungui oculorum, quod πτερόγιον*

*Græcis uocatur. Cap. XXI.*

*Ob cōcoctri-  
cis uel ex-  
pultriciis im-  
becillitatē.*

**Q**Vando aliquid membranulæ neruosaë instar, ex angulo oculi nares spectante oriri, & oculi album obtegere, ac ad usq; nigredinem eiusdem protēdi cernitur, affectus unguis appellatus, oculo innascitur. Huius noxa tunc demum peior censetur, dum ad nigredinem, quæ è regione

RHAZAE DE MOR. CVR. §7  
 ē regiōe pupillē est, malū preperit. Hac  
 itaq̄ mēbranula tenui existente, collyrio  
 uiridi, & collyrio ex æris flore, eā elidere  
 tentandū est. Sed postq̄ in uetustatem &  
 crassiciē unguis deuenit, scalpello ad  
 id parato est euellēdus. Collyrium ui  
 ride, quod tuniculę Sebel dictæ, ungui  
 & albæ cicatrici auxiliū præstat. Aeru  
 ginis drachmæ tres, æris floris combusti  
 drachmæ sex, auripigmenti rubri, nitri,  
 halcyonij, singulorum drachma una, sa  
 lis ammoniaci drachma semissis, guttæ  
 ammoniaci drachmæ duæ. ammoniacū  
 in rutę succo dissoluitur, & reliquis me  
 dicinis eo aspersis, informantur mirifice  
 uirtutis \* collyria, etiā si paulo uehemen  
 tiora sint. Collyriū ex æris flore, quod  
 unguem exerit, Aeris cremati, æris flo  
 ris, utriusque drachmę quinque, ærugi  
 nis drachmæ duæ, salis ammoniaci, ni  
 tri, \* auripigmenti, quod sublimatū sit,  
 singulorum drachma una: conteruntur  
 omnia: & septimanæ spacio, ut melius  
 exiccentur, reponuntur. deinde illis rutę  
 succo

Chirurgia  
 apud Aëtiiū  
 lib. 7. c. 60.

\* Præstatis  
 sima sunt, si  
 ne liquore  
 detrita, siue  
 instar pul  
 ueris ad  
 mota.  
 \* Id inter  
 reliqua est  
 mordacissi  
 mum.

C 5 succo

58 PARA. IN NONVM  
 succo conspersis, finguntur collyria, quibus unguis affricatur.

De uibice, ac cruentis suffusionibus ex icctu  
 alidue causa. Cap. XXII.

Ob parua-  
 rum uenula-  
 rum diuor-  
 tium.

vehemens  
 multum.

**Q**Vando in oculo ex plaga, seu alia  
 quauis occasione, maculam sangui-  
 nolentam fieri contigerit, sanguis ibidem  
 ex affluxu collectus (postquam aestus &  
 fluxio conquieuerint) discutiendus est.  
 Sumito itaque auripigmenti rubri, thur-  
 ris, myrrhae, ammoniaci, singulorum æ-  
 quas portiones: his coriandri succo de-  
 tritis, formato collyria, ac illa corian-  
 dri succo læuigata, oculo exigente usu il-  
 linito. Verum quam diu dolor perseue-  
 rauerit, albumen oui oleo rosaceo comi-  
 sceto, & lanam teneram illis imbutam ocu-  
 lo illigato. Etiam columbae sanguinem ex  
 teneris alis expressum, statim per initia  
 opportune post uenae sectionem, si opus  
 sit, instillabis.

A frigido  
 humoris af-  
 fluxu.

Ad lachrymas. Cap. XXIII.  
**C**VM maiores oculorum angulos con-  
 tinenter

tinenter uidos ac madentes conspexeris, egrum quotidie ieiunum, & corpore expurgato, ad balnea deducito: & oculo hunc subscriptum puluerem, tenuitate atomis non ablimilem, inspargito. Puluis quidem iste accipit, pompholygis drachmas decem, coralli rubri & albi, myrobalani citrinae & contritae, aloes, singulorū drachmas duas, piperis drachmae semissem, haec in pollinem tenuissimum detrita, oculo crebro inspirantur.

Præsentē calore amoue piper.

De uisus debilitate. Cap. XXIII.

**S**I cum uisus imbecillitate, manifestae humiditatis notae apparuerint, quae tempore inediae & exercitij nonnihil remitti uideantur, catapotia coctia, leuioribus purgantibus praesidijs tentatis, subinde egrotanti porrigere, & alimenta siccantia & extenuantia administrare oportebit. Vomitus quoque subinde post assumptos cibos incidentes, ad pituitae educationem, irritare opportunū est. Oculis autem pulueres siccandi uim possidentes,

Ex humiditate, aut spirituum crassitie.

Ex siccitate, aut spirituum penuria.

tes,

tes, utiliter inspargentur. Quod si iam dictum affectum liccitas, corporisq; macies concomitentur, copiosius & humectans alimentum, & uini potus, ex usu erunt. Item aqua egelida capiti liberaliter infundenda, atq; ad tepentis aquæ uaporem facies inclinanda est. Naribus autem ac auribus, oleum amygdalarū dulcium instillandum, ac oculis lac mulieris adoleſcētulæ quotidie, idq; sepius est infundendum. Hæc porrò imbecilli uisus species, famis tempore & uacua aluo, increſcit, magisq; intenditur. Compositio pulueris tenuissimi, uisum qui humiditatem suæ imbecillitatis causam obtinet, exacuens. Accipito pompholygis rosacea aqua abluti siccatiq; drachmas uiginti, deinde exprimito sampſuchi uirentis succum, et posteaquam nocte una quousq; fæces subsiderint, requieuit, eū percolato, & eo succo aspersum pōpholygē, donec exiccetur seponito, posteaq; conterito. Insuper sumito zingiberis, piperis nigri, piperis longi, chelidonij, singulorum

*Puluis ad  
humiditatē  
oculi.*

## RHAZAE DE MOR. CVR. 61

gulorum drachmas duas, salis ammonia-  
ci drachmā unam, pompholygis ad præ-  
scriptum modū præparati drachmas ui-  
ginti, hæc omnia cōterito, & succo uiren-  
tis foeniculi aspergito, & rursus siccata ac  
contrita reponito, & exposcēte usu, ocu-  
lis iniiciens utere. Præter ista quoq̃, pro-  
posito affectui collyrium ex fellibus illi-  
tum optime facit: sed ualde acre & mor-  
dax est.

Ad palpebrarum tumorem, Græcis χέμοσιπ  
appellatum. Cap. XXV.

**O**Culo epithema humorū affluxum *A sanguinis*  
reprimens, Capite de oculi lippitu *influxu.*  
dine descriptum, illinito. *Fol. 45.*

Ad palpebrarum pilos, oculos iritantes,  
Cap. XXVI.

**S**I pilus unus alterūe oculo infestus *Ob siccita-*  
fuerit, alijs rectis palpebrarum pilis, *tē, aut poro-*  
mastichæ, aut oleo sesamino, illū aggluti *rum obli-*  
nato, aut radicitus eos euellito: ac locū, *quitatem.*  
a quo euulseris, mucronato ferro, aut acu  
urito. Verum si multi pili oculum iritaue-  
rint, necessitas tarsum præscindere co-  
git.

## 62 PARA. IN NONVM

git. Cæterum eius negocij tractatio, nostri propositi libri limites transcendit.

*De suffusione, siue humorum in oculum affluxu. Cap. XXVII.*

**Q**uandoque ante oculos culices alii, cui, uel alia tenuia, lucentia, caliginosaq; corpuscula perperam obuersari uidentur. Quod nonnunquam propriæ noxæ oculi, nonnunquam uentriculi affectui fertur acceptum. Quare inter hæc duo discrimen habendum est, neque sanè hoc symptoma homines infestans parui pendendum est. Quod si ob uentriculi uitium euenerit, non metuendum, ne oculo magnam noxam adferat. Sin ex proprio oculi affectu sit, metu grauioris mali non caret: siquidem id suffusionis initium esse consuevit. Cæterum affectus hic, dum recens est, nondumq; radices egit, medicamentis eliditur. At ubi uetus perfectusq; extiterit, sola punctori styli mucronis per corneam pertusione, curari potest: licet fortasse nec pertusio quidem, ipsiusq; membranulæ à pupillæ regione

*Paul. lib. 6.  
cap. 21.*

regione depreſſio, opem adlatura ſint.  
Quā ob cauſam inter hæc duo iam enar-  
rata, merito diſcrimen ſummo ſtudio in-  
quirendum eſt. Quod autem id ſit, per-  
ſtringam. Cum igitur utrique oculo, mu-  
ſcæ, aut culices, aut quid ſimile occuſare  
uideatur, pro certo habēdum, ex affectu  
uentriculi malum pendere. Si autem alte-  
ro tantum oculo huiuſcemodi apparitio-  
nes conſpiciantur, uitiū oculo propriū  
eſſe iudicatur. Sic etiam quando cibus di-  
ſtenſo uentriculo, & eo ingeſta male con-  
coquente, nauſeaq; laborante, ſolito plu-  
res cerni uideantur: tempore uero inedia,  
aut exercitiū, pauciores hallucinationes  
eueniant, & tunc quoque ſciendum eſt,  
ab ore uentriculi affectum pendere, idq;  
maxime ſi duobus tribusue, aut etiā plu-  
ribus menſibus ſuffuſionis apparuerint  
accidentia, contemplantiq; tibi pupillā  
nihil tenebroſum cōſpiciatur. Dum ita-  
que harum coniecturarum congeriem  
congeſſeris, catapotia coccia porrigito:  
quibus ſi affectus in totū extirpatur, præ-  
dictis



dictis notis indicationibusq; fidē dabis, utpote affectu à uentriculi uitio dependente. Caterum si altero tantum oculo uisa fuerint, & singulis diebus perpetuo huiusmodi apparitio perseuerauerit, nullo scilicet die interueniente, qui omni reprehensione caruerit, censendū est suffusionis (quam aquam aliū uocāt) adesse inītia: præsertim si altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut (ut breuiter dicā) non exacte pura uideatur, quæ si ita se habeant, certo certius est suffusionem esse.

*Mali, ex oculi uitio cui ratio.*

Quando itaq; affectus hic ex propria dispositione oculi pendet, ~~prohibendum~~ aegro, ~~ne cucurbitulis~~, neque ex uenis in manum distributis, sanguinē extrahat; similiter quoque, ut piscium, & eorum quæ humectāt, pituitosumq; succum generant, esum fugiat hortaberis. Aluum uero frequēter carapotijs coccijs deijcies, & aegrotum calefaciētibus siccantibusq; ales, atque hydromel potui illi propinabis. Oculis uero collyriū ex fellibus oportune illines. Collyrium ex fellibus, quod

*In initio Paulus et Aëtius uenā secāt. Præstiterit ante leuio- ra à Galeno descripta tentasse.*

quod auxiliatur incipienti suffusioni, & pupillæ dilatationi, & his qui post occasum solis non uidēt, & hebetudini uisus, humiditatem sui occasionem habētibus, hac ratione conficies. Fellis gruis, fellis piscis, Arabibus \* sabot dicti, fellis hircini, fellis accipitris, fellis aquilæ, fellis perdicis, singulorum siccorū unum, aut plura, horum aridorū drachmis decem, adijcies euphorbij, syluestris cucurbitæ, saganipeni, singulorum drachmā unam, his simul omnibus attritis, & succo uirētis fœniculi aspersis, formato collyria. Exigente quidem usu, unum lacte muliebri, aut oui candido læuigatū, oculo illinito.

\*Nos Lucij utemur, Galen. quoque callonymi meminit.

Ad nocturnam cæcitudinem, quæ νυκταλωψ

Græcis dicitur. Cap. XXVIII.

**H**Vic affectui idoneum est, hepar caprinum scissum, & sectionibus singulis iniectum piper longum: & pipere eisdem sectionibus ocluso, in clibanum hepar mittitur, & tantisper dum assetur exicceturq̄, non tamen uratur, relinquatur, quo aliato, piper longum extractum,

Ab aq̄ui huius moris et spirituum crassitie.

**E** diligenter

## 66 PARA. IN NONVM

diligenter cum moschi momento cōteritur, ac sanie, quę ex alfo iecore resudauit, conspargitur, & exiccatur in pulueremq; detritum, oculo crebro insufflatur. Iam quoque ipsum iecur opportune edendū porrigitur. Aut caprillum fel mellis comixtum, in æneo uase super ignem decoquito, & dein specillum fellis intinctum, oculo admoueto, magis tamen profeceris, si collyrium ex fellibus muliebri lacte detritum oculo inunxeris. Porrò si hæc omnia inefficacia fuerint, aluum deijcito, ac sanguinem ex utriusq; humerarijs, & frontis uena detrahitò, uictusq; rationem extenuato.

De dilatatione pupillæ. Cap. XXIX.

*A siccitate.*

**C**um pupilla, hoc est foramen, quod propter uueam tunicam à natura perforatam in nigredine oculi cernitur, usque adeò dilatatur ac patescit, ut omni ex parte alba oculi attingat: & si id post uehementem capitis dolorem euenerit, modica eius restitutionis spes habenda est. Exigua autem existente dilatatione,

*Ab humoris copia.*

uentrem

RHAZAE DE MOR. CVR. 67

ventrem catapotijs coccijs subinde deij-  
 cies, ac identidem collyrium ex fellibus  
 oculo illines. Cæterum si pupillam pro- *Aplaga:*  
 pter ictum dilatari obtigerit, haud qua-  
 formidandum: quia nisi uuea tunica di-  
 uulsa sit, pristinae integritati restituetur.  
 Parabis itaque ad huiuscemodi uitium,  
 emplastrum ex fabarum farina, chamæme-  
 lo & althæa: & hæc in uino & aqua con-  
 tusa, oculo (non statim tamen a princi-  
 pio,) induces.

De fistulis maioribus oculi angulis acciden-  
 tibus. Cap. XXX.

**S**I quãdo angulus maior madet, cūq; *A putri &*  
 comprimatur, fanies & pus emanat, *erodente hu-*  
 fistula ægrum molestat, cui ignito ferro *more.*  
 præsentissime succurritur. Verum eius *Apud Cel.*  
 usum docere, ab huius libri tractatione *lib. 5. ca. 28.*  
 alienum censetur. Nihilominus tamen  
 subiungam remedium: quod si accõmo-  
 ueris, ipsam resudationem per menses plu-  
 res ita comprimēs, ut eger conualuisse ui-  
 deatur. Medicamen hoc accipit, Aloës,  
 thuris, sarcocollæ, cinnabaris, balaustij,  
 E 2 sibirij,

stibij, aluminis, singulorū pares portio-  
 nes, æruginis quantū pēdet quarta pars  
 unius, hæc trita, ac plātaginis succo sub-  
 acta, in collyria redigito. Cū aut̄ usus ex-  
 petit, fistulā, donec uniuersa sanies in ea  
 coaceruata, pfluxerit, præmito, deide æ-  
 gro in latus sanū, fistulæq; non obnoxiiū  
 decūbēte, iam descripti collyrij in succo  
 plātaginis, aut iure decoctæ gallæ imma-  
 turæ dissoluti, tres guttas, aut quatuor, nō  
 simul quidē, sed unam post aliam, iusto  
 interposito interuallo, in magnum oculi  
 angulum, fistula tentatū, instillato. Quo  
 peracto, æger trium horarū spacio, præ-  
 dicta figura decumbet. In aurora insecu-  
 ti diei, rursus fistulam exacte comprimi-  
 to, ac eandem curationem reiterato, atq;  
 deinde septimana una, aut quam diu fi-  
 stula pressa refudat, idem repetito. Siqui  
 dem hac curatione, locus fistulæ infesta-  
 tus, siccus multis mensibus seruabitur.  
 De oculorum autem præsidij, quantū  
 præsens institutum exigit, iam satis per-  
 tractatū existimo. Reliqua uero quum  
 ad

*Fusissime li.  
 4. Secundum  
 locos Gale-  
 ni.*

RHAZAE DE MOR. CVR. 69  
 ad curationes, quæ ferro ac manus admi-  
 nistratio peraguntur, pertinent, relin-  
 quam, quoniam multis remedijs, atque  
 longa pertractatione opus habent. Sunt  
 tamen nonnulla ex horum genere in his  
 libris, quib. de decoratione, & fucis, tuē-  
 daq; sanitate egimus, descripta.

De aurium dolore.

Cap. XXXI.

**S**I aurium dolorem, faciei & auri ui-  
 cinarum partium inflammatio do-  
 lorq; pulsatilis concomitentur, sangui-  
 nem ex humerali uena secta, lægrotanti  
 detrahito. Item oleum rosaceū, oleumq;  
 de floribus salicum, modice ad auris sen-  
 sum calentia, cum aceti pauxillulo, in au-  
 ditorium meatum infundito: ac ea hap-  
 su lanæ mollis excepta, & paululum refrige-  
 rata, foris admoueto. Lac quoque ita ca-  
 lidum, uti est recenter emulctum, subin-  
 de cum oui candido, auri instillato. Ven-  
 trem autem myrobalanis citrinis, scam-  
 monio, & aloë, uehementer ducito. Præ-  
 parabis autē huiuscemodī medicamen,  
 in hunc modum. Sumito myrobalano-

In. 4. scilicet, et s. ad regem Almansor.

Ex inflama-  
 tione cōtra-  
 cto.

E 3 rum

## 70 PARA. IN NONVM

rum citrinarum drachmas uiginti, & in puluerem contritas, duabus libris aquæ quousque ad duas tertias libræ unius ea absumatur incoquito, deinde decoctum per colū trañcito. Insuper accipito aloës drachmam unam, scammoni obolum unum, hæc discocto cydoniorum succo asperfa, atque in catapotia septem digesta porrigito: & deinde post duarum horarum intercapedinē decoctum, quo catapotia foelicius agant, præbeto. Quod si dolor minime conquiescens urget, opi momentum, oleo rosaceo temperatum, auri immittito. Et si post opi usum, dolor pulsabilis, priori similis redierit, tri-duoq; talis perseverauerit, oleum ex sēfami semine, in quo anatis aut gallinæ adeps dissolutus fuerit, subinde sensim auri infundito. Siquidem tunc auri abscessus inest, quem suppurare decet. Quando itaque dolor sedatus fuerit, suppurationem perfectam esse scito, & subitam insperatamq; ab aure puris profusionē exspectato. Cæterum dum dolor aurium,

*A crassis uiscosisq; humoribus.*

RHAZAE DE MOR. CVR. 71  
 rium, post fastidiosam repletionem, aut  
 uentos frigidos, molestauerit, oleum in  
 quo ruta cepaue incocta est, tepidum au-  
 ri immittito. Quod si hoc inualidum fue- *Præstat le-*  
 rit, oleum in quo turbit decoctum sit, au- *uitorib. ante*  
 ditorio meatus instillato. Aut oleum lilio *corporis ua-*  
 rum, (cui ad singulas uncias, euphorbij *uationem*  
 recentis & castorei utriusque drachma *uti.*  
 una exactissime leuigata, adiecta sit,) in-  
 fusum non minus iuuat. Porrò si ne hoc  
 quidem auxilium præstiterit, aluum cata-  
 potijs coccijs ducito, & laconicum pri-  
 mam balnei partem (in quo sudorẽ pro-  
 uocet) intrare ægrum iubeto. Vinum si-  
 militer uetus ac robustum illi propinato,  
 reliquamq; uictus rationem calefacien-  
 tem & incidentem instituito. Si uero au- *Ex flatuo-*  
 riũ dolori adsint sonitus, tinnitus, et fla- *so spiritu.*  
 tus, panicum siue milium in frixorio tor-  
 re factum, identidem feruidum per saccu-  
 los superaccommodato. Aures quoq;  
 ægri ad uaporem aquæ, cui mentastrũ,  
 stichas Arabica & sampsuchus incocta  
 sint, inclinato. Ad hæc castorei & eu-  
 phorbij



## 72 PARA. IN NONVM

phorbij, utriusque pondus quatuor granorū hordei: in iofmini olei denarijs duobus dissolutum, & deinde auri infusum, ac forinsecus illitum, magnum adfert præsidium.

*De auris ulcere. Cap. XXXII.*

*Primo ut ulcus mūdet, secundo ut cōgluinet, utitur.*

**P**Vre ab aure profluente, mulsa tepida crebro in uno die infundēda est: deinde infrā scriptum hoc medicamen, præsentī affectū multum accommodū, est inijciendum, Sarcocollæ, aloës, cinna baris, thuris, singulorum drachma semifis, squamę ferri, æruginis, utriusq; obolus. omnibus aceto læuigatis, in aurem, quod fatis est, infundatur. Vel linimētū tortile ex linteo, melle imbutum, ac dicto iam liquori intinctum, in aurem mittitur. Aeger quidem tantisper hoc medicamine, & mulsa, dum auris curetur, oportune uti poterit.

*De sonitu & tinnitu aurium. Cap. XXXIII.*

**N**onnunquam hoc uitium ob exquisitum auditus sensum, eiusq; acrimoniā oboritur, cuius certissimum indicium

RHAZAE DE MOR. CVR. 73

indiciū putatur, si tempore inedia increuerit, crapulae uero & repletionis remissior fuerit. Hic igitur affectus, cum leuior sit, sibi dedicatam curationem nullam exposcit, nisi forte aggrauescat. Tū enim opij grana duo, oleo rosaceo soluta, ac in aurem dimissa, illi (sensu nonnihil stupefacto) abunde auxiliantur. Si uero huiuscemodi affectus capitis grauitatem, & auditus imbecillitatem sibi comites sortiti fuerint, oleum seminis raphani, & oleum amygdalarum amararum, & oleum rosaceum, in quo castoreū fuerit detritum, auditus meatui instillabis. Aures quoque ad uaporem aquae, cui sampsuchus, stichas Arabica, absinthiū, mentastrum & origanum incocta sint, opportune inclinabis. Et aluum catapotijs coccij deijcies, & uinum ægrotanti subtrahes, parcesq; ales.

*Ex euaporatu crudi humoris.*

*Post euaporationes olea accōmō de instillantur.*

*Ad grauem auditum. Cap. XXXIII.*

**C**um autem auditus grauitas hominem occupat, perpendendum est, an in aure fordes (quas à consistentia ce-

E 5 ram

ram nominant) coaceruatae sint. Quoniam huiusmodi sordibus ibidem inueneratis, pharmacis mihi supra ad auris ulcera narratis, aut nitro in aceto subactis, aut manuali opera expurgabuntur.

*Acrudis huiusmodi moribus.*

Verum si non sint sordibus infectae, & auditus grauitas post copiosam ciborum ingestionem, aut morbum acutum, humores ad aurem in eius iudicatione protrudentem, oborta sit, aure uaporem aquae, cui paulo ante dicta decocta sint, recipies: idque per infumibulum, quo totus uapor in aurem penetret. Curabis autem id rectissime ad hunc modum. Mentastrum, absinthium, samolium, suchum, aliaque superius praecedente Capite commemorata, in aeneo uase aqua pleno, & ad hunc usum idoneo, ore scilicet angustiore, decocto, ac deinde infumibulum uasis ori accommodato, & ne uapor exhalet, linteis infumibulum & uasis os circumuoluito, ac deinceps aure super infumibili orificium inclinata, uaporem aeger uentriculo cibis non distenso recipiat. Praeterea collyrium

## RHAZAE DE MOR. CVR. 75

lyrium hoc, deinde auditorio meatus in-  
 stillato. Syluestris cucurbitae drachma  
 una, nitri scrupulum unum, castorei, ari-  
 stolochiae rotundae, succi absinthii, singu-  
 lorum drachma semissis, costi sesquiobo-  
 lus, euphorbii obolus, fellis uaccini qua-  
 tum ad simplicia excipienda sat est. infor-  
 mato ex his collyria: & cum usus exigit,  
 unum oleo amygdalarum amararum de-  
 tritum, auri pedetentim ac continue in-  
 fundito. Hoc enim praestantissimum ad-  
 fert praesidium dolori, qui ex pituita est,  
 & sibilo, tinnitui ac sonitui, flatulentos  
 spiritus causam habentibus. Praeterea sur-  
 ditati quoque, quae viscosorum crudorumque *Ex sicca*  
 humorum soboles est. Porro si auditus gra- *te.*  
 uitas post ieiunia, crebrasque uigilias, obo-  
 riatur, & fuerit facies emaciata, & oculi  
 concaui, aeger balneum dulcis aquae pe-  
 tat, & copiosiori potu, ac cibo humecta-  
 te utatur, somnosque plures sibi conciliet.  
 Caput quoque aqua tepida cum oleo hu-  
 mectandi uim obtinente, donec sanescat,  
 perfundat. Quod si a phrenitide hoc *Ab expur-*  
 genus *to humo-*  
*per crisi*

76 PARA. IN NONVM  
genus uitij inuaserit, præfidijs Capite de  
aurium sonitu descriptis, curatur.

Ad aurium uermes, & animalcula auditus  
meatum irrepentia. Cap. XXXV. •

**C**VM auditorium meatum titillatio,  
pruritus & dolor molestant, & uer  
mes inde excidunt, mentastri succum,  
aut foliorum persicorum, aut oleum nu  
cleorum malorum persicorū, aut aloem  
in succo absinthij detritā, auri immitte,  
hæc nanque uermes, & animalcula au  
rem irrepentia, aut in ulceribus nata, in  
terimunt.

Ad ea quæ in meatum auditorium incidunt,  
euellenda. Cap. XXXVI.

*Cauidum  
e illapsum  
orpus hu  
midorū usu  
tumescat,  
pisa, faba*

**Q**Vãdo aliquid meatui auditorio in  
figitur, oleum tepidum illi infundi  
to, & ægrum in balneum potabilis aquæ  
deducito, atque in eo tantisper dum mol  
lius corpus eius reddatur, immorari fini  
to. Deinde naribus struthium in puluerē  
subactum inspirato: aëremq; per inspira  
tionem attractum, donec sternutatio iri  
tetur, ægrotātem retinere iubeto. huius  
scemodi

scemodi nanque ex sternutatione & concussu, fortasse id quod meatui illapsum est, eijcietur. Si uero maius fuerit, quam quod excidere possit, forpicula, aut ferro instar retuli hami in aurem demisso, opere precipium est extrahere. Quinetiã idem quoq; in naribus, si usus expetit, tentandum est. Porro si in porum auditorium aqua defluerit, capite uersus eam partem, in qua patiens auris est, inclinato, in uno pede subsiliat æger. Quod si nõ excernitur, sternutationẽ ut præcepi, prouocato: deinde tepidum oleum subinde auri instillato. Neq; hoc malum parum nos anxios reddere debet, præcipue si id quod in aurem inciderit, aut ingressum sit, tetra qualitate pollet. Inde enim grauis cruciatus subsequi, & in aure inflammata, si intus maneat, conuulsiones adferri solent.

*Multi lacerata, capite, auri illigata, ut in alijs utuntur.*

*Succio utilissima est.*

*Ad sanguinem e naribus erumpentem.*

Cap. xxxvii.

**E**X eorum genere, quæ sanguinis e naribus profluuium sistunt, est succus

## 78 PARA. IN NONVM

\* Id ex fa-  
cultate fit,  
quonia cali-  
dus est, nec  
crystam in-  
ducit.

cus ocimi maioris, in quo camphora læ-  
uigata sit, & naribus ita immisus. Auxi-  
liatur enim huiuscemodi \*succus hoc af-  
fectu implicari solitis, aut ante fluxū san-  
guinis, aut tempore profluij naribus il-  
litus. Vel accipito gypsum, cinerem char-  
tæ ex linteis præparatæ, gallam, cinnaba-  
rim, calcem uiuam, chalcitidem, & hæc  
simul in puluerem detrita, naribus inspi-  
rato. Vel linimentū tortile ex linteo, his  
pulueribus albumine oui exceptis imbu-  
tum, naribus immittito. Aut alumen scif-  
file, in puluerem longe tenuissimum a-  
ctum, cum pari portione amyli, naribus  
insufflato. Quod si copiose sanguis pro-  
fluere perseverat, brachiorū partes axil-  
lis uicinas, zonis, aut cordulis uincito.  
Quinetiam ut sanguinem in cōtrarium  
melius trahas, fœmora quoque ac testes  
uinculis intercipito. Porrò si affectus in-  
ualecat, incisa humerali partis illius un-  
de sanguis profluit, sanguinem per in-  
terualla modice detrahare confert. Siqui-  
dem nec hac ratione sistitur, magnas cu-  
curbitulas

## RHAZAE DE MOR. CVR. 79

curbitulas ignitas hypochondrijs, ea parte qua sanguis fluit affigere, cutemq; si opus sit leniter incidere, consiliū est. Medicamen sistendo sanguini longe efficacissimum. Accipies calcem albam & leuem, qua aurifabri uti cōsueuere, & subinde tritam, citra cunctationem naribus inspirabis. † uel linimentum funiculare † alijs, & oui cādido liquore illitum, eaq; calce imbutum, narium foraminibus immittes.

Ad narium crustas & ulcera. Cap. XXXVIII.

**C**Rustis, quas Græci *εσχοδρας* uocāt, Obmaterie ex caustico rū usu aduersionem.  
 in naribus obortis, ceram et oleum humectans, cuiusmodi uiolaceum est, & gallinaceū adipem illines. Ad hæc ægri naribus crebro, diebus aliquot, aquæ calidæ, cui emollientia & humectantia incocta sint, uaporem mane obijcies. Cæterū crustis iam emollitis ac prolabi incipientibus, linimentum tortile aceto acerrimo sale temperato intinctum, naso inferes, ac crustis ipsis acetum cum sale superaccommodabis, siquidem eo aceto exiccata, diutius naribus non inhærebunt.



80 PARA. IN NONVM

bunt. Quod si ulcera ibidem oboriatur, unguento cerussę opportune ea restitues, præcipue si calidam admixtam habeant intemperiem.

De polypo & sarcomate. Cap. XXXIX.

A materia  
affluxu &  
concoct. &  
expul. imbe-  
cillitate.

**C**um parte interiore narium, caro superflua, mollis, & quasi laxa & rubra albaue innascitur, & nares quoq; crassescere incipiunt, iamq; dicta carne impleri, humeralem uenam primum incidere iuuat. Deinde linimentum tortile unguento uiridi imbutum, naribus positum bene facit. Eius quidem unguentilibro septimo Almanfori dedicato, Capite septimo, De carnem exedentibus remedijs, meminit, & Constat autem æruginis & despumati mellis utriusque uncia, quibus nonnulli addunt sarcocollæ drachmam semissem, & ammoniaci tantundem: quæ unâ cum ærugine, melle & aceto excipiunt, atque in formâ unguenti digerunt, § Verum si hoc non usque adeo efficax fuerit, \* medicamẽ mordax ibidem à me descriptum, tantisper dum planè

\* Mesteze-  
bergi Ara.  
nocant.

planè locus expurgatus exesusq; fuerit, parti laborati inducet. Præterea affectui huic nonnunquam ferro, excindendo radicatus carunculam illā, succurritur. At medici id tentantes, interdū grauiter delinquunt, ac ægrum (affectus differentiā non perpendentes,) in magnum uitium inducunt. Nam in naribus quoque cancer subinde nasci solet, quem sine discrimine cum polypo confundunt. Quum itaque hoc in loco obortus cæcer, neque mordacia fert medicamina, neq; quæ ferro sit præcisionem: consilium est, leniter illum atrectare, & præsijs leniētibus, & sanguinis missione, & alui solutione ipsum tollere. Cognoscitur uero, an huiuscemodi affectus cancer sit, ex eo uidelicet, si durus est, & uenas tumidas habet, & ad palatum usq; nonnunquam prorepat. Proinde naribus siccis durisq; existētibus, ac nullo ab illis manante humore, summopere cauēdum est, ne præfens affectus, aut huic similis, ferro acribus uel medicamentis iritetur. Verum si, quæ na-

F ribus

ribus caro innascitur, laxa mollisque fuerit, & humores e naribus profluxerint, ac si pressus nasus, mollem, nec tactu durum sese offerat, non metuendum est, quin acrium medicaminum usu, & ferro subueniri illi possit.

De oblesâ olfaciendi facultate. Cap. XL.

Ob frigidum  
humorem or-  
ganis olfa-  
ctus impa-  
ctum.

† Aliis, ar-  
temisia.

Utilis erit  
ante localiū  
usum, totius  
capitis  
purgatio.  
\* Eius usū  
docet Plin.  
l. 28. ca. 8.

**Q**uando sensus, quo odores percipimus, deperditus debilisue est, & naribus nulla superflua caro increuit, & aer solito more per nares attrahitur, & oculi sensuumque reliquorum organa, naturalibus munijs apte funguntur, naribus puluerem tenuissimum ex struthio, cyclamine, & sale ammoniaco, inspirabis. Aegro quoque, ut nares uapori excalescenti aceti subinde admoueat, precipies. Verum si hæc inefficacia sint, subsequens medicamen naribus illinetur. Cuius compositio in hunc modum se habet. Nigellæ, fellis gruis, cucurbitæ syluestris, ueratri albi, singulorum pares portiones, hæc detrita in puluerem, \*urina cameli Arabici, quantum ad contegendas medicinas

cinas fat est, excipiuntur: deinde ad solem  
 exiccanda reposita, tandem in pastillos  
 lentium instar, digeruntur, exigente au-  
 tem usu, unus illorum oleo † sampfuchi † *Varia exē  
 plaria ua-  
 ria habent  
 olea, uideli-  
 cet sambuci,  
 & tosmini.*  
 solutus, naribus inducendus est. Siqui-  
 dem hoc remedium, praesenti affectui est  
 aptissimum. Quod si hoc medicamentū  
 suo calore & mordaci facultate, magnū  
 dolorem excitauerit, oleum seminum cu-  
 curbitae domesticae, narium foraminibus  
 inunges, & capiti aquam calidam libera-  
 liter infundes. Sorbitiones quoque actu  
 calidae & humectantes, aegro conducunt.  
 ex quorum numero sunt ptisana, & fur-  
 furum decoctum, eaque quae farina & alijs  
 frumentaceis seminibus praeparatur. Et  
 subsequens quidem praesidium ad deper-  
 ditum olfactum efficacissimū putatur,  
 quod in hunc modum conficies. Conte-  
 rito nigellam prius aceto peracri mace-  
 ratam, in puluerem tenuissimum, et cum  
 ueteri oleo subigito, deinde aegri capite  
 (ore aqua impleto) quantum licet retror-  
 sum reclinato, comprehensi medicami-

84 PARA. IN NONVM  
 nis aliquot guttas naribus instillato, & laborantem quoad potest, aërem ambientem attrahere præcipito, hocq; tribus insequentibus diebus & ternis uicibus factum. Cæterum si ob medicamenti acrimoniâ rosio aliqua cõcitetur, ea quæ prius dolori utilia præcepi, naribus admouebis.

*De dentium & gingiuarũ dolore. Cap. XLI.*

*Ex inflama-  
 tione.*

**S**I contingat gingiuam unâ cum dentium dolore cruentam simul & tumidam, & rubro colore suffusam esse, tumore repletumore pulsatili, cucurbitulis scoptulis, aut inferiori mādibulæ affixis, sanguinem detrahito, prius tamen secta hume-

*Acetius in  
 hoc affectu  
 acetum tan-  
 quā hostilē  
 gladiū uitā-  
 dum suadet,  
 ac asininum  
 lac probat.*

rali uena. Deinde ore aliquādiu acetum cum rosaceo, donec tepuerit, retinendum præbeto: quo eiecto, idem rursus repetat, ac postea solum rosaceum frigidum ore retineat. Verum si ea ratione affectus nō sopiatur, sitq; cum inflammatione uehemens pulsatilis dolor, camphoram unâ cum pyrethro contritam, dentium radicibus ad gingiuas applicato, et postq̄ pulsus defluerit, à saliuâq; elutus fuerit, aliū secundo

RHAZAE DE MOR. CVR. 85  
 secundo diligenter inspargito. Præterea  
 lanam mollem oleo rosaceo imbutā, den-  
 ti applicato. Quod si dolor non remis-  
 sus aliquando incrudescit, grauiorq̄ red-  
 ditur, opij obolum rosaceo læuigato, &  
 illo circumlitam lanulam quāminime  
 sordidam, radici affecti dentis adhibeto.  
 Si ne sic quidem dolor requieuerit, gingi-  
 uis scalpello leniter incisis, sanguifugas  
 admoueto. Porrò si gingiua neq̄ cruen-  
 ta, neque tumida sit, neque pulsatili dolo-  
 re infestetur, & facies absque inflamma-  
 tione cernatur, sed dentium dolor à nau-  
 sea, & copiosa ciborū ingestione & cœ-  
 na agrum inuaserit, ægerq̄ multis cibis  
 refrigerantibus usus fuerit, aluum cata-  
 potijs coccijs deijcito. Et dolore affecto-  
 rum dentium radices, subscripto medica-  
 mine circumlinito. Quod accipit, pyre-  
 thrum, sinapi, thapsiam Indicam, nitrū,  
 piper & zingiber: quibus in puluerē de-  
 tritis, dentium radices infricabis. Lanam  
 quoque tenellam melle imbutam, ac illo  
 puluere inuolutam, dentiū finibus circa

Ex frigidi  
 humoris af-  
 fluxu.

F 3 gingiuas

gingiuas apponito: prius tamen ore, aceto, in quo pyrethrum, mentastrum, & origanum ebullierint, abluto. Extrinsecus autem panicum, siue milium in frixorio cum pauxillulo uini & aceti tostum, sacculoque insutum, genis accommodato. Aut piperis puluere melle subacto, dentem eiusque radicem infricato. At si hæc inuálida fuerint, dentium finibus hæc theriacam superponito. Castorei; laserpitij, hoc est succi Cyrenaici, piperis, gingiberis, styracis, opij, singulorum pares portiones: hæc melle leuigata, denti inducitur. Aeger quoque ad tempus à cibo abstinebit, et subinde laconicum primam balnei partem, ut sudor copiosus erumpat, ingreditur. Et quo minus corpus pituitosum maneat, subinde utiliter aeger sese exercebit. Si autem nec sic dolor sedatus sit, ferro candenti dentium radices subinde contingito, uel penitus dolentem dentem extirpato. At erosionem tentato denti, medicamenta sequentia, ut quæ uehementer exedant, imponito,

*Ob præstantiam ab autore theriaca appellatur.*

*Candentis stili usus, multis probatur.*

avignig

e 7

aut

aut in totum dentem euellito.

Medicamenta eradicantia & confringentia  
dentes. Cap. XIII.

**M**edicamen quod exeso denti im-  
missum, ipsius remittit dolorem,  
ac ipsum † comminuit. Sumito \* herbā  
lactariam foeminam (quam Græci *τιδύ-  
μαλον μυστήριον* uocant) & piper, his com-  
misce cedri resinā, dentiꝑ excuato im-  
ponito. Medicamen imbecillos ac do-  
lentes dentes eradicās. Accipito radices  
mori, radices capparum, pyrethrum, lac tī  
thymali, liquorem uolubilis maioris (qui  
Græcis *κισσάμπελος* dicitur) cucurbitæ  
syluestris radicem, auripigmentum ru-  
brum, his tritis, acerum quantum ut in-  
ter se cohæreant satis est, inspargito. Et  
deinde aliud acerum unius hebdomadae  
spacio (ut exacte conglutinentur pulue-  
res) singulis diebus pari modo, ut prius,  
adijçito. Deinde dentes circumquaq;  
scalpello rasos, prædicto medicamine in  
aceto detrito decies in die, donec facile  
moueantur, illinito, eaq; ratione extrahi

† Alias, cō-  
\* stringit.  
Nonnulli  
Kebekengi  
ranunculu  
interpretā-  
tur.

Plurimi py-  
rethru 40.  
dieb. aceto  
maceratū,  
deinde tritu  
denti exeso  
imponunt.

F 4 to.



## 88 PARA. IN NONVM

to. Aut plusculis diebus dentē fœce aceti acerrimi madefacito, ut mobilem postea extirpes. Vel fluuiatiles \* ranas, oleo tantisper dum marcescant, incoquito, & eximente usu, dentes prius tamen circumcisos, huiuscemodī oleo subinde illinito: ac sic dētes euellēdos, iam laxatos, instrumento ad id parato, eradicato.

\* Potius adeps ranae uiridis in arboribus de gentis.

Ad stuporem dentium. Cap. XLIII.

**H**ic affectui portulaca & amygdala amara, uel quæ uiribus his respōdent, commanducata, auxiliū præstant. Sal quoq; si eo perfricētur, aut cera commasticetur, non parum iuuant.

† Aliās, Ad dētes, frigidī contactu indolēscētes.

† Ad dentium refractionem. Cap. XLIII.

**O**leum excalesfactum, linteocq; exceptum, admoueto: aut ouī uitellum assum, aut calentem panem masticandū porrigito, aut balsamo oleōue iridis dentes affricato.

De linguæ orisq; superficialijs ulceribus.

Cap. XLV.

§ **S**I ulcera subrubra ac sanguinolenta sint, accipito rosarū seminis, amyli, cinerulæ,

RHAZAE DE MOR. CVR. 89  
 cinerulæ, lentium excorticatarum, seminis portulacæ, coriandri exiccati, seminis senæ ex Mecha aduecti, singulorum pares portiones, camphoræ pauxillum. his *A sanguine.*  
 in puluerem subactis, aphthas affricato.  
 Præterea eadem quoque aceto cum rosa ceo oleo, et rosacea aqua excepta, ore retinenda præbeto, sanguinemq; cucurbitulis, scoptulis & faucibus à foris affixis, *Ex pituitoso succo.*  
 minuito. At si albicantes papule sint, sale & melle illinito, & syrupū acetosum uocatum, aut muriam, ad oris collutionem porrigito.

De gingiuis sanguine humentibus. Cap. XLVI.

**A**D gingiuis sanguine tenuiore perpetuo fluentes sanandas, accipito *A mordaci & erodente humore.*  
 auripigmenti rubri & citrini, calcis, gallarum immaturarum, aluminis, singulorum pares portiones, his in puluerem subactis, & aceto peracri exceptis, informato pastillos exiguos, & ubi usus exigit, eorum obolū sumito, eoque adamussim detrito, gingiuis infricato. iam postquam puluis ille gingiuis aliquandiu adhæserit, *Vehemens hoc, & crustans est.*

F 5 rit,

## 90 PARA. IN NONVM

rit, osq; plantaginis aqua, aut lacte ablu-  
tum fuerit, rosaceum oleum ægro retinē-  
dum præbeto. Est enim id præsentî affe-  
ctui, tum putredini, & herpeti exedenti,  
qui os infestare consuevit, remediū præ-  
sentissimum.

*De laxatione procidentiaue gurgulionis.*

Cap. XLVII.

*Columella.*

**C**Um ægro radici linguæ, aut fauci-  
bus uidetur quippiam incumbere,  
& quando os adaperit, seu linguam exe-  
rit, eius gargareo laxatus elongatusq;  
propendere conspicitur, sumito compo-  
sitionem ramech ab Arabibus uocata,  
in quam gallæ immaturæ, & uuæ passæ  
ingrediuntur, deinde accipito salem am-  
moniacum, ac ea in tenuissimum pulue-  
rem simul redacta, instrumento ad hoc  
apto, super columellam inspirato, atque  
huius instrumenti mucroni narrati pul-  
ueris momento apposito, ad columellæ  
radicem sensim contingendâ instrumen-  
tum dirigito, columellamq; eo pauxillū  
foras attrahito, Id autem instrumenti ge-  
nus

*Scribonius  
eius loco gal-  
læ cōtūsam  
habet, quæ  
in princi-  
pio erit cō-  
modior.*

RHAZAE DE MOR. CVR. 91

nus ab uua attollenda *σεφολύπιδιον* dicitur. Aut si uoles ex malo punico acido, unà cum sua carne contrito, gargarizationes parato. Caterum si diutius ita producta propenderit, ipsiusq; pars superior, qua scilicet palato adnectitur, tenuior extiterit, caput uero quo linguam spectat uuae instar, rotundum atque orbiculare increuerit, radicitus eam (candēti ferro ad id parato, ac per \* canalem aliquem ori immisso) praescindito, Caueto tamen, ne priusquam ad eam figuram columella perueniat, eam amputes. siquidem talis sectio interdum tantum concitat sanguinis profluxum, ut nullis praesidijs sisti queat.

Vua.

\* Archigenes  
 nes oui putamine  
 utrinque per  
 tuso utcatur.

De hirudinibus gutturi incidentibus, aut alijs reptilibus fortuito irreptantibus. Cap. XLVIII.

**D**Vm quis in guttore pruritus titillationemq; experitur, & sanguis tenuis & rubicundus modicè inde refudat, suspicio est, hirudinem deuoratam esse: praecipue si aqua, cui hirudines innatant, hauserit. Aegro itaque ore magnū

92 PARA. IN NONVM  
 gnūm hiare, & linguam exerere præcipi  
 to, & linguæ basi pressa, fauces ad solem  
 inspicito. Iam si sanguisugam propè ad  
 hærescere conspexeris, ægrotātem ab ea  
 ad hunc modū liberato, uulsella, qua tela  
 extrahi consueuerūt, sanguisugæ caput  
 comprimito, ac postea sanguisugā euelli  
 to. Verum si conspectum hirudo fugiat,  
 æger subinde sinapi cum aceto gargari  
 zet: siquidem acris incitata, à loco cui  
 inhæret dimouebit. Vel ex aceto & suc  
 co Cyrenaico, aut ex sale, & aceto garga  
 rizationes ad eandem utilitatē ægrotan  
 ti porriges. Præterea nigellam & sinapi,  
 trita, gutturi utiliter inspirabis. Item ex  
 cepæ succo gargarizationes præbebis.  
 Cæterum si post euulsam hirudinē, san  
 guis fluere perseverat, ex iure cui mali  
 punici cortices, balaustia & rhus coria  
 rium incocta sunt, gargarizationes pa  
 rato. Gutturi quoque balaustiorum pul  
 uerem, thus, cinnabarim & amyli insu  
 flato. At si stomacho hirudo adhæserit,  
 medicamina quibus uermes propellun  
 tur,

tur, propinato. Ex horum quoque genere, quæ hîrudines diuertunt, prima balnei domus censetur, si illi æger tantisper dum multa sitis ipsum urgeat, immoretur: ac deinde aquam frigidissimam, niue scilicet infrigeratam, ore contineat: & quâ aqua tepuerit, eam reijciat, aliamque frigidam in ore recipiat. Hîrudo siquidem aliquoties frigoris cupida, ad os prorepit.

*De his quæ in os, seu œsophagum prolabuntur.*

Caput XLIX.

**S**I quâdo, quod in guttur deuoluitur, illi aut œsophago, tanquam infarctum inhæreat, sitque id aut bolus aliq̄s grâdior, aut quippiam illi non absimile, nimirum quod nec asperum, nec angulosum sit, aut partibus inter se diuisis constet, iuuat identidem egrî ceruicem concutere, ac liberaliter aquam transglutire, ea nanque ratione forsitan ad inferiora il-lapsum in œsophagum corpus, propellatur. Aeger præterea balneum potabilis aquæ ingressus, oleum, aut alia emollien-

tia

Multis oblo-  
ga cerea cá-  
dela oleo te-  
penti intin-  
cta utitur.

tia ac humectātia bibat, ac deinceps ma-  
gnos bolos deglutiat. Si uero ne tum qui-  
dem in uentriculum procidit, instrumen-  
tum corporibus ex œsophago propellen-  
dis adaptatū, ori immittetur. Est autem  
hoc instrumenti genus ex plumbo factū,  
quodq̄ cum longū sit, retisq̄ instar con-  
fabricatū, in omnem gibbositatem faci-  
le effingitur: ac ea industria œsophago  
inuolutum corpus, in uentriculum pro-  
truditur.

Ad oblaesum linguæ sensum, ac deficientem  
motum. Cap. L.

Ex pituitæ  
affluxu.

Rhazes hic  
ut sæpius a-  
lias, corpo-  
ris euacua-  
tionē factā  
subintelli-  
git.

**Q**Vando lingua cæteris membris il-  
læsis, torpida redditur, nulla tamen  
febris, aut alius acutus & ardēs morbus,  
ægrum infestat, sumito salem ammonia-  
cum, piper, zingiber, sinapi album, pyre-  
thrum, herbæ pediculariæ semen, nitru,  
origanum, saccharum, nigellā, sampsu-  
chum aridū: ac ex his simul in aqua deco-  
ctis, gargarizationes parato, interim ta-  
men prospiciat sibi æger, ne portionem  
aliquā huius liquoris deglutiat. Profunt  
quoq̄

quoque pluribus diebus ieiuno egro, col-  
lutiones ex muria Nabathææ, aut ace-  
to & pyrethro, præparatæ. Vbi uero æ-  
ger os colluere his cessauerit, accipito fa-  
lis ammoniaci, pyrethri, piperis, sinapis,  
singulorum æqualia pōdera: & his in te-  
nuissimum pollinem subactis, linguam  
diu huiusmodi puluere infricato.

Quod si linguæ stupiditatem, auditus, re-  
liquorumq; sensuum torpor concomita-  
tur, laboranti præsidij nervorum resolu-  
tioni dicatis, subuenies. Porro si in acu-  
tis febribus sermo difficilis fuerit, uide-  
risq; cum sermonis difficultate, extenua-  
tam & breuiorem conuulsamq; esse lin-  
guam; aqua calida in qua herbæ emolli-  
entes humectantesq; ebullierint, super  
colli uertebras, & aurium præcipia, ubi  
scilicet mandibularum articulatio est, op-  
portune superfundetur. Præterea par-  
tes illæ humectante oleo, cuius generis  
uolaceum & amygdalarū dulcium cen-  
sentur, infricandæ sunt, & ægrotanti oleū  
modicè inferuifacium, ore retinendum.

Et si

Ex cerebri  
confortio.

Animia sic-  
citate.



Et si multum temporis lapsum fuerit, ex quo sermo aboleri uisus fuerit, aut si à primo ortu primæ conformatione id euenit, operæ precium est indagare, an lingua faucibus linguam colligans, præternaturaliter excreuerit. Quod si inueneris, parum eam præscindito, ac uulneri chalcitidis puluerem ad crustam inducendam inspargito.

*Hi Græcis ἀγλωγλωσσοί dicuntur. Apud Aëtium Ser. 8. c. 35. est administratio.*

*Ad linguam in nimiam molem intumescentem.*

Caput LI.

**C**um lingua in tantā molem increuerit, ut ore retineri nequeat, fricanda est cepis, aut citrorū acido succo, aut \*ribes, aut malo punico acido, donec multa salua defluerit. Ea namque ratione decrescet, pristinaeque formæ restituetur. Si uero id tamen non suffecerit, aceto & sale diligenter linguam infricato: & si hoc quoque inualidum extiterit, primum sanguinem ex duabus humeralibus, deinde ex uenis sub lingua latitantibus, detrahito.

*\*Veteribus incognitū. Manardus eius loco ruminicis succo utitur.*

De tumore

De tumore sub lingua enato, qui ranula dicitur. Cap. LII.

**T**umore huiuscemodi maligno sub lingua accidente, inter initia lingua sale ammoniaco, & gallis confricada est. Verum eo tumore in uetustatem protracto, medicamine cruentis gingiuvis dicto, lingua infricabitur, hoc autē acre, & crustam ulceribus inducens medicamen est. Deinde post eius usum, ægrotantem, acetum cum sale contemperatum ore retinere, utile erit. Græce πα-  
ραχου

Ad pustulas ac tumores linguæ. Cap. LIII.

**H**is eisdem remedijs, quibus aphthis supra comprehēsis, & anginae medemur, succurritur.

De angina. Cap. LIIII.

**A**ffectum Latinis anginam, Græcis στωάχνη, appellatum, testatur inter deglutiendum ac respirādum, percepta difficultas molestiaq̄. Qui morbus modo grauior, modo leuior, pro trāsglutiendi respirandiq̄ difficultatis magnitudine pronunciat. Quocirca quando Ex sangui-  
nis copia.

**G** transglu-

## 98 PARA. IN NONVM

transglutiendi noxę adfunt faciei, & oculorum rubor, corporisq; repletio, in ipsius curationis initio humeralis incidenda est, & gargarizatio ex malo punico acido cum sua carne, præparanda. Vel ex succo malorum syluestrium, igne, uel sole incrassato, aut rubi fructus succo similiter gargarizationem. Et deinde ex rosacea aqua, cui rhus coriarium immaceratum sit, collutionem porrigito. Postquam hæc triduo diligenter sint facta, & alius succo fructuum ueluti prunorum, tamarindorum, cassia fistula, manna, (quam ueteres mel aërium appellarunt) fuerit soluta, gargarizationes ex decoctione ficuum caricarum, et uuarum passarum, uel è medulla cassiæ fistulæ cum hydromelite porrigito. Si autem malum longius prorogatur, gargarizationibus & inspiratione acrium medicaminum, quę infra subiiciam, utemur. At si nullo in facie rubore æger suffusus fuerit, & copiosa pituita ab ore profluxerit, ad hæc si ægrotans frigida humidaq; temperie sit, statim

*A pituitoso  
succo.*

RHAZAE DE MOR. CVR. 99

statim inter initia aluum catapotijs coc-  
 cijs deijcito, & acriorem clysterem Capi-  
 te de apoplexia descriptum, infundito.  
 Sed si malū incœperit, gargarizationes  
 propinato ex syrupo acido, q̄ aceto, sac-  
 charo, & aqua potabili preparatur, uel  
 ex hydromelite & pipere & oxymelite.  
 Temporis uero successu ex muria Naba-  
 thææ: & deinde quoque ex hydromelite  
 & sinapi collutiones administrato. Ex  
 eorū genere, quæ malignis anginis, post  
 aliorum & retrahentiū & euacuantium  
 usum, auxiliū præstant, sunt & sangui-  
 nis ex uenis sub lingua latitantibus im-  
 minutio, & cucurbitulæ, † sine cutis inci-  
 sione, collo affixæ. Sunt præterea collo  
 applicanda epithemata humida ex mel-  
 le, quod anacardinum supra appellau-  
 imus, idq̄ tantisper, dum uesiculæ excitē-  
 tur. Sic quoque ad eundē usum, ex sina-  
 pi gargarizatio utiliter exhibetur. Fauci-  
 bus autem subsequētem puluerem inspi-  
 rato. Qui accipit sinapis, salis ammoni-  
 aci, pyrethri, nīri, succi Cyrenaici, pipe-  
 ris,

*Sūmē peri-  
 culosæ ang  
 n.e curatio.*

*† Alibi, cū.*

*Hec omnia  
 inter initia  
 uitare oportet.*

ris, mentastri, partes aliquot, hæc in pul-  
uerē detrita, faucibus insufflato, aut cum  
hydromelite gargarizationis loco por-  
rigo.

De tussi.

Cap. LV.

*A calid. &  
sic.  
immixta  
uicē inter-  
pretatur et  
Aliqui per  
muraba uio-  
las saccha-  
ro conditas  
intelligunt.*

**C**um tussis aspera & arida cum ru-  
bore æstuq; molesta est, laboranti  
aqua cui uiolæ immaceratæ sunt, cuiq;  
saccharum in condimentū adiectum sit,  
& ptisana propinabuntur, fabas quoq;  
excorticatas, & spinachiam uocatā her-  
bam, cum oleo amygdalarum dulcium,  
inter cibos assumet. Aquæ autem, quæ  
potui porrigeat, uiolaceus syrupus cōmi-  
scendus est. In ore uero sub lingua æger re-  
tinebit globulos: qui quum ad pellendā  
tussim faciunt, à Græcis *Bixileas* appellan-  
tur. Quorum compositio hæc est: Succus  
dulcis radicis, sacchari albi, utriusque  
drachmæ decem, amyli, tragacanthæ, a-  
mygdalarum dulcium cortice liberata-  
rum, singulorum drachmæ quinq;, hæc  
nucleorum cotoneorum cremore exce-  
pta, in globulos redigito. At industrium  
esse



## RHAZAE DE MOR. CVR. 101

esse oportet eum, qui medicamentum linguæ subiicit, ut paulatim eo liquefcente, larynx id quod in eam defluit excipiat, quod tussi resistens optime curabit.

Porro si tussi præfens glutinosi sputi copia expuitioni cōtumax, noxam inferat, quæ tamen feбри & uehementi alui solutione uacat, subsequētes pastilli infirmo porrigendi erunt. Qui constant, seminis fœniculi, seminis apij, succi dulcis radicis, adianti, amygdalarū amararum, singulorum æquis portionibus, hæc simul lini seminis succo excepta, in pastillos digeruntur, quorum denarij tres offeruntur. Decoctū uero, quo in proposito affectu utimur, quocq; iam comprehensos pastillos ægrotanti eos exhibituri, læuigamus, Capite quo distillatiōis subsidia scribuntur, præceptum est, illi tamen drachmæ quinque adianti, & hysopi momentum opportune in præfenti affectu, adijciuntur. Si uero eò uetustatis & malicie tussis deuenerit, ut laborantem uigilijs excruciet, globuli ex styrace illi porrigendi

A pituite  
copia.

G 3 gendi

gendi sunt. Qui recipiunt, myrrhae, styra-  
cis, opi, singulorum pares portiones, fin-  
guntur ex his globuli lupinorum instar:  
7. *Secundū* & horum unus, aut alter ore sub lingua  
*locos, habes* retinendus, (ut eliquesces deuorari queat)  
*generosum* offertur. Aut quum ab huiuscemodi glo-  
*diacodyon.* bulis abstinetur, dormituro aegro syrupi  
papaueris uncia, uel albi papaueris semē  
cum saccharo, ad manducandum praebe-  
tur. Is autem qui hoc malo corripitur, ab  
omni acidorum, salforum, austerorum  
acriumque esu, coarcendus est. Suffumi-  
gatio ad ueterē tussim, foetidaque sputa effi-  
*Mirificē* cax. Sumito aristolochiae, myrrhae, styra-  
*exiccāt.* cis, galbani, singulorum pares modos, auri  
pigmenti rubri quantum omnia pendent,  
haec in puluerem subacta, butyro uaccino  
subigito, ac ex eis probe mazas pilae  
instar, cōfingito: & quum usus exegerit,  
ieiuno aegro harum unam carbonib. su-  
perpositam, per infumibulum suffito.

De difficultate spirandi, quam Graeci ἀδυσία  
appellant. Cap. LVI.

A glutinosa  
pituita pul-  
monis me-  
tib. impacta

**D**Vm quis crebra tussu correptus,  
fre-

RHAZAE DE MOR. CVR. 103  
frequenter respirat, quemadmodum so-  
lent citatiore cursu, aut uehementi exer-  
cizio fatigati: & quando supinus decum-  
bit grauius, dum uero recta ceruice sedet  
minus afficitur, subscriptum decoctū illi  
propinādum est. Accipit autem ficuum  
caricarum drachmas decem, palmularū  
pinguium ac recentium, seminis apij, se-  
minis fœniculi, adianti, dulcis radicis,  
hyssopi, marubij, singulorum drachmas  
quinque, incoquuntur simul tribus libris  
aquæ dulcis ad duarum librarum euapo-  
rationem, & deinde percolantur. Huius  
decocti iuris suspiriosus triduo uncias  
quinque bibet, adiectis interim subscri-  
ptæ cōfectionis drachmis tribus, quæ ad  
hunc modū se habet. Dulcis radicis suc-  
ci, hyssopi, adianti, singulorū drachmæ  
decem: cardamomi, piperis, amygdala-  
rum amararum, aristolochiæ rotundæ,  
seminis urticæ, singulorū drachmæ quin-  
que, mellis despumati quod satis est. Cō-  
fectio hæc efficiendis è thorace recremen-  
tis quàm aptissima est, quocirca septima-

G 4 na



## 104 PARA. IN NONVM

na una continuo utiliter æger ea utetur. Deinde post sinapis & mellis esum, uomitus iritandus est, aliusq; catapotijs his ducenda. Accipiunt autem, agarici quantum pendent hordei grana octodecim, cucurbitæ syluestris carnis grana sex, succi cucumeris asinini quantum pendent hordei grana quatuor, dulcis radicis succi sesquidrachmam, finguntur ex his catapotia, quæ unî propinationi sufficiunt. Post hæc decoctum unâ cum confectio- nis usu repetendum est. Postremo uomitum quoque & uētris deiectionem reite- rare conuenit. Et hæc uniuersa quoad sa- nitati æger restituatur, sunt tentanda, in- terim uero, à crassorum & acidorum & austerorum esu, ægrotus diligēter arcen- dus est.

De laterali dolore, qui πλευρίτις Græcis  
diciuntur. Cap. LVII.

Pulsus his  
adeft durus  
& serrati-  
lis cū spirā  
li difficul-  
tate.

**C**VM quis in membrana costas suc-  
cingente, dolore punctili laborat,  
præcipue si tussis sicca & febris illū con-  
comitentur, competit, si dolor, qui à sum-  
ma

ma humerorum compage ad extremas  
 costarum cartilagine est, usque ad clavi-  
 culam peruenit, sanguinē ex axillari eius  
 partis, quam dolor infestat, minuere: nisi  
 forte uniuersum corpus sanguine plenū  
 plethoricumq; fuerit. Tunc enim ex late-  
 re opposito sanguinis detractio, celebra-  
 bitur. Porro si morbus ad dies aliquot  
 ægrum adflixerit, fluxusq; cōstitit, san-  
 guis missus ex cubito affecti lateris, reme-  
 dio est. Si autem ad inferiora costarum  
 interualla circa hypochondria dolor de-  
 scenderit, alius decocto, Capite de distil-  
 latione comprehenso, ducenda erit. Cæ-  
 terum ueriti turbationem, quam purga-  
 tio accersere solet, præstabit uenam inci-  
 dere, deinde hordei decoctum cui saccha-  
 rum admixtum sit, in potu propinare.  
 Quod si tussis admodum arida sit, mane  
 singulis diebus iuleb uiolatum  
 porriges. Deinceps uero hor-  
 dei decoctum ægrotanti non  
 inutiliter præbebis. Et si agri uires deie-  
 ctæ fuerint, pane modice fermentato, ac  
 G 5 quam  
 na, amygdalis, saccharo, & rosarum aqua, ad delicias parant.

Hip. et Gal.  
 ac alij Graeci  
 ferē oēs,  
 affluentem  
 sanguinē in  
 contrarium  
 reuellētes,  
 atq; iam in  
 partē afflu-  
 xum à loco  
 uicino unā  
 deriuātes, ē  
 directo late-  
 ris affectū  
 uenā etiam  
 in corpore  
 plethorico,  
 ac inter ini-  
 tia, oppor-  
 tune fecant.  
 aliter quā  
 Arab. & eorū sequaces,  
 quos a iugōs: merito q̄s  
 ob id appellauerit.  
 Officinæ  
 quāsdā ma-  
 zas ex farē

quàmminimè salso, frigidaq; abluto, si-  
mul cum saccharo, eum cibabis. Robu-  
stis autem uiribus, hordei ius usque ad  
diem quartū sufficiet. Vbi uero iam spu-  
ta deijcere aegrotans cœperit, decocto ad  
distillationes curandas superius descri-  
pto, perpetuo ante hordei decocti potū,  
donec restituatur aeger, uteris. Porro si  
febris, uehementiaq; morbi perseueraue-  
rint, atque aegre sputa educere aegrotus  
ualuerit, decoctum capite de respirandi  
difficultate comprehensum præbebis.  
Quod etiam dum aeger saniem expuet,  
utiliter administrabis. Caterum si inter  
morbi initia sputa ualde nigra flauaue  
apparuerint, & ita continuata fuerint, et  
neque febris, neq; calor ante septimum  
diem se remiserint, haudquaquam affe-  
ctus timore uacat. Præterea si præter hæc,  
eadem spirandi difficultas permaneat, et  
simul audiatur in thoracis cavitæ mur-  
mur aliquod, similiter si genæ ac oculi  
multo rubore suffunduntur ac dolent,  
affectus in maturam mortē præcipitat.

Quod

Quod si lateris parte exteriori, rubor aliquis suffusus, tumorue conspiciatur, & locus affectus tactu indolecat, ad curbitularum usum (antè summa cute leniter incisa) properandum est. Aut emplastrum ex sinapi & ficibus recte, donec modice locum exulceret, imponetur. § Prius tamen opportuna uenæ sectione, aut purgatione, quæ huic malo idonea esse posset, & humoris affluxi leni resolutione, tentatis. § Sanè ex imperitorum Medicorum hallucinatione, multa huic malo accidunt augmenta, ueluti quum in membrana costas ambiente, crassos flatus infartos coniecturantes, confectionem diamoschum appellatam, aut huic in discutiendo & incidendo uiribus parem, intempestiue porrigunt: siquidem ea ratione medicandi, ægrum plane iugulant. Affectus porro, qui in spurias costas integente membrana, ex inflammatione oboritur, Arabibus Persica dictione birsen (quasi thoracis noxa) dictus est.

De

De pulmonum inflammatione, quæ πνευμονία Græcis dicitur. Cap. LVIII.

Quando hominem febris ardēs corripit, tantaq; inter spirandum difficultas oboritur, ut se strangulari existimet, & quum tanto rubore malæ suffusæ sunt, ut tinctæ uideri possint, ac dum tussis et thoracis parte anteriori distētio, & thoracis grauitas (tamen absque dolore punctili) premunt, quodq; per sputa deijcitur spumosum est, is æger, si omnia concomitentur, ualentem ac acutam pulmonis inflammationem suffert. Quod si quoque pelliculæ ipsius, quæ cum thorace secundum ipsius longitudinem sunt connexæ, inflammentur, etiam dolorem punctilem æger percipit. In curationis itaque initio e uena axillari § dextra § sanguinis detractio prodest. § Nam sola ratione plethoriæ, aut affluxuri humoris, uena pertusa, in hoc affectu iuuat. Nihil enim à pulmonibus cordisq; dextro uentriculo uenæ sectione educi posse, membranarum dextri uentriculi cordis, anatomica

*Aëtius in utroq; cubito per interualla secat.*

RHAZAE DE MOR. CVR. 109  
 anatomica administratio apparēter de-  
 monstrat. § Deinde post uenæ sectionē,  
 reliqua curatio iisdem, quibus pleuritidi  
 medemur, tentanda est.

*De cruentis ac purulentis exptionibus.*

Caput LIX.

**S**anguis si sreatu, aut pauco strepi- *Ex faucib.*  
 tu, qui absque tussi est, educitur, nul-  
 lus erit inde ægro metus, siquidem astrin-  
 gentibus & humorum impetum reprimen-  
 tib, gargarizationibus, in Capite ad  
 anginam præceptis, & ratione uictus te-  
 nuiori, sanari poterit. Vomitu quoq; *Ex uentri-*  
 si erumpat sanguis, nec inde ingens ægro *culo.*  
 formido incuti debet. Venæ sectione nā *Diuersis in-*  
 que, & astringentium usu, quale ompha- *nxi scopis*  
 cinum est, & rhus obsoniorum, atq; his *uarias ue-*  
 persimilibus, per sanari hoc uitij genus *nas in hoc*  
 poterit. Sumito itaque lapidis Armenij, *affectu in-*  
 gummi Arabici, balaustiorum, cinnaba- *cidimus.*  
 ris, thuris, omnium æqualia pondera, &  
 horum drachmas tres simplici discocto  
 cydoniorum succo subactas, propinato.  
 A quibusdam uero sanguis, per circui-  
 tus

## 110 PARA. IN NONVM

tus quosdam, expui cōsuevit, unde non modo nulla noxa illis imminet, uerum etiam id ualeitudini multū prodest, Proinde is minime supprimendus putatur.

*Ex pecto-  
re, à uenaru  
pta, crofa,  
aut aperta.*

Sin autem cum tussi sanguis prorumpit, non immerito formido nos occupat: nihilominus tamen ægri curationem, uenæ axillaris sectione incipies, partita interim sanguinis missione. Deinde subscriptos pastillos potui porriges. Qui cōstant, thuris, cinnabaris, utriusq; drachmis tribus et scrupulo uno, succini drachmis quinque, lapidis hæmatitis, \*terre sigillatæ, utriusque drachmis decem, aluminis drachmis duabus cum semisse, baustiorum drachmis tribus, opij drachmis duabus, rheobarbari Seni tantundem, ex his portulacæ succo aspersis, informantur decem pastilli, quorum quoti die unum succo ocimi maioris, aut portulacæ læuigatum, propinabis. Atsi uehementior morbus extiterit, sanguinisq; eruptio incrudescit, alterum pastillum, ægro somnum inituro, porriges. Crura quoq;

*\* Carent no-  
stra offici-  
na uera.*

*His præci-  
pue ne tus-  
siat, prospici  
es debet.*

## RHAZAE DE MOR. CVR. III

quoque circa inguina, & brachia ad scapulas, aut potius in tenuioribus partibus (utpote magis nervosis et dolorificis) uinculis intercipito, ac unà summas extremasque partes ad reuellendum sanguinē, fortiter infricato. Pectus quoque, precipue si dolore quopiam iritetur, epithematibus ex paulo antè comprehensis pastillis, aceto & aqua subactis, præparatis, crebro illinendum est. Aegri quidem cibus, rhus obsoniorum & omphacinum, eisque per similia admisceto. Item terram

\*Nos lapide Armeniæ portulacæ succo macerato, utemur.

De tabe, quæ phthisis Græcis dicitur.

## Cap. LX.

SI quis partium colliquationem à tussi, quæ ex diuturno morbo fit, aut post crebra cruenta sputa, aut multas puris reiectiones patitur, illi lac asinum utiliter potandum porriges, at si eius lactis facultas

Proprie pulmonum est exulceratio. Gale. humani lac præstantissimam esse asserit.



tas nō detur, caprinum, cui sacchari momentum commixtum sit, offerro. Quod etiam posteaquam aliquid panis illi adieris, aegro esui dabis. Quinetiam si huiusmodi generis lacte capit, illud quoque aquæ loco, quoties sitit, propinabis. Interdum tamen, tenue ac temperatum uinum potandum exhibebis. Cibum uero ex auium & hœdorum carnibus administrabis. Aegrotus præterea ieiunus & à cibo, balneo haudquaquam calido, sed tepente utatur, solioq; dulcis aquæ diutius immoretur. Et inter cetera, ne alius fluat turbeturue, diligenter præcauere aeger debet. Si quidem soluta fuerit, huius pulueris potu constringetur. Accipit autem, gummi Arabici, \* spodij, lapidis Armenij, seminis myrti, singulorum partes æquales, subiguntur omnia in puluerem, & eius uno die drachmę tres cum syrupo albi papaueris, & myrti succo difcocto exhibentur. Hic puluis ad hunc modum in potu administratus, eos qui tussi & cita aluo laborāt, strenue iuuat. Verū huic

\* Subsequē  
tibus capiti  
bus nostratē  
tes officinæ  
ebur cōbu-  
stum acci-  
piunt.

huic interdum, ut maiorem astringendi  
 uim obtineat, utiliter adiiciuntur \* xylo- *\* Sunt quorū  
 caractæ ex Syria, & bdellium ex Mecha rādā astringen-  
 aduectum. Porro si è lactis usu in febrim gentium li-  
 æger rapiatur, ptisana pota substracto la gnorū puta  
 ctæ bene facit. Verum febre cōquiescēte, mina.  
 ad lactis usum rursus pperandum est. Si  
 aut denuo febris molestauerit, lac fugien-  
 dum est, & ptisana quousq; febris abiga-  
 tur offerēda: qua iterum propulsa, lactis  
 usus repetitus prodest. Hęc quandiu ne-  
 cessitas urget, quadam uicissitudine sunt  
 faciēda. Interea uero summo studio, ne  
 alius lubrica fluat, prospiciendum.*

De cordis palpitacione. Cap. LXI.

**S**I febris pulsusq; uelox cordis tremo- *A calida oc-  
 rem concomitatur, egro axillari dex- casione.*  
 tra secū, sanguinem detrahito, & po-  
 tui pastillos ex camphora, succo malo-  
 rum acidorum læuigatos, in potu præ-  
 beto. Hi accipiunt spodij, seminis cucu-  
 meris citrinati, intybi, lactucae, portula-  
 cae, rosarū, sandali albi, omnium æquas  
 portiones, & horum singulis drachmis,  
 H adiçito

*videtur Rhazes cū Grecis in his vitijs parum tribuis se croco.* adijcitur camphoræ pondus trium granorum hordei, ac his omnibus malorū syluestrium acidorum succo detritis, informato pastillos, & eorū quotidie duabus septimanis continuis, drachmam unam malorum syluestrium acidorū succo detritā, in potu porrigito. Porro si hæc præfidia morbo cesserint, lac ex quo butyrū pressum est, ne forte continuus pastillorum usus noceat, potui præbeto. Alimenta uero erūt, pulli ex aceto, & uiræ immaturæ succo, aut alio quopiam acido condimento elixi. Syrupus quoque acetosus appellatus, qui ex saccharo apparatus sit, potui utiliter dat. At si cordis palpitatio febrili uacat, ex moscho compositos pastillos in potu offeres. Qui recipiunt, mastiches, spicæ, ligni aloës, cinnamomi, caryophylorum, galliæ moschatæ, nucis myristicæ, \* cubebe, cardamomi maioris & minoris, corticis citri, singulorum sesquidrachmam, moschi obolum, his uino odoro aspersis, informato pastillos, qui syncopi ac cordis palpitationi

*A frigida causa.*

*\* Nō constat inter se Arabes. nos sub eo nomine semina acris habemus.*

tionis strenue auxiliantur. Electuariū  
 ex moscho sumptuosum, defectui animi,  
 tristitię, cordis palpitationi & fastidio uti  
 lissimum. Mastiches, cinnamomi, semi-  
 nis ocimi maioris, feminis ocymi citrina-  
 ti, feminis melissę, feminis sisymbrii, semi-  
 nis sampuchi, piperis longi, singulorū  
 par pondus, ex his omnib. in puluerē re-  
 ductis, drachmæ decem sumuntur, marga-  
 ritarum cōminutarū, coralli rubri, \* cu-  
 bebe, bombycis crudæ, hoc est nondū in  
 filum cōtortę in textaę, succini, been al-  
 bi & rubri, folij Græcis *μαλαθαίρον* dicti,  
 singulorū quoq; drachmæ decē, moschi  
 Tubabetici syncerioris sedrachma, om-  
 nia hæc, melle maceratarum myrobala-  
 norum chebularum excipito. Hoc sanē  
 electuariū uentriculi frigiditati, ac con-  
 coctricis imbecillitati, mirum in modum  
 prodest.

\* *Mostrarū  
 officinarum  
 semen pro-  
 posito non  
 est inutile.*

De cholera, morbo. Cap. LXII.

**Q**uando dolor punctilis atque ero-  
 dens, tormina, & nausea aliquem  
 inuadunt, & si his adsint, aut subsequan-

*Ab illo si hu-  
 moris co-  
 pia.*

H 2 tur

† Alia, et,  
ut Paulus ac  
Aëtius ha-  
bent.

Humores  
ad superfi-  
ciem retra-  
hit, ac exic-  
canti uacua-  
tione corpus  
humectat.

Relicto  
morbo, sym-  
ptomatum  
curatio.

tur uomitus, † uel uentris per inferiora  
turbatio, aqua modice inferuefacta co-  
piosissima crebro propinari debet: dein-  
de uomere oportet, digito, aut pinna ori  
indita. Item alui ductione adiuuandus  
est stomachus. Sin autē uomitus, & alui  
fluor non conquiesuerint, ad tepentem  
aquam rursus confugiendum est, bilioso  
enim humore circūcirca adhærente, unā  
cum aqua reiecto, stomachus elotus, ac  
leuior redditus, oblatum sibi cibum reti-  
net. Quocirca ubi morbus remitti cœpe-  
rit, æger in balneum potabilis aquæ de-  
ducatur: cui unius horæ spacio, aut pro-  
uirium robore, immoretur. Egressus au-  
tem balneo, & cibus cōcoctu facilibus, ac  
boni succi, ut pullorum carniū expres-  
so, & uino subastringente enutritus, ac  
præcordiis oleo ad id idoneo perunctis,  
somnum sibi conciliare debet. Et licet  
immodica uentriculi perturbatio, suprâ  
infraq̄, ac reliqua grauiâ symptomata su-  
perueniant, non ideo animus abiicien-  
dus erit, quin potius medicinis subsequē-  
tibus

RHAZAE DE MOR. CVR. 117

ribus malo auxilium ferendum est. Initio  
 itaque pastilli ex thure, aqua, aut niue, &  
 malorum punicorum discocto succo la-  
 uigati, semel propinandi sunt. Qui, si uo-  
 mitus ingruerit, secundo quoque porri-  
 gentur. Ad hæc extremas quoque brachio-  
 rum & foemorum partes circa inguina,  
 uincire oportet. Præterea aquã niue in-  
 frigidatam, cruribus & pedibus ab alto  
 instillare, ac etiam in gelidã aquam eas  
 extremas partes immittere, illiç immo-  
 rari, strenue auxiliatur. Venter porro  
 epithematis, quæ sandalis, rosis, campho-  
 ra, gallia moschata, simul rosarum aqua  
 aspersis, cõficiuntur, irrorãdus est. Con-  
 fert item linteum aqua rosacea niue refri-  
 gerata immersum, si uentri opportunè,  
 post epithematum illinitionem appona-  
 tur. Quod posteaç tepuerit, ne concale-  
 factum noceat, abijcietur, et aliud in eius  
 locum superacõmodabit. Aut cataplas-  
 ma ex palmulis, cum uitis agrestis flori-  
 bus, & acacia, item hypocistidis & mali  
 punici succo, est inducendum. Porrò pau-

*Paulus hæc  
 calida fieri  
 præcepit.*

## 118 PARA. IN NONVM

latim uinum uetus decocto malorū puni-  
 corum succo temperatum, propinabi-  
 tur. Et quotienscunq; æger id euome-  
 rit, toties aliud post modicum interuallū  
 offeremus. Cibus autem panis malorum  
 punicorum succo maceratus, unā cum  
 uino subastringente erit: quem si uomi-  
 tu eructet, rursus quousque uomitus se-  
 detur, alium porrigemus. Si uero animi  
 deliquio ob ingentē euacuationem, dis-  
 solutis scilicet spiritibus, æger corripia-  
 tur, moschum hordei grani instar, uino  
 ¶ leuigatum, dare prodest. Proinde si os  
 clausum teneat, ut aperiendum est, & ui-  
 num id infundendū. Sic quoque hædo-  
 rum & pullorum carniū expressum, &  
 mali cydonij succus, uino commixta, uti-  
 liter porriguntur. Præter hæc, ante ægri  
 nares affos pullos discerpere iuuat, si mo-  
 do carniū uaporem non abhorreat.  
 Thus quoque, ad uentriculi retentricem  
 facultatem corroborandam, ore com-  
 manducandū, ut paulatim eger id trans-  
 glutiat, dandū est. Postremo \* bolus Co-  
 raceus

† Alibi adij-  
 citur, uel  
 rob grana-  
 torum.

\* Pli. ut opi-  
 nor, Tauri  
 lyginiū la-  
 p: dē uocat.

racelius camphora conditus, & in pulve-  
rem adamuſſim tritus, atque cum aſtrin-  
gēte uino porrectus iuuat. At omnibus,  
quæ huic malo commoda præcepimus,  
præſidijs, donec uomitus ceſſet, uentricu-  
luſq; alimentum ſentiat, erit inſiſtēdum.  
Poſtquam uero uentriculus cibum am-  
plecti cœperit, cibandus eger eſt, & mo-  
dicum uini ueteris ac odori, potui porri-  
gendum, ſomnuſq; ad reſtituendas uires  
conſiliandus. Paſtilli ex thure, uomitui  
facri. Boli \* Coraceſij, thuris, amborum  
drachmas decē \* cubebe, cardamomi, u-  
triuſque drachmæ duæ cum ſemiſſe: cam-  
phore, galliæ moſchate, caryophylorum  
ſingulorū obolus, hiſ rumicis ſucco de-  
tritjs, informato paſtillos pondere ſeſqui  
drachmæ, ad uomitum mirè efficaces.

\* Nos no-  
ſtro Arme-  
nio, & acri  
ſemine ute-  
mur.

Decoctione quidem mali punici ſuc-  
cum in craſſatum, ad hunc modum appa-  
rabis. Sumito malorum punicorum aci-  
dorum ſuccum, ac per noctem, paulo ſe  
amplius, quod craſſum eſt, in fundum re-  
ſidere ſinito, deinde quod purius eſt, tan

H 4 tiſper



tis per dum mulsi spissitudinem accipiat,  
 decoquito, & diligenter spumam detra-  
 hito, ac dein succo ab igni remoto (tamē  
 adhuc calenti) † menthe uiridis coliculos  
 illi inijcito, eosq; cum succus iam refrige-  
 ratus est, extrahito. Ad huius formā cy-  
 doniorum malorum, & malorum sylue-  
 strium acidorum syrupos, ad retentricis  
 facultatis robur augendum efficaces, fie-  
 ri decet. Si autē uomitus aliquoties plu-  
 rimum inualuerit, proruperitq;, cucurbi-  
 ta magna cum multa flamma, ori uentri-  
 culi affixa, ac uis abstracta, eaq; secundo  
 ac tertio agglutinata, plurimum aegro  
 auxiliatur.

De uentriculi imbecillitate. Cap. LXIII.

Ob frigidā  
 distempe-  
 riam.

**V**entriculi imbecillitas si cum modi-  
 ca siti, & longa cibi in uentriculo  
 mora, ructibusq; acidis, aegrum affligit:  
 & symptomata hæc pauca, neque admo-  
 dum uetera sint; uentriculus pastillis ex-  
 rosis confectis, sanitati restituetur. Quo-  
 rum eger singulis diebus mane denarios  
 duos, & totidem obolos, cum uncia semi-  
 num

RHAZAE DE MOR. CVR. 121  
num incidētium decocto dissolutos, de-  
uorabit. Seminum autem decoctum in  
hunc modum præparatur. Cumini Na-  
bathæ & ammeos utriusque drachmæ  
duæ, in mīna aquæ tantisper dum ea ru-  
bescit incoquuntur; de qua deinde cum  
pastillis ex rosīs ægro mēsurā supra com-  
prehensa propinatur. Pastilli uero ex ro-  
sīs, accipiunt pulueris rosarum rubrarū  
drachmas tres: ligni aloës, spicæ, masti-  
ches, casie lignee, iunci odorati, floris cin-  
namomi, absinthij, singulorum drach-  
mam unam, hæc uino ueteri conspersa,  
in pastillos rediguntur. Verum interim  
æger alendus est cibus quàm minimū hu-  
mectantibus, & concoctu facilibus, pa-  
rumq; excrementijs, ex quorum genere  
pulmenta aromatibus & odoratis inci-  
dentibusq; seminibus præparata, & alijs  
qui simul & calefaciunt & incidunt cibi,  
sunt. Aegrotanti præterea ante cibum  
multa exercitatio, minorq; solito aquæ  
frigida usus, & postquam cibus in uen-  
triculi fundum descenderit, profundus  
H 5 somnus,

¶ 22 PAR. IN NONVM

somnus, illito prius uētre oleo nardino, magnopere iuuant. Vino autem ueteri & mero parce, ne cibus in uentriculo fluctuet, utetur, atque omnino uictus rationem extenuabit. Quod si hæc symptomata inueterauerint in cruduerintq̄, electuarij ex cumino, & electuarij ex thure, utriusq̄ sesquidrachma, cum uncia uini ueteris ac meri diluta, recte exhibebitur, & uictus ratio eadē cum paulo ante præscripta instituetur. Electuarium ex cumino. Cumini Carmaniani drachmæ centum, zingiberis drachmę uiginti \* piperis drachmæ decem, foliorum rutæ, nitri naturalis & integrioris utriusque drachmæ decem, omnia despumato melle excipito, & huius antidoti, si aluus non respondeat, portionem aliquam porrigito. Sin autem cita sit, electuariū ex thure præbe to: cuius cōpositio infra Capite de uentris profluuiō describit̄. § Sed si aluus neque nimis stricta, neque plus iusto soluta fuerit, utrunq̄ electuariū, ut iam diximus, offeret̄. § Porro si hæc inefficacia  
**ant,**

*A maiori causa.*

*Alibi, albi additur.*

## RHAZAE DE MOR. CVR. 123

sint, ferri recrementum uino laeuigatum,  
aut potius quæ ex eo est, compositionem  
dato. Præparabis quidem stercoreis ferri  
compositionem, ad hunc modum. Semi  
nis apij, seminis fœniculi, anisi, cumini,  
ammeos, \* aniuden, origani, ligustici, cã  
ri, seminis coriandri, piperis nigri, pipe  
ris lōgi, cinnamomi, thuris, spicæ, caryo  
phylorum, nucis myristicæ, cyperi, zingi  
beris, singulorum sēsquidrachma, sterco  
ris ferri drachmæ quindecim, omnibus  
uini centuplū addito, & ad dimidias de  
coquito, percolatoq̄. Eius percolati me  
dicamenti ægrotanti drachmas triginta  
ex uino administrato, ac unā uictus ratio  
nem tenuiorem instituito. Hæc tribus se  
ptimanis commode repetuntur, & recte  
ab acidis & recentioribus fructibus, &  
frigida aquæ potu, abstinetur, uinumq̄  
moderate utiliter propinatur. Cata  
plasma ad uentriculum calefaciendū cor  
roborandumq̄ multum efficax. Sumito  
styracem, spicam, iunci rotundi florem,  
absinthium, calamum aromaticum, ma  
stichen,

\* Arbor est  
apud Auic.  
sub nomine  
Assæ.

124 PARA. IN NONVM  
stichen: & ea uino ueteri & cydoniorum  
succo aspersa, in cataplasma uentriculo  
superinducendum, dirigito. Ad hæc op  
time facit uentriculo, ex oleo nardino &  
cyprino frictio, illinitioq;. Quinetiã &  
lana succida prædicto oleo tepete imbu  
ta, linteoq; uentriculo superligata, mul  
tum iuuat. Potui autem ægrotanti ui  
num uetus calidũq;, aut hydromel propi  
nabitur. Mane uero ægrotante ieiuno,  
aut saltem tribus horis ante cibum, diacy  
donium (Arabibus miua appellatum)  
mediocris mystri modo dandum est. Ap  
paratur autẽ ex malis cotoneis pharma  
cum hoc modo. Ex malis cotoneis maio  
ra iucundioraq; & minus acerba, quæ ui  
delicet struthia appellantur eligito: expres  
sumq; eorũ succũ, diem & noctẽ totam,  
quo resideat, relinque, deinde eo percola  
to, ex puriore succo partes duas sumito,  
sacchari partem unã, uini ueteris unam:  
& lente supra prunas, donec mellis spissi  
tudinem recipiãt, decoquito. (hac enim  
crassitudine, stomachica medicamenta  
preparari

## RHAAZAE DE MOR. CVR. 125

preparari solēt.) deinde spumā diligēter auferto. Postea ad singulas totius libras accipies, zingiberis, spicæ, cinnamomi, caryophylorū, singulorū drachmā unā, mastiches drachmas duas: quæ omnia in puluerem tenuissimum detrita, lineoq̄ panno illigata, adhuc feruenti decoctio inijcies, & quum à prunis amotum refrigerit, linteum diligenter expressum eximes, ac medicamen ad hūc modum usui futuro recondes. Quod si concoctio nis offensæ adsint, cibi fastidiū, nidorosi oletosiq̄ ructus, & sitis uehemens, uocatum cotoneorum malorum acetosum syrupum propinabis, quem ad hunc modum conficies, Succu cotoneorum acidorum pars una, sacchari albi totidem, acetu albi ac perlucidi quarta pars, omnia simul tantisper dum iustam spissitudinem obtineant, decoques. Sanè hic syrupus uentriculum corroborat, & præterquam quod eius munia ad actionē excitat, uehementem quoque eius inflammationē & estum mirifice reprimit. Aegro autem  
cibus,

Gal. & Alexan. pulueres inijciūt.

A calida in temperie.

cibus, qui simul & acidus ac austerus sit, preparabitur, cuius generis est caro cum immaturarū uuarum & malorum syluestrium acidorum expresso, & \*ribes decocta, & columbæ quoque uentrem mentha infartum habētes, cum momento salis & omphacino decoctæ, aliâque aciditate & austeritate his correspondentia, alimenta sunt. Præterea puluis hic crebro fumendus offertur. Qui accipit, rosarum rubrarum drachmas decē, spodij drachmas tres, feminis coriandri drachmas quinque, huius pulueris drachmæ duæ succo malorum punicorum acidorum, & syrupo acetoso cydoniorum insparsæ porriguntur. Caterum si paulo ante dictis symptomatibus corporis macies inflammatioque adsint, laborant lac & hordei decoctum propinetur, ac herbis humectantibus refrigerantibusque, ex quorum genere lactuæ, maluæ, cucurbitæ & citrinati cucumeres sunt, æger enutritur, non nimis liberaliter tamen. Iam etiã hœdorum & lactantium agnorū carnes,

\* Nos Acetosa uocata herba utimur.

A sicca & calida in temperie.

&

& recentes in petrosis aquis degentes pisces, ægro ex usu sunt. Ad hæc balneum dulcis aquæ, tepentis, quotidie conscendat, solioq; ad tempus insideat. Vinum etiam perlucidum & perquam dilutum bibat, ac subinde quieti se det, motumq; omnem & exercitium fugiat. In summa, uictus ratio, ac reliquum uiuendi genus tale sit, quod obœsilitatem pariat. Sed si hunc affectum inflammatio, æstusq; uehementissimus cõcomitetur, uentriculo refrigerantibus inunctionibus, ut oleo quod immaturæ oliuæ fuderunt, & melino, atque uiolacei momẽto succurres, & hordei decoctum potui præbebis, ægro tantiq; eandem medendi rationem cum hectica feбри correptis, institues.

*De oris uentriculi dolore, ac inflammatione.*

Cap. LXIII.

**S**I oris uentriculi dolorem, eiusdẽ subuersio, & erosio, nauseaq; subsequantur, egro liberaliori aqua modice incalēfacta porrecta, ut uomat (digito, aut pinna oleo madente, in fauces inserta) præcipiemus.

*Ab intensiore  
re intemperie.*

*Abq; infla-  
tione calido huius  
more.*



piemus. Caterum si hoc inualidum fuerit, alius hiera picra, ut in uentriculi tuni-  
cis impactum succum expurgemus, du-  
cenda est. Accipit autem amarū hoc me-  
dicamen, pulueris rosarum rubrarū, spi-  
cæ, mastiches, ligni balsami, fructus bal-  
sami, cinnamomi, casia lignea, afari, sin-  
gulorum drachmas quinque; aloës ruffi  
coloris, iocinorisq; modo cōcreti, duplū  
omnium, quod diligenter detritum, alijs  
simplicibus medicaminibus leuigatis, &  
incerniculo extenuissimis fetis, aut feri-  
co constructo, cribratis, commisceetur,  
atque rursus omnia simul cum alq̄e con-  
teruntur. Huius autem quantitas, ab au-  
reis duobus ad denarios duos usq; offer-  
tur. Laboranti quoque quotidie panem  
uino austero, & mali punici succo supra  
descripto, cotoneorumq; acidorum syru-  
po maceratum, præbeto. Si autem do-  
lori acidorum & flatuorum ructuum  
copia, uentriculiq; distētio, ac singultus  
affuerint, exhibeto electuarium diacymi-  
nū, & diacalamēthes, & alia consimilia,  
quibus

*Differt à  
Gal. 7. Me-  
thodi.*

*Alibi à .ij.  
ad aureos  
ij. legitur.*

*Ob frigidū  
succū et fla-  
tus.*

*Nō inuili-  
ter hæc præ-  
cedet, pitui  
est humoris*

*uacuatia.*

quibus flatuosos spiritus discutiendi uis  
 adest, quæ Capite de intestini laxioris ui-  
 tij prælijs persequar. Cibi autem agri  
 erunt pulmenta aromatib. & calefacien-  
 tibus feminibus apparatus. Potui quidē  
 pauxillulum uini ueteris et meri propina-  
 bitur. Exercitia quoque, & medicamen-  
 tofarum aquarū, aut in laconico balnea,  
 non mediocriter iuuant. Quinetiā uen-  
 triculiū penicillo, nardino oleo, aut quo-  
 piam alio calefaciente, & subastringēte, *Cum inflā-*  
 imbutō, fouere conducit. *matione.* Porro si oris  
 uentriculi dolorem, febris unā cum ma-  
 nifestæ inflammationis indicijs, & æstu,  
 qui tactu de iudicari possit, subsequatur,  
 mox inter curationis inītia, axillari dex-  
 tra secta, sanguinem detrahito, et dolenti  
 loco sandala, rosas & camphoram, simul  
 rosarum aqua & cotoneorum succo leui  
 gata, superaccommodato. Aegro uero  
 præter ptisanam nullum cibum offerre  
 debes, proinde à carniū esu, uino & com-  
 positionibus ex melle cōfectis, in primis  
 arcendus est. At corroborādī gratia, in-  
*sinuo* **I** *terdum*

*Hodie epi-  
 themata li-  
 quidiora,  
 quàm apud  
 ueteres, pa-  
 rantur.*

130 PARA. IN NONVM

terdum malorum punicatorum acidorum succum, & eum qui ex reliquis fructibus frigidam & astringentem uim possidentibus, igni aut sole decoquitur, utiliter propinabis. § Siquidem inflammatio oris uentriculi, & iocinoris, astringētia desiderant, nam si solo relaxante praesidio curationē tentes, uitae periculū intuleris. § Aestus porro uehementia remissa, cassiam fistulam intybi succo dissolutam, & simul cum eo decoctā, ac diligenter à spu ma liberatam, aegro offerre conducit.

*Scirrhi uentri curatio.*

Cum uero longius morbus prorogatus fuerit, et ardor omnino quieuerit, inflammatio autem in duriciem & scirrhuū deciderit, emplastrū istud affecto loco superligato. Violarum aridarum drachmae decem, rosarum rubrarum drachmae quinque, spicae odoratae, mastiches utriusque drachmae tres, cyperi, iunci rotundi floris, calamī aromatici, cuiusq; drachmae duae, farinae foenograeci drachmae uiginti, florum chamameli, seminis althaeae, hordeaceae farinae, singulorū drachmae decem.

omnia

omnia feminis lini succo asperfa, in em-  
 plaftri formā redigito, ac horis quatuor  
 ante ciborum ingestionem, uentriculi re-  
 gioni superinducito, uentriculo tamen  
 prius nardino oleo foto. Deinde conco-  
 cto, & uentriculo depulfo cibo, uentri-  
 culi locus lana nardino oleo immerfa,  
 uti iuffi irrorandus eft, præfcriptumq̃  
 cataplafma rurfus inducendum. Confe-  
 ctio quidem olei, feu unguenti nardini  
 fimplicis, in hunc modum fe habet. Olei  
 \*glandis unguentariæ, quod proprie ba-  
 laninū dicitur, libra, fpicæ femuncia, ma-  
 ftiches, cofti, cyperi, iunci rotundi floris,  
 calami aromatici, fingulorum drachma  
 una, uniuersa hæc in pollinem fubacta,  
 dictoq̃ oleo iniecta, foli feptimana una,  
 in uafe obturato ore, exponūtur, & dein-  
 de percolantur. Porrò feces fordesq̃ ma-  
 nibus inter colandum hærentes, cataplaf-  
 matibus propofito uitio dicatis, admix-  
 tæ, plurimum iuuant. Cæterum oris  
 uentriculi inflammatione in tantam ue-  
 rufitatē protracta, ut in abfcelfum erum-  
 pat,

Oleum nar-  
 dinum.

\* Mesuas  
 magis pro-  
 bat fejami-  
 num.

Abfcelfus  
 cura.

Arculanus  
Rhazen hic  
ventriculi ce-  
lema cura-  
e autumat.

pat, pastilli ex spica propinati, optime fa-  
ciunt. Accipiunt quidem hi, florū iun-  
ci rotūdi, calix lignee, theobarbari Seni,  
calami aromatici, spica, cuiusq; drach-  
mas tres: croci, myrrhae, anisi, costi, pipe-  
ris, singulorum drachmam unam, bdellij  
uarij drachmas tres, mastiches drachmas  
duas, ammoniaci drachmam unam, fin-  
guntur ex his pastilli pōdere sesquidena-  
rij, quorum quotidie unus sapa detritus  
exhibebitur. Emplastrum ad prædictū  
affectū ualde efficax, quod hac ratione  
præparatur. Bdellij mollis drachmæ de-  
cem, ammoniaci drachmæ quinq;, glan-  
dis unguentariæ drachmæ decem, apij se-  
minis tantundē, spica, mastiches nigrae,  
utriusque drachmæ quinq;, cerae drach-  
mæ tres, olei nardini drachmæ quinde-  
cim, gummi uino subastringente diluun-  
tur, & eis omnia cōmixta, in emplastrum  
digeruntur. In uentriculi itaque & ioci-  
noris affectibus profligādis, medico eru-  
dito & natura sagaci opus est, ut qui ac-  
curatē ipforū dispositiones distinguere,  
ac

ac curare queat. Nihilominus quātum-  
uis succinctus fuerim, Capita et rerū sum-  
mas, quæ his affectibus presidio esse pos-  
sent, hoc Nono libro persecutus sum.

De singultu. Cap. LXV.

**Q**Vando singultus post crassorū ci-  
borum ingestionem, aut uini per-  
quàm diluti copiosiorē usum, aut cibum  
alioqui sua nimia humiditate flatuosum,  
inuadit, aqua calida, cui cuminum, men-  
tha, mentastrum & thuris pauxillulum  
incocta sint, crebro in potu offerēda est,  
& agro, ut sibi somnum conciliet, præci-  
piendum. Ventri quoque, uesicę, ac sac-  
culi huiusmodi decoctis seminibus, &  
herbis calefacientib. discutientibusq; im-  
pleti, superligandi sunt. Quinetiā & eis-  
dem uentriculus opportune irrigabitur.  
Aeger autē tenuiori uictu, eoq; inciden-  
te, enutrietur. Ac cum plusculis diebus  
moderatiōri cibo agrotantem alueris, in  
laconicum primam balnei domū subin-  
de ipsum deduces. Item insecutis aliquot  
diebus, illi siccantia & flatus discutientia

A flatu, et  
crudo suc-  
co.

Profuerit  
ante huius  
usum cuo-  
muisse.

I 3 alimenta

## 134 PARA. IN NONVM

alimēta, modice tamen, præbebis. ē quo-  
rum albo sunt, pulmenta aromatibus se-  
minibusq; calefacientibus ac incidenti-  
bus condita, & assi montani passeruli.  
& pauxillū uini meraci potui ei tum offe-  
res, ne forte uini copīa, cibi fluctuationē  
in uentriculo creet. At si hæc non usque  
adeò ualida fuerint, pastillosex thure por-  
rigo. Quos ad hunc modum conficies.  
Accipe thuris drachmas quinque, inulæ  
campanæ drachmas tres, mentastri, folio-  
rum rutę aridorum, utriusque drachmas  
duas, seminis † sisimbrij drachmas tres et  
semissem, his detritis, & hyssopi succo su-  
bactis, informato ex illis pastillos sesqui-  
drachmæ pondere, & eorū unum in die,  
cumini decocto læuigatum, propinato.

Ex siccitate. Porro si singultus cum tremore, aut  
nausea, aut siti, aut oris summa ariditate,  
post febrim superuenerit, aquam modi-  
ce calidam, non liberaliter, sed pedeten-  
tīm forbūlandam dabis. Et si tali auxilio  
haud quaquam malū propellitur, aqua  
cui hordeum incoctum sit, unā cum oleo  
amygdæ.

† Alias, ne-  
mē, hoc est  
scrpilli, aut  
etiam si-  
simbræ.

amygdalarum dulcium porrigenda est. Quinetiam uertebras ceruicis & dorsi, humectante oleo tepente perungere, infricareq̄, non mediocriter cōducit. Aegrotanti uero potus, ex herbæ pulicaris seminis & iuleb uiolato, & malorum punicorum dulcium succo, parabitur. Præter hæc singultui, qui ex repletione est, ac sternutationi spiritus compressio quam plurimum confert.

De canino appetitu. Cap. LXVI.

**S**I quis assidua fame crucietur, & tamē cibis assumptus ita grauet, molestus q̄ sit, ut eū mox aut uomere, aut per inferiora deijcere cogatur, oryza illi utiliter edenda porrigitur: cui sanies ab agno in fornace asfo emanans, pinguedinis loco commixta sit. Ad hæc caudæ, & agnorū pedes, & qui his uiscositate & pinguedine respondēt cibi, accommodē offeruntur. Vinum quoque uetus, quodq̄ impense calefaciat, liberaliter (uel non sitiēti agro) haustum, optime facit. Deinde his deuoratis, ut ingesta euomat, egrotā-

Ob eā causam singultibus timor incutitur.

Ab acido succo.



*Ab immodi  
ca trāspira  
tione, aut ca  
lido succo.*

ti præcipiendum. Ac isto curationis modo, tãtis per dum ab omni malo liberetur æger, ut utatur, consilium est. Sin uero à cibo nulla molestia afficiatur, neque per uomitū, neque per aluum illum deiciat, carnes bubulæ, & alia cōcoctu peruiacia edulia, porrigenda sunt. Quocirca triticum pultis instar elixum, & oryzacum lacte decocta, accommode exhibentur. Potui autem, gelida aqua detur. Quinetiam optima ratione æger in aëre frigidiori ac perspirabili delitefcet, & ab omni acidorum, & austerorum, & acerborum atque acrium esu, quum ea scilicet appetitum prouocent, abstinebit, folisq; dulcibus ac glutinosis, concoctu tamen peruiacibus, enutrietur.

*De iocinoris dolore. Cap. LXVII.*

*Ex intēpe  
rie aut hu  
more cali  
do.*

**S**I decoloratus aliquis, corporis ineptum habitum, ac dolorem dextri lateris sub hypochondrijs, ad nothas ac potestas costas, comites sibi habuerit, & si color, quo suffunditur, flauus conspicitur, magna quoq; oris ariditas, ingensq; sitis

## RHAZAE DE MOR. CVR. 137

sitis agrum torquent, hordei decocti ius,  
 & herbarum infrigidantium succi, syru-  
 po acetoso ex albo saccharo decocto di-  
 luti, utiliter porrigentur. Huius autem ge-  
 neris herbarum sunt, intybum, solanū,  
 \* amplexicaulis. A foris autem, epithe-  
 mata, ac aspergines ex duobus sandalis,  
 rosarum floribus, camphora, et momēto  
 spicæ, in aqua rosacea simul detritis, ad  
 hunc modum accommodabis. Accipies  
 linteum aliquod, & hoc liquore refrige-  
 rante & subastringente imbutum, loco  
 laboranti superinduces, & priusquam te-  
 pescat, illo amoto, aliud in eius locum ap-  
 plicabis, partemq̄ diligenter irrorabis.  
 Potui uero malorum punicatorū succus,  
 ac similes decoctione in crassati succi, fa-  
 cultatem refrigerandi obtinentes, exhibi-  
 ti profunt. Quare aeger à uino, & his que  
 melle condiuntur, ac calefacientibus in-  
 cidentibusq̄ cibis, arcendus est. Item pa-  
 stilli ex acidæ spinæ baccis porrecti, non  
 mediocri auxilio sunt. Qui recipiūt, suc-  
 cū baccarum acidæ spinæ drachmas de-

\* Theo-  
 phrastus cu-  
 scutā lino-  
 derā uo-  
 cat.

quibus da-  
 mnum in-  
 abigit

I 5 cem,

## 138 P A R A. I N N O N V M

cem: seminis intybi, seminis cucumeris trinati, seminis portulacæ, cuiusq; drachmas tres, rosarum drachmas duas, rheobarbari Seni drachmam unam, spicæ fedrachmam, redigito hæc in pastillos, pondere drachmæ & semissis, atque eorum unum syrupo acetoso, saccharo præparato, aut malorum punicorum succo solutum, propinato. Aluum quoq; si necessitas urget, succo fructuum, ut prunorum & tamarindorum, ac saccharo albo, deijcito. Porro si uitiatus color, iocinoris dolorem subsequens, cum uirore albicâs, mediûsq; inter colorem colliquatione laborantium partium, & colorem tumidarum, extiterit: præterea si ægrotati aluus laxa fluxerit: & palpebrarum, ac summorum partium tumor, digitorum tactui cedens, ac laxitas affuerint: pastilli ex rheo barbaro Seni, syrupo acetoso melle composito subacti, porrigendi sunt. Hi consistant, mastiches, succi eupatoriij, succi absinthij, seminis foeniculi, anisi, singulorû drachmis duabus, rheobarbari Seni drachmis

*Ab intemp.  
aut materia  
frigida.*

## RHAAE DE MOR. CVR. 139

chmis decem, hæc absinthij succo detri-  
ta in pastillos pondere drachmæ unius et  
semiflis digeruntur: quorum exigente usu,  
unus quotidie commemorato syrupo di-  
lutus, propinabitur. Præter hæc, empla-  
strum ad præsentem affectum efficax, ad  
hunc modum præparabis. Accipito spi-  
cam, mastichen, cyperum, iunci rotundi  
florem, calamum aromaticum, crocū &  
myrrhā: deinde myrrham unā cum ma-  
stiche in uino odorato subigito, ac alijs  
his commixtis, finge emplastrum, iocino  
riq; superinducito. Interim uero à cibis  
crassis, refrigerantibus, multamq; pitui-  
tam gignentibus, ægrotātem arceto. At  
si huiuscemodi inefficacia fuerint, pastil-  
los ex cācāmo \* radicū decoctorum iure  
solutos, exhibebis. Recipiunt autem pa-  
stilli ex cācāmo : cācāmi, rheobarba-  
ri Seni, utriusq; drachmas tres: spicæ, se-  
minis apij, ammeos, mastiches, iunci ro-  
tundi floris, baccarum iuniperi, amygda-  
larum amararum, costi amari, rubiæ fa-  
tiuæ, succi eupatorij, asari, aristolochiæ  
rotundæ.

Emplastrū  
de spica.

\* Hodie no-  
strates offi-  
cinæ laccā  
uocant.

## 140 . . . PARA. IN NONVM

Quidā ad-  
dunt sibi-  
nam.

rotunde, gentianæ, cuiusq; sesquidrach-  
mam, cancamo & eupatoriū succo uino  
subactis, reliquisq; medicaminibus illis  
admixtis, formantur pastilli, pendentes  
singuli drachmam & semissem. Radi-  
cum quidē ius, hac ratione preparatur.

Infusio  
... ..

Corticū radicū apij, corticum radicis fœ-  
niculi, utriusque drachmæ decem, sem-  
inis apij, seminis fœniculi, iunci odorati  
floris, ammeos, singulorū drachmæ quin-  
que: rosarum rubrarū drachmæ tres, spi-  
cæ odoratæ tantundem, omnia in aquæ  
libra ad tertias bullūtur, ac ita decoctum

Hodie medi-  
ci decoctio-  
nes suas ma-  
gis dilutas  
parant.

ius cum commemoratis pastillis assumi-  
tur. At si inflammatione abscessuue  
iecur cōflicteretur, eisdem auxilijs, quibus  
oris uentriculi inflāmatiōi & abscessui  
medemur, illi succurrendum est.

De morbo regio, qui & insep & dicitur.

Cap. LXVIII.

**M**Orbo regio si febris affuerit, inty-  
bi & solani succi, & hordei deco-  
cti ius, potui offeruntur: & cucurbitis do-  
mesticis, atriplice, cucumeribus citrina-  
tis,

tis, & alijs herbis infrigidadi facultate his  
 paribus, æger enutrietur. Iocinori uero  
 emplastrū inflammationē arcens, quod  
 duobus \* sandalis conficitur, illigato, ac  
 aluum prunorum tamarindorum succo  
 & saccharo deijcito. Quæ si minus effica  
 cia fuerint, pastillos ex camphora succo  
 punicorum malorum acidorū detritos,  
 præbeto. Pastilli de camphora. Saccha  
 ri, spodij, rosarum rubrarum, cuiusque  
 drachmæ tres; feminis intybi, feminis cu  
 cumeris citrinati, feminis cucurbitæ, fe  
 minis lactucae, feminis portulacæ, sanda  
 li rubri, cuiusq; drachma una. fingito ex  
 his solani succo, aut illi cõsimili subactis,  
 pastillos drachmas duas pendetes, & ho  
 rum unum quotidie cum camphoræ obo  
 lo, aut minus pro morbi ac uirium ratio  
 ne, propinato. Si æger sanguine plenus,  
 multo tempore uenam non secuit, uena  
 axillari dextra pertusa, sanguinem detra  
 here expedit. Quod si arquatus citra  
 febrim contingat, aluum catapotijs his,  
 (postquam leuiora tentaueris) recte pur  
 gabis.

\*Mesuasce  
 rotū sanda  
 linū quoq;  
 describit.

-mbrū dñi  
 -mbrū dñi  
 -mbrū dñi  
 -mbrū dñi

-mbrū dñi  
 A meatuuum  
 obturatiōe.

-mbrū dñi

gabis.

142 PARA. IN NONVM

gabis. Aloës drachma una, scammonij  
 sesquibolus, agarici scrupula duo, succi  
 eupatorij scrupulum unum, hæc intybi  
 succo excepta in catapotia dirigito, &  
 \*una dosi exhibeto. Insuper pastillos ex  
 cancamo, radicum incidentium decocto  
 subactos, præbeto. Porro si bilis suffu-  
 sio in morbo regio oculos dehonestare  
 non cessauerit, æger subinde acetū acer-  
 rimum olfaciet, & naribus folio dulcis  
 aquæ insidens idem attrahet, & mirifice  
 iurabitur, si pressis naribus paulisper id  
 contineat. Oculis quoque ictero cum fe-  
 bri laborantis, aqua rosacea instillanda  
 est. Præter ista arquato implicito, in  
 mali declinatione, tribus hebdomadibus  
 lactis serum potui porrectum, non par-  
 tum præstat auxilium.

\* Satisfecerint duabus vicibus.

Non inutiliter in eo incidentia manerantur.

De aqua inter cutem, quæ ὀδρωσὶ Græcis dicitur. Cap. LXIX.

nonius.

**C**Vm post iocinoris dolores & fe-  
 bres, abdomen intumescere cœpe-  
 rit, ac fumen (quod spaciū inter umbili-  
 cum & pectinē est) prominere, & huius  
 regionis

regionis cutis extenuari albescereq; uisa fuerit: & quum concusso abdomine talis auditur sonus, qualē percussū uterī aqua non omnino pleni, elidere solēt: sicq; unā cum his urinā rubrā sint, parua adipiscēdā sanitatis agro spes reliqua est, potissimum si is uirūm robore destituatur. At cui uires constant, et uenter quoq; aridus est, catapotia ex \* rheobarbaro Seni, cha- \* Nos no-  
 maeleam in earum mixtura recipientia, stro utemur  
 porriguntur. Habent autem huiuscemodi catapotia, rheobarbari Seni, succi eupatoriij, seminis intybi, cuiusq; drachmas tres, agarici drachmas quinque, chamaelea drachmas decem, finguntur catapotia, quae ut plurimum quantitate drachmarum \* durarum cum semisse, accōmo- \* Suffecerit 3. i. et. f.  
 de singulis septimanis exhibentur. Ceterum uiribus prostratis, pastillos ex chamaelea prebeto, qui constant, seminis intybi drachmis decem, chamaelea drachma una, agarici scrupulis duobus, succi eupatoriij tantundem: rosarum, † seminis cucumeris citrinati, utriusque drachmis



¶ 44 PARA. IN NONVM

mis duabus cum semisse, hæc in decē pa-  
 stillos redigito, ac eorum unum in die sy-  
 rupo acetoso ex saccharo preparato dilu-  
 tum, offero. Aluo autem cita profluente,  
 pastillos ex acidæ spinæ baccis, syrupo  
 acetoso læuigatos, porrigito. Aegrotan-  
 tem præterea montanis auiculis assis, &  
 carne minutim concissa, ac cum oui uitel-  
 lis frixa, enutrto: & potui succum coto-  
 neorum, cum pari sacchari portione &  
 quarta parte aceti decoctum, administra-  
 to. Verum si aluus plurimum lubrica fue-  
 rit, ut symptomati occurras, impermix-  
 tum cydoniorum malorum decoctū suc-  
 cum propinato. Cæterum si à morbo uri-  
 narum rubor, & æstus, & cutis suppal-  
 lidus coloris suffusio abfuerit, subsequen-  
 tia catapotia magno auxilio deglutuntur.  
 Constant autem hæc: Chamælee, sa-  
 gapeni, utriusque sedrachma: sacchari,  
 columbarum ruralium fimi, utriusque  
 obolo uno. Largiter quidem hæc catapo-  
 tia aquam ducunt, ac per inferiora miri-  
 fice protrudunt. Pastilli præterea ex can-  
 camo,

\* Illud aui  
 mei manu  
 scriptū exē  
 plar nō ha-  
 bet.  
 Vna uice  
 hæc multis  
 porrigitur

camo, radicum incidentium elixarum iure diluti, propinandi sunt. Emplastrum quod aquæ subter cutem speciei, ἀσκήτης ab utero sic dictæ, strenuè auxiliatur. Farinæ hordeacea, cyperi, stercoreis † ouilli veteris, nitri naturalis, lapidis Armenici, cuiusq; æquæ portiones, sulphuris uiui momētum, quibus omnibus muria, aut aceto mulso subactis, toti abdomini emplastrum adaptatur: quod insigni ui in exiccandis humoribus pollet. Cæterū si in palpebris, alijsq; summis corpōris partibus, digitorum tactui cedētes tumores (ἀιδήματα Græci uocant) oboriantur, & testes quoq; ac scrotum intumescant, & facies unā cum totius corporis habitu laxa spongiarū instar, & albicans pitui tosaq; emortui similis appareat, hydro-  
 pis species, ἀνασάρκα, & λευκοφλεγματία appellata, hominem affligit. Aegro itaq; hac implicito, pastillos ex cancamo radicū decocto subactos, porrigito. Aluū autem singulis septimanis, catapotijs ex rheobarbaro subducito. Ad hæc, egrum

† Aliàs, bu-  
 buli.

καοσάρκα.

Pillule Me-  
 sues de ra-  
 ued sūt for-  
 tiores.

K fabulo

fabulo arenaq; excalesfacta faburato; ac  
 uacuo cibus uentriculo exercitium uehe-  
 mens & frequens in sole, & famē sitimq;  
 agrotanti praescribitur. Porro si uenter  
 inflatus distentusq; fuerit, & concussus  
 tympani crepitum ediderit, aquae subter  
 cutem specie, *τυμπανίτην* dictam, adesse  
 certū est. Qua qui implicitus est, ab om-  
 ni olerum usu, & flatus gignētibus cibus,  
 circuncidendus est: & abdomen eius in-  
 dies panico tosto, & momento salis, ac  
 furfurib; sacco insutis, fouendū. Huic  
 praeterea cucurbitulae leues, cum multa  
 flamma crebro toti uentri suffixae, maxi-  
 me profunt. Quinetiam remedia discuti-  
 tiendis digerendisq; flatibus inscripta, et  
 ad urinas efficaciam, eligenda sunt. e quo-  
 rum genere sunt diacymintum, et ex bac-  
 cis lauri electuariū, quod Capite de ilei  
 morbi curatione prosequar. Deinde huic  
 quoque agrotanti multa exercitia, & fa-  
 mes ingens, strenue auxiliantur. Sic quo-  
 que collyria, seu glandes flatulentis spiri-  
 tibus amouendis dicatae, & alia à me. Cap-  
 pite

p̄ite ad colī intēstīni uitū remedia descri-  
benda, quāmaxime accommoda cen-  
sentur. Proinde clysteribus ex huiusce-  
modi glandibus liquore quopiam detri-  
tis, uti expediet. Item uentrem etiā aspe-  
ro līneo, tantisper dum rubor excitetur,  
perfricare, & clysteres ex oleo rutaceo in-  
fundere, consilium est.

De lienis dolore. Cap. LXX.

**S**plenis dolorem si æstus, & urīnæ ruf-  
sæ, febrisq; subsequantur, iſrā scripto-  
rum pastillorum portionem: ægro porri-  
ges. Pastilli ex agno casto. Seminis agni  
casti, fructus tamaricis, utriusque drach-  
mæ decem, seminis intybi drachmę quin-  
que, seminis portulacæ tantundem, his  
aceto acri detritis, informato pastillos, &  
eorum unum drachmarū trium ponde-  
re, aut aliās pro morbi magnitudine, sy-  
rupō acetoso ex saccharo preparato, sub  
actum, porrigito. Si uero ægrotantis ue-  
næ uniuersi corporis sanguine distentæ  
turgent, uenam axillarem sinistram, aut  
\* eam, quæ à cubiti uenis ad sinistram ma-  
\* Ea uix so-  
lus axillaris  
uen. eramus  
est.

K 2 num,

num, inter paruum ac anularem digitos  
 repit, secabis, & sanguinem quantū pro  
 laborantis corporis habitu satis esse con  
 ieceris, fluere lines. Lienī quoq; frustum  
 huius generis pāni, quem uulgo filtrum  
 uocant, aceto excalesfacto imbutum ap  
 ponatur, & a dulcium crassorumq; esu  
 æger abstineat. Porro si absque ardo  
 re quopiam lienis dolor ægrotantem tor  
 quet, pastilli de capparib. appellati, sum  
 mē auxiliantur. Recipiunt autem: corti  
 cis radicū capparīs, seminis agni casti,  
 utriusque drachmas decem: scolopēdrii  
 drachmas septem: aristolochiæ tenuis, fo  
 liorum rutæ, seminis nasturtij, acori, ni  
 gellæ, singulorum drachmas tres, ammo  
 niaci drachmas tres, ammoniacum ace  
 to diluitur, & ceteris omnibus eo asper  
 sis, finguntur pastilli drachmarum dua  
 rum pondere, quorum unus syrupo aci  
 do melle composito, & radicū decocto  
 dissolutus, potui datur. Porro si inten  
 sus tumidusq; splen absque magno gra  
 uitatis sensu fuerit, & cum premitur rugi  
 tus

*1. reperit, et  
 saluata  
 uicinat*

*A frigido  
 humore.*

*Ex flatu.*

tus aliquis sub tangentis manu auditur, iam comprehensos pastillos, radicū decocto dilutos, prabeto. Potui autem uinum uetus ac meraculum porrigito, & quoad fieri potest, frigida usum subduci to. Emplastrum ad lienis flatus, eiusdemq; duriciem, optimè faciens. Foliorum rutæ drachmę decem, nitrī, mentastri aridi, utriusque drachmæ tres, ammoniaci drachmæ septem, ammoniacum uino ueteri subigito, & eo cętera perfusa in emplastrum digerito, lienisq; regionī fascia aut instita illigato.

De morbis intestini plenioris, & tenuioris.

quorum hic ἰλεϑ, ille κώλιϑ Græcis dicitur. Cap. LXXI.

**S**I uentris dolor, unā cum eiusdē astrictione, & ciborum fastidio offendit, absque tamen omni ardore & febrī, ea quæ aluum citra uomitus iritationē ducunt, porrigēda sunt: cuius notæ electuarium ex gallia moschata est. Quod accipit, mastiches, caryophylorum, zingiberis, piperis nigri, piperis longi, cinnamo

ileus à frigido humore.

Non inutilis erit intermitia, uel lenis clyster.

K 3 mi,

*\* Pastilli  
sunt, & ad-  
feruntur ex  
oriēte non  
bene parati,  
Manard.*

*Videtur in  
hoc medica-  
mine ali-  
quor drach-  
mae turbit  
deesse.*

mi, nucis myristicæ, \* galliæ moschate,  
singulorū drachmas decē, scāmonij dra-  
chmas decē, deinde exprimūt cotoneorū  
acidorū et recētū succus, qui equa mellis  
portione, donec medicinarū pōderi am-  
bo respōdēt, cōmiscet, & deinceps simul  
omnia pedetentim supra prunas, ad de-  
bitā crassitiē decocta, futuro usui repo-  
nūtur. Quantitas autē præsēntis antidoti  
una uicē exhibēda, est inter drachmas  
duas, et duas cum semisse. Quod si dolor  
uehementi ciborum nausea uacat, & æ-  
ger deuorata medicamina uomitu haud  
quaquam diuertit, catapotia ileo morbo  
sacra exhibentur. Quæ constant, cucur-  
bitæ syluestris, sagapēni, utriusque drach-  
mis decem, scammonij drachmis tribus  
& scrupulo, finguntur catapotia, ex qui-  
bus oboli quinque administrantur. hæc  
etenim tenuioris intestini morbū depel-  
lunt. Cæterum si ileus intantum seuiat,  
ut aluum ducentia pharmaca inualida  
sint, ægrotanti hanc infra scriptam glan-  
dem subdes, Salis cibarij drachmę decē,  
medullæ

medullæ cucurbitæ syluestris drachmæ  
 duæ cum semisse, scammonij tãrundem.  
 his melle læuigatis, informato glãdes ad  
 longitudinem longaonis, ac ita subici-  
 to. At si nihil auxiliij præstiterint, clysterẽ  
 hunc lenem (ut sua mora feces molliat)  
 infundito: qui accipit, ficus caricas quin-  
 que, furfuris manipulum, altheæ tantun-  
 dem, betæ folia decem. hæc linteo illiga-  
 to, ac in libris duabus aquæ ad dimidias  
 decoquito, deinceps decoctũ ius per lin-  
 teum colato, & sesquidrachmam nitri, &  
 olei sesamini unciam unam illi adijcito,  
 sicq; apparatus enema inijcito. Verũ si  
 hoc infusum acrius reddi desideres, iam  
 comprehensẽ glandis drachmam & se-  
 missẽ ei contemperato. Clyster stre-  
 nue facies subducens, & superfluos suc-  
 cos abstergens: quo aluo medicamentis  
 non cedente, neque aliàs illis adiuranti-  
 bus utimur. Carnis cucurbitæ syluestris  
 drachmẽ decem, centaury drachmẽ quin-  
 que, utriusque cyclaminis speciei drach-  
 mẽ duæ: mentastri, rutæ, origani, cuiusq;

K 4 manipulus



## 152 PARA. IN NONVM

\* Sic Leoni  
cenus alchi-  
tram uocat.

manipulus unus, omnia in aquae libris  
tribus ad duas tertias decoquantur, &  
percolato decocto, commiscetur \* resi-  
na cedrinae, mellis singulorum drachmae  
tres, castorei, sagapeni, opopanacis, praescriptae  
glandis, cuiusque drachmae duae,  
omnibus pistillo cotusis, & iam tepidis,  
clyster inijcitur. Ceterum si aluus indura-  
tum, ac quasi in nucleos diuisum stercus  
(quod Graeci *σύνβαλον* appellat) minime  
egerit, in clysteris usu, donec illud expel-  
latur, persistendum est. Siquidem comprehensum  
enema, in ilei intestini uitijis atrocibus ac  
uastis, & seuo colico affectu, qui cum magno  
ciborum prostrato appetitu, nullaque per aluum  
deiectione affligit, utiliter subijcitur. Presentem  
quoque tenuioris intestini affectum, praeter  
tradita symptomata, foetidi ructus, & faecum  
nunquam per os eiectione, comitari consueuerunt.  
Quae quum hominem affligunt, mortem subinde  
minitantur.

Colicus ex  
flatu.

Porro si uentris dolor, tam ingenti alui  
constrictione uacat, et si flatibus distentus  
uenter,

uenter, murmure multo agrū molestia  
 afficiat, electuariū ex baccis lauri porri-  
 gitur. Hoc recipit: Foliorum rutæ arido-  
 rum drachmas decē, ammeos, cumini, li-  
 gustici, origani, nigellæ, cari Alexādrini,  
 seminis petroselinī, amygdalarum ama-  
 rarum, piperis nigri, piperis lōgi, menta-  
 stri, dauci, acori, baccarū lauri, castorei,  
 cuiusq; drachmas duas, sagapeni drach-  
 mas quatuor, opopanacis drachmas tres,  
 excipiuntur omnia mellis æqua portio-  
 ne: & eius electuarij nucis auellanae, aut  
 alterius parue nucis Indicæ instar, indies  
 datur, cū uini ueteris & calefacti uncia,  
 aut radicum incidētium decoctorum iu-  
 ris uncia. Hoc \* electuario ad dirigēdos  
 flatuosos spiritus, nihil est efficacius. Pre-  
 terea glandem hanc spiritibus depellen-  
 dis ac discutiendis idoneam, aluo indito.  
 Cumini, foliorum rutæ uiridis, utriusque  
 tantum quantum manus apprehendit,  
 utriusq; cyclaminis speciei drachmę tres,  
 nitri drachma una, deterito hæc melle, et  
 lanam spongiamue illis circumlitam in

\* Electua-  
 ria uocata  
 sub antidoti  
 nomine cō-  
 prehendere  
 licet, item  
 et confe-  
 ctionis.

Satius erit  
 mel in cras-  
 sari, quam  
 spōgia uiri.

K 5 anum

## 154 PARA. IN NONVM

anum dimittito. Abdomen quoque penicillo, calidiore, flatusque dissipate liquore, imbuto, subinde foueto, ac irrorato. Quinetiam agrum in labrum huiusmodi flatus discutiendi uim obtinens, deducito. Si uero his malum non cesserit, cucurbitulas magnas cum flamma & leues toti abdomini defigere, locumque rudiori ac aspero linteo perfricari praestat. Deinde crebrae inunctiones, ex rutaceo oleo, aut alio huic in calefaciendo finitimo, non alienae sunt. Iam quoque castorei & euphorbij utriusque sedrachma, huiusmodi oleo laeuigata, clysteris forma utiliter infunditur, admixto tamen quopiam incidenti ac flatus digerenti decocto, quod clysteris materiam praebet.

Qui autem hoc malo teneri consueuit, dum sanus est, a uini diluti & frigidae aquae potu, & herbarum infrigerantium, & lactis, & aliorum flatuosos spiritus gignentium alimentorum esu, se arceat. At uini meri potu utatur, uictusque rationem reliquam calefacientem ac incidentem instituat.

RHAZAE DE MOR. CVR. 155  
 tuat. Philonium, quod ileosis ad discutiendos flatus, & soporem sensitivæque facultatis stuporem inducendum, propinatur, cum scilicet summis tenentur cruciatibus, animique deficientis suspicio ingruit. Piperis, ammeos, foliorum rutæ, mentastri, castorei, baccarum lauri, cumini, cuiusque uncia una: opij, mandragoræ, seminis alterci, singulorum semuncia, subinguntur simul cum mellis pari modo, porrigit uero eius medicamenti sesquidrachma, aut minus, pro uirium robore. Ple-  
 runque etiam huic pharmaco commiscetur, scammonij tertia pars uncie unius, unde & alium quoque citat. § Philonis uero Tharsei anodynon habet, croci drachmas quinque, pyrethri unam, euphorbij unam, spice nardi unam, piperis albi, alterci utriusque drachmas uiginti, opij drachmas decem, excipe melle, & ad eos qui sterora in maximis doloribus, per uomitum reijciunt, dato magnitudine fabæ, externis aut quaternis cyathis aque frigidae §. Cæterum si dolori febris adsit, cal-

Ex 9. Secū  
 dum locos  
 Gale. 9.  
 Sermōe Aē  
 tij, restitut  
 descriptio.

Ab illo  
 fia humore.

## 156 PARA. IN NONVM

fia fistula succo intybi decocto ac despu-  
 mato, diluta, ægro offertur, potui quoq;  
 syrupus uiolaceus utiliter porrigitur. At  
 cibus, quibus herbae emollientes & frigi-  
 diores adiectæ sunt, oleoq; amygdalarũ  
 dulcium præparatis, enutrietur. Item le-  
 uiores infusiones, ut ex oleo in quo foeno-  
 græcum aut althæa ebullierint, & anseri-  
 no adipe, ab inferioribus partibus ægro-  
 tanti iniiciuntur. Porro si locus abdo-  
 minis, qui à sinistro rene ad dextrum, per  
 uentriculi fundum cincturæ modo perti-  
 net, tumidus conspicitur, & laxum inte-  
 stinum quoque inflammatione correptũ  
 apparet, sine mora aperta dextri cubiti  
 uena, sanguis minuendus est, & cassia fi-  
 stula herbarum refrigerantium succo sub-  
 acta, subinde propinanda. Item si tenue  
 intestinum inflammatione infestetur, ea-  
 dem præsidia præstada sunt. Cibus uero  
 ægro huiuscemodi, coli uitio per circui-  
 tus quosdam torqueri solito, conueniet,  
 qui herbis aluum emollientibus præpa-  
 ratus, oleum quoque sesaminum in con-  
 dimentum

Ex san-  
 guine.

Ex san-  
 guine.

## RHAAZAE DE MOR. CVR. 157

dimentum accipit. Ab omni porro acidorum, austerorum, crassorum, aluumque astringentium esu, in totum abstinendum est.

Eum uero quem cum dolore flatus quoque implicare solent, pulmentis aromaticis speciebus, aut calidioribus, incidentibusque seminibus conditis, nutrire conuenit. Proinde est contrarium ab olerum, lactis, & flatus excitantium ciborum ingestione, abstinere ex usu est. Potui uero uinum uehemens incorruptumque propinabitur, aut hydromel, cui medicamina incidentia excalescentiaque in condimentum iniecta sunt, ex quorum numero piper est, porrigetur. Huiuscemodi autem hydromel, quod modo subiicitur, est. Conmisceto mellis puri libram, aquae potabilis libris sex, & tantisper dum zula<sup>ou</sup> crassiciem ambo recipiant, decoquito, spumamque detrahito, quo diligenter peracto, ad singulas libras hydromelitis, piperis contriti drachmas duas linteolo illigatas, quousque hydromel adamussim decoctum sit, immittito: & ubi refrixerit, diligenter expressum

uictus ratio in doloribus ex flatibus.

## 158 · PARA. IN NONVM

expressum linteolum eximito. poscente quidem usu, eius portionem liberaliter propinato. Eos quoque quibus ex flatibus & crassis crudisque humoribus dolor esse consuevit, strenue iuuat ricini fruticis oleum, recēti seminum decocto contemperatum. Præfens quidem seminum ius accipit: Ammeos, cumini, ligustici, cnicici, origani, nigellæ, cuiuscumque quantum trinis digitis comprehenditur, hæc aquæ libris tribus immissa, ad dimidias decoquuntur, usus autem eius est, si ipsius uncis duabus, olei ricini in drachmas tres dilueris, pluribusque diebus ea quantitate potui porrexeris. Verum si dolorem arboris comitetur, sumito pruna uiginti, ficus caricas quinque, uuarum passiarum ab acinis mundatarum drachmas quinque, decoquito & percolato, ac postea cassiam fistulā in eo decocto subegeris, secundo per colum traicito, & amygdalarum oleo adiecto, potandum porrigit. Vel decoctum in Capite de distillatione commemoratum, eius loco offero.

Cæterum

*Raro hodie hæc pinguis potanda porrigitur.*

*Hoc laudatissimum in his affectibus est.*

Cæterum si aluus uehemēter astricta fuerit, huic iuri adiſcientur filicule, turbit, utriusque drachmæ duæ: & his simul decoctis, tantisper dum aluus respōdet, eo iure utemur. Posteaquā uero cita ea profluxerit, polypodium, & turbit amouebuntur. † Puluis qui aluum ducēdo, simul flatus & grauitates reprimīt. Turbit albi & amygdalarum dulciū oleo irrorati, ac in puluerem adamūssim contriti drachmæ uiginti, sacchari drachmę triginta, zingiberis drachmæ decē, huius quidem pulueris ut plurimū drachmæ \* tres impermixtæ, aut alicui ad id idoneo liquori iniectæ, offeruntur. Catapotia quorum unum deuoratum, uentrē deſcit, & appetitum incitat, & flatuosos spiritus grauitatesq; reprimīt, ad hæc ciborum concoctionē iurat. Mastiches, zingiberis, cinnamomi, caryophylorū, pęonia, piperis nigri, piperis longi, scammoni, sacchari, uiolarū, cuiusq; uncia una, fingunt catapotia cicerū instar, & eorum unū trāsglutitū, aluū semel bisue deſcit.

De



Lienteria à  
calido hu-  
more.

\* Brabãtia  
subco nomi-  
ne paruos  
quosdã ru-  
bros fru-  
tus habet,  
ad proposi-  
tum aptissi-  
mos.

Nos primũ  
ius lenticule  
effunde-  
mus.

**Q**Vando assumptus cibus solita mo-  
ra in uentriculo non retētus, citius  
paululum immutatus egeritur, & si huic  
uitio ob excrementorum acrimoniã uen-  
tris erosio & cruciatus ac fitis affuerint,  
quæ etiam plerunq; concomitatur alui  
profluuium, in quo excrementa ante ci-  
borum ingestione excreta, saniem quam  
piam admixtam habent, agrotãti ex im-  
maturis uuis decoctione inspissatus suc-  
cus, aut \* ribes, aut malorum punicotũ,  
cum spodij & rosarum utriusq; drachma  
una propinabitur. Pastilli quoq; ex spo-  
dio astringentes, identidem utiliter offe-  
runtur. Cibi porrò sunt, lenticula cum  
aqua, aceto & croci momento decocta,  
& pulli cũ aceto elixi, idemq; alli, & om-  
phacino intincti. Potui uerò rhois deco-  
ctum rosacea aqua dilutum, aut malorũ  
punicorum succus exhibebitur. Prate-  
rea cibus rhus obsoniorum in condimen-  
tum accipientibus cibabitur, & breuiter  
totam uictus rationem ad restrictionẽ &  
astrictionem

astrictioem dirigere consilium erit.

Cæterum si absque huiuscemodi erosione alius lubrica molesta sit, si quoque quod fluxu egeritur nullam saniem admixtam habeat, sed albidū glutinosumq; id cernitur: præter hæc etiam, si inflāmatio modica, sitis exigua et ructus acidi affuerint, laboranti betam, & sinapi, & salitos pisces aliaūe incidēdi uim possidentia, administrabis, & deinde anethum simul cum salis momento in aqua decoques, & posteaquam percolaueris, adicies percolato iuri, mellis quod satis est, & sic post incidentia pituitam ingesta, propinabis: eoq; pacto digito, aut pinna ori indita, uomitum ægrotanti prouocabis. At si affectus, ob humorum copiam uentriculi tunicis imbutam, illo curationis modo non cōquieuerit, pituitam ducens pharmacum præbebis, Cuius generis quod iam subsequitur cēsetur. Aloës drachma una, cucurbitæ syluestris carnis drachmæ quatuor, sacchari tantundem, turbit drachma una, ex his forman-

Lient, à crudo & frigidissimo succo.

Lienteria potissimū à cœliaco affectu cruditate cernitur.

L tur

*\* Potius tri-  
bus, et in ro-  
bustis cor-  
pore.  
Licteria ex  
naturalium fa-  
cultatum im-  
becillitate à  
frig. & hu-  
mid. intep.  
\* Alibi far-  
cimina sale  
condita.  
alibi etia  
substantia.*

tur catapotia, quæ uni propinationi suf-  
ficiunt. Ad hæc uomitu ex incidentibus  
sapius uti expedit. Cibos autem, quibus  
æger uescitur, in muriâ intingere iuuat,  
ut inde incidendi & calefaciendi uim obti-  
neant. Proinde quoque \* cibus sale con-  
ditis, ac acri gustu præditis, breuiter suo  
calore appetitum incitantibus edulijs, op-  
portune ægrum cibabis. Si id quod  
per aluû deijcitur, nihil superflui biliosi,  
nihil saniosum, nihilq; pituitosum ad-  
mixtû habeat, uinum merû robustumq;  
offeretur. Similiter electuarium quoque  
ex thure præbetur, quod accipit, thuris  
drachmas decē, piperis, ammeos, spicæ,  
ligustici, anisi, nigellæ, cuiusque drach-  
mas duras, balaustiorum drachmas de-  
cem mellis dispumati quantum ad prædi-  
ctas medicinas excipiendas sat est. Huius  
uero antidoti usus probatur, quoniâ uen-  
triculum impense calefaciat, mirificeq;  
exiccet. Seminum quoque decoctum,  
ad plenioris intestini morbû idoneum,  
propinabitur, uinique meri potu æger  
assuetus.

affuefie.. Caeterum si assumptus cibus crudus haudquaquam egerit, sed aquosa que  
 dam & alba tenuisq; substantia, praesentibus iocinoris imbecilli notis, excernitur, egro ex ferri stercore electuarium, & id quod ex thure fit, porrigentur. Et pastilli quoq; quos calefaciendo iocinori inscripti, & electuarium diacalaminthes, utiliter administrabuntur. Diacalaminthes autem, compositio est huiuscemodi: Foliorum ruta, foliorum calaminthae excicatorum, ammeos, cari, ligustici, zingiberis, cinnamomi, longi piperis, singulorum aequae portiones, omnia decocto melle excipiuntur. Item praeter haec, ad ea quae calefaciendo corroborandoq; iocinori superius comprehensa sunt, recurrendum est. Porro si commoratus affectus, iocinoris imbecilli indicijs caruerit, siq; quod fluxu egeritur, tenue subalbidumq; una cum uentriculi grauitate extiterit, malorum puniceorum puluis deuorandus dabitur. Praeparatur autem, ex acinorum mali punice acidii, afforum, & in tenuissimum

L 2 puluerem

*Coeliacus affectus ob iocinoris obstructionem & attractionem imbecillitatem.*

*Differt à Galeni. 4. de sanitate tuenda.*

*Coeli. ex uentriculi & graciliu intestinorum uitio.*

puluerem actorum drachmis centū : cari, seminis eoriandri, utriusque in aceto acerrimo maceratorum, ac deinceps torrefactorum drachmis uiginti, \* xylocara cta, rhois Syrenaici, balaustiorū, cuiusque drachmis decem. omnia in tenuissimum puluerem teruntur, qui deinceps transglutiendus offertur, aut malorum cydoniorū succo immixtus, porrigitur. Electuarium quoq; Cazi inscriptū, opportunē administratur. Cuius mixtura in hunc modum se habet. Acinorū uuae passę in tenuissimum puluerem tritorum libra una, baccarum mirti aridarū, ac pari ratione subactarum libra † semis, xylocrata Nabathæ, balaustij seminis tamaricis, ammeos, singulorum drachmæ decem. conficiuntur omnia saccharo arundinibus innato, seu apum melle quàm exactissime spuma liberato, & deinceps huius portio p morbi magnitudine præbetur. At si defluuij alui recrementa flaua, & anum mordicantia inueniatur, & æger siti febricq; corripiatur, pastilli astringētes

\* Opinor quorundam lignorū astringentiū putamina.

† Alias, quinq;

Diarrhœa ob bilis copiã uetriculũ et intestino reurgitãtē

## RHAZAE DE MOR. CVR. 165

astringētes ex spodio, & aqua crudæ pol-  
lentæ hordei, prospere porrigētur. Pastil-  
lorum autem astringentiū ex spodio mix-  
tura, ad hūc modum se habet. Rosarum  
rubrarum, spodij, singulorum drachmæ  
decem: seminis rumicis, rhois Syrenaici,  
balauſtij, gummi Arabici, cuiusq; drach-  
mæ quinq; redigūtur in pastillos drach-  
marum duarum pondere, quorum unus  
uncia decocto cydoniorū succo, & sex-  
tante succi plantaginis dissolutus, potui  
datur. Aquam quidem pollentæ hordei,  
hac ratione præparabis. Hordeum con-  
fractum, in aqua quæ ipsum tegit, tantū  
super dum aqua modice inspissetur, deco-  
quito, deinde percolato, & eius uncias  
quatuor cū spodij, & gūmi Arabici utri-  
usq; drachmīs tribus dilutas, porrigito.  
Quod si uentris fluxui, intestinorū exul-  
ceratio serpendo depascens, superuenerit, lapidis Armenij puluerem deuoran-  
dum exhibeas. Qui constat, seminis her-  
bæ pulicaris drachmīs uiginti, seminis  
plantaginis drachmīs decem, gūmi Ara-  
bici,

*Dysenteria.*

L 3

## 166 PARA. IN NONVM

bici, lapidis Armenij, utriusq; drachmis  
tribus, pulicaris herbae semine torrefa-  
cto, omnia simul cum illo in puluerē su-  
biges, ac eum in aurora drachmarū triū  
pōdere, cum discocto cotoneorū succo,  
potui porriges: ac somnū inituro aegro,  
tantūdem probe offeres. Inter cibos qui-  
dem administrabis pulmentum, ex puni-  
corum malorum acinis, & uuis passis, in  
aqua cum pauxillulo aceti decoctis. Pre-  
terea edulium cum immaturarū uuarum  
succo confectum, & quod rhus obsonio-  
rum in condimentum accipit, aegrotanti  
utiliter offeres. Similiter quoque ex her-  
bis aluum emollientibus, cum rhoi prae-  
paratum edulium, & id genus alia, eden-  
da appones. Ad haec pastillos de balau-  
stijs continuæ leuitati intestinorum (que  
Græcis λευσιγία dicitur) dicatos, si modo  
alius continenter fluat, propinabis, nec  
refert, an eius uentris profluuij recremen-  
ta sanguine tincta, intinctaue sint. Reci-  
piunt itaque pastilli commemorati, Gal-  
larum, siliquarum Nabathææ, seminis  
tamaricis,

Potui lac  
scissum por-  
rectum ab  
Alex. pro-  
batur.

RHAZAE DE MOR. CVR. 167

tamaricis, thuris, balauftij, singulorum  
 æquas partes; opij, gummi Arabici, utri-  
 usque partem dimidiānt, his in puluerem  
 subactis, ac cydoniorū malorum succo  
 asperfis, informato pastillos \* duarum \* Propter  
 drachmarū pondere, atq; unum, si neq; *nimiā stupe*  
 fiti, neque febris crucietur æger, uino læui *faciēdi uim*  
 gatum præbeto. Præsenti autē febris, de *d. 3. i. inci-*  
 coctione inspissato cotoneorum aridorū *piemus.*  
 succo pastillos detritos, propinato. Sane  
 hi pastilli in magnis & continentib, alui  
 fluoribus, ut efficacissimi commendan-  
 tur. Pastilli tenesimo sacri, qui malignis *Tenesmus.*  
 flatibus, & murmure infestātib, absen-  
 te tamen calore, porrigēdi sunt. Seminis  
 hyoscyami albi, seminis anethi, seminis  
 fœniculi, singulorum drachmæ quinq;  
 ammeos drachmæ duę cum semisse, opij  
 drachmæ tres, seminis apij drachmæ de-  
 cem, hæc uino subacta in pastillos redigi  
 to, ac unum sesquidrachmæ pōdere, aut  
 minoris, pro uirium & morbi ratione, uī  
 no læuigatum, potui offero. Compo-  
 sitio electuarij de styrace, uetusto uentris  
 L 4 fluori,



## 168 PARA. IN NONVM

fluori, et tenesimo cum flatibus malignis, absque febris & ardore infestante, utilissima. Castorei, opij, asari, styracis liquide, myrrhæ, seminis alterci nigri, thuris, cuiusq; aquæ portiones, \* mellis quantum ad simplicium medicinarum exceptionē fat est, huius quidem pondus inter duas drachmas & tres, ut plurimum propinabitur. Si tenesinus post decimū diem protractus fuerit, nec medicamina quicquam præsidij attulisse cernantur, & ægrum circa pectinem dolor aliquis exercet, ad subscriptum clysterem recurrendum est. Panacis, oryzæ, lētium, quibus tribus cortices detractæ sint, rosarum siccarum, balaustiorum, calicum gladium, cuiusque manipulus unus, omnia tribus libris aquæ potabilis ad dimidias incoquantur, & deinceps percolatur, insuper sumuntur cerussæ, cineris \* chartæ Baby Ionice, aut si eius facultas non est, cineris alterius chartæ, utriusque drachma unat lapidis Armenij sedrachma, vitellus oui assus induratusq; unus, olei rosacei semuncia.

\* Plurimū  
4. mellis  
partes ad  
unā medica  
minū accipi  
mus.

\* Opinor  
ex Diosco.  
papyro sic  
ri.

muncia, hæc omnia iam narrato decocto subacta, commixtaq̄, semel bisue clysteris forma ægrotanti infunduntur. Por- <sup>A putri</sup>  
 rò si tenesmus in uetustatem incidit, ac <sup>pituita.</sup>  
 nullus sanguis, sed rasura alba & mucco sa, mucconi saniosi non absimilis, proflu-  
 xerit, pharmaco putredinibus sacro, uide-  
 licet Capite quo gingiuarū putrescentium curationem persecuti sumus descri-  
 pto, rectissimè ad hunc modum uteris. Portionem aliquam eius medicamēti in pauloante descripto decocto subigito, et clysterem unum atque alterum in aluum ex eo dimittito. Quod si alui fluorem ex huius clysteris acrimonia, intestinorū & sedis musculorum ardor ac erosio consequantur, enema ex rosaceo oleo tepente iniiciendum erit. Sin uero nullum notabilem præscripti clysteris infusio rosionē induxerit, tātisper dum affectus restituitur, in eius usu persistere consilium est.

Epithema quo uenter uehemēti & con- <sup>Ad frigidū</sup>  
 tinuo profuuiō afflicti, ac uiriū robore <sup>affectum</sup>  
 languidus, illinendus est, Gallia moscha <sup>utile est.</sup>

L 5      tæ,

ta, acacia, cyperi, myrrha, gallarum, cur-  
pressi, thuris, omnium partes aequales, his  
uino ueteri & subastringente, aut coto-  
neorum succo aspersis, uenter crebro ir-  
rorandus est. Huic quoque nonnunquam  
panis bis coctus ex Syria commiscetur.

*ad calidum  
affectum  
utile est.*

Ceterum si morbum ardor concomite-  
tur; epithema quod duobus sandalis, ro-  
sis a fibris liberis, lapide Armenio, nuce  
Indica, galla, pane bis cocto, & succo ma-  
lorum punicorum acidorum, aut cotoneo-  
rum, aut succo myrtino, constat, praesidio  
erit. Si autem uehementi ac graui tenes-  
mo eger tenetur, saepeque ad secessum pro-  
perat, nihil tamen nisi forte mucosum  
quid egerit, glans ista subiicienda est, si qui-  
dem mirifice tenesimum, sensoriae faculta-  
tis torporem inducens, sedit. Thuris, lycij,  
croci, gummi Arabici, cuiusque drachma  
una: opij drachmae duae, informantur \*  
glandes, quae ano induntur.

\* Alexā. ad  
nuclei pinei  
magnitudi-  
nem, paulo ue  
maiores eas  
fieri praeci-  
pit.

A partium  
debilitate.

De urinae difficultate. Cap. LXXIII.

**Q**uod si urina modica excernitur,  
aut in totum supprimitur, nullo ta-  
men

RHAZAE DE MOR. CVR. 171

men in inguinibus apparente tumore, nullacq̄ præfente grauitate aut dolore, qui aut renes, aut urine meatus infestet, infra scriptis medicaminibus, urine ciendæ uim possidentibus, malo subueniendum est. Cuius notæ, hoc quod modo subiicitur est. Seminis apij, nitri naturalis, rubie fatiuræ, olufatri, baccarum iuniperi, seminis asari, ammeos, seminis fœniculi, spicæ, amygdalarum amararum, cuiusque drachmæ uiginti, seminis melonũ drachmæ decem: cantharidum, quarum \* alæ \* & capita abiecta sunt, drachma una, ammoniaci drachmæ tres, ammoniacum uino diluif, ac eo reliquis exceptis, formatur formulæ auellanae nucis instar: quarum portio inter drachmã unam & tres una propinatione ex cicerũ decocto offertur. Sanè hoc medicamẽ habitus mollifici, eiusdem laxitati, hypofarcæ, eijciendisq̄ his quorũ occasione corpus exicare cogimur, accommodum censetur. Si urine difficultas à casu, aut scemorum, aut ani circumiacetium uel partium

\* Fuchsius  
alæ sinen-  
das autu-  
mat.

Ab externa  
causa.

plaga

## 172 PARA. IN NONVM

plaga apprehēdit, agrotāti sanguis axil-  
lari uena pertusa (partita interim sangui-  
nis missione) detrahet, & locus affectus  
egelida aqua subinde irrorabitur, & cali-  
dioribus doloremq; sedantibus oleis, ad  
medij diei spacium infricabitur. Aeger  
quoq; ad urinæ excretionem cohortan-  
dus est, quam optime spiritus retētionē,  
& musculorū octo abdominis compres-  
sione, perficiet. At si suppressio urinę  
uesica plena ac intensa, molestet, præfer-  
tim post sanguinis aut puris eruptionē,  
medicamina, quę grumos sanguinis &  
puris in uesica cōcreti discutere colliqua-  
req; solent, propinanda sunt. Medica-  
men grumis sanguinis, & puris uesicę  
amouendis, uehemēter generosum. Car-  
damomi, myrrha, rubiæ satiuę, qua ue-  
stes inficiuntur, baccarum iuniperi, am-  
moniaci, liquoris Cyrenaci, singulorū  
æquę portiones. ammoniacum foenicu-  
li succo, aut simili aliquo læuigatur, & eo  
alia excepta, in catapotia digeruntur: ex  
quibus drachma una quater in die, cum  
superius

*A corpore  
urine mea-  
tum obtu-  
rante.*

*superius*

RHAZAE DE MOR. CVR. 175

superius comprehensi feminum decocti  
 uncis tribus, propinatur. Syrupus quo  
 que acetosus, ex aceto acerrimo prepara  
 tus, subinde porrigendus est. Ad hæc per  
 syphonem aqua sale diluta, aut lixiuuium  
 opportune inijcitur. Compositio autem  
 lixiuij ad id efficacis, ad hunc modũ præ  
 paratur. Cineris † ilicis, cineris sarmento  
 rum, \* cali calcis, cuiusq; debitæ portio  
 nes, his aqua quousq; tegantur, superad  
 ditur, triduoq; ita seponuntur, deinde il  
 lis per colum transmissis, lixiuuium recon  
 ditur, & eius modica portio per syphonẽ  
 in uesicam demittitur. Cnici etiam folia,  
 & blitum cum modico olei amygdalarũ  
 decocta, affecto loco recte superaccom  
 modantur. In folio præterea infusus,  
 cui chamæmelum, stichas Arabica, sam  
 psuchus & sisymbriũ incocta sint, agro  
 strenue auxiliantur. Poterit quoq; huius  
 cernodi folium ex brassicarum summita  
 tibus, & blito, & stercore columbino in  
 aqua decoctis, adaptari. Sanẽ in his deco  
 ctis quoad per uires licebit, magno præsi  
 dio

*Arculanus  
 syrupũ per  
 syphonẽ im  
 mitendum  
 existimat.*

† *Alia,  
 glandium.  
 \* Serapio  
 usque Græco  
 rũ esse ait.  
 Leoniceus  
 uero tele  
 phion.*

## 174 PARA. IN NONVM

dio aeger desidebit, atq; ex iam compre-  
 hēsis herbis, cataplasmata ac fots ingui-  
 nibus & circumiacentibus partibus, uti-  
 liter inducet. Quando autem folio inse-  
 dit, ea quæ urinas citant ac mouent, po-  
 tui dare confert. Verum si hæc uniuersa  
 inefficacia sunt, ad instrumentum urinis  
 eliciendis aptum (syphonem, aut cathe-  
 ram uocant) recurrendum est. Si uero  
 urinæ difficultas post calculi indicia obo-  
 riatur, agrum supine procumbētem, pe-  
 des ac genua uarijs motionibus in altum  
 conquassare concutereq; decet. Cæterū  
 si urina non profluxerit, operæ precium  
 erit, & hic quoque ad depellendum cal-  
 culum, colli uelicæ orificio incumbente,  
 instrumēto (quo in uelicam demisso uri-  
 na emollitur) auxiliū præstare. Perca-  
 uendum tamen, ne uelicæ ceruix inflam-  
 matione tentata, eius instrumenti dimis-  
 sione iritetur. Ad suppressam urinam  
 inter cætera mirifice conducūt, frequen-  
 tes in labro calidiore infessus, & ex oleis  
 calidioribus emolliētibusq; crebræ inun-  
 ctiones.

*Lapide in  
 uesicæ ad-  
 huc ceruice  
 hærente.*

*Totius capi-  
 tis epilo-  
 gus.*

Etiones. Item medicamēta urinasmouentia epota praesidium praestant. Maxima igitur diligentia ab acidorum, austeriorum, acerborum, crassorumque esu, aegrotantem circumcidere conducit.

De renum & uesicae calculo. Cap. LXXIII.

**L**apidem uesicae declarant, continui pudendorum aegri pruritus, & crebra manuum cōrectationes, & frequēs ipsorum tentigo, subitaque ipsorum laxatio, & urinae cum difficultate ac dolore excretio: in quo affectu longaum quoque à uesicae calculo compressum, interdum procidere solet. At calculum renibus innatum, testantur laborantis cum urinae difficultate, uehemens renum & meatum, per quos urina è renibus in uesicam distillat, & circumiacentium partium, & inguinum dolor, & aluus initio astricta, & ciborum nausea. Calculo quidē in uesica concreto, haec infra scripta compositio utilis est, quoniam ad cōminuendum lapidem etiam uetustiore, mirifice efficax est. Et ego quoque eius usu, magnum

*A crasso-  
recoq; humo-  
re, ignea ca-  
lidity in-  
crassato.*



## 176 PARA. IN NONVM

gnum lapidem minori quadraginta die-  
rum spacio, confregi. Habet autem ea  
se in hunc modum, Fructus balsami, se-  
minis raphani, dauci, seminis olusatri,  
corticum radicum opoponacis, corticū  
radicum capparum, amygdalarum amara-

\*Alij dāno  
cochie saxi  
fragiā uer-  
tunt.

rum, \*baccarum lauri, florum iunci ro-  
tundi, cyperi, spicæ Indicæ, casia lignee,  
scolopendrij, seminis rutæ syluestris, gen-  
tiana, aristolochiæ rotundæ, asari, carda-  
momi, ammoniaci, sagapeni, bdellij, pi-  
peris, acori, omnium æquæ portiones,  
gummi in balsami oleo sufficienti, disso-  
luti, subagitentur: deinde reliquā ex his  
conficiātur, finganturq; globuli, quorū  
singulis diebus drachma feminum inci-

Scorpionū  
cineres.

dentū decocto soluta propinetur, Non-  
nunquam & obulus cinerum scorpionū  
unā cum eis porrigitur, Scorpionū por-  
rō cineres in hunc modum apparari so-  
lent, Accipiuntur scorpiones, qui in ol-  
lam fictilem repositi, & olla diligentissi-  
me obturata, super regulam in furnum  
non usque adeo calidum dimittuntur,  
ibiq;

ibiq; ad sex horarum spacium sinuntur,  
 & in super exempti, ac in tenuissimum ci-  
 nerem triti, usui futuro in uitreo uase re-  
 ponuntur. At æger decocto cicerum, &  
 cibus aromatibus seminibusq; calidiori-  
 bus preparatis, alendus est. A lactis ue-  
 ro, & casei, aliorumq; crassorum & glu-  
 tinosorū ciborum esur reuocandus, quo-  
 niā eorum succus facile in calculū a ca-  
 liditate induratur. Preterea descendat æ-  
 ger in folium, cui brassicarum folia, sam-  
 psuchus, \* blitum, abrotanum, menta-  
 strum, columbinum stercois, & medulla  
 seminis enici incocta sunt. Quinetiā in-  
 guina scorpionum oleo inungēda sunt,  
 atque eius momentum in uesicam per sy-  
 phonem infundendum. Oleum scor-  
 pionum, Aristolochiæ rotundæ, gentia-  
 næ, cyperi, corticis radicū capparū, cu-  
 iusq; uncia una. Hæc in libra olei amyg-  
 dalarum amararum soli exposita, marce-  
 scere septimana una sinūtur, deinde ex-  
 pressa percolantur, in cuius percolati li-  
 bra iniiciuntur scorpiones decē, & iam

\*Virib. no-  
 stre spina-  
 chie respo-  
 det.

Desuas du-  
 plex descri-  
 bit, secundū  
 hinc sum-  
 ptum est.

**M** omnia

omnia rursus in uasculū adamūssim oc-  
 clusum, ad solē duabus hebdomadis ex-  
 ponuntur, dein per cōlum transmissa fu-  
 turo usui reconduntur. Quum itaq; hoc  
 genus olei quā optimū ac laudatissi-  
 mum ad propositum affectum existima-  
 tur, eius portio per guttulas in aēri pe-  
 nem, postquam ē solio descēderit, rectissi-  
 mē inditur. Ceterum si lapis in uelica im-  
 pendio increuerit, illi nullum, nisi à ma-  
 nuali incisione, qua euelli queat, remedi-  
 um præstari potest. Verum huius sectio-  
 nem perscribere, nostri propositi libri li-  
 mites haudquaquam admittunt. Cum  
 autem renibus calculus innatus est, eger  
 in solium emolliendi ui præditū, frequen-  
 ter se demittet, & renes, et lumbos, nuper  
 enarratis oleis inunget. Ac lintea quoq;  
 calefaciendi uim obtinentib, liquoribus  
 immersa, dolētī loco admouebit, ex quo-  
 rum classe ea, quæ hactenus enumerau-  
 mus medicamina sunt. Potui autem, cal-  
 culos confringētia dissecantiaq;, non ta-  
 men manifesto calefacientia, præbeto.

*Apud Paul.  
 lib. 6. c. 60.  
 et Cel. lib.  
 7. cap. 26.*

quinto M

Verum

RHAZAE DE MOR. CVR. 179

Verum si euenerit calculum ex renibus per meatus urinarios, quos Græci *ὀφρῆτις* *pas* uocant, in uesicam decumbere, eaq̄ occasione uesicæ ceruicem obturare: aut si idem à uesicæ calculo fiat, aqua calida paulatim ab alto, pudēdorum partibus, donec rubore suffunduntur, instillanda est, post hanc, oleum tepidum guttatim superfundatur, partesq̄ illæ infricentur.

Porro extrema urgente necessitate, ad exteriora succio remedio erit, siquidē eā calculū dimouebit, & cum urina fortasse extra penem simul alliciet. Quoniam si angulosus magnusue extiterit, inferiore uesicæ ceruicis partem, qua scilicet eius corpus spectat, incidere necessitas iubet, ut hinc lapis manuali arte euelli queat.

De renum & uesicæ inflammatione. Ca. LXXV.

**P**hlegmonem renum, cōcomitatur Renum. febris inordinata, nec usque adeo ardens, sed quæ cum horrore, & rigore egrotantem apprehēdit, & frequens mictus, & inferiorum dorsalium partium dolor grauis, unde si quando ager dimouetur,

M 2 in

## 180 PARA. IN NONVM

in his partibus pondus tanquam ab illis  
 suspensum, propendere sentit. Cum itaque  
 hæ notæ conspiciuntur, si modo nihil  
 aliud prohibet, citra cunctationē in prin-  
 cipio, axillari uena è directo partis dolen-  
 tis grauitateq; implicitæ secta, sanguinē  
 ægro minuemus. Regioni quoq; dolenti  
 forinsecus cataplasmata, & fodus, q̄ me-  
 dio crem refrigerandi uim obtinent, ac-  
 commodabuntur. Quorum usu si affe-  
 ctus propellitur, bonū putabitur, quo-  
 niam nulla suppuratio expectanda erit.  
 Cæterum si neq; dolor, neq; febris, neq;  
 grauitas horum applicatione conquieue-  
 rint, urinæq; frequēs stillicidium ægrum  
 laboriose molestauerit, pus hac in parte  
 colligi indicium est. Tunc itaq; cataplas-  
 ma dorso induces, quod chamæmelo, se-  
 mine lini & furfuribus, oleo sesami simul  
 exceptis, constat. Iam etiam in folio ex  
 emollientib, herbis parato, in seffus sum-  
 mē profunt. Porro si æger pus minxerit,  
 semina subsequente Capite ad urinæ ar-  
 dorem recensenda, donec imminuatur  
 decrescatq;

*In princi-  
 pio quoque  
 Gal. axilla-  
 rem secat,  
 aliàs autem  
 in poplite.  
 ex Rhaz. filica.*

RHAZAE DE MOR. CVR. 181

decreſcatq; pus, aegrotanti offeres. Dein de paſtillos in capite ſanguinis & puris miſctui proprio deſcribēdos, exhibebis.

Inflammationi autem ueſicæ comites ſunt, febris \* continua ardens, & urinae reddendæ impotentia, & eiufdem ſtillicidii: & ceruicis ueſicæ, & ſcœmorū imi-  
q; uētris dolor. Quare uenam axillarem hoc affectu implicito, incidere præſidio eſt, & alia quæ renum inflammationi accommoda retulimus, adhibere, confert.

veſicæ.  
\* Inter-  
pres con-  
cluſa.  
ſcœmorū  
Scirrhi ve-  
num cura-  
tio.

Cæterum non omnis renum inflāmatio in uomicam tranſit, ſeu diſcutitur, ſed aliqua in duriciē etiam occalleſcit, cuius grauitas in renibus tanquam ab ilijs ſuſpenſa, abſente feбри, moleſtiam aegro inferit. Huic igitur clyſteres infuſi ex ſano græci, & ſeminis lini cremoribus, atq; ex chamæmeli, braſſicarum, meliloti, maluæ ſylueſtris & furfurum decoctio, uehementer conducunt. Nec minus iritatus uomitus, ob materiæ diuerſionem, adiuuat. Cataplaſmata quoq; ex iam comprehenſis emollientibus medicamentis præ-

M 3 parata,

parata, regioni renum accommodata, non parum auxiliantur. Iam si urina modica egeritur, prædictis, ea quæ urinæ ciendæ sunt, accommode adhiçuntur. Sanè huic quidem affectui non mediocrè curam diligentiamq; adhibere conuenit, quoniam huiuscemodi renum duricies (quam Græci *σνιψῶν* appellāt) aquæ inter cutem interdū autor, non aliter quàm iocinoris aut lienis duricies esse consuevit.

De urina ardore. Cap. LXXVI.

Ob urinae à  
calidis suc-  
cis acrimo-  
niam.

**Q**Vando agro inter mingendum ardor, punctilesq; cruciatus in uesicæ ceruice oboriuntur, a falsis, acidis & acris circumscindendus est. Et cibus humectantibus ac aluum emolliētibus herbis præparatis, & fuscis, hisq; in leniendo uentre paribus, alendus. Quinetiam ad reprimendum humorum acrimoniam, subsequens medicamen porrigendū est. Seminis melonum excorticati drachmæ triginta, seminis cucumeris citrinati, seminis cucurbitæ domesticæ, seminis portulacæ,

RHAZAE DE MOR. CVR. 183  
tulacæ, seminis papaueris albi, singulo-  
rum drachmæ tres, seminis alterci albi  
drachmæ duæ, sacchari albißimi quantũ  
simul omnia pendet, huius pulueris quo  
tidie drachmæ tres mane, & tantundem  
rursus sub uesperã dormituro ægro cum  
uncia syrupi uiolacei, aut iozulapou, &  
dulcis radicis decocto, offeruntur. Ad  
hanc quoque noxam quã diligētissime  
attentum Medicum esse oportet, siquidẽ  
urinæ acrimonia, dum perseverat, uelice  
& urine meatum exulcerationem crea-  
re solet.

*Ad sanguinem & pus mingentes.*

Cap. LXXVII.

**S**I à casu, aut plaga alicui sanguis per  
penem erumpat, uena axillaris (parti  
ta interim sanguinis detractione) recte se-  
catur, & pastilli ex succino potui accom-  
modè porriguntur. Pastilli de succino,  
Succini, gummi Arabici, utriusq; drach-  
mæ quinq; balaustiorum drachmæ duæ  
cum semisse, hypocistidos tantundẽ, thu-  
ris drachmæ duæ: seminis apiij, opiij, utri-

M 4 usq;



## 184 PARA. IN NONVM

usq; drachma una, rediguntur in pastillos  
 sesquidrachmæ pondere, quorum unus  
 quotidie rhois decocto dilutus, utiliter of-  
 fertur. Inter cibos quidem, conueniunt  
 glutinosæ & uiscosæ carnes cum rhu ob-  
 soniorum, aut omphacino elixæ. A salis  
 autem & acris oportune æger arce-  
 tur. Verum ic̄to loco cataplasma ex lapi-  
 de Armenio, acacia, aloë & lycio, posca  
 exceptis, superaccommodabitur. Si san-  
 guinis mictu post acrium esum, aut uini  
 acrioris, calidiorisq; usum, eger angitur,  
 uena axillaris ad sanguinis retractionem  
 incidenda est, atq; pastilli ex succino ex-  
 hibēdi. Vniuersa quoq; uictus ratio pla-  
 nē eadem cum præcedentium erit. Cæ-  
 terum si ex ulcere erosione cōcitato, pus  
 minxerit, pastillos hos præbeto. Constāt  
 autem, seminis melonum, seminis cucu-  
 meris citrinati, cucurbitæ domesticæ, sin-  
 gulorum corticibus liberatorum drach-  
 mis uiginti, lapidis Armenij, gūmi Ara-  
 bicī, thuris pinguioris, cinnabaris, singu-  
 lorum drachmis decem, opij drachmis  
 tribus,

*Ex uenarū  
 erosione.*

RHAZAE DE MOR. CVR. 185  
tribus, feminis apij drachmis duabus. fin  
guntur ex his pastilli drachmarum duarum  
pondere, quorum unus uncia syrupi al-  
bi papaveris detritus, singulis diebus po-  
tui offertur. Quinetiam cervici vesicae, in-  
fra scripti collyrii portio, per syphonem  
utiliter inditur. Collyrium de cerussa.

Cerussa, sarcocolla, thuris, gummi Ara-  
bici, opij, cinnabaris, singulorum aequae  
portiones: haec succo portulacae aspersa,  
in collyria rediguntur. Deinde per sypho-  
nem mulsa aegro in vesicam infunditur,  
ac ad urinae excretionem aegrotas ab astan-  
tibus utiliter incitatur, insuper postquam  
urinam eminxerit, huius collyrii portio  
asinino lacte soluta, per syphonem vesicae  
infunditur.

*De his qui inuiti urinam reddunt.*

Cap. LXXVIII.

**S**I aeger magnam urinae portionem  
Semingit, nullam tamen inter mingen-  
dum acrimoniam ardoremue percipiat:  
aut si quis noctu se commingit, uerum ne-  
que siti, neque aliqua corporis macie, colli-

M 5 qua-

## 186 PARA. IN NONVM

quatione uero inde tenetur, ea que urine re-  
 stringenda sunt, utiliter utrisque offerun-  
 tur. Quale quod iam subsequitur medi-  
 camen est, Glandium drachma una, thu-  
 ris drachmae triginta, feminis coriandri  
 exiccati, gummi Arabici, lapidis Arme-  
 nij, singulorum drachmae decem, omnia  
 in puluere subiguntur, cuius mane drach-  
 mae tres, & totidem sub noctem, cum mo-  
 mento decoctionis inulae campanae, ut  
 medicamen ad uesicam usque deueniat,  
 propinantur. § Quoniam uero hic affe-  
 ctus, renum retentricis imbecillitatem,  
 aut urinae meatum ambientem musculum  
 relaxatum, aut aliam quampiam frigidam  
 uel humidam occasionem sui autorem ha-  
 bere solet, non immerito his dum pulue-  
 rem offers, ipsis dicatis remedijs prospice-  
 re debes. § Quod si aeger in hoc affe-  
 ctu, siti inexplebili, quae nimio cruciatur  
 clamorem aegrotanti excitet, conficiatur,  
 et potio protinus qualis assumpta est, per  
 urinas transmittitur, hordei decoctum  
 cum herbae pulicaris feminis cremore,  
 porrigendum

*ambitus.*

## RHAZAE DE MOR. CVR. 187

porrigendum est, & aeger immaturarum  
 uuarum succo, & cibus illo & rhoi obso-  
 niorum preparatis, & alijs his perfimili-  
 bus eduljjs, enutriendus est. Lac quoque  
 acidum, ex quo butyrum coactum sit, &  
 quæ ex hordeo cortice libero parat pul-  
 s, magno auxilio offeruntur. Potui autem,  
 decoctioe ignis aut solis inspissati succi,  
 qui acida qualitate pollent, propinaban-  
 tur, & ab omni exercitio, & mulierum con-  
 cubitu aeger arcebitur. Præclarè uero  
 faciunt hi pastilli, potui oblatis. Spodij  
 drachmæ decem, feminis lactucæ, femi-  
 nis portulacæ, utriusque drachmæ quin-  
 decim, coriandri exiccati drachma una,  
 rosarum rubrarum, lapidis Armenij, sin-  
 gularum drachmæ quinque, balaustij drach-  
 mæ duæ, camphoræ sedrachma. teruntur  
 in puluerem, & plantaginis succo exce-  
 pta, digeruntur in pastillos: quorum drach-  
 ma malorum puniceorum acidorum suc-  
 co subacta, porrigitur. Herbae etiam in-  
 frigidates, cuius generis sunt portulaca,  
 plantago, & solanum, commodè renum  
 regionem

Aëtium lac  
 scissum ha-  
 bet.

Arab. Rob  
 uocant.

188 PARA. IN NONVM

regioni superligantur. Ab omni quidem calidorum ciborū esu, & uino, ac his que urinas citant, imprimis abstinere cōfert.

Inter ea que stolidorū imperitorumq; medicorum inscitia, in hoc affectu delin qui solēt, totius corporis tabes, colliquatioe, primas obtinet: in quā agrum pro pinatione calidorum medicaminū & uri nas promouentiū, euestigio inducunt.

De lumbricis in ano ac uentre natis. C.LXXIX.

*Prolixius  
agit Aëtius  
Sermo. 9.  
cap. 39.*

**Q**Uo hoc malo torqueri solet, à cras sis & glutinosis ac pinguibus cibus, nimiaq; alimenti infarcione abstinere oportet, & indies panis offulas, sinapi muriacq; immerfas, ante cibos magna utilita te assumet, siquidem ea ratione, lumbricos procreari prohibebit. § quoniā origo omnium trium generū uermium, uidelicet lumbricorū, teredum, et ascaridū, ex cruda, crassa, pituitosaq; materia putredini accommoda, existit § . Si tamen nihilominus post horū incidentiū usum intestinis innascentur, nullū ab expulsio ne remediū est. Medicamen porrò tere

tes,

RHAZAE DE MOR. CVR. 189  
tes, & longos rotundosq; lumbricos ex-  
pellens, preparatur ex semine \*burungij  
excorticato, hoc est, erisymi, aut ut alijs  
placet, melissophyli, aut erucae syluestris,  
quando scilicet ægro fame uexato, eius  
feminis drachmæ septem in lacte leuiga-  
tæ, porriguntur. Medicamentum aliud  
generosum, agēs lumbricos. Burungij se-  
minis excorticati, feminis nigelle, turbit,  
cuiusque pares modi: lupinorum, nastur-  
cij, arenulæ rubræ ex Mecha aduectæ  
(quam Arabes \*kanabel appellant) sin-  
gulorum pars dimidia, omnia in pulue-  
rem subiguntur. Exposcente autem usu,  
ager per triduum lac recenter multum &  
calidum biber: & deinde tertio die uictu  
tenuissimo enutritus, cōmemorati pulue-  
ris drachmas septem lacti adhuc ex ube-  
ribus calenti, & aceto iniectas, assumet,  
idq; eo potissimum tempore, quo fames ip-  
sum cruciat. Ascarides uero uermes mi-  
nuti, in extremo longaone & ani fibula  
nati, sunt, quamobrem ibidem pruritus  
(cuius gratia anus subinde infricat) exci-  
tant.

\* Alij abro-  
tanū inter-  
pretantur.

*l. c. bill.*  
\* Ita Venetū  
suā semēti-  
nā Arabicæ  
uocat, tamē  
nec Au. nec  
Sera. est. Vñ  
de Antoniū  
Musā 279  
simplici.

190 PARA. IN NONVM

tant. Depelluntur uero huiuscemodi uer-  
mes, lana molli oleo in quo porrum ebu-  
lierit imbuta, ac in ani fibulam cum spe-  
cillo detrusa, potest autem lana tenera ci-  
trij mali oleo, aut mentastri liquore, aut  
momento aloës, uaccino felle soluto, in-  
tincta, in anum etiam ad eundem usum  
subijci.

De hæmorrhoidibus, <sup>ragg diis,</sup> scissuris, & fistulis ani.

Cap. LXXX.

Hæmor-  
rhoides.

**D**Vm sanguis purus citra dolorē ab-  
ano per certa interualla emanat,  
minime supprimendus est, nisi forte sua  
profluuij copia laborantis uires deuce-  
rit, siquidem huiuscemodi sanguinis pro-  
ruptio, multis affectibus hoc uitio deten-  
tum, immunem reddit, Cæterū si eo san-  
guine ab oris uenarum, tanq̄ ex capitu-  
lis quibusdā surgentibus profluente, ægri  
robur deijcitur, suppressio ex usu erit.  
Proinde pastilli de succino, rhois deco-  
cto soluti, cōmode offerūtur, Cibis autē  
rhus obsoniorū in condimentū accipien-  
tibus, & succo immaturarū uuarum præ-  
paratis,

paratis, hisq; persimilibus, quibus alendi facultas est, rectissime enutrietur. Porro si vires plurimum prosternantur, expresso carniū, cui plerunq; cotoneorū succus, & uinū subastringens admixta sint, alēdus est. Vinū quoq; austerū propinādum. Præterea iocinori emplastrū de spica, Capite de iecoris dolorib. inscriptū, pag. 139. utiliter superaccommodabitur. At si hæc inefficacia fuerint, confectio ex ferri stercore apparatus, porriget. Ea accipit, myrobalanorū Indicarum, belliricarū, emblicarum, singulorū drachmā semissem; spicæ, iunci odorati floris, cyperi, zingiberis, piperis, ammeos, thuris, cuiusque drachmas duas: stercoris ferri in aceto septimana una macerati, ac deinde combusti drachmæ quindecim, excipiūtur omnia despumato melle simul cum myrobalanorum emblicarum iure decocto, ueluti Capite de melancholia comprehensum est. Huius iuglandis instar quotidie exhibebitur. ea namq; cōfectio, ē uenulis ani, & ex ijs per quas menses mulierib. repurgantur,



## 192 PARA. IN NONVM

gantur, manantem sanguinem sistit. Pre-  
 ter hæc quoq; diuturno uentris proflu-  
 uio, nõ mediocri ea præsidio est. Quod  
 si excrescentia aliqua eminēs, & magnos  
 excitans cruciatus in ano oboritur, ue-  
 rum à qua nihil refudat: cepæ succū, aut  
 fel uaccinum modica lana illitum, excre-  
 scentia applicato. Glandē quoq; oblon-  
 gam ex malo terræ paratā, in anum ægri  
 tota nocte retinendā indito, & si forte for-  
 tuna glans ex ani fibula propellitur, rur-  
 sus donec excrescētia eius acrimonia in-  
 cidatur, atq; adaperiatur, sanguisq; pro-  
 fluat, eam subiicito. Caterum si quādo  
 cum uehementi dolore, inflāmatio quo-  
 que ingens anum infestet, uena ægro se-  
 canda est, atq; emplastrum infra scriptū  
 superligandum, quoniam hoc probe hæ-  
 morrhoidum dolorem subleuat, potissi-  
 mum si adiunctam habeāt inflāmatio-  
 nem. Accipito itaq; ad eius emplastri cō-  
 positionem, iuris decoctionis meliloti, &  
 chamæmeli tantisper dum tabuerint in  
 aqua elixatorum, tantum quantum uola  
 una

una continere potes, & deinde oui affilur  
teum unum, croci drachmā unam, opij  
drachmas duas, seminis lini contriti, fœ  
nogræci, maluæ syluestris, singulorū ma  
nipulū : excipito omnia sapa, hoc est de  
cocto uino, in quo bdellij drachmæ tres  
dilutæ sunt. Iam postq̃ excrementia su  
perficiē oleo sesami, in quo gallinaceus  
adeps, aut anatis solutus fuerit, inunxe  
ris, prædicta emplastri modo adhuc ege  
lida dolenti loco admoueto, extrinsecus  
betæ, aut lactucæ folijs tuendi gratia im  
positis. Aliud remediū, dolorem inflam  
mationemq̃ remittens, Cepam albam  
quā optime coctam, unā cum butyro  
uaccino tantisper dum emolliatur, conte  
rito, & ita ambo modicè calentiā ano in  
flammatione tentato submittito, id nāq̃  
mirifice dolorē reprimat. Quod si lan  
guētis anus scissuris, (quas Græci *scissura*  
appellāt) infestatur, quæ exiccata aluo ob  
fæcum duriciē cruciatus, dum æger ege  
rit, inferūt, catapotia ex bdellio subinde  
propinata, strenue auxiliant. Quæ con  
stant, myrobalanorū nigrarum, chebula

N rum,

## 194 PARA. IN NONVM

rum, utriusq; drachmis decem, sagapent  
drachmis tribus, nasturtij albi drachmis  
duabus, bdellij mollioris & pinguioris  
drachmis quindecim, oia porri succo, in  
quo bdelliū subactū sit, excepta in cata-  
potia redigūtur, quorū dosis identidē as-  
sumpta inter drachmā unā & † quatuor  
est. Si aut affectā partē ardor affligit, un-  
guēto de cerussa eam circumungito. Ab  
sente quidē aestu, unguine ex cameli gib-  
bi adipe, et bdellio preparato, affectā par-  
tem illinito, quod Arabes unguentū de  
Sene uocāt. Huius aut cōpositio in hunc  
modū se habet. Cerę lutea, olei sesami, a-  
dipis anatis, medullæ cruris uaccini, adi-  
pis ex cameli gibbo collecti, bdellij, cuius  
q; paria pondera, bdelliū feminis lini cre-  
more soluit, & alia eo excepta, in linimē-  
tum redigūtur, cui nullū uiribus par est.

Quod si ægrum profundiores scissuræ, à  
quib. foetidū pus resudat, implicēt, medi-  
camen acre Capite de ulcerib. descriptū,  
iis admoueto, et ut biduum admotū eger  
sustineat, sollicitato. At si reliquæ aliqua  
per sudores erūpentes remāserint, rursus  
tantisper

7. ad Al-  
man. cōstat  
ex aruginis  
et mellis æ-  
quis portio-  
nibus.

tantisper dū locus exiccetur, et nihil pro-  
 manet, nuper dictū medicamen superac-  
 comodato. Si autē ea, quæ hac in parte  
 innascuntur, in tantū prominēt propen-  
 dentē, ut arida ac liuida fiant, butyrū te-  
 pidū donec liuor amoueat, subinde ijs in-  
 ungit. Verū si denuo huiuscemodi de-  
 fluens sudor, egrum in posterū molester,  
 \* medicamē acre, et ad saniosa ulcera op-  
 timè faciēs, iam secūdo applicato. Sin autē  
 nihil refudat, unguento de \* cerussa opti-  
 me huiuscemodi excrescētis subuenies.

Est & quādo uenulę sanguine manan-  
 tes, & foris propendētes, ignito ferramē-  
 to curant, sed eius rei tractationē, propo-  
 situs liber minime admittit. Cæterū iter  
 reliquas corporis partes facillime anus si-  
 stulis tentat, quum arctis & oblongis sini-  
 bus ex sua figura subiectus sit, Fistulæ au-  
 tem hę nonnunq̄ penitus penetrāt, non-  
 nunq̄ cæcę sunt, Proinde si utrinq̄ pertu-  
 sę fuerint, flatus & sicciora recrementa  
 per eas protrudunt. Si autē una tantū par-  
 te foratę sunt, neq̄ sterqus, neq̄ flatus in-  
 de prorumpūt. Harū autē præsidia cōple-

*Hec omnia  
 ferè septi-  
 mo libro ad  
 Al. descri-  
 buntur.*

*Paul. lib. 7.  
 cap. 79.*

*Fistulæ.*

*Pulchre a-  
 pud Paul.  
 li. 6. Ca. 66.*

N 2 re

## 196 PARA. IN NONVM

tè percēfere, plus est, quā suscepto hoc libro limitari posset. Verū quia mortales pene omnes in harū curationibus, q̄ sapissime in maximos errores labunt, quo nō exiguae noxae subsequi solēt, perstringemus illa, quae huic affectui cōgrua praesidia putamus, quaeq̄ ratione ab huiusmodi uitijs sibi praecauere poterunt, exequemur. Existimamus itaq̄ fistulā utriusq̄ pertusam, & in ano penitus delitescētem, nulla ratione esse ferro cōtingendā. siquidē in his ferri incisio, stercoris praeter uoluntatē egestionē cōcitāt, licet et aliud quoq̄ sit, prohibens fistulā perfossam ferri mēto tentari: nimirū quū quoad uixerit aeger, hoc in statu a ferro nō laesus, permanere possit, nullā inde scilicet insignē noxam, praeter saniei resudationē percepturus. Verū si id quod ē fistula profundit, acre & mordax odoreq̄ foedū existit, cuiusq̄ copia indies increscit, fistula putrida quae herpetē exedentē sibi comitem habet, egrū infestat. Cui medicamine acri, erodētēq̄, & deinde deperditā carnē restituētē, priusq̄ malū dilatescat augeaturq̄, subuenire

*Opinionid  
esse, quod  
melle & æ-  
ruginē con-  
stat, &c.*

subuenire

subuenire debes, antea tamē leuiore quo  
 piam tentato. Porrò si id qđ refudat, exi-  
 guū, nec mordax, nec odore foedū fuerit,  
 sicq; malū non serpsit, nulla inde præter  
 refudationē & fluxū habēda suspicio est.  
 Poterimus tamē huic, ut exiccet, et subli-  
 deat, & nisi per lōga interualla quicq; re-  
 sudet, subuenire: atq; rursus ubi sanies e-  
 manat, præscriptū medicamen ad fistu-  
 las, huic quoq; fistulae accōmodare, eaq; *Eas curatio-  
 nes pallea-  
 tas practici  
 uocant.*  
 ratione tota egrī uita, blādīre illi nitēmur,  
 nullā inde notabilē noxam egrotāte per-  
 cepturo. Rationē autē administrādī me-  
 dicaminis hāc censeto. Ante omnia fistu-  
 lam, donec quicquid in ea conseruatū sit  
 pfluxerit, cōprimito, deinde collyrii Ca-  
 pite de oculi fistula descripti, portionē ali-  
 quā succo plantaginis, aut pluuiāli aqua  
 laeuigato. Iam si fistula specillū recipere  
 possit, specillū molli lana inuolutū, hocq;  
 liquore imbutū, fistulae imponito. Si autē  
 ob angustā, aut loci distantā, fistula spe-  
 cillū recipere nequeat, resupinato ægro,  
 alteroq; foemore puluinari incūbēte, col-  
 liriū succo plātaginis, aut illi simili solu-  
 tum,

tum, guttatim p̄ interualla fistulæ immānare finito. Hoc q̄dē tribus insecutis diebus mane, et sub uesperā, opportune perages. Præterea in aq̄ æneo uase calefacta infellus, & ex eadē lotiones, exusu erūt.

*Ad procidentia ani & uulvæ. Cap. LXXXI.*

*Ani.* **S**I anus inflammatione liber p̄cidit, itaq̄ se habet, ut impulsus in pristinū locū protrudī ac retineri queat, sumito cerusæ, balaustrij, gallarū, aluminis, stibij, singulorū pares modos, & ea in tenuissimū pollinē deterito, procidentiq̄ ano inspargito, ipso prius oleo rosaceo calēte circūlito, aut uino austero deterito. Deinde suo loco repositū anum, deligato. Id tamen ppriissime, postq̄ æger excreuit, tētabis, ne statim ad egerēdū necessitas ipsum urgeat. Sumunt quoq̄ ad presens uitū, gallæ, balaustria, glandularū calices, myrti folia, quæ simul aque donec ea rubescat incoquuntur, & deinde ex huiuscemodī decocto infellus & lotiones parant. Cæterum si anus ob inflammationē tumidus, imponi nequeat, æger in aquā calidā cōscendet, & ei ad tēpus immorabitur, atq̄  
 anum

anum cera, cui chamemelinū oleum, aut anethinū contemperatū sit, illinere, quo usq; reponi queat, consiliū est. Postq; uero recodi potest, supra præscriptis astringendi uim possidentibus pulueribus, & fascijs illi rei adaptatis, utendū erit. Vterus uero si declinauerit, eadē ratione illi subuenire decet. At in hoc uitio uinculis fortioribus uti, & ægram supinam & eleuatis foeminibus, ijsq; sibi mutuo innitentibus, decumbere necessarium est.

*Vulue.*

*Græci ad id pennis astringentibus utuntur.*

*Ad menses cōsertim erūpentes sistēdos. C.LXXXII.*

**I**mmoderate profluentib. mēsis retinendis, pastilli ex succino, astringente quo piā liquore læuigati, atq; septimana una ita ppinati, optime faciunt. Quibus si nō cōquieuerint, cōfectio quæ ferri steracus accipit, exhibebitur, & uena cubitū perreptās, opportune (partita interim sanguinis missione) incidetur. Cucurbitulæ quoq; sub māmillis infigēde sunt, et cibus austeris ac refrigerantibus utendū. Sūmē etiā facit medicamen hoc, in egræ sinum instar pelli immissum. Thuris, balaustij, gallæ, stibij, acaciæ, aluminis, singulorū

*Ob tenuem & mordacem humorem.*

N 4 aquæ



Pag. 169, et  
170. descri-  
buntur duo,  
et ad cali-  
dum scilicet  
affectum, et  
ad frigidum.

A costipatis  
frigore me-  
atibus, aut  
crasso san-  
guine.

æquæ portiones, his in tenuissimū polli-  
nem redactis, lana quæ ad pessum sat est,  
eo puluere circūlinitur, ac ita in mulieris  
pudendū inditur. Epithemata quoq; Ca-  
pite de uentris profluuiō cōprehensa, in-  
guinibus & lumbis inducere, & in aquā  
æneo uase calefactā conscendere, oppor-  
tunū est. Porrò si hæc nō profuerint, acu-  
tior pessus, ut q̄ crustas sua ui inducit, in  
uteri collū diutius retinēdus, subiicitur.

Ad suppressos menses citandos. Cap. LXXXIII.

**C**Um mēstruæ purgationis strāgula  
tui magna subsequitur noxa, pastil-  
los ex myrrha porrigito. Recipiūt autē,  
Myrrhæ drachmas tres, seminis lupini  
adamuissim cōtriti drachmas quinq;, folio-  
rum rute, mētastrī, pulegij, cumini, rubi-  
e fatiuæ qua uestes inficiunt, liquoris Syre-  
naici, sagapeni, opoponacis singulorum  
drachmas duas, his baccarū iuniperi iure  
subactis, informantur pastilli duarū dra-  
chmarū pōdere, & unus iure decoctiōis  
baccarū iuniperi detritus, in die exhibet.  
Sanè hoc medicamen adeo in ducendis  
mensib. pollet, ut etiā foetus educat, et in-  
ter

RHAZAE DE MOR. CVR. 201  
 ter primos dies conceptionē facile impe-  
 diat, si quæ eo identidē utatur. Ad hæc cu-  
 curbitulas popliti agglutinare, ac uenam  
 interiorem malleolum perreptātem, aut  
 poplitis incidere cōfert. Postremo foemi-  
 nibus cucurbitulas cum cutis incisione  
 defigere, non infimū auxiliū præstat.

*Ad uulnæ scissuras. Cap. LXXXIII.*

**H**Is curādīs, medicamē anī rimis, seu  
 fissis sacrū, ex usu erit. Præparatur  
 quoq; ad idē pessus ex anatis adipe, cely-  
 po, hoc est lanæ succidæ fordibus, cruris  
 ceruini medulla, hæc cera, oleo lilij aut  
 narcissi subacta, excipiunt, atq; ex ijs for-  
 matus pessus in egræ sinū dimittit, dūmo-  
 do neq; febris, neq; ardor ægrā molestat.  
 Quoniā si rimis æstus cū erosione adfue-  
 rit, oleum rosaceū illitū optime facit: nec  
 minus quoq; ex cerussæ unguēto pessus  
 subditus iurat. At si uehementior calor æ-  
 grā affligit, sumito portulacę, aut lactucę  
 succū, aut herbæ \* pulicaris seminis cre-  
 morē, fingitoq; laminā plumbeā leuitati  
 marmoris cui colores interunt similes, &  
 illi in circuitu labrū inflectito, ac deinde

**N 5** dicto-

dictorū succorū aliquē laminæ infūdito,  
et correspōdēte leuitati pistillo plūbeo, la-  
minā donec succus debitā spissitudinē re-  
cipiat, plumbicq; nō exigua portio ipsi ad-  
miscetur, terito. Iam \* illi succo rosaceū  
oleum admisceto, ac informato pello, in  
ægræ sinu ipsū subijcito. Hoc enim  
remedium uteri cancro exulcerato, eiq;  
consimilibus uitijis auxiliū est.

\* Aëtius no-  
αἰβλου χρ-  
ἀορ uocat.

cancro me-  
detur.

De uulvæ inflammatione. Cap. LXXXV.

\* Alias hu-  
merali,  
cephali-  
ca  
basilica.

**I**nflammationē si febris ardorq; cōco-  
mitet, sanguis ex t axillari minuendus  
est, & ægra pūfana enutrienda. Renibus  
quoq; & lūbīs, & fœmoribus, et sumini,  
epithemata calidiorib; tumoribus dicata  
superaccōmodabimus, & locū alijs refri-  
gerātibus (à fortī ligatura abstinentes) ue-  
hemēter infrigidabimus. Verū si febris et  
æstus cōquieuerint, ac aliquæ inflāmatio-  
nis calidæ reliquiæ in duriciē occallescen-  
tes supermāserint, liquidis & emollienti-  
bus unctionib; ac iniectionibus per infe-  
riora utēdū erit, & mulier in decocta sup-  
purādi emolliēdiq; uī pollētia desidebit.

\* Spud Gal.  
z. de arte cu-  
ratiua, re-  
percutiens  
emplastrū.

Pessus induratas uteri inflammationes  
emolliens,

## RHAZAE DE MOR. CVR. 205

emolliēs, ac eius cruciatib. leniēdis, pede  
tētīmēq; sedādis quā aptissimus: Adipis  
anatis, medullae cruris cervini uel uacci-  
ni, bdellij molliusculi, croci, lutei oui assii,  
facis olei seminis lini, fecis olei liliij, singu-  
lorum pares modi, omnia simul in sapa,  
aut alio quouis dulci uino subiguntur, sin-  
gaturēq; pessus dolorib. mitigādis, et uul-  
uā duriciē emolliēdis maxime opportu-  
nus. Cōducūt prāter hāc infessus ī deco-  
cto foenogrāci, seminis lini, chamemeli,  
meliloti et brassicarū sūmitatū: q̄ singula  
p se, aut simul oīa dulci aque incoquunt.

*De exulceratione, abscessu & cancro uteri.*

Cap. LXXXVI.

**V**Teri exulcerationē testat pus, aut  
sanies à uulua pfluēs, si itaq; prom-  
pta in cōspectum uenerit exulceratio, &  
pus aut sanies à primis partibus pfluxe-  
rit, nullaq; cavitās foeda putridaue agrā  
molestauerit, accipito aloē, thus, myrrhā,  
cinnabarim, sarcocollā, & ea in pollinē  
detrita, laborāti parti inspargito, tātisper  
dū solutionē unitatis puluere illo restitū-  
tam uideas. Aut eū puluerē liquore aliq̄  
perfusum,

## 204 PARA. IN NONVM

perfusum, in unguēti formā redigito, ac  
 ita utere. Sin autē altē pus profluit, pello  
 ad sāguinis & puris eruptiōes inscripto,  
 & succo plātaginis soluto, in uterū clyste  
 rem infūdito. At si qd' effluit, foedū mali  
 gnoq; odore fuerit, pessum secundū prio  
 re acriorē, dictoq; modo læuigatū, in uul  
 uam indito: prius tamen utero mulsa per  
 eneū oriculariū clysterē immissa, abluto.  
 Porro si præter materiæ fluxū, cruciatus  
 pūctiles & tumor durus, q̄ tactu deprehē  
 di possit, adsint, magno studio ne locus  
 acriorib. iriteē, præcauendū est. Proinde  
 succo plūbi, quē attritu supra apparauimus,  
 aut cerussæ unguēto opportune ute  
 mur, uenāq; cubitū preptantē utiliter in  
 cidemus. Est præterea ægra ab his q̄ atrā  
 bilē accumulare solēt, et aromatib. & se  
 minib. calidioribus, et icidētibus, q̄busq;  
 cōdita calidiora apparari cōsueuerūt, ar  
 cēda. De uulua strangulatu. C.LXXXVII.

Cancro me  
 datur.

Ex uitiato  
 semine, aut  
 mensibus.

**S**I qm̄ mulierē diutius sanguinē men  
 struū retinuisse acciderit, ac ad multū  
 interuallū uirū non admisisse, quū tamē  
 ad uenerē ea procliuis extiterit; præterea  
 si gra-

RHAAZAE DE MOR. CVR. 205  
 si grauitatē & dolorē in demissioribus lū<sup>1. femo-  
ris.</sup>  
 minis partib. perceperit, ad hæc si quēdā  
 ueluti ad superiora ex pubis partibus cō-  
 tractum senserit, animi deliquitū fortasse  
 hæc comitabit, & ueluti emortua morbo  
 ue comitali correpta mulier prosternet.  
 Vnde quoq; ægerrime eam aērē inspira-  
 re, uel arterias pulsare, p̄cipiemus. Et for-  
 sitan his accidētib. oppressa, suffocata pe-  
 ribit, fortasseq; (licet difficulter) sanitati  
 restituetur. Quapropter hunc affectū sta-  
 tim atq; implicat, p̄pellito. Incipito itaq; <sup>Dū est satis  
urium Celsi  
uenā secat.</sup>  
 curationē, a pedum & crurū fictione, eo-  
 rundēq; dolorificis uinculis astrictiōe, se-  
 cundū hæc per magnarū cucurbitarū in  
 pube et foeminib. agglutinationē. Obste-  
 trici quoq; digitū odorato oleo intingere  
 præcipito, ut eo in uteri collo inferto, &  
 penitius q̄si ad uulua os demisso, circūli-  
 nitu & titillatione corruptū semē eliciat.  
 Naribus etiā struthiū inspirandū, ac auri-  
 bus †prolatæ uoces sonoraē inelamandæ <sup>†Aliqui cen-  
tus ridicu-  
las uoces  
prescribūt.</sup>  
 sunt. Itē nihil iucūdo gratoūe odore pol-  
 lens narib. admouēdū. imò odorata, cu-  
 ius generis gallia moschata est, recte abij-  
 ciuntur.

ciuntur, Inguina autē, ac illis cōtermina  
loca, odoratis epithematis foueto, & ea q̄  
tetro foedoūe odore sunt, naribus induci  
to, cuius notae stercus, castoreū, sulphur,  
& extinctū ex lucerna linimentū, cēsent.

*Pli. addit ca  
pillos mulie  
ris crema-  
tos.*

Caterū muliere ualetudini restituta, iā re  
cēsendis p̄sidijs, ne denuo affectus exer  
ceat, eā à noxa præseruare pfuerit. Proin  
de si morbus post mēsiū suppressionē na  
sca, ea quæ mēsibus cēdis sunt p̄beto.

*post Longā  
rari dispan  
ctiōnem  
disuētio-  
nem l*

Itē ē pedis uenis sanguinē detrahito, in  
guinibusq̄ ac coxis cucurbitulas affigi  
to. Porro si post diu itermisum cōcubitū

(q̄ subīde huius mali autor esse cōsueuit)

huiuscemodī noxa inuaserit, summē au  
xiliabitur cū uiro coitus: aut si eius occa  
sio non datur, obstetrix, aut ipsa mulier  
præscepta ratione interpositis interual  
lis semen prouocabit. Vel semen extin  
guētia, quæ suo loco executus sum, offer  
to. Item pastillos ex myrrha Capite de ci  
tandis mensibus inscriptos porrigo.

*Circa finem  
quinti ad  
Almāforē.*

De mola uteri. Cap. LXXXVIII.

*Ex mulie  
bri semine  
et affluētib.  
mensibus.*

**I**Nterdū mulieres affectus quidā angit,  
qui per initia cōcepti fœtus suspiciōnē  
adfert.

adfert, illis em̄ ueter intumescit, & decolorata apparēt, mensesq; supprimunt. Motus tamē qui in hoc morbo est, ab eo q; ab infantib. fit, dissimilis percipit. mola nāq; digitis uolēter iniectis, à suo loco aliter q; foetus dimouet. Ceterū circa finē mali cū magnis laborib. doloribusq; informē aliā quam carneā massam, nō aliter q; si parent, educūt. Interim aut̄ interdū soli flatus, & humorū copīa, ab utero, prūpunt. Vnde ueter fidere solet, atq; enumerata symptomata ab agrotante offerri. Porro postq; tēpus, q; foetus utero gesti moueri solēt, lapsus est, pastilli ex myrrha seminū incidentiū decocto lauigati, ppinādi sunt, oleūq; † balsami inguinibus, & uteri collo inungēdū. Ad hęc pessus, q; ruta et mēastro cōstāt, & alios Capite de mēsiū puocatiōe, foetusq; eductiōe cōscriptos, subiicere cōuenit. Quantitas quoq; catapotīs foetidis una uice porrigēdis inscripta, pluries ppinabit, siquidē his omnibus, affectā propediem liberabuntur.

De ramicū generibus. Cap. LXXXIX.

Si alicui in abdomine pars aliqua pro-

Quae mola educunt.

\* Id serē 4. aut. 5. mense est.

† Alias, chei sim, hoc est ligustici. Alias de rasiū.

Laxato, aut rupto ad uer-



*sa semina -* minet, quæ resupinato ægro, & leniter di  
*ria perito -* gitis parti admotis, sidit: quæq; rursus se  
*neo.* dēte ægro prouoluit, affectus ramex di-  
 ctus agrū molestat. Quocirca hoc mor-  
 bo implicatus, à uehemēti motu, nēpe cur-  
 su, saltu, clamore, & id genus alijs, præfer-  
 tim post ingestū cibū, cohibendus est, ac à  
 fabarū, & imprimis phaselorū, lenticule,  
 oleorū, horūq; quibus inflādi uis adest cō-  
 mestioe, omnino arcendus. Verū inter cæ-  
 tera maxima laborātī sollicitudo, ut aluus  
 cita fluat, habēda est, siquē ea ratioe, for-  
 tassis quo minus doleat præcauebit. Præ-  
 ter hæc, loco deligaturā cōuenientē, præ-  
 cipue dum occasio motū præcipit, accō-  
 modare cōfert. Tamē si uehemētius uen-  
 ter eminet, et grauat, à motu omnino ab-  
 stinēdū, nisi forti fasciā, aut alio ad id ido-  
 neo uinculo, inguinib. præcinctis. Em-  
 plastrū ad ramicē. Gallarū, cupressi, utri-  
 usq; partes duæ: myrrhæ, cyperi, sampsu-  
 chi, acaciæ, thuris, gūmi Arabici, cuiusli-  
 bet pars una, gūmi uino lauigantē, & reli-  
 qua in puluerē pbe coacta, illis adijciun-  
 tur, deinde contusa, & resupinato ægro  
 instar

instar emplaftri admota recte deligant, et  
 insoluta ad † triduū, aut quatrīduū sinun  
 † Aliās, ad  
 sex, aut se-  
 ptem dies,  
 nec malē.  
 Tunc itaq; rursus supino procūbēte  
 ægro, fascia laxatur, eoq; emplastro abie-  
 cto, aliud in eius uicē applicat, ea nāq; ra-  
 tione, ne dilatescat malū, cauet. Quum  
 ramex ad testes pertinet, scrotū increfcit  
 ac intumet, idq; uel ob coaceruatos fla-  
 tus, uel alicuius humoris coluuiē ibidem  
 collectā, aut propter intestinū aliquod in  
 eam partē deuolutū. Si itaq; ob plapsum  
 intestinū cōtingit, grauis & excrucias, ta-  
 ctuq; indolēs ramex erit. Proinde illi ean-  
 dem quoq; quam præscripsimus uiuēdi  
 rationē instituemus, ac pauloante dicto  
 emplastro superaccōmodato, locū conti-  
 uo fasciis cōstringemus; siquidē ramex  
 uinculis nō cōpressus, indies magis dila-  
 tescit augeturq;. Si uero ob coaceruatā  
 humoris colluuiē euenerit, scrotū ipsum  
 turbidum, tersum ac intēsum conspicit.  
 Huic itaq; aquoso ramici epithema Capi-  
 te de aqua subter cutem ad *solitū* descri-  
 ptū, circumlinendū, aut potius emplaftri  
 modo superaccōmodandū. In hoc præ-  
 senti

Hactenus  
 de inguinū  
 ramice  
 egit.

○ senti

senti affectu, aqua interdum ad inferiora  
 procūbit, per quę etiā nonnunq̄ refudat,  
 & aliquādo parte scalpro pertulā, p̄fluit,  
 quibus occasionib. æger ad tēpus malo  
 liberatur, at tēporis successū morbus re-  
 petit. Proinde post effluxum humorē, æ-  
 grotāti ignitis ferris, et medicaminib. stre-  
 nuē siccātibus ac astringētibus, succurrē-  
 dum est. Quoniā illorū remediorū usū,  
 mali restitutio fit, nec aliās huiuscemodī  
 noxa ægri tentant. Caterum harum ma-  
 nualium curationū tractatio, propositi li-  
 bri instituti non est. Quando autē huius  
 affectus, flatuosus spiritus auctor est, locū  
 perfricare benefacit, & oleo iōsmīno in  
 quo castoreum & euphorbium læuigata  
 sunt, recte pars tumida subungitur, ac in  
 penē quoq̄ guttatim huius portio, com-  
 modē per syphonem insullatur.

Apud Paul.  
 lib. 6. C. 62.  
 Cel. lib. 7.  
 cap. 21.

De podagra, reliquisq; articularijs morbis. C. XC.

A calidi hu-  
 moris af-  
 fluxu.

**S**I quando articulos dolor cū tumore  
 exercet, & tactu locus calidus, colo-  
 re t̄p̄ rubro perfusus percipitur, ægrotāti  
 si dextro pede laboret, ex extrema dextra  
 manū, aut cubito; si sinistro, ex summa læ-  
 ua

va manu, aut cubito, sanguinem detrahi  
 to. Partē quoq; affectā, ad reprimendū  
 humorū influxum, doloremq; remitten-  
 dum, hoc epithemate irrorato, Rosarum  
 rubrarū, sandali rubri, nucis Indicę, glau-  
 cii succi preparati, lapidis Armenij, opij,  
 singulorū æquæ portiones, his aqua &  
 aceto subactis, epithema inducitur, ac ne  
 concalescētū noceat, subinde repetitur.  
 Itē herbæ pulicaris semen aceto macera-  
 tum, & chartæ, uel alicui linteo ad id ido-  
 neo inducētū, tātis per dum tepuerit, dolē-  
 tī parti superaccomodato. Quando autē  
 tepuerit, illo amoto, in eius locum aliud  
 debile refrigeratū, applicato. Ad hæc al-  
 lum myrobalanorū et hermodactylorū  
 iure deijcito. Præparabis autē huiuscemo-  
 di ius hac ratione. Accipies myrobalano-  
 rum citrinarū drachmas quindecim, pul-  
 ueris turbit oleo amygdalarū dulciū cir-  
 cumliti, filiculæ (quam Greci πολυπόδιου  
 uocant) utriusq; drachmas tres, foliorum  
 arboris senæ drachmas quatuor, seminis  
 fumarie herbæ tantundē, hermodactyli  
 albi, seminis intybi, seminis apij, rosarū,  
 O 2 singu

singulorū drachmę duę, omnia in tribus  
 libris aquę, ad duarū consumptionē de-  
 coques, & insup manibus adamussim cō-  
 fracta percolabis, ac eius excolati iuris  
 uncias sex, aut septē cum sacchari albissi-  
 mi drachmis decē, prospere porriges. Ve-  
 rum si quis præsens decoctū fastidierit,  
 catapotia præbeto, quę lecto decumben-  
 tes surgere, moueri, & obābulare faciūt.  
 Cōpositio quidē eorum in hunc modū  
 se habet, Aloës drachma una, scāmonij  
 obolus semissis, rosę rubrę cōtritę obo-  
 lus unus, hermodactyli albi drachma se-  
 mis, redigito hæc in catapotia, ac una ui-  
 ce porrigito, habito interim respectu ui-  
 riū ægroti. Cæterū æger cibis infrigidāti-  
 bus & austeris enutriendus est, & a uini  
 potu & carne, hisq; quę melle parantur  
 circumcidēdus, Cū uero tumoris ardor  
 inflāmatioq; cōquieuerint, his quę cali-  
 diorib; tumoribus discutiendis sunt, affe-  
 ctus sanabit. Eius quidē notæ hoc est: Ce-  
 ra oleo lilij soluta, succo fœnogræci, & se-  
 minis lini cōmiscetur, simulq; ad debitā  
 mixturā pistillo terunt, & deinde epithe-  
 matis

\*Interpres  
 male quar-  
 tam partē  
 drachmę  
 uertit.

Plura et me-  
 liora. 7. ad  
 A'mā. libro  
 describuntur

## RHAZAE DE MOR. CVR. 213

matris instar aegræ parti accommodantur.

Interuallis uero quibus sanus, ac ab accessionibus aeger liber est, uenæ sectione circa tēpus quo malo torqueri solet, idēq; potissimū in uere, est utendū: ac aliuus his quæ flauam bilē purgāt deijcienda, atq; à uini, & eorum quæ melle apparātur, & carnis usu abstinendū. Proinde cibus acidis & austeris, hisq; frigiditate paribus, enutrietur. Porrò partes huiuscemodi uitio cruciari solitas, paulatim à consueto exercitio dissuescere confert, maximè dū accessionis tempus expectatur, et corpus & uenæ sanguine turgēt, & quādo à uenæ sectione, atq; alui solutione, ad longū interuallū aeger sibi tēperauerit. Cæterū si quādo articulorū dolorē neq; ardor, neque rubor concomitetur, & aeger frigida temperie sit, locusq; tactu algidus percipitur, inter curatiōis inītia, catapotia maiora de hermodactylis porrigenda sunt. Quorū mixtura talis est: Hermodactyli, satyrii, chamaeleæ, cuiusq; drachmę quinque, hieræ picræ drachmæ decē, cucurbitæ syluestris, cętaurij minoris, utriusque

Huius morbi preseruatō.

Acetū tamē quū sit neruis inimicū nō cōuenit.

A crudo humore.

O 3 drachmæ

## 214 PARA. IN NONVM

*Practici horum usum, coquentia precepsisse uolunt.*

§

*Veniunt nulli cat. Mes. ex hermo. quia non a deo uehementes.*

*Tophi articulorum.*

drachmę gncę, euphorbij drachmę dug,  
 turbit drachmę decę, thapsię Indicę, zin  
 giberis, sinapis, piperis, castorei, singulo  
 rum drachma una, omnia simul rosarū  
 melle excepta, in catapotia digerunt, ho  
 rum pōdus a drachmis drabus cū semis  
 se, ad tres datur, Sanē mirifice hęc catapo  
 tia profunt, liquidē ægre surgētes ad am  
 bulationē promouent. Epithema ad fri  
 gidū pedum articulare morbū efficac.  
 Styracis liquidę, castorei, euphorbij, myr  
 rhæ, aloës, acacię, singulorū æque portio  
 nes, his uino ueteri affuso, format epithe  
 ma. Caterū dolore se remittēte, laborātī  
 calidæ aquæ ab alto instillatiōe, & olei li  
 liorū inunctiōe, prospere subueniemus.  
 Emplastrū præterea ex bdellio molli, sty  
 race, fœnogręco, semine lini et ammoni  
 aco præparatū, utiliter dolenti parti indu  
 cemus. Adaptabimus autē id ad hūc mo  
 dum, ammoniacū cum bdellio uino uete  
 ri diluemus, quo reliqua excepta, ac si  
 mul linteo aliquo accōmodata, loco in  
 star emplastrī superponemus. Id quidē  
 articulorū uitium, quod in lapideā duri  
 ciem

ciem occalescit, quodq; cola & articula  
 mēta tophis adimplet, presentis affectus,  
 de quo iā paulo ante locutus sum, species  
 censet. Quare hoc quoq; uitio implicitos  
 à fastidiosa ciborū repletionē, frigida po-  
 tu, cibus glutinosis & crassis, & crebra te-  
 mulētia, merito arcere cōuenit. At postq̄  
 sanitati restituti fuerint, mediocre exerci-  
 tium, praesertim ante cibū illis imperādū  
 est, & à uenere imprimis uentriculo cibus  
 distenso, sunt cohibēdi. Ad hęc à balneo  
 dulcis aquae abstinere, & post assumptos  
 cibos quiescere, cōsiliū est. Potui uero eis  
 uinum merū ac uetus, & ea quę urinas ci-  
 tant medicamina, dum sani uiuūt, porri-  
 gētur. Affectus à parte implicita coxen-  
 dix appellatus, is dicit, qui ab ossē lato &  
 coxendicis per fœmur ad genua usq; pro-  
 tendit, quicq; nōnunq̄ etiā in longū uirgē  
 instar, per totū crus dimissus ad summū  
 usq; pedē pertingit. In hoc itaq; affectu,  
 si intemperie calor præualet, urinęq; co-  
 loratae sint, sanguis primū uena cubitum  
 perreptāte lateris dolentis pertusa, ob ple-  
 thoriā minuēdus est; deinde poplitis, aut

Ex calore  
 medicami-  
 nū crassis re-  
 liquis indu-  
 ratis, & te-  
 nubus reso-  
 lutis.

Mali à frig-  
 humore præ-  
 seruatio.

Coxendix,  
 siue scia-  
 tica.

A sanguine.



## 216 PARA. IN NONVM

A crudo  
succo.

ea quę exteriorē malleolū perreptat, deri-  
uationis gratia secta, opem fert. Item ea  
quę ad calidū articulare pedum do-  
lorem inscripsimus, præter humorum  
tamen in partem impetum reprimētia,  
summopere cōfert. Caterum si æger fri-  
gida temperie fuerit, colorq; exalbidus et  
aquę subter cutem similis, subinde rapha-  
ni decocto, & syrupo acetoso, uomitū iri-  
rato, Coxā uero, & fœmur, et tibiā totam  
oleo in quo castoreum, euphorbiū & sty-  
rax lauigata sunt, cōtinuo inungito. At  
si coxendicis dolor diuturnus, & solutu  
cōtumax fuerit. ægrotāti clysteres ex mu-  
ria Nabatheæ & nitro præparatos, infun-  
dito. Collyriū quoq; ex cyclamine & syl-  
uestri cucurbita confectū, & raphani &  
cepæ decocto solutū, quousq; locus leni-  
ter exulceretur, superaccomodato: quo-  
niam papulis cōcitatis, affectus subinde  
restitui consueuit. Si uero morbus in ue-  
tustatem incidit, sumito sinapis & ster-  
coris columbini æquas partes, & eas tri-  
tas ficuum decocto excipito, ac in morē  
emplastri coxendicis regioni superindu-  
cito,

1. baurach

Has exulce-  
rationes ne  
cito cicatri-  
ce obducantur, brassicę folijs te-  
gunt.

cito, ac tantisper dum ex concitatis uel-  
 culis sanies profluat, finito, & deinde lo-  
 cum aqua calida irrorato. Post hæc die-  
 bus aliquot, ægrum à medicaminum usu  
 liberum reddito, siq̄ illis sanitati non re-  
 stituitur, eandem curandi rationem repe-  
 tito, ac ita ægrotanti succurrito. Porro si  
 affectus diuturnus ad multum tempus  
 exercet, suspicioq̄ sit luxationis capitis  
 foemoris ex coxendricis cotile, ob uiscosi  
 humoris uitium, aut si articulus iam luxa-  
 tus fuerit, ad uisionem descendere oportet.  
 Proinde ferreo instrumēto † instar ro-  
 tæ adaptato, locum circa articulationis  
 latera urito, & in lati ossis summitatis, ac  
 foemoris capitis cute, ignito ferro aliam  
 crustam inducito, prioremq̄ ea ratione  
 augeto. Verum huius rei tractationē præ-  
 sentis libri termini haudquaquam admit-  
 tunt. Præter autē omnia iam comprehen-  
 sa, dum ualet æger, uomitum sibi familia-  
 rem reddet, ac aluum facile respondentē  
 sibi procurabit. Præterea uictus rationē  
 (crassos cibos, multamq̄ temulentium à  
 e arcendo) extenuabit.

† Aliter idē  
 autor in li-  
 bro de ar-  
 ticularijs  
 morbis, ca-  
 pite. 25.

Recētiore  
 Græci tres  
 crustas u-  
 runt.

Ab humore  
frigido. **Q**um gibbus primū nasci cœperit,  
catapotia maiora ex hermodacty-  
lis porrigito, ac subinde olei † ligustici  
drachmas tres, cū seminū calidorū deco-  
cti uncijs tribus, propinato. Ad hæc, par-  
tem oleo iofmini, in quo styrax liquida,  
castoreum, euphorbiū subacta sunt, illi-  
nito, & à crassis refrigerantibusq; cibis æ-  
grum arceto. Præterea aquam calidā, cui  
mentastrū, sampsuchus & stichas Arabi-  
ca seu Gallica iococta sint, parti ab alto su-  
perfundito: insuper frequētes frictions,  
atq; ex calidiorib. oleis inunctiones, ten-  
tato. Quod si hoc morbo correptus puer  
fuerit, tepentis aque balnea, ac ex iā enar-  
ratis oleis inunctiones, abunde auxilia-  
buntur. Verum si nunc primū nascē-  
tem gibbum febris concomitetur, à iam  
dicta curandī ratione, planè est disceden-  
dum, & ex herbis infrigidantibus deco-  
ctum cum cassia fistula potui propinan-  
dum. Item uena quoq; axillaris pertun-  
denda, atq; emplastra ad dolentē locum  
usq; uī sua refrigerandī perreptāua, affe-  
ctæ

Ab inflam-  
matione.

etæ parti superaccommodanda sunt.

De varicibus.

Cap. XCII.

**S**I uenæ dilatatae & turgidae, & uarijs <sup>Acrasso &</sup>  
 re cōspiciantur, uiridioresq; in cru <sup>melancholia</sup>  
 pellatus, ob similitudinē quam cum uitis <sup>co sanguine.</sup>  
 maioribus ramis inæqualiter distributis  
 habet, hominē afficit. Quo morbo mul-  
 tos labores pedibus subire soliti, cibisq;  
 melancholicū sanguinē coaceruantibus  
 copiose se implētes, subinde offenduntur.  
 Inter initia itaq; presidiorū uenā axillare  
 incidere expedit, ac his quæ bilē atrā edu-  
 cunt, quorū <sup>Capite de melācholia memi-</sup>  
 nimus, alius rectissimē subducent. Et hæc  
 pluries reiteranda sunt, & ab omnibus a  
 quibus melācholici arcent, omnino præ-  
 senti affectu impliciti, cohibendi sunt.  
 Postq; autē ad dies aliquot præscripta cu-  
 rādi rōne usi sumus, sanguinis detractio-  
 nē ē uenis cruris intumescētibus, moliri  
 opportunū erit, ex quibus tantisper dum  
 qcquid in illis collectū sit, effluerit, san-  
 guis manare sinetur. In summa igitur, æ <sup>Excindus-</sup>  
 grum bilē atrā euacuantib. uti, uenamq; <sup>tur interdū</sup>  
 axillarem <sup>varices, ut</sup>

apud Paul. axillarem pertundere confert: proinde et  
 li. 6. Ca. 82. ab omnibus melancholicū succum gene  
 i. brasiuam rantibus, abstinere opportunum est.  
 omni. 150. renou. vocabulo.

De elephantia. Cap. XCIII.

Inter reli-  
 qua reme-  
 dia Græci  
 adustionem  
 capitis pro-  
 bant.

**H**ic affectus postq̄ penitius radices  
 infixerit, nunquā curationē admittit.  
 At si recens adhuc malū est, & manū  
 quis ei recte adhibet, eoq̄ quo debet mo-  
 do præsidia applicet, restituitur, aut saltē  
 ne inualescat augeaturq̄, illi p̄spicitur.  
 Quando itaq̄ crura intumescunt, & to-  
 tus habitus atro colore suffunditur, ue-  
 næq̄ quas uarices appellant apparēt, fre-  
 quentē uomitū à radícula assumpta, aut  
 cibis imperare cōducit, similiter quoq̄ à  
 nimia obambulatione, & à recto corpo-  
 ris statu abstinere cōfert. Præterea uenter  
 secundū uomitū, catapotijs maiorib. ex  
 hermodactylis ducēdus est, & deinde uo-  
 mitus reiterādus. Hæc nanq̄ subindere-  
 petita iuuant, & æger à crassiorū esu utili-  
 ter arcetur. Itē tibiam totā ligatura ex ca-  
 nina pelle intercípere conuenit, idq̄ uin-  
 culo prius in calcaneū iniecto, atq̄ ita sur-  
 sum ad genu deducto. Verū anteligatio-  
 nem,

nē, epithemata ex aloē, myrrha, acacia, hypocistide, & alumine, simul omnib, in aceto acri detritis, preparata, cruri admo- uere ex usu est. Venā quoq; interiorē cu- bitū, si res exostulauerit, manus opposi- tae incidere oportet: idq; magis uere, in q; potissimū hæc lues & nascitur, & intēdi- tur. Caueat etiam eger, ne rectus stet, nisi uniuerso crure exactissime deligato, & nulla ratione ab huiuscemodi epithema- tum usu abstineat. Itē uomitu quoq; idē- tidē utatur. Quod si eger statim à uomitu quietē petat, is brassicarū seminibus, sti- chade Arabica, sarmentorū cinere, lupi- nis, nitro, caprino stercore, foenogræci fa- rina, simul in salita aqua decoctis, euapo- rādus est. Præterea uno atq; altero die ex lixiuio fodus, optime facit, nā hoc pposi- ti affectus, præcipuam partē discutit, aut saltem illum leniorē mitioremq; efficit.

De lumborum rubore, seu exulceratione.

Cap. XCIII.

**C**Vm quispiam diutius supinus dor- so incumbit, renū regio rubet, un- de et parua ulcuscula nōnunq; eueniūt. Quando

i. mentaf-  
tor  
\* Hoc lixi-  
uū multi ex  
quercus ci-  
neribus, ace-  
to peracri-  
o uino ca-  
lidiorē pa-  
rant.  
† Aliis  
ligna

## 222 PARA. IN NONVM

Quando itaq; rubor intendi cōspicitur, miliū, aut panicū, aut falicis folia subster- nenda sunt, ægerq; frequenter ab incubi- tu subleuādus est. Ac hæc loca rubentia, aqua rosacea niue aut fonte refrigerata, irrorare, & flabellis ea euētilare, cōducit. Verum calore non conquiescēte, epithe- ma Arabibus alhubrati dicitū, ex aqua ro- facea, cāphora & alijs quibusdā refrige- rantibus succis præparatū, ueluti Capite de phlegmone descriptū est, summa utili- tate superaccommodabitur. Vel succus plumbi, supra ad uulvæ scissuras inscri- ptus, utiliter loco inducetur. Iam si papu- læ, atque exulcerationes oboriantur, un- guento quod \* cerussa constat circumli- tæ, restituentur.

Li. 7. ad Al  
mas. ca. 10.  
\* Officine  
albū Rasis  
uocant.

De doloribus extremarum, summārum uē  
partium. Cap. XCV.

**D**Vm dolor aliquis, manū aut pedē  
exercet, æger interrogādus est, an  
is illi ex ictu, uel incidente quopiā corpo-  
re, uel diuturno in partē innixu, uel alia  
quacūq; manifesta causa, euenerit. Quo-  
niā si eius doloris externa causa autor nō  
fuerit,

## RHAZAE DE MOR. CVR. 223

fuerit, affectū locum intueri oportet, an  
 ne scilicet cæteris partibus plus minus ue  
 rubeat, siquidem si uniuerso corpore ma  
 gis rubore suffusus fuerit, præsidia phleg.  
 moni dicata ex usu erunt. At si neq; cali.  
 dior, neq; sanguinolētior percipiat, sed si  
 indies liuescat exicceturq; aquā calidam  
 ab alto illi instillare cōfert. Item cera oleo  
 macerata, inuncta, & tātis per dū cōquie  
 uerit dolor, in parte relicta, subsidiū præ  
 stat. Cæterū si pars subtumida, manuū  
 tactui subfrigidā temperiē referat, subin  
 de eam infricare expedit, ac aquā calidā  
 ī qua sampſuchus, chamemelū & stichas  
 Arabica ebulierint, parti infundere, uti  
 iā diximus, utile putat. Dehinc oleo \*lu.  
 tearum uiolarū, quæ antiquis parietibus  
 innascūtur, locus irrorabitur. At æger ui  
 ctus rationem extenuabit, multoq; exer  
 citio utetur. Item in laconicum primam  
 balnei domū, ut sudorē prouocet, utiliter  
 ingrediatur. Verum si hæc inualida fue  
 rint, aliū serosum succū expurgātib. re  
 medijs, ducēda est. Pars præterea si tactu  
 frigida

Li. 7. ad Al  
 māf. ca. 10.

\* Officinæ  
 cheieri uo  
 cant.



## 224 PARA. IN NONVM

frigida experiatur, primum fricanda est,  
 1. sambuci-  
 no  
 2. de baen  
 deinde oleo costino, & oleo iofmini &  
 balanino, & his uiribus paribus, modi-  
 ceq; tepentibus, circumlinetur. At si hæc  
 quoque inefficacia fuerint, unguentis,  
 Capite de neruorum resolutione supe-  
 rius compræhensis, donec probe  
 omni molestia æger libere  
 tur, inter unguendum  
 utemur.

PARAPHRASEOS ANDREAE  
 vvesaliij Bruxellensis in nonum Rhazæ  
 ad Regem Almanforem, de affe-  
 ctuum singularum corporis  
 partium cura-  
 tione,

F I N I S.

ANDREAS

ANDREAS VVESA-

LIVS BRUXELLEN-

sis Candido Lectori S. D.



EREO optime Lector, undecum  
que delicatioribus auribus satis-  
factum nō esse, quum interdum  
in hac nostra Paraphrasi uoces  
quasdam ab Arabibus, & ferē o-  
mnibus nostri temporis Medicis  
in medendi usu tritas reliquerim, quæ tamen nec  
uerē Latinae dici possint, nec ab eruditis in Latina  
lingua scriptoribus (Plinium dico, Celsum, Lar-  
gum, Varronem, & Columellam) receptæ sint.  
Quare te hoc loco admonendum duxi, non id u-  
biq; sed interdum & necessario factum, nimirum  
in quibusdam simplicium medicaminum Græcis  
illisq; autoribus incognitis nominibus, & aliqui-  
bus compositorum medicaminum formulis: cu-  
iusmodi sunt, myrobalanorum Arabibus usurpa-  
ta genera, tamarindi, camphora, iuleb, syrupus,  
electuarium, aliq; (si quæ reperiantur) similia.  
Quicquid tamen sit, nullam omnino eius gene-  
ris relictam existimo, quam non alicubi in libri  
marginibus, quibus interdum Lectori consulere  
statui, aut orationis serie, prout res postulare ui-  
debatur, explicauerim, meumq; quid de ea senti-  
rem iudicium adscripserim. Neq; uero me fugit  
P esse non-

## EPISTOLA

esse nonnullas, quæ Latine quidem, Græcè exprimi potuissent. Sed quoniam autores de his parum inter se consentire uiderentur, satius putavi, eas quoque quales reperissem relinquere. Talia sunt, turbit, Arabum spodium, kanabel, cali, & si quæ istis sunt cognatæ dictiones: quas tamen omnes huiuscemodi ferè nota \* uel semel saltem signari curauimus, quemadmodum & hac † diuersam ubique lectionem iudicare placuit. Præter quas et hanc § in ipso cõtextu dictionisq; serie collocatam reperies, ut nimirum intelligas, quod quicquid ea includitur, id Rhazæ omnino non sit.

Quamquam nec omnia, quæ paraphrastica libertate interieci, his statim quoque characteribus ceu terminis intercipienda duximus: at ea duntaxat, in quibus, aut propter prolixitatem, aut nouam inuentionem, à morosiori quopiam petulantiorisq; linguæ inculari possem. Licet & id rarius, quum magis paraphrastæ, quàm interpretis officium insecutus sim. Vale candidissime Lector,

& hunc nostrum laborem, quem primus inter eos, qui aliquid posteris in medicina reliquerunt subiui, boni consule.

ELENCHVS BREVIS EORVM,  
 quæ singulis huius libri Capiti-  
 bus continetur.

Cap.		Cap. i. Pag.
1	De capitis dolore.	2.8
2	De uertigine, quam Græci σκότυμ uocant.	3.10
3	De phrenitide.	4.13
4	De apoplexia.	5.16
5	De sopore.	6.17
6	De congelatis, quibus semper oculi incommuētes manent.	7. ead.
7	De neruorum resolutione, quæ παράλυσις dicitur.	8.21
8	De stupore & tremore.	9.23
9	De oris distortionē.	10.24
10	De conuulsione, quam σπασμὸς Græci uocant.	11.25
11	De morbo comitiali, πικνίδια dicto.	12.30
12	De incubone, qui affectus φιάλις Græcis dicitur.	13.31
13	De melancholia.	14.39
14	De disillatione, raucitate, & grauedine.	15.43
15	De lippitudine, quæ δαλμιά Græcis uocatur.	16.47
16	De oculorum ulceribus.	17.51
17	Ad ea quæ oculis incidunt educendā.	18.52
18	De albugine oculo innata.	19.54
19	De scabrie & tunicula.	20.55
20	Ad maiorum angulorum carunculas pruritu uexatas.	21.56
21	De ungui oculorū, quod πύργος Græcis uocatur.	

## ELENCHVS

cap. 22	De uibice, ac cruentis suffusionibus ex ictu, aliaue causa.	
	22. 58.	
23	Ad lachrymas.	23. ead.
24	De uisus debilitate.	24. 59.
25	Ad palpebrarum tumorem, Græcis χίμωσιμ appellatum	
	25. 61.	
26	Ad palpebrarum pilos, oculos iritantes.	26. ead.
27	De suffusione, siue humorum in oculum affluxu.	27. 62
28	Ad nocturnam cecitudinem, quæ νυκταλωτ Græcis dicitur.	28. 65
29	De dilatatione pupille.	29. 66
30	De fistulis, maioribus oculi angulis accidentibus.	30. 67
31	De aurium dolore.	31. 69.
32	De auris ulcere.	32. 72
33	De sonitu & tinnitu aurium.	33. eadem
34	Ad grauem audiuum.	34. 73
<i>ibid.</i>	Ad aurium uermes, et animalcula auditus meatum irrepentia.	35. 76
<i>ibid.</i>	Ad ea quæ in meatum auditorium incidunt euellenda.	
	36. eadem pagina 76.	
35	Ad sanguinem è naribus erumpentem.	37. 77
36	Ad narium crustas & ulcera.	38. 79.
37	De polypo & sarcomate.	39. 80
38	De oblesâ olfaciendi facultate.	40. 82.
39	De dentium & gingiuarum dolore.	41. 84
<i>ibid.</i>	Medicamenta cradicantia & confringentia dentes.	42.
	87.	

Ad stuporem

CAPITVM.

cap. 40	Ad stuporem dentium.	43.88
ibid.	Ad dentium restrictionem.	44. cad.
ajoue	De lingue orisq; superficialijs ulceribus.	45. cad.
41	De gingiuis sanguine humentibus.	46.89
42	De laxatione proidentiaue gargarionis.	47.90
43	De hirudinibus gutturi incidentibus, aut alijs reptilibus fortuito irreptantibus.	48.91
44	De his que in os, seu cesophagum prolabuntur.	49.93
45	Ad oblesum lingue sensum, ac deficientem motu.	50.94
46	Ad linguam in nimiam molem intumescenem.	51.96
47	De tumore sub lingua enato, qui ranula dicitur.	52.97
ibid.	Ad pustulas ac tumores lingue.	53. cad.
48	De angina.	54. cad.
49	De tussi.	55.100
50	De difficultate spirandi, quam Græci ἀσπυα appellat. e	56.102.
51	De laterali dolore, qui πλινθία Græcis dicitur.	57.104
52	De pulmonum inflammatione, que περιπνευμοτις Græcis dicitur.	58.108
53	De cruentis ac purulentis exptionibus.	59.109
54	De tæbe, que φθίσις Græcis dicitur.	60.111
55	De cordis palpitatione.	61.113
1	De cholera morbo.	62.115
2	De uentriculi imbecillitate.	63.120
3	De oris uentriculi dolore, ac inflammatione.	64.127
4	De singultu. <small>nota. in libro de gradu: adiecit cap. 9. de vomitu.</small>	65.133
5	De canino appetitu.	66.135

## ELENCHVS CAPITVM

7	De iocinoris dolore.	67. 136
8	De morbo regio, qui <sup>ἰκτερί</sup> & Græcis dicitur.	68. 140
9	De aqua inter cutem, que <sup>ἰκτερί</sup> & Græcis dicitur.	69. 142
10	De licis dolore.	70. 147
11	De morbis intestini plenioris & tenuioris. hic <sup>κώλη</sup> & sille <sup>κώλη</sup> & Græcis dicitur.	71. 149
12	De uentris profluuiio.	72. 160 (culo. 74. 175)
13	De urine difficultate. 73. 170. De renum & uesicæ cal-	
14	De renum & uesicæ inflammatione.	75. 179
16	De urine ardore.	76. 182
17	Ad sanguinem & pus mingentes.	77. 183
18	De his qui inuiti urinam reddunt.	78. 185
19	De lumbricis in ano ac uentre natis.	79. 188
20	De hæmorrhoidibus, scissuris, & fistulis ani.	80. 190
21	Ad procidentiam ani & uulue.	81. 198
23	Ad menses confertim erumpentes.	82. 199
24	Ad suppressos menses citandos.	83. 200
25	De uulue scissuris.	84. 201
26	De uulue inflammatione.	85. 202
27	De exulceratione, abscessu et cancro uteri.	86. 203
28	De uulue strangulatu.	87. 204
29	De mola uteri.	88. 206
30	De ramicum generibus.	89. 209
31	De podagra, reliquisq; articularijs morbis.	90. 210. 214
33	Ad incipientem gibbum.	91. 218
34	De uaricibus.	92. 219
35	De elephantia.	93. 220
36	De lumborum rubore, seu exulceratione.	94. 221
37	De doloribus extremarū, summarumq; partium.	95. 222



ERRATA INTER IMPRIMEN-  
dum forte commissâ, sic  
emendabis.

**P**agina 18. in margine, uersu 9. exhibenda sunt.  
38. 22. myrobalanos. 53. 1. remiss. 73. 18. opportu-  
ne. 77. 21. è naribus. 79. 15. gallinaceum adipem.  
101. 16. quocq. 105. in margine, Hip. & Gal. ac alij  
Græci, &c. 114. in marg. uers. 12. sub eo nomine.  
145. 17. albicans. 147. 14. casti. 166. 2. tribus, pul-  
caris. 168. in marg. 4. unam.

BASILEAE IN OFFICINA  
Roberti VVinter.  
A N N O  
M. D. XXXVII.  
Mense Martio.