

*Bibliothèque numérique*



**Baudelocque, A. C.. - An putredo  
nosocomialis cum gangraena  
confundi potest ? An eadem utrinque  
causa, signum, prophylaxis et medela  
?**

**1824.**

*Paris : Ex typographia Migneret*  
**Cote : 90975**

21

# COMPETITIO AD AGGREGATIONEM

JUSSU REGIS OPTIMI ET EX MANDATO SUMMI GALLICÆ UNIVERSITATIS MAGISTRI INSTITUTA, ANNO 1825.

*AN PUTREDO NOSOCOMIALIS CUM GANGRÆNA CONFUNDI POTEST ? AN EADEM UTRINQUE CAUSA, SIGNUM, PROPHYLAXIS ET MEDELA ?*

## THESIS

Quam, Deo savente, in saluberrimâ Facultate Parisiensi, præsentibus competitionis judicibus, publicis competitorum disputationibus subjicit et dilucidare conabitur die anno 1824.

A. C. BAUDELOCQUE,

Doctor Medicus Parisiensis, Academiæ regiæ Medicinæ Socius adjunctus, etc.



PARISIIS

EX TYPOGRAPHIA MIGNERET,

VIA VULGO DU DRAGON, N.<sup>o</sup> 20.

M. DCCC XXIV.

0    1    2    3    4    5 (cm)

~~COMITATUM~~ . . . . . D. ESQUIROL.

BOYER.

DUPUYTREN.

RICHERAND.

MARJOLIN.

BOUGON.

GARDIEN.

CAPURON.

RIBES.

DENEUX.

DD. BRESCHET.

MOREAU.

JUDICES . . . . . P. et D.

VICES - GERENTES. DD.

DD. LECORCHÉ-COLOMBE.

LISFRANC.

J. CLOQUET.

A. O. BAUDDELOCQUE.

D. P. BauddeLocque.

De Putredo nosocomialis.

AN PUTREDO NOSOCOMIALIS CUM GANGRÆNA CONFUNDI POTEST? AN EADEM  
UTRINQUE CAUSA, SIGNUM, PROPHYLAXIS ET MEDELA?

IN nostro thesis argumento, agitur de duobus, quorum prius est alterius conclusio. Itaque causæ, signa, prophylaxis et medela, primò putredinis nosocomialis, deinde gangrænae nobis sunt examinanda: posthæc, unam cum alterā comparabimus; et ex istâ comparatione orietur solutio quæsiti: an putredo nosocomialis cum gangræna confundi potest?

Antequam incipiamus, nostrum non esse dicemus, investigare omnia quæ ad putredinem nosocomialem aut ad gangrænam pertinent: paucis solummodo has affectiones describemus, ut eas inter se possimus comparare.

*De Putredine nosocomiali.*

Putredo nosocomialis, cui quoque gangrænae humidæ nosocomiorum nomen, vulneribus et ulceribus propria est; cuius signa sunt: dolor acerrimus, partium vicinarum tumor, puris saniosi, cinerei, glutinosi, fetidi segregatio, vulneris aut ulceris incrementum.

De putredine nosocomiali non disseruerunt veteres. Attamen, ut censem Doct. Léveillé, vulnerum cancer de quo Celsus loquitur, putredini nosocomiali congruere potest. Inter se quoque conveniunt sordida, putrida ulcera quæ a Guy de Chauliac describuntur, et gangræna humida nosocomiorum: idem dici potest de putredine quæ, cum urbs Rothomagus obsideretur anno 1562, vulnerati affecti fuerunt, putredo quæ, ut ait Ambrosius Paré, nec gregariis militibus, nec proceribus, nec principibus ipsis parcebatur.

In hâc materiâ, primus versatus est ex professo celeb. Pouteu. Postea quidam alii idem opus suscepérunt, et majorem minorēm utilitatem scientiae et aegrotis attulerunt.

*Causæ.* Putredinis nosocomialis multæ enumerantur causæ. Inter quas nosocomiorum situs insalubris, aer pestilens propter nimiam in eodem loco ægrotorum multitudinem, propter gangrænâ vitiatos, febre typhode correptos, aut propter aliud ejus modi, cœlum-nubilum, frigidum, electricitas, quidam venti, lunare lumen, squalor, rarae curationes, quorundam unguentorum usus, irritatio allata ossium fragmentis a vulnere non extractis, aut violentis istorum fragmentorum tractionibus, contusio nimia, stupor localis, frequens vulnerum sclopetariorum comes, cibus et remedia corpus effringentia, concoctiones non absolutæ, febres mucosæ, præsertim typhus, hemorrhagiæ, sudores, suppurationes diuturnæ, nostalgia, etc., etc.

Quidam affirmaverunt putredinem, de quâ agitur, praeter omnia eligere vulnera sclopetis illata, et plagas in membris inferioribus sitas.

Nobis examinandum est paucis verbis quid valent hæ variæ causæ.

Putredo in temperaturis maximè contrariis observata est, à decimo quarto gradu infrâ o ad trigesimum quartum suprà; in Alemaniâ, in Franciâ, in Hispaniâ, in Italiâ, etc.; per aestates servidas et hyemes persfrigidas, per autumnos et vera tûm arida, tûm pluvia.

Haud dubia videtur vis electricitatis. Non raro fit, ait professor Richerand, ut gangræna humida nosocomiorum appareat tempore procelloso: quod animadverti, inquit, quum mane me conferrem in nosocomium Sanct. - Ludov. quando, nocte antecedente, ægrotorum somnus, tonitru et fulguribus, fuerat perturbatus.

Quorundam ventorum vis non eodem modo probatur: afflante aquilone, austro, vento torrido, frigido annotata est putredo, et forsà sæpiùs quam afflante imbrifero.

Aliquot sunt Chirurgi qui putaverunt putredinem, quæ Madriti sœviebat, mense januario, anno 1810, lunâ plenâ exasperatam fuisse. At aliæ possunt afferri causæ quibus increvit, et phasibus lunaribus antecedentibus, eadem non acciderunt.

Squalor, parum frequentes curationes, vulnera nimirum aëri exposita, unguentorum vel irritantium vel debilantium usus, fragmentis ossium allata irritatio, aut tractionibus violentis, sunt totidem causæ quæ, quamvis nobis non sufficientes videantur ad pariendam putredinem, possunt tamen ei aliquo modo favere. Idem dicemus de cibo et remediis debilitantibus, de hemorrhagiis, sudoribus, suppurationibus diuturnis, et de nostalgiâ.

Vehementes commotiones, stuporque localis vulnerum sclopetariorum, minus valent quam dictum est, ad putredinem producendam. Re ipsâ, ut ait Doct. Ollivier, solum evenit, quando vulnera jam non sunt recentia et quando stuporis effectus jam diu evanuerunt.

Constat putredinem nosocomialem, præter omnes, eligere plagas sclopetis illatas et vulnera quæ in membris inferioribus sedent; quod in dubium revocari nequit, quodque non pertinet ad putredinem: plagarum sclopetis illatarum, plagarum in membris inferioribus sitarum sanatio magis diuturna est, et ideo diutius vulnera ad causas putredinis sunt objecta: unde gangræna humida magis frequens.

Situs nosocomiorum in locis humidis, non longè a fluviiis, ut sentiunt præ cæteris Clar. Pouteau et Desault, est causa maxima putredinis: ad hanc causam celeb. Desault referebat morbi frequentiam in nosocomio parisiensi, cui nomen *Hôtel-Dieu*. Non negamus quod de nosocomiis fluminibus et locis humidis appositis, dictum est; nihilominus, non semper fuit putredo frequentior in valetudinariis fluvio appositis: aliquando quidem evenit ut sœviret in valetudinariis magis remotis, dum istis parceret. Præterea, aliquoties magna fuit vis gangrænæ humidæ in nosocomiis in altitudines editis, et in locis humido carentibus.

Aér vitiatus propter multitudinem ægrorum congestorum in locis angustis et cœlo patenti non expositis, propter ægrós gangræná aut febribus typhodibus inquinatos, etc., uno modo propter quemvis alium fetorem, multò magis idoneus est ad producendam hanc putredinem.

Etenim, his omnibus variis, de aëre vitiato dictis, simul connexis, tunc appareat putredo nosocomialis pessima, lethifera.

In nosocomio, cui nomen Charitatis est, vulnerati cubantes in octo vel decem lectis continentibus cum valetudinario ubi jacebant ægroti febre adynamicâ tentati et moribundi, sèrè semper, ait Clar. Deschamps, putredine nosocomiali correpti erant.

Quidam vulnerati, hoc narratur à professore Delpech, qui aderant in nosocomio sancti Eligii-Montis-Pessulaní, collocati fuerunt in locis parum lucidis, qui habebant facilem aditum cum aliis valetudinariis plenis ægrorum typhode nosocomiali vitiatorum; tunc ferè omnia vulnera huic contagioni exposita, in putredine summa facta sunt. Simul observabat professor Broussonet typhodem fieri frequentiorem et graviorem in locis continentibus vulneratorum valetudinariis.

Professor Delpech observavit quoque putredinem nosocomialem produci posse miasmatibus gangrænarum propriè dictarum, et emanationibus dyssentericis.

Gangrænam humidam nosocomiorum sèpè à gastricâ colluvie, à febre mucosâ, biliosâ et præcipuè typhode produci, quidam existimârunt. Quæ quidem opinio valet adhuc apud peritissimos.

Pro certo habemus putredinem nosocomialem posse cum his morbis coexistere: at hi morbi producuntne putredinem, an sunt tantum cum putredine coincidentes, ut putat professor Delpech, qui vidit putredinem modò antecedentem, modò sequentem alias morbos. Idem professor asserit se vidisse ægrós colluvie gastricâ, febre biliosâ, catarrhali aut typhode liberatos, et tamen hæ sationes non multùm valuerunt ad gangrænam humidam tollendam. Hæc affectio quam existimat esse cujus vis alias alienam, nocet,

inquit, morbis qui ad cām se jungunt, et si putredo remediis vinceretur, statim alii morbi mirum in modum in melius veniebant; quod sāpē vidit.

Qui aliter sentiunt, qui putredinem nosocomialem morbo generali produci putant, hanc opinionem certis rationibus non confirmant: itaque nobis liceat sentire cum professore Delpech, donec, argumentis firmioribus, de istā sententiā ducamur.

Putredo nosocomialis sporadica est aliquando. Vertiturne in contagionem? Hāc de re aliter alii censuere auctores.

Clar. Pouteau, et post hāc plurimi auctores asseruerunt putredinem transmitti posse instrumentis et linteis quibus aegri, isto morbo affecti, curati fuerunt. Nihil de hoc modo transmissionis dubitandum putamus, et, in opusculo professoris Delpech, plurima leguntur facta quae illum certissimè probant: similia quādam indicantur a doctore Ollivier; et in nosocomio Charitatis, putredinem ab ægro ad ægrum aliud transmissam vidimus à chirurgico tyrone qui utrumque curabat.

Inoculari potuit putredo nosocomialis, et quomodo doctor Ollivier hanc in seipso excitaverit, haud fastidiosè legetur.

Nihilominus, Clar. professores Richerand et Percy, hanc contagiosam esse negant.

Enarrat doct. Thomas professorem Dupuytren pus ab ulcere, quod putredo nosocomialis vitiabat, inseruisse vulneri roseo, nec quidquam mali indē evenisse ei qui experientiam patiebatur.

Professor Richerand testificatur se haud semel quasdam guttas puris quae puris ex hāc putredine stillantis, vulneribus et ulceribus injecisse, ullā sine istius tabis notā. Tandem Doct. Percy et Laurent argumentationibus plus minusve certis contra vim contagiosam putredinis nosocomialis, seriem addunt experimentorum quae nihil ad vulnera contaminanda valuerunt.

Quanquam afferantur tantæ auctoritates, non possumus non agnoscere vim contagiosam putredinis nosocomialis. Quae vis cer-

tis demonstratur factis, et Chirurgi, de quibus verba fecimus, non putredinem inoculare potuerunt certè quòd non sàt sæpè id tenterunt, vel quòd eis temporibus et in eos qui tunc extra morbum essent, experimentis data fuerit opera.

Non solum per contactum animadvertiscitur putredinis transmissio : nempè professor Delpech sæpius observavit eam semper inquinare vulnera, ægri ita affecti, proxima. Ideoque, si quis, putredine contaminatus, in vulnerorum valetudinarium admittitur, mox diffunditur morbus, primùm vulneratos proximos invadens, et indè usque ad remotissimos pervadit.

Per aerem transvehi facile videtur hujus contagionis principium, quod sæpè impeditur, lectum ægrotantis involvendo atmosphærâ chlori, adhibitis capsulis fumigatoriis continuis.

Ut manifestetur putredo nosocomialis, necessaria est solutio continuitatis. Attamen Doct. Ollivier hunc morbum cicatricibus novis accidisse refert.

Eò facilius apparet putredo, quò liberius, vel aere infecto, vel linteis aut instrumentis, tangi possunt vulnera, et in plagiis quæ membrum hinc et indè transmeant, semper ab oris incipit.

Quidam asserunt rarissimè putredinem invadere vulneratos alioque sanos. Videtur tamen non magis eis parcere quam ægris quocumque morbo affectis. Cæterum non in eodem loco inclusis omnibus vulneratis deprehenditur.

*Symptomata.* His signis agnoscitur in vulnero, putredo nosocomialis: doloribus plus aut minus acribus opprimitur aeger; minuitur suppuratio, et fit serosa; brevi in superficie vulneris, quod anteà roseum erat, appareat humor glutinosus, subalbidus, semipellucidus, qui, a professore Delpech, existimatur pseudo-membrana, cuius sensim crescit crassitudo, et fit ferè similis puri; attamen auferri nequit et movetur tantummodo substantia mollis, pulposa, subalbida, quæ maximè, partibus subjacentibus, hæret: nonnunquam fit ut hæc substantia sit subrubra, et, in pluribus locis, sanguinolenta.

In omnes partes interea, tum in latitudinem, tum in altitudinem augetur plaga; hujus orae majorē afferunt dolorem et invertuntur; cedemate vel etiam emphysemate afficiuntur; stillat maxima copia puris saniosi, fetidi, cuius foetor sui generis; omnes partes vicissim destruuntur, et abeunt in formā eschararum mollium, substantiae pulposae, homogeneae, albidae, aliquando sanguine striatae, dum morbus seu natura seu arte vincatur.

Non semper ea sunt putredinis nosocomialis initia: aliter incipere potest, nempè hoc modo: alia phænomena semper antecedit dolor; at in loco qui afferit dolorem, ferè simul animadvertisitur pars excavata, primō parum extensa, ferè semper rotunda, quæ circumscripta oris acutis et sublevatis. Hujus excavationis color est obseurior quam totius vulneris color, cuius aspectus semper idem remanet; ora partis excavatae præsertim sunt violacea; plena est ichore subnigro, tenaci, quod facile auferri potest, è quo foetor illi proprius exhalatur; tum ulcerationis tota cernitur superficies.

Hæc ulceratio modo est unica, modo plures sunt quæ in unam tandem coeunt.

Ut ut hæc sunt, morbus plerumque ingravescit, donec totum vulnus assecutus sit. Evenit quoque ut ulceratio totum, ab exordio, vulnus occupet.

Quando ad hunc gradum pervenit morbus, rapidè undique serpit; ulcerationis fines sunt colore violaceo; idem color ad ora, et quidem ultra, progreditur; ex eâ stillat pus ichorosum, subnigrum, sanguine striatum, fetidissimum. Nulla manent vestigia partium destructarum, nisi ichor.

Hæc sunt phænomena quæ ut plurimum observantur.

Nonnunquam fit ut malum sit omnino locale, dum reliquum corpus est in valetudine integrâ: at saepius, quinto vel sexto die, doloribus turbatur quies, fastidiuntur cibi, lingua fit pallida et alba, epigastrium, quando premitur, afferit dolorem, corpus brevi-

emacescit , vultus videtur tristis , dejectus , corporis temperies minor est quam in habitu consueto , arteriae pulsus est debilis ; tandem , decimo vel duodecimo die , ut sit persæpè , æger in febre incidunt , et rarum est ut rigor eam antecedat , nisi adsit complicatio ; pulsus fit frequens , celer , at semper debilis ; corporis calor major fit , cutis est sicca et pallida ; levis adest cephalalgia , magnâ siti vexatur æger , sensim deficiunt vires ; vesperè febris exacerbatio levis subit . Si morbus semper ingravescit , tunc sopor fit ; raro idæ delirio turbantur ; oculi sunt semi-clausi ; in magnum stuporem incidunt æger , jacet supinus , ferè immobilis ; pulsus fit frequentior et maximè debilis ; plerumque desinunt excretiones ; moritur , aut potius , extinguitur æger .

Non semper habet exitum lethalem putredo nosocomialis ; interdùm , quinto , sexto vel nono die , evanescit , et phænomena generalia non obvenerunt . Nonnumquam etiam , quamvis hæc phænomena obvenerint , fit tamen sanatio sive sponte , sive arte juvante , post tempus magis diuturnum , post quindecim vel viginti dies , post unum mensem : Interdùm , in eodem statu , per plures menses remansit .

At quocumque tempore , si sanatio advenit , primò immunitur dolor , et brevi omnino desinit ; pus fit magis album ; ejus odor jam non est fetidus ; ulcerationis ora deprimuntur , ejus superficies est minus aspera ; rosea fit : circulum subnigrum , ædematosum , qui eam circumdat , inflammationis veræ signa subeunt ; simul febris se remittit , evanescit ardor , minor est agitatio et sitis minus ardens ; coloratur facies , oculi sunt minus inertes , omnia sedantur , et solutio continuitatis ad primum statum adducta , brevi ad sanationem tendit , nisi , ut sæpè fit , vulneratus recidat in putredinem , cum sanatus videretur .

Fieri potest complicatio putredinis cum pluribus morbis et præsertim cum typhode nosocomiali . Quando de causis disseruimus , diximus hanc putredinem omnino alienam esse morbis quibuscum jungitur ; diximus quoque hanc putredinem esse his

morbis noxiā. Illorum morborum incrementum modò antece-  
dere, modò sequi potest.

*Diagnosis.* Nonnunquam multæ nascuntur difficultates, et,  
ut putat professor Delpech, falsa funestaque theoriæ conditionis  
symptomaticæ hujus morbi, ex erroribus diagnosis, orta est.

Aspectus vulnerum in quibus adest complicatio morbi acuti,  
cum putredine nosocomiali non debet confundi. Horum vulne-  
rum superficies siccatur, et formatur eschara quæ cadit quando  
solutio morbi acuti advenit. Ob colluviem gastricam, in vulnere  
formatur quoque aliquando tenuissima eschara, quæ tantummodò  
superficiei adhæret et quæ brevi solvitur.

Idem professor Delpech narrat se vidisse celeberrimum chirur-  
gum parisinum qui accipiebat, pro putredine nosocomiali, vulnus  
contusum, in dorso manus situm. Hoc evenerat quinque ante die-  
bus; æger non labore desisterat, et vulnus male curatum fuerat,  
ita ut esset inflammatum et perfusum floccis albidis, sanguino-  
lentis, quos efficerat putrefactio cutis emortuæ. Indè erroris  
causa.

Putredo nosocomialis adhuc confundi potest cum vulneris  
ecchymosi. Quiquidem error facile vitatur, si animadvertis-  
semper in putredine excavatio plus aut minus profunda, quod  
non invenitur in ecchymosi.

Ad distinguendam putredinem nosocomialem à quavis aliâ  
affectione, necesse est ut adnotetur dolores, plus vel minus acutas,  
in solutione continuitatis semper antecedere alia morbi phæno-  
mena, et mutationes, de quibus diximus suprà, sequi statim eos-  
dem dolores.

*Prognosis.* Periculum putredinis nosocomialis varium est, pro  
variis circumstantiis in quibus manifestatur. Hæc complicatio  
vulnerum ut plurimum gravis; semper impedimentum affert sana-  
tioni solutionum continuitatis: in hoc solo est noxia, quum ag-  
reditur vulnera simplicia, parùm extensa, et quum vulnerati  
sunt benè valentes et optimâ corporis habitudine.

At si putredo incidat in solutiones continuitatis latè patentes, non recentiores, tunc magno potest esse detimento, et periculum augebitur, si vulnera sita fuerint in vicinia partium ad vitam magis necessariarum, in proximo trunci, arteriae majoris, etc.

Interdùm putredo nosocomialis occupat leve vulnus, deinde in totum irruit membrum, quod sensim consumit, in articulationes se insinuat et producit mortem, sive dolorum vi, sive frequentibus et abundantibus sanguinis profluyiis. Nunnunquam autem ægri, consumptione, vel accidentibus generalibus e putredine ortis, pereunt.

Eò gravior fit putredo, quòd incidit in ægros magis debiles et habitudine magis vitiata. Ejus effectus sunt maximè perniciosi apud ægros scorbuto corruptos.

Minus exitiosa putredo sporadica, quam epidemica. Hic morbus exasperatur commoratione ægrorum in locis ubi originem duxit, et quando supersunt causæ qui eum produxerunt. Vel augetur, vel minuitur periculum, prout istae causæ plus minusve valent; indè nascitur cujusque epidemiæ sævities.

*Prophylaxis.* Quæ cum sint nosocomialis putredinis causæ, natura pestifera, propagationisque modus, facilimè judicatur morbum hunc vel avocari, vel in progressu cohiberi posse, quando jam existit.

Frequentissima, fortassè evidentissima causa huic morbo assignari potest, scilicet: aëris vitiatio, sive coitione multorum hominum in locis humidis, insalubribus, in ædibus cælo malè apertis producta, sive exhalatione ægrotantium gangrenæ tabidorum, morbis putridis, dysenteriæ, etc., laborantium. Vitandæ sunt igitur aëris corruptionis causæ, et si omnino vitari nequeant, permagni saltem interest vim malignam moderari, nosocomiorum munditiem servando, ventulum novum, quotiescumque necesse est, faciendo, vapores nitri vel chlori suscitando.

Maxima equidem cura adhibenda ad avellendas causas præparatorias. Idcirkò, cibus salubris, quantum opus est, adminis-

trandus, subacidâ potionē, generoso vino cum magnâ moderatione utendus : non minor habebitur et ratio et diligentia exquisitæ munditiei, tūm corporis, tūm vulneris, curationis admodum iteratæ : removenda sunt etiam unguenta, plagarumque superficiem, non diurno tempore, nudam, impressio aëris ambientis afficiet.

Accuratè scrutari debent abdominis viscera; si supervenient quædam gastricæ aut intestinalis colluvie signa, statim adhibitis medicamenta seu vomitoria, seu cathartica, priùs quam potus amari, vel subaromatici prescribantur.

Putredine nosocomiali existente, jamjam notati prophylaxis modi, summâ utilitate insignes, qui propagationi impedimentum afferant.

Ne quid magis dicam, hæreat semper animo hujusce morbi virtus pestifera; quam facillimè, non modò de manu chirurgi, de instrumentis, de linamento, de linteo, sed etiam de vehiculo aeris transmittitur. Vestimenta equidem, plurimis confitentibus factis, sæpiùs contagionis principium, in locum nondum contaminatum, attulerunt. Itaque non nimis commendabitur mundities manuum, instrumentorum, renovatio frequens linamenti et linteorum, adeò ut nunquam bis inserviant, etiam si diligenter mundata fuerint. Non ægrotantes linamentum conficiant ( Pou-teau ), nec plagis imponetur ante quam chlori vaporibus fuerit subjectum ( Delpech ). Præcavere utile est, ut linamenta simul et linteæ, procul ab ægrotantibus removeantur, ut à cæteris, putredine nosocomiali laborantes, sejungantur. Si fieri nequeat discessus, lectum ægrotantis, capsulis plurimis suffitus chlori mittentibus, circumdate : hoc ipso modo, professor Delpech contagionem cohibuit : istâ agendi ratione, chirurgi vestimenta aere pestifero minus imbuta, non aliò contagionem transmittunt.

Quandò, præsertim in valetudinario, grassatur putredo, summa cura adhibenda ne plagæ nondum infectæ, sæpissimè detegantur, vel diutiùs denudatae maneant.

*Medela.* Putredinis nosocomialis medela, modò topica, modò generalis.

Nedum plurima medicamenta topica, multis jamjam abhinc annis proposita, artis medicæ splendorem denuntient, inopiam contrà confirmant: si quædam etenim effectus certos habuissent, cætera in oblivione venissent.

Plurima equidem remedia, præcipue antiphlogistica ant anti-septica, dubios assecuta sunt effectus: non singula pensare licet; pleraque inertia sunt, aut tantum dolorem incitavere, ut mox derelicta fuerint.

Ex omnibus remediis commendatis, meritam obtinuit famam acetum. Multoties repetita facta, hujus remedii præstantiam, professori Delpech demonstraverunt. Præcipue incipiente morbo, infectionis latitudine depressioneque circumscriptis, atque ulcere putrido nondum tenaci et crasso pure induito, acetosis ablutionibus et topicis sæpè putredo evanuit, aut saltem minores peregit progressus. Acida vel citrei, vel sulfuris, vel nitri, vel chlori, aquâ plus minusve diluta, eadem virtute præstant; unguentum ægyptiacum non immeritam quoque laudem consecutum est.

Hæc omnia remedia férè omnino irrita, cum purulenta cuticula ulcus induerit, nisi, professori Delpech exemplo, antequam apponantur topica, plaga expurgetur, et frictiones cum aspero crasso que linteo adhibeantur, quæ materiem pulposam, hærentem atterant, planèque destruant; tune in ulcere sic cruentato, ex aceto effuso, sicut et ex cæteris acidis, insolitus nascitur dolor. Remedium partes vivas afficit.

Si non omnino destructa fuerit pseudo-membrana, forsitan putredinis progressus sistent; sed ad felicem exitum non eveniet morbus; certissime post aliquot dies revertetur, sicut rerum experientia confirmavit. Idcirco, aceti et cæterorum acidorum utilitatem restrictè confiteamur.

Pulvis carbonis, inferiori virtute prædictus, si medicamentis, de quibus jamjam locuti sumus, conferemus: attamen existimatione

floruit, modo ut in iisdem casibus, cumque sedulâ eâdem curâ, adhiberetur. Fætorem puris discutere, inter præcipua hujuscemodi remedii commoda, professor Delpech annotavit.

Carbonis ignescens vaporem quidam laudavere. Itaque ulceri imponebant crustam similaceam fermentescentem, quæ vaporem continuum effundebat. Ista verum agendi ratio reprehensione digna: vim etenim mali accedit, materiei putridæ effluvium cohibendo.

Non minus laudatus corticis peruviani pulvis. Haud certi sunt hujusce pulveris felices effectus, siquidem, ad rem dijudicandam, respiciamus experimenta, in posterioribus gangrænae humidæ epidemiis, tentata. Et enim, sub crustis peruviani corticis, crescere, atque etiam malum ingravescere, semper visum est.

Ut ulceri sordido imponatur crusta vel quatuor, vel quinque lineis crassa, pulveris cinchonæ, oleo e terebenthinâ madefacta, suadet doct. Dussaussoy. Mox crusta siccatur, friabilis fit, et viginti quatuor post horas, haud difficile remota est; eadem medicatio statim renovanda. Sibi non semel utilissimum fuisse remedium, refert Dussaussoy, præcipue cum morbus levis, et in principio esset. Sed cum res ita sint, haud rarum est agrotum sponte e morbo evadere; vident etiam, idem Doct., illud remedium nullum felicem exitum habere.

Minimo auxilio est iste pulvis, et, quod pessimum est, in ulceris superficie materiam putridam retinet, unde in pejus ruit putredo.

Inter omnia quæ, contra nosocomialem putredinem, proposuerunt medicamenta topica, solummodo verè præsentissima caustica. Si sit putredo, cum destruantur partes vitiatae, partes quæ, ut ait professor Delpech, principium morbi occultant.

Quamobrem, quidquid adurit adhibitum fuit: aliquando auxilio est nitras argenti, cum putredo levis est et parum alta. Huicce caustico parum confidas, sicut et acidis metallicis, quæ sœpissime cum pure vulneris superficiem operiente, se miscent,

nec usque ad partes vivas perveniant. Quod si aliquando illis uti necesse est, sicut ante usum aceti, planè destruenda est materies tenax, pulposa.

Inter omnia caustica multum præstat ignis, tūm certo, tūm rapido effectu. Ut plurimū satis est semel comburere, præcipue cum ignis illico destruit omnes partes vitiatas. Certè prænuntiari potest sanatio, quotiescumque, intra viginti quatuor horarum spatio post adustionem, dolores, è putredine orti, evanescunt. Escharæ siccitas certissimè comprobat omnino et prorsus deletam esse luem. Sæpissimè iterum urendum est, si minima pars ulceris adhuc humida sit.

Aliquando necesse est plus minusve incidere, ut igne totum malum persequatur. Haud timida agendi ratio sæpè felicem habet exitum, sicut videmus in professoris Delpach opusculo.

Quidam avellere escharam suaserunt, nē mali principium seryet, et illud in contactu reponat cum partibus sanis. Etenim aliquando accidit ut iterum appareat putredo nosocomialis simul atque ignis eschara solvitur. Iteratum malum aliā causā essetne productum?

Cæterum minimè semper facilis et sine dolore, escharæ avulsio. Magis innocua est agendi ratio, et recidivo morbo occurrit, professor Delpach, linamento aceto imbuto quod escharas circumdabat; non semel quotidiè, eodem aceto, humectabat linamentum.

Aliquando cauterium vidit non satis altè penetrans, professor Delpach, propter nimiam vulneris humiditatem: tunc, cum felice exitu, adhibuit potassam causticam, sicut infrà explicatur. Fragmentis angularibus potassæ totam partem infectam configit, donec guttulae sanguinis effluerent; hinc crassa eschara cuius solutio, roseum vulnus ostendit.

**Amputatio, extremum remedium quoque propositum ad sistendum putredinem nosocomialem.** Quando convenit, sempersupra

mali fines efficienda est; aliter inutilis fit operatio, propter iteratam putredinem in extremitate mutilati membra.

Putredine nosocomiali sanata, nullas curas præcipuas requirit plaga. Omni ope et operâ entendum quin malum redeat.

Nunc aliquid de medelâ generali dicendum.

Minimè credimus putredinem nosocomiorum à morbo generali productam; contrâ, persuasum habemus localem esse: præsertim in medelâ locali, omnia medicamenta versantur. Si putredinem subsequuntur generalia phænomena, ab iisdem remediis et putredo et phænomena cohibentur.

Famis usus, potus aciduli et diluentes, putredine nosocomiorum laborantibus optimè convenient. Corticis peruviani ingestio laudata fuit; sed, in principio morbi, nimiùm irritat ægros, et diarrheæ funestæ ortum dare potest. Tantùm modo utilis est cùm, senescente morbo, dolorum acritas, persecutio, puris magna copia, aut forsitan materiæ putridæ absorptio, in atoniam et debilitatem, ægrum adduxerunt.

Præsertim maximè prodest cortex peruvianus cum, sanata putredine, illi superest summa debilitas, undè mors evenire potest.

#### D E G A N G R Æ N A .

Gangræna cujusdam partis mors est. Hæc vox *gangræna* non semper habuit hunc sensum. Galenus, et posthac plurimi auctores, hac voce usi sunt, ad significandam cuidam corporis parti mortem imminentem.

Deindè, illâ voce designata est mors partium, in superficie sitarum, tegumentorum; sphacelus verò nominabatur mors totius membra. Quæquidem distinctio nihil valet.

Gangræna quoque sicca et humida dicitur, pro redundantia aut paucitate fluidorum in parte mortuâ.

*Causæ.* Nullæ parti gangræna parcer. Multis causis modò externis, modò internis, produci potest.

Externæ causæ sunt inflammatio , contusio , combustio , conge-  
latio , motus fluidorum impeditus.

Gangrænæ causa frequens, inflammatio , vel intensitate, vel ma-  
lignantate.

Gangræna ab inflammatione intensâ producitur, propter fluido-  
rum accumulationem vel motûs impeditum in aliquâ parte.  
Circulationis fluidorum impeditus sêpissimè oritur ex tumefac-  
tione impeditâ ab aponeurosisibus , cæterisque vinculis fibrosis :  
partes subjacentes opprimuntur duabus viribus quæ , dissimili  
modo, agunt , scilicet : affluxus et status fluidorum qui amovent  
ex interiore ad externis, et renixus aponeurosium qui exteriore  
ad internis repellit.

Quesnay, hoc in casu aponeuroses agere vi propriâ , pûtabat,  
contrarium probatur.

Contusio , sicut inflammatio, duobus modis afferit gangrænam :  
vel atterit partium structuram, vel earum actionem organicam  
adeò minuit, ut mors indè sequatur.

Prior modus sat perspicuus est. De altero aliquid dicamus :  
mors partes contusas invadit, non quia partium actio organica,  
maximè debilitata, se se sensim extinguit, sed quia affluxus abun-  
dans fluidorum fit in partibus debilitatis : hæ partes, quæ nullo  
modo fluidis possunt obsistere , distenduntur , undè fit ut alte-  
retur , deleatur eorum structura.

Si principium caloris, cuiuscumque modi satis collectum, cor-  
pori admotum fuerit, pars læsa subito vitâ orbatur et in nigram  
aridamque escharam convertitur. Gangrænam quoque afferunt  
quædam substantiæ, nomine causticæ ; partes destruunt per con-  
tactum plus minusve diuturnum , et similes combustionis ha-  
beri possunt.

Si caloricum abest, non minus est periculum ; nam frigus pro-  
ducit aliquandò gangrænam, sive coagulatione fluidorum, quorum  
motus impeditur, sive minuendo, sive delendo solidorum ac-  
tionem organicam , et sensum hebetando.

Vel ligaturā, vel compressione vasorum, impeditur fluidorum motus. Utuntur ligaturā, nonnunquam et compressione in sano-  
tione aneurismatis aut arteriae vulneris. Aliquando fit quoque ut totum membrum vel aliqua pars comprimatur. Clar professor Boyer exemplum refert sphaceli cruris, cuius occasio fuit fascia quae membrum valde stringebat.

Herniarum strangulatio nobis præbet exemplum compressionis circularis et localis.

Per fracturarum curationem, aliquando apparent escharæ in locis membra qui nimium ferulis comprimuntur, et in partibus quibus perdiū æger incubat.

Professor Boyer narrat se vidisse mentum et os maxillæ inferioris gangraenæ vitiata, apud mulierem cujus musculi posteriores colli erant resoluti, unde pressio menti in thoracis partem superiorem.

Quod nobis dicendum est de causis internis gangraenæ non tam perspicuum est quam quod ad causas externas pertinet.

Sæpè gangraenæ causanihil aliud est nisi natura inflammationis, malignitas, sive, ut evenit in pustulâ malignâ, hæc malignitas quæ in principio localis est, totam corporis œconomiam inquiet, sive, ut in anthrace, hæc malignitas primò in toto corpore disseminata, unam tantum partem deinde afficiat.

Adhuc habenda est ab internâ causâ gangraena quæ supervenit aliquando per febres putridas, quæ quidem invadit partes anteâ inflammatas, aut febri finem facit, modo critico, delendo partes quas vitiatura non videbatur.

Causa gangraenæ certa est, secalis cornuti usus.

Tandem est quædam gangraena, cujus causam dicere, difficile foret: senilis nominatur. Hujus gangraenæ senectutem et virium defectum occasionem esse putant. Nonnunquam adest cum aneurysmate cordis, aut cum osseâ præcipuarum arteriarum induratione. Hoc autem verè dici potest, causam illius morbi esse sæpè ignotam.

Eae sunt quæ paucis dicere voluimus de causis gangrænæ.

*Signa.* Varia sunt gangrænæ phenomena, præ variis causis.

Cum intensam inflammationem gangræna sequi debet, immiuuntur dolor et calor, prout major sit tumefactio, quodquidem septimo vel octavo die accedit: pars gangrænæ affecta frigescit; collabitur tumor; color ruber brevi mutatur in violaceum, in nigrum; sensus aboletur; carnes sunt densiores; cuticula solvit, apparent phlyctæna sero subnigro plena.

Si gangræna proximè evenit à contusione violentâ, eschararum solutionem solummodo comitantur phœnomena de quibus verba faciemus infra.

Si autem contusio gangrænam adducit, partes debilitando, tunc supervenit tumefactio vel plus vel minus magna, aliquando sanguinis extravasatio: simul color et sensus evanescunt.

Quum corpus maximè calidum cuidam parti admoveatur, hujus partis structura statim destruitur; tunc eschara, modo sicca, modo mollis et humida, cuius varius est color, pro caloris gradu et naturâ corporis urentis. Sæpè multæ phlyctæna, sero limpido plenæ, escharam circâ observantur. Eudem agendi modum habent substantiæ causticæ.

Propria phœnomena pertinent ad gangrænam à congelatione: Primùm, in partem frigori expositam sœvit dolor, aut major aut minor; pallescit hæc pars, et jām moveri facile nequit. Si majus fit frigus, tūm nullus est dolor; sensus hebetatur; motus abit, sensim tardior est fluidorum progressio, color partis lividus; vita discedit simul atque congelantur fluidi. Frigus eodem modo totum corpus congelare potest; tunc somnus arctus et ferè invincibilis morti prægreditur.

Sequentia observantur, quando ligaturam arteriæ eujusdam membra præcipue, sequitur gangræna: membrum sensim frigescit, fit grave, œdematosum; minuitur sensus, pulsationes arteriarum cessant; brevi cuticulæ desquamatio, color lividus, subviridis.

Gangræna ab internâ causâ, nonnunquam erysipelatis speciem

habet; mox, magis saturatus color; calor, dolor et quidem sensus evanescunt; frigida est pars cui imminet gangraena, firma, densa, maculis nigris tecta. Evenit quoque ut gangraenam praecedat maxima tumefactio, quam sequuntur calor, tensio et dolor, mox refrigeratio et insensibilitas. Rubor inflammationis vertitur in colore nigrum, plus minusve saturatum. Tandem, ut in pustula maligna, aliquando prurigo mordax, in uno cutis loco, gangraenae imminentiam denuntiat: ibi parva vesicula, sero plena, manifestatur; paulo post incute appetet tuberculum durum, complanatum, insensibile, quod areola plus minusve rubra circumdat. In areola disseminantur parvae phlyctenae. Quod tuberculum, textum cellulare invadit, inde oritur nucleus durus, gangraenam vitiatus, cum tensione et tumore. Non semper eadem sunt signa gangraenae senilis: idem dici potest de gangraenâ ab usu secalis cornuti. Modò, imminente gangraenâ, pars fit frigida; nihilominus, æger, sensum caloris urentis, percipere potest; interdum, nullus adest dolor; tantummodo gravitate, torpore et frigore tolerabili, quæritur æger. Cùm gangraena in limine adest, pars fit rubra; nulla tensio, nullus calor. Rubor brevi obscuratur et in lividum, deinde in nigrum, mutatur: qui rubor semper gangraenam antecedit. Esa charæ senilis gangraenæ sunt persæpè nigræ. Aliquando accedit ut crustulæ sint pallidæ aut albidae, et tune gangraena dicitur alba. Raro phlyctenæ gangraenam senilem comitantur. Quæcumque sit gangraenæ causa, mox putrefactio in partes mortuas ieruit: quandoque tamen, nec dissolvuntur partes, nec mutantur in nigrum aut viridem, nec destruantur, nec disfluunt in fluidum crassum, nigrum et maximè fetidum, nec dilabuntur; partes vero gangraenam vitiatae exsiccantur et durescunt. Utcumque ceciderit, assilatur ex gangraenâ odor fetidus, sui generis, cadaverosus, qui non potest non agnosci, si semel ad nares pervenit.

Quum gangrænae sistit progressus, extremæ partes mortuæ quodam cinguntur inflammatorio circulo, cuius roseus color multùm differt à colore subnigro, plerūmque gangrænam præcedente. Tum manifestus est limes vivum inter et mortuum. Difflit pus, primò saniosum et rarum; deinde magis abundans et meliori naturâ. Partes mortuæ sensim secedunt à vivis, et inter eas major fit distantia; tandem, nullam jām habent inter se connexionem. Quæquidem separatio efficitur post tempus magis vel minus diuturnum, pro gangrænae extensione, naturâ partium mortuarum, et pro viribus ægri.

In his quæ suprà, tantùm de phænomenis gangrænae locibus, de phænomenis quæ in ipso loco mortificationis obseruantur, diximus. Nonnunquam in gangræna adnotantur phænomena generalia.

Quandò gangræna ab intensâ inflammatione procedit, et quandò partes vite maximè necessarias afficit, doloribus acutissimis insensibilitas tota succedit, pulsus, ex pleno, fit exiguis, debilis, frequentior, miser; magno torpore prostratus æger.

In gangræna à malignitate inflammationis, summa est virium prostratio; pulsus est exiguis, debilis, miser; sèpè æger delirio placido vexatur, vel omnibus alienus est; singultus et vomitus subeunt; tunc mors supervenit, aliquandò brevi tempore: quod adnotavimus post quindecim horas, apud pueroram, cuius totum membrum inferius dexterum, in illo brevi tempore, fit gangræna vitiatum usque ad abdominis parietes.

In gangræna senili, sèpè nullus est ægri affectus generalis, si lassitudines et maximam pulsus debilitatem exceperis. Sistit morbus, et æger convalescit. Nonnunquam autem fit ut magis ac magis minuantur vires; tunc superveniunt delirium, sudor algidus, mors.

Lassitudines antecedunt gangrænam ab usu secalis cornuti; pallescit tota corporis habitudo, præsertim facies; obdurescit et intumescit abdomen; stupidus fit æger, et stupiditas crescit pro-

ratione progressus gangrænæ. Fæces maximè fetidæ sunt; corpus emaciatur; tam debilis et exiguus est pulsus, ut vix sub tactum cadat; fit tamen fortior et frequentior, quandò dolores sunt acutissimi.

Gangrænæ progressus multas habent differentias, pro morbi causâ.

Sic gangræna ab inflammatione intensâ, ut plurimùm septimo aut octavo circiter die apparet. Citius oculisve apparere potest. Mox omnes partes inflammatas invadit: tunc ponuntur limites.

Gangræna à combustione, à congelatione, à contusione subito accedit, subito ad summum pervenit.

Gangræna ab impeditâ fluidorum progressionem, plus aut minus lentè evenit, modo intrâ aliquot dies, modo intrâ plures hebdomadas. Aliquandò fit ut progressus habeat magis diurnos.

Gangræna ab inflammationis malignitate, sæpius, magno cum furore, progreditur, et nisi celerrimè sistat aut reprimatur, mors citò evenit.

Gangræna senilis, gangræna ab usu cornuti secalis, ut plurimùm lentè progrediuntur, perennant. Rarissimè tamen fit ut, spatio aliquot dierum, ab extremo pede ad genu ventremque proserpat.

*Diagnosis.* Diagnosis gangrænæ haud semper facilis in omnibus morbi statibus. Potest confundi gangræna quodam cum statu, cui nomen est asphyxia localis. In hoc statu, sicut in gangræna, nullus sensus, nullus calor, nulla arteriarum pulsatio. Vitæ phænomena deleta videntur: post aliquot dies renascuntur, et erroris magnum esset periculum, si præmaturè judicium diceretur. Curiosum asphyxiæ localis exemplum refert clar. Delamotte. Non rara hæc asphyxia, post membra arteriæ majoris ligaturam.

Si velis certam dicere diagnosim, ne festina. Expectare convenienter cuticulæ desquamationem et odoris proprii, sui generis, emanationem de quâ jà locuti sumus, et quæ haud dubium putredinis indicium præbet. Putredo sola gangrænam denuntiat;

attamen cum gangræna, cuius est consequentia, non confundi debet; Gangræna tandem permotâ, difficile præterea est, quâmin altum descendet, augurari: quandòque hoc assequi volumus, necesse est ut examinæ partes, usque ad carnem vivam, incidentur. Incisionum altitudo morbi fines demonstrat.

Gangræna quâ partes internæ vel viscera corripiuntur arduam aliquandò facit diagnosim. Hujusce exitus suspicionem habeatis, si asperimi doloris amotio successionem fecerit stuporis aut indolentiae, arteriarum pulsus exigui, debilis, creberimi, virium torporis, inertiae aut singultuum, aut defectionis aut sudoris algidi.

Causarum de quibus gangræna evenit explorata notio, in modo curandi, utile sæpius afferit consilium. Huic ergo rerum cognitioni summa investigatio adhibenda.

*Prognosis.* Gangrænæ prognosi varia secundum morbi causas, detimenta, organi emortui excellentiam viresque agrotantis. Utcumque se habent ista, grayem semper existimare licet morbum, in destructionem partes morbidas trahentem.

*Curatio.* Tria capita amplectitur gangrænæ curatio; 1.º malo, antequâm irrumpat, occurere; 2.º si jàm invaserit, remittere impetum; 3.º ad sanationem toto studio incumbere, processu anteâ inhibito.

*Prophylaxis.* Prophylactica remedia non eadem pro variis causis. Num acutissima inflammatio gangrænam minatur, ad famis usum, ad phlebotomiam sæpissimè, quoad conveniet, iteratam, ad potus diluentes, abundantes, ad topica emollientia citò et obsfirmatè confligiendum. An vero aponeurosis densa partes inflammatio labôrantes coarctat, atque tumefactioni facit impedimentum, nec morâ largis profundisque incisionibus dividatur.

Gangræna à combustione, gangræna proximè à contusione, obvia medicamenta non patiuntur. Membrum autem contusum, si ingentem suscepit debilitatem, et gangrænæ invasio im-

mineat, adverso casui repentinè obviam eatis, discussoriis et frigidis topicis, et paucos post dies, cùm sævet inflammatio, novam curandi methodum, id est antiphlogisticam adhibeatis.

Gangrænam imprimis à congelatione, ut avertat, ars medica obtinuit. Cui tale impendet periculum, non subito et ex præcipiti membrum ignis in calorem proferetur: istius rationis agendi incaute certissimam pænam ægrotans persolveret. Magni contrâ refert membrum, vel corpus frigore correptum, in aquam algidam immergere, seu nive cooperire, seu frictionibus niveis fovere, intreâ dum alteras frictiones, non procul à regione quâ sedent organa circulationis, adhibemus. Eamdem viam curationis insistere oportet, donec livida et subnigræ maculæ evanuerint, torporque decreverit. Si nondum omnino perierit principium vitæ, móx ad calorem, ad sensum, ad ruborem carnes redeunt. Tunc solummodo præscribendi fotus cum spiritu vini, cum aromaticis, et frictiones cum pannis laneis calidis. Dùm laborem istum ad habitum corporis urgebimus, ut hauriantur cardiaca medicamina, præcipue ammoniacum, præsertim yalet.

Arteriâ præcipuâ cujusvis membra constrictâ, si gangræna immineat, fovere calorem, omnemque vel minimam compressionem vitare, necesse erit.

Gangræna à compressione obstabitis, omnia removendo, prout difficultas tulerit, quæ fluidorum motum impediunt.

Quid faciendum est ut vitetur gangræna à causis internis? Earum deuicias maligna naturaque involuti, nihil aliud nisi duobium, de methodo prophylaxi, medico permittit.

Sedulo cavere oportet ne comedatur secale cornutum.

Cura diligenter gangræna senilis causas investigando, forsitan obviam ire licebit. Homo qui, jammultis abhinc annis, vino, ultra modum, utebatur, per plurimos menses gangræna identidem redeunte laborabat. Postquam præclaro Lapeyronie suadente, in usu vini sibi temperasset, potionisque lacteas et aquosas

substituisset, felicem exitum habuit gangraena, et jam tum non rursus apparuit.

*Medela.* Cum jam nata est gangraena, protinus ad illam compescendam spectandum est, instando usu remediorum prophylacticorum in mali finibus : ea remedia frustra apposueris in parte mortua ; ibi nihil agere debent.

Quidam vitiatas gangraenae partes scarificare, incidere volunt, ut ad vivum remedia perveniant. Solummodo autem putredini eschararum favent incisiones, tumefactionem partium quibus imminet gangraena, augent, producunt quidquid vitandum est. Haec rejiciendae sunt.

Si continuos progressus habet malum, quidam in vivum incidunt. Quod si actum est, renascitur gangraena. Minime utilior cauterii in vivis applicatio.

In gangraenâ à compressione, ab impedito fluidorum motu, sublatâ causâ, tollitur effectus.

Aliquando subito sistere possumus gangraenæ à malignâ causâ progressus; sic in anthrace et pustulâ malignâ. Hoc agitur excisione, aut, quod multo melius, ustione, sive cauterio, sive substantiâ causticâ.

Plerumque vani sunt artis conatus, et omnia naturæ referri debent. Attamen in quâdam gangrenæ specie, cuius Pott primus locutus est, utilissimi fuerunt opii usus internus et fôtus anodini.

Partes gangraenæ vitiatae statim putredine corripiuntur ; cuius putredinis fetidus, et ferè intolerabilis est odor, qui imminuitur mediis quæ sistunt putredinem. Vulgo emplastro styracis circumvoluta est eschara ; at hujus styracis resinæ odor graveolentiæ gangraenæ addit ; melius est condere partes pulvere corticis peruviani aut quernei : ad fôtorem delendum, nobis utilissimus esse videtur liquor vulgo dictus de Labarraque (chloruretrum calcii.)

Sibi proprio labore mortuum è vivo divellit natura : aliquando tamen hanc solutionem adjuvare licet. Ab inflammatione everti-

tur eschara. Si partes vicinæ nimirum calent aut rubent, emollientia topica desiderant, quibus benignè suppuratione moveatur; verum si languescit inflammatio, aliquid eorum admovendum est quæ stimulant.

Utcumque, removendæ sunt escharæ simul atque secedunt, resecandæ particulas adhuc adhaerentes, nunquam tamen usque ad vivum. Sic imminentur pessimus odor. Omnipotens solutis escharis, nullâ præcipuâ curâ sanatur plaga.

Ita res se habent cum gangraena non magnam partium crassitatem aut latitudinem vitiavit. Sed non semper naturæ committere licet partium mortuarum secessionem, quando, exempli gratiâ, tota membra crassities in sphacelum abit: sæpè æger diem supremum obiret, antequam solverentur partes, et si viribus exhaustus non periret, plaga inæqualis, deformis, curatu haud facilis esset.

Membrum extirpandum est, sed non prius quam certi vivum inter et mortuum definiti sint limites. In his limitibus secare convenit.

Huc usque solummodo de locali curatione gangraenæ locuti sumus. Haud semper inutilia sunt quedam medicamenta generalia, corroborantia, inter quæ adnotandus est cortex peruvianus.

In gangraenâ à causis internis, ex principio ad finem laudantur tonica, cardiaca.

Ut plurimum sustinendæ sunt vires in gangraenâ senili; aliquando tamen in virtute temperantia non inutilis.

Specificum remedium gangraenæ corticem peruvianum habent Angli Chirurgi, quod, experti negant Galli.

Nobis paucis dicendum est de remedio à D. Pott laudatissimo, adversus quamdam siccam gangraenam, præcipue observatam apud prædivites, scortatores, vino et gulæ deditos. Hocce remedium est opium, scijus tres quatuorve grana quotidiè ingerenda sunt.

10 Plerique Chirurgi non unanimi iudicio, in naturam nosocomialis putredinis consentiunt. An putredo gangrenæ in modis haberi debet, an vero formâ habituque variis à gangrenâ differt?

Comparatio ejusque morbi de causis, de signis, de prophylaxi et medelâ incidere potest quæ nosmetipsos ad sententiam non errantem, sed argumentis obfirmatam, perducet.

1.º Non evenit putredo nosocomialis, nisi anteâ adfuerit solutio continuitatis.

Gangrena non tantum exulceratas, sed etiam sanas et integras carnes afficit.

2.º Aëris ambientis corruptio, pestiferæ emanationes, sicut anteâ experientia confirmavimus, unicam haud dubiam nosocomialis putredinis causam constituunt. Istâ tandem sœiente, morbum regenerant modo noxiæ de ipsâ exhalationes, modo pus virulentum ab ulcere secretum: putredo de causâ externâ semper oritur.

Multæ quidem cause, tūm exteriores, tūm internæ, longè dissimiles, gangrenam afferunt. Anthrace, pustulâque malignâ exceptis, nequaquam vi contagiosâ gangrena pendet.

3.º Putredo nosocomialis exedit carnes quas in materiem mollem, pulposam, cinereum congeneramque convertit: partes aliquando consumuntur, nec reliquæ supersunt quæ detrimen- tum confirmant.

Gangrena lethalem exitum afferit; sed partium textura perstat eadem, donec elementorum solutio putrida venerit.

4.º Magnoperè ars medica pollet ad putredinem nosocomialem evincendam; nullâ ferè valet virtute, si gangrenæ nondum circumscriptæ, non vero pustulæ malignæ, curam atque operam conferat.

5.º Causarum discrimen, methodi prophylacticae uniuersique accommodatae discrimen, apertissimè indicat.

6.º Gangrena consultò in partes laborantes inducta, putredini nosocomiali nonnunquam auxiliabitur. Nil exindè, quam utrius-

que morbi methodus therapeutica discrepet, evidentiū denuntiat. Propter et hanc causam, non omnino pustulæ malignæ putredo dissimilis.

Itaque non aliam putredinis nosocomialis speciem exhibet gangræna, nisi vivarum partium mortem; cujus et habitus et modus agendi et natura in utroque morbo valde dissimiles.

Putredinem detritus, exanimatio vero partium gangrænam depingit.

Si cujusque morbi causas, effectus, gradum, curationem estimemus, summo discrimine uterque sejungi debet.

Pustula maligna sola et putredo non planè dissimilem visum exhibent, si tantummodo causis et curationi attendamus: ambæ etenim contagiosæ; pustula vero maligna solummodo ad contacatum. Nil à curatione augurari licet; eadem quippe sanandi ratio causas non consentientes impugnat.

Maximè igitur, ex meāmet ipsā sententiā, gangræna cum putredine nosocomiali discrepat; et si rerum explanatio non prævaluerit, quæ opinionem firmat; si quidam, destructione partium hallucinati, unum et eundem morbum haberent gangrænam et putredinem nosocomialem, cur istis cancrum non adjungerent?

Quas ob causas, cum putredine nosocomiali non confundi potest gangræna.

FINIS.

PARISIIS,

FECIT ULRICUS ET IESUSS DIBOC. M. DCCLXVII.

M. DCC. XLI.