

Bibliothèque numérique

medic@

**Dictionnaire des maladies
éponymiques et des observations
princeps : Parapsoriasis**

BROCQ, Louis. - Les parapsoriasis

*In : Annales de dermatologie et de syphiligraphie
(1869), 1902, 4ème série, vol. 3, pp. 313-15*

encore vus se transformer en d'autres syndromes, en tumeurs, par exemple, ou en nappes érythrodermiques; ils demeurent identiques à eux-mêmes jusqu'au bout. Quelquefois le prurit disparaît pendant la période ultime.

Enfin, et cela est tout à fait important, il n'y a aucun rapport entre la forme affectée par la maladie leucémique et les variétés éruptives observées; qu'il s'agisse de leucémie vraie, ou de pseudo-leucémie lymphocythémique, les accidents sont les mêmes. Il paraît cependant que les leucémies myélogènes y disposent beaucoup moins que les lymphatiques. Tout cela, bien entendu, sous bénéfice d'inventaire, et jusqu'au jour où des observations nouvelles, plus complètes et plus nombreuses, achèveront de nous éclairer sur ce sujet.

Les parapsoriasis.

Par M. L. Brocq.

Nous désignons sous le nom générique de PARAPSORIASIS toute une série d'éruptions, des plus rares, qui ont été décrites par Unna sous le nom de *Parakeratosis variegata*, par Jadassohn sous celui de *Exanthème spécial psoriasiforme et lichénoïde*, puis sous celui de *Dermatite psoriasiforme nodulaire*, par Juliusberg sous celui de *Pityriasis lichénoïde chronique*, par Brocq sous celui d'*Erythrodermies pityriasiques en plaques disséminées*, par Radcliffe Crocker sous celui de *Lichen variegatus*.

D'après les faits que nous avons personnellement observés, nous croyons devoir en distinguer trois variétés ou, pour mieux dire, trois formes objectives principales; les divers faits publiés par les auteurs jusqu'à ce jour peuvent rentrer dans ce nouveau cadre.

La *première variété*, à laquelle nous donnons le nom de PARAPSORIASIS EN GOUTTES, est caractérisée objectivement par une éruption maculo et papulo-squameuse aplatie, sans infiltration notable du derme, variant comme teinte du rose un peu bistre au rouge brunâtre, suivant les localisations, peu ou point prurigineuse, ne donnant pas au coup d'ongle le piqueté hémorragique et la surface lisse, luisante du psoriasis, mais ayant parfois une certaine tendance à saigner par le grattage, ressemblant dans son ensemble à une éruption de syphilis secondaire sans infiltration, ou à un psoriasis en gouttes avorté, localisée surtout au tronc et aux membres, laissant presque toujours indemnes la face et les extrémités, ayant une évolution lente, et offrant une grande résistance

(1) Voir pour plus de détails le mémoire original complet qui sera prochainement publié dans les *Annales de Dermatologie*.

au traitement local. C'est dans cette variété que rentrent probablement les cas de Jadassohn.

La *deuxième variété*, à laquelle nous donnons le nom de PARAPSORIASIS LICHÉNOÏDE, est caractérisée objectivement par un début par des papules minuscules de la grosseur d'une tête d'épingle, aplaties, brillantes, et ressemblant alors à des papules de lichen plan avortées, sauf la couleur qui est plus vive, parfois déprimées et ayant l'aspect atrophique, parfois plus volumineuses et légèrement squameuses, ne donnant jamais alors au coup d'ongle les caractères du psoriasis, [peu ou point prurigineuses, ayant de la tendance à former des réseaux à travées plus ou moins étroites, sinueuses et irrégulières, encerclant des zones plus ou moins larges de peau saine ou à peu près saine, formant aussi dans certains cas des plaques irrégulières, plus ou moins étendues, et dans ce cas constituant des formes de passage vers la troisième variété, ayant des colorations variables, du rose pâle au rouge brunâtre suivant les localisations, et par suite donnant dans son ensemble un aspect général bigarré au malade, localisées surtout au tronc et aux membres, laissant presque toujours la face indemne; ayant une évolution des plus lentes et offrant une grande résistance au traitement local. C'est dans cette variété que doit rentrer le lichen variegatus de Radcliffe Crocker et peut-être la parakeratosis variegata de Unna.

La *troisième variété*, à laquelle nous donnons le nom de PARAPSORIASIS EN PLAQUES, est caractérisée objectivement par des plaques circonscrites assez bien limitées, de 2 à 6 centimètres de diamètre, disséminées çà et là sur les téguments, d'une teinte variant du rose pâle au rouge bistre ou livide suivant les sujets et suivant les localisations, présentant une fine desquamation pityriasiqne plus ou moins marquée suivant les sujets, mais qui peut faire défaut, ne donnant jamais au coup d'ongle les caractères du psoriasis, semblant parfois en certains points être constituées par des agrégats de petites papules aplaties, et dans ce cas pouvant être considérées comme des faits de passage vers la deuxième variété, sans infiltration appréciable des téguments à la vue ou au toucher, n'envahissant que fort rarement la face, ne donnant que peu ou point de sensations subjectives, évoluant avec une extrême lenteur et offrant une résistance des plus grandes au traitement local. Cette troisième variété correspond à nos érythrodermies pityriasiqnes en plaques disséminées, et aux faits de White.

Au point de vue histologique, ces affections sont caractérisées par une infiltration de cellules rondes autour des vaisseaux papillaires qui sont dilatés, par de l'aplatissement des papilles, et par une tendance à leur disparition, par de l'œdème très accentué des parties supérieures du derme et de l'épiderme, par une presque disparition

de la couche germinative, par de la dilatation des espaces intercellulaires de la couche épineuse, et l'existence de quelques leucocytes dans ces espaces, par de l'œdème de la couche granuleuse qui manque par places; au niveau de ces derniers points on trouve des noyaux dans les cellules de la couche cornée.

La durée de ces dermatoses est des plus longues : elles ne s'accompagnent que de peu ou point de prurit; leur retentissement sur la santé générale est nul. Le topique qui semble avoir le plus d'efficacité est l'acide pyrogallique employé avec persévérance et énergie.

Un nouveau cas de parakeratosis variegata.

Par M. MÉNEAU.

Les cas de Parakeratosis variegata depuis la publication d'Unna, Santi et Pollitzer en 1890, ne sont pas très nombreux. Si l'on exclut de cette entité clinique les types très voisins d'érythrodermie pityriasique en plaques disséminées de Brocq, de dermatite psoriasiforme nodulaire de Jadassohn, de pityriasis chronique lichénoïde de Juliusberg, d'exanthème lichénoïde psoriasiforme de Neisser, on ne trouve guère d'autres observations de parakeratosis variegata que celles publiées en Angleterre par Jamieson à la *British medical Association* en 1898, par C. Fox, R. Crocker à la *Dermatological Society of London* en 1900, sous le nom de Lichen variegatus, Fox et Mac Leod, en 1901 (*British journal of dermatology*), Abraham à la *Dermatological Society of Great Britain* en janvier dernier.

Il m'a donc paru intéressant de vous présenter, ne fût-ce qu'à titre documentaire, l'observation suivante prise à la clinique dermosyphiligraphique de mon excellent maître, M. le professeur Dubreuilh, à l'obligeance duquel je dois de pouvoir la publier.

OBSERVATION. — Il s'agit d'un jeune homme de 21 ans, chez lequel l'éruption a débuté vers l'âge de 10 ans et depuis lors est restée absolument stationnaire. De taille moyenne, fort, robuste, le sujet n'a aucune tare constitutionnelle, n'a jamais fait de maladie grave, n'a jamais quitté la France et jouit d'une santé parfaite, au point de vue général. L'éruption occupe surtout les segments supérieurs des membres (épaules, bras, fesses, cuisses). Elle est assez abondante sur les avant-bras, surtout au voisinage des coudes, sur l'abdomen et sur les flancs. La poitrine et le dos sont à peu près indemnes; la face, le cou, les mains et la moitié inférieure des avant-bras, les jambes et les pieds sont complètement respectés. Sur les régions atteintes, l'éruption envahit également les surfaces d'extension et de flexion et ne présente aucune systématisation. Son aspect est partout le même. Elle est constituée par des taches brun rougeâtre, dont la grandeur varie de