

*Bibliothèque numérique*

**medic@**

**Roussel. Mémento Roussel**

*Paris : Les Laboratoires Roussel, s.d.*



Licence ouverte. - Exemple de l'Ordre national des pharmaciens

Adresse permanente : <http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?extcnop0008>



## ADDITIFS

Le **STÉROGYL 15**, remboursé à 80 %  
par les Assurances Sociales (Catégorie B)  
est soumis, d'autre part, à la réglementation  
applicable aux substances figurant au  
tableau «C».

Nouveaux produits remboursés par les A. S.		<b>ESCOSYL</b>	Catégorie B
		<b>FURALONE pommade</b>	» B
		<b>PENICILLINE G</b>	» B

**ERRATUM** : Lutazol ampoules (page 29)  
au lieu de "voie sous-cutanée"  
lire : "voie sous-conjonctivale"

**LES LABORATOIRES ROUSSEL**

97, rue de Vaugirard, Paris-6<sup>e</sup>.



## ACAVYL

3,3' méthylène-bis-4,4' hydroxy-coumarine  
abaisse le taux de prothrombine  
dans le sang  
Antivitamine K

**Comprimés de cinq centigrammes  
par tube de 20**

à employer  
avec prudence  
dans les thromboses vasculaires,  
phlébites, embolies,  
en dehors de toute intervention  
chirurgicale

6 comprimés les 1<sup>er</sup>, 4<sup>e</sup> et 8<sup>e</sup> jours  
ne pas dépasser 90 centigr. en tout  
sans vérifier le taux de la prothrombine

Assurances Sociales :

Tableau : **A**



## ACETO-STERANDRYL 10 & 40

Solution huileuse d'acétate de testostérone

**Boîte de 5 ampoules de 1 cc. dosées à 10 mgr.**  
**Boîte de 1 et de 5 ampoules dosées à 40 mgr.**

1 mgr. de testostérone =  
100 U. I. d'androstérone


Métrorragies : 1 amp. à 10 mgr. quotidienne  
jusqu'à l'arrêt de l'hémorragie.

Fibromes, affections du sein, frigidity : 1 amp.  
à 10 mgr. tous les 2 jours, pendant la  
période intermenstruelle (5 à 10 inj.  
par mois).

Grand prostatisme : 1 amp. à 40 mgr. quoti-  
dienne pendant 10 jours.

**Injection intra-musculaire profonde**

Assurances Sociales : B



## ANGIOXYL

Extrait pancréatique désinsuliné  
d'action trophique vasculaire, spasmolytique,  
hypotensive.

### = FORME AMPOULES =

Boîte de 10 amp. de 2 cc.

1 ampoule = 20 unités hypotensives

1 à 3 ampoules par jour, par séries de 10 à  
20 jours.

#### Voie intra-musculaire profonde

### = FORME SIROP =

Flacon de 150 cc.

1 cuil. à dessert = 10 unités hypotensives

2 à 3 cuillères à dessert par jour par  
longues séries.

Chez les anxieux, 1 cuillère à soupe avant le  
coucher.

#### Voie digestive

Assurances Sociales : ampoules : **A**

: sirop : **B**

**NOUVELLES PRÉSENTATIONS**



## ANGIOXYL

Hormone vaso-dilatatrice, tensio-dépressive  
d'origine pancréatique

**Nouvelle présentation :**

flacons stériles de 20 cc. munis d'une  
capsule de caoutchouc, perforable  
par l'aiguille à injection

Deux concentrations

**I. - Angioxyl normal** - 10 U.G. au cc.  
(même titrage que la préparation anté-  
rieurement présentée en ampoules)

**II. - Angioxyl fort** - 30 U.G. au cc.  
(triple dosage)

Dose quotidienne moyenne 2 cc.  
par séries de 15 à 20 jours

(Utiliser l'Angioxyl Normal ou l'Angioxyl Fort  
selon l'intensité des lésions)

**Voie intra-musculaire**

**Injections périfocales**

(Ulcères - Escarres)

La forme **Sirap** est maintenue  
sans changement

**Flacon de 150 cc.**

2 à 3 cuillères à dessert par jour

Assurances Sociales : **B**



## SURESTRYL

Acide de-hydro-follicultique  
dérivé de la folliculine dont il possède  
la structure

**Comprimés à 1 mgr.  
en tube de 15**

Toutes les applications de l'hormone  
folliculaire sans les inconvénients  
des œstrogènes de synthèse

Posologie variable selon les indications  
(dose usuelle dans le syndrome  
ménopausique 2 à 4 mgr. par jour)

**Voie buccale**





## AUXERYL

Solution huileuse de Vitamine A  
additionnée de Vitamine D<sub>2</sub>  
Vitaminisation A

**Flacon de 10 cc.**

1 cc. = 10.000 U. I. Vitamine A  
1.000 U. I. Vitamine D<sub>2</sub>

1 goutte = 400 U. I. Vitamine A  
40 U. I. Vitamine D<sub>2</sub>

Traitement préventif :  
une cure de 10 jours par mois.

Nourrissons : V à X gouttes par jour.  
Enfants : X à XX gout. par jour.  
Adultes : XX à XL gout. par jour.  
Traitement curatif : L gouttes par jour.

**Voie digestive**

Assurances Sociales : B

**B-DEUGYL**

Vitamine B<sub>2</sub> cristallisée  
ou Lactoflavine  
ou Riboflavine


**Tube de 30 comprimés**  
**dosés à 2 mgr. de Vitamine B<sub>2</sub>**

Effet vitaminique : 1 à 4 comprimés par jour

Effet pharmaco-dynamique (migraines, cram-  
pes musculaires) : doses 4 à 5 fois  
plus fortes.

**Voie digestive**

Assurances Sociales : B



## BENZO-GYNOESTRYL I

Solution huileuse  
de benzoate de di-hydro-folliculine

**Boîte de 2 ampoules de 1 cc.  
dosées à 1 mgr. de benzoate  
de di-hydro-folliculine**

1 mgr. = 10.000 U.I. de benzoate  
de di-hydro-folliculine

4 à 6 ampoules par mois

S'il existe un cycle menstruel, choisir les  
2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> septenaires

Peut être associé au Lutogyl 10 dans la même  
seringue, pendant 5 jours consécutifs, à la fin  
du cycle (Zondek) ou par séries mensuelles

**Voie intra-musculaire profonde**

Assurances Sociales : **B**  
Tableau : **C**



## BENZO-GYNOESTRYL 5

Solution huileuse  
de benzoate de di-hydro-folliculine

**Boîte d'une ampoule de 1 cc.  
dosée à 5 mgr. de benzoate  
de di-hydro-folliculine**

5 mgr. = 50.000 U.I. de benzoate  
de di-hydro-folliculine

1 à 5 ampoules par mois

S'il existe un cycle menstruel, choisir les  
2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> septenaires

4 ampoules en 15 jours, suivies de 3 ampoules  
de Lutogyl 10 en 10 jours, permettent l'éta-  
blissement d'un cycle artificiel

**Voie intra-musculaire profonde**

Assurances Sociales : **B**

Tableau : **C**



## BIVATOL

Solution huileuse de  $\alpha$  carboxéthyl-  
 $\beta$  méthyl-nonoate basique de bismuth

**Forme adultes : boîte de 12 ampoules de 1 cc.  
dosées à 0 gr. 07 de bismuth métal.**

**Forme enfants : boîte de 10 ampoules de 1 cc.  
dosées à 0 gr. 035 de bismuth métal.**

Tous les stades de la syphilis acquise  
ou héréditaire :

Adultes : forme adultes 2 inj. par semaine par  
séries de 15 à 20.

Enfants : forme enfants, de 6 à 12 ans, 1 cc.  
de 3 à 6 ans, 1/2 cc.  
avant 3 ans, 1/10<sup>e</sup> à 3/10<sup>e</sup> de cc.  
2 inj. par semaine par séries de 12 à 15.

**Voie intra-musculaire très profonde dans les  
muscles de la région supéro-externe de la fesse**

Assurances Sociales : B



# CASALDYL



cholérestique et cholagogue  
de saveur agréable

Caséine formolée à 4 %

Pilules de 100 mg

**Boîte de 75 gr. de granulé**



Dans les troubles intestinaux avec prédominance  
de la flore acidifiante



3 à 4 cuillères à café par jour



**Voie digestive**

Assurances Sociales : B



## COLLUBIAZOL

~

Solution buccale de « carbaméthyl-  
/ méthyl-aminocyclohexane de blennob

Collutoire au Rubiazol

Forme adulte : boîte de 10 ampoules de 1 cc.  
dosées à 0,50 gr. de blennob. total.

~

Forme enfants : boîte de 10 ampoules de 1 cc.  
dosées à 0,25 gr. de blennob. total.

**Flacon de 45 cc. dosé à 5 %**

~

Contra-indications : aucune. Dans les troubles intestinaux avec diarrhée, l'usage de ce produit est déconseillé.

**Badigeonnages** : 2 à 3 fois par jour

**Gargarismes** : 1 cuil. à café dans un  
demi-verre d'eau tiède

**Injection vaginale** : 1 cuil. à soupe par litre

Vous l'avez vu dans les pharmacies. Pour plus de renseignements, consultez votre pharmacien.

**Application externe**

Assurances Sociales : **B**



## D Y D A M I C O L I D

cholérétique et cholagogue  
de saveur agréable

**Flacon de 100 cc.**

1 cuil. à café.	}	0 gr. 18 de peptone
		0 gr. 50 de sulfate de magnésie.
		1 gr. 80 d'extrait de bouillon.

2 cuillères à café dans une tasse d'eau tiède  
le matin à jeun, trois fois par semaine

**Voie digestive**

Assurances Sociales : B





## DICORANTYL

Dérivé diacétylé de la corynanthine  
(Modérateur du sympathique)

**Tube de 25 comprimés  
dosés à un milligramme**

Hypertension  
Anaphrodisie  
Parésie intestinale

4 à 8 comprimés par jour

**Voie digestive**

Assurances Sociales : B

**DIPEGYL****= FORME COMPRIMES =**

Boite de 40 comprimés dosés à 0 gr. 05

**Troubles pellagroïdes**

(cutanés, digestifs, nerveux)

4 à 8 comprimés chez l'adulte

1/2 à 2 comprimés chez l'enfant

**Un comprimé pour 0 gr. 50 de sulfamide**

Pour augmenter la tolérance aux radiations :

8 à 10 comprimés par jour

**Voie digestive**


**= FORME AMPOULES =**

Boite de 6 ampoules de 2 cc. dosées à 0 gr. 10

1 à 3 ampoules par jour

**Voies sous-cutanée, intra-musculaire,  
intra-veineuse**

Assurances Sociales : B



## D I S O N Y L

Sédatif hypotenseur

### Pilulier de 60 dragées

Extrait pancréatique désinsuliné quinze ctgr.  
 Phényl-éthyl-malonylurée . . . . . quinze mgr.  
 Solution de trinitrine au 100°. quinze mgr.  
 pour une dragée.

2 à 6 dragées par jour

insomniques, anxieux, 2 dragées  
 avant le coucher

### Voie digestive

Assurances Sociales : **B**

Tableau : **A**



# ECTIAZOL

F. J. Y. R. S. / Q. 3028 E

paragraphe

Solution aqueuse de Rubiazol  
titrée à 5 %

Tube de 25 comprimés dose 0.1 mg  
Flacon de 45 cc.

Fragilité capillaire entraînant soit hémorragies  
viscérales, soit syndromes vasculaires, tels que  
purpura : 4 à 15 comprimés par jour, selon le

Applications externes, en badigeonnages  
sur les dermo-épidermites streptococciques

Troubles du métabolisme hydrique  
(œdème, eczéma)  
4 à 8 comprimés

Application externe

en bouche  
**Application externe**

Assurances Sociales : B



ROUSSEL

ESCOSYL

Esculoside à action vitaminique P

**Tube de 25 comprimés dosés à 10 mgr**

Fragilité capillaire entraînant, soit hémorragies viscérales, soit syndromes vasculaires, tels que purpuras : 4 à 12 comprimés par jour, selon le cas et l'urgence.

Troubles du métabolisme hydrique  
(œdèmes, eczémas)  
4 à 8 comprimés

**Voie digestive**

Assurances Sociales :



## FURALONE

pommade

Semicarbazone du nitrofurural,  
puissant bactériostatique,  
pommade de couleur jaune d'or

**Tube de 15 gr. représentant 0 gr. 075  
de principe actif**

### Application externe

en couche épaisse sur toutes dermites (avec  
ou sans ulcération).

Assurances Sociales :



## GLOSSO-STERANDRYL

Méthyl-testostérone

**Tube de 20 comprimés dosés à 5 mgr.**

Multiplier par 2,5 la dose requise de Stérandryl en injections (voir posologie du Stérandryl).

**Voie perlinguale**  
**(les comprimés sont déposés sous la langue)**

Assurances Sociales : **B**



## GRAVIDOSTYL

Sérum de jument gravide

Boîte de 6 ampoules de 10 cc.

Nourrissons :

1 ampoule incorporée au biberon.

Adultes :

1 à 3 ampoules par jour.

Voie digestive

Peut être donné en lavement

Assurances Sociales : A





## GYNOESTRYL (Comprimés)

di-hydro-folliculine

**Boîte de 40 comprimés**

1 comprimé = 0 mgr. 05 = 50  $\gamma$  = 500 U.I.

1 à 4 comprimés par jour, par séries de 15 jours. (Pendant la période intermenstruelle si la femme est réglée).

### Voie perlinguale

(Les comprimés sont déposés sous la langue)

Coefficient d'activité = 1/3

(multiplier par 3 la dose de benzo-gynoestryl requise en injection)

Assurances Sociales : B



## GYNOESTRYL (Gouttes)



Solution hydro-alcoolique de di-hydro-folliculine

**Flacon de 10 cc. contenant 2 mgr.  
de di-hydro-folliculine**

**Flacon de 20 cc. contenant 4 mgr.  
de di-hydro-folliculine**

1 goutte = 0 mgr. 004 = 4  $\gamma$  = 40 U.I.

15 gouttes = 1/5 mgr = 2.000 U.I.



5 fois V à X gouttes par jour par séries de  
15 jours. (Pendant la période inter-  
menstruelle si la femme est réglée).

### Voie perlinguale

(Les gouttes sont déposées sous la langue)

Coefficient d'activité = 1/3

(multiplier par 3 la dose de benzo-gynoestryl  
requis en injection)

Assurances Sociales : B



## HEMOSTYL

Sérum de cheval hémopoïétique

**Boîte de 6 et de 18 ampoules de 10 cc.**

**Flacon de sirop de 300 cc. dont une cuillerée  
à soupe contient 3 gr. de sang total**

Ampoules : adultes et enfants 1 à 3 ampoules  
par jour avant les repas.

Sirop : adultes 2 à 3 cuil. à soupe par jour.  
enfants 2 à 3 cuil. à dessert par jour.

### **Voie digestive**

Les ampoules peuvent être données en lavement

### **Voie externe**

En cas d'hémorragie en nappe, utiliser  
l'Hémostyl en tamponnements

Assurances Sociales : Ampoules **A**

Sirop **B**



## HEPAGYL INJECTABLE

Extrait hépatique anti-anémique  
particulièrement destiné à toute  
anémie grave

**Boîte de 6 ampoules de 1 cc.**

Une ampoule = au moins une unité clinique  
anti-birmérienne

Suivant l'intensité de la déglobulisation  
de 2 ampoules par jour à une par semaine

**Voie intra-musculaire profonde**

Assurances Sociales : **A**



**HORMONE  
GONADOTROPE  
ROUSSEL**

Gonadotrophine sérique

**Boîte de 6 ampoules  
dosées à 800 U. I.**


1 U. Evans de maturation folliculaire =  
10 U. R. (Cole) = 20 U. I.

Chez l'homme : séries de 18 amp. Une injection par jour et repos une semaine.

Chez la femme : une ampoule les 12, 13 et 14<sup>e</sup> jours du cycle.

**Voie sous-cutanée ou intra-musculaire**

Assurances Sociales : **A**



## IMPLANTATIONS DE CRISTAUX

Hormones synthétiques à l'état de cristaux  
agglomérés en petits comprimés aseptiques

Syncortyl	.....	pellets de 100 mgr.
Stérandryl	.....	— —
Lutogyl	.....	— —
Gynoestryl	.....	— 20 mgr.

Les pellets implantés sous la peau réalisent une  
hormonothérapie continue et particulièrement  
efficace

**Pour posologie, voir notices spéciales**

Assurances Sociales : **B**



## INSULYL

Insuline pure

**Tube de 5 cc. de 100 U.I. (20 U.I. par cc.)**

**Tube de 5 cc. de 200 U.I. (40 U.I. par cc.)**

1 U.I. =  $1/22^{\circ}$  de mgr. de poudre étalon  
= 1 unité clinique =  $1/3$  unité physiologique

Posologie très variable dans le diabète (de 20 à 100 U.I. selon l'état du malade).

Dans le coma diabétique 60 U.I. d'emblée.

Indications autres que le diabète : environ 20 U.I. par jour.

**Voie sous-cutanée profonde**

## INSULYL-RETARD

Insuline-protamine-zinc

**Tube de 5 cc. de 200 U.I. (40 U.I. au cc.)**

A employer quand les besoins du malade ont été appréciés à l'aide de l'INSULYL

**Voie sous-cutanée profonde**

Assurances Sociales : **A**

**ISONAL**

N. Méthyl-phényl-éthyl-malonylurée

Tube de 20 comp. dosés à 0 gr. 10

— 30 — — 0 gr. 05

Barbiturique de toxicité atténuée

Enfants au-dessous de 3 ans :  
un demi-comprimé à 0 gr. 05

au-dessus de 3 ans :  
un comprimé à 0 gr. 05

Adolescents et adultes : 0 gr. 10 à 0 gr. 80

Voie digestive

Assurances Sociales : B

Tableau : C





## K-THROMBYL

### = FORME GOUTTES =

Solution huileuse de méthyl-2-naphtoquinone 1,4 (ester de la Vitamine K ou de coagulation sanguine).

**Flacon de 20 cc.**

1 goutte = 1/10 mgr. de principe actif

Nourrissons : X à XX gouttes par jour.  
Adultes : L à C gouttes par jour.

**Voie digestive**

### = FORME AMPOULES =

Solution aqueuse de dibenzoyl-2-méthyl-naphto-hydroquinone-disulfonate de sodium


**Boîte de 6 ampoules dosées à 50 mgr.**

L'ester hydrosoluble porte 1/3 de son poids en facteur vitaminique K

1 à 2 ampoules par jour

**Voies sous-cutanée, intra-musculaire  
intraveineuse**

Assurances Sociales : ■



## LUTAZOL

### = FORME COMPRIMÉS =

Sel de potassium de l'acide para-sulfamido-phényl-azo-salicylique

**Flacon de 25 comprimés dosés à 0 gr. 50 de principe actif**

Infections à virus : zona. 4 à 10 comprimés par jour.

1/4 comprimé écrasé chez l'enfant par année d'âge.

Trachome : 12 comprimés en 24 heures pendant 2 jours, puis 8 pendant 2 jours, suivis de 4 à 8 pendant 2 à 3 semaines.

#### Voie digestive

### = FORME AMPOULES =

Sel de lithium de l'acide para-sulfamido-phényl-azo-salicylique

**Boîte de 4 ampoules de 2 cc. dosées à 1 %**

Une ampoule = 0 gr. 02 de principe actif

Une ampoule par jour

#### Voie sous-cutanée

Assurances Sociales : **B**

Tableau : **C**



## LUTOGYL 5 & 10 (Ampoules)

Solution huileuse de progestérone

**Boîte de 3 ampoules de 1 cc. dosées à 5 mgr.**

**Boîte de 3 ampoules de 1 cc. dosées à 10 mgr.**

1 mgr. = 1 U. I.

Aménorrhée secondaire : 5 jours consécutifs  
1 Lutogyl 10 + 1 Benzo-Gynoestryl 1,  
dans la même seringue, une série par  
mois.

Stérilité : (absence de nidation) 30 mgr. ré-  
partis du 14<sup>e</sup> au 24<sup>e</sup> jour du cycle.

Ménorragies : 25 mgr. dans les 10 jours qui  
précèdent les règles.

Menace d'avortement : 10 à 50 mgr. dans la  
journée.

Avortement à répétition : 10 mgr. par semaine  
pendant les 4 premiers mois de gros-  
sesse.

**Voie intra-musculaire profonde**

Assurances Sociales : B



**LUTOGYL 5 & 10**  
(Comprimés)

Anhydroxy-progestérone ou prégnéninolone

**Tube de 25 comprimés dosés à 5 ou à 10 mgr.**

Coefficient d'activité buccale = 1/6

(Multiplier par 6 la dose requise  
pour le Lutogyl ampoules)

Il est préférable de sucer le comprimé  
plutôt que de l'avaler

**Voie perorale**

Assurances Sociales : **B**

**MYOVARSYL**

**Diamino-dihydroxy-arsénobenzène-  
diméthylène-sulfite de sodium**

**Boîte unitaire avec les dosages suivants de  
principe actif :**


0 gr. 015 - 0 gr. 03 - 0 gr. 06 - 0 gr. 12  
0 gr. 18 - 0 gr. 24 - 0 gr. 30 - 0 gr. 36  
0 gr. 42 - 0 gr. 48 - 0 gr. 50 - 0 gr. 54  
0 gr. 60

**Traitement de la syphilis par arsenic trivalent**

**Voie sous-cutanée ou intra-musculaire**

Assurances Sociales : B

Tableau : C



## OPHTAZOL

Collyre au sel de lithium de l'acide para-  
sulfamido-phényl-azo-salicylique

(Sel de potassium)

**Flacon de 10 cc. dosé à 1 % d'azoïque  
sulfamidé**

Chaque goutte contient environ  
0 mgr. 5 de principe actif

II à III gouttes instillées, deux à trois fois  
par jour, entre les paupières.

**Voie conjonctivale**

Assurances Sociales : B



## OPODERMYL

Onguent à base d'extraits embryonnaires

**Tube de 40 gr. dosé à 5 % d'extraits  
embryonnaires**

Une application par jour en couche épaisse

**Voie externe**

Assurances Sociales : B



**PENICILLINE "G"**  
**ROUSSEL - SCHENLEY**

Pénicilline " G " cristallisée

(Sel de potassium)

**Flacons de :**

**100.000 U.**

**200.000 U.**


**500.000 U.**

Stable à température ordinaire  
sans précaution particulière

**Voie parentérale**

Assurances Sociales :





## PHYTOGYL

Complexe phospho-calcique vitaminé

**Tube de 25 comprimés à 0 gr. 50**

Un comprimé contient :

Vitamine D <sub>2</sub> cristallisée 1/10 <sup>e</sup> mgr. = 4.000U.I.	
Phosphate tricalcique .....	0 gr. 09
Gluconate de calcium .....	0 gr. 03
Inophosphan .....	0 gr. 06

Par jour :

Nourrissons	: 1 comprimé écrasé.
Enfants	: 2 comprimés.
Adolescents, adultes, femmes enceintes :	3 à 5 comprimés.

**Voie digestive**

Assurances Sociales : B



## PREVARSYL

Acide m. acétylamino-p.hydroxy-phénylarsinique.  
Arsenic pentavalent à action maxima per os.

### Flacons piluliers de :

100 comprimés	à	0 gr. 01
50	—	à 0 gr. 05
25	—	à 0 gr. 25

doses variables suivant l'intensité des affections  
amibiases, spirillozes, trypanosomiases

Par jour :

Adultes : 2 à 4 comprimés 3 à 4 d'heure

### Voie digestive

Croquer ou délayer les comprimés  
dans un peu d'eau

Assurances Sociales : **B**

Tableau : **C**



## PROXYTOL

Diastases hépatiques, stomacales, intestinales  
et pancréatiques

**Boîte de 36 comprimés**

Proxylase de foie .....	0 mgr. 33
— d'estomac .....	0 mgr. 16
— d'intestin .....	0 mgr. 08
— de pancréas .....	0 mgr. 16
par comprimé	

Par jour :

Nourrissons : 2 à 4 comp. écrasés 3/4 d'heure  
avant les tétées.

Enfants, adultes : 4 à 6 comprimés.

**Voie digestive**

Assurances Sociales : **B**



## PYOFORMINE

Médication anti-infectieuse polyvalente

**Boîte de 4 ampoules de 2 cc.**

Enfants : jusqu'à 10 ans : 1 cc. par jour.

10 ans et au-dessus : 2 cc. par jour.

Adultes : 2 à 3 ampoules par jour.

**Voie sous-cutanée profonde  
ou intra-musculaire  
(agiter l'ampoule avant l'emploi)**

Assurances Sociales : **A**



## RUBIADERM

Pommade au Rubiazol

Tube de 40 gr.  
Pommade dosée à 5 %

**Application externe**  
en couche épaisse sur les lésions  
Peut être injecté dans les trajets fistuleux

Assurances Sociales : B



## RUBIAZOL

Carboxy-sulfamido-chrysoïdine.  
Azoïque sulfamidé, très bien toléré

**Flacon de 40 comprimés, dosés à 0 gr. 20  
pour faciliter la médication réfractée**

Nourrissons : 2 à 6 comp. écrasés.  
Enfants : 5 à 15 comprimés.  
Adultes : à titre préventif : 6 à 8 comprimés.  
à titre curatif : 10 à 25 comprimés.

### Voie digestive

Assurances Sociales : **B**

Tableau : **C**



## SEDO-GYNOESTRYL

Antispasmodique général  
Sédatif

**Flacon de 10 cc.**

Di-hydro-folliculine	2 mgr.
Bromure de sodium	3 gr. 70
Extrait de Jusquiame	0 gr. 20
Alcool à 39° q.s.p.	10 cc.

1 goutte = 1/5 de mgr. d'œstradiol  
= 2.000 U. I.

5 fois V à X gouttes par jour par séries de  
15 jours, pendant la période inter-menstruelle,  
si la femme est réglée.

### Voie perlinguale

(Les gouttes sont déposées sous la langue)

Assurances Sociales : ■

ROUSSEL

## SERUM POLYVALENT de Leclainche et Vallée

Sérum prélevé sur des animaux immunisés  
avec des microbes pyogènes

**Boîte de 2 ampoules de 10 cc.**

Infections générales : injections Intra-muscu-  
laires ; dose d'attaque : 80 cc., puis  
doses dégressives.

Lavements : 40 à 80 cc, matin et soir.

Infections locales : en pansements sur la plaie  
infectée.


**Voie sous-cutanée**

**Voie rectale**

**Pansements locaux**

Assurances Sociales : **A**





## SIROPS GOBEY

### = LAXATIF GOBEY =

Principes actifs végétaux d'action douce

(1) **Flacon de sirop de 150 cc.**

Enfants : 1 cuillère à café

Adultes : 1 cuillère à dessert

(2) **Etui de 100 gr. de granulé**

Nourrissons : 1/2 cuil. à café

Enfants : 1 cuillère à café

Adultes : 1 cuillère à dessert

Assurances Sociales

Sirop B

### = PECTORAL GOBEY =

Extraits végétaux sans opium

**Flacon de sirop de 150 cc.**

Jusqu'à 2 ans : Autant de cuillères à café  
que l'enfant a de semestres

De 2 à 5 ans : 3 à 4 cuil. à café par jour

De 6 à 12 ans : 2 à 4 cuil. à dessert par jour

Adultes : 2 à 4 cuil. à soupe par jour

Assurances Sociales : B

### = SEDATIF GOBEY =

Synergie calmante atoxique

**Flacon de sirop de 150 cc.**

Jusqu'à 2 ans : 1 à 3 cuil. à café par jour

De 2 à 5 ans : 3 à 4 cuil. à café par jour

De 6 à 12 ans : 2 à 4 cuil. à dessert par jour

Adultes : 2 à 4 cuil. à soupe par jour

**Voie digestive**



## SOLANTYL

5,5 di-phényl-hydantoïrate de soude

**Pilulier de 25 comprimés dragéifiés dosés  
à 0 gr. 10**

**Boîte de 100 comprimés**

Comitialité. Adulte vierge de toute thérapeutique antérieure : d'emblée 3 comprimés pour atteindre 6 comprimés par jour, si nécessaire.

En cas de thérapeutiques antérieures, la substitution doit être progressive.

L'association avec les barbituriques est possible et parfois nécessaire.

Sympathalgie, névralgie faciale : 2 à 3 comprimés par jour.

### **Voie digestive**

(A prendre au cours des repas)

Assurances Sociales : B



SIROPS GOBEY

= LAXATIF GOBEY =

**STERANDRYL 5 - 10 - 25**

Solution huileuse de propionate  
de testostérone

**Boîte de 4 ampoules de 1 cc. dosées à 5 mgr.**

**Boîte de 5 ampoules de 1 cc. dosées à 10 mgr.**

**Boîte de 2 ampoules de 1 cc. dosées à 25 mgr.**

1 mgr. de testostérone =  
100 U.I. d'androstérone

Prostatisme moyen, asthénie, sénescence :

4 amp. à 25 mgr. la première semaine.

2 amp. à 25 mgr. les semaines suivantes. Séries mensuelles discontinues.


Infantilisme : 1 amp. de 25 mgr. quotidienne séries discontinues de 6 jours.


Impuissance : 1 amp. de 25 mgr. quotidienne séries discontinues de 6 jours.

Petit prostatisme, petites asthénies : 1 amp. de 5 mgr. ou de 10 mgr. quotidienne pendant 3 semaines.

Syndrome adiposo-génital : 1 amp. de 10 mgr. tous les 2 jours. Série de 10 suivie de 10 jours de repos.

**Injection intra-musculaire profonde**

Assurances Sociales : 



ROUSSEL

**STEROXYL (gouttes)**

Solution hydro-alcoolique de Vitamine D<sub>2</sub>  
cristallisée

**Flacon de 10 cc. contenant 5 mgr. de calciférol  
soit 200.000 U. I. de Vitamine D<sub>2</sub>**

Une goutte = 0 mgr. 02 de calciférol = 400 U.I.

Jusqu'à un an : X gouttes par jour.

De 1 à 10 ans : X à XX gouttes par jour.

A partir de 10 ans : XX à XXX gouttes par jour.

**Voie digestive**

Assurances Sociales : B



ROUSSEL

## STEROGL-15

Forme ingérable

Vitamine D<sub>2</sub> cristallisée  
en solution alcoolique ou huileuse

**Boîte de 1 ampoule dosée à 15 mgr.**

**Boîte de 4 ampoules dosées à 15 mgr.**

15 mgr. de Vitamine D<sub>2</sub> = 600.000 U.I.

Rachitisme et spasmophilie :

Prévention : 1 amp. tous les 6 mois.

Traitement : 1 amp. suffit généralement.

Cas sévères : 1 amp. par semaine pendant 3 semaines.

Décalcifications :

a) ostéopathies, arthrites, rhumatismes, 2 amp. par semaine pendant 2 mois

b) grossesse, allaitement,

Prévention : 1 amp. au cours des 3, 6 et 9<sup>e</sup> mois.

Traitement : 1 amp. tous les 2 mois.

c) cal paresseux : 1 amp. à renouveler éventuellement au bout d'un mois.

Lupus tuberculeux (Méthode de Charpy) :

3 amp. par semaine pendant 2 sem.

2 — — — 3 —

1 — — — 12 —

Tuberculoses extra-pulmonaires :

adapter la posologie précédente à l'âge, la tolérance, la sévérité du cas.

Engelures :

Prévention : 1 amp. à l'automne.

Traitement : 1 amp. par semaine pendant 3 semaines.

Convalescences : 2 amp. dans un mois.

Suspendre la médication en cas d'anorexie, nausées, polyurie.

**Voie digestive**

**L'excipient huileux est plus particulièrement destiné aux nourrissons**

Assurances Sociales : B



## STEROXYL-15 Injectable

Solution huileuse de Vitamine D<sub>2</sub> cristallisée

**Boîte de 4 ampoules dosées à 15 mgr.**

15 mgr. correspondent à 600.000 U.I.  
Même posologie que le STEROXYL 15 per os

### **Voie intra-musculaire profonde**

La forme injectable doit être utilisée en cas de mauvaise assimilation digestive (fréquente chez les tuberculeux).

Elle permet une meilleure tolérance de la vitamine D, lorsque de hautes doses sont nécessaires.

Assurances Sociales : ■

**SUISERYL**

Sérum normal de porc, anti-colibacillaire

**Boîte de 6 ampoules de 10 cc.**

Toute infection intestinale aiguë


Adultes : 1 à 4 ampoules par jour.

Enfants : demi-dose.

**Voie digestive**

**Peut être donné en lavement**

Assurances Sociales : B


 ROUSSEL

## SYNCORTYL 2 - 5 - 10

Solution huileuse d'acétate  
de désoxycorticostérone

Boîte de 4 ampoules de 1 cc. dosées à 2 mgr.  
— — — — 5 mgr.  
— — — — 10 mgr.

Maladie d'Addison : injections quotidiennes,  
doses variables avec l'étendue des  
lésions.

Maladies infectieuses : prophylaxie du syn-  
drome malin : 5 mgr. tous les 2 jours.  
Syndrome malin : 10 mgr. au moins  
par jour.

Shock : prophylaxie : 5 mgr. par jour, les 3 jours  
précédant une intervention. Dans le  
shock, 10 mgr. toutes les 2 heures.

Déshydratation : 2, 5, 10 mgr. par jour selon  
l'âge.

Asthénies : 2 à 5 mgr. deux fois par semaine.

Intoxications aiguës : 10 à 20 mgr. par jour.  
chroniques : 5 mgr. par jour.

### Injection intra-musculaire profonde

Assurances Sociales : **A**





## TETRAVIT - B

### ROUSSEL

Complexe vitaminique B

#### Tube de 20 comprimés

contenant par comprimé de 0 gr. 50 :

Vitamine B1 (Aneurine) . . . . .	1 mgr. 5
Vitamine B2 (Riboflavine) . . . . .	0 mgr. 5
Vitamine PP (Nicotinamide) . . . . .	10 mgr.
Pantothénate de calcium racémique . . . . .	20 mgr.

Prévention et traitement de l'avitaminose B  
anémies, diabète, névrites  
déficiences organiques

2 à 4 comprimés chez l'adulte  
1 à 2 comprimés chez l'enfant et le nourrisson

**Voie digestive**

Assurances Sociales : B



## THROMBASE ROUSSEL

Thrombine, principe actif de la coagulation sanguine

- 1°) Poudre blanche, très soluble dans l'eau, conservée et livrée en ampoules scellées sous vide.  
0 gr. 22 de principe actif par ampoule.
- 2°) Solvant en ampoules de 2 cc.

**Boîte de 2 ampoules de poudre**  
**Boîte de 2 ampoules de solvant**

Verser le solvant dans l'ampoule qui contient la poudre en prenant les précautions d'asepsie d'usage et agiter jusqu'à parfaite dissolution. Avec la solution obtenue, imbiber gaze ou "Spongel" et faire pansement compressif.

## SPONGEL ROUSSEL

Eponge de gélatine desséchée, résorbable, stérilisée, présentée en tube stérile. Extraire l'éponge au moyen d'une pince stérile, l'imbiber de solution de "Thrombase Roussel" et l'abandonner ensuite dans la plaie.

Neuro-chirurgie - Chirurgie générale  
Stomatologie - O. R. L.

**Action locale**

Assurances Sociales : B



THROMBASE  
ROUSSEL

## TREPHONYL

Facteur de croissance et de régénération cellulaire, antianémique, galactogène.

**Boîte de 6 ampoules de 10 cc.**


Une ampoule contient 4 gr. 75 d'extraits embryonnaires et 4 gr. 75 de sérum hémopoïétique.

Adultes : 1 à 3 amp. par jour, entre les repas.

Enfants : 1 à 2 amp.

**Voie digestive**

Assurances Sociales : **B**



## UCLARSYL

Novarsénobenzol Codex

Boîtes unitaires dosées à 0 gr. 05 - 0 gr. 10  
 0 gr. 15 - 0 gr. 20 - 0 gr. 30  
 0 gr. 45 - 0 gr. 60 - 0 gr. 75  
 0 gr. 90 - 1 gr. 05 - 4 gr. 50  
 par ampoule

Boîtes séries de 0 gr. 15 à 0 gr. 90

**Injection intraveineuse**

Assurances Sociales : A  
 Tableau : C



## UROFORMINE GOBEY

Hexaméthylène-tétramine pure

### = FORME COMPRIMES =

Boîte de 50 comprimés dosés à 0 gr. 50  
Boîte de 50 comprimés effervescents à 0 gr. 25

2 à 4 comprimés par jour  
(dose doublée pour le comprimé effervescent)

Voie digestive

### = FORME AMPOULES =

Boîte de 12 amp. de 2 cc. à 25 %  
Boîte de 6 amp. de 5 cc. à 25 %  
Boîte de 12 amp. de 2 cc. à 50 %  
Boîte de 6 amp. de 5 cc. à 50 %

1 à 3 ampoules par jour

Voie Intra-veineuse

Assurances Sociales : B

## TABLE DES MATIERES

Acavyl .....	1	Lutezol .....	29
Acéto-Stérandryl .....	2	Lutogyl 5-10 (ampoules) ..	30
Angioxyl .....	3	Lutogyl 5-10 (comprimés) ..	31
Auxergyl .....	4	Myovarsyl .....	32
R-Deugyl .....	5	Ophtazol .....	33
Benzo-Gynoestryl 1 .....	6	Opodermyl .....	34
Benzo-Gynoestryl 5 .....	7	Pénicilline "G" Roussel ..	35
Bivatol .....	8	Phytogyl .....	36
Cesaldyl .....	9	Prévarsyl .....	37
Collubiazol .....	10	Proxytol .....	38
Damicol .....	11	Pyoformine .....	39
Dicorantyl .....	12	Rubiaderm .....	40
Dipégyl .....	13	Rubiazol .....	41
Disonyl .....	14	Sédo-Gynoestryl .....	42
Ectiazol .....	15	Sérum Polyvalent .....	43
Escosyl .....	16	Sirops Gobey .....	44
Furalone pommade .....	17	Solantyl .....	45
Glosso-Stérandryl .....	18	Stérandryl, 5, 10, 25 .....	46
Gravidostyl .....	19	Stérogyl gouttes .....	47
Gynoestryl (comprimés) ..	20	Stérogyl 15 .....	48
Gynoestryl (gouttes) .....	21	Stérogyl 15 injectable ..	49
Hémostyl .....	22	Suiseryl .....	50
Hépagyl injectable .....	23	Syncortyl 2, 5, 10 .....	51
Hormone gonadotrope ..	24	Tétravit B .....	52
Implantations de cristaux ..	25	Thrombase et Spongel ..	53
Insulyl, Insulyl-Retard ..	26	Tréphonyl .....	54
Isonal .....	27	Uclarsyl .....	55
K-Thrombyl .....	28	Uroformine Gobey .....	56

