

Bibliothèque numérique

medic@


Les établissements BYLA. -


. - Paris : Imprimerie G. Desgrandchamps, s.d.




Licence ouverte. - Exemple de l'Ordre national des pharmaciens

Adresse permanente : <http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?extcnop0023x002>









LES
ÉTABLISSEMENTS BYLA

Société Anonyme au Capital de 5.000.000 de Francs

Chèques post. :
PARIS 177-37

Tél : } FL. 46-38
- 46-39

Adr. Télégr. :
BYLABIOLYB-PARIS




7 Diplômes Hors Concours, 15 Grands Prix aux
Expositions Universelles de :

**PARIS, LONDRES, MILAN, BRUXELLES, SAINT-LOUIS
BUENOS-AIRES, RIO-DE-JANEIRO, STRASBOURG**

Siège Social et Administration :

26, AVENUE DE L'OBSERVATOIRE - PARIS

Usine et Laboratoires de Recherches à GENTILLY (Seine)




Les ÉTABLISSEMENTS BYLA offrent en hommage, aux Médecins, cette petite brochure, conçue exclusivement dans un but pratique et destinée à leur fournir des indications utiles aux prescriptions opothérapiques.


*Ils attirent vivement leur attention sur les **SPÉCIALITÉS BYLA**, toutes d'ordre **strictement médical**, et rappellent spécialement leurs nouvelles présentations opothérapiques brevetées, qui sont :*

**SANS ODEUR,
D'ACTIVITÉ CONSTANTE,
ET DE
CONSERVATION INDÉFINIE**

Les ÉTABLISSEMENTS BYLA adresseront, sur simple demande, à MM. les Médecins, tous échantillons gracieux de leurs différents produits, ainsi que la littérature les concernant.



N.-B. — Les Spécialités BYLA ne sont jamais annoncées ni délivrées directement au Public.



LES NOUVELLES
Formes Opothérapiques
BYLA





FORME SÈCHE CACHETS "OPO" brevetés
FORME COMPRIMÉE, GLANDULES, comprimés dragéifiés
FORME LIQUIDE.. .. "EXO" sucrés et aromatisés
FORME INJECTABLE, AMPOULES, asepsie rigoureuse

sont

SANS ODEUR
ET DE
CONSERVATION
INDÉFINIE



MÉDICATION SIMPLE 
PLURIGLANDULAIRE
 PANGLANDULAIRE

LES CACHETS "OPO" BYLA

(PROCÉDÉ BREVETÉ)



PRÉPARATION :

Extraits opothérapeutiques totaux, obtenus par dessiccation des organes correspondants, dans le vide à basse température puis, séparation ultérieure du lipide et de son substratum cellulaire. Chaque cachet renferme

deux comprimés revêtus d'un enduit protecteur

Le plus grand, sous forme d'un anneau légèrement compressé, représente le substratum cellulaire dégraissé.

Le second (au centre de l'anneau) représente le lipide correspondant.

En boîtes de 24 cachets.

AVANTAGES:

Par leur enrobage protecteur et les soins apportés à leur conditionnement, les **CACHETS "OPO" BYLA** se trouvent soustraits à l'action de l'oxygène et de l'humidité.

Ils sont donc **SANS ODEUR** et de **CONSERVATION INDÉFINIE**.

MODE D'EMPLOI: Uniforme pour tous les Cachets « OPO » BYLA : 2 à 4 par jour.

(Voir Formulaire des pages 12 à 29).



FORME OPTHÉRAPIQUE COMPRIMÉE

LES GLANDULES BYLA

(COMPRIMÉS DRAGÉIFIÉS INALTÉRABLES)

Médication
Simple et
Pan-
glandu-
laires.

••

Flacons de
60 com-
primés



Flavéine
Ovarine,
Médullo-
séine et
Pluriglan-
dulaires.

••

Flacons de
40 com-
primés



PRÉPARATION : Extraits totaux organothérapeutiques obtenus en partant d'organes frais recueillis avec le plus grand soin et séchés dans le vide à basse température. Aussitôt après leur préparation, ces extraits sont mis sous la forme de **Glandules**, comprimés dragéifiés **inaltérables**, à enrobage spécial pour digestion intestinale.

AVANTAGES : Cette forme pharmaceutique se prête bien au dosage rationnel du principe actif et permet sa facile absorption tout en lui assurant une longue conservation.

MODE D'EMPLOI : Unique pour tous les organes: 4 à 8 comprimés par jour.

(Voir Formulaire des pages 12 à 29).

FORME OPOTHÉRAPIQUE LIQUIDEINALTÉRABLE

LES "EXOS" BYLA



PRÉPARATION

Les "EXOS" BYLA sont obtenus par exolyse aseptique de l'organe frais.

AVANTAGES

Les "EXOS" BYLA sont l'objet d'un contrôle rigoureux, physiologique, chimique.

Soigneusement étalonnés par des méthodes précises, les "EXOS" BYLA présentent toujours la même activité thérapeutique.

De saveur agréable, ils sont parfaitement tolérés et se conservent indéfiniment.



MODE D'EMPLOI

Uniforme pour tous: 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.

Les prendre de préférence dans un peu d'eau gazeuse.

(Voir Formulaire des pages 12 à 29).



FORME OPOTHÉRAPIQUE INJECTABLE

LES AMPOULES BYLA

aux Extraits injectables de
FOIE, HYPOPHYSE, OVAIRE, SURRÉNALE, REIN, RATE
THYROÏDE, TESTICULE, ETC.



PRÉPARATION: obtenues avec des organes dont l'intégrité physiologique est soigneusement vérifiée.

Elles sont préparées avec une asepsie rigoureuse, et leur stérilité est contrôlée par examen bactériologique avant qu'elles ne soient livrées aux malades.

Chaque ampoule correspond à 0 gr. 25 d'organe frais

AVANTAGES :

Les ampoules injectables BYLA sont constituées par des sucs organiques **rationnellement dilués et amenés à un état voisin de l'isotonie**. Leur emploi ne provoque **aucune réaction douloureuse**.



En boîtes
de 6 et 12
ampoules
de 2 cc.

MODE D'EMPLOI: Uniforme pour tous les organes :

Une ampoule tous les deux jours en injection intramusculaire.

(Voir Formulaire des pages 12 à 29).

MÉDICATION PANGLANDULAIRE

PAR LES

CACHETS OPO-PANGLANDULAIRES BYLA
PANGLANDULAIRES BYLA (comprimés dragéifiés)
SUCS PANGLANDULAIRES BYLA (inaltérables)
AMPOULES PANGLANDULAIRES BYLA

contenant les différents organes dont l'action physiologique est bien établie et dont l'insuffisance se fait sentir par des troubles plus ou moins graves.

TROIS SÉRIES	Masculine	Gastérase, cérébrine, hépatine, hypophysine, pancréine, rénine, orchitine , surrénine, thyroïdine.
	Féminine	Gastérase, cérébrine, hépatine, hypophysine, ovarine , placentine , pancréine, rénine, mamelline , surrénine, thyroïdine.
	Infantile	Gastérase, cérébrine, hépatine, hypophysine, pancréine, rénine, thymusine , surrénine, thyroïdine.



INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Les **Produits Panglandulaires BYLA** sont indiqués dans les syndromes pluriglandulaires, dans l'épuisement nerveux, le surmenage physique ou intellectuel, la neurasthénie, l'asthénie, l'anémie, l'obésité, les adynamies, les troubles de la nutrition, les affections du tube digestif, le myxœdème, les troubles circulatoires. On les donnera également chez la femme : dans les troubles de la formation, de la grossesse, de la ménopause, et chez l'enfant, dans les retards de croissance, les développements tardifs.

(Voir Posologie et Mode d'emploi, page ci-contre).

DOSES ET MODE D'EMPLOI

(TOUTES LES GLANDES EN PROPORTION NORMALE)



CACHETS PANGLANDULAIRES

Prescrire : OPO-PANGLANDULAIRES BYLA

- H.** — Adultes masculins 2 à 4 dans les 24 heures
F. — Adultes féminins 2 à 4 dans les 24 heures
E. — Enfants 2 à 4 dans les 24 heures



PANGLANDULAIRES

(Comprimés dragéfiés)

Prescrire : PANGLANDULAIRES BYLA

- H.** — Adultes masculins 4 à 6 dans les 24 heures
F. — Adultes féminins 3 à 5 dans les 24 heures
E. — Enfants 2 à 4 dans les 24 heures



SUCS PANGLANDULAIRES

Prescrire : SUCS PANGLANDULAIRES BYLA

- H.** — Adultes masculins.. . . . 2 à 3 cuillerées à bouche dans les 24 h.
F. — Adultes féminins 2 à 3 cuillerées à bouche dans les 24 h.
E. — Enfants 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.



AMPOULES

Prescrire : AMPOULES PANGLANDULAIRES BYLA

- H.** — Adultes masculins 1 ampoule tous les 2 ou 3 jours
F. — Adultes féminins. 1 ampoule tous les 2 ou 3 jours
E. — Enfants 1 ampoule tous les 2 ou 3 jours

OPOTHÉRAPIE VÉGÉTALE



SUCS PURS INALTÉRABLES DE PLANTES FRAICHES
LES ÉNERGÉTÈNES VÉGÉTAUX BYLA
 (chimiquement dosés et physiologiquement éprouvés)

PRÉPARÉS

avec des plantes récoltées sur leur terrain d'élection ou cultivées d'une façon rationnelle, à l'abri de l'air, de la lumière, de la chaleur (sans le secours de dissolvants neutres miscibles), par exolyse aseptique étherée de la plante fraîche.

AVANTAGES

Ils réalisent exactement la composition bio-chimique de la plante vivante, et n'ont leur équivalent dans aucune pharmacopée. Leur **activité est toujours identique** d'une année à l'autre, car ils sont l'objet d'un double contrôle, chimique et physiologique.



En flacons de 90 c.

MODE D'EMPLOI

Uniforme pour tous les **sucs de plantes Byla**, sauf Colchique et Digitale.
(Se prennent avec un peu d'eau sucrée).

Prescrire: VALÉRIANE, GUI, SAUGE BYLA, etc.

(Voir tableau ci-contre).

SUCS PURS INALTÉRABLES DE LA PLANTE FRAICHE LES ÉNERGÉTÈNES VÉGÉTAUX BYLA			
PRESCRIRE	MODE D'ACTION	MODE D'EMPLOI (dose moyenne)	
COLCHIQUE BYLA	Antigoutteux, analgésique	X à XXX gouttes par jour	
DIGITALE BYLA	Toni-cardiaque, diurétique.		
AUBÉPINE (CRATAEGUS) BYLA.	Régulateur cardiaque et vasculaire	Trois cuillerées à café par jour.	
GENËT BYLA	Diurétique, régulateur cardiaque		
GUI BYLA	Vaso-dilatateur, antiscièreux, anti-hémorragique		
MUGUET BYLA	Toni-cardiaque		
SAUGE BYLA	Anhydrotique, tonique		
CASSIS (RIBES NIGRUM) BYLA	Antirhumatismal, uricolytique		
MARRONS D'INDE BYLA	Toni-vasculaire, résolutif, analgésique		
VALÉRIANE BYLA	Sédatif, régulateur du système nerveux.		
MONOGRAPHIE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE.			

ORGANES	MODE D'ACTION ET INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE ET	
		Forme sèche: CACHETS « OPO » BYLA	Forme dragéifiée: GLANDULES BYLA
CERVEAU	Action excitante et toninutritive sur l'encéphale. Fatigues cérébrales, Affections du système nerveux	Opo-Cérébrine Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandules de Cérébrine Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
CŒUR	Insuffisances cardiaques, Myocardites toxiques ou post-infectieuses	Opo-Cardine Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandules de Cardine Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
ESTOMAC	Activant de la protéolyse gastrique. Insuffisance gastrique Dyspepsie, Achylie Hypochoylie	Opo-Gastérase Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandules de Gastérase Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
FOIE	Insuffisance hépatique Diabète par anhépatie États hémorragiques	Opo-Hépatine Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandules d'Hépatine Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
GANGLIONS LYMPHATIQUES	Fièvres ganglionnaires Rhumatismes, Angines	Opo-Lymphatine Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandules de Lymphatine Byla à 0 gr. 15, 4 à 8 par jour.

MODE D'EMPLOI

Forme liquide: « EXO » BYLA	Forme Injectable: AMPOULES BYLA
<p>Exo-Cérébrine Byla : Ne se fait pas.</p>	<p>Ampoules de Cérébrine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Cerveille fraîche 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Cardine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à : Myocarde de bœuf frais . . . 5 gr. ou à Cardine 1 gr. 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Cardine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Myocarde frais 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Gastérase Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à : Muqueuse gastrique fraîche de porc 5 gr. ou à Gastérase 0,80 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p> <p>Elixir et Vin de Pepsine Byla : 1 à 2 verres à liqueur après le repas.</p>	<p>Ampoules de Gastérase Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Muqueuse gastrique fraîche . . 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Hépatine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à : Foie frais de porc 5 gr. ou à Hépatine 1,25 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules d'Hépatine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Foie frais 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Lymphatine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à : Ganglions lymphatiques frais. . 5 gr. ou à Lymphatine 1,25 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Lymphatine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Ganglions lymphatiques frais. . 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>

ORGANES	MODE D'ACTION ET INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE ET	
		Forme sèche: CACHETS « OPO » BYLA	Forme dragéifiée: GLANDULES BYLA
HYPOPHYSE	Hypertenseur tonocardiaque, Excitant de la fibre lisse, Accroît la coagulabilité du sang	Opo-Hypophysine Byla : Cachets de 0,10, 0,15 et 0,25 2 à 4 par jour.	Glandes d'Hypophysine Byla à 0 gr. 05
	Acromégalie, Gigantisme, Diabète, Troubles nerveux, Cardiopathies	Opo-Pituilobine Byla ou EXTRAIT DU LOBE POSTÉRIEUR DE L'HYPOPHYSE : Cachets à 0,05, 0,02, 0,01 2 à 4 par jour.	Pituilobine Byla à 0 gr. 01 4 à 8 par jour.
INTESTIN	Excito-moteur intestinal; excito-sécrétoire pancréatique, biliaire, intestinal.	Opo-Duodénase Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandes de Duodénase Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
	Entérite, Constipation, Troubles intestinaux non définis.		
MAMELLE	Anti-hémorragique; Stimulant de l'activité mammaire, Lactation.	Opo-Mamelline Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandes de Mamelline Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
	Insuffisance de la sécrétion lactée, Métrorragies, Fibromes utérins.		
MOELLE OSSEUSE	Syndrome anémique, Leucémie, Polycytémie, Rachitisme, Cachexie.	Opo-Médullosséine Byla : Cachets de 0,10, 0,20 et 0,30 2 à 4 par jour.	Glandes de Médullosséine Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
OS	Troubles ostéogènes, Phosphaturie, Décalcification, Allaitement.	Poudre d'os frais Byla: Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Ne se fait pas.

MODE D'EMPLOI

Forme liquide : « EXO » BYLA	Forme injectable : AMPOULES BYLA
<p>Exo-Hypophysine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. présente la même activité physiologique que 0,05 poudre d'hypophyse normale titrée sur utérus de cobaye. 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules d'Hypophysine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Hypophyse fraîche 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p> <p>Ampoules de Pituitobine Byla : (Voir dosage page 37)</p>
<p>Exo-Duodénase Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à : Duodénum frais de porc . . . 5 gr. ou à : Duodénase 0,80 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Duodénase Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Duodénum frais 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Mamelline Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à : Mamelle fraîche 5 gr. ou à : Mamelline 0,65 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Mamelline Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Mamelle fraîche 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Médullosséine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à : Moëlle rouge fraîche 2 gr. ou à : Médullosséine 0,20 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Médullosséine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Moëlle rouge fraîche 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Ne se fait pas.</p>	<p>Ne se fait pas.</p>

ORGANES	MODE D'ACTION ET INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE ET	
		Forme sèche: CACHETS « OPO » BYLA	Forme dragéfiée: GLANDULES BYLA
OVAIRE	Insuffisance ovarienne, Castration, Troubles de la ménopause, de la grossesse et de la puberté, Obésité, Rhumatismes chroniques, Dermatoses.	Opo-Ovarine Byla : Cachets de 0,10, 0,20 et 0,30 2 à 4 par jour. Opo-Flavéine Byla : (Corps jaune) Cachets de 0,10, 0,15 et 0,25 2 à 4 par jour.	Glandules d'Ovarine Byla à 0 gr. 15 Flavéine Byla à 0 gr. 05 4 à 8 par jour.
PANCRÉAS	Pancréatite, Diabète pancréatique, Troubles intestinaux, Troubles diathésiques.	Opo-Pancréine Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandules de Pancréine Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
PLACENTA	Insuffisance de la sécrétion lactée, Troubles utérins, Synergique de la mamelle.	Opo-Placentine Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandules de Placentine Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
POUMON	Suppurations pulmonaires, Pleurésies purulentes.	Opo-Pulmine Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandules de Pulmine Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
PROSTATE	Affections de la prostate, Neurasthénies, Impuissance.	Opo-Prostatine Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandules de Prostatine Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.

MODE D'EMPLOI

Forme liquide: « EXO » BYLA	Forme injectable: AMPOULES BYLA
<p>Exo-Ovarine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à :</p> <p>Ovaires frais de génisse . . . 2 gr. ou à Ovarine 0,40</p> <p>2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules d'Ovarine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à :</p> <p>Ovaire frais 0,25</p> <p>Ampoules de Flavéine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à :</p> <p>Corps jaune frais 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Pancréine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à :</p> <p>Pancréas frais de porc . . . 2,50 ou à Pancréine 0,60</p> <p>2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Pancréine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à :</p> <p>Pancréas frais 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p> <p>Traitement du DIABÈTE par L'INSULINE BYLA (Voir pages 30 et 31)</p>
<p>Exo-Placentine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à :</p> <p>Placenta frais de vache . . . 5 gr. ou à Placentine 0,80</p> <p>2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Placentine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à :</p> <p>Placenta frais 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Pulmine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à :</p> <p>Poumon frais de mouton . . . 5 gr. ou à Pulmine 0,80</p> <p>2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Pulmine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à :</p> <p>Poumon frais 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Prostatine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à :</p> <p>Prostate fraîche 5 gr. ou à Prostatine 1 gr.</p> <p>2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Prostatine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à :</p> <p>Prostate fraîche 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>

ORGANES	MODE D'ACTION ET INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE	
		Forme sèche : CACHETS « OPO » BYLA	Forme dragéifiée : GLANDULES BYLA
RATE	Anémie, Hémorragies, Infections, Tubercu- lose.	Opo-Splénine Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandules de Splénine Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
REINS	Urémie et intoxica- tions urémiques, Néphrites aiguës et chroniques, Affec- tions rénales.	Opo-Rénine Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandules de Rénine Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
SANG	Fonction oxydasique, Fonction hémato- gène. Syndrome anémique, Grossesse, Conva- lescence, État dé- pressif.	Hémoglobine Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandules d'Hémoglobine Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
SUR- RÉNALES	Action antitoxique. Action tonocardiaque. Action hypertensive. Insuffisance surrénale. Maladie d'Addison, Surrénalite aiguë et chronique, Adynamies Collapsus	Opo-Surrénine Byla : Cachets de 0,10, 0,15 et 0,25 à 4 par jour.	Glandules de Surrénine Byla à 0 gr. 10 4 à 8 par jour

ET MODE D'EMPLOI

Forme liquide : « EXO » BYLA	Forme injectable : AMPOULES BYLA
<p>Exo-Splénine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à : Rate fraîche de porc 5 gr. ou à Splénine 1,25 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Splénine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Rate fraîche 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Rénine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à : Rein frais de porc 5 gr. ou à Rénine 0,80 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Rénine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Rein frais 0,25 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Sirop d'Hémoglobine Byla : 2 à 3 cuillerées à bouche par jour.</p>	<p>Ne se fait pas.</p>
<p>Exo-Surrénine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à Surrénale fraîche de bœuf 0,50 ou à Surrénine 0,10 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Surrénine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Surrénale fraîche 0,25 1 ampoule tous les deux jours.</p>

ORGANES	MODE D'ACTION ET INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE	
		Forme sèche : CACHETS « OPO » BYLA	Forme dragéfiée : GLANDULES BYLA
TESTI- CULES	Tonique neuro- musculaire. — Excitant du métabolisme. Insuffisances glandu- laires. Troubles de la nutrition, de la crois- sance. Troubles nerveux.	Opo-Orchitine Byla : Cachets de 0,25 et 0,50 2 à 4 par jour.	Glandules d'Orchitine Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour
THYMUS	Action trophique. Rachitisme, Myopa- thies. Maladie de Basedow.	Opo-Thymusine Byla : Cachets de 0,10, 0,20 et 0,30 2 à 4 par jour.	Glandules de Thymusine Byla à 0 gr. 10 4 à 8 par jour.
THYROÏDE	Action trophique et antitoxique. Myxœdème, Goltres.	Opo-Thyroïdine Byla : Cachets de 0,01, 0,02, 0,05, 0,10, 0,15 et 0,25 <i>Tous autres dosages en cachets simples.</i> 4 par jour. Cachets de Thyroïdine Byla : Cachets de dosés à 1, 2, 5 milligrammes tous dosages.	Glandules de Thyroïdine Byla à 0,01, 0,02, 0,05 et 0,10 Glandules de Parathyroïdine Byla à 0,001 4 à 8 par jour

Cachets et ampoules opothérapiques à toutes formules

BILE	Constipation opiniâtre, Ictère, Angiocholites et Cholécystites.	Ne se fait pas en cachets. Choléitoires Byla : Suppositoires à base d'ex- trait de bile glycinée au 1/10°. - Adultes et Enfants. Boîte de 12.	Glandules de Bile Byla à 0 gr. 15 4 à 8 par jour.
-------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

ET MODE D'EMPLOI

Forme liquide: «EXO» BYLA	Forme injectable: AMPOULES BYLA
<p>Exo-Orchitine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 grammes correspond à Glande orchitique fraîche de bœuf 5 gr. ou à Orchitine 0,60 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules d'Orchitine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Glande orchitique fraîche . . . 0,25 1 ampoule tous les deux jours.</p>
<p>Exo-Thymine (ou Thymusine) Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 grammes correspond à Thymus frais de veau . . 3 gr. ou à Thymusine 0,30 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Thymine Byla (ou Thymusine Byla) : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Thymus frais 0,25 1 ampoule tous les deux jours.</p>
<p>Exo-Thyroïdine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 grammes correspond à Thyroïde fraîche de mouton . . 0,25 ou à Thyroïdine 0,05 Iode physiologique thyroïdien 0 milligr. 15 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules de Thyroïdine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : Thyroïde fraîche 0,25 Ampoules de Parathyroïdine Byla : 1 ampoule de 2 cc. correspond à : 1 glande parathyroïde fraîche. 1 ampoule tous les deux jours.</p>

et à tous dosages, sur ordonnance du Médecin.

Bile Liquide Byla : Solution glycérique inaltérable à 10 % pour lavements: Adultes : 1 cuillerée à soupe dans 1/4 de litre d'eau bouillie. Enfants : 1 cuillerée à café dans 100 grammes d'eau bouillie.

NOTE. En raison de la susceptibilité de certains malades, il est utile de commencer par le 1/4 de cette dose.

Ne se fait pas.



POLYOPO

Au point de vue opothérapique, les associations pluriglandulaires glandulaires multiples simultanées, mais aussi pour éviter, en stimulant même nuisible sur d'autres organes que le même extrait est capable hypophysio-ovarienne dans les myasthénies). Dans d'autres cas, au ciation de la thyroïde à l'hypophyse pour combattre l'hypothyroïdie toutes ces indications, on réalise des associations judicieuses

ORGANES	INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE	
		Forme sèche: CACHETS « OPO » BYLA	Forme dragéifiée: GLANDULES BYLA
Formule N° 1 — HYPOPHYSE ET TESTICULE	Myxœdème, Troubles endocriniens, Infantilisme masculin	Opo-Hypophysio-Orchitine Byla : Opo-hypophysine 0,10 Opo-orchitine . . 0,60 par cachet 2 à 4 par jour.	Glandules Hypophysio-Orchitine Byla : Hypophysine 0,05 Orchitine . . 0,10 par glandule. 4 à 8 par jour.
Formule N° 2 — HYPOPHYSE ET OVAIRE	Troubles de la ménopause et insuffisances glandulaires	Opo-Hypophysio-Ovarine Byla : Opo-hypophysine 0,10 Opo-ovarine . . 0,20 par cachet. 2 à 4 par jour.	Glandules Hypophysio-Ovarine Byla : Hypophysine 0,05 Ovarine . . 0,10 par glandule. 4 à 8 par jour.
Formule N° 3 — TESTICULE ET THYROÏDE	Myxœdème, Insuffisances glandulaires, Infantilisme masculin	Opo-Orchito-Thyroïdine Byla : Opo-orchitine . . 0,60 Opo-thyroïdine . 0,05 par cachet. 2 à 4 par jour.	Glandules Orchito-Thyroïdine Byla : Orchitine . . 0,12 Thyroïdine . 0,03 par glandule. 4 à 8 par jour.

THÉRAPIE

d'extraits sont utiles, non seulement pour combattre les insuffisances un organe par l'extrait correspondant, d'exercer une action inutile ou d'inhiber (association thyro-ovarienne dans la maladie de Dercum, contraire, on utilisera l'action antagoniste de certaines glandes: asso-légère créée par la médication hypophysaire. En tenant compte de d'extraits, en vue d'harmoniser les synergies glandulaires.

ET MODE D'EMPLOI

Forme liquide: «EXO» BYLA	Forme injectable: AMPOULES BYLA
<p>Exo-Hypophyso-Orchitine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 grammes correspond à :</p> <p>Hypophyse fraîche de mouton . 0,50 Gl. orchitique fraîche de bélier . 5 gr. ou à :</p> <p>Hypophysine normale titrée . . 0,10 Orchitine 0,60 2 à 4 cuillerées à dessert par jour</p>	<p>Ampoules Hypophyso-Orchitine Byla :</p> <p>Hypophyse fraîche de mouton 0,05 } par ampoule Gl. orchitique fraîche . 0,20 } de 2 cc.</p> <p>1 ampoule tous les deux jours.</p>
<p>Exo-Hypophyso-Ovarine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 grammes correspond à :</p> <p>Hypophyse fraîche de mouton . 0,50 Ovaires frais de génisse . . . 2 gr. ou à :</p> <p>Hypophysine normale titrée . . 0,10 Ovarine 0,40 2 à 4 cuillerées à dessert par jour</p>	<p>Ampoules Hypophyso-Ovarine Byla :</p> <p>Hypophyse fraîche de mouton 0,05 } par ampoule Ovaire frais de génisse 0,20 } de 2 cc.</p> <p>1 ampoule tous les deux jours.</p>
<p>Exo-Orchito-Thyroïdine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 grammes correspond à :</p> <p>Gl. orchitique fraîche de bélier . 5 gr. Thyroïde fraîche de mouton . . 0,25 ou à :</p> <p>Orchitine 0,60 Thyroïdine normale titrée . . . 0,06 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules Orchito-Thyroïdine Byla :</p> <p>Gl. orchitique fraîche de bélier 0,15 } par ampoule Thyroïde fraîche de mouton 0,10 } de 2 cc.</p> <p>1 ampoule tous les deux jours.</p>

ORGANES	INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE ET	
		Forme sèche: CACHETS « OPO » BYLA	Forme dragéifiée: GLANDULES BYLA
Formule N° 4 — OVAIRE ET THYROÏDE	Insuffisance thyroïdienne et ovarienne	Opo-Ovaro-Thyroïdine Byla : Opo-ovarine . . . 0,20 Opo-thyroïdine . . . 0,05 par cachet 2 à 4 par jour.	Glandules Ovaro-Thyroïdine Byla Ovarine . . . 0,12 Thyroïdine . . . 0,03 par glandule 4 à 8 par jour.
Formule N° 5 — SURRÉNALE ET HYPOPHYSE	Asthme essentiel, Myasthénies, Insuffisances surrénales, Basedowisme.	Opo-Surréno-Hypophysine Byla : Opo-surrénine . . . 0,10 Opo-hypophysine . . . 0,10 par cachet 2 à 4 par jour.	Glandules Surréno-Hypophysine Byla Surrénine . . . 0,10 Hypophysine 0,05 par glandule 4 à 8 par jour.
Formule N° 6 — SURRÉNALE ET THYROÏDE	Retards de croissance	Opo-Surréno-Thyroïdine Byla : Opo-surrénine . . . 0,10 Opo-thyroïdine . . . 0,05 par cachet 2 à 4 par jour.	Glandules Surréno-Thyroïdine Byla Surrénine . . . 0,12 Thyroïdine . . . 0,03 par glandule 4 à 8 par jour.
Formule N° 7 — HYPOPHYSE ET THYROÏDE	Syndromes pluri-glandulaires Sclérose, Obésité	Opo-Hypophysio-Thyroïdine Byla : Opo-hypophysine . . . 0,10 Opo-thyroïdine . . . 0,05 par cachet 2 à 4 par jour.	Glandules Hypophysio-Thyroïdine Byla Hypophysine 0,12 Thyroïdine . . . 0,03 par glandule 4 à 8 par jour.

MODE D'EMPLOI

Forme liquide: « EXO » BYLA	Forme Injectable: AMPOULES BYLA
<p>Exo-Ovaro-Thyroidine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à :</p> <p>Ovaire frais de génisse . . . 2 gr. Thyroïde fraîche de mouton . 0,25 <small>mg</small> : Ovarine 0,40 Thyroïdine normale titrée . . . 0,05</p> <p>2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules Ovaro-Thyroidine Byla :</p> <p>Ovaire frais de génisse . . 0,15 } par ampoule de 2 cc. Thyroïde fraîche de mouton . . . 0,10 }</p> <p>1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Surréno-Hypophysine Byla : 1 cuil. à dessert de 10 gr. correspond à :</p> <p>Surrénale fraîche de bœuf . 0,50 Hypophyse fraîche de mouton 0,25 <small>mg</small> : Surrénine normale titrée . . . 0,10 Hypophysine normale titrée . . 0,05</p> <p>2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules Surréno-Hypophysine Byla :</p> <p>Surrénale fraîche de bœuf . 0,20 } par ampoule de 2 cc. Hypophyse fraîche de mouton 0,05 }</p> <p>1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Surréno-Thyroidine Byla : 1 cuil. à dessert de 10 gr. correspond à :</p> <p>Surrénale fraîche de bœuf . 0,75 Thyroïde fraîche de mouton . 0,37 <small>mg</small> : Surrénine normale titrée . . . 0,15 Thyroïdine normale titrée . . . 0,09</p> <p>2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules Surréno-Thyroidine Byla :</p> <p>Surrénale fraîche de bœuf 0,15 } par ampoule de 2 cc. Thyroïde fraîche de mouton 0,10 }</p> <p>1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Hypophysio-Thyroidine Byla : 1 cuil. à dessert de 10 gr. correspond à :</p> <p>Hypophyse fraîche de mouton 0,50 Thyroïde fraîche de mouton. 0,37 <small>mg</small> : Hypophysine normale titrée . . 0,10 Thyroïdine normale titrée . . . 0,09</p> <p>2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules Hypophysio-Thyroidine Byla :</p> <p>Hypophyse fraîche de mouton 0,05 } par ampoule de 2 cc. Thyroïde fraîche de mouton 0,20 }</p> <p>1 ampoule tous les 2 jours.</p>

ORGANES	INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE ET	
		Forme sèche: CACHETS « OPO » BYLA	Forme dragéifiée: GLANDULES BYLA
Formule N° 8 — SURRÉNALE HYPOPHYSE THYROÏDE	Asthme essentiel, Myasthénies, Insuf- fisances surrénales, Maladie d'Addison, Syndromes pluri- glandulaires.	Opo-Surréno-Hypo- physo-Thyroidine Byla : Opo-surrénine . . . 0,15 Opo-hypophysine . . . 0,05 Opo-thyroidine . . . 0,03 par cachet 2 à 4 par jour.	Glandules Sur- réno-Hypophy- so-Thyroidine Byla Surrénine . . . 0,07 Hypophysine . . . 0,05 Thyroidine . . . 0,03 par glandule 4 à 8 par jour.
Formule N° 8 bis — OVAIRE SURRÉNALE HYPOPHYSE	Insuffisances glandu- laires, Troubles de la Puberté et de la Ménopause, Syn- dromes adipo- génitaux.	Opo-Ovaro-Surréno- Hypophysine Byla : Opo-ovarine 0,15 Opo-surrénine . . . 0,05 Opo-hypophysine . . . 0,05 par cachet 2 à 4 par jour.	Glandules Ovaro-Surréno- Hypophysine Byla Ovarine 0,07 Surrénine . . . 0,05 Hypophysine . . . 0,05 par glandule 4 à 8 par jour.
Formule N° 9 — HYPOPHYSE OVAIRE THYROÏDE	Troubles de la Méno- pause, Syndromes adipo-génitaux.	Opo-Hypophyso- Ovaro-Thyroidine Byla : Opo-hypophysine . . . 0,05 Opo-ovarine 0,20 Opo-thyroidine . . . 0,03 par cachet 2 à 4 par jour.	Glandules Hy- pophyso-Ovaro- Thyroidine Byla Hypophysine . . . 0,05 Ovarine 0,07 Thyroidine . . . 0,03 par glandule 4 à 8 par jour.
Formule N° 9 bis — OVAIRE SURRÉNALE THYROÏDE	Troubles de la Pu- berté et de la méno- pause, Syndromes adipo-génitaux.	Opo-Ovaro-Surréno- Thyroidine Byla : Opo-ovarine 0,20 Opo-surrénine . . . 0,05 Opo-thyroidine . . . 0,03 par cachet 2 à 4 par jour.	Glandules Ovaro-Surréno- Thyroidine Byla Ovarine 0,07 Surrénine . . . 0,05 Thyroidine . . . 0,03 par glandule 4 à 8 par jour.

MODE D'EMPLOI

Forme liquide: « EXO » BYLA	Forme Injectable: AMPOULES BYLA
<p>EXO-SURRÉNO-HYPOPHYSO-THYROÏDINE BYLA : 1 cuil. à dessert de 10 gr. correspond à : Surrénale fraîche de bœuf . . . 0,50 Hypophyse fraîche de mouton . . . 0,25 Thyroïde fraîche de mouton . . . 0,20 <small>ou 2 :</small> Surrénine normale titrée 0,10 Hypophysine normale titrée 0,05 Thyroïdine normale titrée 0,05 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules Surréno-Hypophyso-Thyroïdine Byla : Surrénale fraîche de bœuf. 0,10 Hypophyse fraîche de mouton 0,05 Thyroïde fraîche de mouton 0,10 } par ampoule de 2 cc. 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Ovaro-Surréno-Hypophysine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à : Ovaires frais de génisse . . . 1 gr. Surrénale fraîche de bœuf . . . 1 — Hypophyse fraîche de mouton 1 — <small>ou 2 :</small> Ovarine 0,20 Surrénine Byla normale titrée . . . 0,20 Hypophysine Byla normale titrée . . 0,20 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules Ovaro-Surréno-Hypophysine Byla : Ovaires frais de génisse . . 0,15 Surrénale fraîche de bœuf. 0,05 Hypophyse fraîche de mouton 0,05 } par ampoule de 2 cc. 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Hypophyso-Ovaro-Thyroïdine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à : Hypophyse fraîche de mouton 0,50 Ovaires frais de génisse . . . 1 gr. Thyroïde fraîche de mouton . . . 0,80 <small>ou 2 :</small> Hypophysine normale titrée 0,10 Ovarine 0,20 Thyroïdine normale titrée 0,20 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules Hypophyso-Ovaro-Thyroïdine Byla : Hypophyse fraîche de mouton 0,05 Ovaires frais de génisse . . 0,15 Thyroïde fraîche de mouton 0,05 } par ampoule de 2 cc. 1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Ovaro-Surréno-Thyroïdine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à : Ovaires frais de génisse . . . 1 gr. Surrénale fraîche de bœuf. . . 1 — Thyroïde fraîche de mouton . . . 0,80 <small>ou 2 :</small> Ovarine 0,20 Surrénine normale titrée 0,20 Thyroïdine normale titrée 0,20 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules Ovaro-Surréno-Thyroïdine Byla : Ovaires frais de génisse . . 0,15 Surrénale fraîche de bœuf. 0,05 Thyroïde fraîche de mouton 0,05 } par ampoule de 2 cc. 1 ampoule tous les 2 jours.</p>

ORGANES	INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES	POSOLOGIE ET	
		Forme sèche: CACHETS « OPO » BYLA	Forme dragéifiée: GLANDULES BYLA
Formule N° 10 — HYPOPHYSE TESTICULE THYROÏDE	Développement tardif, Myxœdème, Insuffisances glandulaires.	Opo-Hypophyso-Orchito-Thyroïdine Byla : Opo-hypophysine . 0,05 Opo-orchitine . . 0,60 Opo-thyroïdine . . 0,03 par cachet 2 à 4 par jour.	Glandules Hypophyso-Orchito-Thyroïdine Byla Hypophysine 0,05 Orchitine . . . 0,07 Thyroïdine . . 0,03 par glandule 4 à 8 par jour.
Formule N° 11 — HYPOPHYSE THYROÏDE SURRENALE TESTICULE	Insuffisances glandulaires, Infantilisme masculin, Syndromes adïposogénitaux.	Opo-Hypophyso-Thyroïdo-Surréno-Orchitine Byla : Opo-hypophysine . 0,05 Opo-thyroïdine . . 0,05 Opo-surrénine . . 0,05 Opo-orchitine . . . 0,10 par cachet 2 à 4 par jour.	Glandules Hypophyso-Thyroïdo-Surréno-Orchitine Byla Hypophysine 0,03 Thyroïdine . . 0,02 Surrénine . . . 0,03 Orchitine . . . 0,07 par glandule 4 à 8 par jour.
Formule N° 12 — HYPOPHYSE THYROÏDE SURRENALE OVAIRE	Insuffisances glandulaires, Troubles de la puberté et de la ménopause.	Opo-Hypophyso-Thyroïdo-Surréno-Ovarine Byla : Opo-hypophysine . 0,05 Opo-thyroïdine . . 0,05 Opo-surrénine . . 0,05 Opo-ovarine . . . 0,10 par cachet. 2 à 4 par jour.	Glandules Hypophyso-Thyroïdo-Surréno-Ovarine Byla Hypophysine 0,03 Thyroïdine . . 0,02 Surrénine . . . 0,03 Ovarine 0,07 par glandule 4 à 8 par jour.

MODE D'EMPLOI

Forme liquide: «EXO» BYLA	Forme Injectable: AMPOULES BYLA
<p>Exo-Hypophyso-Orchito-Thyroidine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à :</p> <p>Hypophyse fraîche de mouton . . . 1 gr. Gl. orchitique fraîche de bélier . . . 2,40 Thyroïde fraîche de mouton . . . 0,80^{cc} :</p> <p>Hypophysine normale titrée . . . 0,20 Orchitine 0,30 Thyroïdine normale titrée . . . 0,20</p> <p>2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules Hypophyso-Orchito-Thyroidine Byla :</p> <p>Hypophyse fraîche de mouton 0,05 Gl. orchitique fraîche de bélier 0,15 Thyroïde fraîche de mouton 0,05</p> <p>par ampoule de 2 cc.</p> <p>1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Hypophyso-Thyroido-Surréno-Orchitine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à :</p> <p>Hypophyse fraîche de mouton . . . 0,50 Thyroïde fraîche de mouton . . . 0,40 Surrénale fraîche de bœuf . . . 0,50 Gl. orchitique fraîche de bélier . . . 1,60 ou à</p> <p>Hypophysine normale titrée . . . 0,10 Thyroïdine normale titrée . . . 0,10 Surrénine normale titrée . . . 0,10 Orchitine 0,20</p> <p>2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules Hypophyso-Thyroido-Surréno-Orchitine Byla :</p> <p>Hypophyse fraîche de mouton 0,05 Thyroïde fraîche de mouton 0,05 Surrénale fraîche de bœuf 0,05 Gl. orchitique fraîche de bélier 0,10</p> <p>par ampoule de 2 cc.</p> <p>1 ampoule tous les 2 jours.</p>
<p>Exo-Hypophyso-Thyroido-Surréno-Ovarine Byla : 1 cuillerée à dessert de 10 gr. correspond à :</p> <p>Hypophyse fraîche de mouton . . . 0,50 Thyroïde fraîche de mouton . . . 0,40 Surrénale fraîche de bœuf . . . 0,50 Ovaïres frais de génisse 1 gr. ou à</p> <p>Hypophysine normale titrée . . . 0,10 Thyroïdine normale titrée . . . 0,10 Surrénine normale titrée . . . 0,10 Ovarine 0,20</p> <p>2 à 4 cuillerées à dessert par jour.</p>	<p>Ampoules Hypophyso-Thyroido-Surréno-Ovarine Byla :</p> <p>Hypophyse fraîche de mouton 0,05 Thyroïde fraîche de mouton 0,05 Surrénale fraîche de bœuf 0,05 Ovaïres frais de génisse 0,10</p> <p>par ampoule de 2 cc.</p> <p>1 ampoule tous les 2 jours.</p>

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI
DE L'INSULINE BYLA



FORME INJECTABLE:

DIABÈTE LÉGER: Une ampoule, ou se contenter du régime seul (soit 15 unités cliniques).

DIABÈTE MOYEN: (détecté par la présence, en plus du glucose dans les urines, de corps acétoniques en petites quantités); 2 ampoules d'INSULINE BYLA ou 1,5 cc. de solution BYLA par jour, à injecter une heure avant les deux repas principaux.

DIABÈTE GRAVE: 4 à 5 ampoules par jour, en deux fois, ou 5 cc. de solution BYLA.

COMA DIABÉTIQUE: 2 à 4 ampoules à la fois ou 1,5 cc. à 3 cc. de solution BYLA toutes les trois heures.



MODE D'EMPLOI DES AMPOULES:

1° Couper à 1 cm. au-dessus de l'étranglement, la pointe de l'ampoule contenant l'INSULINE BYLA;

2° Aspirer avec la seringue le contenu de l'ampoule de sérum;

3° Le vider aussitôt dans l'ampoule d'INSULINE BYLA;

4° Rouler cette dernière entre les mains étendues jusqu'à dissolution complète, et aspirer le liquide obtenu.



MODE D'EMPLOI DE LA SOLUTION BYLA:

Nettoyer le capuchon de caoutchouc avec un peu d'alcool et aspirer la quantité voulue de liquide dans la seringue, en traversant le caoutchouc avec l'aiguille. Faire une injection intra-musculaire dans la région fessière.

POMMADE A L'INSULINE BYLA: s'emploie en applications sur la plaie que l'on recouvrira d'un simple pansement aseptique. En tube de 20 grammes de pommade contenant 0 gr. 40 d'Insuline Byla, soit 400 unités cliniques.

POUDRE A L'INSULINE BYLA: pour usage externe; est contenue dans des ampoules de 0 gr. 03 d'Insuline Byla, soit 30 unités cliniques. — Couper l'ampoule au-dessus du petit tampon de coton placé dans la tige. Enlever ce tampon et saupoudrer la plaie avec la poudre. En boîte de 12 ampoules de 30 unités cliniques.

TRAITEMENT DU DIABÈTE
ET DE SES MANIFESTATIONS PAR
L'INSULINE BYLA

Autorisée par l'Académie de Médecine et adoptée dans les Hôpitaux

COMPOSITION : L'INSULINE BYLA est un extrait endopancréatique purifié, débarrassé des matières salines et protéiques de la glande.

Elle se présente sous **deux formes injectables :**

1° Une poudre **stérile** immédiatement soluble dans l'eau, enfermée dans des ampoules stériles. Chaque ampoule contient 0 gr.015 d'Insuline BYLA, soit 15 unités cliniques pour les ADULTES et 0 gr.005 soit 5 unités pour les ENFANTS; elle est accompagnée d'une ampoule de sérum physiologique dans laquelle on la fait dissoudre au moment de pratiquer l'injection.

2° Une solution **stérile** contenue dans un flacon de 6 cc. Chaque cc. de solution correspond à 20 unités cliniques



En boîtes de 12 et 6 ampoules de 15 unités cliniques. — Médication infantile: Boîtes de 12 ampoules de 5 unités cliniques

INDICATIONS:

Traitement du Diabète et de ses manifestations chez l'Adulte et l'Enfant

Traitement des plaies atones et des ulcères variqueux chez les diabétiques et les non diabétiques par la :

Pommade à l'INSULINE BYLA et Poudre à l'INSULINE BYLA
pour usage externe.

(Voir posologie et mode d'emploi page 30).

Pour toute documentation, demander la plaquette spéciale sur l'INSULINE BYLA.

AMINO-SEL BYLA

REMPLECE LE SEL

COMPOSITION : Ne renferme ni chlorures, ni bromures, ni iodures, ni phosphates, mais uniquement des corps chimiquement définis, extraits des féculents et des fruits : glutamates et tartrates alcalins.

INDICATIONS:

L'**Amino-Sel BYLA** est indiqué dans l'Albuminurie, les Affections circulatoires, hépatiques, néphrites aiguës, scarlatine, etc., etc.



En flacons-salières : La petite salière (pour une semaine).

La grande salière (pour trois semaines).

MODE D'EMPLOI

Saupoudrer les aliments avant de les consommer, au goût de chaque malade.

N.-B. — L'Amino-Sel Byla est d'origine essentiellement végétale et ne se vend que dans les pharmacies.

MUSCULOSINE BYLA

(VINGT ANS DE SUCCÈS)

COMPOSITION: La **Musculosine Byla** est le suc musculaire de la viande de bœuf crue, inaltérable et sucré, obtenu à froid, hyperactivé par les oxydases et la catalase oxyhémoglobinique.

Riche en
Vitamines
et
en Amino-
acides de
croissance



En flacons
de 500 cc.

En demi-
flacons de
250 cc.

INDICATIONS: *Neurasthénie, anémie, convalescence, tuberculose, etc. — Toutes misères physiologiques. Le plus puissant des reconstituants hémato-musculaires.*

MODE D'EMPLOI: 1 à 2 cuillerées à bouche un peu avant les repas, dans un peu d'eau, gazeuse de préférence.

Pour les diabétiques, prescrire: **MUSCULOSINE SANS SUCRE**

MÉDICATION ORCHITIQUE

NEUROTROPHOL BYLA

ELIXIR, GRANULÉ ET DRAGÉES

COMPOSITION : à base de glande interstitielle, de glycérophospharsinate disodique, de nucléinate de soude



DRAGEES :
boîte de 60
dragées.

ELIXIR :
flacon de 310 cc.

GRANULÉ :
boîte de 150 gr.

INDICATIONS : Rénovateur cytoplasmique, excitant de la nutrition, tonique nervin — Insuffisance génitale — chlorose, neurasthénie tuberculose, sénilité, etc.

MODE D'EMPLOI : **Elixir.** ADULTES : 1 verre à liqueur après chaque repas. ENFANTS : 1 cuillerée à dessert ou à café après chaque repas

Granulé. ADULTES : 3 doses par jour dans un peu d'eau (ou à croquer), matin, midi et soir. ENFANTS : 1 à 3 cuillerées à café, suivant l'âge

Dragées. ADULTES : 4 à 8 par jour. — ENFANTS : 2 à 4.

DES INFECTIONS INTESTINALES ET STOMACALES

PARALACTINE BYLA

COMPOSITION : La **Paralactine Byla** est constituée par une culture pure du gros bacille bulgare sélectionné.

Sous deux formes :

CULTURE PURE SUR LAIT

COMPRIMÉS SUR LACTOSE



En boîte de 4 flacons
de 60 cc.

En flacon de
60 comprimés.

INDICATIONS: 1° Dans toutes les entérites aiguës et chroniques des enfants et des adultes;

2° Dans tous les phénomènes consécutifs à l'auto-intoxication d'origine intestinale, c'est-à-dire : eczéma, urticaire, acné, herpès et en général, toutes les affections de la peau;

3° Chaque fois qu'on veut faire de la bonne hygiène, et dans ce cas, quinze jours d'administration du ferment lactique par mois suffisent amplement pour entretenir dans l'intestin une flore normale

MODE D'EMPLOI: Comprimés : 1 ou 2 comprimés dissous dans un peu d'eau sucrée, froide ou tiède, trois fois par jour.

Culture sur lait : 4 cuillerées à café par jour délayées dans un peu d'eau lactosée (ces doses peuvent être augmentées).

MÉDICATION ANTI-ANAPHYLACTIQUE

PHYLACTONE BYLA

EN CACHETS ET EN GRANULÉ

COMPOSITION: Peptone spéciale à polyvalence protéinique et riche en polypeptides.

INDICATIONS:

Médication anti-anaphylactique par excellence.

Migraines, céphalées, urticaires et tous états morbides d'origine anaphylactique.



GRANULÉ:
Flacon de 100 gr.

CACHETS:
Flacon de 30 cachets.

MODE D'EMPLOI:

CACHETS: dosés à 0 gr.40 de Peptone spéciale; 2 à 3 cachets, par jour, trois quarts d'heure à une heure avant les repas.

GRANULÉ (particulièrement apprécié des enfants): une mesure correspond à 0 gr. 40 de Peptone spéciale; 2 à 3 mesures par jour délayées dans une petite quantité d'eau, trois quarts d'heure à une heure avant chaque repas. Pour les enfants, employer la moitié de la dose.

MÉDICATION HYPOPHYSAIRE

PITULOBINE BYLA

(EN AMPOULES)

COMPOSITION: Extrait épuré de lobes postérieurs d'hypophyses titré physiologiquement sur utérus de cobaye. Une ampoule de 1 cc. correspond à :

Extrait sec de lobes postérieurs (Pitulobine étalonée). 0 gr. 05
ou à

Glande fraîche lobe postérieur 0 gr. 25



En boîtes de 4 ampoules de 1 cc.

INDICATIONS: Obstétrique: Inertie utérine, Hémorragie de la délivrance. — **Gynécologie:** Salpingites chroniques, métrites, etc. — Hémoptysies des tuberculeux. — Défaillances du myocarde.

MODE D'EMPLOI: La Pitulobine BYLA s'administre en cachets sous forme de poudre d'extrait sec (voir formulaire page 14), mais plus fréquemment en injections hypodermiques ou intra-musculaires, ou en injections intra-veineuses, diluée dans du sérum physiologique. Dose moyenne: 1/2 cc. On peut aller jusqu'à 2 cc. dans la journée suivant les résultats obtenus et l'état du malade.

SIROP d'HÉMOGLOBINE BYLA

COMPOSITION : Le Sirop d'Hémoglobine BYLA est préparé à l'oxy-hémoglobine naissante cristallisée.



❧ ❧
*Pas d'intolérance,
 ni constipation.
 Gout agréable
 Ne s'altère pas.*

❧ ❧
*Le plus puissant
 et le plus assimi-
 lable des ferru-
 gineux naturels.*

INDICATIONS : *Déchéances organiques, anémies diverses, tuberculose, scrofule, grossesse et tous états dépressifs.*

MODE
 D'EMPLOI

Adultes : 2 à 3 cuillerées à bouche par jour.
 Adolescents : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.
 Enfants : 2 à 3 cuillerées à café par jour.


MÉDICATION THYROÏDIENNE

THYRATOXINE BYLA

(THYROÏDINE DÉLIPOÏDÉE)



COMPOSITION : Extrait thyroïdien du mouton privé de ses toxo-lipoïdes et de ses toxamines cardiotropes, d'activité constante, grâce à son titre uniforme en iode physiologique.



En flacon de
80 comprimés
contenant cha-
cun 0 gr. 030
de substance
active
et 0 milligr. 15
Iode thy-
roxinien.

INDICATIONS : Toutes celles de la thyroïdine, mais

SANS SES INCONVÉNIENTS

Myxoedème, sclérodémie, infantilisme, obésité, etc.

MODE D'EMPLOI :

Adultes : 1 à 4 comprimés et plus par jour.

Enfants : 1/2 à 4 comprimés par jour.

QUELQUES AUTRES SPÉCIALITES BYLA



ADRÉNALINE BYLA. Naturelle, chimiquement pure, bi-cristallisée. *Maladie d'Addison, Défaillances cardiaques, Hémoptysies.* — En flacons spécialisés de 5, 15 et 30 grammes ou en ampoules de 1 cc. de solution au 1/1000°. — 1 cc. à 4 cc. en 24 heures, suivant les cas.



ADRÉNOPITUINE. (Ampoules). Association d'Adrénaline et de Pituitobine Byla, titrées physiologiquement. — En boîtes de 6 ampoules.

Traitement de l'Asthme essentiel.



GALACTOGÈNE BYLA. A base de placentine et de galega. *Agalactie et Hypogalactie.*

3 à 4 mesures par jour, délayées dans un peu d'eau ou de lait sucré



LIPOCHOL BYLA. A base de cholestérine pure. Toutes les indications de l'huile de foie morue.

Émulsion : 2 à 4 cuillerées à bouche par jour pour les adultes; 3 à 4 cuillerées à dessert par jour pour les enfants.

Pilules : 6 pilules par jour pour les adultes; 2 à 4 pour les enfants.

Granulé : 4 cuillerées à bouche par jour pour les adultes; 3 cuillerées à dessert par jour pour les enfants.

Ampoules : (huile spéciale cholestérinée à 5 %). En boîtes de 12 ampoules. — Suivant indications.

Anémie simple ou prononcée, diabète, scrofule, tuberculose, états consomptifs ou cachectiques.



PEPTONE BYLA. Du Codex, entièrement désodorisée, d'un goût très agréable, soluble dans tous les liquides.

Alimentation normale, maladies de l'estomac et de l'intestin, anémies, cachexies, etc.

4 cuillerées à bouche par jour.



VITAMINES BYLA. Granulé sucré, de goût très agréable, constituant une friandise et contenant, à l'état sec, les différents facteurs de croissance. Employées avec succès dans : alimentation des nourrissons, troubles du développement de la croissance, de la puberté, convalescences et toutes carences aiguës et chroniques.

3 cuillerées à dessert par jour.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages
Cachets « OPO » Byla	4
Glandes (comprimés) Byla	5
Exolysés Byla (sucs inaltérables)	6
Ampoules Injectables Byla	7
Médication Panglandulaire	8
Énergétènes Byla (sucs végétaux)	10
Formulaire Opothérapique Byla	12 à 21
Formulaire Polyopothérapique Byla	22 à 29
INSULINE BYLA	30, 31
Amino-Sel Byla	32
Musculosine Byla	33
Neurotrophol Byla	34
Paralactine Byla	35
Phylactone Byla	36
Pituilobine Byla	37
Sirop d'Hémoglobine Byla	38
Thyratoxine Byla	39
Spécialités médicales Byla	40



Imp G. Desgrandchamps
Paris, 23, Rue Boissonade



