

Bibliothèque numérique

medic@

**Sanchès Ribeiro, Antonio. - Versurae
physicae [morbosae], chemicae,
physiologicae et historiae naturalis,
anatomiae, 20/12 1736**

1736.

Cote : Ms 43



(c) Bibliothèque interuniversitaire de médecine (Paris)
Adresse permanente : <http://www.bium.univ-paris5.fr/hist/med/medica/cote?ms00043a>

HP 2729

M^s n^o 43
(anc. n^o 13)

3 III



MS n° 43
anc. n° 13

numération à l'encre
rouge initiale

(26)

Versurae ~~Physicae~~ chemicae, Physiologicae, & ~~Historiae~~ Naturalis. Anatomiae
Morbosae 17²⁰/₁₂ 36 Index appensa indicabit Contenta
Historiarum anatomicarum morbosarum. potissimum
17²/₆ 42.

A.A. ex quibus collegi.

Regia Scientiarum Academiae Historia
Per Joan. Baptista DuRoi. Parisiis 1698. 4°
Philosophical Transactions
Hales Statick & Hemasticks.
Brisseau. six observations a la fin du ii tom de
l'Anatomie chirurgicale de Dalfin. de l'edi-
tion de Paris 1734. 8° 2. vol.
Ind. Ruysch. observations Anatomiques & chirurgi-
cales au nombre de cent. trad. par D. M. Paris
1734. a la fin de l'Anatomie chirurgicale de Dalfin.
fin. 2. vol. 8. Paris.
Tomae Bartholini Acta Medica & Physi-
cendia an. 1671. & 1672. Haefniae
1673.
Musei Imperialis Petropolitani. vol. 1. Pars 1. qua continentur
Res naturales ex Regno Animalis. Typis Academiae Petropoli.
1741. 8° / continet praeparata Ruyschiana.
Nicolaus Tulpus observ. Medicae. Amstelod. 1672. Elsevir.
Histoire de l'Academie Royale des Sciences
depuis 1666 & suivantes 4° Paris.
Bonetus Sepulchretum Anatomicum in tres tom.
Genevæ 1700. fol.
& Multorum, quos hoc opere leges

Collection
des Remedy, copie du 3^m volume des Oeuvres de
M^r Boyle, abrégé par M^r Peter Shaw. 3 vol. 4°
London



Fermentatio

25

Ms. n. 43 (anc. n. 13)

Index fidei fousas
Memoratis

Na

Physica chemica Historia

Natural. Anatomia

17²⁰/₁₂ 36. P. Deleury

Ad versum. tom. 1.

Index Anatomiae Morbosae

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

X

Z

avoir pressé & jeté le jus font non seulement du pain, mais aussi
 le pain ils tirent tout le jus de la racine, ensuite ils le bavent & la
 le grand torteaux, qu'ils cuisent au four, & c'est qu'ils appellent caf
 breu, ils prennent ces torteaux secs, & les détrempent dans l'eau
 le ingent apropos: Cette pâte cuite ainsi avec l'eau devient
 tion qu'elle enivre comme fait notre vin. Relation de la Rivière
 voyage 1639



Arteriae — 14.

Arteria aorta — 16.

Aspera arteria. 20.

Arteria Pulmon. 15.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R


S

T

V

X

Z



Cineres loco Salis Comm.

fol. 2.

Cerebrum: nati sine cerebro

8:19:83.

Calculus humanus --

9

~~Cerebrum~~ 19:

Cartilagineus 20:

Caro: 20:

Cutis: 21

Cory: 22

Cranium: 69:

Cerebellum: 23

Caput: 24

Conceptus foetus prae-
naturam. vide

Uterus

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

X

Z

Diaphragma: 25

Dura Mater: 26

Dentes: 66

Ductus Thoracicus: p. 74

D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Z

Epidermis: 27

Epi ploon: 28:

Epiglotidij vliay. 82.

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

S

T

V

X

Z

©BIM
Fermentatio ————— fol. 1
Frigus comprimit, & tñ aquam
dilat. — — — — — 3.

Foetus in abdomine in
ventu intra uterum pag. 89

F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Z

Gravitas, mineralia igne gressu 4
viora evadunt 3

Generatio fructuum 7

Glandulae: 29

Generatio: 7.6:

Glanglion: 79.

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

X

Z

Hepar. 30

Harmattan. vide —

pag. 35

Ventric. Lenticul.

H

I

L

M

N

O

P

Q

S

T

V

X

Z

Intestina . 31

Intestinum duodenum . 31:

— Ileum . 32:

— Colon . 33:

— Rectum . 68 -

— Cecum . it

Irritabile partes
Corporis . Vid. MS.
de Mby Melancholij .

I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Z

Lympatica vasa 34:

Lien: 34:

Linguae cancer. pag 88

L

M

N

O

P

R

S

T

V

X

Z

Membranae: 35

Musculi: 36:

Mesenterium: 37:

Mammæ: 38

Mediastinum: 39:

Medulla oblongata: 41.

Membrana Vithora: 35.

Membrana cellulosa pag. 35

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

X

Z

Nervi :42.
Nares 64

43

N
O
P
Q
R
S
T
U
X
Z

14
Olla: 43:
Ovaria: vñ. Uterus.
Oesophagus: 44:

Oculi: 45

Omentum: 28:
vñ. Epiploon

O
P
Q
R
S
T
U
X
Z

18
Pinguedo: 46:

Peritonaeum: 47:

Pancreas: 48:

Pleura: 49:

Pericardium: 50

Pulmo: 51.

Pia mater: 52

Pylorus: 57:

Periosteum: 71:

P

R

S

T

V

X

Z

Ros — — — — —
Renes: 53
Succenturiati: 53.
Respiratio Lasa. vid. p. 83

R
S
T
U
X
Z

Salp. mar. _____
Spinalis medulla.: 54:
Sinu. maxillaris. 55:
frontalis. 72
Sutur. deleta. p. 86.

6

18

S
T
U
X
Z

Testes: 56:
Tubae Fallopianae: 75
Thymus: 78

48

T
U
X
Z

19
Vegetantia — fol 10

Venae — 16:

vena cava — 16

— portar. 17

— lactase. 77.

Ventriculus: 57.

Vesica urinaria: 67.

Vesica felleis: 58.

Ureteres: 59.

Urethra: 60

Vesiculae Seminales: 60.

Uterus: 61

... ovaria: 62

... tubae Fallopii. 63.

— vagina — 61.

Valvulae cordis: 65

Umbilicus. p. 81:

Vertus Septilens Afric. pag 35

V
X
Z

20


272

22

lui
e le
+ de
du b
ils le
ntat
lon v

lui
e l
t de
lu t
ls le
ntat
on v





Fermentatio

26

§ Les Américains de la racine Yuca après lui avoir pressé & jeté le jus font non seulement du pain, mais aussi
 Un liqueur comme le vin: Pour faire le pain ils tirent tout le jus de la racine, ensuite ils la bavent & la
 réduisent en poudre: de cette farine ils font de grands torteaux, qu'ils cuisent au four, & c'est qu'ils appellent caf
sava: Quand ils veulent faire du breuvage ils prennent ces torteaux secs, & les détrempent dans l'eau
 qu'ils font bouillir a petit feu, tant qu'ils le jugent apropos: Cette pâte cuite ainsi avec l'eau devient
 une boisson si violente par la fermentation qu'elle enivre comme fait notre vin. Relation de la Rivière
 des Amazones par le P. Acuña dans son voyage 1639

Cineres loco salis communis in vicu

27 (2)

Les Indiens du côté de la rivière des Amazones accoutument de se servir pour saler de Cendres faites d'une certaine
 Sorte de poilme. Acuña dans la relation qu'on a.

Frigus


183

Duttomel R. S. A. Hist. anno 1667. fol. 12. ait

§ Illud enim palam est omnia pene corpora frigore contrahi, ut caloris vi dilatantur. Sed Aquam solam frigus
 = distendit: hinc glacies aquae innatat, quod pro mole sua sit levior: Contra oleum frigore concretum fit gravius
 = & in liquidum oleum descendit: Vini Spiritus in thermometro multum contrahitur: sed aqua congelata distendit tubos
 = & vasa quibus coarctetur. D. Hugenius 1686-67 cum sevirer hyems acerrima tubum ferri sclopeti in duas
 = partes secari atque unius extremum ferruminari iussit: tubi aqua repleti alterum extremum cochlea ope vi
 = adacta oclusit, ac ne aëri ullus pateret aditus, liquefactum plumbum superfudit ad fenestram sui cubuli gelido
 = aëri tubum noctu exposuit, qui circa horam septimam matutinam crepuit magno cum strepitu, ac factus est in ea
 = parte, quae minus firma erat, & crassa. Tunc quatuor in longitudinem pollicum vicia est, per quam glacies variis bullis
 = hi in sui medio distincta erupit. § Experimentum in parte altera tubi iteravit, qui eodem fere modo dirup-
 = tus est.

§ Utrum aquae particulae, dum frigoris vi riget fiant immobiles, nec tam apte aliis aliis incumbant, quam ubi mo-
 = tu ingenito cidentur, tum enim facilius fluctuantur, ac pressioni aeris, aut aliarum aquae partium cedunt?
 = An potius aër poris aquae conclusus in varias bullulas distenditur, quales in glaciem per rimam sclopeti exeunte
 = vicia sunt, quod accircumfuso aëre minus premantur? alius excutendum relinquimus. quamquam illud ipsum
 = diiudicari potest experimentis quae D. Hornberg anno 1692 in sua macchina Pneumatica nobis coram exhibuit....
 { Causam puto esse quod in aqua aër est: & quando aqua congelatur comprimuntur aëris globuli, qui Coniuncti
 = iam superant resistentiam atmosphaerae, & tunc diffingit vasa primo, postea aqua exit, tanta, quanti adhuc sunt aë-
 = ris globuli in ea inclusi.

Brasiliae noctibus aëris frigoris intensius; hibernis, quod mireris, mitius praesentitur. Pilo Cap. 1. lib. 1.



Gravitas

29 (4)

Du Hamel. anno 1667. p. 13

Vulgo persuasum est corporibus maius pondus non accedere, nisi sensibili aliusque materia fiat accessio.
 § Du Clos. libram unam reguli antimonii in marmore triti, in tenuissimam pulverem contriti vase fictili
 & plumbato impositam radiis Solaribus exposuit, atque ope speculi vitorii hanc materiam incendit, adeo ut
 fumus albicans, & densior erumperet: pulvis in cinerem redactus post horam integram $\frac{1}{10}$ pristini ponderis
 parte auctus est: pulvis quo tenuior citius inflamabatur, & ponderosior ferebat gravior apparebat.
 § Regulus antimon. cochleari ferreo impositus $\frac{1}{8}$ sui parte factus est gravior.
 § Limatura cupri rubri unciarum 8 limaturae ferri 4 unc. tantundem auri pigmenti crucibulo im-
 ponit. tartari in pulv. redacti 3ii superfudit alio crucibulo, & inverso prius operuit per octo horas in
 furnulo, quem cementationis vocant, aucto per gradus igne tantum die crassius nigrum &
 calcinatum apparuit; eo sublato haec mineralia quatuor uncias graviora reperta sunt, adeo ut
 auri pigmentum, quod ignis calore minui solet, tartari ope fixum evaserit, & per $\frac{3}{4}$ hore igni
 admixtum $\frac{1}{5}$ fere sui ponderis parte increvit.
 Causa est fonsij particulae, quae intra mineralia se recondunt: etiam aeris particulae.

Ros *

30 5

Brasilia ros pinguior & corrosivo sale multo imbutior, quam Europa, quia ferrum. Reliqua rōdit metalla præter
alias minus solidæ materiæ. Euo. p3

Salsedo maris

31^c

Brasilia mare Salsit est quam sorptionem ventu. p. 3 Piro

Generatio fructuum

32 7

Brasilia fructus Guajacorum, seu Guajacorum arborum semel per biennium.
fructus arboris Ibaree, sive Guaiaci Brasiliensis vix per quadrimum produuntur } p. 5. Perso

Generatio

1742

Per auram
Seminalern

Albinus Professor Anat. Leyde contra veteris esse generationis efficientis, inveni-
tus; & tantum pro aura seminali contendit.

= L'occasion d'abjurer lui a été donnée par une certaine petite bête aquatique qu'il
il a mis dans l'eau, & en la regardant en voilà une autre qui sort d'elle; il va
transporter cette nouvelle, dans une autre vers d'eau, il la regarde un peu après elle de
vienne aussi grande que sa mère, & peu après cette bête va à coucher, il transporte en-
core cette dernièrement produite, & elle va faire la même chose, & comme ça il a
vu la propagation plus de 100 fois: Mons. Albinus apersent ou il peut contre carrier
& harceler Ruysch le fait: Boerhaave de son tems, (comme vous savez) a été fort
pour l'infallibilité de Ruysch. Sic tempora mutantur & nos & // partie d'une lettre de
M^r Ens disciple d'Albinus datée à 5 Juin 1742 à Mons^r. le D^r Londoni, qui me l'a com-
muniqué.) on ne conçoit pas comme de cette observation on peut conclure ce qu'on avance: mais j'ai
trouvé apropos de la copier pour donner à son tems l'esprit à cette explication.

Cerebrum

vide pag. 19

33 8

Philos. Transact. abr. tom. 3.º p. 24. n.º Transact. 226

Natus fuit infans unus sine Cerebro: huius loco erat aqua rubra sanguis ve dilutus timica, tanquam P. vel Dura Mater investitur: Medulla Spinalis erat, sine qua vivere animalia non possunt: ibi narratur D. DuVerney cerebrum Columbi abscidisse, & lino crudo implevisse & per parvum tempus vixisse adhuc: ita D. chirac canibus Cerebrum & cerebellum detrahebat, folliculis aer pulmone servabatur vivebant aliquandiu haec animalia at sine Spinali medulla vivere nequit ob rationes ibi allegatas.

Ex Memores Academ. Roy. Cher. Par. tom. 1.º p. 227.

fungus
cancer

Juvenis puella dolore capitis vehementissimo per VI annos tortis, post varia ex arte medicis remedia ad ministrata ad arteriotomiam divertum est, sed frustra: ad trepanum deinde: neque ultra vasa illius inventus humor, neque dura mater laesa. hoc post aliquot dies facta, sed frustra omnia nova edo immaniter cruciabat. 8. post trepanum mors.

Cadavere tres fungi magnitudine pili ortum in corticali substantia cerebri ortum ducentis dura matri adherentibus, quae hic loci valde crassa erat: Contra cranium, quod valde tenue erat & charta crassitie aequale: eo in loco ubi fungi respondebant. Ventriculi superiores aqua pleni: tertius sanguine atro plenus: Inplexae Choroidae glandularum forma semini genyae emulantes apparebant vltus in superficie cerebelli, quod ad profunditatem trium linearum se extendebat in cerebello ipso.

Abusus
varii.

Ibid. pag. 320 & seq. Historiae referuntur abcessuum multorum cerebri, Graeciae, cancerorum, quae mala per dolores assiduos acres, paralyses lateris oppositi, febres, convulsiones manifestantur: ibi per experimenta demonstratur posse cerebrum scindi aperiri, secari, postquam trepano cranium, & meningis sectae & apertae fuerint.

Observatio canceri cerebri post mortem inventi pag. 324

Observatio gangraenae ————— pag. 325

maxima cerebri portio deperdita quam vix fuerit vixit agrotus, quamvis paralitici & aliquando epilepsia tentatus: sed mente constabat pag. 325 & seq.

Neuralgia

Ex observations Anatomiques de cadaveres. Par Pierre Barriere. Perpignan. 1751. 4.º

moeror.

Ob. 1. Miles factus hebet melancholicus, ex lecto cadens in seipsum: observ. 11. alter neotat

vide pag.

In cadaveribus utriusque, vasa cerebri turgida nigra: in 1.º 3.º ventriculus aqua plenus, glandula pituitaria turgida inflata: in 2.º in sinu longitudinali polypus: in utroque, poly-

15. Sub

pi Cordis dextri: felix vesica dytenta felle bile spuma mustellini coloris. In alij observatione

arteria

IV pag. 13 ibid, aqua intra pericardium, & in pulmonum cavitate: product polypus: bily Congestionem

Capit

Unde moeror, dypendens animi, melancholia: product polypus: bily Congestionem

serum in cavitatibus cerebri, pectoris pericardii.

Ibid pag. 17.

Oberv. 1. Miles, qui ob imminens ad turrem poenam, damnatus, melancholicus delirus,

in cadavere inventum Cerebrum siccum: in ventriculo utroque Cordis polypus

Oberv. 2. pag. 19: ex angore & moerore ob denegatam demissionem, Miles febricitans, e-

macatus, moritur: Cadavere: invenitur Cerebrum siccum in nigrum vergens, turgida inflata: poly-

pus pinguedinem seu lardum emulans ventriculo dextro Cordis.

Ibid observ. 2. pag. 23.

Talpa in vena capitis apparet: aperto tumore pus exit: cranium carnosum invenitur: Subsequitur diarrhoea moritur: cadavere: pus intra cranium. Trepano opus erat:

Abcessus

Ibidem observ. 1. pag. 27. Miles annis doloribus capitis exulans per tres menses: in casum

remedia adhibita: pulsus parvus frequens: pallida facies: moritur: inveniuntur ventriculi cerebri

anteriores aqua pleni.

Unde in doloribus capitis facie pallida, pulsus parvus frequente aqua vel in ventriculis anterioribus

Cerebri, vel in tertio cum polypo sinuum lateralem, ut ostendit 11 observat ibid pag. 26

vide pag. 19. et Contra


Cephalaea

polypus
bily spiss
sa. multa

polypus
in utroque
polypus

aqua

& polypus
serum cerebri



Halley Haemorrhagica

§ Neque alcalina, neque acida, neque neutra Salia, Salina, Sulphurea, Saponacea ve mē-
trua Calculum dissolvunt: tantum Spiritus nitri, qui valde corroderet, est illud dissol-
vit: Sed si in vesicam introduceretur, illam corroderet, laceraretque

Menstrua

§ Sunt tamen Menstrua quae metalla & marmora dissolvere possunt, quamvis illa cor-
pori applicata minime illud corrodant.

Tartary

gr. 230

aër cubicus 16

pollic. 1

calcul. $\frac{3}{4}$ 17 pollic.

x = 645. plus.

= 49 gr. remansit

§ Tartary distillatus maximam aëris copiam reddit: quod in aliis Corporibus non
apparet, vel sunt mineralia, vel animalia, tanta copia

copia aëris in
calculo.

§ Calculus humanus pondere 230 gr. magnis. poll. $\frac{3}{4}$ stillatus dedit aëris 516
cubic. pollic.: residuum erat 49 gr.: ita ut aëris corpus esset maius illo calcu-
li 645 vice. Sed post aliquot dies illa aëris generati per distillat. elastic-
itas perdebatur

§ tartarum vini rhenani parum olei per distillat. dat: Semina & Solida vegetabili-
um partium maiorem copiam: Ita calculus renum & Vesicae paucum oleum
per distillat. & Calculus felleus maiorem

oleum in calculo

§ Parvus calculus felleus dissolvatur in lixivio Salis tartari per 7 dies: Nam tar-
tarus dissolvatur; Sed calculus vesicae minime

calculi fellei
dissolvens.

males erat $\frac{1}{3}$ pollic.

aër erat = 144

plus quam calculus

§ Calculus renum pondere 115 gr. cum pollice uno cubic. Sp. nitri dissolvatur in
tra tres h. magna spuma: aër generat erat 48 cubic. pollic. elasticitatem
servabat: Sed tartary dissolvatur ita; Sed aer elasticitatem non servabat.

Sp. nitri calc. &
dissolvens.

§ Est animalis tartarus, qui ita aliquoribus humanis separatus, sicut vulgaris tar-
tarum per fermentationem fit a vegetabilibus: ambo hi tartari, videlicet Calculus
& tartarus in his coherent: ambo Separantur per expansionem liquorum, & la-
teribus vasorum continentium coherent: fundum non præstunt, neque præcipitantur.
Primæ pars amborum tartarum lateribus vasorum affixa attrahunt particulas, quæ
in liquoribus sunt, sibi similes: hæ tartari pleniori corpore deponuntur ad latera
vasorum continentium, quando latera illa sunt semel incrustata.

Calculus est tartar-
us animalis: &
Tartary est vege-
tabilium.

§ Fluida quo magis sunt fermentata & tenuiora evadunt eo maiorem tartari copiam
emittunt; ita Fluida animalia quo magis ad putrefactionem accedunt eo
maiorem copiam tartari ad latera vasorum emittunt: Quo liquores sunt in vasis
continentibus quietiores, & maiorem copiam tartari emittunt: Sicut vinum quod nisi
quietum sit tartarum non emittit: ita Urina quo magis in renibus detinetur
eo magis Calculorum copia incrustantur, idem in vesica

§ Corpora, quæ maiorem aëris inclusi servant tartary est: unde maxima horum attrac-
tion est; quia per hanc attractionem Solida partes vegetantium & animalium fiunt.

Corollaria

Hinc Corpora quæ magis in putredinem vergunt eo magis ad calculum sunt af-
formandum sunt aptiora; 2. Quo maior quies est in his maior copia tarta-
ri animalis deponitur: hinc illi qui multum dormiunt, & sedent, ut infantes
eo magis ad calculum sunt proni. 3. Deinde quo magis incubitus est ho-
rizontalis magis ren vni comprimitur a ventre, & depressior est: ideo Urina
non fluit ex rene illo: ibi sistitur postea quæ in vesica iterum & calculum
deponit: ergo decubitus Capite & nimis Corpore elato melior est

Experiment. p. 213

Cepæ, cochlearia, Raphanus Rusticanus Singula contusa & olla separata
inclusa: in medio cujuslibet Massa inclusus fuit calculus durus: Singula
premebantur, & loco tepido per tredecim dies reposita fuerant: Explorata
tandem

tandem calculi, qui sepulti fuerant in raphano rusticano & cochlearia nullum detrimen-
tum passi fuerant; tantum ille qui in cepis inclusus fuit, ^{ita} molli evadit ut ungue ab
radiis posuerit: idem accideret si calculus in succo cepe aqua diluto macerabatur in
calore prope Caminam per 15 dies

Corollaria

Hinc illi qui utuntur cepis in cibo si prorsus calculus non dissolvatur saltem non
increscet. 2. Diuretica calculum non minuire, sed urinam expellendo & conten-
ta utique adcreioni calculi impedire: Hinc omnia quae alcalescentia sunt humo-
rum impediunt, & acrimoniam obtundunt non solum calculum generari impe-
diunt, sed etiam factum minuunt: Hinc cerealia, herbae, mucilagines
prosumt: hinc famina, & illi qui fibra laxa sunt calculo formando apti
non sunt: Hinc panis tostus carnes ~~ad~~ tota morbum augent.

Experim.

Calculi in aqua egida macerati per longum tempus mucosa crusta erant
inducti. Si vero calculi in aqua pura cum vina mista macera-
bantur tunc non dissolvebantur, neque mucosa ~~aper~~ tegebantur

Corollaria

Hinc quo aqua puriores eo meliores & minus calculo generando aptae sunt.
Hinc urina quo magis retinetur eo magis ad calculi generationem & in-
durationem conducit.

Vegetantia

Hac Drake Man Marat Jun
Ches collecta fuisse, dum Petro
poli fuit anno 1237.

(39) 10

Boerh. Chem. p. 57. prom. ptij.

Est vegetans corpus Hydraulicum, ex variis vasis, variisque humoribus constans, quod parte quadam sua externa alteri corpori adhaeret, cuius ope haurit planta materiam Nutrimenti, & incrementi sui.

De Planta
in genere

Si recte attendis ad varietatem formarum partium vegetantium, ad huiusmodi Contestationem diversam incedem, ad Solida & Fluida, jam habes. Differentiam inter haec & fossilia. quoniam inter Animalia, si Contingat Radicem, quod pabulum in se trahit ex, cui committitur, Terra. fossilia N.B. immixto vocantur corpora Hydraulica.

Principia Vegetantium sunt Terra & oleum tenax, quod vix dissociandum nisi aperto igne, hoc oleo coniungitur, & adunatur Terra & fit planta.

Sola Radix trahit in se nutrimentum ex terra. excipe tubera, & Callos Terrae, quorum superficies huic officio inservit. osculi bibulis in omni superficie scaturit radix, per quae humor pabuli hauritur & sic per omnem plantae molem deducitur. haec ce oscula sunt tanquam vasa lactea, quae Chylum in se absorbent. cum Vegetantia sunt inter aquam, aerem, & terram, quae Elementa in se recondunt Aquam, spiritum, oleum, Sal, necessarium erit ut igne artificiali & Calore agitentur, permisceantur, & denique Radicibus plantarum applicentur. Humores plantarum in duos distinguuntur scilicet in humores Crudos, & humores coctos. humores enim Crudi sunt illi qui nondum per vim plantae subacti fuerunt, sed postquam Terra Caeli quae ignis vicissitudo Calidi, frigidi, humidus, & siccus eos agitant, promoverunt quae, tunc cocti evadunt. Scindatur Caulis ficus, Vitis & emanabit liquor tenuis, acidulus, ferit humor Crudus. in racemis Uvarum prodest certo humor Coctus.

Radix.

Qui in foliis humores sunt, aeri, nudi exponuntur; hinc per superficiem valde auctam, maxime per permittuntur, atque in naturam plantae propriam excoquendo, perficiuntur, verba sunt folia tanquam pulmones qui pro reliquo corpore laborant. Supra haec folia noctibus optivis exsudat liquor, qui varia nomina accipit pro varietate plantae; tunc supervenienti frigore, possunt densati colligi, ut fit cum Manna, Cera &c.

Folia?

Humores qui in foliis fuerunt parati, adhuc in florum Calice, petalo, Stamine, & apice ulterius perficiuntur, flores enim verum plantae Characterem imprimunt, atque Novae Embioni gignendo Conservando, aptant parant quae. Nunc inest ille fragrantissimus odor spiritus perficiens, qui forte est genitali odoramento Embioni lucem visus, gratius odor. ad Cotylas & apices, Stamina mel unde quaque exsudat, ad favos formandos, utuntur apes.

Flores.

In Semine continetur planta Embryo 3: placenta uterina, vel coty. pedone, quod idem est, simplici, duplici, vel multiplici, cui fune umbilicali Embryo connectitur. haec placenta Balsamo scaturit, quod nihil aliud est quam oleum plantae elaboratissimum. est tenax humida arctet, embryonem defendit, & verbo est hoc oleum illud Alchemistarum sp. Rector, Sulphuris Nicola, Archæus &c. N.B. Non est hoc oleum fragile stirpium fibras defendens, nam datur aliud genus in plantis, quod in Balsamum Resinam quae, per Caloris vim, moram quae temporis facile permittitur.

Semen.

Cortex plantarum haeret oleum laevif, simile membranae cellulo-
sa animalium. defendit totum plantae corpus ne aqua debilitatur
geluere. hocce oleo adest fere semper spiritus acidus, qui per
stodini resistit. Cinamomum, Sassafras reconduunt Cortex duo ole-
um pingue. ex cortice ars chemica varia educit, nam hyber-
na tempestate multum olei continet: e contra diebus aestivis aqua
sal, sapis in plantam ipsam transeunt. quando oleum hoc
colligitur liquidum est, si Calorem solis subivit tunc Balsamum.
vrem evadit. si Calore interiore tractatur hoc balsamum
tunc Semirapinolum exit. Si magis, ac magis augetur Cal-
or tunc illud oleum Naturam Resinae induit, quae spiritu
acido magis orbatu est, in igne deflagrans, oleo misceatur diffu-
siturque, in aqua dilui solet. frigida nullam tenacitatem
oleosam habet, friabilis fit. haec resina si excoquitur adhuc
Colophonia fit, & evadit, in hac deprehenditur aliq. res.
Cui, quod Gummi vocant, & est tenax, lentum, liquescens
& deflagrans ad ignem, aqua dissolvendum. + Gummi Resina
Confunditur aliquoties, ut videtur in Aloe Myrrha, & Galbano,
Ipsa plurimis aliis, quae Resinam & Gummi una inter se con-
ducunt.

Cortex.

Balsamum.

Semirapinolum.

Resina.

Colophonia.

Gummi.

Gummi Resina.

+ Gummi Resina una
Confunditur praecipue
in plantis Umbelliferis,
Cicetis.

Humores, qui in plantis Circulant faciunt sunt tanquam sanguis
in Corpore humano; inveniuntur enim omni puncto plantae ut in
Chelidonio, Vithymalo. liquores quoque habent pl. singulares, fit
in illis idem quod fit in animali Corpore. in Calyx petalo-
rum floris Alois mellitus invenitur liquor, dum amarefcit
succus & alij partibus, in Radice, flore, fructu, semine, folijs,
Cortice, ligno, aliis invenitur humorum generis. propterea
differunt adhuc liquores plantarum, tenacitate sua, blanditie,
Herbaria, medicatis vivibus, Venerosis, Nutrientibus.
N.B. haec differentia humorum potest inveniri in una tota planta.

Succus proprius.

Illae, quae producit Chemia de plantis sunt: 1. spiritus Rector,
nihil saponacei, salini, gummatosi in se habet. intricatus est
oleo. Antiqui dilebant, quod omnis odor ex spiritu Rectore
proveniret. Canis Cognoscit Herum quia distinguit spiritum
Rectorem ab alijs, & invenit illum suo Hero proprio.
2. Sal acidus. 3. Sal neuter. 4. Sal alcalinus fixus, vel vo-
labilis. 5. Oleum & saponis mixtum, ac sapis est. 6. Oleum
tenacissime terra cohaerens difficile separandum 7. terra
denique sincera, quae est firma basis Omnium.

Productum
Plantarum.

Constant Vegetabilia ex solidis, aut fluidis partibus. soli-
da Vegetantium partes sunt vel vasa, vel Consistentes partes
Crassiores ex Vaporum concretionum adunatione Coalescentes.

Plantar. partes.

Planta vasis suis bibulis liquidiora absorbent. vasa haec
in tota superficie apparent, sed praecipue in Radicibus. Con-
tinguntur in frigore & siccitate, dilatantur, in aere humido
& calido, inque terra irrigua & tepente. ipsum aërem hau-
riunt specie laryngis, eumque in penitiora fabricata planta
deducunt.

Plant. vasat.
1.
Absorbentia

Sunt alia vasa plantis propria, quae moventia dicuntur. accipiunt enim liquores ex variis absorbentibus & per omnes p[ar]tes p[ar]tes movent; abiciuntque calorem & frigorem facit ut veteri elasticitas in f[er]ri ad liquores promovenda. plantae nullis valvulis in se habent, quoniam plantae inversa semper fere nutrimentum hauriat, quod impeditur.

2^o. sunt vasa moventia.

Alia adhuc apparent quae mutantia vocantur, haec sunt vasa quae liquores acceptos sic mutant ut singularem plantae naturam in mutant.

3^o. sunt vasa mutantia.

Demons[tr]antur alia, quae sunt continuatio praecedentium, liquorum singularem sece[m]entum vel mutantium magis magisque in proprium ingenium plantae, ut in Aloe ductus singularem abscessum reperiantur, qui liquorem vehunt quam distinctissimum ab omni alio humore illi alij vasis contentis, genitilique, in eadem Aloe talia sunt in tithymalo & Chelidonio.

4^o. sunt sece[m]entia vel mutantia.

Recensetur vasorum genus, quae receptacula nominantur, in quibus recipiuntur humores illi qui transierunt per quantum vasorum genus, dictus, in receptaculis h[ab]et, quiescent perficiunturque.

5^o. sunt Receptacula.

Pandem sunt canales excrementi, qui faciunt ut liquores elaborati sine extra fabricatum plantae corpus effundantur, quod fit aliquoties, fractis Cancellis, hinc gummi, resinae epissae quae ignorat.

6^o. sunt Excrementia.

Processus 1^{us}

Hic apponam omnia illa quae possunt adici ex processibus Chemicis Cl. Boech. Sicut incipiam. dico quod ex primo processu, qui fit Plasma, vixi dicitur ~~liquor~~, qui est pars plantae, & pars quoque vasis qui consistit suis propriis partibus. Et hic res, nihil aliud nisi partes liquidae plantarum, ceterarumque corporum adiacentium, colore dicitur praecedenti excocta, & in plantarum folijs concentrata, una cum latice exhalans ex vasculis plantae effusumque. in hoc liquore extracto videtur esse 3^o. quid; semina, vel alia corpuscula, quae tractu temporis formant algam quandam, alibi mucilaginem, quae liquorem deinde obfuscant turbantque.

Pro.

Ex dictis constat liquorem extractum, distillatum ve plantarum odore celeberrimum, gratissimumque, ope ignis ad gr. 85. constare ex duabus partibus nempe ex aqua, & spiritu Rectore. In hoc pendet sola vis medicata plantarum, nam ubi avolaverit, vapida aqua manet. Reficit enim & nervos m[en]te afficit praecipue Hypochondriac Hyptericas cum Hyacinthum sub se inspirant.

Hinc quoque dicitur quid sit illud, quod perit in aere aestivo in plantis. scilicet aqua haec, & sp. descriptus.

Inde etiam dicitur qualis sit natura liquidi, qui primus ascendit, inter destillandum. Vnde &

qualis sit peculiaris Materies quae odoris speciem donat, nonne Spiritus Rector solus, docemur? etiam scitur

Quidnam sint illa effluvia quae aestivo maxime tempore Vegetantibus in auras exhalant.

N.B. fere omnes plae
eliciunt spiritus dictos; sed
hæc inscripta gerunt hec
posteriori sententia magis ma
nifesta.

Abrotanum non opus est
Ageratum transcribere
Allium ea quæ in
Angelica parte 2.
Anethum p. 18. præ
Anisum tant. v. p. 18.
Aurantium v. II.

Non debemus itaque mirari si effecta stupenda audimus; ut
fit umbra Juglandis quæ alium sistit. halitus papaveris
somnum dat; & cortex Peruvianus solo halitu fertur, cu
vaut intermittere febrem. Cum quæ hæc ita sese
habeant, videtur plantarum mira effluvia debeant exhala
re & sic atmospheram implere; unde accidit quod in syl
varum multoties halitus venenosus procedat; ut accidit tri
tibus exemplis, in America.

Processus II.

Ab hoc secundo processu dicimus quid Infusum, De
coctum, Apocema ve sint. Infusum enim fit grad. Calor. Infusum.
211. in vase clauso per spatium dimidiatæ horæ, reti
net hoc modo magis facultatem plantæ, id est, spi
ritus illius rectior. Decoctum fit op. ejusdem Calor. Decoctum.
grad. ac Infusum; sed debet ebullire; si vas aper
tum magis tunc avolat aqua tenuissima, nisi fiat
in Olla Lapinea, vel Vase Chæmico subtilissimo, ubi
conservantur quamoptime hic vapor, vel sp. Rector.
Multæ sunt plantæ quæ decoctionem nequeunt subire.
nam statim inepta redduntur, & vis volatilis quæ sita
perditur op. ignis. præter Astringentia, Acida, Aroma
tica Viscosa, Demulcentia, emollientia frigefacientia Me
tricæ, saponacea, Viresca, non debent decoctionem
subire reliqua. hæc dicta Astringentia &c. habent suam
virtutem in re, quæ fixa magis, quam Calore 211. vel 212 gr.
separatur.

N.B. Vis peculiaris plantæ non semper se manifestat suo
jodore vel fragrantia, vel Calificante sapore, nam postea
plantæ inelle, quomvis seorsus vix officiat, ut in radice
Hellebori nigri, Cicuta Aquatica Gepneri, Sapo mariano, Decoct. Vires.

Si Decoctio fit in vesica sub appposito Maonico, atque
exhalans aqua remanenti Decocto redditur, tunc decoctum
vim plantæ præparatissimam retinet.

Vis Decoctorum Infusorum ve, postquam corpore
hominis introducta sunt, pendet ab aqua Calida, simul
ac a virtute admixta plantæ. hæc regula potest multa
alia deducere, ut in Mæa, aqua Calida tepida plus facit,
quam illa chinensis simplex, detrimenti.

Dicitur quoque ex eodem processu vascula nostra mini
ma non dissolvere Calidis humidis, ve. put postea quod Ro
maximus postquam ebullitionem repetitam subivit, folia
sua integra possidet. apparent sub finem, pilæ, apices
Verrucosæ, fibra tamen plantæ op. microscopio sunt
eadem; non destruantur quia ultionæ sunt terrestres
non saponacea, oleosa, Salina. eadem de corpore humano
intelligi. N. ad huc decoctionem plantarum vires aliquot
et immutæ. Anum bulliend. miscet. Anum diuretic. Vapens
ebullitione sola fit.

Anum. Anum.

Processus III.

Triplex est modus depurandi decocta, quae nempe, Colo, actu cum albumine. Sed prior solum chemico examini convenit. Colata enim infusa vel decocta & vase repando recepta, si exhalent ad spiritum mellis, tunc Mustum potest appellari; si ad dimidiam decoctum saporem naturalem referens, dicitur sine corruptione illibatum potens, Sappa vocatur. Defrutum quod idem est, adferendo. Gelatina q. guttulas demissas in laminam frigidam inter glaciem remanet. Si Mel dilutus tunc Sympus, si Spiritus Rob, vel Robor. extracta autem vocantur omnia haec parata; quae liquida, spissa, dura nominantur. Omnia haec possunt elici ex succis, propter herbam, fructuum, horarum imprimis, immo, & radicum succulentarum e.g. glycyrrhizae.

Mustum
Sappa.
Defrutum
Gelatina
Sympus
Rob
Extracta.

Si ex his dictis volumus habere decocta vel infusa secundum processum tunc. Diluenda aqua, haec sunt. Haec supra dicta Mustum &c. Diu servari queunt illibata, vel in annos. servant multum plantae, quatenus in portione volatile amiserint ex effectis, & extricis plantis nihil potest extrahi, ut propter quod succos non continent. Contra morbos putidos habent maxime Cole in hisce remedium quod si cum aqua diluitur minor effectus praestat.

Vires, usus.

Processus IV.

Ex hoc processu elicitur; plantae, postquam igni aperto expositae fuerint, oleum imprimis dare, & sub finem terram virginem, mercuri. Scitur hinc aquam ebullientem, ex plantis posse auferre omne salinum vel sit volatile vel fixum. oleum tamen ultimum, quod terram conjungit, connectit, nunquam.

Usus.

Item dicitur, quod decocta, Apodemata ve, solum de plantis sal, & oleum primum, & secundum auferant. nullomodo ultimum hoc.

Vires medicatae, nutritae, venenatae, habitare in illa plantae parte, quae decoctione aqua elici potest; dicimus. nullam singularem vim, oleum per se, vel terram in se continere. Patet quoque, quod si planta sit calore celesti exsiccata multum de suis viribus perdat.

Notandum est quod planta in genere deest sub analysis 3. oleorum species 1.° spuma oleosa. 2.° pinguis decocta. 3.° ultimum terram conglutinans solo igne aperto separandum. Sed adhuc, quod verisimile est, primum, & secundum oleum unicuique plantae singulare esse, verum ultimum omni plantae eodem; & per se patet; nam cum virtus medicata in 1.° & secundo consistat, oleum, debet esse quoque singulare liquidum vel oleum; aliter omnes plantae eodem Vires habuissent.

Plantar. oleor. spec.

Tandem discimus sal in ultimo stamine plantae solido fuisse quari. Eadem possunt intelligi & animalibus. Terra enim est sola Basis.

Processus V.

Colligitur ex hoc processu Rob, defrutum, extractum & processus tertii salus cineris donari, si igni aperto Cochleari ferreo committuntur.

Immo aquam bullientem, sal, & oleum plantarum solvere. Sal & oleum sunt planta mista in formam saponis, unde Naturus plantarum succus saponaceus existeret intelligitur.

Quinetiam dicimus Colorem extracti pendere solum ab oleo, quod in auris, vi ignis, postea avolat.

Animadvertendum est plantas volatili virtute praeditas oculos in lachrymas Actes, si igni Cochleari ferreo committuntur, vix restat de cineribus sal; nam valde volatilis est planta haec sunt Cera, Cochlearia, Sinapi Raph. Rusc. &c.

Processus VI.

Dicitur hoc processu, ubi planta recens comburitur, donari cineres salios. Salinum quod plantis inest, igne aperto, non creditur volatile, sed oleum tantum, quod ei adheret.

Oleum & salum naturaliter mista in plantis, aqua posse solvi, unita manere, sed igne separari.

Sapo Animalium tum, tum plantarum debet esse unitus, nam si oleum separatur seorsum, morbus utrisque fit Hipp: hoc observavit dicens: Mista salubria, separata noxia.

Processus VII.

Hinc scitur qualis sit differentia inter salum illum Proc. V. VI

& hunc Naturum plantarum, qualem ex Aceto & succo elicitur; ille fuit productus visola ignis, & differt in Colore, sapore, figura, omni

que effectu tam Physico quam Medico ab hoc secundo. ille steorum in planta non praestitit. sed Nova creatura, opus ignis, ut Helmontius exprimit, facta fuit.

varium salum, & diversum pro varietate plantae acquiruntur. Becabunga, Cichorium, ebulus

Endivia, fumaria, Gramen, Nasturbium aquaticum, dant

salum citro magis similem. + Ex plantis viscosis non acquiruntur sal nisi, opus fermentationis, dissolvatur ille lentor.

ex Oleosis, & Aromaticis vix potest impetrari hic sal.

Succus Acetosa si humoribus nostris inhibeat, penetrabilis est, & in vasa sal parva penetrat facillime, unde vi-

res suas exercere potest.

Processus VIII.

Sal Naturus qui post fermentationem oritur, est ille sal fructu-

um horum in hoc Processu rursus adhibentur huic operi. postquam

prae se ferre fermentant, & crinum in posterum dant. si vinum hoc

longa quiete manet, oriuntur corpuscula, quae ad omne solis

punctum transferuntur. Praecedenti vero processu sal oriebatur

in fundo Vasis Jethopis Vini, vel ut mature Chemici, quareis prope-

ram Tartarum. Acida, Austera & Asida dant plus huius lapidis quam Dulcia, Oleosa, Vina. Si non bene fermentant minus

Tartari huius dant. sed perfecte fermentationem subeunt

+ Curant hi succi me-
dicati, subnitrosi, vete-
res obstructions sol-
vendo, piceum lento-
rem atrabiliis funder-
e, Chronicos morbos
efficacissime sanando.

+ Lt suorum
 Corrigen. laborantibus
 putrido, acri bilioso.
 hinc acutis multum
 prodest. evadit op-
 timum aperient,
 amilla acedine,
 postquam se immis-
 cuit cum acri putri-
 do, nam tunc in
 materiam magis
 solubilem abit.

tunc multo magis Tartari exhibent. Vina rubra rubrum, candida ^{usus}
 album tartarum, creant. Non solvitur aqua, aceto, vino, requi-
 rit Calorem ebullientis aquae antequam solvatur. Sed ubi haec aqua
 frigescit statim in massam coit, quae proprie dicitur Cremor, vel
Crystallus Tartari. Cum crematur haec Crystallus generat plus aeris
 elastici, quam ullum Corpus notum. + plura De hoc ca. Sale invenies
 Brocchi 54 & 55.

Proceff. IX.

Arteriae

Arteriarum finis triplex: 1. desinunt in canales abstrictos, qui humores extra cutem externam, internamve exhalant. 2. desinunt in canales abstrictos, qui humores intra quoddam Cava Corporis exhalant, ut in ventriculis Cerebri, thecam medullarem Spinalis pleuram, pericardii, peritonaeum, tunicam vaginalem, Uterum &c.
3. in venas sanguineas continuatas.

Psychus de hy vidend.

Ex libris ad me dat. Schreider 17²⁸/₁₀ 42

Arteria Epatica

Tota quanta oriatur ex arteria mesenterica superiore ad minimum erat aequali arteriae Splenicae, quam Praceptor (innuit Magnum Boerhaave) scribit illam esse incredibilem ratione maiorem.

Carotidis.

Oculus Patholog. Halleri. Obi. IV pag. 13.
Sanguis suffocationibus obnoxius, pulvis veloci: tumor erat albus cuti concolor, aure maxillae inferiore inde clavicula terminatus, in eo durities quaedam &c. vide librum. Carotis apparuit aneurismatica tunicis crassius factis.

Aorta
descendens

(14)
39

Ex Ruyssch. obi. 38.
Aneurysma Arteria in aorta ad distantiam a corde trium pollicum ingens Aneurysma, in quo pul-
sus aderat, inventum fuit: ita pectoris cavitatem arcuaverat, ut costarum, & sterni
ossa ad maximam tenuitatem reduceret.
Ex Hist. Medic. Hoff. Ep. obi. iv.

Morbi
aortae

Morbi ou-
lorum

Arteriotomi- Virgo, cui dolor intensus in oculo sinistro obortus fuit, arteriotomiam paravit: Quis prius
a. missa arteria per longitudinem aperta: sanguis exit: & subebatur crepere lupi ma-
pis albumine ovis: & Pygaturis: hanc Consulunt in ophthalmia operationem Severinus
deeffuaci medicina: Graeb ut ~~Almsted~~ Phases. Haller. & Duret. de morbo intern.
Cap. 13. & in cataracta incipiente
Ac. Roy. Scienc. tom. 2. p. 6

Lapidinae
Concrec.

Inventa aorta circa valvulas Sigmoides crusta lapidosa obducta.

Ulcera
arteriae
aortae

Philos. Transact. n. 483. § XIX Haller A.
Arteria aorta tum ad cor tum in thorace, in abdomine denique, membrana interna undique
laesa, quasi scabendo in eminentes cristas liberae, fluctuantes, mutata, tamquam Ulcere ali-
quo consumpta esset: Itae squamae parvae ossae erant, alibi petrosae; & acervi tophe-
teorum granorum plerumque vasorum ex aorta oriundorum ostia obidebant; Membra-
na musculosa sana fuit, tum externa, ut utrumque omne in intima sederet &c.
Idem pag. 529. Demonstrant arteriarum tunicam partim ob repetitos cordis ictus in-
durari, partim inter ossificata spatia rumpi; Sic debilitari tunc aorta (in hoc cada-
vere sinu aorta erat maximus sed sine aneurismate) truncum & ad aneurismata redi-
ponum: Demonstrat in ipso sanguine obique terram veram calculorum circumvehi, ne-
in renalibus solum vii deponi, sed ibi haerere & deponi, congeri quae ubi rupta sunt
larga membranae vasorum, & attractio terrearum molecularum ad aspera super-
ficiu consequales maior est.

Syncope
& mors

Sanguis
Coagulans

Ibid. n. 492 p. 173. Simili fore historia ab Haller Communicata
Puella 14 an aegri capitis gravamine, vertigine, anxietate, moritur: invenitur arteria mag-
na & vena cava repletae sanguine coagulato, tanquam si gladius e vagina distringeretur.
Petri Salii Diversi de Syncope de Affectib. particularibus C. IV p. 216

15/ Arteriae Pulmo-
nales
Morti

Tuberculi calculosi

Hist. Acad. Scient. ann. 1707. p. 26.

Subito vir quidam moritur: dum in vivis difficilis respiratio, frequentes cordis pal-
pitationes, febris lenta, macies, pallor. Inventa arteria pulmonali interiori
sui facie tuberculi calculosi, qui parietes ejusdem penetrabant ad externam vasa: Cor solito grandius.
faciem: aqua praeterea in pectore exorta vasa.

Arteria subclavia.

Aneurysma

Barrere observationes de Cadaveribus. Peripneumonia. 1751. 4.^o

Homini tabaci, tabaci anidum suctor diffilima respiratione frequenter totius: aneurys-
ma in subclavia, & in aorte quatuor digitos infra curvaturam alterum inventum
fuit aneurysma.

Dum vivebat arthmaticus, facies pallida, tumida, labia plumbea: palpitatio
ad Cartilagineam xyphoideam: prope mortem inflati pedes.

Arteria Carpi

Dura nodosa facta

Barrere: Observationes ibidem. 53. observ. 1. & 2.^a

In Militibus duobus aliis quae multum, quibus impendebat supplicium, vel quibus denega-
batur demisso ab stipendij observavit flagax indytrius quae practiciis se cum pulum
horum tangeret, „ Comme si. C'etoit une petite corde remplie de noeuds, que
l'on touchat, ce qui me fappa: „ & pagina 61, ait „ je trouvoy un poult rabo-
teux avec des inegalites qui resistoient au tact Comme si. C'etoit une corde
ou. un petit baton scabreux, que l'on touchat: „ hi sine febre erant taciturni,
nunquam queruli, patientes; Cor suum edentes.
vide sub Cerebro. pag. 8.

mentis
afflictus

Venal

Venarum initium triplex. 1 ex omni cutis externa, interna, ore aperto accipiens. 2 Ex omni puncto cavi in quo arteria exhalans exit. 3 ex arteria continuata.

Exterius applicata medicamenta, ut intus assumpta operantur: Aloe Calocynthia purgant, Cantharid. urinam movent; allium plant. pedum alligatum expectorat: Cardialia apponita roborant: Ergo venae per orificia absorbent exteriori admodum, ut ferunt intro in sanguinem, ut mefentericae ex intestinis ad pector. Harum Exercit. 1. Cap. 16.

Morbi

vid. Epip.
morb. p. 28
§ Hydrops

Crusta obdu-
cta.

venae
pulsantes
ac arteriae

Ita possunt per morbum dilatari ut diametrum trium calamorum scriptoriorum aequent.

Ex Acad. Scient. hist. tom. 2. p. 213.

Retulit chirurgus D. Dodart se in cadavere quodam vasa omnia invenisse crusta obducta in parte parvam exitum tantum liquidum circulaturum relinquentem.

Memoire de l'Acad. Sciences. tom. V. pag. 159. M. Homberg. M.

Il y en a une histoire d'une Dame morte d'un aneurisme du Cœur avec des polypes dans leur Cavité; elle avoit des accès asthmatiques; pendant ces accès il avoit observé un battement de veines semblable à celui des artères, parce que le sang venal ne pouvoit passer le Cœur librement.

*Asthma:
Cordis im-
pedimenta*

Cava
Morbi

Philosoph. Transact. n^o. 483. § XIX. Haller H.

Reperi venam cavam in quadragenaria inter renalem sinistram & iliacam venam enor-
miter angustatam, ut vix quidquam transmitteret; aliquid polyporum repertum intus est; Vena sper-
matice dextra enormiter dilatata. exinde conitax dari Morbos venarum, angustarum plerumque solito
& distenterum.

Dilatata
&
Angustata

Transact. Philosoph. n^o. 492 p 172.

In femina 40 naria vena cava inter renalem sinistram & iliacam venam mira angus-
tata, polypora substantia fere obstruata. Vena spermatica dextra mire dilatata.
inedim cadavere: hunc tantum morbi.

Tota Concreta

Academicar. Annotationum. lib. VII. Cap. IX. Bern. Albini 4^o pag. 80

Vena Cava circa iliacarum ortum tota Concreta reperta est; morbo enectus
extenuato Corpore; sic Concreta erat, ut veluti deleta, cum vertebri conjuncta esset
in unum.

extenua
to Corpore

Morbi
v. Cavae

17/ Vena
Portarum

in vesicam
felleam

Ex Instit. Bonon. tom. ii. part. ii. pag. 334

In hydropicae feminae cadavere inflando venam portarum sua fuit horum finis cum
poro biliaris Communicatio; quae in hoc cadavere amplior & grandior quam in alijs apparuit;
Haec poro mulier illa erat in cuius fellea ~~venae~~ cysti vena porta propagine pri-
mum observaveram, & conspicui magis, quam in alijs subjectis, biliaris porus ramusculis
Cum hi, non secus ac maiores dictorum vasorum trunci, propter naturam ampliatam essent.
Sed liquor injectus vel aer per venam portarum nunquam in cavum vesicae felleae in-
traverat, sed in substantia ipsius serpentino more divaricabatur & manebat.
p. 335: & 336. ibid: Illam, ait, communicationem non in vesicam felleam sed in porum cysticum;
Quod bilem secernendam per illum evacuantem inserviant ductus illi qui cystidem bilij praecep-
tant. Corridem dissertationi imponit se originem bilis cysticae noscitur.

Morbi
Ven. Port.

ossea

Physic. obi. 70.

Gravida, eodem tempore hydropica, peperit: hydrops mansit: dolores circa praecordia
Cuncta: mortui: cadavere: Peritoneum, multis granis maioribus sabulo similibus
variegatum: Vena Portarum ossea. Epiploon: Consumptum.

Lapide:

Org. inventi in vena portarum, hepate J. Ignatii de Loyola. Buonay. lib. 37.

Ex Museo Acad. Imp. Persano de cerebri Serinio IV. & V. n^o 115. p. 52 } vide retro pag. 8^a

de cerebri cortice = Prae-matrix portio cum annexa portione Substantiae Corticalis cerebri, quam ex meris vasculorum
= Sanguineorum extremitatibus Contingere humiliter videtur. NB Vestigium est venosi quid et
= iam interese. 2. Extremitates ultimae sunt notissimae, et 3. videtur Corticem non ex glandu-
= ly Contingere.

de cerebri medulla ibi n^o 149. p. 56

la. = Infantis Caput cuius superiore parte cranii ablata Cerebrum in conspectum venit. NB Corticali ab-
= lata, medullaris, Substantia se videndum exhibet. Vasa Sanguinea autem sunt numerosissima.

ibi n^o 153. p. 16.

Contra Vieussien = Portio Cerebri in liquore servata postquam methodo Vieussiana per 5 hom. in oleo fuit decocta, in qual-
= culentissime apparet hac methodo Substantiam Corticis in talem statum esse reductam, ut nequaquam
= apta sit ad demonstrandum: Corticem ex meris vasculis Sanguinis esse constitutum. // idem ostendi
= tur numeris seq. 154. 155.

Cerebrum duriss. ibi n^o 156. p. 57.

imum arte = Magna portio Cerebri humani lapidei inftar adrupetico ante annos 50 indurata absque decoctione
= neque solum tantam adquisivit duritiem, verum etiam lapidei scintillantij, inftar fulget, ita, ut per 1000
= annos Conservari possit. // Possunt ne mortui reddere Cerebrum ita, saltem aliqua sui parte?

Pondus cerebri Ex Instit. Bononiensi tom. 11. pag. 153

homini aequale Cerebrum ene homini maius, aut ponderosius, s. toti quidem corpori conferatur, quam ceteris animan-
alij fere tibus: Postius eundem hominem pependit invenit 114: 6. lib.: ejusdem Cerebrum extractum
in lancem pependit lib. 3: 8 $\frac{3}{4}$: idem fecit in animalibus variis, invenit fere eandem, quam
vi minorem proportionem; excepto passere canario ubi corpus drachm. 111. Cerebrum gr. 13. ubi
proportio vel homini aequali vel maiori: unde non tutum affirmare homini maius quam
alij animalibus cerebrum

Morbi ce
rebr
17-16
5
adep. 8^o

Privau observatory, alafin de l'Anatomie de Palfin de la dernière Edition. obs. 1.

Miles ~~de~~ Sagitta peruluy forum per ~~of~~ temporis, Pluram, & que matrem intravit: 7^o Sopor, Pus feridum longa copia & exurgente multa pullulabant singuly diebus per foramina facia trepano repetito: forum Sagittae in profundum cerebri descendit, neque auferri potuit: tunc Paralysis laterij oppositi dimidii corporis; morbo melius procedente primum cruy paralyticum moveri incepit, & postremo brachium.

Quando fere 4^a cerebri consumpta fuit per suppurationes, & exurgente, abscissa, fer-
ro intus latente, suppuratio melius apparuit: tunc terribiles Convulsiones.

Siccum redditum fuit corpus; aversabatur omne ciborum genus praeter lac
Nulla febris tempore suppurationis supervenit; facile puy exibat per patentissima
foramina tria trepano facta: neque febris fuit nisi rubro moro celeriter sanguine:
Nullum delirium, neque phrenitis; unde illo sensorio communi seu origine ner-
vorum nulla mentis erronea idea: unde i Cerebro nulla idearum origo.

Unde apparet primo vertiginem, Soporem, paralytin, convulsionem, ~~Phrenitidem~~, esse
morborum cerebri gradus hic: ut observavit Wepherus tr. de Apoplexia convulsionem non
fuit in cane vivente nisi adacto ferro ad corpus callorum Ut hic apparuit; quia fun-
dus ulceris cerebri erat jam mundus, ideo ferrum altius Cerebrum, seu corpus callorum
tangebatur: unde erant pia matre nulla convulsionem, sed tantum torsionem, ut ~~Pidley~~
de ~~cerebro~~ in Dura observant matre canis viventis. Philosoph. Transact.

Omnes mentis idae fieri erroneae possunt illo Cerebro, & hoc lero, illa erronea
fieri possunt: Arterij sic matris, & Durae, quae nervos omnes in origine sua circumdant
inflammari & vel alij laesij causis possunt erroneae idae fieri. ut invenij multij suf-
ficiantibus, ventriculorum efficientibus

Julp. lib. 1. Cap. 27. vide pag. 22. in Polypo Cordis —

Ex H. Ac. 6. 1703. M. pag. 261.

Petrificatum

In Bove pingui sano, robustissimo Cerebrum marmoris simile inventum fuit: aliquot epuy partes
infernae, Spina medullaris, nervi inventae fuisse molles naturalibus similes: Bartholin. Cent. VI
observ. 91 refert similem casum, ubi macer, pendulum caput, aeger bos erat. Hinc in
bi non sunt penitus ob partium solidatum mutationem, sed ob liquorum naturam mutatam

Ibidem 1704 M. pag. 6.

Hydroce-
phalus

Buella 5 annorum nata lenta febre, ad motus impotentia, tanquam di catarrho laborasset de-
linebatur: pulsus varius, intermittens, celer, aliquando lentus, respiratio facilis, catarrhus gra-
vis; Somnus placidus: Sordis ante mortem per 15 dies multa in ore, pulsus frequens, durus.
~~Emphysema~~ Emphysema a bucca dextra ad per totum corpus sensum sequebatur, praeter inferiorem
artem: inflatio ad tactum cadebat: crepitabat sub digiti cutis. ~~Emphysema~~ mortua.

Cadavere: Sanguis in Dura, pia matre paucus; in ventriculis multus serosus latex:
Integumentis ventris Scitij cadaveris odor alcalinus: (an ex aere?) Epiploon sicut in
asectis valde miratum: pancreas fere exhaustum: mesenterii glandula durae, atea
tomatice: pulmones tuberculis cadaveris adherentes pleurae; tumor apparuit ad
Cordis basin sinistronum super arteria pulmonali; nuci formis, lirrhoris: ejus radices
vasa sanguinea penetrabant sed Spinam dorii desinebant.

§ Hic tumor puto causam hydropicali fuisse;

vide fol. 8^o

Ex Bonis S. Anat. p. 192. lib. 57. obs. 73 Ex Nicol. Fontan. Refert se pue-
rum delirantem, flores colligentem, pulsu parvo frequenti, lingua nigra, nigris excrementis pullulantibus
forma, detentum invenisse: Mortuus: In cadavere; in corpore calloro inventus tumor nuci ju-
glandi similis, arterij rubris distinctus: aperitur abscessus apparet.

Abcessus

Serum

Ballonius Epid. 1. pag. 3. de puella febre Intermitte, Sitis, alvus adstricta, carui, Convulsionem
mors: Cerebrum humidum solito plius in cadavere invenitur.
vid. pag. 83.

Convulsio
na violenta

atropia
Febris
nulla
Nullum
delirium

Apoplexia
aque, pituita

Emphysema
putredo

epiploon
putridum

tumor
arteriae
pulmonal.
in corde

Phrenitis
aurea

capitis dolo
res: convul-
siones

Morbi
asp. art.

Tulpij lib. 2^o Cap. VII

Spiritu diffi-
cili

Civ. Amstelodamensy per 7 annos difficili spiritu, Tussi torquebatur: insequuta corporis macie: Accidit
ut Vehementer tussiret, & tuum putamen epiceret, quo exeso curatur: indicabat ager locum dolentem,
Sed et Caput aperta arteria. Nechs teterum sibi. Decad. VI Cas. X de nummo ibi detento.

ulcus pe-
netras

Mem. de l'Acad. de chir. Paris tom. p. 347

(48)

aputa
mine ibi

Lug. vene-
rea.

Morbis
Cutis

Cuticula—Ex Philosoph. Transact. n.º 474 Art. iv. Ibi A totus est ut attendat nigrum Mausorum a
 muso nigro inter corpus reticulare & Epidermidem non adeste: probat per longas paginas Colo-
 rem Ethiopum nigrum ex densitate Epidermidis, paritateque pororum ejus provenire. Nigri-
 um Europaei Epidermis laxior. illy albi color, congruenter alijs nationibus prope vel ~~dequant~~
 in Equatore cum silvestri, vage que vita. Verum est quod præp. 3.º fol. 109
 trax equatorem cum silvestri, vage que vita. Verum est quod præp. 3.º fol. 109
 = The part of y^e Skin which appears black in Negroes is y^e Corpus reticulare cutis: And
 = y^e external lamella of y^e Epidermis: And all other parts are of same Colour in them.
 = With those of white people, except y^e fibry which pass between those two parts. Ibi
 De morbis Cataneis agit in Corollariis; sed non placet.

Morbi

4621

Morbi

Morbi
cutis.

17

Hist. Academ. Leunf. 1686. tom. 2.º p. 278.

Coeur blessé Un homme qui ayant le cœur percé d'un coup d'épée a vécu encore 24 h.^s après.
vivant

Ido Wolphi Oberv. chirurg. medic. Oberv. XXI. p. 70. Luedlomburg. 1704. 4.º
vulnus cordis Refert Anatomicum Torsby se présente cadaver juvenis, qui antea 4.º annos pun-
coni, sanati. tum in pectore laesus, & curatus, aperuisse, Cor tunc de industria lustrare, & apparuisse
Conum Cordis vulneratum; Cicatrix restitit omnibus facie inspicenda

Foramen ovale. Trans natur. 80 annos natæ corde foramen ovale apertum inventum fuit; Causa ibi affig-
act. Philop. natur. "She never enjoy'd a moment's health in her life. Ibi de puella quæ
Nº 454. p. Sub aqua per 15 minuta ut aiunt, Vivit sana, quamvis de causa mortua post 5 dieb:
166. infirma erat: Ideo Auctor illy, qui fracta valetudine vivunt a tenerrius foramen
ovale esse apertum asserit, & Ideo incolumis sub aquis vivere!

Morbi
Cordis
Polypus

Tulp. l. i. c. 27

Hom. Trepidus, hebes repente occisus a mortuo attonito: in cadavere inventa: Cerebrum flaccidum. Membrae multa pituita perfusae; venae eadem materia turgabant, sinu faliformi. Et tanta Applexia copia ut extrahi possit inter longioris filii. Ventrículo aquae plurimum; in spinalique medulla etiam, tanta copia ut spongia succati opus esset, ut lubricarentur partes: in Corde Sinistro polypum ex alba ac concreta pituita inclusa membranaceo involucre: adhaerebat carni, cordis finis. assurgebat. huius trunco, arteriam aortam, & arteriam pulmonalem obturavit: valvulae claudere se non poterant.

Polypus

Ex Hist. Ac. Scient. p. 279

Cuidam cor gladio trajectus adhuc per 24 horas supervixit.

Auricula dilatata Ibidem. pag. 337. & 338.

Auricula dextra cordis Praefecti navis ita dilatata inventa fuit ut infantis caput aequaret: libram cum semisse sanguinis continebat: intetus auriculae paries substantia ova, atque composita obducatur: ideo dura apparebat tensa, tamquam pila aere plena: Illi respiratio pulsus palpitatioque difficilis, durus & frequens pulsus erat, cordis palpitatio: ortu morbus ex irae excandescencia summa, qui singulis augebatur diebus.

Causa
Ira summa

Tumor vide fol. 19. b. Sub Hydrocephalo.

Polypi cordis Dr. Schloph. Transact. N. 464 p. 123.

albi ad venas Ex frigore aequilonari, ex potu spirituosio, ex frequenti mutatione calidi & frigidi. Arteriarum magis ex corde exeun- ti oriuntur polypi veri.

Cor diu
in ventriculo

Ex peripheria cordis sanguinis seri & sanguinis exstant, quae in pericardio collecta mortis causa fuerunt: vide Pericardium. (Seng. lib. iii.)

Pectoris hydrops

Aqua

Ex Ballonio Epid. l. pag. 11.

Difficultas spirandi per annos 30, de oppensione stomachi: membrana putuerant, Cor aqua natabat: librae aliquot putres eductae: in latus dextrum facili decubitus, in sinistru difficilissimus: natabat: librae aliquot putres eductae: in latus dextrum facili decubitus, in sinistru difficilissimus: cum Syncope: aruerant pulmones. pulvis magnus, elatus, tardus, interitus: Sanguis sub doloribus, & oppensione interit.

Cor maximum

Ex Nic. Fontano Resp. & Consult. Med. p. 59.

Filia 17. ann. nata; Paralytica sine manifesta causa subito moritur: Cadavere Cor duplo maius solito, auriculae maximae, venae aeneae aqua & sanguine atro grumoso admodum distenditae; dicere hanc thoracis hydropem laborasse. Nunquam animi deliquio, cordis palpitatio, neque moeroris, suspirii, dolore dum vixerat tentata fuit.

Nulla sympto-
mata.
Paralysis

abcessus

Ibid. pag. 60.

Trimus puer moerens, gemebundus moritur: cordis cavi sanguis ater grumosus, aqua in pericardio: abcessus intus ovi prope sinistram cordis auriculam.

In corde abcessus, tubercula, ulcera, tumores, vermes, calculi, Crinis, calyx. vide Ulsulum lib. 1. de fabric. c. 5. Holl. de morb. lib. 1. Marcel. Donat. lib. V de Med. Hist. Cap. 4.

Polypus

Diver. observ. 88 Cent. 1. Juvenis 5 an. nat. cum currens difficili corripiebatur respira- tione: mox tandem in tussim, febrem parvam, alii fluxum modicum in quo flava viridis: 5. hypothyria correptus moritur. Cadavere. Cystis fellea gradior & humore ni- gricante repleta: pulmo sinister diaphragmati haerebat: Sinistra cordis auricu- la solito amplior, repleta materia crassa, compacta, alba, laedum coctum referente.

pulsus in-
aqual.

Ulcus
cum pericardio
adhaerente

Diver. observ. 87. Cent. 1.

Puella 14 ann. vomitu pituitoso, Cardialgia singulis diebus mane; dolore summitatis scapulae; alii fluxu: Pulsus intermittens epidu: decubitus in sinistram latum difficili, qui si tentaretur cardialgia illico & tussis corripiebatur: huius siccus erat; flatu inferne & superne. Somnus paucus; difficultas spirandi. febris intensa. De 34 sputo sanguinis librali. quo continuato per biduum moritur. Inventum ulcus cordis: apud Schenckium simile inveniuntur.

pulsus in-
aqual.

vide fol. 76

Cerebellum Epistola D. Abr. Kaeu 9 Julii. 1742 Hag. Comitij data

Acy intra Cerebellum adacta feru magnorum virorum auctoritate expectabam fulmine
 =quasi ictum cadere animal; cum non modo mire convulsum supersit, sed ut numquam in uno
 =experimento requiescit per fere horae quadrantem supervixisse vidi, currenq; currenq; tang, imo
 =vire vix edentq; quae cum inopinata acciderent, ne fidem negarent illi, apud quos potius
 =opinio praepudicat, quam imitatio rei discernit, demonstrari haec experimenta, plurimq; me
 =Acij Chirurgi.

9

Morbi.
Cerebelli

Bribeau-observatory. la 3me

Tympanotriba 40 annos natus in vehementissimos dolores totius Capitis incidit, ad quos levandos nullis remediis potens fuit Medici: tandem miserrime cruciatus mori-
scirrhorum tur. Cadavere: tumor Scirrhorum, qui scalpellam resistebat, intra Cerebelli cor-
tumor: pus inventus fuit: arteriae intra cranium pleno sanguine erant parum capiti-
impletae.

vide fol. 8. in fungus

dolores
occipitis

Molle, &
durum

Ex Boneti Sep. Anat. tom. 1. p. 49. ex Nicolao Anthropol. lib. 6. c. 2.
Iis, qui assiduo capitis dolore in occipitis laborant, observavit illos Cerebellum esse
Cerebro mollius; malis aridum & friabile.
Henricus ab Heers observ. 4. Spadaceni. Mr Crue Leodiensi ex melancholia furio-
sa reddito Cerebrum illi Siccum, durum, flavedine tinctum.

dolor frontis:

Abcessus

Medical Essay vol. V. P. ii: art. 53.
Gravitate, dolore frontis assiduo, caput antrosum ad genua inclinatam; evacuationes multo-
magne, omnes frustra: pulsus duri, nulla convulsionis; appetitus protratus: ante mor-
tem dolores assarunt, appetitus revertetur; sed post 24 fere repente moritur.
Vires dures puri in tumore suppurato intra abellum, & sinistra laterali Dura M.
Sanguis coagulatus, inventa in cadavere fuere.

Scirrhus

Ex Philos. Transact. 474.
Celeberr. Haller puellam, quae inanem vitam querebat, VI anno natam duxit cui scirrhus in
cerebello invenit, & inutile ad functiones, quae tamen fiebant, vitales reddebatur: unde Cor non tanta
quantam creditur vulgo necessitatem habet ut cerebello sano utatur: vulnera cerebri illico non
interficiunt. vide Casum Simil. Act. Parisin. ann. 1705. n. 13. vid. Opuscula Pa-
thologica Halleri. Lausanae. 8. 2. Si alia Historia Scirrhorum in cerebro, glandulis Mesenterii,
Inguinalium, & bronchialium. pag. ii.



24/
Caput

[Faint, mostly illegible handwritten text in a historical script, possibly Latin or Greek, covering the majority of the page.]

Morbi
quibus ten
tatur capi
tis partes
anat. inv.

90

Diaphragma

Docuimus de Buffon primum, quem sciam, cogitavit diaphragma esse organum sensitivi sensui, seu illius affectui dolori, & laetitia; sicut in grano, v.g. tritici adeo in medio ejus punctum, tanquam fulcrum, ex quo procedunt & radices, deorsum, & folia sursum ita puto in corpore fieri cum diaphragmate, quod est fulcrum totius fabricae animalis: non solum ut regat per motum alternantem viscera in abdomine, sed etiam motus voluntarios: nam si homo concipiat rem ingratis, vel gratis, illius rei sensum sentit ad scrobiculum cordis, sed quae illius sensus tantum in diaphragmate est: sensu hoc grato vel ingrato semel ab homine percepto, determinatur tunc per motum voluntarium, vel cohibentem, ut rem ita perceptam prosequatur, vel aufugiat.

Cum tam perbelle viderem rem ita manifestam, considerationeque pulchram, cogitavi ut nervorum propagines octavi parii, quae oesophagum praeseptant, investrerentur siquidam, num eorum aliquod ad diaphragma protenderentur ad illum locum ubi oesophagum illum perforat: annuit Illustri viri, & cadavere comparato, sequentia observata hae die fuerunt praesente Celeberrimo Anatomico D. Ferrein.

Idem omnibus novum octavum per nervorum bifurcam divisionem vixque oesophagum decurrit inter p^l subter pleuram; simul ac pervenit ramus sinister oesophagi ad illam partem ubi oesophagus diaphragma perforat, ille octavi parii ramus in varios alios abit, & circulum tanquam circa diaphragma, quo oesophagus amplexitur: quando ita parum percurrit tres illi rami decurrunt inter pleuram et pericardium, & per hoc decurrunt, & illi rami jam minores facti in diaphragma se expandunt, ea in parte illio, ut pericardium jam adnexum diaphragmati non est.

Simul ac oesophagus perforat diaphragma ad sinistroni in parte muscosa rami 8i parii, qui ventriculum amplexantur ibi tendunt verum libum foraminis diaphragmatis. Sed hic querendum & sciendum ubi tendit ea pars diaphragmatis, & ubi musculara ejus pars.

Tunc querenda illae partes quae sub cartilagine xiphoidea sunt: hae cognoscendae si stilo adacto ad extremum cartilaginis xiphoideae: stili puto respondere non poterit ventriculi ori superiori, sed centro nervoso diaphragmatis. sed videbimus.

Morbi
Diaphragmatis
Pleuritis
Foramen

Bonnet. J. Br. fol. 187 lib. 1 § 7^a tit. 1.

Refert puellam ex lipothymia mortuam subito fuisse. In Diaphragmate atropho in Lipothymia
Cysti cum vesiculis aquosis tantum inveniuntur.
Isti foramen in Diaphragmate fuisse ob pus ex pleuritide ortum factum.

Pleuritis

Foramen

Extas Epistola Gabrielij Clauveri ad Marium Ruych Med. Amstelod. Batavi. 1661 dato. In qua vomitus ad
Historia Iuvenij post commiffationem denati per ingens lassitudinem vomitus huius secessum materiei mortem
mors, piceae intra tres dies. Cadavere inveniuntur foramen a natura factum in Diaphragma-
te, sine ruptura, per quod ventriculus cum parte coli intestini in cavum pectoris penetrave-
rat: Cor in dextro latere detrusum ut ventriculo & intestino locum daret: dum sanus
erat illico post partum arthmate corripiebatur: ad cetera sanus.

idem

Philosophical Transactions n^o 478 art. 3.
Puella moritur: inveniuntur foramen in Diaphragmate per quod ventriculus, pars illi
intestini, Caecum cum appendice, coli portio in pectus intraverat. vide locum.

Ossium

Le 14 9bre 1747. Le nommé Basil age de 53 ans entra à l'Hôpital St. Eloy de Mont-
pellier: ... il avoit le pouls faible & intermittent, un délire considérable, les yeux
cavés batus, les dents & les gencives noires; la Respiration facile: C'estoit le 5^{me}
jour de son mal sans que on lui rien fait encore: ... Il survint un Meteo-
risme & la malade mourut le 8^{me} de la maladie: On porta son cadavre dans
l'amphitheatre après l'avoir ouvert On reconnut que tout le Centre du diaphrag-
me étoit ossifié de même que cette partie du péricarde qui s'y attache: l'apex
ossifié avoit plus d'une ligne & de même d'épaisseur. M^r Vigaroux Maître chi-
rurgien de cette ville garde la piece. // M^r le D^r Layan m'a communiqué cette
Observation, qui lui a été communiquée de Montpellier. 17³⁰ 50.

Deliri-
um
an
aniduum.

Expercussione Fred. Hoffmannij tom. V. Medicin. Rational. pag. 324. cap. de Arthmate convulsivo.
scrobiculi cordis Refert, Ex gravi scrobiculi cordis percussione subito hominem perisse suffocatum:
Est mortem Vitium fuit tendineae partis diaphragmatis Suggillatio & Strictura
a percussione factae.

Mors

Adhaerent
Pulmoni.
vide pulmo
pag. 51

Tumores

Sunt tumores relictii post inflammationem: videntur orthopneici & arthmatici moriuntur
Iude signa in Petro Salvo Duveno Cap. VIII de Effect. particul.

226
Dura
Mater

Morbi Brisseau observation. 2^a

Suppuratio mor post 18 menses ad connexionem suturae sagitalis cum lambdoidali ap- dolor.
ratio paruit: aperto demum purij multum dedit: Cranium apparuit Cariosum; tum Capiti.
dur. matr. dem Dura mater suppurata; scilicet emisit, sicut tendens supputi; post
cranii longas abundantes suppurationes, Callos inductus fuit omnibus Cranii, & cura
tuy tandem eger: nulla luy venerea suppicio aderat

Ossea Ex Hist. Acad. Sc. tom. 2. p. 25

Inventa Dura Mater ossea: homo ~~mentis~~ ^{dumvixerat} stolidus erat ad mortem.

Falx ovisculi Ex Hist. Acad. Reg. ann 1711. pag. 27.

multis. In Juvene praecoci 9 annorum. 1^o febre valida, memoria defecit, post aliquot annos Epilepsia
epilepticae factus; insulny menstruation, tandem frequentior: anno 27. morit.

227/
Epidemi

Morti

(53)

Simplex ex Bona Lib. 1. q. 12 p. 253. ex Bona. Rec. lib. 13. cap. 15.

Hildani Snä de Omenti
ti vru

Refert in illa cavitate omenti deprehendere atrum, crassumque humorem, ita ut marsupium illud fuisse
aero humore repletum; deinde ibi flatu contineri, hunc murmurare oriri, quod hypochondriaci observant
praesertim sinistro latere, ubi cavitas illa magis propatula est: verum membrana illa omenti
foraminibus per ora flatu non continet; cetera quamvis fieri ob morbo, sed flatu si fuerint a
puretate hunc humoris prope, quod in hypochondriaci in senis annos prolongatur: Ideo intra integ-
ra, postsumum Colon.

Morti

Ruych. observ. anat. 18

Hydrops.

Mulier per 15 annos hydropo laborans mortua, fœt. in cadavore
Vasa Sanguinea per totum ventrem diametrum trium digitorum scriptoriorum
æquabant. Epiploon carnosum redditum; crassitie digiti, peritonæo connectū
in medio inventus tumor pugno æqualis; in ejus medio pili similes illi capiti
inventi fuerunt, digiti longitudine & microscopio lustrati radice carebant.
Epiploon Scirrhorum vide. Pulmo. 51. b. observ. aer in hydropo

Carneū.
pili vnt. hy.
Scirrhus
tumor

In Puerperio
Vultra

Ruych. obi. 63.
In omento foeminae post gestationis tempus mortua tumor molli inventus: Janae mu
lieris post gestationem proly sine magno incommodo ferunt, & apprehendere mani
bus tamquam fascimen possunt.

Æ. optime naturam omenti contemplari ait, Quando abdomen elevatur
omentum arctatur, in manus reductur spatium, tunc inflamatur, peritonæo adhe
ret: ob odorem partus protelatos idem fieri posse.

Scirrhus

Ex Bonis. S. An. hb. 1. § IX p. 239. ex Bower. Prae. Lib. 13 Cap. 15

Melancholia

glandulis foeda
materia repletis

Henr. Merbomius de Abcess. Intern. natur. fol. 58. Edit. Lips. & Dordræ 1718. 4.
Indi aliquotus, qui Strumæ, seu Scrophulæ in collo habebant, sector omentum dedisse pluribus
glandulis foeda materia repletis: ... posse mutari glandularum, musculosarum: Georgius Horstius
in additionibus ad Marcellum Donatum, infemina, cujus omentum tumefactum ab abcessu ad
56 libras pendens

Scrophula

Maximum
omentum

Ex Philosoph. Transact. n.º 382. tom. 7. abridg. part. 3.º pag. 518
libr. XVI ½ pendens: lapides nigri in vesica fellei.

vomitibus bi
ly atræ
dolor scrip
to hypoch.
immuni

Scirrhusum
rubrum, contrac
tum

Bower observ. 48: cent. ii.
Canonicus incidit in vomitum contumacissimum, qui nulli remediis
cessit: erat temperamento melancholico adusto & tanquam melancholico morbo ef
fect affectus curabatur a medicis: Sed fallabantur, Cadavere
Omentum crassum, rubrum, Scirrhorum, contractum, ut hepar prima fronte
referret: Ventrículus luteus, superiore ejus parte Scirrhusus: intestina livida; lien
sanus.

Pinguissimum, mu
rum, hydatibus

Heister. observ. 382. p. 445
Crassities trium erat pollicum. omnia abdominis contenta circumvolvebat: Intes
tinum Cecum cum appendice magna erat pingue dinosa durissima perforata, per
quod omnia contenta præterlabantur. inventa Eecum cadavere, cujus mortui
fuerat. Post debacchationem Vitiū quoddam potumque ex Urno Hungarico &
alii in diarrhoeam implacabilem incidit, & phlegmæ mortui, Consumptus
et exhaustus.

Morti

Glandula Drosalis
ad Oesophagum
Sita, vel sitae.

Heister. Observ. 467. pag. 534. edit. Anglic.

Ibi refert in multis cadaveribus has glandulas nullas inveniri; aliquando unicam, aliquando duas, ut Vesalius observavit: Ruychuius invenit: aliquando ita tumida sunt ut omnia videretur potiusque interciperent. non loquuntur de cura per Salivationem, ut si bene recordor, auduisse auctoritate accedisse Ruychuius hunc morbum curanti.

Orator Serri I Nicolay Bidlo mihi retulit similes. Se agnum tractasse, antequam eviscerare de glute in capere: apertis cadaver invenit cariosam glandulam Oesophagi maximam intabum commensam.

Thyroides glan-
dulae degeneratio

Haller Opuscul. Pathologica. Lib. VI. p. 16.

In parturientibus aer per coram admittitur: vid. Mem. Defentes p. 159 & seq. ad calcem. parturientium. Sed invenitur molli carnea, alba callora pinguedo in medio & aliquid lapideum: ibi mulierum. multa similes historiae, ubi Hydatides, Cysticae, Scirrhus, arena tephacea. p. 17.

Ibidem. Pericula fieri poterit morbus compressus venarum & arteriarum circumjacentibus. vid. p. 18.

Struma

Hepato

Memories de l'Acad. Royale de Sciences. tom. X. ante renovationem. pag. 476.

Ibi Vermes inventi in hepate arietis: ibi causa indicatur; quando hoc pecudij ge-
 nus pascitur herba Sideritis & labra aversis, tunc vermes generantur, sumi les-
 folij hujus herba: ibi refellitur S^{ra}. Canel. Gemma & aliorum, qui ex hys vermibus
 in animalium hepate inventis conjiunt fore ut pestis inter homines grassetur.
 Cum frequentissimi sine peste inveniuntur illi vermes in hepate illorum animalium.

Morbi

Ex Duch. obi. 50.

86

abicepsus

Juvenis dolore epigastrii, febre tumore dextri lateris; cauterio potentiali & scalpello apertus tumor, pus exit, sanatus. Merket. Simily report. obi. 52.

Hydatides

vide Uteri morbos. pag. 61.
Ibi observ. 65: ubi totum hepar in hydatidibus abiit.

Hydrops

Ex Hist. Acad. Scientiar. ann. 1701. pag. 147.

Præcesserat dierum, totius corporis macies, hydropica tunc mulier facta: Inventa vesica fellea distenta ut aliud simularet hepar: continebat multifariam hydatidem, pellemque, ex hydatidibus ortas, quæ per alvum dum viveret exibat: hepar erat siccatum & valde tenue. In anima
Hic morbus in ætatis valde noxius est, præsertim oculis, & vervecibus, quibus postquam augmentum nutritionis maximum attigerunt, & pinguidine abundaverunt hic supervenit morbus, macies, in ventre aquæ inveniuntur. cognoscitur hic morbus in vervecibus quando glandula lachrymalis minoris anguli oculi comprimatur, & glandula lachrymalis signum rubedo non apparet, tunc hepar hoc laborat morbo.

Abcessus hepatis, Vesicæ felleæ intus

Philosoph. Transact. 449 § VIII
Robustus vir febre intermittente laboravit: Cortex perurano imprudenter Febr. Int. curata febris; per insequentes 14 annos pondus hepatis & viscerum morbus accusabat, quæ incommoda per purgantia evanescebant: Tunc & ante mortem mensis Ictericus factus, dextro latere dolore lancinante, inflammatio, pus apertum apertum fuit; & multæ puri non boni manifestæ Captas fuere intra 25 dies: tunc frigore præfuit moritur cadavere

Icterus

Inventa fuit cystis fellea nimium distenta, & sacculus, qui tegumenta elevaverat, Calculi, cretacea materia plenus: reliqua minoris momenti. vide locum.

Ex Bonet. J. Anatom. lib. 1. § 3 p. 234. obi. 32

Nobilis quidam ob rerum suarum pacturam gravi animi dolore & ægritudine of-
sidue tristis cogitandus, lemetum timens, Commissus monachis, fons ut exorcismata morbus
agerent, convictor eorum diu fuit: tandem debilis, sine febre, siti: urina rubra
qua non turbida unquam: fastidium ingens, parum bibens, adiposus. macie
confectus moritur.

Pulmo

Cadavere Hepar tantum invenitur nigrius quam anatomia: Pulmonis substantia magis nigricabat, & foveæ digiti impressæ retinebat.

Aqua

Philosoph. Transact. n.º 475. an. XVII. pag. 305

Femina 40 ann. nata acuto dolore assiduo in regione hepatis, tantillum tumebat, & hydropem
pectoris. præfio inflatu undulatio profunda sentiebatur sub tegumentis. moritur
Cadavere inventum hepar ingentis magnitudinis: adhaerebat partem peritonæo
sine inflammatione; ita largum ut ventriculum & ad lienem pertingebat; comprime-
bat diaphragma, & pectoris cavitatem arctabat: majore loco hepatis aperto
octo librae aquæ limpide effluens ex marispro facto ex tunica hepatis: Cystis
era ex glandula Conglobata, quæ lingua sedem morbi: hepar functiones suas exibat
quævis ita morbosus esset: nulla siti ægrota; neque in urina magna muta-
tio: parere non poterat tantum supra pectus. hydropem pectoris simulabat.

Cancer

Duch. observ. 53. Cent. ii.

Brevi epigastrio lateri, dextro, dolore, humerum dexterum doloribus infestabatur, ut
pleuritidem mentirentur: tantum in opio inducis doloris. dolor præterea
in coxa: vide locum: ante mortem hydropica facta

Cadavere: hepar tumorebus scirrhoris, parte sui maxima suppuratis;
in cuius extremo duo tumores cancerosi pendentes, ad umbilicum usque: hepar
pendebat # 20 & amplius: diagnosi hic fallax: nam appendix illa can-
crose mentis faciebant, & ab hepate ortum ducebant.

Intestinum
DuodenumIntestina extra
ventrem pendula

Ex Philop. Transact. N. 422.

M^r Laude Amyand Vidit puellam recens nati cui Intestina
pendula erant: foramen circa umbilicum dimid. pollicis diam. vixit tan-
dem triduo: Similes observationes vid. Ephem. Natur. Cur. Dec. I.
ann. VI. & VII. obs. 232. p. 341. N. Deur. Secunda Ann VI. obs. 126.

Ex Init. Bonon. tom. II. part. I. pag. 138

& Intestinum Duodenum, ab initio procedit cum mesocolo conjunctum, ac tressere
digito descendit, colo arctissime, leviq. reni dextero, adherens. tum colon, ac re-
nem ipsum relinquens, supra spinam inflectitur; adhuc mesocolo adherens. hic,
quod etiam doctissimus Santorini animadvertit, inter subjectam venam cavam
& superpositam venam portae se immittit, & ad sinistram ventris partem adcon-
dit; nec unquam mesocolo ^{non} adnexum est: donec ad ~~mesentericam~~ meserae-
um perveniens superiori eius alae tandem adjungitur; Namquamvis mefe-
rum duodeno leviter & vix adhaereat hoc loco, mihi tamen mesocoli
partem, quam modo diximus cum duodeno conjungi, radicibus suis pervadit, &
saxum antevix fortiter: Oportet ergo intestinum duodenum mesocolo curum
dari, atque ipsum quasi perforare, & circa medium volvi.

& tota via erant, qui docent tenuia intestina omnia mesocolo ad-
necti, eoq. quasi sustineri: Illud etiam accedit Int. Duod. & dixer. Id ad
Colon adungi, & reni dextro superinumbere, & praeter posteriorem mesocoli
partem excurrere, tum ad superiorem eundem partem ascendere; quorum
nihil antea ab anatomicis scriptum fuerat.

In praxi possunt renum symptomata osiri a duodeno, & symptoma-
ta duodeni a rene dextro, Colon etiam intestinum ab utroque: Sunt etiam
meserae glandula in morbi indurata & tumentes, haec duodenum comprimunt
hinc vomitus: potest duodenum Craspius reddi, tunc meserae vasa compri-
met; venam cavam subjectam; portarum superpositam: vide Santorini
observationes Anatomicas.

vide Medical Essays vol. IV. fol. 65. & seq. Vid. etiam Santorini observ. Anat.
Cap. IX § 7 p. 167 edit. Leydae. 4.º de Duodeno, morbi que ibi natis.

De Situ

doloris Iliaci
causae

1 Si nervi, qui ad intestina tenuia, obstructi fuerint & non depellunt, & paralytici facti fuerint tunc intusceptio vni in aliud intestinum fit, ut in hac observatione refert H. de bis vidisse in duobus, qui dum vixerant multis ventris doloribus ~~se~~ erant correpti, & post partum duobus illico horis, vel una: *

Cum superior intestinum sit paralyticum collabatur Superius & in non resistens intrat: ego inpprati Rayethian, quae Academ. Sc. Servat, vidi.

2 Hypertoniae Causa sunt vel obstructio ~~excrementi~~ ^{ab} excrementi duris facta; vel ab ossibus deglutitis, vel ab alijs solidis corporibus: quia intestina ita obturata peristalticum perdunt motum.

3 Contractio intestini, & substantia eius indurata: tunc neque flatus neque excrementa exire possunt, sunt inflammationes &c. * 2

4 Suffocatio intestini ilei in Hernia inguinali.

* In atonia: Mulier adfrectissima alvo laborabat, continuo vomit sine magno ~~obstaculo~~ incommodo, quia dolores non sentiebat, & sine febre intra tamen brevis tempus mortua est.

* 2. ibi de vidisse intestina in quorum cavum digitum minime introduci non poterat.

Vermes perforantes in inguine

Mesbomii. de Abscess. Intern. natura. pag. 52. An. Lipsiae 1718. 4.
vide etiam Medical Essays. variis in locis. Similia

Appendix nova

Ex Franz. Philosoph. n.º 476. art. 6.
Puer cum Cerevisiam biberet acidam in colicum incidit violentum dolorem. venter durus; vomitus avidus cum excrementis mortuus intra tertium diem.

Cadavere: Intestina crassa vasa inventa sunt: in Ileo hernia quaedam, vel appendix nova inventa fuit, quae obitaculum excrementorum deponere fuit: erat longa tres pollices eadem ac intestini diametri: & clausum intestinum ita erat ut nihil defendere poterat

Appendix

Fantoni Epist. Medic. Prima pag. 157.

Appendix ilei intestini, longitudine vnicuique, vi linearum latitudine & in coniformam desinente.

Guntzius observavit in cadaveribus ex Mania defunctorum hanc in Ileo appendix inveniri.

volvulus

33/
Intestinum
Colon

Morti

Psych. obser. 92

59.

dilatatum

Ita dilatatum inventum fuit in cadavere puella 5 annorum Intestinum Co-
lon, excepta illa recti parte, ut totum impleat abdomen: dum vixerat dolori
by ventrij torquebatur ^{reobitate morbi Dorte & sectionis cadaverij.} ad qua multa remedia Contra Vermes fuisse exhibitia.

vermes
symptomat.

vermes perforan-
tes

Ex Hildano lib. I. obser. 54.

Laborabat quidam atroci colico dolore, quem excepit Coli inflammatio, ac ipse abiectus
qui in sinistro hypochondrio proruperit, cum pure vermes simul & excrementa crui-
tanti.

Colicij dolor.

lapidea
materia
distentiu.

Ex Nicol. Fontan. Consil. & Resp. Medic. p. 84.

Juvenis ex iliaco mibo exspiravit: Inventum intestinum colom fecibz vidu-
ratis, lapidem referentibz, distentum arcte adherentem.

Iliaca pavio

Morbi.

Lien
Morbi.

Krusch. obs. 62

In statu naturali digitis sub costis spuriis sentiri nequit; sed tumefacta non solum
sentiri potest sub costis, sed ad hypogastrium usque extendi posse.

Arteriae diameter ad ingressum lienis octies capaxior, quam vena a liene exiens; qua illam
portarum constituit, hinc sanguinis detentio in cellulis huius visceris, fit ut ad initium accedat
putredinis (ut suspicatur Gorter). Observatum fuit a D. Puriell libro de colico morbo anglice
scripto illum canes, quibus lien secerat, salaciores antea observasse.

defectus lie-
nis, salacius
redditi. i. e. d.
pronus

Quid praestet lien

Ex Hist. Bononiensis. tom. II. pag. 152: Sectum cani fuit lien; vulnus consolidatum, vixit:
sanguis videbatur: in iram priorior, curru praestabat; idoneus veneni, gradus catellae plures fecit
necavit Butuy, & sanum et integrum alterum canem: caparatus cadaveribus: jecur illius aui
lien sectum maius erat, friabile, impenitus rubrum, bily copiosior, viridis, amarior: unde lien
mors sanguinis invenit, ut bily subdulus fiat.

Morbi

Situs mutatus

Krusch. obs. 62.

Quosdam post laboriosum partum durities hypogastrii observabatur ignota: mo-
ritur febricitans: Cadavere: lien octies superabat magnitudinem naturalem:
4 libr. pendens: Cavitationem hypogastrii descendebat: locum ubi lien situs
a natura plerum est, munitus corpore carnosius magnitudine cantanecae, (qui
foram lienis munus obibat.)

Sectus, & de-
ficiens incane

ibi. obser. 66.

Lien sano cani sectus fuit; vasis ligatis, & vulnus ligatum ex arte & sanatum. ut
XII Canis sanus: post ablatum lienem postatus appetitus erat: & vomebat.

Putridus

vide fol. 68: in Intestino Plecto cum pinguedine multa morbosa.

Sectus sine
noxa

Philosoph. Transact. N^o 451. p. 426.

Ex vulnere lien extra relictus, tumefactus ad gangrenam proximus, sectus, ⁺ postligaturam
ad claudiam partem; reliqua intus: Sanguis evasit homo.

Ex observ. Martini Bogdani appensis libro Lisey Elltr. Anatomie. obs. II
Pustius de dolore immensi sinistri lateris ad spinam omni ilei se extendenti
cum mictu cruento torquebatur du: mortuus: inventum Venem sinistram
amplexans, Scirrhorum, magis. vid. pag. 213. edit. Francof. 1679: 8.

Carentia Lienis

Ex L. Anaz. lib. I. § 18 p. 229. obs. 22: Melancholia verata mulier mesta
Colore nigro cutis: mortuus: Lien non invenitur.

Melancholia

vid. fol. 73

Membrana

De Membrana Cellulosa, Adiposa & videndum Volum. II. Medical Observations & In-
quiry pag 26. ubi natura, functio, sed & suppurationi; multa que egregia simul trahi
que eximie leges.

Harmattan, Ventus Lepidus, Africa

Journal Encyclopédique année 1782/1. Juin pag 131. Tom. IV Part II
Vbi ex ~~De~~ Franchon Philosophiques tom. VI pour l'année 1786 part 1^{re} in 4° Londres
1781. Dans le même Journal pag 133, L'Harmattan est un vent périodique

Membrana Vellera.

Commentar. Acad. Reg. Gotting. tom 2. p. 366

Intestini
Recti

Vir 50^{aris} praeter asthma convulsivum hemorrhoidibus mucosy laboranti secedit per
aliam membrana molli spongiosa crassa, sinubus excelsa, fastidissima, demissa fere
manu magnitudine; post multos dies purulenta materia copiose excremitur: cum
celsa gr. aliquot deglutitur ob asthma dolebat in intestino recto. (Egrosus erat?)
nunc autem optime se habet. Suppurato

Musculi

Mammarii

Tumor Scirrhus
in Causa.

Haller Opuscula Pathologica. Observat. V. p. 14

In Belgio frequens morbus: Collum incurvatur, atque ad alterum latum inclinatur. Scirrhus
 Curacionem in secundo opposito musculo sed male: Virque faciunt illi qui musculo caput ob-
 oppositum tamquam paralyticum sanant. Sed quando a Scirrho in ipso contracto stipum
 musculo aliud requirit remedium. Anfractu argenti vivi, embrochia, emollientia
 fomenta

Morbi.

Puyeh. ob. 31

(63)

Se mesenteria putrida invenisse refert.

Puerina

Ventricis
dolores

Sampzweerde de Naturali molarum uteri hutor. pag. 229. 8. Lugd. Bat. 1686

obstructione

puella octo annorum valetudinaria in atrocem ventris dolorem incidit: tres vel quatuor
a post partum horis incipiebat, & ita ferox ut inconvulsionem, & admirandam corporis flexuram
& saltum quandoque ob doloris acuitatem 4 vel 5 ped. altitud. detruerent: indig. macilen-
tior facta moritur

Cadavere omnes ferme Mesenterii glandulae crassa carne imitae coagulato
erant; chylo. exatque per glandulas nondabatur. &c.

Hypochondri-
acy mby

abscessus

Ex Bonet Sep. Anat. lib. 1. § 9^a oboro. 37 p. 237.

Patrius intemperatissimus in affectionem hypochondriacalem incidit, aderat nae-
sea continua creber vomitus & tristis cogitatio: sensit horrorem; tumor appa-
rens sinist. & idem circa pubem, maior minusque, qui vesicam comprimere urinae
difficilem reddebat: causa, flatu reducatur: tandem ita magnus excrevit he-
mor ut de umbilicum & sinist. latus se extenderit & spiritum redderet difficilem
cachochymus factus per 2 menses sub morbo luctavit mortuus.

Cadavere: abscessus inter tunicas mesenterii inventus est.

Scrophula

Henr. Merdorn: de Abscess. Intern. Natura. pag. 62. Ed. Lipsa. 1718. 4^o

pleniusque

atrophia

dolor, grava-

tury vomitus

aliqua adstricta

colica, febris

culca, diarrhoea

taby, mors.

Cystici tumores, sup-
purationes, melicerides,
lutei, cretacei: hyda-
tides. Wharton de sup-
pura.

Hic Auctor refert se multa cadavera vidisse tumorebus variis oritur a glandulis ducentibus
fuisse Mesenterium obfistum: hunc Scrophula, quae plerumque Mesenterii, & pulmonum tun-
iculis affectorum; sed hic possunt latere tumores sine Scrophulis.

Mediastinum.

41
Medulla
oblongata.

Nervi.

Hunter observ. Medic. Anat. Chirurg. Anglice. London 1755. 4^o p. 144.
Observ. 38. Refert. " The last mentioned Patient, whom I couched for y. Cata-
ract, was afflicted with another remarkable Complaint.
= He had not y. least power to move his right arm, but was obliged to
= suffer it to hang down useless, yet retained y. Sensation of y. part.
= His right foot was in like manner affected, except that he could
= stand or walk upon it, though not so well, as with left foot.
= On y. Contrary he could move his left arm, and leg spontaneously;
= but what was more surprising, there were without any sensation, so that
= he could not distinguish any thing by feeling.
= And indeed when these limbs were dipped in cold water, or
= in warm, he did not perceive any difference (in y. left side: y. Skin of
= left side might be burnt, or scalded, it gave it no pain, or Cured or pricked
= with needles, without having y. least Sensation. &c.
It tunc judicat nervos sensus ad cutem decurrere, diversos ab illis
qui ad musculos, qui motum edunt.

Morus et
Sensus a Nervis
diversis

Nervi. Quam proponi de Consensu caput inter Ventrículum questionem acutissime investigabo adnex
 = tot in corpore reuanti: enucleandum est sexti, & octavi parii Systema vniuersum, maxime in
 = abdomine, tempestas parum sinit curiositati anatomicae indulgere; Expectanda iterum est
 = occasio, qua foetum, vel iunioris Cadaver accipiam / odi enim talia in brutis inquirere / quae
 = tamen mihi facile erit. In praeparatiz enim raro possumus vniuersum Systema servare
 = quamvis propositi implere. Sic bina Corpora, ut ex vno eruiam totum Alteriarum, ex altero
 = vniuersum Systema si tertium, nervos potuit Eustachius: Interim aliquid.

Tibi, vir clarissime, dicam, forte paradoxon.

Concedo totum Corpus Consentire

Concedo totum Corpus Consentire per nervos

Concedo totum Corpus Consentire per nervos vniue

Nego interim nervos Consentire

= Per Consensum Corporis intelligo verum doloris, vel voluptatis Sensum. Consentit etenim
 = Corpus (ut ita dicam) per Circulum Sanguinis: in eo Consentit per vasa: quod non in nervis: quia
 = demonstratum est omnem fibrillam nerveam esse Solitariam: Horrendum opticy nervi
 = (vel potius ejus expansio) videt monstrum; moventur mox omnes fere musculi; ipsum cor
 = Celeriori motu Contrahitur: Peraguntur haec omnia ope nervorum: Sed aliud: Titillan-
 = tur nares, per quas distribuitur ramus quinti parii (ut omnes afferunt) mox sexti pa-
 = ris, totum intercostalium Systema, vagus, forte liquidem octavi paris rami, Convelluntur,
 = Convulsi movent musculos, qui respirationi inserviunt: Unde Sternutatio. An ergo
 = inter illos nervos auderet qui negare Consensum? Salvo meliori, ipse nego: Nullus, cum
 = nervo nervi confluit: omnis fibrilla, distincta penitus ab alia fertur distinctissima ad
 = partem destinata: Ponam; unicum myculum dividi in centum milia fibrillarum motuque
 = ponam, omnem fibrillam myculorum donari fibrilla simplicissima nervea; non ne sunt tot
 = distinctae origines in medulla oblongata, aut Spinali, quae junctae dein & membranis in
 = volutae, faciunt, quod anatomici nervum vocant: Sic simul deferuntur ad partem destinata.
 = An non ibidem omnis fibrilla sibi agit? & actio in vno musculo a nervo, est ut
 = actio omnium nervorum in omnibus musculis intoto Corpore? Et an non idem est verum
 = in nervis, qui sensum faciunt: Hinc concludo minus forte sanus nervum cum nervo
 = non Consentire, quia nervus cum nervo nullum habet commercium; & liquidem per nervu
 = intelligo ultimam Solitariam fibrillam. Omnem itaque Consensum puto haerere in
 = vno Sensorio Communi, non relative, sed immediate; nec despero posse explicari, quomodo ab
 = ingrato Spectaculo, Sonitu, tactu, gustu, olfactu, imaginatione &c. affectum per ner-
 = vos Sensorium Commune, per alios nervos emittit motum, qui facit Corpus Consentire, ex
 = ipsis hydraulicis, & hydrostaticis, modo assumamus spiritum esse in nervis, qui actionem exercet.
 = cuius subtilitas modo est respectu nostri.

= Hanauld demonstravit ramum nervi cuiusdam si satis magnum, qui, oriens ex ple-
 xu ganglii formi semilunari Vieussentii proxime ad plexum mesentericum ascendere
 ex abdomine in thoracem, & in auriculam dextram cordis quae basia, ubi plu-
 res dividitur. Hist. Acad. Scunt. 8. 1737.

Morbi

Psych. observ. 81

(69)

Ossa tentantur teneritudine ita laxa, ut inde ortum ducant tumores
 laxi, magni, nullum pus, pinguedinem, sed sanguinem liquidum a-
 quosum: Si aperiuntur lanceola citius moriuntur ~~in~~ affecti: Ideo me-
 lius est ut perse aperiuntur & excoercentur, & hoc modo vitam serius
 trahunt. Si dolore nascitur, augetur morbus hic.

tumores

Ex Museo Imperial. Petropol. scrip. XVII. 118. n° 28.

Mollities

Corta foetus aliquore acidiora ita mollicata ut nodus in illa posset fieri.

Fragilitas, Flexibilitas, solutio

Uide Philo. Francisci. vol. 48. p. 1. pag. 297. § 44. by Dr. Pringley.

Oesophagus.

Morbi

Tumores

Tapius lib. cap. 44 p. 82

Inter asperam & oesophagum tumor quidem nascitur praeter naturam, aliquando latus, aliquando conspicuus; primum coarctat, mox occludit penitus gulam: Signa sunt Angustia gulae, spiritus difficili, gutturi fervor, Sputa Salsa, perennis salivae Scretus; pars digito explorata, tumorem, magis planum, quam acutum ostendit: Utrum hunc passa tumorem guttas tantum aliquot lactis deglutiret poterat. ad mortem:

Cadavere tumor apparuit Carcinomatodes: Illius radices per totum collum distributae erant, praesertim circa gulam: ob has ita pressus era oesophagus ut filum intrinsece crederetur. Arteria cervicalis nimium distenta: angustia tumor carotidem comprimebat?

Circa mortem deglutire possunt, quia corpus tunc omnem elasticitatem amittit.

Cartilagineus

Ex Mem. Chir. P. tom. 1. p. 489

Ibi ex Sampsonio in Miscellan. Curior ann. 16— & Boerhaave de oesop. deglutitio affect. ex deglutitione impedita inventus oesophagus cartilagineus, ita impedita contractus, & ad longitudinem tantam, ut a clavicula ad ventriculum ne sui seipsum quidem admittere nequiverat.

Ruptura ex abscesu Hunter observ. 462 pag. 531.

Refert quendam abscesu pulmonis laborantem dolorem acutissimum tolerasse per aliquot dies ad tertiam quartam ve vertebrae dorsi; tandem huiusmodi succubuit. Cadaver aperitur: in pulmone invenitur

marisupium tamquam gelatina, purum, mularum analepticarum, quo contra morbum sorbebat, & haerebat, plenum: mirabantur unde hoc; natus oesophagus, invenitur perforatus illo in loco ubi inflammatio, denique abscesus sui speciem dedere.

Boerhaave rupturam oesophagi vidit post vomitorum aerem in Cornu Wafflerar.

Ego ipse Petropoli vidi rupturam oesophagi ortam a gangrena ventriculi, nullo precedente vomitu: simulac ruptus fuisset clamat ager, se mori, & mortuus invenitur: Sanes multa, quae per foramen oesophagi in cavitatem intraverat pectoris invenitur: dicens ego, non sine digere mori, Cadaver.

Ocul.

Extrait d'une leure datée a 5 Juin 1742 de Mr. Ens Disciple de Mr. Albinus Professeur
d'Anatomie a Leyde

- = Moni. Albinus avant deux ou trois mois par un billet affiche ala porte de l'Academie
- = a fait inviter tous les Etudiants, & dany leur presence il a institue l'Anatomie de l'
- = oeil apres qu'il a doucement oté les humeurs, il dit, Meilleurs; Je vous veux mon-
- = trer une chose nouvelle, bien que je l'aye déjà trouvé avant huit annes: il mit le
- = bulbe dans l'eau, & au Centre de la Retine il nous a montré un processum cum
- = Capitulo: Je donne ici l'idée comme je puis par cette presente figure (sicet ruditer)
- = Il n'a pas ajouté l'utilité dany l'optique. & traite de la Generation Contra vermes

Inventum
in oculis
novum ann.
1742 a b Albinus

$\frac{1}{2}$ 

17 $\frac{17}{5}$ 50 §

J'ai entendu a Mr. de Buffon qu'il avoit trouvé la demonstration par quoi nous voyons un objet
avec les deux yeux ~~seulement~~ seulement plus d'une 13^{me} partie, & pas double. Il disoit aussi
Nous voyons un objet clairement v.g. comme 12 avec un oeil; donc avec l'autre ensem-
ble nous le devrions voir plus clairement comme 24. Mais par des expériences de Mr.
Jurin nous le voyons seulement comme 13. La raison est, est: ~~le thalamus~~ l'Angle
qui font le thalamus Nervorum est de 115, ou 117. v.g. $\frac{2}{13}$ l'objet qui portera
par le côté a sera vu comme 12. l'autre b comme 12 a 115 b comme elle se
rencontreront il fera la diagonale, or la diagonale sera comme 13 de côté
12 v.g. $\frac{12}{13}$ de la sorte nous verrons l'objet selon la longueur de la
Diagonale, & pour cela nous le verrons comme 13 & pas comme 24

BIUM
46/
Pinguet

Peritonaeum

Peritonaeum per morbum in duas diverfum lamellas. vide Hydropem Peritonaei Contra

Morbi

Peritonaeum scirrhorum in Hydrope: vid. 51. b.

Hydrops: epifig
na: Eius signa: incipit sensum & lente, neque prosperae valetudinis signa mutantur: tantum mole nocet & quando conunguntur aqua. Menstrua in foemina apparent statim tempore: omnia non naturalia munia rite peraguntur. H. Ac. Reg. Sc. anno 1707. pag. 510 ibi per Q signa Peritonaei hydrope Cognosci docetur.

Sventer jugiter eandem figuram servat, mutata quavis sit situs; nulla fluctuatio: tibia & femora raro edematosa, vel prope finem.

Inter duas Peritonaei lamellas aqua inter lamellas duas Peritonaei inventa fuit post mortem. Cura ibi proponitur; si incisio aperta servetur turunda & injectio- nibus depuretur & ad Cohesionem producantur peritonaei lamellae; p. 502

Scirrhus Dux. observ. 90 Cani. 1. ^{ventriculi} Dux. aurifabrum dolore rodente crudelissimo fuisse sine intermissione dolor ventri- detentum per 6 menses in marasium incidit; mort: Solum opio dolores uli immarij. inducitur dabant brevis: purgantibus & vomitoriis usque perit: Cadere Pylori, Duodenum, jejuni initium scirrhus affecta capacita- tem arctante, cum Pancreate Scirrhus.

Hydrops Peritonaei
per 44 annos
gestatus Medical observations & Inquiries vol. 1. observ. 2.

Mulier post labores violentos ineluit, petit subterraneam cameram, humidam fi- gidamque; quovis tamquam si frigore concepta; ventre dolore & circa umbilicem cepit, venter ducendi incipit: nunquam puncturam aquarum causa perferre cepit. Cadavere lamellae peritonaei separate inveniuntur; intra harum cavitatem inventa fuisse ad 100 libras fluidi fluidi, viscosi: vide locum

Morti

Henr. Meibomii de Fibris Intern. Natura pag. 66. Est Lipsia 1718 4°

= Vidi illud inflammatum, saepe plene rubrum & diffusum saepe etiam purulentum: Joh. Pico-
= lani in summi illius Historici Aug. Tuvani cadavere deprehendit pancreas magnitudi-
= nine & pondere hepatis, glandula hujus, quae alia parva sunt ovi Colombini speciem
= retulerunt, Substantia autem tota fuit duriora: Fabr. Hildanus quoque infeno-
= rem partem pancreatis in Steatoma duorum pugnonum magnitudine excrevisse
= notavit.

Durum In-
duratum
Cum Vesica
fellea obstructa.

Melancholia

Heister. Observ. 339. 4° Anglica edita. London 1755. 4°

Refert se duo cadavera aperuisse in quibus pancreas durum in venis, vef-
culam que fellea ductum cyticum fere clausum ob valvulas spirales
quibus obstructus erat: ~~Quidam~~ dum vivebant melancholico morbo de-
tenti fuere (unus mas, alter foemina erat) & mortem sibi conscivere
mergendo se: Unde Heister putat hunc morbum ortum plerumque tra-
here a vitio bily imminuto, & Succo pancreatici: hunc chylum vapi duc-
primus in putredinem &c.

49/
Pleura

Pericardium Ex. Ac. Roy. scienc. tom. 2. p. 6
 Dans Un Henyon le Coeur n'avait point de pericarde: observ. Du Verney.

Morbi

Sanguinis #iii
intus

Inflamatio et
obscursus

Dabes

Signum hydropis peri-
cardii.

Medical Essay. Vol. V. P. 11. art. 56.

Unde et hystoriam omnem: ex cordis peripheria & praesentem ex basi dext. & sangui-
nis gura exstant si cor premebatur.

Laborabat juvenis ardensissima febre cum dolore pectoris dexti; curatus apparebat
Loto optimo, ex imperato praecedentibus nonnullis syncopis mortuus. Inventus
est in membranis intersepiantibus tumor inflammatorius, qui communicabatur
in parte cum pericardio. Petrus Salus Duresus de Affectu particul. cap. VI
pag. 226 edit. Francof. 8°.

De tabe pericardii in Summa Galeni lib. 1. de locis affectis cap. 1. & Petrus
Salus Duresus. cap. VII de Affectu particul.

Morgagni Sedes & Causa motor. Epist. Anat. Medice. XX art. 36, Bonus affi-
" due cubat, sic tamen (pleuritide laborabat) ut in dextrum vergat latus: Caput
" autem submissum tenet, ut plerique eorum solent quibus pericardium
" ingenti aquae copia turgescit

Ex Epistola D. Abrah. Kacii ad me data 3 Julii. 1742 Hag. Comit.

Pulmo

Experi. = Halesii nobile^{est} experimentum, quo dixit Canem, cui in aspera arteria immixtus tubus
= ad quem adaptata vesica in aëre in aëre vaporoso ultra minutum non posse vivere
= nisi aëdat novus aër, vel externa pressio. // Vidi proprio experimento vixisse in eo
= dem aëre vesica incluso, hanc hanc adaptata anxietatibus & Sypirij maxima
= ad finem, Canem per Septem minuta, sine ullo novo aëre, vel adjumento externo:
= vixit unius mediocri magnitudinis Canis minuta quadraginta & sex, Equidem novus
= eo tempore per tubum episthomio versatilis instructum, inflari novum aërem ad
= priorem vaporosum. Ad secundam inflationem sibi relictus respiravit, anxie
= quidem per 5 minuta & sic porro. Ex his, qui aderant, amici tribus diversis horis
= gij notarunt, vixisse animal propria respiratione triginta & octo, reliquum tempus
= quo pressa fuit vesica efficere octo minuta. Vixit alter stuplo maior canis
= minuta septuaginta Septem & dimidium, in quo tentavi experimentum primo
= eadem, mox duplici vesica, qua caperet duplum aëris. Plura ejus modi
= cepi.

Morbi

Ruych. observ. anatom. 13.

49

= Ater in
vesiculis
post mortem
in hydropo.

= adhaerens pleu-
rae

Femina 40 ann. nata hydropo laborans ita difficili respirazione frequentissime ^{difficultas}
convulsatur ut livida facies, labia evaderent, mortem omni momento expectans. Mor ^{respiratory}
tunc tandem: Cadavere:

Epiploon scirrhusum: Peritonaeum crassum: Intestina contracta, vel ob
abstinentiam, vel aquarum pressionem: Vesica felle vacua: Pulmo pleurae
adhaerens: Pulmone vesiculae pellucidae erant, quae aere turgabant. Si
manu comprimiebantur aer non exibat, tantum stilo perforatae subride-
bant & aer erumpebat: nullam cum aspera arteria communicationem
habebant vesiculae illae aereae, unde ex sanguini illis adlato ortae fuerunt.
Puto humoribus serisij putridij factis & ad vesiculas pulmonis
adlatij ex his aeris elementa soluta aërem produxisse.

ex sanguine
seroso putrido
facto aër fit
intra corpus.

Difficilis
Respiratio

ibid. observ. XX
Mercator diuturna respirazione difficili, qua per casum in aquas auctior
indies evasit: Cadavere: Pars pulmonis obstructa & vesicula nimium in-
flatae, & obturatae. // observat. XXI. ibid. idem morbus eam simili symptomate

Hepar.

Hypochondria-
cus, morbus

Vitium

vide fol. 30. Sub Morbo Hypochondriacum.

Medical Essays, tom. V. P. II. art. 58.

Ulcere facto in pulmone repleri potest universum pulmo pure ab hoc ulcere, seu
tente, quia pulmones mortis non sint causa: vid. ibi Historiam, & ratio-
cinium optimum quomodo in cadaveribus sit mortis causa investiganda.

Phthisis: abscis-
sus hepatis

Sine pulmone

Ex Nicol. Fontan. Persp. & Curat. Medic. p. 55.
Puer quodammodo marasmo extinctus secatur: hepate prope venam cavam parva gibbosa
abscissa feda: nulli pulmones, vias supplebat vesicula membranosa flatu repleta
venulis exiguis munita ab aspera arteria ducentes arteria. vid. Zacutus Lusitan. Rari
admirand. lib. II. observat. 100. observat. 101.

Aqua seu aë-
ma pulmonum

Barreire observations tierces des cadavres: Perpignan. 1751. 4°. pag. 37 & seq.
Per tres observationes ostendit pulmones aqua infartos invenisse: dum vivebant
difficilis respiratio, Tussis sicca: Pulvis molli, frequens, obscuro: tamquam frigore
essent correpti. hic parum cura anti phlogistica prodest.

Signa.

Adhaerens
Diaphragmati

Ex Barreire ibidem pag. 44. observat. singularis
Miles egrotabat tamquam si frigore esset correptus; febris parva: S.M. post 3um in-
gens dolor ad sinistrum latus anidui, difficilis respiratio oboritur: ad costas spuris
extendebatur: super dolorem cubabat anidui; pulvis parvus, frequens; facies pel-
lida: moritur quamvis minus esset pluviam liberaliter sanguis.
Cadavere: lobus dexter pulmonis colore roseo anteriori facie; colore livi-
do in posteriore; diaphragmati ita valide adhaerebat ut sine ruptione sepa-
rari non posset; ubi adhaerebat colore puniceo tingeatur: hydaty in hoc
lobo aqua plena inventa etiam fuit.

Erysipelat
pulmonis.

Signum

His oculi palpebra inferior pedumque extremitates solent sub tumescere &c.
Petri Salvi Diversus Cap. V de Affectibus particularibus.

Hydrops.

[Faint, illegible handwriting in a cursive script, likely Latin, spanning the main body of the page. The text is mirrored across the page, suggesting bleed-through from the reverse side.]

Succenturia
ti vus.
infetu urinam
capere.

Unde Morgagni Epistol. 18.

Ex Instit. Bononiens. tom. ii. pag. 150.

Anatomicus Putius induxit animo nihil aliud esse, nisi diverticula quaedam quibus segregetur, & subigatur urinosum serum, quo renes fetuum plus solito abundent, tum in venas emulgentes transferatur, ut ibi sanguis ad fluendum aptior fiat. Et sane humani fetus vesica ter tantum liquoris urinae librae ter minimum continere IV, quamvis toto praegnationis tempore urinae librae ter minimum congregari in illam debeant; quare cum infetu allantoides, au pseudoallantoides si nulla iniqua derivari possit urina, existimat Putius, hunc vrum Succenturiatibus renibus tribui posse. observatio Fantoni probat: is enim puellam calculo laborantem, incidit mortuam; in rene tamquam sacculo, invenit. Putius cada- ver menitriculae hydrope pectoris mortuae; in rene ita grande ac sum- ple- rumque veri renes.

Morbis

Cancro

Hydrops

vide in M.S. de Mbu melancholicis pag. 121. & 145. historiam sub finem

Philosop. Transact n^o 482. § 2. Sam^l Glass

Buella hydropis laborabat, cui tibia non inflata: poru urinae emittebat, moritur: Cadaver e: ~~Plen~~
dexter in maximum saccum aqua plenum excreverat totum abdomen, ~~Sed~~ impletum, & Diaphrag
ma detrudentem.

Abscessus in
parte exteri
ore.

Barrere observationes tres de Cadaveris. Serpignan. pag. 52.

Pus per Urinam exibat: moritur, inventi abscessus in parte exteriori renum ex quibus
pus ad vesicam pergebat: intus sani, neque in vesica abscessus inventus fuit: fe
bre laborabat suppuratoria dum vivebat.

Morbis

Bartholinus (U.S.) Cent. 1. histor. 38: refert de melancholicum, natura, vel
Curis non ait, detruncatum aperuisse cui renes succurritati maiore cavitate
ampla: ~~de eadem~~ apud Bonet. lib. 1. § 5. lib. 36 p. 237.

Maxillaris

Nobi
Polypi
in Maxillari

Rupich. obs. 77

Intra maxillarem sinum polypus natus, adgingivam descendens cauterio
exproptus, avulsus molantibus dignot-dentibus. Vidi ego tumorem ingentem
post avulsam dentem inferiorem; excrevit immaniter, ita ut os obtureret
radix mali in sinu maxillari erat: Chirurghi malum secundo exasperant
re: mortua tandem.

81

Testes.

Laesi testibus ~~vis~~ tuisset, respiratio afficitur: quia nervi, qui testes pertingunt, diaphrag-
mati inferiunt: per immoderatum contum, huius latera jam fatiscunt tuisset, inane aspidia:
Scurculum dolet Cordis: vide Gunz Comm. ad lib. Hipp. de Humoribus pag. 227, 228

Mobi
Herniae

Ex Ac. Sc. Hist. anno 1701. M. pag 271. H. Meri Candidus

(82)

Ibi plex casus refert quibus vixim fuit intestina cum peritoneo ad Scrotum Vomitus
descendisse: Etiam omentum & anulo Vasica spermatica amplexum fuisse: Etiam Singultus
Musculorum aponeurose ventris herniam Compavisse, conjuncti Simul integri
nis & peritoneo

Via observ. pag. 288 quando urinae integra Suppresio & cathetere ve Icturia
sica explorari nequit, tunc cum tricipite Cava (hoy quanti) supra oria pu curanda.
ty, vel supra eorum Commisuram ubi recti muscoli conjunguntur per perfora
savesica

Hippocr. de Humoribus § V. Ed. Vander Linden. pag. 322. tom. 1.

Ventriculus

Quemadmodum arboribus terra, ita animalibus ventriculus nutrit, calefacit, & digerit.

frige facit.

Dilatatio Abdominis ad omnesque se extendit & implet lethali, vomitu, alii adstricta:
Ventriculi Viri Historiam. Medical & Philosophical Commentaries vol. 2. Part. III pag.
294 ann. 1774. London. A. Duncan Scoto.

Pylorus.

Morbi Ruych. 61. 39.

Scimus Iuvenis dolore ventriculi diuturno cruciatus, vomabat etiam asidue, animi deliquia: aliquot ante mortem horis vomens negra: Cadavere.

Scirrhus inventus infundo ventriculi pugnum magnitudine aequans, materia nigra, tenaci refertus.

Contractus ibi observ. 68.

ibi observ. 68.
In cadaveri Nobili ventriculus ita arctatus apparuit ut intestinum referret:
Lugd. Batavor. 1730. vidi in Norocomio cadaver apertum a D. Chat. Professore
Med. in quo ventriculus eandem, ac duodenum capacitatem aequabat: Hepar
duntaxat erat abneque ingenti, quia ventriculum comprimebat, arctavit.

Dilatatus Sylvestris 16i. obi. 74:

162. obs. 74:
Fame canina faemina laboravit: tormina ventris assidua: Cadavere: tantum
2. lotus tantum inventu fuit, ut digitor omnes manus intromitti possent.

Pylorus dilatare tantum
Pylorus dilatatus
Pylorus dilatare tantum
Pylorus dilatatus
Pylorus dilatatus
Pylorus dilatatus

pylorus *obtus*
Ex Bonet. S. Anat. obs. 33. tom. 1. p. 234.
Invenis temperie cholericam postquam potum multum, aut vappa, duby erat enim
quem accusant, incidit in pondus in stomachi fundo; ructus foetidos, flatum in abdomi-
ne defectionem cineritiam foetidam, diarrhoeam emulans, astum: Distentiones
hypochondrii; metus trinitia. post multa adhibita remedia subsequantur, lani-
nationes, distentiones, deliquia animi, edematosis pedibus, fluxio ad aurem, brachium
fameur (An paralysis) ventriculi motus invenit. Coma vigilans moritur.
Incedendo ventriculi atamento similis Copiosa & maxime corrupta ma-
ut vix pennam intrudere

nationis, distentionis, & ventriculi motus inventus
 famer (An paralysis).
 Cadavere: Infundendo ventriculi atramento similij Copiosa & maxime corrupta ma-
 tione foetida; pylorus surrhorus arctissime clausus, ut vix pennam intromittere
 possit; mesenterio surrhorso, lapidoso; Sanguis ibi contentus ater: reliqua naturam
 obervantia praeter in corde multam pinguedinem.
 In attento dato, malo hic initium sumpsit, morbus?

2^o attenuato, dato, malo. hic vitium sumptu, morbi?

Cancer, Humores Ex. Henr. Merbomii de Astrac. Intern. natura. Dreide & Lepia 1718. 4^o pag. 43. & 50.

Capitata arcuata

Ex Henr. Merbomii de Alac. Intern. natura
Civis incipit queri de latitudine praecoriorum crurum; post novas nuptias incipit de dolore in mucronata
re fovea cordis ingenti queri, aliquando sinistrorum, aliquando dextrorum: dabat inde vomitus.
Cuius malum, crevit, simul ac assumpsit alimenta, vel potulentia, quae replicare subin-
de coegebatur.
Cadavere fundus ventriculi inventus putridus, & pylorus fluxus, Cancro depastus
Punctis glandulas inflatas referebant.

Cadavere fundus ventriculi inventu putridu, & pyloricae glandulae Cancro depauperatae, tumore Arcum trij. caecum pylori arcante, qui dissecti glandulae inflatae referebant. Vesica fellea bile duranta, & hepatis bilita.

Equi, asini vesica fellis carent: Ruysch. obr. 31.

De Bilia felly Seegeor de ortu & Progressu bily cystica Dist. inaug. Lug. Bat. 1739.
Ex variis demonstrat experimentis bilem hepaticam ex ductu hepatico ad vesi-
cam felleam adire per ductum cysticum: & quod bily fel ex hoc tantum fon-
te ortum ducere: tempore pasty, ventriculo pleny comprimitur exty kintty
vesica fellea & exit bily in intestina: Ventriculo jejuno ventriculy duo
denum descendit & bily hepatica & cystica per ductum communem in
teyrum penetrare possunt: Sed stant & retinentur: Sed cum bily hepati-
ca peger decernatur ex hepate, & per canalem communem interclu-
datur exitus, ascendet per canalem cysticum ad cystim felleam, ubi
morata spissitudinem, quem unile cystica obierant, adquiret.



§ Ex Differtat. de chylori foety in utero a Chry. Jac. Treu 1715. 4^o pag. 46

Ductus cysticus Extant sectiones duorum cadaverum in quibus inventus ductus cysticus valvulis spiralibus
valvulis spiralibus obitus: tali conformatio bili exeunti renioram necit: quo impedita morbo pan-
creaty magnitudine aucta generat: fi illi flatusus morby ex diminuty coctioni-
bus: inde pro hypochondriaci habiti.

Morbi.

Vesicula fellea vacua in Hydrope: vid. 51. b. in hydrope.

84.

lapis

vermes
in vaccis

calculus

Ruych. obi. 31.

Invenit vesicam fellea in cadavere in varias distinctas cellulas; tunicam qua bilis in
ternam crusta calculosa esse obductam. Idem fore observavit in vaccis, in qui-
bus vermes lati in poro biliario inventi fuere, qui bili ingresum in intesti-
num impediabant: tunc bilis stagnans ad canalem illum post se crustam
calculosam relinquit.

Hydrops
vermes
vaccae

hydrope

Observat. 87. ibid.

Quidam Hydropticus asceticus mortuus Cadavere: tantum cadaver inventum, praeter solitu-
dinem Hydropticus asceticus mortuus Cadavere: tantum cadaver inventum, praeter solitu-
dinem: Vesica fellea magna, valde dilatata humore aquoso, neque bilioso, neque ama-
ro, plena: in canali cyptico inventus calculus magnitudine pisi, qui aditus
canalem obturabat.

vesica fellea adha-
rens colo, & peri-
toneo.

Ex Memoires del Ac. de ch. Paris. tom. p. 172.

Joemina 30 annos nata, pinguis frequenter doloribus vehementissimis regione epigastri-
ca, tota incidit tandem in vehementissimos dolores cum totius ventris tensione, delirio
abortu ventris evacuatione biliosa & purulenta evasit: post septem annos ex febre
ardente moritur. Id morbi Exc. Comit. de Lowenholde fuere huius generis?

dolores
colici epi-
gastrici
frequentes

Cadavere: vesica fellea & hepatis adhaerebant colo, & peritoneo per longitudinem
triun pollicum: vesica fellea parva; tota cavitas integre occupabatur per calculum
qui vesicae universione adhaerebat. nequa quidem bili aderat, tantum hepatica.

pinguedinis
causa

Erit ne pinguedinis causa defectum bili cypticae? sana exiiente hepatica?

vesica fellea dis-
tentiissima
adhaerens

Ibidem pag. 178.

Vir 45 annos natus egrotare incepit a rheumaticis symptomatibus febre, videbatur la-
nus; paulo post marasmo confici videbatur: tunis sicca; sed appetebat, dormiebat, mara-
smus; aetate: hepatis regio tumida: extendebatur tumor ad hepate adona ilii. urinae ru-
brae turbidae: excrementa albidia: augebatur sensim marasmus, debilitas magis: mors.

maras-
mus
quantitas
XX

Cadavere: Vesica fellea distentiissima; eus superior pars hepatis adhaerebat; anterior pe-
ritoneo: per molem suam hepatis comprimebat versus diaphragma: liquor erat

calculi IX

limpidus viscosus amarus, ad quantitatem # 20: calculi 60 ibidem continerentur.

habetur. in observ. M.S. similem leg.

vesica fellea in
sacco formata
adhaerens

Ibid. pag. 179.

Joemina 65 annos nata morbo hysterico, cum colicis doloribus
rui scirrhus a cony spurij ad os ilii se extendens: dolores amarunt. tandem re-
vertuntur cum febre: alvus adstricta; irregulari febris cum profusa alvo, aliqua colicij
do: Ventris tumor dolorum: inflammatur ad suppurationem; pui ubi viam quaerebat.

hysterici
morbi
doloribus

Cadavere: vesica fellea adhaerens inegumentis ventris: parvis purulentis hepatis
abscissis inter duos myculos obliquos. vesica fellea sacculus multij contrabat. inter quos calculi
tres excolebantur in quibus tres inventi fueri calculi: adhaerebat vesica fellea inte-
tino jejuno, & vicinis partibus ita annexa ut explicari non poterat: Spissa tripla
in eju corpore

Ex calculis
bili dulci

Philosoph. Trans. 483. § XIX. Haller 111 Vesica fellea flavabilis vix amara pl-
na & calculis ad viginti exiguis, angulosis, quorum unus ita obidebat ostium ductu
= cyptici, proprius paulum cholidicho, quamprimum cyptici valvula, ut bili, contra quam,
= solit, ex vesicula promendo expelli non poterat. Dulcedinem mobile, quando
= in calculos coit, plerumque reperi solit.

Uretres

Mortui

apud dilatati

Calculi

Pag. 161. 54

89

Mulier vehementissimè dolentibus urinam reditura. Dui tanta moritur: Cadavere Calculus inventus in uretere supra insertionem vesicae: Uter tantum locum sibi sinxit ut ejus ~~hanc~~ Contenta esset in cavo: Ureter deinde valde crassus in sub Hantia, Lamphy.

Ureteres coaliti

Ex Philoiph. Transact. N^o 474 Art. XVII: pag. 207. M^r Huxham. A. Colici Femina calculi renum tabory unum pelvam urinam obturat ureterem: collabuit & dolores. Coalita manet: quoniam per Syphonem nisi fuisset liquor, ne fuita quidam adversum pervenit: lege Corpory, Uasorum, quibus si humor deficiat coalescent: Canaly arteriosus, Uachus, vasa umbilicalia atendant. vide locum Ubi de ventriculo, pyloro, hepate, intestitini morbi variis tentati agitur, Ubi de coalitione vncorum ob defectum rois ex omento, & peritoneo. vide M. S. Practicum titulo viscera coalita: vide Sy Cooper Anatomia ad Intestinum Colon.

Urethra

Morbi
Ischuria

H. del'Ac. des Sc. tom. 1. p. 402

Miles ischuria laborans tentata cathetere exploratione vesica, quae frustra, quia in
traduci catheter non poterat, ^{nisi ad initium urethrae} moritur: Cadavere: Ureteris Sani: Urina putri
da vesica plena inventa fuit: Cicatrix inventa fuit ad urethrae initium:
Illa Cicatrix Canalem urethrae aetate fecit; hinc quae vocant Carnositates
originem trahunt, quamvis diverso sensu. Mery observavit.

Uerikulae
Seminales

60
86

Venus.

Placenta Ex Hc. sc. hist. 1702. pag. 211. Oberv. Lure: placenta in initio foetus mai-
or, quam sub finem: crassior & sanguine turgidior ~~quae~~ in initio: ideo
difficilior abortui, quam partui: & facilius intra uterum latent, quam post
naturalem partum.

Menstrua ibidem: Menstrua ex utero prodeunt: minime ex vagina. ibi re-
fertur utrobique menstruatui uterum os ad labia addere tunc
temporis menstruationis

Duplex Ibidem. 1705. pag. 47. & la Mem. pag. 382
In puella bimestri inventus duplex uter, cum duarum vaginarum in unam definen-
tium canalibus: hinc superfœtatio oriri potest: Singulis his uteris unica adnata
cebat tuba fallopiana, ovarium, ligamentum latum, rotundumque.

Vagina } Ex Philop. Transact. H. 422.
obturata } Amyand Urinae suppressionem observavit ortam a sanguine in vagina
obturata & adnata detento: quia ante 8 menses illa parturierat mulier
duos ediderat ~~non~~ pueros: tunc myrthiforme caruncula ita lacerata,
fieri ut conglutinerentur & ostium vulvae, seu antrum clauderent:
per pondus urinae supprimebatur: facta incisione decussata, & sangui-
nis huius exire; tunc libere urina exiit.

Superfœta-
tioUrina suppres-
sio

Morbi. Uteri

Hydatides

Molae

Ex Puych. observ. 28.

67

Sunt hydatides in utero ex relictae placentae frustis, gestata foetu per 2 menses: accidunt aliquando ut molae fiant & ab utero exeant, quarum origo a placentae frustis ex abortu felici, vel tempore gestationis proximo partui: hinc quando placenta junior, id est, duorum, vel 3^m mensium, frustra relinquuntur mola exeant: si placentae prope partum, fiunt hydatides, haec magis, quam illae uterum distendunt.

ibi. obi. 33.

inventas hydatides fuisse in utero, ortas a placentae imatura relicta. Nam hepar & renes aliquando in hydatidibus abeunt, vasij uterini in vesiculis abeuntibus: in Hydrope frequentius. ibi obi. 46, ubi hystrina hydatidum in ventarum humorem tenacem continentium.

hepar
renes

Hydrops

Hist. Ac. Scient. ann. 1702. p. 214

Post partum lochia, ob Animi perturbationis molestas, retenta fuere: in hydropem incidit. tunc cum tricuspidi cava ex abdomine aqua varii coloris, & consilientia putrida non magna copia exeant: ineresunt subinde, & umbilicij sponte umbilicij aperitur, quo facto aqua collectae, fluant curatur mulier. Venter nunquam ita tumidus fuit, ac duras: (Ideo puto ex sanguine retento, corporis, sanguinis que compage non destructa, lochiorum ortum duxisse hydropem).

Scirrhus

Polypus
cordis

Philos. Transact. n. 481. § V. pag. 285

Anna Hicks inter 30 & 40 annum frigore correpta laborabat peripneumonia pulvis deprehenus, cordis palpitatio difficili spiritus: S. M. celebrata parum profuit: cordis palpitatio, dolorque mansit: Cadavere

Venter elatus ita ut gravida putaretur: apparuit uterus magnus, durus quam valde: inexteriori superficie duo corpora dua pendentia & adherentia ori magnitudine; due adhuc similes, quamvis minores protuberantiae apparbant: Substantia harum protuberantiarum non ita compacta ac dura ac illa uteri: ovaria & tuba sane fere. Substantia uteri cartilaginea. Similem refer Puych Per. Anatom. X. n. CVI. in vetulij ab illo observatus Scirrhus: sed haec femina cujus in historia fit mentio juvenis erat Caustatibus adhesionibus variis. Corde dextro polypus canerum.

Inflamatio nervorum uteri

Ex Hist. Bonon. tom. II. part. 2. pag. 185: vide totam Historiam M.S. de morbo Melancholico & pag. 148.

Fetus extra uterum

Ex Hist. Bononiensis. tom. II. part. III. pag. 251.

Similis ibi Cypriani historia est: fetus novimestris in cavo abdominis inventus: Corallia rursus: dum parandi tempus erat uterum aperiebatur ac in vera parturientibus, quod negat Cyprianus. 2^o nullum gravidationis signum certum esse: 3^o operationem qua fetus extrahitur scilicet abdomine periculo non carere ut Cyprianus affirmat: haec enim mulier facta operatione mortua fuit: placenta multum turgida vasij intra abdomen inventa fuit; unde per placentam nutriti foetus: perinde naturam tunicam seu sacculum intestino ileo adhaerere ita firmiter ut per difficile sine laceratione extrahi non potuisset.

Ovaria

Signa partu
peracti in
dare.

Ex Hist. Ac. Sc. 1701. M. p. 109

Quando ova impregnata ab ovario exeunt cicatrix relicta est: per quam in cada-
vere cognoscitur quanta edidit partu femina. Ita vidi in f. ~~Boetii~~ Boetii.

Mortui

Ex Hist. Nat. Scient. torn. II p. 244 - 245

Foetus inventi
ibi

In ovario cujusdam faeminae abicepsu tentato invenit 2 Meny os mandibula
superioris, & dentes ita abrotuti, ut horum aliqui sibi decem annos jam natoj vide
retur.

— ibidem. pag. 31

In ovario puellae 18 ann. nate apparebat infans, sed monitrosa figura. tamen
dentes oculi, capity rudera observari poterant.

Ibidem 1701. M. p. 109 & seq.

Foetus

Intra ovarium inventus fuit fetus.

Ibidem 1702 M. p. 108

Febris

Foetus

Hydrops

Orde Philoſoph. Vanyae. n.º 466. p. 223.

ovar. Tympanit.

Communicavit mihi D. Kaau Boerh. ovarium cum eubj. Vtero, vagina femina ju-
venis ex frigoris vi extincte, quod ovarium aqua supernatabat: aperui lanceo-
la exit flatu multu & parum sanguinis liquidi: erat dytenty pluy solito, nam
fuit factu hic tympanit. inflando arteria, aere tunc repleta fuere
pugnum pueri. aquabat, ille ovarii; hunc enim enni dedit; hoc mihi Dom. Kaau, qui inflavit
demonstravit.

Puer. obier. 60: Cent. 1.

Refert viduam postquam arthmate, peripneumonia a frigore incaute suscepto, palpitatori-
bry cordis, varia quamvis fuerent ex arte adhibita remedia, cum S. M. tum contra
inflammationem & spirituum ataxia mortuam subito cecidisse.

Gangrena

Cadavere: Mediastinum pleno sero sanguineo: pulmo inventus materia
purulenta repletus: Ovarium sinistrum ovum aquabat; colore nigricante, in Hyperst.
tuy gangrenam referent; nucleu interny erat grummu sanguinis putrefactuy. palp. cord.
foron hic for. illorum hypericorum quibz erat obnoxia, & palpit. Cordis.

distenta, Hea-
tomate

Ex Hist. Academ. Royall. de leun. an. 1707. p. 26.
Nihil ibi lectu dignum prater mollem ovarionum, quae partes adjucent, com-
primendo macerando in putredinem conversa fuere.

Tubae Fallopii.

Observatae tubae Fallopii fuisse obturatas, aliquando ad uteri insertionem aliquando ad earum finem: Causae sunt partus dolori admodum inflammationem tubae inducentes, vel ventris doloris inflammatorii: Sorenavit At simul ac tubae hae esse claudae ovarii esse connexas:

ibi observ. 84

Aliquando lochia per tubas Fallopii valde dilatatae, in pelvim intrarunt dilatatae. Lochia.

& mortem arceperunt.

ib. obs. 85

Etiā sanguis menstruus per tubas Fallopii ad ovarium usque, dilatatus Menstrua-
perungere & adhaerere potest.

Foetus intra

Ex Hist. Nat. Sc. 1702. M. p. 206

Joemina cadit ingenua succusu violento post 6 horas acerbis doloribus ventris conqueri caepit. dolores per 28 horas assidui fuere. menstrua tunc apparuerunt, singulis diebus minora evadentia: hoc per septimanas sex tunc frigidus sudor, facies pallida, venter durus, nausea assidua, difficilima respiratio, fere aphonia, lipothymiae, pulsus parvus intermittens: mors: dum in extremo mortis labore erat de dolore ventris acuto, de quadam valva decussata & infra diaphragma sita amare querebatur.

in Cadavere: foetus intra tubam fuit; & tuba fracta: vere ob casum, ex quo omnia mala.

Foetus

Ibidem 1702. p. 198

Joemina ex alto cadens impeditur gravida post 5 hebdo madae febri Corripitur acuta, moritur intra v. dies. tuba fallopiana foetus in

venit. Ibidem Doct. DuVerney monstrat foetus in cavitate ventris in ventris cavitate inventos prius intubis fuisse, & ad ventrem fuisse protrusos.

Morbis

Ruych. observ. 44

Cursa calculosa. Puella ludens pilam ambrae parvam in nares adiecit. ibi mansit occultata: do-
lores deinde pariebatur molestos: 14 stat. anno sternutando pilam eiecit
curta lapidea obductam: Idem cum cerasi nucleo nare detento obvenisse
ibi refertur:

Unde evidentissimum est omnes nostri corporis liquores aptos natos esse
ut in Cornuam substantiam, calculorum evadant, simulque plus solito de-
tineri, ferri.

Valvulae CordisValvula quatuor in Arteria pulmonali. vidi Morgagni Epist. 34 n.º 15. Sedley & Causa Morborum

Morti

osseae

Ruych-obervo-69.

(91)

Mercator diuturna orthopnoea, ante mortem pulsu debilissimo, ut vix perciperet, leprothymii sub avido moritur: cadavere: valvulae semilunares omnes inventae ⁱⁿ clausae & connexae simul, ut nulla, per quam ex corde sinistro sanguis iret pateret exitus

Foramen val-
= valve semil.

Vidi ego in Valvulam semilunarem ruptam, ita ut foramine esse aperta, limbus Valvulae hujus operis erat: Ager dum vixit profunde in pectore dolorem sentiebat: palpitazione Cordis ingenti detinebatur: mortuus tandem: hoc accidere possunt per Verbera & Contusiones violentissimas in dorso; & levibus ponderibus vno Conatu. Petropoli San-
= hant pontissimus Chirurgus demonstravit mihi.

Morbi

Ex Ruysch. obi. 82

(92)

Simul ac alveoli dentium carne, vel tartaro obturantur dentes vacillant, cadunt:
Etiam illi, quibus gingivae deficiere incipiunt dentes cadunt, deficiunt ob
eandem causam vel male affecta maxillae osse.

Vesica Urinaria

Oleum agnidalax.
dulcium cum
urinae relictum

Ex Insiti. Bononiensi
tom. 11. part. prim. p. 218

Refert Bacchetony ubi Medici lithotomy puellam febre ardente detentam ijchuria con-
reptam fuisse 3^o a morbi insultu: oleum agnidal. dulcium medici exhibent: incipit
nam urina suppressa erat: cathetere immisso die 4^o 5^o 6^o & 7^o urina hinc plures
exiit: At septimo res mira, exiit Urinae duas Congruas octo, plus, quam
oleo assumpserat, oleum agnidalaxum dulcium Tertio antequam assumpserat, puri.
Colligit ex hy Bacchetony opus esse ut via patula sint & inventy brevior
quam anatomici urinae invenerunt, alia per quae a ventriculo ad vesicam illud oleum
ibi iram quassavit.

Morbi.

Lapis

Ptychium Observat. 89

(92)

Quoniam 25 cui lithotomia fuit administrata, tenaculis calculus ob ingen-
tem molem, cum totam vesicam impleat, extrahi non potuit: Vesica admo-
dum crassata pollice crassa erat: in ap. interstitij materia purulen-
ta erat similis purguedini fusae per ignem.

Spina cras-
sa purul.

Hernia
Scroti

Fuit hernia scroti vesica illic descendente: ita Prusich. vidit observ. 98.

Calculus
in Substantia

Ex Mem. Ac. Sc. 1702. M. p. 26. A. Livre

Inveni duo calculi fueri intra vesicae tunicae. In rene sinistro in interno ul-
cy inventum, & a calculo expulso parva formatum, per ureterem descendens & vesicam
intraturus detinebatur: inde ab ap. & calculi reventi: Hi calculi reddere uri-
nam facillime possunt: investigati cathetere frustra: Cognosci morbus potest si
digito in viri in Intestino recto, & foemina in vulva & cathetere intus vesti-
cam calculi comprimatur: facile inveniri potest: & cathetere vesicae
tunicae descendere, ut in fundum cadant vesicae. Cognoscitur morbus ex
urina seroso-lactea.

N.B. ibi demonstratur fere Calculum vesicae parietibus internis
adhaerere non posse.

Calculi in sacco re-
positi in vesica
inventi — —

Philosop. Pharmact. N.º 462. p. 11.

Intestinum *Coecum* Ditus processus vermicularis caeci est ut in eo maior liquoris tenuis separatur & ad caecum demittatur, ut faeces ibi durae factae cum illo liquore mistae facilius in Colon intestinum abeant: multis glandulis, per quas Sucus ille solvens separatur, Constat Processus ille vermicularis.

Morbi

Ex Ruyssch. observ. 35

14

Intesti. recti scirr-
phus

Homo melancholicus Stranguria assidue valde incommoda: deinde difficulta equali
album exonerandi: miserrime vitam, ad mortem, egit: Cadavere: calculi majores in pel-
vi utriusque renis: tertius maximus in renis substantia dextri: Vterus & vesica
lana: Intestinum caecum ita adhererat ut malleo tantum separari potuerit:
erat scirrhus, carneum, cavitas paleam tantum continere poterat.

Idem. observ. 36.

Idem fere casus, Vbi tantum intestinum rectum scirrhus affectum erat:
excrementa exitu non habebant: ideo remedia tantum lenientia hic: Senior
C. de Louenvalde hoc morbo in ^{canerum} scirrhus verso propter empiricorum inscitiam
mortuus est anno 1734.

Sanguis ex-
transatus
in abdomine
Corde jejuno

Appendices pinguedi-
nosa

Femina 20 an. mater, mire ob animi motum lenem perturbari solita: flatu, lasi-
tudo, falsam mentebantur graviditatem conatus ad vomendum, torminibus abdominis:
subsequens ingens vomitus post aliquot menses: dolores immenses ventris, mors.

Scirrhus putridus

Cadavere Aperto peritoneo Sanguis multus extra vasa in gyris intestinorum: Cor
exsangue. Lun. putridus. Intestina recta utriusque latere externe 20 appensa
erant tamquam mactata pyra, quae dissecta, pinguedinem continebant: neque
apertae ferre poterat, & frequenter tenuissimo laborabat album exonerata.

Ex Communi. literar. 1740 Hebdom. 30. Mens Julii

Volvulus

Ex Liberis ad med. D. Schreib. 17²²/₁₀ 42
Vidi volvulum, nunquam opinor descriptum, nempe Intestinum ileum, Caecum $\frac{7}{8}$ Intestini
Coli, ingreſſa erant intestinum rectum & $\frac{1}{8}$ Coli: chirurgi symptomata morbi non obser-
verant, dum in vivis ager erat.

Ex Ac. Scient. Hist. 1702. p. 234

Ossa fati, qui
in ventris cavitate
erat, per I. R. emi-
ſa

Femina os humeri sine carne per I. R. eiecit: praecesserant per
10 menses dolores Ischiatici, costarum, hepatis, febris, sp. diffi-
cili, haemoptisis, marcor, febris assidua: Menstrua regula-
ria aderant, uterum integre sanum: fati ex tuba fallop. in ca-
vitatem uterini incidit: manu & forficibus, quae per anum & for-
men intestini recti ad cavitatem pergenz introducta fuere, secan-
tibus, arripuntibus ossa crurii & reliqua multa arte, patientia
ejecta fuere & mulier ad integram valetudinem redacta.
Mery insignis chirurgus perfecit: ~~laxa~~ non poenitebat,
historiam, patientiam, & animum operanti, & aegroti fortis
cupere ~~videre~~ legere.

Colici dolores
flatu multo

Ex Philoſoph. Transact. N^o 422. § IV

Quidam 40 annos natus temperamenti cholericis, jam ante longum tempus doloris
colicis (in hypogastrio praesertim) & flatibus continuis tortus. Tribus ante mortem
annis defectiones biliosae purulentae, aliquando sanguineae, aliquando mucilaginosae,
dita frequentibus aut aliquando vicis album deponeret intra breve tempus cum affi-
duo teneſmo: sub finem harum evacuationum Caruncula fungosa, livida, nigra
nec morchatae magnitudine excreverat. aliquando alvi adstricta, aliquando laxa:
cum appetitu ingenti & volaci aliquando, aliquando portato: indies langueret,
sicque vivebat, color plumbeus, frequenter ~~laxo~~ colore, urinis paucis, biliosis.

Ulcus
adhaerentia
Recti &
Caeci

Cadavere
Omentum scirrhosum: bily vesica semiplena bile nigra: hepar scirrhosum tu-
berculis duris, albidis: Pancreas scirrhosum: Intestinum caecum in pelvi de-
berculis duris, albidis: Intestinum rectum adhaerebat, communicabatur per ulcus: ambo intestina
Recti Intestini trunsum & cum Recto adhaerebat, communicabatur per ulcus: ambo intestina
gangraena affecta: recti intestini ³ gangraena ² membrana interna corrupta, cum
glandulosis Corporibus avellanam aequantibus nigris, duris: ambo intestina ita putrida
ut

vide pag. 70

Morbi

Fissurae
tabulae inter
naeEx Tulpii observ. Annot. 1672. 8^o. Cranium obi. 2.Cerebrum syde
ratum

Quidam sclopato in occipite ictu, Concidit protinus, foras vix lesu: febre, Convulsionem; trepano san-
guis supra membram lantum exiit. 6^o mortuus. Cum terebra aperiretur Cranium guttae sanguinis stillabant
ex universa calvaria: Dissecto Cranio foras calvaria illaesa; interne variae secundae tabulae rinae, ap-
paruerunt: Dura mater lunda, Cerebrum syderatum; venae leerae, ad basin cerebri, Rete mirabile
Sanguis concretus.

§ ap. 50 § VII: quibus encephalon $\sigma\phi\alpha\chi\epsilon\lambda\epsilon\iota\sigma\theta\eta$ Corruptum (syderatum vertunt) fuerit tribus
mortuus diebus, si vero hoc effugerint sani fiunt. // Hippocrate hoc verbo non indicat integram corruptionem,
aliquando ingentem inflammationem & pressionem, ut ait 3 de Morbis Cap. 4. vide Vandsueten Comm. ad
ap. 50. B. 432.

Alma, cum
apoplexia

Ibi observ. VI.

Tremulenti cadit; attonitus fit, spiritus difficilis, vox suppressa, oris spuma: moritur: rima in calvaria
inventa: Sanguis vberim effusus, supra & infra cerebri membranas.

*Intestinum Aectum**Coecum*

Morbi

ut sine laceratione tangi nequirent. Colon excrementis duris repletum erat: quamvis multa liquida excreta erant.

Ex his sequitur

Après tous ces Circumstances il n'est pas difficile de conjecturer quelle a été la cause de cette triste maladie. l'Anatomie nous apprend que l'adhérence des Intestins soit entre eux, soit avec le Peritonaire en diminue considérablement le mouvement peristaltique (voyez l'anatomie de Cowper dans l'explication de la planche 34 par conséquent qu'un Intestin vienne à être adhérent quelque part aussi tous les excréments vont être poussés plus lentement. Avec moins de force, ils s'accumuleront plus lentement. Ils retarderont les matières qui les suivront, & par peu qui ces excréments soient durs & capables de blesser comme des noyaux de prunes ou autre chose semblable ou que des humeurs acides & bilieuses se jettent dans les Intestins, & s'arrêtent à l'angle aigu du Colon de lors il viendra à l'intestin inflammation, emision, ulcere, & enfin gangrene sur tout dans un Corps de chimie.

Ex versione Bremond.

Ruptura intestini, excrementis adstringente

Festini Patholog. lib. VI cap. 3^o pag. 158: Edit. Ultraject. 1656. 4^o

Puella septenis cum diarrhoea laboraret sollicita mater cydoniata exhibuit; reprimatur evacuatio: inflatur abdomen, distenditur, vomit faulenta, animi deliquit: mors.

Cadavere inventus coecum obstratum cydoniata: ruptum per cuius foramen contenta in cavum abdominis exivere.

venter tu
medijs deli-
quis, vomit-
mors

Pinguetudinosa vide. pag. 28. sub Mento pinguisimo duro.
Mafia.

Periosteum

Callus

Callus fit ex multis laminis perioniei conjunctim incumbentibus ad osseam ferre naturam accidentibus, minime vero ut aiunt ex succo osseo ad fracturam collecto: probant experimenta capta in ii qui scorbuto acerrimo fuere correpti in navigatione Archiatallapi Anon, in quibus cicatrices aperiebantur & Calli omnium dissimulorum disolvebantur. vide *A Discourse on the Scurvy* by D. Need differtem libri "An Historical Account of a new method for extracting y^e foul air out of Ships. London. 1749. 8^o pag. 93 & Sequent.

Morbi

tumor ingens

Ex Memor. de l'Acad. de Chir. Par. tom 1. pag. 271

97

Post longum cursum doloribus femoribus ingentibus prehenditur Juvenis robustus: languet, dolor augebatur tumor ad immanem molem totius femoris moritur.

Cadaver inventum os femoris infra trochanterem minorem fractum: explorato, quod tenebat fracturam ex epi superficie origo horrendi hujus tumoris: in medio hujus tumoris substantia ossis fuit inventa.

Morbi,
vulnera,
calculi,
vermes,

Ex Memores del Acad. de Chiruz. Par. tom. 1. p. 332

Vulnera Sinus frontalis ita rebellia curatu non sunt ut plerumque creditur: extant ibi exempla
pene curari: ex hoc enim metu Trepanum administrandum interdicitur Magni: Sed
si isti calculi, vermes extarent sine metu ~~non~~ solidandi vulneris administrari po-
terat: Magnus Boerhaave vermes Sinu frontali degenti, & ex offatu frequenti fla-
rum, in quibus Vermium semina latent proveniente fumo cineribus interfe-
cit & curavi Notchedamensem foeminam. ita & ore illius audiui.

Lien

Lienis Morbi

Magnum

Schirrhosum

idem

Putridum

Ex Sep. An. Bonet lib. 1. §IX. obs. 23. p. 229:

In hypochondriaci cadavere Lien 4 lb. pond. aequus inventus.

Ibid. Lien Scirrhosum inventum obs. 24.

Ibid. obs. 25:

Ibid. observ. 25. Suspensa mortem sibi accipit miser maniacus hypochondria ante vexatus: invenitur detracta terrena Lien putridus.

99
Hypoch.
morb.
idem

Ductus Thoracicus

Communicatio cum vena emulgenti vid. Mem. Ac. Parif. tom. X pag. 462 & seq.
X cum vena cava inferiori per vena, emulgentem, lumbarem vena-
que Ibidem. pag. 501.

Ex Philosph. Transact. n° 475. art. XXII. pag. 336.

Femina doloribus ventris, gravida, per triginta hebdomadas passae; puer per anum exiit: Uterus clausus erat, & infantis caput extra uterum tangi poterat. moritur.

Adhuc in tuba dextera infans mortuus vi mens. in pueri Conventu: si maxilla ad os matris

cohaere in tuba dextera infans mortuus vi mens. in pueri Conventu: si maxilla ad os matris

Motus
fetus
in utero.

Et costa ad spina cohaerebant: non movebatur ille in loco fetus anhelans fuit, ideo in natura
si gestacione fetus Providens Natura motus illos frequentes in utero instituta voluit, ne rige
de evadant cartilaginei ad os matris.

COR

in - all
the - 4
the - 4

Morbi cordis

Polypus cordis dextri

River. obs. 77. cent. 2^a

Sexagenaria pingui admodum religiosa, meditationibusque data per 15 an. Difficili respiratione torqueri caput; scalis, veta ascendere non poterat, quoniam quiesceret; tentata convulsio ne muscularum maneret. apoplexia tandem. Pulsus erat inaequalis, reuerens, singulis in pulsationibus. Cadavere: auricula dextra polypo carneo plena: ventriculus dexter parte interiori putridus niger, exulceratus: Lena putridus, diffusus ad quatuor. Pulmones sinistro py. / dum agrotabat nulla Cuffi concepta fuit.

— ibid. observ. 21. cent. IV.

Polypus

Generosus vir cum Rhodaro natus, naefragium ita timuit terrore fuit perculsus, palpitatio difficilis, hinc incepit palpitatio, difficilis respiratio, pulsus inaequalis, pedum tumores: mortali respiratio tur. Cadavere inventi ambo ventriculi cordis sanguine concreto repleti, in sinistro cordis ventriculo inventa sunt duae carunculae rotundae, avellanae magnitudine, arteria aorta natum praecedebat.

Abcessus seu Metastasis

Ex Barre observationibus tunc de cadaveribus: Perpignan. 1751. 4^o

Ex Gonorrhoea, Mely in abscissum: symptomata praesensunt: in cadavere py in ore putridus inter peritonaeum & pinguedinem ibi adnatam: In ventriculo dextro Saccus parvus, inventus pure plenus, ejusdem consistens & coloris, similis illi, qui in pelvi inventum fuit.

Hoc in agrote dum agrotabat palpitatio cordis aderat, febris, pulsus frequens inaequalis, intermittens: Difficilis respiratio aberat, quae in cordis polypo vel aneurysma obsidua est.

Venae lacteae

Ex Initit Bonon. tom. 11. Part. 111. pag. 485

In avibus non
sunt: vena me-
senterica hoc praestare
officium

Aves quibus in partu murebatur minera ferri; in harum vena mesen-
cis repletur notabiliter apparebat propter ferrugineum colorem, quo eadem surcu-
li ab invicem distinguebantur, praesertim ubi vasa haec a tubo intestinali ad
mesenterium distribuuntur: "Vasa haec hoc modo a ferrea substantia co-
lorata, ea semper in loco apparuisse, in quo eadem oriri videbantur ab
illis intestinis, quae adhuc contento intus chylis distenta erant; in illis vero
quae jam fuerant eodem depleta, nullus erat huiusmodi color videtur con-
finis; vasaque vero paulo remotius ab ipso: id est versus mesenterii contra,
ubi corpuscula ferruginea secundum vasorum directionem disposita in-
veniebantur. Consentunt Parvinsius, Peyerus, Brunerus in anseris, gallinae
in Ciconia, Artore, facti sunt chylum ab intestinis, non in vasa chyli formae
quae nulla sunt, sed in mesenterica vena immediate transferri

Ex Instit. Bononiens. tom. II. Part. I. pag 148

§ Jam Bartholinus, Mucicrus, Meijerus, Morgagni Vitulinum thymum longa maceratione emollivere, tum cultro unum, aut alterum maiorem lobum detractis, tunicis perforarunt, albicans exiit humor lacti Consimilis: Putum hoc addidit, per incisuram quam fecit, expresso humore cannulam immittebat atque inflabat; aer ita ex aliis in alias permeabat vascula, & lobulos universos pervadebat; qui transitu aeris de cellulosa membrana omnes cellulas invadente suppurationem dabat: inflato ita thymo aeri exposito, pendente ad succandum, occurrunt ramenta, quae sunt carnosae, dicere: haec cellulosa tunica in renibus, hepate Cerebro, sic tractatis non apparet.

Tunc vtrum statuit ex observatis thymo: hunc vtrum datum a natura ut pulmonis vtrum adimpleret dum fetus utero inclusus est: Notum jam Couperum coloratam Ceram per ductum thoracicum adactam in thymum incidisse, tum thymum chylum subigit, ut in subclavariis venas subinde mittatur, vel ad secerandum loc ad modum mammillae, Labiscentibus venis largiendum: abundat thymum quam plurimus vasis sanguiferis, quae in ipsum passim excurrunt a subclaviis, a mediastinis, a jugularibus, a mammariis, aliquando a proximis, vel aorta vel venae cae ramusculis. Liquor thymi naturam chyli retinet: ad ignem non concrevit, ut serum sanguinis, albumen ve ovi.

Ex tom. ii Histoire de l'Academie des Sciences de Berlin 1748
pag. 108: H. Ellert.

Loquitur de ganglione morbo, seu tumore, qui pot vim statam levandi ponderibus in metacarpo oritur: aperit materiam butyraceam continet: oritur ex multilagine oleo, quod membrana cellulosa qua fibras singulas muscularium fibrarum amplexitur, & ad tendinum attingit: si per vim, contusionem, vel fibra aliquot illius membrana adiposa rumpantur, tunc contentum oleum si-
tritur in ruptura, & ganglion fit: si per amputationem extirpatur, tunc
symptomata inflammatoria & Spasmodica oriuntur non sine dyscrimine,
si Morbus omnem non adhibuerit curam ut symptomata sufflammentur.

Suturae deletae

Commentar. Acad. Reg. Gotting. tom. 11. pag. 366

Puella undecim annorum paralyti Universali concepta: manserat motus musculorum fa-
cili, voci formandi, deglutitioni, in reliquis motus et sensus adoluit. Functiones ani-
mi & sensuum organa integra. Ossa Cranii, post mortem explorata, ita erant conferra-
minata, ut nec sutura coronalis nec sagittalis appareret. Ossa temporum cum of-
sibus occipitis, ut & ossa sphenoidalia dea cum temporalibus multis cranio-
facta.

(80)

106

Paralysis
Universalis.

Vmbilicus

Morbi.

Henter. Observ. chirurg. Anat. Medical. London 1755. 4.º pag. 137.

(107)

Ann. 21.

In cadavere umbilicus ad vertebrae accedebat; ita intestina dijunxerat ut in pel-
vim recondita invenirentur: linea alba, muscoli que recti super aortam & verte-
bras lumborum inuumbant: mesenterium ita distentum ampliatum que
ut latera, pelvim que, ubi intestina jacebant, occuparet: Cum vivus erat
proculdubio ~~per~~ arterie micatio in umbilico sentiebatur: que mala
quos dolores, quos Convulsionem miser non sentiret!

Epiglottidis
 Hely

Haller opuscul. Patholog. lib. 8^a p. 19.

Vox extincta erat; in vtroque oris tubera crassa duriora: dimidia
 pars epiglottidis ulcero tumore tecta, & parum erosa.

Rauco
 Vox extincta

Ex pag. 13.

Cerebri Morbi

169

Uir febre detentus soporose & orthopnoea: moritur: Crania gelatinosa seri coniectio circa vasa sanguifera compecta est, per tenuem Meningem repentia: tum serum impidum laterale, ventriculos: quales intra intra primas vertebrae circa medullam Spinalen. Morgagni sedes Morborum. tom. 1 pag. 130. Ed. Ven. Got.

Respiratio laesa
Intra thoracem
Extra thoracem
In Cerebro
In Collo
In Ventre

§ 6.

Ibidem n° VIII de Muliere: Sanguine turgida Meninges Tenues omnia, & ii vasi quae medullarem trapiunt substantiam. Cerebellum laxissimum: Cerebrum autem non.

ibidem videbim: difficilem respiracionem frequentius furi a praegrandi hepate, a pancreate scirroso, a tumoribus diaphragma comprimentibus

In collo causa

§ n° 12: 13. 14. De Puella asthmate laborante, pus spuenie, extincta voce: moritur

* n° 13

invenitur abscessus asperae arteriae posteriori parte adumbens, cartilagineus labefactoris & Illustrissimum Virum Venereo morbo (obscuro potius) correpto, oritanti curato, quia

Tacore poterat
supinus, & in latu
pulsus optimus
color faciei: op
petit ut sanus:
nihil accusans.
vid. ibid Morgagni.

aut putens adhuc illum contraxerat, circa XL annum aetatis per totum collum tumores

procurrere coeperunt, quos induritus, sed Medicina ignavis, chirurgus cum suppuratores vide-

ret, Causticis remediis occidere omne molimine adhibuit: Quod fit incipit ad minima

motus respiratio laedit, ad levis usque: pinguis cum esset, & tubercula sicca, humida ali-

quod tentaretur, incitat me ut in medellam illi adhiberem: annuo: frictio-

nibus ex mercuriali ungu. cum camphora per 25 dies cum decocto laxativo sanis n° 14.

parvula morbum aggredior debellandum: Cessat morbus: sed post VI annos

malum vehementius revertitur: & sub difficilima respiracione, voceque extincta, miser-

ime moritur. Cadavere inventus tumor scirrhus durissimus magnus asperam

arteriam comprimens: pulmonibus sanis.

Antonius n° 12 ibi. fere similem affert, quem vide quem Morgagni n° 12 citat:

& ibid n° 15 in Octogenaria similem casum

Cartilaginea
& circa
falsa
bronchia

Laesiones intra
thoracem

Ibid n° 18. pulmonum bronchia ab aspera arteria oriunda in cartilagineam

sed osseam naturam mutata, tum in senibus octoginta ultraque, cum In su-

venibus.

at n° 20 calculos inveniri intra pulmones: minores, praegrandesque: Tussis sicca

febris macies, dolores punctorii thoracis, sanguinis sputum & haemorrhagia ad

morkem usque: Suppurationes: Lac tunc noxium: oleo amygdal. dulc.

larga assumptum copia.

N° 24. ibi. Pulmones coniecto.

Ibi Epistol XVI p. 136. n° A. 6. 8: Ex cadaveribus jam facti hydropis signa

intelligi n° IX. Ledum tumor. Sitis: faucium siccitas: pulsus humilis, tussis

irrita; catarrhalis materia sputum erat.

N° 28. n° 33 ibid, ubi ostendit ex perguici subito post inceptum somnum, patho-

gnomonium non esse signum hydropis pectoris: Cum Poloniae Senatorii nulla

nulla erat somni cum periculo suffocationis interruptio

Ibi N° 17. Male expectatus vir de aqua in pericardio inventa iudicium fert:

febris erat symptoma collecta aqua in pericardio & cavea pectoris: Cum putres-

cere incepti febris: putrida jam. gangraena, quies, mens sana: mors.

Ibid. n° 23 Dum aqua parum intra pericardium palpitacionis fuerit: si

aqua multum & dytontum tunc abest

Calculi

Carni, cartila-
ginei.

Aqua in peri cardio
Cum febre

Palpitatio Cor-
dis ab aqua
pericardii.

Hydrops pul-
monum & pericar-
dii

Causa: Scabies re-
puls. vide
ibid n° 34.

ibid. an n° 26 an n° 33 ostendit per observationes nullum certum hydropis pectoris
esse signum: cum multis observat. 28

vide 84.

Vidi in nonagenaria apud Clenum Vincent brachii & manus metatarsi oedema ante mortem

in Del Isle vxore: Crassa pingui, tuniculosa, catarrhosa, vomebat aliquando, pulsu sinistro abolito per tres hebdomadas ante mortem: plauide jacebat, dormiebat: oedema in manus metatarsis post paucos dies abiit plauide

Et in Principe Galizin ante mortem hydropse pectoris, Cuius ab domini lumbrum manum dextram cum brachio edematosa paucis ante mortem diebus: Vnde Morgagni Epistol. Libi II. pag. 145 n° 36 ubi ex Santoro, Buchneri & Vallalva similia oedemata observata fuisse.

§ ibi videb. fol. & n° 23: 41. 44

N° 44. pag. 148

Pericardii hydrops
ex Albutino

N° 43. pag. 147. quae optima

N° 46. pag. 150: Itaque per longas demonstravit paginas, Animi deliquia Tussim, respirationis difficultatem in pectoris & pericardii hydropse perpetua non esse: Perbellè perpendit varia & multifarie symptomata fieri ab aqua quantitate, ab epi indole dum adhuc mutata non est, vel quando jam putreda ob mortem fuit facta: Confer corpus turgens sanguine ut in Iuvenibus, vel exanthemum, ut in Senescentibus, vel in Senibus: quod ex faciei colore, ex causis morbum generantibus coniectare licet: Sed dubia tandem signa sunt huius morbi cum in quamplurimis adsint, & in totidem absint.

ibidem de Siti, quae neque in hoc morbo perpetua.

ibidem de Pectus tumore

ibidem de Aquae fluctuatione vel intra pectus vel pericardium

ibid: Contabescencia, tristitia, faciei pallor, oculi minus viridi facti, extrema corporis subfrigida — dubia

N° 47. pag. 150. Ex Albutino Pectus cordi imperitum: Sensus oppressionis ex levi motu, & quasi cordis constrictionis, Crescente morbo, praecordiorum anxietate:

N° 48: hic legendus: cum signa conjuncta reuocent, & ab his dignosis petenda.

Frenatio Sterni
distulenda.

Epistola 17. pag. 152.

De Respiratione laesa, a cordis, aut Aegae arteriae intra thoracem aneurysmatibus.

Observ. n° VI. n° 8°. n° X°. n° XII. n° XIV.

Flatibus per os
emissis levabatur:
putant aliqdo tantum
flatibus laborare

N° XVI. Thorax parte ab aneurysmate occupata, saepe oesophagus ita premittur, ut minime facile sit flatibus erumpendis via: Sed de flatuum causa altum silentium: Sed Medicos sapienter monet ne in morbi causam decipiantur, putantes a flatibus tantum originem ducere.

N° XVII. Verederarii, & Libidinosi aneurysmatibus praeter ceteris hominibus magis obnoxii. aut Morgagni

N° XXII. Ex Lancisio de Aneurysm. propos. 41 affert, de Centum sponte oris aneurysmatibus plus quinquaginta in gulosis & bibosis se vidisse

In Suffocatione
manus brachiaque
in calente aqua im-
mungere & fricare

Vide n° 27 ibi. Col. 2°. Vbi in suffocationibus prope mortem ab aneurysmate vel cordis vel aorta oriundis, tunc manus & brachia in aqua calente immersa franda spasmis laxantur, circuitus quo sanguinis perficitur.

N° 28. Cor cum pericardio mole auctum diaphragma aliquando deprimat &

Oedema
brachii &
manus
ante mortem

Lumborum
dolor ad dia-
phragma, lega-
menta infera
Es
hydatid. cordis
& pericardii.

Quasi imponit mby
cor magnum Ventriculi morbo simulat; & pulsatio simulat illam, quae oritur sub hene at arteria
mesenterica, ut fit in hypochondriacis, qualem vidi in Musico De l'opilio.

N^o 30 & 31. Pulsatione (vel casu) orta, et signa aneurysmaty adeffe, cum jam sit
Remedia 2^a annu- Certum Statutum quae ex observat^o constat S. M. alternis mensibus (certis diebus pre-
symptomata inci piam quentius suadentem) & tenuissimus vinctus, cum aqua ad certum pondus, ut humor, minue-
tra facta. rentur, succaretur corpus: tunc arteria aneurysmatica tunica in se collaberentur.

Arterio pulsa Sea
hie, saumale ac- n^o 32. in pectoris oppressionem; suspicabantur aneurysma aorte: Sanguis mittitur.
rata invito ego iterum mittitur: moritur eger: ut Ballonro accedit: Unde nunquam in
morbo dubio invito ego exercenda magna remedia: invito ego clyster sim-
plexera ~~atque~~ iniecit chirurgus, moritur. vid. Act. Phys. Med.

Epistol. XVIII. p. 162.

Cordis aneurysma
ab arteria aorte
constrictione

N^o 2. Historia suture cordis aneurysmatici, arteria aorta descendente contracta, similis / Squamula
illi Meckell H. Ac. Sc. Belghensij. in Suture. oris aorta
Nagis.

Contracta aorta
prope Cor: fit moritur denique: Cor magnum: Ubi dexter cum auricula dilatatur cum maxime:
furan, quando Arteria autem magna erat prope cor ad miram angustiam contracta.
Sanguis ex dextro
vlt non venit in
sinistrum

N^o 8. observat
— 2^a que ad n^o 17. tracta de dilatatione cordis & Ventriculorum & auri- cum tuberculy
cularum at

N^o 17 tractat de Arteriae Aortae aneurysmata: Notatu digna haec ob-
servatio aneurysmaty, quod epis signa cum illy hypochondriacis morbi Confen-
derintur: nam ab emissy flatibus levamenti: Siquod huius arteriae aneurys-
maticae signum est sedate elaty clunibus reclinato Capite deorsum.

N^o 24. Ex tussi ferina protrahit. Ex frequenti & valida tuba inflatione: Aneurysm.
Causa. tuf-
sy & tubercula

N^o 28. Histor. aneurysmaty aortae cum bractey offey: Vbi de offifia
rioris Causa. vrg. ad 33 rancrum.
N^o 34. Histor. aneurysmat. Aorta descendenti offea, intus flavae: Vbi sequenti numero
multa, utique n^o 32 de causa offificationis.

Aneurysm.
Causa. tuf-
sy & tubercula
*
Phila. Tranyact.
vol.
Vbi maxilli omnes
offis facti sunt.

Epistola XIX de Suffocatione: De Tussi.

n^o 33.

In hac Epist. de Suffocatione Suspendio: anatomicae ligaty veng jugularibus: Suffocati
in specy lictifera, intrantes, camitoria & alia putrida loca. Submersione aquarum** n^o 40
Infantiq intra vel extra uterum Suffocati

Epist. XX

De Pectoris, Laterum & Dorsi dolore

Polypi

In peripneumoniy ad n^o 31 usque inveni in dextro ventriculo auriculy, vna
que in cava polypi. vide observationes ibi.

Pleuritides
ab ero pntum

N^o 30. 32: 33: 35: 36: Quinque narrante pleuritide vita functi
in quibus aqua in pulmonum cavitate pericardio quae congesta primum, in
venta fuit: decumbent simulabant hepatitidem, peripneumoniam
pleuritidem: orthopnoici, sputo aliquando sanguineo moriebantur.
N^o 42: adducuntur Aretaei & Aureliani loca in quibus de decubitu
in dolens latus faciliore, quam in sanum: Sed non semper hoc signum ve-
rum, neque constans.

Sicut in latus
dolens.

¶ 46. Et in hoc articulo, multas que alij Superioribus palam apparet, ventri
dolore, ad illicum quoque, cum laterum, pectoris, Sini que Coniungi possit: non solum ab
hij auctoribus sed a Veteribus que ut a Celso Aveliano lib. 2. Acut. c. 14.

Ventri dolore
Sedigna trapa
tis affecti, Coniunc
ta cum illi pecto
ry.

Epi. XXI. pergit de Pectoris, laterum, Dorsi Sermo

Art. 4. Senex peripneumonia mortuus: Cordis tuberculus, vel hydaty Vlt. Sinistro: auricula
dilatata Sinistra: orienia bronchiaty aneurismatica: Aorta squammy opsey & a
Nº 6. Structor 30 ann. febre intermittente Cum rigore in peripneumoniam incidit
Unde febribus sunt morbi multi qui progressu inflammatorij pulmonum evadunt: &
quod initio sine inflammatione apparet.

Pleuritidey

Infida peripneumo
nie signa, notha

Ab artic. VI ad 22.
Infida & fere nulla signa lethaly peripneumonice. Valignis morby & more
art. 13. Aut inflammationem, quam negarem: implentur pulmones prope mortem
aduro putredo pestilenti Epidemico oritur morby.

Art. 19. Lani hytoria cum pleura opsa: de Crusta inflammatoria abun
tia vel presentia Cautela optima art. 21.

Pulmony firmitas
hepaty substantiam
mentiens.

Articul. 27. ~~Veneremur~~ & 28.: Ostendit omnes pleuriticos & peripneumo
nicos, quibz pulmo hepaty dantiem nanqyctur, mortuos fuisse ex sua, Valsal
va & Lelli a Fonte: inflammationis signum: Valde dubito veram inflama
tionem ibi inventam fuisse & mortem accersivisse: puto ex putredine Sesi
longum ortum traxisse, & pulmones pro putredine Colapso Sanguine sub mor
bo infarcit, quo mors citior: sed hec discutenda adhuc: Quia curativam
methodum Clar. Vir non affert.

Crusta alba sangui
quid indicet in pleu
ritide vel peripneumo
nia notha?

Art. 35: 36. In his duobz observationibus, alij que pleuritibz ubi pleuritidey notha
describuntur, notatu dignum est Crusta alba in sanguine misso: & aqua in pec
tori Cavitate; inter pulmones pleuram que, inter Cor & pericardium: illam indicio
signum fuisse in thalamo cordis dextro polyporay altay Concretionay adesse: &
pulmonum corpus repar simulans; que grany, ponderosi, nigri, adhaerentes & a
Art. 37: 38.

Euy impleuride locy
affecty? pleuritidey sine
dolore:

Pleuritidum Sedy pulmones porray quam pleura: Pleuritidey Epidemica cum
Veneribus simul putredinosi maligni morby effectus.

Mediastri & pericar
dii inflammationy

Art. 46. In hoc & de Mediastino & Pericardio dum inflammatione Gr
reperiuntur. ex Talio & erudissime ut Soler, sed perplexissime.

Ab aneurysmate Pecto
ry dolor pleuriticy le
thalis.

Art. 47: & 48: Observationes duae, ubi cauti debemus esse quando dolores
pectoris tractamus: opy erit in memoriam aneurysmationis signa in me
moriam revocare.

Epi. 22. De Sputo Sanguinis, purulento & a

Lues Venerea: cau
sa multiplex pulmony
putri dorum

Art. 5 ad calcem: Monachus sputo sanguinis, cui tres germani fratres hoc mibo
mortui: filii armeni hominis, Italiae que faeminae
Ego observavi illos tam maculo, quam faeminae, qui a parentibus Lue
Venerea vasa infecti, in sputum sanguinis ab etate 17 a 28 Laborare.

Art. 11 ad calcem. ibi de effectu Luei Venerea in pulmonibus.

mi

De Equitatione in ph
thysi: De Cantu, Vlti
feratione

Art. 13. Contra Sydenham. Differt Epi ad Cole qui in phthysi equitationem
suadebat: & Sanctor. in Art. Med. c. Galen. qui in simili morbo conuocari
vide

vide eruditam perpalchram que Considerationem.

Signa phthisij, sive
phthisiae

Pulvis frigida et
fructu capite

timor dissuadi ph
thysiae pulmones
cordatus.

Coma Felicitas
Coma Doloris

Art. 18: 19: 20.

Art. 20: 21. Cum variis phthisi causis, & post mortem inventis ad artic.
22.

Art. 24. observationes de phthisi orta ab ulcere ex pericardio, quae aequi
signa vide ex Actio, (quem vide). Vbi in eodem textu Historia curati
per lac muliebri pulchritudine & bacchi sublingualibus: Curatus, sed post multos annos sepi
genitum humor per cutem sparsit, pedes adortus; evanescit, ventrem torquet mors. (ex
mercurio esset tractatus & ex arte curatus sanatus. Curaretur)

Art. 31. Ibi de phthisi spuria curata ex superiore parte pectoris: ex L. V. audierim
affirmare ortum duxisse sputa illa, maurem, tuffem & similibus causis.

Ex glandula Colli tumi
di, dignosci poterit pul
mones, quoniam eodem
labore morbo, phthisi
causa

Uterq; appert
anteria a lue
venere

Epistola XXXIII De Palpitatione & dolore Cordis

Palpitationis huius
torvae III sine vi
tuo cordis, neque
variorum

Art. 2. observatio: | Il me semble que la cause de la mort de cette femme a été la saignée
dans une palpitation qui provenoit de l'ataxie spirituum.) ad art. viq. 7.

Art. 3 & 10 leges morborum valvularum
Ponunt officae furi valvulae, quin palpitatione Cordis vlla appareat: vid. art. 12
Neque pulsuum intermissio, neque inaequalitas.

Palpitationis
causa

Art. 13 leges vltra valvularum mitralium sine vlla palpitatione Cordis.
Sed furi poterit ut palpitatione fiat valvula, vel arteriae officae factis: art. 14
Art. 15. De Vermibus in tra Cor dubitat; tantum in ventriculo cordis
contingit. Loweri de vermibus cordis in dubium vertit. Hepatis veronem
lethalem leges apud Medical Essays & Inquiry tom: 1.

Palpitatio
a vermibus
et afflabus
art. sequenti

De Pericardii ad
hacione ad cor

Art. 17 neque palpitationis causa est: sed praecordiorum oppressionis &
Hinc valedixit Epistola sententiam M. Senae Traité du Cœur reamory, & suam cum huius
art. esse contententem, viz, rarissime causam palpitationis cordis certam esse: Multa
at imitacione in ipso corde, multa extra cor: aucto vasorum, pericardii &
ad Calam vide

Anervij convul
si. A report.
Valvularum mibi

Epist. XXXIV. Depulsibus, asphygia &c.

Pulsuum natu
ralium & morbo
sorum abolitio

Ad art. IX tractat de asphygia naturali. Morbora que: Sciunt Medici fieri posse
ut sanus sit homo sine pulsuum motu, tanquam illi qui sub aquis mortui fere
varent: exploratq; colli inuicem pery ~~inter~~ tarsi (ut mones Amatus Lepus
quos) quamvis Morgagni Equod mirum, cum omnia fere legere medica non reor
debet: fit morbosus pulsuum abolitio cum debilitate vocis, motus & alij debilitate
vitalium signis. Ex pulsa, agnoscere morbus perdifficile, Solo.
Art. 13 Extra observatio: Pulsus minimus debilis; ad sinistram hypochondrium dolores
cum respiracione difficili, & animi deliquit frequentibus. Pericardii aqua & Cor magne
in caddere, quod illorum pulsuum causam accusares:

Art. 14
A flabibus; ex
male affecto ventr
mutari possunt pul
sus

Art. 20
Art. 22
Art. 23
Art. 24 ad 31. per longas & taediosissimas lectu paginas, Sreantissime Morga
gi nobis tam multa de polypo verbo: mihi culpa: pauca ex iij didici: Unum
tantum rati, neque ita frequentes, ut plures solent, esse polypos antem mortem genera
tos & morborum causam: Non me docet, quod doceri impense optabam, quid
materiei

Hypops pericardii
Cor magnum
vid. iterum hic
articul. 12

An ex valvulis, os
desque
ruptis & tiberibus
sententibus, semita
naribus?

Polypus: hys
art. 24

Vermes Cordis
an sine? quia pulsuum
mutationes?

materiei componatur polypus: si a crusta illa inflammatoria; & quoniam illa sit, si a sanguinis pinguedine oborta; si a morbo peculiari. nihil nobis docet. Sed tantum pul-
sus intermittens a polypo non provenire.

Cordis palpitatio sine
Cordis nequa arteriarum
vicio

Art. 34: Cuius cordis palpitatio ad umbilicum usque cum difficili respirazione in
venter nihil quod pro causa accusaret. forsan S. Misympney multa.

Epistol. XXV de Lipothymia & syncope

Adilatatio dextra cor
de, auncula vena ca
vaque

Art. 3. Obscu.

Art. 6: 7: ab offe in falsiformi processu. precedentibus aliis

Cordis 21uq —

Art. 17.

Falsiformy
proclivis
cordis

Epistol. XXVI de Morte Repentina vicio vasorum possimum in thorace

ab aneurymate, offe
Curatibus aorte

Art. 25. Haec observatio instructissima est: ad aneurymata Cognoscenda optima est.
Precedentes observationes ex rupta aorta sanguinem in pericardium illabente.

Cause aneurymata
vel varicis

Art. 27. Ibi per observata demonstratur facilius in thalamo cordis dextro aneurymata
ferri & in ventre varices in vena cava, quam in Arteria Pulmonali, cum resistentia differant.

A vena sine peri

Art. 29. Ita varicosa ut cavam aquaret: rupta sanguinem in cavum dextrum emisit.

Mors a valvula mytrali-
bus, semilunaris dux, offe
sis, cum aorta interiori
faciei duxit, offe, &
dilatatione, sine magno
aneurymate.

Art. 31 ad 35^{um} Quibus in observationibus, seny & famina subito moriunt.

Arteria bronchialis a
neuryma effuso

Art. 33: Effusio in Cellulam membranam internam mediastini cum vehementissimis
tractatorum doloribus.

Epist. XXVI de De Morte Repentina vicio Cordis & de Gibbere.

Bractea aortae in
bore mortis Ca. Sancto
muy —

Art. 37 & proxime sequentibus. Vid. etiam obs. n° 35 Lue Venerea Chronica
mortuo, ubi non constat mortis causa.

Ep. XXVII de Rep. Morte, & de Gibbere.

De rupto non rupto
Cordis & Ventrículo
Sanguinis.

Art. 1. Illa obs. Harvei de rupto Cordis sinistro ventriculo, lipothymia & Suffocatione,
an. 2. Obscu. Pinguissima femine: observari feminas, quibus Chronica Lue Venerea
pinguis fieri; calculo renum, vesicae felle: Nam offeas arterias, Cartilagineas & Valvulas
haec Lue producat? etiam haec mala in hac historia ortum duxerunt ab
hac Lue: ibi observanda mala, quae a sollicita cura ulcerum tibiae, vel
cutis, non curaty interiny & detergy. n° 8^o observatio optima!

Lue Ven.
Chronica
Ulcerum
male curata

Offeas Valvulae, arteriae
cum pinguedine maxi-
ma, ortum inter-
nae arteriarum.

Acordis mole dilatata:

n° 12. & sequentibus: | N° 16: 17 ad 19.

offeas Substantia cartila-
ginea, Cordis, arteriae
valvularum Substantia non
sunt causa mortis

Ibi an° 20 & 24: arteriarum notantur Ulcera, aspera cartilaginea puncta,
Lapides, quae omnia morum argunt, retardant, et effectus dilatationis in Cor
edunt. ad 25

Ulcerum aortae
et inaequalitatem

N° 28 Obscu. Substantia mortis hominis 58 an. nati, qui bubonibus veneris & Lue
Veneris symptomatibus Coratibus, praeter multa in corde inventa, in interioribus
aortae prominentibus & pustulis plena, et per subclavia & Carotides & Cordis Coronarias
Ibi n° 30 de pustulis & prominentibus in aorta inventis

Pl
Lancus

Blancus Epist. de Monst. in Instit. Bononiens. Hist. n° 30 ait, Arteriam
magnam, veluti ulceratam, & corrodam, variis punctis, scatenam... quod saepe ob
vari in alijs cadaveribus, eorum presentum qui syphillide laborarunt, & ad aneuris
ma aorte, vel ad pectoris hydropem sunt dyspositi.

Excludi.
arteria aorta
ulcera &c.

Epistol. XXVIII de Deglutione lesa.

Causae multae narrat: vitio palati, laryngis pharyngis, oesophagi cum glan-
dulis, cartilaginibus, diaphragmatibus, hepatis, prostaticis, ophthalmicis &c. multa
ex his, quae deglutionem impediunt ab illo praevio morbo, praeposito contrahuntur.

Epist. XXIX.

De Singultu, de luminatione hominum, de Ventruli dolore.

Singultus

n° 3. Graet-Hallerum opus. Pathologica obervatione XIV Historia III pag. 31. Vbi ven-
triculum inflammatum praefertim adhaerentem os & for. nigrum, Singultus imperipneu-
monia erat affligens.

Dolor vti & vo-
mitus

N° 6. Perbella obervatione in cadavere facta: a scirrhus primus ventriculi in cancerum
desinens, motus fuit.

Scirrhus &
cancer vti.

Vti tumor in ppi-
mam suppurationem.

N° 12. Vomitus: glandula vti aucta.

N° 14. obervatione de ulcere & foramine Ventruli in Vtula cum tumore dex-
tri ventris in ovario sedem habent: Vti vti
nausea, &c.

Spurium Anurys
ma.

N° 20. obervatione: Ventruli ulcera, oesophagi quae, cum ventriculi sinistri
parietibus crassius, dexterarum dilatationem, quae spuria vocantur Anurysmata.

Ulcers

Epistola XXX de Vomitu

N° 2. Vomitus fuliginosus ex cancro ventriculi cum dolore.

Cancer vti.

Febrijs Tertiana
duplex

N° 4. / 7° mortuus cum vomitu chocolata colore referens, convulsione, cui cor-
tex peruratus exhibitus non fuit.

N° 7. a Vesica fellea crassissima, pancreas ad Scirrhum vergente: historia Matronae. & n° 10
a pancreas Scirrhus, Cancro fere, ortus Vomitus.

Pancreas, & vesica
fellea crassissima.
idem

n° 12. Ex pancreas, migrante, Scirrhus Duodeno quae.

n° 14: Ex hepate Scirrhus: Pancreas Siccissimo, ad pylorum callosus ventriculi; (recorde
D. Nicolai Strassburgi)
Reliqua ad § 22. Historia de Vomitu ex renum calculo, ex hepate Scirrhus, ex
pancreas & pyloro affectis.

Epistola XXXI. de Alvi Profluvio

Epistolae XXXII: (Epist. XXXIII) De Alvi adhaerentia & Haemorrhoidibus

Ep 33: De Recti Interni prolapsu.
In his sedibus viae declarantur: Horum a relaxatis Coh. celulis, tunica quae huius in-
teriore, quem morbum ad unguem leges descriptum tom. 2° Observationes Medicae &
Literary Edinburgensium: Remedia erunt digitis collapsas haemorrhoides in
sedem intrudere post singulas sedes; & ardoris butyro Cacao introito sedare: huc
morbo jam viginti & ultra adhuc annis vitam traho: Reliqua remedia
seu instrumenta aut relaxationem contineant, noxia puto.

remedia in
sedibus relaxatis
nem

Ep. 34

Morgagni sedes Morborum. Epistola XXXIV. pag. 44. vol. ii.
De Dolore Intestinorum. Ubi de Hæc, & Coli doloribus; & De Hernia incarcerata ut loqui amant Chirurghi.

Mercurius Cruditus
N. 13
Et initium morbi in hernia contipata alio exuberari, si debet, debet. nam morbo jam protracto frequentissime accidit ut in gangrenam intestina incidant, tunc mercurius tunicae rumpit in cavum ventris & sequitur, quo motum procul dubio, accelerant.

Et n. 15 & seq. de Hernia crurali
Et de Hernia ab intestinorum appendicibus vel a natura vel a morbo ortis, luculenter agitur.

n. 35: Intestini
intussusceptione.

N. 35: Ex modo antea dictis videtur: Hernia: Intussusceptione, Inflammatione; Rebus occludentibus: Circulo Scirrhus in Colo. Colon Scirrhus induratus; Simulante causa, Urina; Urina, rupta vesica ob casum, in ventris cavum offensa. Intus, utero rupto, putrescentis sanguinis intestina irritando, vulvali causa.

Epist. 35 pergit de Intest. Dolore

Hic de industria A. quæstionem agitur num gangrena Intestinorum præsertim tenuium anni possit sine febre, Inflammationeque intestini: quod plerique contendunt semper gangrenæ antecedere: Sed experimentis quamplurimis in cadaveribus capitis constiti multos ea putredine perisse præcedente tantum ventris dolore, acutissimo, Chronico antea & obtuso: Quia dolor hi in intestinis tenuibus novum tantum sunt morbi, sanguine parum inculcato: fit tunc cordis paralyticus, & igitur pariter dolent: perit pars ac si nervi Secti fuisset, tunc lethali gangrena fit.

Signa in his doloribus ventris lethalia n. 21. hujus epistolæ pete ad Alfortino celeberrimo Medico: 1. ventris tumor durus: 2. pulsus abolitio 3. Oculorum vi omni fere abolita, & insoliti quid ostendentes.

Epist. 36. De Tumore & Dolore Hypochondriorum.

Observo de Hepate ventris cavitatem implente, abicepsu in sima sui parte cum diaphragmati connexo, rupto in thoracem; qualem apud Magistrum Bern. Siggeerd Almon vidit. Signa, tussis, macies, inflati pedes, Sputa glutinosa albicantia; Sed posteriora deficiunt in Anterioribus signa ut videtur n. hic. 5. & 6.
Lien, Hepar, Renes, tumentes, Scirrhi, maximi, dolores, pleuritides & multa causare possunt Ventris mala

n. 2. n. 4.

Epist. 37 De Ictero & de Calculis Biliaribus

De Calculis

Ex terrore, ex metu percussus quidam Icterus: in hepate sedis mali: Convulsi mortui sunt.
Amplissima hic de varia calculorum natura per longas paginas Sectionibus 53 ad nauseam usque. Sed multa ad Diagnostica Utilia leguntur.

Epist. 38 De Hydropne in Genere & Saccato

Lingua Cancer.

vide. *Medical Commentaries* by a Society of Edinburgh. tom. 2^o Part. III. pag.
296. London. 1774. 8^o.

Plumbi Exhibiti remedium fracta exhibuit, Sanguifugis ad raninas
applicatis, Sanguinem dextra copia evacuat, Curatur Cancer.

FOETUS In abdomine inventus

Intra Uterum. Vide Conceptus. Vide Uterus. pag. 61.

Journal de Politique et de Littérature. N.° Septième 5 Mars 1775

Tom. I pag. 280 Par M^r Linguet. à Paris.

» Lettre de M^r Nuch Chirurgⁿ de Tropol en Nithlsburg, en Moravie, qui a
» été certifiée pour le Commandant & Major de la Citadelle.

» Dans les premiers jours d'Avout. 1773 Un soldat de 22 ans, fut at-
taqué de maux de Cœur legers, depuis q^a : avec accidens succedant l'enflure
du Ventre : on le traita Comme Hydropique le ventre grossissoit Le 3
Janvier 1774 sentit de l'Ury douleur dans la region Lombaire les douleurs aug-
menterent on lui a fait la ponction du Ventre, il n'en sortit lamonde
goutte d'eau Les douleurs & les Convulsions s'en meslerent, & le patient
mourut aprs 37 heures de souffrance

» On a ouvert le Cadavre : a l'ouverture du Cadavre & de l'abdomen
» on apercut Un Kyste ; ouvert, on y trouve Un foetus mâle mort & bien
» Conformé, avec son placenta, les membranes & les eaux : C'etoit Une Ma-
» trice l'orifice regardoit l'Intestin rectum, avec lequel Elle communiquoit
» par Un petit Conduit, en forme d'appendix ; Il n'avoit que cette Vierge de
» Commun avec le sexe féminin. D'ailleurs il étoit parfaitement Homme in-
» terieure & exterieurement. La position, les Ligaments de cette Matrice
» étoient dans l'ordre naturel : Les Vaisseaux Spermatiques aboutissoient
» en partie aux Ovaires ; Une autre partie Continuoit son chemin jus-
» que aux Testicules On examina la forme du bassin ; Elle étoit telle
» qu'elle doit être dans l'homme : Les Mamelles n'étoient pas grosses
» may Elles Contenoient du lait, & leur areole étoit large & noire.

» On se rappellat que Ce soldat s'étoit plaint plusieurs fois de
» sentir remuer quelque chose dans son ventre, et particulièrement 30 heures
» avant sa mort.

» Il ne restoit aucun doute sur la maniere dont Cet homme
» pouvoit avoir engendré par s'en rendre plus Certain encore, on
» s'empara de son Compagnon de lit : On le mit aux fers, & par des me-
» naces reiterées, on lui fit avouer, Ce que l'on soupçonnoit Violentement.

Je ne Veux croire Ce fait : May je n'ose pas le nier.

