

Bibliothèque numérique

medic@

**Mothereau, Jacques - candidat /
Simon, Jean-François - président. -
[De anevrysmate]**

1750.

***Paris : Typis Delaguetta Regiae
Chirurgorum Academiae
Typographi
Cote : ms 2342, n°7***



Licence ouverte. - Exemplaire numérisé: BIU Santé
(Paris)

Adresse permanente : [http://www.biusante.parisdescartes
.fr/histmed/medica/cote?ms02342_ms02346x01x0007](http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?ms02342_ms02346x01x0007)




D. O. M.
POSITIONES ANATOMICÆ
ET
CHIRURGICÆ.



ORPORIS HUMANI partes solidæ & fluidæ mutue
gaudent motu ; si ster æquabilis , firmissima stat
integra que viget & fovetur sanitas : cessante verò
æquilibrio & aliquatenùs impeditâ earum actione
reciproca , alteratur solidorum naturalis tonus ,
nativam exuunt indolem fluida.

TUBOS & canales , diversi quidem generis , constituunt solida.
Quidam à sinistro cordis ventriculo ad extremas corporis partes
procedunt ; ex illis alii progenerantur dextro cordis thalamo infe-
rendi : priores arteriarum nomine donantur ; de eorum structurâ ,
distributionibus , actione & usu pro viribus differere conabimur.

ARTERIARUM sanguis peculiari præter naturam tumori
præbet originem , quem vocant Anevryisma : hujus species du-



plex ; vel à dilatatis arteriæ parietibus sacculus fit , qui sanguineo latice repletus pedetentim augetur , & legitimum Aneurisma dicitur : vel ex solutâ tubuli unione , à cruore effuso tumor efformatur , huncque Aneurisma spurium appellant.

IN quâcumque corporis parte Aneurismata possunt contingere ; legitima frequentius in partibus internis observantur , spuria verò in artubus.

DART Aneurismata ab interiorum tunicarum dilatatione , exterioribus à causâ quâlibet divisâ , quidam scripserunt ; hæc arteriarum hernias nuncupavêre.

IN Aneurismate spurio sanguis effusus plus minùs-ve post sectionem arteriæ in vicinia paulatim intenditur ; vel tumorem circumscriptum tunicis arteriæ adhærentem , à coagulo in stratum super stratum ordinato , efformat *. Singulis , tum legitimo , tum spuris , sua sunt signa , sua cuique prognosis , diversa omnibus competit medendi methodus.

ANEVRISMA legitimum , ab arteriæ compressione , contusione , erosione , nixu vehementiori , & aliis causis cum internis tum externis oriundum , exterius se prodit tumore ut plurimum rotundo , molli , haud immutato cutis colore , lentiori progressu crescente ; pressione non nunquam penitus evanescit , plus minùs-ve distinctâ innotescit pulsatione ; cui , qualis sit , non semper fidendum , neque hæc pro signo pathognomonico habenda.

SPURII Aneurismatis in quo longè latè que diffusus est sanguis ; tumor subdurus , digitis pressus vix cedens , sensibilis pulsationis expers , haud infrequenter colorem plumbeum induit.

ANEVRISMATIS legitimi speciem & indolem non rarò mentitur Aneurisma spurium , in quo sanguinis coagulum circumscriptè ad formam concamerationis accedit. Hoc à legitimo differt in eo quod solutæ unionis à causâ externâ sit consecutivum , quod pressione quàm minimum evanescat , quod que obscurior ex illo fiat pulsationis arteriæ perceptio.

* De hæc aneurismatis spurii secundariâ specie videatur dissertatio à Domino Petit Chir. Magistr. in Regiæ Scientiarum Academiæ commentariis ann. 1736. pag. 244.

INDOLIS aneurismatum habitâ ratione diversa favire queunt accidentia. In veris, temporis progressu, tunicarum expansio major, & spontanea demùm ruptio: in spuris diffusis, partis ingurgitatio & livor, dolor gravativus; imminentem gangrænâ, brevi que nasciturum ex eâ sphacelum prægreditur non nunquam intumescencia partis œdematosa: in spuris consecutivis, tumor durus, paulatim augescens, mole tantum fit molestus, & obeundis functionibus partem prorsus imparem reddit.

CETERUM à naturâ, sede, mole, accidentibus, distantia à corde, diversa aneurismatum deducenda prognosis.

QUÆ in partibus internis sunt aneurismata, palliativâ tantum à generalioribus remediis, tum à moderatâ victûs ratione petendam, & à quocumque immoderato nisu cavendo, admittunt curationem. Exterioribus verò aneurismatibus perfecta quandoquæ competit curatio, imprimis à tumoris compressione, aut à ligaturâ arteriæ obtinenda.

ANEVRISMATI legitimo, si ab arteriæ compressione aut coarctatione non oriatur, compressio congrua; modò tunicarum non immineat disruptio; tunc enim operatione solùm, si possit institui, sanabile.

POSSIBILITATEM operationis celebrandæ arguit suprâ-actata, ope torcularis Dⁿⁱ Petit, arteria, quod quidem compressionem vocant præparatoriam.

IN aneurismate spurio cum effusione intra textûs adiposi cellulas, tumor, præcautis præcavendis, aperiatur; solutio tubuli solemter detegatur, nervo que, si sit vicinus, ab arteriâ separato, hæc duplicem inter ligaturam constringatur.

COMPRESSIO exterior, aneurismatis spurii consecutivi indubitatum præsidium; dum modò tumor mole non sit major: hunc ritè diutius que compressum tutò curari posse, prospera docet praxis.

OPERATIONI cùm est locus, celebratâ ut par est, rectèque deligato vulnere, victûs ratio tenuis imperanda; venæ sectioni-

4
bus accidentia arceantur & debellantur: fortibus spirituosius gan-
grana præcavenda & removenda: linamenta carpta vulnere super
imposita, donec spontè decendant, relinquantur.

SISTENDO inter operandum sanguini, styptica & caustica,
compressiove, non semper tanquam insidiosa spectentur; cum
ad illa, quibusdam in casibus, veluti ad sacram anchoram con-
fugere necesse sit.

IN vulneris curatione à remediis suppurantibus supra ipsam
arteriam diligenter abstinendum.

*Has positiones, DEO JUVANTE, & præside M. JOANNE-
FRANCISCO SIMON, Artium & Chirurgiæ
Magistro, Demonstratore Regio, Cohortis Equitum
Levis-Armaturæ à Regis custodiâ Chirurgo Primario,
tueri conabitur JACOBUS MOTHEREAU Parisinus, in
Almâ Universitate Parisiensi Artium Liberalium Magister.*

PARISIIS,
IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS:

Die Jovis 24 Decembris à sesqui-secundâ post meridiem
ad Septimam. Anno Domini 1750.

PRO ACTU PUBLICO.

Typis DELAGUETTE Regiæ Chirurg. Academiæ
Typographi 1750.