

Bibliothèque numérique



**By, Guillaume-Charles - candidat /
Allan, Guy-Felix - président. - De rupto
in partu utero**

1782.

Paris :

Cote : ms 2345, n°7

CELEBERRIMO VIRO
DD. CAROLO-TUSSANO VERMOND,
CHIRURGIÆ MAGISTRO PERITISSIMO,
REGIÆ CHIRURGIÆ ACADEMIÆ CONSILIARIO,
REGINÆ CHRISTIANISSIMÆ
PRO RE OBSTETRICIA CHIRURGO SAGACISSIMO, &c. &c.
IN GRATI ANIMI MEMORIAM.
HAS QUALESQUE LABORUM PRIMITIAS
OFFERT, DICAT, VOVET ET CONSECRAT
EJUS DEDITISSIMUS ALUMNUS;
G. C. B Y,
REGII CHIRURGIÆ COLLEGII CANDIDATUS.



C E L E B R A R I M O V I R O

D D . C A R O L O - T U S S A N O A R M O N D

C H I R U R G I E M A G I S T R O P R I M I S S I O N E

L E C T U R E C H I R U R G I C A M A G I S T R I C A C O N S I L I A R I A

R E G I N E C H R I S T I A N I S S I M E

L E C T U R E O B S T E T R I C I A C H I R U R G I C A S I C U R I S M O ; q u e g e

I N C R A T I A N I M E M M O R I A M

L A T S G A R T E R S C H W A B I A K O R N U P R I M I T U S

O U T E R T , D I C A T , V O A T E T C O N S E C R A T

L U T T D E D U T T I S M U S T E R I M U S ,

G . C . B .

T E X U C H I R U R G I E C O M P E X E C O N S I L I A R I A



DE RUPTO
IN PARTU UTERO.

THESES
ANATOMICO-CHIRURGICÆ.

I.

UBI primùm ardere incipiunt partus dolores , vix ac ne vix quidem eventum præsigire licet; tot obstarre possunt cause! tot nasci obices! tot denique occurrere accidentia! Etsi accedunt contractiones & iterantur ; etsi legitimis conatibus os uteri dilatatur, explicatur, attenuatur ; etsi collectæ, ruptis membranis,

A

effluxerunt aquæ, caputque infantis progrederitur; et si denique, nec hæmorrhagiâ nec convulsionibus corripitur partura mulier; attamen faustum nuntiare successum non decet. Ecce subito remittunt dolores, & inquirenti causa patet: vel caput infantis obliquè situm, vel incuneatum, vel ipse fœtus perversè compositus, vel renitens os uteri, vel denique pelvis vi-
tium quodlibet, irrita parientis conamina reddunt; & licet jam pluriæ feliciter parturierit mulier, fœtum de novo in lucem edere nititur incassum. Quid inde? Ars subveniat necesse est. Sed beneficæ fidens naturæ obstetricans, periculum in morâ non judicat, cunctatur; interea recrudescunt dolores, fœtum inæquali-
lem inæqualiter premit uterus summè moliens, repetitis con-
tractionibus resistit immobilis infans; quâ plus eminent parte,
oppositum visceris parietem contundit, debilitat, lædit, immi-
net ruptura uteri, & reverâ accidit. Hac de strage disceptatur,
quædam de utero gravidò præmittemus.

I I.

Ex anatomia patet uterum fibris muscularibus diversimodè dispositis, mirum in modum replicatis, decussatis, intricatis, textu cellulofo, vasis nervisque instrui. Vasa sanguifera, ab hypogastricis & spermaticis oriunda, ad matricis latera externè protenduntur, totam visceris substantiam tortuosè perreptant, sinus alluunt, in superficie internâ dein hiant. Sic antè & post graviditatem; at in prægnantibus fit mutatio, primo gestationis tempore vix sensibilis, sed versus tertium quartumve mensem valdè notabilis. Ampliata uteri cavitate expanduntur fibræ, explicantur vasa, rectiori viâ incedunt, uberiorique latice sanguis affluit, potissimum eâ sede quâ hæret massa quam placen-
tam nuncupare solent. Hinc videtur quantum à vacuo differat uterus gravidus ratione situs, figuræ, molis ac crassitie. Qui

3

enim vacuus partem pelvis infimam intestinum rectum inter & vesicam occupat, accrescente ovo, sensim ac sensim dilatatus & expansus in ventrem assurgit: figuram pyriformem in rotundam mutat, tali mole crescit & augetur ut circè graviditatis terminum, intestina undique repellens, cavum abdominalis ferè solus adimplere videatur. De causâ quæ proximè uterum expandit dudum disceptatum est: à latice in amnii cavum jugiter stillante produci creditur hic effectus, & unicuique verisimile videtur (1). De hujus visceris crassitie, tempore gestationis, magna lis est. Uterum nihil amittere crassitiei suæ, contra autem inspissari pertinaciter contenderunt plurimi ac celeberrimi auctores (2), quam crassitatem venarum sanguine turgidarum summæ dilatationi tribuebant (3). Hos omnes in errorem delapsos, cum aliis non minoris subsellii scriptotibus (4) possumus afferere; invitis enim constat adversariis, gravidæ ventrem contrectanti fensiles esse infantis motus, ejusque partes quandoque distingui posse ac si charta tantùm dextram contrectantem inter & uterum esset interposita. Insuper si gravidum secueris uterum, & adhuc amnii liquore refertum, hujus tenuitas patebit (5). Erroris ergo

(1) Cel. M. Piet. Dissertation sur les eaux de l'Amnios, p. 46.

Cel. M. David. Dissert. sur l'uf. des eaux de l'Amnios, p. 8.

(2) Inventi gloriam sibi tribuit Dulaurens. Anat. Lib. 7. Cap. xi. p. 339¹. — Crassam matricis sustinet substantiam Rosset. de part. Cæsar. Edit. Bauhin. p. 4. — Deventer qui in Mauriceum insurgit. nov. lumen. c. 8. Mery in act. Reg. scient. 1702. p. 292. — Heist. Comp. Anat. notâ 31. — Nortwyk. inter rarissima ponit si quandoque extenuetur. uter. hum. gravid. p. 111. crassam se vidisse refert Hall. El. phys. t. 7. p. 57.

(3) Haller. I. c. p. 58. — Heist. I. c. Röderer. El. obst. §. 52. — Muller. de utero rupto. §. 35.

(4) Galenus de Anat. uteri c. 8. — Avicenna lib. 3. fol. 21. tract. 1. c. 1. Aetius tetrabil. 4. Serm. 4. c. 1. — Mauriceus, Traité des maladies des femmes grosses, C. 4. p. 21. — Stalp. vander Wiel obst. Rar. Cent. post. pars. prior. obst. 30. p. 316. — Dionis. operat. p. 165. Cel. M. Piet. I. c. p. 47.

(5) Cel. M. Piet. I. c. p. 43.

causa fuit quod matricem vacuam & jam contractam incidabant; fœtum quidem habebat contentum, sed fluxerant aquæ & jam contrahebatur uterus; tunc temporis crassum invenere, nec mirum. Nec magis favebit venarum amplitudo, duntaxat enim in placenta areâ turgescunt, & in omni aliâ uteri substantiâ planè exangues videntur, sicuti & sinus qui aliundè arctissimi; hinc per transennam observare liceat, in hysterotomiâ si placenta areæ parcat Chirurgus, vix aliquid sanguinis effluere (1).

III.

Ex hac tenui substantiâ fœtui expellendo minus inservire uterum non consequitur, sed quantum, in partu impedito, rupturæ faveat illa dispositio facilè diagnoscitur. Etenim ubicumque obniteni & se se contrahenti utero nimium resiftit fœtus, ibi viscus dilacerari potest (2). Tanti infortunii ætiologiam explanare intricata res est.

(1) L'incision de la matrice ne donna pas une seule goutte de sang. *Vid.* Récit utile & curieux, Edit. an. 1740, a cel. M. Souchay, de sectione Césareâ à Cel. M. Soumain celebratâ — Idem evenit in eâ quam an. 1768. Celebravit noster celeberrimus Magister Vermond. Nos autem non later quandoque hæmorrhagias esse observatas, non negat Rossetus, & vidimus semel, operante tamen Chirurgo peritissimo; sed hic fortè, ut alias, in causa fuit sectio inferius celebrata: uteri collum & vaginalæ superior pars disiecta erant. Ab alio quoque incisa fuit sedes placenta, & exinde hæmorrhagiam subiisse mulierem notum est.

(2) Ad fundum rumpi potest uterus. Guillemeau, liv. des Accouch. obs. 9. — Simon Scholarius in Eph. nat. cur. d. 1. A. 2. obs. 85. p. 159. — Lamotte obs. 391. Ad latera, & propè collum, quod sæpius observatum, Guillemeau, I. c. obs. 1. Salmuth, apud schenium, p. 12. — Andr. Low. nat. c. d. 2. A. 9. obs. 115. p. 194. Stalp. v. der Wiel. c. 1. obs. 66. Mauriceau obs. 251 & bene multi. Rupturâ vaginalæ fœtus in ventrem delapsus Saviard obs. 25. p. 131.

Causas tamen in externas & internas dividemus. Quidquid prægnantis abdomen percutere vel suggillare valet, pro causa habeatur externa; ictus scilicet, lapsus, nifus violenti (1), validæ compressiones, quibus præcessis ita lœditur jam attenuata matricis substantia, ut dum in fœtum reluctantem se contrahit in partu, hujus resistentiâ rumpatur; rupturæ etiam ansam præbere poterit inscië percontans, iterato tactu, inconsiderata manus. Internæ causæ vel à matre, vel ab infante pendent; ab infante, si sit malè compositus (2), si caput nimium, aut incuneatum, aut malè situm (3). Ex parte matris, uteri morbus & læsio (4), tenuitas (5), deviatio, vitiata pelvis (6), tandem quæ omnia partum aut retardare aut impedit possunt. Hæc autem duntaxat rupturæ favent, si quidem fœtu reluctante, propriâ actione se ipsum dilacerat uterus (7).

(1) Mulier valens & vegeta, quatuor ante partum septimanis, prona & in genua cadens, sonum quemdam in ventre, tanquam crepaturam audivit, statimque reliquo gestationis tempore solito tristior, ponderosior, & pallidior fuit, comedit tamen, dormivit.... de pondere potius interdùm quam de dolore ventris conquesta præfixo partus tempore dolores sensit, sed frustra, at tandem cæ extincta & apertâ absoluissimus fœtus in sanguine materno in medio abdomine natabat, nullâ putredine infectus aut factore gravis. Apud. th. Barth. de ins. part. viis, obs. Jo. Casp. Faullii, p. 76. A lapsu uterum ruprum etiam refert Belhing. diff. de rupt. utero.

(2) Hild. C. 1. obs. 64. Extra vergente sinistrâ manu. -- Dextrâ ad scapulam Scholsius l. c. La Motte, obs. 392.

(3) Mauric. obs. cit. D. Thibault in diario med. mensis Novembri 1754.

(4) Hild. C. 1. obs. 67.

(5) Stalp. v. der Wiel. Cent. post. p. prior. obs. 30. p. 315.

(6) Joh. Jac. Harderus, nat. cur. dec. 3. A. 5. & 6. obs. 133.

(7) Fœtus uterum quatientis convulsionibus, rupturam tribuunt complures, & imprimis, Cel. M. Levret; salvâ summi viri memoriâ, qui longo felici præcessus decursu casum hunc nunquam vidit, hæc infirmari potest opinio. Post eruptas aquas uteri contracti minuitur capacitas; coarctatur

His reverâ causis occurrentibus, effusis aquis, etenim ferè nûnquam ante summos nîsus adhibet mulier; vehementiores exercet viscus contractiones, qui status si diu perduret, tandem rumpitur uterus, unde impeditâ naturali viâ, infanti sive fano, sive mortuo via quandoque patet, quâ toto corpore cum secundinis (1), aut pedibus (2), aut capite (3), aut medio corpore (4) in ventris cavum prorumpit. Quæ varia frequentius olim observata; at melioris hodiernæ *præceos* usu rariora.

Ubi, partu impedito, acriter urgent repetitæ contractiones; pungitivoque, nec non constanti semper & eodem loco, dolore queritur mulier, nec tamen ulterius progreditur infans; attendas, jam de matricis crepaturâ metus est. Tunc si fœtum non convertas, vel aliâ arte quam primum extrahas: periculum in morâ. His neglectis mediis, mox exclamat enitens, auribus instrepit fragor (5), remittunt dolores, dein cessant omnino, stillat sanguis, locum formamque mutat abdominis tumor;

infans, & cò magis, quod magis urgent contractiones, ita ut infantis egressui si sint obstacula, quasi inter prelum hunc comprimi demonstrat experientia. Non negamus subsidente viscere moveri fœtum, nec convolutionibus corripi posse, contendimus tantum, ut ex nostris patet observationibus, ab utero pelli fœtum immobilem & ab eo si quolibet obice renitatur, viscus sed passivè rumpi.

(1) Scholius l. c. M. Thibault des Bois, in diar. Med. mensis Maii 1768.
M. Lambron, Chirurg. Aurelianensis. & act. præses uti dicemus.

(2) Hild. C. 4. obs. 57.

(3) Id. C. 1. obs. 64. quod etiam observavit cel. M. Robin.

(4) Reiselius. nat. cur. d. 11. A. 7. obs. 10. Gregoire. Hist. Reg. Scient. Acad. 1724. p. 36. art. 5.

(5) Heist. l. c. Roederer. l. c. §. 764. Belhing. l. c. — Robin. — Lambron. — Actus præses & alii.

quæ

9

quæ modò dirè torquebatur, nunc quieta appetet prægnans; sed
heu! fallax malacia proximam prænuntiat procellam; mox hor-
renda malorum cohors, properato cursu, advolat, scilicet lan-
guedo, pulsus tenuis, nauseæ, vomitus, singultus, extremorum
frigus, crebra animi deliquia, in quibusdam convulsiones. Quæ
quidem cum occurrunt, rupturæ trahi potest suspicio; tactu
autem certò scies. Digito inquirenti, anteò obvium, frustra quæ-
ritur caput (1); per uteri rupturam dextræ via patet; sub tegu-
mentis distinctè fœtus devii partes attrahere est (2). Aut si pars
quædam infantis extra genitalia propendeat, ex allatis modo signis
haud difficultius de morbo judicabis; quod quidem arduum sanè
& magis si caput obvium incuneatur.

(1) Thibault des Bois, l.c. Cel. M. Deleurye, nota 4. pag. 12.

(2) Anno 1776., mensis Octobris 30 die accessus Cl. actus preses ad pauperculam parochiæ St. Eustachii, trium liberorum matrem, defunctam horâ septimâ matutinâ a partu denegato. Solo tactu abdominis inæqualiter tumefacti, præcipue ad umbilicum latere dextro, fœtus pedes hîc facile distinxit. Mortis causas & symptomatum seriem ab obstetricibus sciscitatus, tres continuos dies, partus dolores acerrimos passam fuisse audivit, sed præcipue versus ossa pubis: quo quidem dolore semper & in eodem constanti loco, pridie adhuc diriore cruciata, subito exclamaverat, dein crepitum quodam auditu, quievabant dolores, immò abhinc omnino remiserant. Tum sublevatam sese affirmabat mulier, sed mox heu! recruduerunt accidentia; horâ decimâ serotinâ, singulture incœpit prægnans, liquores nunc atro virides, nunc croceos totâ nocte evomuit, dum tandem viribus fractis deficiens, vitâ placide deceffit. Hujus cœ infortunii testem desiderans, Cel. M. Piet vicinum advocavit cl. preses. Quo advento, incisis regumentis apparuere pedes ubi diximus, fœtus transversè fatus, caput ponè uterum, facies superna; funiculus inter infantis crura; ad capitis latus placenta; uterus contractus jam voluminis $\frac{1}{4}$ imminuebatur, in collo antorū transversâ aperturâ disruptus, ceteròquin sanus aspiciebatur. Inciso viscere, in fundo apparuit prior placenta sedes. Minima duo sanguinis in abdome reperita sunt coagula.

V.

Tam funesti morbi accidentibus non inconsultè pensitatis : inter pessimas haberi prognosin nemo inficias ibit. Periculosa plenum opus ales facilè dijudicatur uteri sectio, vel peritissimā manu celebrata ; quantum à fortiori discriminis secum afferunt dilacerationes subitanæ & rupturæ quibus frequenter imminent gangræna. Sæpè sc̄pius cum desperata res est requiritur auxilium, aut si matutè, jam gravidae periculo territi, jam muliercularum clamoribus & consiliis molestè fatigati, vel præjudicatâ opinione abrepti, unicam operationem respnuunt parentes & amici. Alias etiam, fatali quodam operandi metu, tristi fato permittitur mulier, & sic ingravescente ad ultima morbo, nunc viribus paucis deficiens, nunc convulsionibus correpta, miserè occumbit (1).

V. I.

Quod autem infaustissimi sit ominis uteri ruptura, non ideo tamen omnis spes abjicenda, præsertim in non nimis extenuatâ muliere. Arti viam detexit natura. Quandoque factum in ventre dissolutum, aperto abscessu externo foras eliminavit (2). Aliundè

(1) Alix placide vitâ decesserunt. Low. l. c. -- Scholz, l. c. -- Stalpart vander Wiel, l. c. Act. præses l. c. aliae in convulsionibus. Haller opus. pathol. obc. 38. hist. tertia. Belhing. l. c. M. Robin.

(2) Mainald, de part. prodig. in quo à rupto utero, in ventris dextrum latus irruit infans, quo relicto ita convaluit mulier ut paulo post de novo impregnata fuerit, idem evenit secundo partu. Hic infans in latus sinistrum. Tribus quatuorve mensibus elapsis, alter abscessu sponte aperto propè umbilicum dextrorum, exemptus est, & alter facta sectione ubi magis pars prominebat in latus sinistrum. Convaluit mulier. Leg. in Planque, Dict. T. I, p. 167, —

patet ex observationibus, plures ex vulneribus in abdomen simul
& utero gravo infictis, sanatas & superstites evasisse mulieres(1);

Alterum extat in le Dran, obs. 92, exemplum à M. Metivier communicatum, aperto abscessu gangrenoso eliminatus est infans. Hic tubarium sufficitur conceptionem M. le Dran, verum amissi liquoris per vulvam effusio, per partus dolores, uteri rupturam satis demonstrat. -- Casum non minus mirandum Ch. actus præsidi communicavit D. Halot. D. M. P. in hoc effluxis aquis, fetum educere frustre conata est prægnans, remissis doloribus convalentem credebant, sed tribus elapsis mensibus, abscessa in abdomen laborabat, sponte aperto duobus in locis, tenuissimis hiatibus, in magnum urbis Nosocomium (l'hôtel Dieu) abiit; per fistulas incisis & musculis & Peritoneo apparuit fœtus jam putrescens, fluebat pus; intestinum colon ulceratum videbatur, artificiali cum ano convalluit mulier; nunc omnino restituta vivens & recte valens.

(1) Anno 1588, 11^a. Martis, mulier gravida tribus juxta umbilicum digitis dextrorum versus, glande plumbeâ è sclopeto confossa est; fœtum utero conclusum à summo humero dextro ad lumbum oppositi lateris trans medium palmonem & diaphragma totum penetravit glans. Sesqui horâ postea fœtum enectum cum secundinis non multum ægrè peperit.... convalluit mulier. Roffet. de part. cœl. Histor. memorabilis, p. 215. -- Aliud exemplum legere est, ex J. Mart. Reichard. anno 1735. Cauponis uxor gravida, ita vulnerabatur iœtu sclopeti minimi, globulis plumbeis quorum alii in scapulam sinistram, alii in brachium, &c..... Præter hæc vulnera leviora, præcipuum reperiebatur in abdominis sinistro latere, latitudine manus sub umbilico obliquè versus dextrum, cuius finis cum specillo sciscitatorio non potuerat attingi.... viso sanguine in lipothimiam incidit mulier, vomitu paulo post correpta est. Crastinâ die urgebant partu dolores, quibus ingruentibus, & effluxis aquis paulo post & momento citius sanum & benè formatum filiolum in lacem edidit... sed mox ubi læsio querenda esset innovuit, nempè recens nato infante à sordibus adhærentibus abluto, vulnus à globulo plumbeo ciceris majoris magnitudine inficatum, super infantuli dextri lateris clavicula in conspicuum venit; ex quo frustulum linteaminis indus vi machine ignivomæ decerpti, ac illuc delati extrahebatur, globulus autem demum 24 ejusdem mensis ex cute ferè papyraceâ facta excidebatur..... Superatis accidentibus gravissimis, sanata est, sed longo tempore, mulier. Vid. Dissert. de utero gravido unâ cum fœtu vulnerato. in Disp. Chirurg. sel. ab Hallero. t. 5. p. 102.

hinc ineluctabili fato prægnantem cripiendi spes non mediocris affulget. Statim ergo post uteri rupturam (ut cum matre servetur si possit) fœtus quam celerrimè extrahendus. Quibus autem mediis utetur Chirurgus, hoc opus. Quando pedibus arreptis, aut aliter naturali viâ educi potest infans, feligendam hanc methodum autumant.⁽¹⁾ : vera hæc appetat indicatio; presenti mitiori auxilio, quamlibet sectionem horrescit Chirurgus. Verùm si variae recensentur & perpenduntur observationes, soli sic Rungio hæc methodus⁽²⁾ prosperè successisse videbitur; aliae omnes, partu absoluto, vitâ deceperunt mulieres⁽³⁾, quas ad orcum deduxit aut viscerum

(1) On doit préférer cette voie à l'opération Césarienne, en supposant même que l'endroit de la matrice qui resserre le fœtus fasse quelque résistance, Cl. M. Simon, in aëst. Reg. Chir. Acad. t. 2. p. 322.

(2) Hist. inst. Chir. t. 2. p. 728.

(3) La Motte, I. c. Haller, I. c. Hist. 1 & 2. Burton t. 2. obs. 7. p. 172. vettente cl. Le Moine. -- hoc anno die mensis Maii 23^a. mulier annorum 33, quatuor liberorum mater, quintâ vice gravida, metu tangens, partu dolores interdùm experiebatur; per 48 horas paulatim effluxere aquæ, caput obvium tactu explorabat obstetrix, 25^a urgebant dolores, sed non ultrà progredi videbatur infans; hâc die horâ quintâ pomeridianâ advocabatur cel. M. Deleurye, qui caput sed obliquè sitem, cura tumefactâ, agnoscit. Quòd semper facile pepererat rite conformata mulier, hoc in partu sic succedere posse existimat. Pulsus erat frequens & durus, sanguinem brachio mittendum judicavit; quo peracto remiserunt dolores; 26^a denuò urgebant contractiones; caput licet obliquum in pelvi superius fretum progreedi videbatur. At repente nisibus ingruentibus, de infantis insolito motu querentem, simulque se suffocatam dicentem, & imi ventris calore vexatam audivit obstetrix, quæ statim mulierem tetigit, sed frustrâ caput quærebat; tunc cel. M. Deleurye manum, horâ sero-ginâ sesquiundecimâ, imploravit. Antea dígito obvium caput nusquam occurrit. Digitum mæconio folidum reducit, Collocatâ Prægnante ad partum præternaturalem, femur & pedem invenit, traxit, & absque illâ difficultate eorum unâ cum secundinis exemit infantem, cui circa collum ter contortum fuisse funiculum asserit obstetricans. Rursus illapsâ manu in uterum, intestina tetigit, & incassum reducere tentavit. De rupturâ uteri certior factus moriturus

suggillatio, aut sanguis in abdomen diffusus. Quâ enim viâ, retracto viscere, difflueret humor? evocari ne poterit injectionibus in uterum & per crepaturam in abdomen missis, uti monet cel. Crantz? At à suomet ipse consilio diffidit, moxque ad servandam pueroram sectione evacuandos humores præcipit (1). Anceps fanè hoc in casu Chirurgia.

Aliud autem est, si toto corpore in ventrem proruerit infans, aut si arte per naturalem viam educi nequeat. Unica tunc supereft tentanda gastrotomia, dura cogit necessitas, ratio dictitat, probat experientia (2). Itaque quo loco magis eminent infantuli partes, hic cautè incidatur abdomen, peractâque sufficienti sectione, cum secundinis extrahatur fœtus; quantum licet evacuentur liquida, si quæ sint, auferatur grumosus sanguis, & ut in hysterotomiâ deligetur vulnus. At si pars infantis ita retineatur ut absque visceris dilaceratione adduci nequeat, incides-ne uterum,

uxorem conjugi præfatus est; & reverâ elapsis horis quindecim, convulsionibus miserè cruciata obiit. 28^a manæ apertum est ejus cadaver adstantibus MM. Lesne, Deleurye & cl. actûs præside; inciso ventre vix sanguinis diffusi aderat selsqui libra; intestina inflammata, necnon uterus jam putrescens, aspiciebantur; in parte visceris anteriori tribus digitis supra orificium, rupturam semi lunarem & laciniatam conspexerunt, quâ dimidio corpore in ventrem proruissé judicari potest. In parietale infantis dextro tumor aderat oblongatus, quo pater obliquè sicutum fuisse caput infantis, sive denegatâ viâ, iteratis contractionibus sese disruptis pressione capititis lœsum viscus.

(1) L. c. §. 42.

(2) Anno 1767, 4^a. mensis Octobris die, gastrotomiam optimo cum successu celebravit expertiss. d. Thibault des Bois, Cenomani Chirurgus. vid. in diar. med. mense Maii 1768. ad vitam rediit mulier. — Hanc quoque, & quod mirum, bis celebravit in eadem muliere D. Lambtron Aureliani Chirurgus expertissimus. 1^o. Augusto mense 1775. 2^o. Mense Octobris 1778. Postea Januario mense 1781, partu naturali, mulier infantem facile & brevi tempore edidit hodiè vegetum & validum. In Epistola ad Cl. act. præsidem notat D. Lambtron, ter ante primam operationem peperisse mulierem, sed partibus

ex consilio cel. Crantz (1) ? Quid vetat ? casu supposito , melius est secare quam dilacerare. Quinimò , si rupturæ labia putredine correpta videantur , & spes salutis remaneat , exsecanda judicamus , Celsi præcepto , satius est anceps experiri remedium quam nullum.

difficillimis cum acerrimis doloribus & diuturnis. Duo primi infantes intra pellim periēre ; vixit tertius qui minimus erat. Has reg. Acad. Chir. observatio- nes communicavit.

(1) L. c. §. 37.

Has Theses , DEO JUVANTE , & praefide M. GUIDONE-FELICE ALLAN , Artium Facultatis & Chirurgie Magistro , Regis , in magno Consilio , Chirурgo ordinario , necnon in Regie Familie domus & Francie magnâ prefectorâ ad relationes jurato , tueri conabitur GUILLELMUS-CAROLUS BY , Parisinus , præclare Artium Facultatis Magister in Universitate Parisenſi , necnon SERENISSIMI PRINCIPIS Biturigum Ducis , Chirurgus or- dinarius , Theseos auctor.

P A R I S I I S.

Die Sabbati 15 Mensis Junii. Anno Salutis 1782 , à sesqui- secundâ post meridiem ad septimam.

IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS,

PRO ACTU PUBLICO

E T

M A G I S T E R I I L A U R E A.