


Bibliothèque numérique


medic@


Cullerier, Michel. - Cours de maladies vénériennes par Mr Cullerier, chirurgien des Capucins et Capucines de Paris


Paris, entre 1792 et 1824.


Cote : Ms 5248
















La maladie vénérienne est une maladie contagieuse gagnée par le contact de parties couvertes d'un léger érudème. Cette définition ne donne pas une idée bien précise. C'est la gale qui est aussi des maladies contagieuses. puis la maladie vénérienne attaque plusieurs parties du corps. il n'y a donc que sa description et celle de ses symptômes qui puissent donner une idée exacte.

Lors de son apparition se présentant sous la forme de pustules par opposition à la petite vérole qui donna le nom de grosse vérole puis elle a perdu son épithète. ou le surnom appelée rogne &c.

À cette époque les français avaient fait la conquête de l'Italie. comme les vainqueurs sont toujours odieux pour le vaincu des italiens donnaient et attachèrent à cette maladie le nom de mal français. c'est là qu'on eut pour le nom de mal de Naples &c. gaspard forellat crut qu'elle était d'origine de leur pays. peut-être l'avait-il vu d'abord en cette province. quoiqu'il en soit il lui en donna le nom.

Les affriganis les habitants de la mauritanie l'appellèrent le mal espagnol et en général on lui donna des noms différents suivant les peuples dont on croyait tenir sa fureur (présent).

on l'appelle maladie de venus maladie vénérienne maladie perçette parce qu'on se était tenté d'en être affecté ^{avec} attaquant les parties de la génération, ou bien parce qu'on cache cette affection ou la faisait aussi traitée secrètement. fraccastor a fait un poème où il en explique l'origine. il suppose que l'homme qui en fut le premier attaqué était le berger syphibis et de là vient le nom de maladie syphilitique.

C'est en 1494 que la maladie a fait son entrée en France.

on comptait une gonorrhée ou seulement

en europe. On conjecturement de leur auteurs est les les
pistes d'une maladie connue auparavant; si leurs mutations
en une autre maladie; et elle été apportée du nouveau
monde?

Dans son commencement la maladie n'affectait que
les téguments, ne se présentait que sous la forme de
pustules aux parties de la génération ensuite elle
devenait consécutive et affectait toutes les parties du
corps, 1495

Le 1^{er} auteur qui en ait parlé est Léonicenus en 1496
il avait observé que les pustules se faisaient sentir inter-
neurement et que quand les douleurs étaient vives les
éruptions n'étaient pas complètes et réciproquement...
il n'explique pas d'ailleurs quelle était cette douleur.
il parle aussi de tumeurs aux aisselles et aux aines auxquelles
il donne le nom de bubons mais il n'indique pas si elles
tenaient à la maladie vénérienne ou bien à ce qui se
voit des maladies adynamiques. Il compare cette
maladie avec l'éléphantiasis et autres maladies
cutanées, et il en résulte dit-il, que c'est une
maladie cutanée nouvelle qu'il attribue à la
dégraderation des humeurs.

en 1497

adit à peu près la
même chose que Léonicenus mais il observe que c'est
par la communication des deux sexes que la maladie
vénérienne se propage

en 1498

Lebartanus a qui décrit les mêmes
symptômes. C'est une maladie cutanée seulement
consistant en des pustules des élévations sur les
parties génitales et qui de là se portent sur le
reste du corps. Léonicenus avait mis cette maladie
en parallèle avec l'éléphantiasis de la lépre. celui-ci
dit que c'est une modification de la lépre de
l'éléphantiasis du primum &

3. en 1499 Gaspar Torella medecin espagnol et l'un
 parle de la maladie comme d'une affection cutanée, mais
 il avait observé que les ^{pustules} ~~males~~ étaient ^{legères} faibles les autres
 plates qu'il y en avait de sèches, d'humides de blanches
 de noires. déjà un autre symptôme se faisait remarquer
 c'étaient de petits points, de petites saillies en forme de
 figues dans sans doute le nom de figues. il attribue
 la maladie vénérienne à une modification des Lairs
 d'Amérique où il prétend qu'est le berceau du mal
 français, napolitain espagnol, américain &
 en 1503 d'autre disent en 1510 Jean de Vigo, médi-
 cin de doctrine un traité de chirurgie. il y parle
 des pustules vénères qu'il divise en plusieurs espèces. il
 a cru observer que leur couleur variait suivant
 les tempéramens des individus; qu'ainsi elles étaient
 blanchâtres dans le lymphatique, noires chez les
 bilieux & cela n'est pas généralement vrai quo-
 qu'on le trouve dans beaucoup de circonstances
 il avait observé qu'il y avait des douleurs intérieures
 dans l'ostéocôpe. ils n'étaient pas seulement
 douloureux, quelquefois ils étaient affectés, formaient
 tumeur dans l'ostéocôpe. d'autres fois il y avait carie.
 en 1507 Giovanni Maria parla d'ulcères à la bouche
 et au gosier dont on n'avait pas encore fait mention
 de chancre; d'après ces auteurs il paraît qu'il
 était ~~plutôt~~ la bouche que paraissait le symptôme
 c'était plutôt à la bouche que paraissait le symptôme
 1546 Jacques Cataneo medecin geinois a parlé
 des mêmes symptômes excepté de quelques uns décrits
 par Jean de Vigo qui ne se trouvent point dans
 son ouvrage. mais la gonorrhée n'était pas
 connue et Léon n'en avait pas parlé. Les
 expressions dont il se sert déignent elles en
 cette circonstance une gonorrhée ou seulement

4.

en manière qui déterminé de la douleur quand l'urine passe? on croirait d'abord qu'il parle de la gonorrhée, mais ensuite en lisant les autres contemporains on croit que c'est tout que de chancres. ainsi c'est en certains d'autant plus que ce n'est qu'en 1551 qu'il est question de la gonorrhée d'une manière bien positive.

en 1518 nicolas de verone ne parle pas des maladies du canal de l'urètre. apparemment qu'il y avait eu de la gonorrhée de cette époque il en avait dit quelque chose. il parle des fleurs de verone, de pourreaux de végétations en forme de choux fleurs et c'est la fois qui parle de ces 3 symptômes. il dit aussi que quelque fois les ulcères se portaient à l'arrière-bouche qu'il y avait extinction de voix que les cartilages se cariaient de la difficulté pour la prononciation des sons, pour les déglutition &c.

en 1530 parut le poème de frasciolo qui a si bien décrit les symptômes qui lui étaient connus. il ne parle pas seulement des l'urètre. ainsi ils ne devaient pas avoir lieu pour lors. il décrit poétiquement tous les autres symptômes dont ses prédécesseurs avaient parlé il parle encore de bubons inguinaires et il est à présumer qu'il a eu vu cette maladie quand il dit inguen edebat. c. ad. qu'un ulcère sougeait l'aine. il paraît qu'il ne connaissait que le bubon ulcéré

en 1536 nicolas maffa med. italien qui décrit très au long tous les symptômes dont on vient de parler qui parle de tout cela

5 qui parle de plusieurs maladies anciennes qu'il a guéries
 il a donné les raisons, a bien indiqué les remèdes qui
 conviennent à la maladie vénérienne et si la mercuriale
 lui étoit venue toujours administrée suivant les préceptes
 il ne s'en feroit pas enfler. Mais dans d'autres occasions, il
 a décrit le bubon enorgé et il étoit vain, il écrit que
 le bubon est le symptôme critique de la maladie vénérienne
 qu'on croyoit avoir son siège dans la foie et tout le malin
 se portoit ensuite dans des aines, par la tisse cellulaire
 crasse qui a duré un demi siècle
 en 1538 alphonse féri ital. ajoute à la description
 de la veal. ven. au symptôme qui fut ensuite bien
 commun. c'est la chute des poils des cheveux des sourcils
 symptômes qui devint ensuite général de sorte qu'on dit
 qu'alors on se rase la tête et la barbe. pelades & ...
 on en parla encore au 17^e siècle mais c'est
 déjà sans depuis 18 ans il n'en a vu que 9 ou 10
 exemples et encore tous les cheveux dans les poils ne
 manquaient pas car il étoit que partiel
 en 1542 ant. le cog dans son traité de maladies
 vénériennes n'a fait rien de neuf seulement il
 décrit mieux le bubon des aines, vénérien des aines
 et lui donna le nom de poulain.
 en 1551 antonius musca brassavola disciple de leonicenus
 dans son traité de morbo gallico, en décrit bien tous
 les symptômes c'est le premier auteur qui ait fait mention
 d'une manière bien particulière de l'écoulement d'un
 canal de l'urètre. on croyoit que c'étoit un
 écoulement de matière féminale. on fut bien
 étonné mais le nom fut conservé. on lui a
 substitué dans ces derniers temps le nom de blenorhée
 qui ne ^{lui} conviendrait pas quoiqu'un peu mieux que l'ancien
 nom. on l'appelle aussi chorde + pisse porcique
 quand il est inflammatoire l'écoulement fut
 beaucoup plus. Si brassavola avoit observé qu'il
 étoit vénérien il n'auroit pas ignoré qu'il étoit

L. B.

il n'était pas vénérien mais qu'étant contagieux il pouvait
passer à d'autres individus. enfin on crut que c'était
une branche venue d'Italie de la maladie vénérienne
dans ces derniers temps on a prétendu que tous les
écoulements étaient exempts de virus vénérés. et que les
gonorrhées ne pouvaient produire que la gonorrhée, mais
de même qu'il est faux que toutes gonorrhées sont vénériennes
de même il n'est pas vrai qu'elle ne le soit jamais.

en 1555 Jarnal parle de différents écoulements seulement
il les fait venir de l'intérieur du bas ventre de la vessie &c.
il déclame contre la mercure et toutes les préparations
on attribua à ce médecin la mort de François par
les autres chirurgiens avaient proposé les frictions.
on dit qu'un d'aux avait déclaré qu'il était
davis que son maître fut frusté comme le dernier
restraint de son royaume.

en 1556 Pecus & Armandus Thomantinus parle
de nouveaux symptômes de tintement d'oreille, affec-
tion fréquent à cette époque et qui le décrit de ^{plus}
dans la suite brièvement parait à celui que
produit le son d'une cloche ou d'un tambour
tintement et mouvement confus d'un bord ou
vement &c. quand certaines parties comme les
voies du palais & du plancher &c. sont détachés
on peut éprouver ce symptôme; ainsi ce peut être
bien être pour un symptôme direct de la maladie
vénérienne.

Quelle peut être la cause de la maladie
vénérienne, comment a-t-elle commencé? il y a
3 opinions parmi les auteurs. Les uns ont dit qu'elle
était née en Italie vers 1494 d'autres que
c'était une modification des maladies
antérieures d'autres enfin que la nouvelle monde
ayant été découvert lorsque la maladie a paru
elle en tenait sa source.

7.

Les uns ont attribué la maladie aux astres à leur
rencontre inégalement et ce sont presque tous
auteurs qui en ont parlé d'abord...

La seconde opinion est celle des auteurs qui rapportent
tout à la divinité, et dit que la maladie a été envoyée
par elle pour punir les hommes de leur libertinage & affligit
pluspart des auteurs italiens presque tous les espagnols, peu
de français, ont été de cette opinion.

D'autres ont pensé que la maladie tirait son origine
de soit de gros fuyes avec des femmes, ou de la même avec
des fuyes femelles. cette opinion n'est fondée sur aucun
fait. Van-helmont a prétendu 1640 que c'était par
de soit d'un homme avec une jument et a dit cela
sur des traditions orales, qui n'ont aucun degré de
probabilité. Jie raveli a prétendu depuis que les
néapolitains pour le venger des français leur avaient
fait manger de la chair humaine amolée en pâte... pour
le rapport de certains vieillards, il rapporte avoir
nourri un chien avec de la chair d'un chien
que le ser lui avait présentée des pustules semblables à celles
qui se trouvaient sur ceux qui avaient alors la maladie
vénérienne. ces expériences ont été répétées sans offrir
le même résultat.

en 1640 jéru mandan a prétendu que la maladie
avait son origine à la cohabitation d'un
chevalier romain avec une courtisane qui avait
la lèpre à une époque où elle avait ses règles épuisées
ou son affection lèpreuse était extrêmement
développée.. que bientôt après l'accomplissement d'un
une irritation à la verge qui se porta à l'habitude
du corps. il veut bien se faire que la maladie
vénérienne ait passé d'une lèpreuse à un
chevalier sans qu'il soit prouvé que la lèpre
ait pu produire la maladie vénérienne. cette
cette opinion de mandan est aussi celle
de mathiolo.

andré celsus regarda la maladie comme une
rempoisonnement, et alleus et des espagnols qui donnerent
a boire du vin aux françois de vin ou on avoit
mêlé du sang humain

Comme lors de l'éruption de la maladie venerea
en europe il y eut de grandes inondations de manière
que les tiber estoit débordé le sé à romé monté sur
les étages &c on n'a pas manqué d'attribuer la maladie
aux emanations terrestres-aquatiques

Dès l'origine de la maladie 40 auteurs ont pensé
qu'elle étoit une suite de maladies antérieures.

L'éléphantiasis étoit une maladie cutanée qui
consistoit dans l'engorgement du tissu cellulaire cutané et
sous cutané. quelquefois les membres avoient de double
de quadruple de leur volume ord^{re}. La surface de
la peau ressembloit après à celle de l'écorce des arbres et
de étoit quelquefois accompagnée d'ulcérations.

La lèpre qui y avoit tant de rapport que
les auteurs ont confondues ne presentoit de différence
de l'ore qui se trouve dans la lèpre il y avoit presque
toujours des ulcérations, des excoriations au lieu que
c'étoit plus rare dans le 1^{er} cas. il y avoit une
division de l'hôpital de venise consacrée à ces 2 maladies

Le lichén étoit un ulcère qui rongeoit tantôt
dans (c'est à dire) de l'autre. - Le volume &c
ces divers auteurs ont donc prétendu que
et que la maladie nouvelle étoit devenue conta-
gieuse par le coït. or la maladie vénérienne étoit
étoit une maladie qui quelquefois ne commençoit
pas par les organes de la génération, ainsi une
maladie cutanée avec pustules et pustules
avec ulcérations ressembloit beaucoup à
L'éléphantiasis. il est vrai qu'il n'y avoit
point d'aumentoient à la peau & l'ent.

9. Différence majeure qu'il a observée, cependant quelquefois on voit des pustules où il y a suppuration dans la tesse-cellulaire, et il y a souvent plus de différence entre un symptôme vénérien et un autre que'il n'y en avait alors entre la lèpre l'éléphantiasis & la maladie vénérienne. puis à l'apparition de la maladie vénérienne les autres maladies cutanées ont le font dissipées, ainsi la lèpre l'éléphantiasis ont disparu presque totalement. il n'a vu que deux exemples, de la 2^e maladie... il a vu des lèpres, mais non telles qu'elles ont été décrites par les auteurs qui en ont vu beaucoup. Voilà 3 raisons très-plausibles pour regarder des maladies ven. comme une modification & cependant ce n'est qu'une probabilité.

une 3^e opinion est celle de ceux qui regardent la maladie vénérienne comme originaire de l'Amérique. Christophe Colomb partit d'Europe au mois d'août 1492. il revint de St. Domingue en 1493... il descendit à Hispaniola et vint débarquer au port de... il avait apporté la maladie vénérienne il est à présent un peu quelle aurait dû commencer ses ravages au lieu où il séjourna quelque temps car on sait que les matelots quand ils arrivent dans un port tombent ordinairement sur les femmes, qu'elles qu'elles soient... il entra ensuite à hisbonne il fut fêté par le roi de Portugal il y resta neuf jours. il y avait dans cette ville des filles publiques, aussi bien qu'aujourd'hui... cependant aucun auteur n'a écrit que la maladie vénérienne ait commencé par Colomb à séjourner à palos à Seville. de là il s'en vint en roi d'Espagne... on prétend qu'il s'arrêta un mois dans cette dernière ville. il fut ensuite à Barcelonne en traversant toute l'Espagne. Il séjourna quelque temps à Barcelonne. il n'y a aucun auteur qui ait dit que la maladie vénérienne ait commencé par cette ville et aucun qui ait dit que Colomb n'y se trouva point d'abord ou n'entra par sa route... Ces arguments sont si

10. Fort qu'on a dit que ce n'était que dans son second voyage que Colomb avait fait présent en Europe de la maladie vénérienne. Colomb est le seul en son voyage car il ne revint d'Amérique qu'à la fin de 1495 il amena avec lui 250 soldats en Espagne. Il y en eut qui s'en furent en France, mais alors c'est à la fin de 1495... à la fin de l'expédition au des Compagnons de voyage de Colomb, moururent qu'on voulait arrêter au lieu d'Amérique en 1494 ou au commencement de 1495 mais on ne sait pas où il alla. mais on dit que plusieurs ^{des} soldats revenus avec Christophe ayant pris part dans l'armée espagnole... cette armée n'arriva en Italie qu'à la fin de 1495 ainsi les Espagnols n'eurent pu communiquer avec les Français qu'à la fin de 1495 au commencement de 1496 ou les auteurs disent que les symptômes de la maladie vénérienne ont commencé en 1494 ou si la maladie existait à la fin de cette année elle n'a pu venir d'Amérique. Les historiens qui ont rapporté de la campagne de Charles VIII ont dit la même chose. L'arrêt du parlement rendu en 1497 parle d'une maladie qui neque depuis plus de 200 ans... on a dit que la maladie était venue en Amérique mais d'autres auteurs ont dit que c'était venue que les Européens l'avaient apportée.

Symptômes de la Maladie Vénérienne

1^o avec solution de Continuité
 charcra. on a appelé ainsi une solution de Continuité qui survient à des parties ou le piderme a peu d'épaisseur et qui paraît être le fruit d'une Maladie vénérienne. on lui a donné le nom

De ~~maladie~~ cancrum cancer chancre parce qu'il y avait
 Des ulcères, rougeurs comme les cancers. ces ulcères ont été
 appelés beniens quand il n'y avait point de douleurs ni de
 rougeurs ou autre complication viciées quand il y avait douleur
 inflammation, &c. & qu'ils étaient difficiles à guérir
 ensuite on les a distingués en inflammatoires, et en
 indolents. en confluenz et en folivains, en statésaires
 et en mobiles et rougeurs quand ils paraissent touzents.
 on bien quand ils se cristifient d'un côté et font des
 progrès de l'autre gagnant d'un côté ce qu'ils perdent
 de l'autre.

ils ont été ensuite divisés en primitifs et en
 Concutifs... Les primitifs sont ceux qui paraissent peu
 de temps après le contact contagieux; ainsi depuis 4 jours
 jusqu'à un mois... Les Concutifs sont ceux qui
 surviennent après des chancres primitifs guéris soit spontanément
 soit par quelques moyens médicamenteux ou bien qui ne se font
 pour développer que quelques mois après le contact.

Le siège des chancres est pour ainsi dire toute
 l'habitude du Corps, cependant quelques parties sont plus
 exposées que d'autres ce sont celles qui sont dans un contact
 plus immédiat lors de la copulation ou bien celles qui sont
 couvertes d'une épiderme mince

Chez l'homme les chancres attaquent ordinairement
 la prépuce ensuite le gland n'importe dans quelle partie.
 astuc a dit qu'on ne voyait jamais de chancres à la
 surface intérieure de la prépuce mais on en voit souvent à la
 surface extérieure et souvent sur le gland (en
 quatre ou à peu près un beaucoup de malades y en ont
 quelquefois des chancres ~~sur le gland~~ se voient sur les
 bourses, mais cela est très-rare et alors ils sont compliqués
 avec des pustules.

Chez les femmes les petites lèvres, le gland de la
 fourchette l'entrée du vagin quelquefois la face

antérieure de grandes lèvres, quelquefois la surface externe
 et autres parties intérieures, ou antérieures, ou postérieures
 de l'anus dans l'un et l'autre sexe, & hautes, & longues
 qui se trouvent dans les anfractuosités résultantes
 du repli de la peau à cette partie. entre chaque
 repli où la peau est plus tendre se trouve une
 matière sablée... on en appelle ces ulcères ragades
 elles ne sont pas plus difficiles à guérir que d'autres;
 mais quand elles sont à l'intérieur de l'anus elles sont
 plus difficiles à reconnaître et même à guérir
 puisqu'elles sont le produit du contact immédiat; d'autre
 fois ce n'est pas le fruit de la débâche anale.

Le noubril en est quelquefois le siège. ordinairement
 ils sont consécutifs. cependant quelquefois ils ne le sont
 pas comme par exemple si la matière vénériale se
 répandant sur le noubril pénètre dans la cavité
 du noubril. c'est chez les personnes surtout chez desquelles
 le noubril est enfoncé; alors le pidarmer est plus
 mince plus tendre et plus susceptible par conséquent
 d'être pénétré. ensuite la malpropreté qu'on
 peut tenir cette partie surtout après la copulation
 peut être cause. on en voit quelques exemples

des chancres ont lieu aux oreilles tantôt sur
 la conque tantôt à l'entrée du conduit auditif
 tantôt dans le fond du conduit auditif externe.
 ils sont toujours consécutifs, à moins de baigner
 d'acids portés sur cet organe. mais le pidarmer
 est plus épais en ces endroits à cause du
 contact de l'air. ordinairement ils sont difficiles
 à guérir parce qu'ils sont compliqués avec
 d'autres maladies parce que d'ailleurs il y a alors
 perforation du cartilage &c. et dans le
 conduit auditif ils sont compliqués de carie
 du conduit auditif ossif.

Les plaques... forment la membrane.

13.

intérieurement des paupières, souvent le cartilage tarso se trouvent
attaqués par la maladie et quelquefois les paupières sont
perdues quand la maladie a été négligée est ancienne et
dans ce cas les rayons lumineux valent plus euodifiés sont
frappés la globe de l'œil et fatiguent beaucoup la vue.

Ceux qui ont bien sur les cornées transparentes, ce qui
arrive assez fréquemment sont encore plus funestes en
ce que la cicatrice donne de l'opacité à la cornée
transparente et empêche la pénétration des rayons
lumineux.

La carie de la membrane pituitaire est souvent
compliquée de la carie des os qui entrent dans la
composition des fosses nasales.

La bouche tant à l'intérieur qu'à l'extérieur est
également le siège de chancres, et cela est fréquent surtout
chez les enfans qui tétant tétent de nourrices infectées, ou qui
en sont embrassés & chez des personnes plus âgées qui
embrassent des enfans infectés, chez les hommes qui
embrassent des femmes infect. et réciproquement et
alors c'est un symptôme primitif... d'autres sont consécutifs
et ceux là attaquent toutes les parties de la bouche... pour
la langue elle est souvent sillonnée perforée détreinte
en grande partie vers de chancres - un homme qui
encore dans l'hôpital s'en est perdu une grande partie.

L'arrière bouche de la membrane du pharynx & quelquefois
de l'ordure est portée si loin que les parties molles qui
couvrent la colonne vertébrale sont attaquées de même
que les os. quelquefois il y a communication des vaisseaux
avec les voies aériennes.

Les chancres ont lieu fréquemment à l'origine
des ongles, attaquent les doigts soit de mains soit de pieds
à l'infirmité des ongles de manière que les ongles

Les
 leur frappées de mort on appelle ces ulcères des ^{ulcères} ~~ulcères~~
 ou saglades, quelquefois ils se trouvent à la réunion des
 doigts plus fréquemment à celle des pieds, on les nomme
 saglades, des orteils parce qu'ils ont une forme alongée.
 c'est assez fréquent chez le pauvre, un du peuple qui
 font peu soigneux de ses propriétés du corps. ce n'est qu'à
 que sur les femmes publiques du dernier étage qu'on
 en rencontre ~~mais~~ jamais sur une femme propre ou
 du moins c'est très rare (exemple chez un garçon boulangier
 aux deux pieds)
 quelquefois on en voit sur les parties où le sudorium
 a manqué de plus d'épaisseur mais il est rare qu'il soit
 simple. La maladie était pustuleuse primitivement &c.

pour distinguer un ulcère vénérien de celui qui n'est
 il est bon de remarquer qu'il y a à la face intérieure qui
 préparée, à la face externe du gland une humeur fébrile
 sabuleuse. elle peut devenir très irritante et produire
 par là des excoriations qui négligées peuvent prendre
 l'apparence de légers ulcères... il faut examiner
 la manière de se voir du sujet, si est propre si
 l'ulcère est superficiel, si l'humeur fébrile est acrimonieuse
 ce qu'on peut reconnaître par des douleurs &c. si l'ulcère
 est profond, les douleurs sont fortes il est à présumer qu'il
 en a point de maladie vénérienne, et si par des
 adoucissants si par des soins de propreté les parties
 se cicatrisent c'est la preuve qu'il n'y a point de
 complication vénérienne.

il y a des femmes qui ont des fleurs blanches
 extrêmement acrimonieuses, ce qui est encore augmenté
 quand les règles sont près de paraître, et quand elles
 finissent... l'écoulement très tendre dans une
 femme dans l'action vénérienne peut avoir une
 excoriation irritée par cette humeur acrimonieuse
 peut donner à l'homme l'apparence de chancres sur
 la partie... quelquefois seulement la simple

15.

Contact, le simple frottement trop long & continué peut produire des excoriations... et on a vu des personnes chez lesquelles il fallait un frottement de demi-heure pour appeler l'orgasme vénérien. à leur place, frottement continué, se fontient des excoriations.

un homme qui avoit subi la castration pour une hernie congénitale etait obligé de se retirer 3 quarts d'heure ou un heure par des frottements continus pour se mettre en état de se coiffer, et il y avoit excoriation. quelquefois des personnes ont le filat très tendu des parties que les reserres forme (combure) par un frottement naturel long & continué de filat se déchire. il en résulte des ulcères qui en imitent ceux des ulcères vénériens. quelquefois aussi une introduction trop difficile dans le vagin peut produire des ulcères dans et chez l'homme et chez la femme dans laquelle le vagin est quelquefois déchiré dans la membrane hymen et dans la face interne des petites lèvres...

chez les enfans encore jeunes chez lesquels les parties ne sont pas assez développées, il y a des déchirures lors des parties introductives. souvent accidant est suivi d'ulcères faveux profonds qui paroissent donner une matière purulente = il y a gonflement ulcère purulente = l'accusé sera examiné, ne sera pas atteint de la maladie vénérienne... si l'on décide que la femme a la maladie vénérienne l'homme dira que ce ne peut pas être lui qui la violée puis que celui qui la viole lui a donné la maladie. (et cela a été vu au tribunal criminel où il a été appelé dans ces cas difficiles et le témoignage commémoratif qui peut lever tous les doutes a été demandé au fils de la fille si elle a eu l'excorsion de la première nuit quelle preuvoit avoir été violée, il peut à la vente y

avec des excoriations et chancres au même temps, on
s'effraye sur l'homme qui a coïté avec la femme sans point
de fuyez de chah ven. &

quelques fois des malades se donnent des apparences
de chancres par des applications de substances irritantes
comme la cantharide, la sabine & dans les uns d'obtenir
des fonges & souvent il est vray des malades qui pour aller
à l'infirmerie montraient de pareils ulcères, mais
ils n'avaient pas toujours la précaution d'enlever
la pellicule qui avait été le résultat de la
d'application.

on divise les chancres en plusieurs espèces
Les chancres immédiats sont ceux qui viennent
d'ores les lieux où le contagium est appliqué
Les médiate - ceux qui n'ont pas touché les parties
infestées. ceux qui dépendent d'une cause médiate
sont ceux qui se montrent sur des parties éloignées
de l'endroit qui a pris d'infection.

Le chancre se développe du 4^e au 8^e - 12^e - 15^e
jours que la maladie commence à se faire sentir.
il se passe dans la machine une quelque chose qui
rend tantôt insensible les malades, ou les qui leur
fait sentir une espèce de malaise. le jour
même de la maladie des symptomes se font
sentir. si c'est un chancre alors c'est une
espèce de chatouillement dans l'endroit où
le chancre se paraître. il se change ensuite en
d'augmentation - un quart de ligne de
diamètre dans le point pailant. si on se
gratte il survient une petite ulcération
alors survient le chatouillement de douleurs moites plaisir...
mais si la maladie augmente ce sentiment
perd le caractère d'une douleur véritable
qui est plus ou moins considérable suivant
de nature du chancre son étendue &c

17. Si l'ulcère est inflammatoire son accroissement se fait soit au largeur soit au épaisseur... mais s'il est indolent il se borne souvent à 2 ou 3 lignes. le 1^{er} peut naître que cette étendue, mais les parties environnantes sont enflammées s'il est rougeant il s'étend &.

quand l'ulcère est formé ses bords s'élèvent un peu plus que dans les ulcères ordinaires, sa couleur est grisâtre la séparation est tenace & mais ceci n'est qu'une description vague.

quelques jours après l'infestation quand la maladie s'est développée c'est un chancre... leur traitement peut être considéré ou comme attaquant le principe de la maladie vénérienne ou seulement ^{comme} attaquant le développement de l'ulcère de là ~~de là~~ traitement général ou traitement local. Le 1^{er} ne peut agir sur le chancre que par le moyen de la circulation générale tandis que le second est immédiatement appliqué sur la partie affectée.

Les médicaments anti-vénériens peuvent être pris dans les 3 règnes..

Le kalmi rotatif qui a été employé comme guérissant parfaitement la maladie vénérienne a été plusieurs fois employé sans succès.

Le mercure, tel qu'il a été employé au commencement de la maladie c.à.d. en frictions. L'était au commencement du 9^{ème} siècle pour les maladies lutanées. or, la maladie vénérienne se présentait avec des symptômes cutanés on crut devoir la traiter de la même manière et l'effet des octions mercurielles quoiqu'elles n'y parvenaient réussirent. ven à peu ou perfectionna l'onguent et l'on en vint enfin au point de regarder comme inutile tout ce qui n'était pas mercure, pour ainsi dire; c'est qu'on s'y conforma que le mercure avec la graisse. ce qui il y a l'onguent simple = l'onguent double quand on met parties égales de deux ingrédients auquel on joint du cerat blanc dans certaines circonstances. on faisait autrefois des frictions d'abord sur une jambe sur l'autre sur les cuisses puis sur un bras et ensuite

18.

sur le tronc... sçavoir on se reconnoît qu'il suffisoit
 qu'il y eut absorption en quel que lieu que ce fut
 qu'il suffisoit par exemple de frotter les extrémités
 inférieures ainsi une jambe après le bain puis —
 l'autre jambe alternativement... il faut
 commencer le traitement par une purgation...
 autrefois on frictionnait après le bain... aujourd'hui
 on le fait alternativement. Les frictions se —
 donnent depuis 24 grains jusqu'à 50 ou 200 grammes
 suivant le longeur l'ancienneté de la maladie et
 le temperament... pour boisson on donne une
 simple tisane de chicorée de delay aux 3/4
 on proscrie les viands salées... Les ragoûts épicés &
 on a dit mal à propos qu'il ne fallait pas —
 permettre l'usage des chofz crûes... c'est mal à propos
 il n'y a point d'inconvénient dans l'usage de —
 la salade et des fruits pourvu qu'ils soient
 bien murs.

quand les glandes salivaires ne sont pas
 sujettes à l'action du mercure, on continue —
 jusqu'à la fin l'usage des frictions dans le —
 cas contraire on les modifie... Paris ont
 les prescrits il y a de malade... ainsi on
 examine tous les jours les gencives du malade et
 la bouche... si le malade y sent de la chaleur
 s'il est plus altéré; si les gencives sont douloureuses,
 rouges gonflées & il faut alors diminuer la —
 quantité de mercure ou le supprimer totalement
 et quelquefois même il faut combattre les —
 accidens en employant ou les gargarismes
 adoucissans quelquefois les uratiques... quelquefois
 même ~~il faut~~ il faut appliquer les vesicatoires

19. on le cautère pour porter quelque autre part
l'irritation.

quelquefois le mercure donne le développement
de peste de sang pour le sang... on administre alors les
trausses adouçissantes, comme bouillons de veau, dissolut.
de gomme arabique, préparations calmantes (comme
tête de perrot, vin d'opium composé &c) les saignées
émollientes. Des bains donneront un relâchement
général qui contribuera à dissiper l'irritation locale
des intestins.

quelquefois on fait usage d'une autre préparation
mercurielle donnée en friction, c'est le sublimé
avec le cerat. Les différents sels mercuriels conviennent
encore contre la maladie générale.

Celui dont on fait le plus grand usage est
le muriate sur-oxygéné de mercure. La
dissolution s'administre dans une décoction quelconque
quelquefois on se sert du muriate, non dissous qu'on
administre en pillule. Le muriate se donne à
une demi-grain pour les doses quelquefois on n'en
donne qu'un grain de grain ab ce est alors que la
quantité de la dose. on donne le muriate dans une
décoction mucilagineuse ou bien dans du lait
pour éviter qu'il ne porte l'irritation sur la
membrane interne de l'estomac. Tantôt dans une
décoction de grain de lin de quinquaine &c. ordinairement
on le met dans une petite de liquide qu'on ^{avale} prend
en 3 prises à savoir 3 le matin une autre à
midi les dernière le soir... dans d'hospice on donne
la dose en entier dans un verre... d'autres fois on
est obligé de la donner en deux prises une le
matin, l'autre le soir. quelquefois on donne un
mucilage rapproché à cause de l'irritation qu'on
craind, ainsi chez les femmes grasses &c

Le muriate peut aussi être donné en pillules. Longtemps
on a craint qu'il ne cicatrisât les tumeurs. On l'ordonne
on avert cherché à le modifier en le mêlant avec
avec des substances farineuses, ainsi avec le farin
le potasse le sel ammoniacal & mais donné
sans il ne produit plus d'accidens, ainsi
on le donne dans une pâte ou il y a la 8^e ou la
12^e ou la 15^e partie d'un grain de mercure, il faut
après qu'il a pris. La pillule que le malade boive
on doit être la dose dans une pillule, dont on prend
une le matin une autre dans la journée & une
autre le soir ou bien on en prend la moitié
le matin et l'autre moitié le soir. Il y a
on en fait usage dans l'hôpital sans qu'il en
résulte le moindre inconvénient. un malade
sur 50 ~~est~~ ne s'en plaint. quelquefois
des malades font atteints d'irritation gastrique
en le prenant en liquide... il y a des personnes
d'ailleurs à qui le goût de cuivre régné
beaucoup.

Le mercure volant avec les graisses sert
d'ore pour les onctions, et la muriate sur oxyde
de mercure en liques et en pillules est donnée
à l'intérieur... on l'administre dissous dans
de l'alcool ou de l'eau distillée et donné dans
une boisson elle-même... en pillules il
faut que le mercure soit très-divisé et
que chaque pillule contienne un 8^e de grain
de mercure... à savoir 8.

une autre préparation est celle de
mercure doux ou peroxide mercurielle
c'est une préparation mercurielle antiphlogistique
mais qui ne l'est pas aussi bien que
la muriate... aussi ne la donne-t-on
que dans les maladies récentes, ainsi dans
un écoulement récurrent, ou l'emploie
encore chez les malades qui ont des

21. chancres récents des pustules récentes & quand
 l'individu ne peut supporter la suppuration.
 on en donne 3 4 jusqu'à 6 grains quelquefois 8
 mais c'est rare. on la donne en pillule, en
 poudre, ou le mélange avec la gomme arabique,
 en pillule ou l'incorpore avec une pâte
 quelquefois pour la rendre purgative on
 y joint de la rubarbe. quelquefois on la rapproche
 d'Allemagne, qu'il y a des grains de mercure
 d'or. Le ser inconvénient de ce médicament est
 qu'il porte sur les intestins et 4 grains suffisent
 pour produire chez certaines personnes des coliques
 dans le cas il est bon de la mêler avec la
 Rubarbe, & on alors les effets irritants sont
 beaucoup moins considérables malgré que la Rubarbe
 agit également les felles. cette préparation
 mercurielle porte d'ailleurs aux gencives.

une autre préparation est connue sous le
 nom de pillules mercurielles qui ont été employées
 dès le commencement de la maladie, ou les
 appellait pillules de barberousse à cause d'un
 turc dit qu'il en avait fait usage la ser... elle
 était composée de d'ingrédient et de résine de
 jalap avec le mercure... à présent on y met
 de la scammonée ou du jalap & c'est toujours un
 purgatif drastique. Dans la première cas était
 un syrop acide il est encore dans le second &
 c'est un anti-vénérien très-spécifique que employé
 très-fréquemment sans fruit, il excite la salivation
 mais fréquemment on l'administre moins
 comme anti-vénérien que comme fondant
 et comme auxiliaire des anti-vénériens ainsi
 dans le cas d'engorgement prend les pillules
 d'alors ne produisent rien, mais on se les mêle

doivent que quand les traitements a été complés
sans si c'était avant il occasionnerait la plivation.
Dose 48 grains a une gros.

une autre préparation est le précipité
rouge ou blanc. Le plus grand nombre des auteurs
le font elevé, contrain. Il produit des nausées & es-
irritations insupportables, ainsi l'oxide de
Mercuré rouge avec l'acide nitrique ne doit
jamais employé qu'à l'extérieurs, ou met un
12^e de précipité dans l'onguent de la mercuré
de Callicurus qu'on applique sur les ulcères dans
les chancres indolens; ... à plus forte raison sur
les douleurs sur les tumeurs il produit de
grand, inconvénients.

Dans la règne végétal sont les sudorifiques -
exotiques et indigènes
parmi les indigènes sont le bardane la feuille
de persica le bois de guinéa &c. en général,
toutes les substances aromatiques ont la propriété
anti-vénérienne à un faible degré. Il faut les donner
à forte dose et encore mélangés avec de faibles
auxiliaires.

parmi les exotiques. Les squines les sassafras,
La squine peut être plus qu'aucune autre des
indigènes; mais la sassa-parille et le guyac sont
véritablement ^{des} anti-vénériens.

Ces deux substances ont été administrés
15 ou 18 ans après l'apparition de la maladie. Ils
ont perdu la réputation acquise et la sassa-
parille ou le guyac employés ou en tisanes
ou en décoction ou en opiate ou en
villule. La tisane se fait ou avec la
sassa-parille seule ou bien mélangée avec le

23. gayac .. mais on a fait d'abord des Haines si légères
 qu'elles ne produisaient rien ou mes les faisait bouillir
 qu'un quart d'heure ou bien on ne faisait même
 qu'une légère infusion... on employe 2 onces de false-paricelle
 et une de gayac ou une once de l'une et de l'autre.
 il fut un temps où la false-paricelle coûtait 1400 livres
 d'once tandis que le gayac n'en coûtait que 105 = quand
 on fait usage de cette tisane elle produit une
 douce transpiration insensible quand on en prend 4 ou
 5 verres, mais il faut rester dedans ou autrement
 on se donne le seruy la nature en autre maniere
 d'une autre le soir... cette préparation est
 capable de détruire la maladie vénérienne, mais
 mélangée avec aide de la mesure elle convient
 mieux

on fait un prop un rob siccifique dont
 on donne 3-6-7 onces. car donne au grand malade
 et de la propriété anti-vénérienne et c'est ainsi que
 l'administration des vers auteurs, on y joint dans le
 tems d'autres substances siccifiques, astringes, et onورد
 d'autres comme des substances aromatiques - -

autre prop... c'est celui de cuisiner la false-
 paricelle en fait la base. on y aurait ajouté de la
 souvache de roses de provins et... qui représente de l'ain
 ou le rendait purgatif... mais il se décomposait...
 et il perdait la propriété anti-vénérienne.

on se mis de gayac la false paricelle dans
 du vin. nicolas massa dit au avoir obtenu de
 bons effets. il paraît que cette préparation convient soit
 après aux personnes faibles soit pour le fait de la
 maladie soit pour celui des médicaments. dans les
 auteurs anciens on trouve encore la false paricelle
 réduite en poudre et formant une opiate en y
 joignant du genièvre et certainement alors
 est des substances les plus énergiques... on y trouve

24

De même la poudre délayée dans un liquide quelconq.
 il y a eu diverses substances prescrites, comme anti-
 venériennes ainsi la poudre de polignol ou il
 entre de la salpe, pareille masquée par le blanc de suif
 & même trois-voies autrefois en italie et portée en
 france par le fils de polignol sans qu'elle y ait fait
 fortune...

La squine a moins de propriétés que la selte par
 le sulfure est plutôt employé pour donner une faveur
 agréable aux remèdes anti-venériens qu'un remède anti-
 venérien.

Le traitement local qui convient aux chancres
 quelquefois il faut un traitement général contre les
 chancres considérés indépendamment de la maladie
 vénérienne.

pour les ulcères vénériens au gland, au prépuce, et
 autres en irouments; à la fourchette aux fesses, chez
 les femmes, il ne faut pas employer il ne faut pas
 employer un traitement local; le traitement
 interne suffit. ainsi quand le chancre est bien
 sec et le pucier de mercure suffit - autrement -
 Mercuriel.

Chancres bariés. charpie ou linge trempé dans
 une décoction... ou bien on employe à cet effet comme
 moyen diététique... ils guérissent dans 15-20 jours
 autrement il y a complications ou bien on va
 pas éloigné le chancre, d'arriver à un.

Cependant quand ils sont stationnaires, il faut
 combattre cet état d'indolence. quand ils sont
 sans douleur on peut le stimuler d'abord par
 une dissolution de muriate par essence de
 potasse (cr.) ou de vin d'opium composé de
 phosgeneique. Souvent on emploie aussi le
 dans lequel entre de un 10^e ou 12^e d'oxide de
 mercure par l'acide nitrique ou précipité rouge.

25.

quand malgre ^{l'usage} de ces moyens il n'y a pas d'irritation
 aux parties environnantes on se sert du sulfate de cuivre. La
 méthode d'usage fondus est quelquefois nécessaire, et alors
 on amène le chancre à la cicatrice d'une manière
 rapide... cependant il y en a qui résistent encore... il
 se forme à leur surface des pellicules calcaires, et d'autres
 est alors il y a une visc. interne une humeur acrimonieuse
 qui les entretient. alors examinez s'il n'y a point de
 tubercule dans les vés. vois... et même dans les cas
 contraire il est quelquefois utile de donner de prodigue
 une frictions un mouvement général qui charge
 de modes dection et après ~~l'usage~~ celui on
 trouve un nouvel aspect dans le plaie.

Si tous ces moyens sont vains il faut tourmenter le
 plus énergiquement cet ulcère indolent, ainsi ^{la} cicatrice
 d'aut même ou bave d'aut même... des ulcères
 qui av. aient résisté deux mois à tous les moyens ont
 guéri par des applications de cette substance...
 quelquefois il faut désorganiser plus promptement
 alors c'est à ce potentiel qui amène une guérison rapide.

Mais quelquefois ces chancres qui étaient
 indolents stationnaires, deviennent inflammatoires,
 toutes les parties environnantes deviennent rouges... d'infla-
 mation se compare par les moyens stimulans employés
 il faut le combattre.

quelquefois il y a douleur au chancre, sans
 beaucoup d'inflammation aux parties environnantes
 il faut alors le traiter comme chancre malin, douleur
 = ancolleux &c...

il y a des chancres qu'on appelle mobiles
 qui se licat n'est d'un côté tandis qu'ils s'étendent
 de l'autre... un ulcère a fait tout le tour du
 gland, malgré les anti-venereux & il la cicatrifa
 plusieurs fois il l'a même brûlé, et c'est le
 seul moyen qui parait avoir réussi, la malade
 étant partie l'ulcère guéri dans les 3 quarts de son
 étendue.

quand le caractère de ces chanvres est parfaitement
 connu que le traitement local ou général ne
 pouvant réussir, il faut agir non seulement sur
 les chanvres eux-mêmes mais encore sur les parties
 environnantes. de tous les moyens pour arrêter
 les progrès de cet, le plus efficace est la cautérisa-
 tion actuelle. mais il faut toujours commencer
 par les plus doux moyens au cas d'un remède trop
 extrême.

Il y a des chanvres qui voyagent pour
 ainsi-dire, à court qui font de progrès sans qu'on
 les apperçoive, ils ont d'abord le peau
 ou bien s'ouvrent à la réunion des ^{progrès}
 avec la glande couronnée du gland.

un voiturier avait un chanvre
 qui avait percé la partie interne du prépuce et
 s'était fourvoyé dans le tissu cellulaire du corps
 sans en être depuis la base du gland jusqu'à la
 racine de la verge jus que sous les téguments qui
 recouvrent le pénis... il y avait 6 mois que
 le malade était le... le gonflement ne
 pouvait laisser de douter de l'étendue du mal
 coll. porta un fillet ^{et s'efforça de mettre le malade à l'aise} derrière le gland & ^{il découvrit}
 v. après ulcère au ^{et} aspect... la tige se cicatrisa
 la verge s'approcha, et il n'y avait qu'une
 rainure pour indiquer le passage du bistouri...
 Les parties furent enflammées et la verge ^{après}
 s'approcha la maladie a été parfaitement
 guérie

Il y a des chanvres qui voyagent
 du côté du canal de l'urètre qui obstruent
 les vaisseaux qui se trouvent entre cette partie et
 le canal de l'urètre. Ils ont bien ordinairement
 percé le fillet. Les malades ne sentent
 pas. il y en a eu qui sont allés jusqu'au
 canal de l'urètre de manière que les

27. urines en sortaient... dans ce cas il faudrait circoncire sans
 temps.

Mais si aucun de ces chancres n'est pas d'origine parce qu'une urétrite
 peut le arrêter il n'en est pas de même de chancres inflam-
 matoires et de chancres douloureux très-différents des précéd.

Il peut y avoir des chancres douloureux sans inflammation
 presque ou des chancres douloureux qui ne sont pas inflam- & est
 matoires jusqu'à un certain point; car, malgré qu'il n'y ait point
 d'inflammation sans douleur et de douleur sans inflammation,
 quelquefois on peut regarder dans tout le sens car et à douleur et dans les deux l'inflammation
 comme accessoire.

il y a des chancres inflammatoires. L'inflammation
 est locale autour de l'ulcère, quand les parties sont sèches
 à découvert quand il n'y a point de fermeté par les art-
 lures le gland par le prépuce et alors la maladie n'est
 ne prend pas d'accroissement.

L'inflammation générale a lieu quand le prépuce
 prend forme phymosis ou paraphymosis.

Le traitement dans les cas est facile... d'abord
 quand les parties environnantes sont seulement enflammées
 on prend des bains généraux des préparations adoucissantes
 d'ayants relâchantes les bains locaux de la verge au bain
 de la verge de l'eau tiède qui est essentielle. quand
 on baigne quand elle est malade avec les substances

emollientes... il est rare que par l'inflammation ne
 s'ade pas à ces moyens et alors on peut employer
 les anti-vénéreux au commencement vers le quart
 de la dose, et au vers doucement ^{vers la dernière} dose est tiré que
 quand l'inflammation est dissipée. on applique aussi
 dans le sens cas les charpies ou de l'eau phagédénique
 et les préparations avec l'opium.

quand l'inflammation s'est emparée de tout
 le membre on ne peut faire l'application que sur
 toutes les parties et comme il y a resserrement, la
 circulation ne peut se faire et souvent la gangrène
 s'en empare... alors il faut employer les moyens
 indiqués dans l'inflammation e. a. d. tirer

28. Des foyes dans mes parties éloignées comme au bras & aux jambes ont été employées pour dégorgers les parties si y a inflammation sans constriction sans resserrement sans douleurs sur le gland les saignées peuvent être utiles dans le cas contraire les douleurs produites pendant la maladie plus graves en y appellent la gangrène.

quand dans l'inflammation générée le prépuce recouvre le gland et qu'il y a phlyctènes entre les deux, dans ce cas il faut de demi en demi heures faire des injections qui sont dans ce cas un des moyens les plus efficaces.

quand elle est la suite d'un resserrement du prépuce derrière le gland alors que les topiques qu'on emploie le resserrement le traquentement du prépuce empêchent la circulation, il faut débrider toutes les parties qui sont resserées, et pourvu que le principe n'ait point été étouffé dans la partie le débridement rétablit la circulation l'engorgement disparaît avec l'inflammation.

Dans certains cas l'inflammation marche très rapidement et la partie est frappée de gangrène, mais les dets enfin se fait avec promptitude il en résulte une ulcère bien destruction de prépuce en suite d'une partie de gland surtout quand l'inflammation a été portée très loin dans cet organe.

On a vu le quart le moitié le 2/3 quart la totalité même de la verge frappée de mort. Pour un malade avait un ulcère à la verge qui la lui avait toute mangée, il venait du moins quinze jours quand il entra dans l'hôpital ce qui ne peut empêcher aucune de communiquer avec une femme il est vrai que la peau dépassait les débris de la verge.

29.

un autre n'en avait que la moitié la peau lui couvrait de gland et de prépuce.

quoiqu'il y eût que l'inflammation se terminoit par suppuration ou par gangrène il n'en résulte qu'un ulcère bœuf.

chancres douloureux rouges malins

ils se présentent accompagnés d'une vive douleur qui est lancinante. Leurs ^{prophères} surfaces est mégala et leur surface est couverte d'une suppuration tantôt tendue tirant sur le gris tantôt tirant sur la couleur d'urine. Le porteur est enflammé mais seulement dans quelques lignes et le reste du membre est souvent très sain.

quand une maladie de ce genre se présente, si on la traite par les anti-vénériens ou laigériens il faut donc employer contre elle, tout ce qui est adouçifiant, les bains locaux et généraux & ucris comme il y a beaucoup d'irritation d'ascension nerveuse il faut recourir aux narcotiques. on donne à l'intérieur dans une boisson adouçifiante quelques grains d'extraits gommeux d'opium ou 10 à 15 gouttes de vin d'opium composé d'eau de morelles la direction de tête de pavots mêlés avec de l'eau de racine de graine de guimauve & peu aussi étendu quand la chancere n'est pas arrivée en très-intensité cela suffit. dans le cas contraire, il faut recourir à de l'extrait gommeux d'opium en grande quantité et de même pour les toxiques souvent ces moyens sont insuffisants. il ne faut pas en discontinuer pour ces usages, afin que la maladie n'augmente pas.

cependant si la maladie ne diminue pas ou qu'elle augmente il faut examiner les 1^{ers} voyes & si mais les chancres par un traitement irritant soit général soit local détruisent les parties ou les font dégénérer en cancer

un malade avait sur le prépuce un ulcère bœuf pour l'étendre mais postérieurement

30

de douleurs et sans discontinuation... on le traite avec
 des frictions mercurielles, on cicatrifa la chancres... cependant
 il faut des progrès: on porte les frictions à 40 gros de mercure
 et déjà le chancres qui n'avait de bord que 3 lignes de diamètre
 est comme une pièce de 24 S. un autre médicament y
 fut appliqué longuement puis et administré un
 nouveau traitement, nouveaux progrès... sur autre médicament
 fait cicatrifer avec ^{par} laide et nitrique; il était alors
 comme un œuf de 3 livres.. le malade vint à
 l'hôpital de bord de son ulcère étaient renversés, la
 surface jaune, douloureuse; il y avait un engorgement
 très considérable aux bourses, une tumeur aux aines, qu'on
 avait regardée comme adhérente et sur laquelle
 on avait fait des frictions. il mourut au bout
 d'un mois.

Dans d'autres circonstances l'amputation de
 la verge est la seule ressource et si on temporise
 le corps de la verge s'engorge et le mal gagne la
 racine de la verge et alors l'opération est très
 difficile. cependant il la faite avec succès... mais
 après l'opération guérison tardive d'un cancer il en
 reparait un autre ^{ordinairement} quand le
 présèque cancéreux a été extrêmement développé.
 cependant il faut recourir à l'opération
 par suite toujours le principe cancéreux ne
 guérit pas. 10 à 12 fois il a fait l'opération
 quand la maladie n'était pas encore trop développée
 sur 4 malades, la maladie se repaît. il en est
 guéri par des excès nouveaux ne font la cause
 parce que quelque fois la cicatrice se déchire.
 un homme de lettres pour avoir fréquenté
 de mauvais lieux eut un petit chancre sur
 le prépuce il s'adressa à la messe abbaye qui
 lui procura un chirurgien. et l'homme lui

31. appliqué sur l'ulcère de longueur bien qui ne siffle
 toujours quand le chancre est cancéreux mais jamais
 quand il est enflammé. comme il n'y a point de
 point d'amélioration de la maladie passé deux médi-
 caments à un autre. le chancre se jeta vers la
 Couronne du gland, dans le tissu cellulaire du
 Corps caverneux. quand M^r Cull. fut appelé
 les bords de l'ulcère étaient renversés la surface était
 douloureuse & il a employé les calmans, le vanillier
 mais déjà l'irritation était dans tout l'organe.
 La maladie a fait des progrès. le prépuce a été
 tellement déformé que le sang a passé par
 le trou de la peau. il croit qu'il succombera à
 la maladie dans quelques mois. le cancer s'est
 porté sur les bourses dans le tissu cellulaire du Scrotum.

Le danger de l'irritation est encore plus grand
 chez les personnes d'un certain âge, sur ceux
 qui sont fortement constitués, sur ceux qui sont
 d'un tempérament nerveux & sur ceux qui ont
 déjà eu des maladies d'un même genre de bubone
 & on doit donc ménager ces chancres comme
 comme la maladie la plus dangereuse. car
 la pratique que l'on veut de combattre est
 ordinairement mortelle dans tous ces cas.

il y a des chancres inflammatoires chez
 les femmes. ils sont accompagnés d'un grand
 développement de glands ou petits levres.
 quelquefois l'inflammation est si rapide que
 le gangrène (comme cela arrive sur le prépuce)
 peut s'en suivre. l'inflammation demande
 le même traitement que chez l'homme. si
 la femme est plethorique ou laignée &c.

il y a de même pour elles des chancres
 malins rouges, et un autre même accident.
 il en est de malades qui ont des ulcères qui détruisent
 les parties intérieures jusques à ce qu'on soit

32. fait par suite de la négligence ^{de méd.} fait par celui de ces
grandes irritations.

une Comédienne avait eu quelques chausses froids
sans grande inflammation aux lèvres. son mari les
cautérisa avec le murice Santonin et lui
administra en même temps un traitement interne.
Les petites lèvres furent gangrénées il y eut perte de
substance... Il crut que c'était une nouvelle éruption
de la maladie en sorte que lorsque l'ulcère fut sur le
point de se cicatriser il le cautérisa encore au point que
la douleur se développait à un degré tel que le
malade ne pouvait plus supporter le traitement.
à cette époque Cullerier appela la surface de l'ulcère
présentait deux pouces de diamètre quand on ouvrit
les lèvres, il avait dégénéré en ulcère cancéreux. et dans
de tous les moyens adouçifs possibles, bains de siége &
dans quelques circonstances, il faut se contenter d'un
bain local ainsi quand le sujet est affaibli = il donna
des boissons adouçifantes, ~~mais~~ des decoctions de
grains de lin de tête de pavot et de meurelle sur
la partie. 3 grains 3 grains d'opium par jour
avec l'extractif de ciguë. Dans huit jours de temps
il y eut une légère amélioration et dans un
mois l'ulcère eut un aspect recouvert. il fut guéri
dans l'espace de 3 mois... il n'y avait pas de disposition
cancéreuse chez le sujet puis que quand les moyens
irritants ont été discontinués la partie affectée
a été guérie... très-probablement le principe
recréé n'existait plus. puis qu'il n'y a pas
donné à cette femme de remède interne... ~~pas~~
précaution un traitement de précaution avec
le vin cependant quand le malade fut
trouvé en bon état.

Il y a des chancres qui font de la douleur
malin font rougeur. ils voyagent dans
la tige cellulente du pénis jus qu'à l'entrée
de l'urètre. quelquefois ils peuvent pénétrer
dans le rectum, puisent ils de l'urètre la paroi-

33. antérieure de rectans en suite que les veuaires, feals, un
portent devant que par le vagin que par le rectans.
Et les ulcères rouges du rectans dans le vagin sont
encore assez communs.

D'autres chancres sont stationnaires dans le vagin
quelque traitement qu'on administre. cet état est
surtout très difficile à changer parce que les femmes
font de peine passées dans l'hôpital qu'elles vont courir
chez les parfums, frottent les uns, l'autre sont abouées
de la matière abouée qui vient de la matrice...
L'ulcère prend de l'accroissement sans être douloureux
et quand il est organisé ulcère il est difficile qu'il
guérisse. cependant il avient guéri, au commencement, quel
qu'assez assez de fait état.

Chez d'autres femmes une irritation locale
y contribue parce que leur imagination effrénée
y appelle les vers mercuriels... et les fistules les
masturbations répétées, auxquelles elles se livrent
font que ces ulcères résistent non seulement au
traitement général mais encore au traitement local.
ou en soit les masturbations et c'est de chancres qui se
trouvent près le clitoris... dans l'irritation opérée
par la surface par l'ulcère et ensuite irritation par
la main et puis l'existence de la maladie vénérielle
sont les causes de cet état stationnaire
quelquefois aussi le défaut de traitement en est la
cause - chez quelques unes de ces femmes les parties
sont indolentes d'autres fois elles sont engorgées

Les chancres ont bien aussi au porteur de l'anus
ils se rencontrent spécialement dans les filles résultant de
du frottement de la peau de l'anus qui étant abouée
souvent cette forme aux ulcères, ils sont quelquefois en un
petit nombre, quelquefois ils sont en un grand
autant que d'acrostrophes autour de l'anus.
Dans d'autres cas ils occupent encore la partie
résultant du frottement, c. à d., occupent toute la
partie ou bien ils sont gagnés localement comme
chez ceux qui jouent le rôle de Janinède

34.

mais souvent ils ont l'air d'être gagnés localement, quoiqu'ils le soient par les voies génitales. Sans doute comme cette surface présente une peau tendre qui est humectée par les mucosités par la matière des glandes sébacées elle peut être facilement infectée & quand la maladie est gagnée par les bords elle se porte ordinairement à l'anus = ainsi enfans qui tétent

Les chancres s'ils sont bannis indolents ne demandent que des soins de propreté. cependant s'ils restent indolents, il faudrait les stimuler quand ils sont inflammatoires, ils présentent des accidens tels que quelquefois, il se développe un engorgement dans le canal de l'anus, qu'il est difficile d'aller à la selle... 4 à 5 fois il ce voit la gongreine se manifester, on utilise moyens curatifs que l'on indique utérins devenus cancéreux id =

Les chancres ont quelquefois lieu jusqu'à l'entrée de l'anus. alors ils ont été plus particulièrement le canal de l'anus se prête difficilement à l'introduction dans ce canal... quelquefois, il est vrai les hémorrhoides, sortent presque aussi grosses que le membre viril mais la dilatation se fait peu à peu des parties se prêtent à cette dilatation par leur mode d'organisation, et elle se fait de dedans en dehors... au contraire, il y a stimulation sur la surface de l'anus sous la copulation. Contre nature et le sphincter se resserre bien loin de se dilater. aussi souvent y a-t-il des déchirures à cette partie surtout quand l'introduction a été brusque et elle se trouve dans ce cas surtout que se trouvent des ulcères vénériens intérieurs. ils sont plus dangereux que les extérieurs parce qu'on ne fait point jusqu'à quel point

35.

L'ulcération se porte parce que le muco de rectum laboué
 ainsi que les matières fécales, quand de ind vidus sont
 rasés, ... alors il y a excoriation irritative sur les mêmes
 surfaces, ensuite une grande difficulté de appliquer des
 médicaments de la esp... à chaque instant il faut y pousser
 des injections. il faut y appliquer de la charpie (quand il
 est possible) imprégnée d'un médicament adoucissant.
 car on expose l'irritation par des excitateurs et même
 on risque de déchirer la partie... mais quand de
 traitement est administré d'une manière convenable
 souvent des injections réussissent... si c'est pas rationnel
 le chancre peut devenir cancéreux & est tuberculeux
 peuvent se développer et alors la maladie est très
 difficile à guérir si elle n'est pas incurable. quelquefois
 la paroi antérieure du rectum et le tissu cellulaire qui
 se trouve entre cet intestin et la vessie se trouvent
 percés dans l'homme. chez les femmes la communication
 se fait du rectum dans le vagin... les matières
 fécales y passent et c'est une maladie d'autant
 plus dangereuse qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas
 moyen de la guérir...

plusieurs femmes en meurent à cause
 du desordement Calligatif qui ont l'habitude
 de terminer les infirmités, et par les chairs qu'elles
 conçoivent en voyant ~~qu'elles conçoivent~~ de trinités de
 fond en comble, Le d'office de leurs réponses et l'organe
 de leur ind ustrie. Les tourment dans le desespoir.

Les moyens qu'on peut leur proposer sont en
 des injections de lotions avec les préparations adouçissantes
 calmantes quelquefois les mèches mercurielles qui
 ont l'avantage de porter le médicament sur la
 Maladie mais c'est quand elle n'est pas ancienne
 et qu'elle n'est pas encore bien étendue et alors
 on propose par ce moyen

si on a affaire a une Malade raisonable il est bien plus facile de le guerir que celles qui entrent dans des hospices = aussi une Malade qui avait un longuier dans le rectum en est il guerri au bout de 4 mois... très saucant les Malades gueriraient si les fims chirurgicaux étaient soigneusement appliquees. Et q. quand les ulcères sont rebelles, c'est au quib ont été mis traités par un mal ou bien que le malade nés pas été aperçue de cile.

Les communications établies entre le rectum et le vagin sont beaucoup plus rares que celles qui ont lieu entre l'intestin et le vagin. Il en a eu quelques exemples. on manque de moyens pour le y remédier. cependant il faut combattre les Malades y remédier. mais il faut des moyens nécessaires on en a proposés plusieurs. le seul convenable serait des pessaires au passage des matières fécales, et si on y parvenait la guerison serait certaine. ... on a proposé l'introduction de mèches vertes très-haut. quand elles restent en place les parties tendent à se rapprocher... mais il faut aller à la selle... on peut bien sans doute donner l'ouverture (Vo y. ceuvres chirurg. de Desf... la Malade dont il parle vint à l'hospice de St. Germain avec un ulcère de la viciété étendue qu'on parvenant, et y mourut avec cette communication du rectum avec le vagin.

on a proposé l'introduction de caennules de gomme élastique, mais on a vu ces caennules se rompre en forme d'entonnoir (et ce sera la manière la plus avantageuse, mais comment faire l'introduction l'un ne pourra admettre un corps que d'un pouce

37 et demi de Diamètre et quand bien même il
 permettrait l'entrée d'un plus volumineux il ne pourrait
 remplir tout à fait la cavité de l'intestin rectum
 s'il est cylindrique on pourra le introduire avec
 facilité mais il y aura plus d'inconveniens encore
 quand des matières fécales commencent à
 passer par le vagin il n'y a que les obstructions de propreté
 qui puissent empêcher le progrès de l'ulcère et peu
 d'inflammation par le passage de matières fécales. Il est
 bon de prendre une position horizontale quand on va
 à la garde robe.

Les chancres attaquent quelquefois l'ombilic
 il y a des individus sur lesquels il fait faille. chez
 ceux là il n'est pas encore d'un de chancres, mais il
 en est qui y ont été enfoncés. chez le premier
 y est plus mince et il y a pointement d'une
 matière blanche dans la surface de cette cavité
 une petite vénerie qui y sera introduit
 localement au qui se développera de l'ulcère
 à l'est ainsi pourra y produire des ulcères...

Les chancres vénériels peuvent avoir lieu
 si par exemple un homme généralement affecté
 de virus vénériel a communiqué avec une femme
 et qu'il aille se frotter contre l'ombilic de cette
 femme. Il y a eu des exemples il y en a encore
 un dans une femme à l'hôpital Malade. il en a
 eu qui paraissent rongeans tant ils avoient
 fait de progrès, ils avoient une pouce de profondeur
 de plus ordinairement ils sont superficiels.

Les moyens de propreté suffisent quand ils
 sont superficiels le chancre est benign si y a inflammation
 d'autant adanciff. calmans. il faut entretenir au
 dehors la suppuration parce que la maladie est entretenue

par la matrice qui y séjourne. car ^{laquelle} les ulcères peuvent devenir foulouys rouges.

toutes les parties de l'oreille peuvent en être le siège. il peut y en avoir de primitifs. ainsi soûche portée sur les oreilles. mais de plus d'apparence que les autres et aux parties génitales. ainsi on a lieu de croire que la maladie est presque toujours contagieuse.

quand les chancres sont peu étendus peu profonds & récents. quelque application locale avec le traitement général suffit. mais ces chancres étant contagieux sont quelquefois compliqués d'une affection toutte d'artre (toute carieuse) alors quelquefois on ne peut pas administrer un traitement général quand la maladie est très-

développée que toute l'oreille est atteinte. les cartilages peuvent en être le siège. les chancres y font des progrès terribles. quand la maladie fait des progrès. et quelquefois ils se font des deux côtés en même temps

ou voit de videres atteints de l'oreille le tissu cellulaire et la membrane conduit aux interne offese les canaux & passent la maladie continue et se porte jusques la cavité qui contient les organes de l'ouïe de fruit la membrane du tympan et souvent ils sont

rendus comme le font des portions d'os durci quand la maladie est baroque si elle résiste jusques longtemps on donne la liqneur de Hanriot ou autres préparations mercurielles mais quelquefois les sudorifiques doivent être administrés.

Ulcers ne font pas rouges. -- extrême propriété quand les cartilages sont déjà atteints. quand la maladie est plus difficile il y a exfoliation. Le paratou de la partie morte d'avec lue

parties vives. ordinairement cela s'achève avec
la terminaison du traitement de la maladie.

quelques fois pour faciliter la destruction des parties
attaquées et qui seroient nécessairement détruites
à la longue pour la suite de la maladie il est utile de
les enlever. quand les ulcères ont pénétré dans le
conduit auditif interne pour attaquer les os, les moyens
de propreté des injections avec le traitement général
peuvent guérir. dans le cas contraire quelques fois
la corde peut faire des progrès et pour que les
parties nerveuses s'isolent il faut du temps. il faut
empêcher que la matière qui est fort négligée par
injections de toute espèce pénétre les os.

il a vu toutes les parties du Conduit externe
attaqué et une exfoliation générale avoit lieu
sur un malade il a fallu un an avant que
l'exfoliation ait été complète malgré que
le traitement eut été fait convenablement
quelques fois les os sortent des chairs comme il
est à élé sans us.

Il y a des fois de pareils ulcères ou
d'écrouilles de bruits incommodes qui existent
encore après la guérison de la maladie parce que l'air
est plus modifié. ainsi on s'en souvient le plus
dans les symptômes. on plutôt c'est l'effet de la
maladie et non son symptôme. dans les cas
de destruction on a appliqué des Corps étrangers
qui avoient la forme et la couleur de
La velle.

Il faut aussi ce sont les paupières, surtout les ailes
portées de haut qui sont affectées de lécères, qui
y sont presque toujours consécutifs. quand ils
sont bornés le traitement général suffit
on peut cependant employer les collyres adoucissants
qui ont le plus d'adoucissant sur les parties les touchées.

40.

quand les paupières en sont attaquées l'ignon de ces lésions
aussi et il tombe; quelquefois ils attaquent même le cartilage
tarpe qui se carie... et ces ulcères guérissent avec beaucoup
de lenteur (il y a inflammation & les font rouges, ces
ulcères & même traitement que ci-dessus)

Ces qui sur la cornée transparente se trouvent à la
circonférence s'ils se trouvent au passage de rayons lumineux
sont bien plus dangereux. Ils sont plus profondément
il y a plus de peine, ordinairement, les ulcères guérissent bien
guérir mais il reste de la cicatrice par leur cicatrice.

quelquefois quand le point d'irritation porté sur le
canal de l'orbite abandonné il en résulte une ophtalmie
mais le phlogose de l'œil ne se borne pas là il se forme
de petits points d'ulcération sur la cornée

un étendement en médecine est une ophtalmie suite
d'une ancienne gonorrhée. il y a de la terminaison par
résolution; mais la cornée transparente ulcérée, plusieurs
cicatrices y croissent bien. par l'autre œil il n'y a eu que
deux cicatrices, mais pour voir il est obligé de
regarder de côté et il n'y voit presque pas sans œil,
la cicatrice empêche en effet le passage des rayons
lumineux.

Quand ces ulcères ont été négligés, ont percé,
pour ainsi dire, la coque de l'œil il se forme de ulcères
profonds & les malades ont par là perdu promptement
la vue. L'œil se voit vuide & par la négligence
mais encore plus par les moyens irritans employés
par les charlatans. que le surface de la cornée
transparente seulement s'est attaquée et que la
maladie fasse de progrès l'œil est perdu pour que
le malade perde la vie.

Chancres du nez

ils peuvent bloquer les ailes du nez ou le bord
intérieur de la cloison. ils attaquent aussi

41

L'intérieur des fosses nasales, les parties dures
 des cornets & comme les parties molles.
 Les extérieurs que surtout bien dans les enfances/ités de
 L'air du nez, ils sont presque toujours couverts et cependant
 ils guérissent facilement, si on se prend de bonne heure
 pour les traiter. mais il se forme souvent des ulcères, et
 ces parties pour qu'ils soient vénériens, il n'y a que le
 traitement qui puisse lever les doutes à cet égard, ainsi
 quand par des adoucissemens des delays on y procure de
 L'accroissement c'est une preuve qu'ils sont vénériens.

Quand ils sont sur le doigt il y a de grandes diffi-
 cultés à surmonter pour le guérir d'infection de la maladie
 parce que plusieurs personnes qui lui ont présentée ces ulcères, se
 croyaient dans un état de maladie vénérienne affrayés de
 ce que leur avaient dit des charlatans et même des gens
 de bien très-instruits. de membrane mucqueuse qui
 recouvre les doigts en ~~est~~ plus exposés à l'air et au chaud
 continuel de doigts parce que l'air ne peut y passer,
 et de la exsiccation et puis ulcère de dernière que
 la maladie fait de progrès... de la une maladie sans
 avoir eu de maladie vénérienne à passer & a été guéri
 par le traitement vénérien.

un homme avait une semblable ulcération
 jusqu'il eut été guéri d'une maladie vénérienne
 on lui fit poser un charbon vénérien on lui fit
 subir un second traitement long temps prolongé, et
 rien ne guérit pas; il vint à Paris où le tourment
 encore par un nouveau traitement... le pauvre
 homme ne content de toutes les semaines qu'on
 lui avait fait avaler fut les munis d'une
 15^e de bouteilles de l'apothicaire dont il fabriqua...
 enfin lorsqu'il les eut achevés il vint trouver
 Cullerier, les doigts était tellement
 desiccés qu'un petit file ne pouvait être
 introduit d'un côté, tandis que de l'autre

42

La cavité était très considérable. cet homme fut bien traité
à un pely porter le doigt dans le nez. Il lui vint une excroissance
sur le bras, remplacée ensuite par une entorse et dans
quelques jours l'ulcère fut guéri. Il y avait une tumeur
dans l'ulcère en gros qui ressemblait à un élargissement
d'irray. Tantôt fois il y a des vices de conformation d'os
Lactation et il faut bien se garder de les prendre
pour un effet des vices vénériens comme cela arrive
que trop souvent.

Sur des Membranes ulcérées on fait des ulcères, une fois
développés font des progrès très-rapides, à cause que
la membrane présente un tissu lâche. parceque quand
on reconnoît la maladie elle est avancée, parcequ'on
ne peut y appliquer des topiques, il se forme
Carie nécrose sur os fongueux et surtout à ceux
qui sont fongueux à leurs surfaces, peu épais. ainsi
tous les os du nez, les moyens et les inférieurs surtout
quand on a reconnu des maladies affectées par quelle
Maladie on envoie que les membranes de traitement vénérien
la guérison affectée facilement. seulement il ne faut pas
arracher les pustules qui se forment; il faut
toujours tenir délayés en quelque sorte le mucus de
la suppuration, et pour cela, malgré qu'on ne
puisse pas appliquer des topiques sur la partie, on
peut injecter dans le nez des cataplasmes emollients
et la pousse sans tendre au soulagement, et les
croûtes endurcies font reconnoître la cause de la
Maladie. on peut encore y faire parvenir des
vapeurs deau chaude qui se détacheront des
croûtes endurcies, et attendront de feront tomber
au contraire quand on arrache les croûtes
avec violence l'ulcère s'exaspère fait des progrès
des ulcères, des fosses nasales se guérissent de-

43

La même manière que ceux des autres parties, ^{mais} quoique avec plus de lenteur par conséquent ne peut y appliquer des topiques, de médicaments de sang

Il faut si les sinus frontaux est vu id est ^{approuvé} et en laub affectés des injections ne peuvent y parvenir et les vapeurs même ne s'y introduisent qu'en petite quantité parce qu'il n'y a que de l'air qui des y porte, et le tempore des sinus des conduits carient des os s'y dans en car

ta il faut d'autant plus de tems qu'on ne peut jamais savoir si la maladie avance ou non si la membrane se détache &c. cependant si la corne est au os des larmes par son odeur extrêmement désagréable presque insupportable, naurabonde & quand la membrane seule est altérée la guérison ne se peut donner par une si mauvaise... on fait que la corne a bien quand on a vu corne que la maladie soit attachée et alors on portent dans ce cas le traitement doit être longtem continué: c'est la conséquence d'une maladie qui a longtem duré dans les os, pour quelle fut l'obscure et se reconnaît par des symptômes.

quand la réparation des parties mortes de l'os d'une partie est faite et la partie complotte, la maladie qui n'est qu'un osseux se répare et même avec les apparences de la maladie existante. on voit des malades, qui ont eu des Recidives, et qui sont traités jusqu'à 3 fois & très souvent après de très sagement & bien méthodiques. très souvent il se répare la maladie et avec de accidens plus qu'au paravant. on voit donc que c'est la maladie la plus difficile à guérir que celle au des symptomes, de la guérison ne peuvent s'appuyer sur eux seuls. ainsi il est bon de continuer le traitement au delà des doses ordinaires, avec et de le porter quelquefois jus qu'à 500 doses de sucrat, et même il est bon de combiner

44

Les fongues avec le mercure

quand les os attaqués font à la partie des os ou du
toucher alors pour en préserver plus promptement la guérison
ou chercher à transporter les parties qui vaillent ou en faire
l'extraction. ainsi quand les os sont attaqués, on qu'ils se
présentent à l'ouverture &c.

quand la carie attaque les os propres comme la
voûte du nez il faut examiner si ya separation des os
d'avec le vif et enlever le sur et préserver par la me-
me ouverture qui deviendrait nécessaire si la partie morte
se cicatrisoit.

après qu'un os a été enlevé la cicatrice naturelle
cicatrise autant qu'il est possible mais communément
frappe continuellement ces parties alors il ya fistule aérienne
en quelque sorte. c'est dans ces sortes de cas qu'on cherche à
boucler les ouvertures... quoiqu'ordinairement la fistule
soit inévitable après de semblable caries, un malade a eu
un ulcère aux fosses nasales, les caries étoient en partie du bord
inférieur des os. L'ulcère se nettoya, l'os y avait mis une
manche de taffetas gommé et gommé. Comme les bords
de la plaie se touchent presque et que le passage de
l'air étoit intercepté la cicatrice se fit tout à fait opérée
mais quand l'ouverture a une certaine étendue il faut
renouveler à la cicatrisation.

quelque fois après la destruction des parties fistuleuses
les parties mortes se cicatrisent, mais il en résulte une
déformation très désagréable... on applique dans ces cas
des nez artificiels qu'on recouvre au plaie au
moyen d'une tige qui va s'attacher dans le nez et se perd re-
dans les narres.

ulcères de la bouche

Les débris au fond de la plaie bruyent. peuvent. Courent
peuvent primitifs. ainsi chez les circons qui touchent au-

45

qui entraient. Des personnes atteintes d'infection vénérienne.
 chez les personnes qui donnent de baisers lascifs à des
 personnes gâtés; chez ceux qui portent le penis sur la bouche
 il est bien des circonstances où les lèvres peuvent être affectées
 sans qu'il y ait au reste... il y a bien quelques probabilités propres
 à éclairer sur la nature de la maladie, mais il n'y a point
 de certitudes bien positives... si l'ulcération dépend du virus
 d'une humeur acrimoineuse &... on en sera assuré
 dans la 1^{re} cas par le fait que produiraient des tumeurs
 adouciissantes dans le lèvre si elle est acrimoineuse
 id. dans la 2^e cas on combattra la maladie par
 des delayeurs, des purgatifs et on obtiendra la cicat-
 risation; et si le sujet a été d'autre & l'ulcère perdus
 de même son mauvais aspect.

un jeune homme avait une ulcère sur la lèvre
 supérieure crue développement de tissu cellulaire dans
 l'étendue de 6 à 7 lignes... Cull. lui conseilla l'usage de
 soit un adouciissant delayants... la soignée que
 présentait l'ulcère, la ressemblance qu'il avoit avec une
 ulcération cancéreuse lui avoit fait donner ce conseil.
 il lui prescrivit la moelle et l'aspersion à l'intérieur &
 le jeune homme fut adressé à une autre personne
 et lui fit prendre la liqueur de vanisier qui
 le guérit très-bien. il a avoué depuis qu'il avoit
 embrassé une femme publique très-jolie qui passoit
 dans les rues de paris mais qu'il en étoit resté la.

une provinciale vint à paris pour consulter
 les gens de l'art sur un bouton ulcère. la lèvre
 inférieure étoit très-développée. Cull. la regarda
 cela comme une maladie cancéreuse. les médecins
 qui la regardent l'extraction du bouton prétend
 cancéreux qu'il regarda comme tel lui-même...
 cependant avant il lui fit quelques questions auxquelles
 auxquelles cette dame fit toujours
 par la négative. elle n'avoit pas vu...

d'homme, on n'avait même pas fait de tentat^{ions} sur les
 virginités & cependant la question qu'on lui avait été
 faite, les trois allant dans la nuit elle se trouvait qu'un officier
 qui avait été logé dans le même lieu lui avait donné en fait
 de partant un baiser à la dérobée et qui cependant avait
 été si bas que la langue l'écève de cet homme lui
 était entrée dans la bouche... elle fit donc le lendemain un
 cat avec qui servit de prétexte pour lui lui demander
 de permettre qu'on fit sur elle quelques investigations uté-
 rines... il trouva des pustules dans le vagin assez
 étroit pour ne pas permettre l'introduction de petit
 doigt, la membrane hymen existait. La liqueur de
 sang vietien lui fut administrée avec les purgatives
 dans 15 jours le bouton diminua de moitié; l'ulcère étant
 renouvelé, il fut guéri dans un mois. Depuis étant marié
 et ayant perdu ses enfans, on a eu quelle n'avait pas
 été guérie... elle est revenue à Paris inquiète de ce que
 les médecins de son pays lui disaient quelle avait l'ulcère
 la verole... mais les lèvres et la partie de la génération
 sont dans le meilleur état et cependant on lui a
 fait subir un traitement et on se proposait encore de
 lui en administrer un autre lors quelle est venue
 à Paris, quoique depuis 8 ans elle n'ait eu aucune
 apparence de maladie vénérienne.

Un Cordonnier avait à la lèvre supérieure
 un ulcère qui ressemblait assez à un ulcère Cancéreux
 il n'avait eu, disait il aucune maladie vénérienne, sa
 femme se portait bien ainsi que ses enfans et il en
 avait eu depuis l'ulcération de sa lèvre...
 cependant l'ulcère fit des progrès. Les deux tombèrent
 avec une partie de la mâchoire. cet homme
 s'adressa à un autre qui le guérit par un
 traitement anti-vénérien. quel avait refusé des
 mains de M^r. Cullerier. L'enfant qu'il avait eu depuis

47 L'ruption ulcéreuse était parvenue à 18 mois dans un très-bon état. Le co. Dornier a avoué depuis qu'il avait eu une gonorrhée avant son mariage qui dattait de 8 ans.

Les ulcères de l'intérieur de la bouche peuvent se montrer sur l'intérieur des joues soit par suite d'un usage de aliments infectés soit par d'autres causes.

Mais des ulcérations peuvent avoir lieu par une cause mécanique. ainsi par des dents caries saillantes et peuvent les produire sans douleur de fois il en a vu des exemples... on les avait pris pour tant pour des ulcères vénériens

il y a de plus des ulcérations dépendans de l'administration de mercure et qui ont l'apparence vénérienne. comme l'irritation qu'il produit ne peut avoir sans exciter une plus grande sécrétion de salive, il en résulte un développement des gencives et de même de tumeurs acroméieuses d'artères peuvent produire une ulcération avec une exudation grasse tenace et il y a alors que les signes commémoratifs et concomitans qui peuvent pointer des signes de la maladie, ou les distinguent

de même après des maladies vénériennes il y a quelquefois des ulcérations à la bouche qui ne sont pas vénériennes, et réciproquement un jeune homme a eu des éruptions dans la bouche qui reparurent 5 fois après avoir disparu dans des circonstances particulières il fait temporairement donner des délayans de relâchans soit intérieurement soit en gargarisme. si les ulcères ne font pas de progrès c'est une promesse qu'ils ne sont pas vénériens cependant certains peuvent être stationnaires comme par exemple l'ulcération d'artères

quand la membrane muqueuse est perdue quand le tissu cellulaire est affecté alors les

Les progrès ne sont très rapides, ce n'est alors que la suite
des lésions continuées, quo'occasionnent des maux d'ameurs —
stimulans appliqués inconsidérément que ces ulcères prennent
de caractère ^{concrets}.

Quand l'ulcère est bien cicatrisé on peut en
faire une plaque pour rassembler les bords de la division (comme
pense le maître tiers) mais il ne faut pas qu'il y ait une grande
déperdition de substance.

Une malade avait des ulcères à l'arrière des joues, et
de la terre inferieure. Ces ulcères avaient perforé les joues, dans
les parties d'environ un pouce, en sorte que des escales de
craie étaient plus grandes que celle de cette quantité. outre
cela il y avait des ulcères à la langue. c'était la suite d'une
maladie (supérieure) et très ancienne, et la femme
n'ayant pu guérir, il avait communiqué vers cette point
la maladie vénérienne de. appliqué avec emolliente
et opiacée. Le virus fut vaincu de mort et tant
de perte de substance avait été considérable.

quelque fois l'ulcère négligé est enflammé
au plus haut degré quelque fois la gangrène s'en
ensuit... il en résulte une vaste ouverture difficile
à fermer et quelque fois la mort est la suite —
de la perte de salivation. appelé de chagrin,
le malade tombe dans un état d'affaiblissement
doubt il ne guérit pas. ~~avec~~ dans les fortes de
gangrène les emolliens font les véritables anti-pep-
tiques pour arrêter la gangrène. Il reste une
grande ouverture ou la ferme par un
obturateur.

Les chancres primitifs sont assez fréquents sur
la langue... sur les tégumens... dans les parties
application de la langue dans des endroits immoindes
et tout cela fait qu'il y en a plus de primitifs
que de consécutifs.

Toutes les parties de la langue qui sont

49

Susceptible, Les bords de la langue correspondant à des dents, peuvent
 au être affectés de manière à être ulcérés et quelquefois dans
 ces cas on a fait subir dans 2 traitemens curatiaux
 il ya aussi des ulcérations des aphtes qui se reconnaissent
 pour cause des maladies vénériennes - il ny a que les signes
 comme érosifs, concomitans qui puissent avec les dents
 et encore ces signes ne sont ils que rationnels. expectation moyen
 les signes... mais encore l'expectation d'artreux peut faire
 persévérer l'état des ulcères. cependant ce n'est pas une
 raison pour regarder toutes des ulcérations dans cette partie
 comme non vénériennes par la raison qu'il ny aura pas eu
 de symptomes primitifs.

Lorsque les ulcérations paraissent à plusieurs reprises
 qu'elles sont superficielles qu'elles n'ont pas fait de grands ravages
 on peut croire qu'elles ne sont pas vénériennes.

un jeune homme avait des ulcérations à la base de
 la langue et dans d'autres parties de la bouche. on ordonnait au
 de traitement ~~anti~~ vénérien... une ulcération superficielle
 parut sur une autre partie de la langue. l'ulcération se
 guérit 7 à 8 fois dans lespace de 8 mois. Le jeune
 homme fut dans son pays. on lui administra le
 muricate pur originaire de Mercurie à un grain par jour
 il ne peut supporter cela, abas du camille et revint à
 paris... M. Cullerier ~~le traita~~ ~~en~~ ~~ce~~ ~~cas~~ ~~il~~ ~~est~~
 par constant que le traitement fut même nécessaire
 et lui Cullerier ne l'avait traité d'abord comme
 maladie vénérienne que parce qu'il lui avait dit qu'il
 était avoit vu des femmes publiques, mais il
 a pu depuis que ce jeune homme avait eu des
 aphtes sur la langue.

Quand les symptomes
 les symptomes sont primitifs et légers 10 à 20 grains
 de muricate suffisent non seulement pour les
 faire disparaître mais même pour en débiter les
 principes

Mais si ya perforation de la langue il faut
 être bien sur qu'il n'y a pas d'inflammation dans

il faut continuer plus longtemps le usage des anti-vénéériens si une portion de la saignée est adhérente avec les autres parties. La déglutition, les prononciations des sons sont très-difficiles. Les malades, après avoir persévé dans le traitement de leur langue, ne peuvent prononcer des sons ou du moins ce n'est que difficilement. un indidien ayant la langue rouge par de ulcères vénériens elle se contracte & adhère avec les parties voisines. il ne peut plus les mouvoir & sa voix se fait à peine entendre. La langue reste quelquefois dure & épaisse, et en quelque sorte embarrassée.

il faut remarquer que des ulcères, les cancers même à la langue ne sont pas quelquefois vénériens.

Les ulcères au voile du palais sont les plus constants des symptômes consécutifs de la maladie vénérienne. plus de femmes que d'hommes en sont atteints. Les chancres y sont rarement primitifs au voile du palais. il n'en a pas si souvent vu cependant est un nombre des chancres possibles qui y en ont.

Les chancres consécutifs sont benignes ou malins. ils doivent être traités suivant l'apparence qu'ils présentent. quand l'ulcère marche avec rapidité qu'il y a douleur inflammation, il faut oublier négliger l'affection vénérienne pour se fonder sur son symptôme. point d'anti-ven. qu'on donne alors mal à propos de cette sorte. mais quel résultat til? d'une maladie qui se ferait bien terminée on en fait une maladie grave et tous les jours des praticiens même instruits font de ces fautes.

un jeune homme parent d'un fameux chirurgien de cette capitale eut une éruption très-grande sur le palais surtout dans la région de la luette. L'inflammation était très-considérable, il fut appelé il ordonna une saignée de sang de la langue que de pousser etc. toutes les parties de la langue y sont

il dit que si on a suivi un traitement anti-venérien int^{er}ne
 long mes ferait perdu. on ne peut pas vouloir recouter. la
 femme ho unida été piéne de son organe, eprouvee une
 grande diffi^{culte} pour la deglutition et l'articulation
 des sons la luetta est perdue &c.

un autre jeune homme fut attaque d'une vive
 inflammation de cet organe à la partie moyenne du Palais
 on voulait donner des anti-venériens, on recouta cette
 fois le malade en fut quitte pour une légère échaume
 entre la luetta et la voile du palais. la maladie
 devint très simple. nulle gêne pour la deglutition ni
 l'articulation des sons.

quelquefois malgré l'usage du traitement pro
 bionique fait des progrès
 mais c'est qu'on ne s'y est pas pris assez à bon heure
 comme déjà l'ulcère a détruit une trop grande partie
 de la langue on ne peut pas en arrêter les progrès
 d'une manière prompte. mais on les arrête enfin
 et il y a des pertes de substance de perforations
 c'est qu'elles existaient déjà - postérieurement, et
 peut être sans s'en faire, mais c'est encore la suite
 d'un mal antérieur. ainsi, par exemple, s'il y a
 une carie, il faut bien que l'os carié se fasse
 une ouverture... on fait usage des delayans le
 médicament interne a été donné à petite dose
 en longmentant d'une manière insensible et
 toujours en considérant l'it ne produisait pas
 trop d'irritation... dans tous les cas ce sont les accidents
 occasionnés par la maladie qu'il faut attaquere
 surtout... car la nature est occupée en quelque sorte
 à l'inflammation de parties affectées.

Mais il est des cas où il faut stimuler
 les chancres par l'application du sulfate de cuivre
 on peut même les toucher légèrement avec
 de nitrate d'argent fondus, mais c'est rare il faut
 être bien sur qu'il n'y a pas d'inflammation dans

Les parties voisines que la partie est parfaitement indolente qu'il n'y a pas de tout de gonflement.

Dans bien de cas la destruction de la lèvre du voile du palais fut la suite de l'application de caustiques quand les parties avoient été enflammées.

Un ^{officier} voyageant dans la Belgique il avoit un voile du palais un ulcère légèrement douloureux, d'un moins supportable. on lui conseilla ^{à l'administration} un traitement anti-vénéreux... l'équilibre du voile du palais et de la lèvre détruits. cependant on parvint à arrêter la maladie pour deux ou trois semaines, et il fut momentanément guéri. Lors, arrivée chez lui, ^{à Paris} l'ulcère se rouvrit et on le cicatrifa avec le nitrate d'argent fondus. on le revint de morceaux de la stimulate pour en continuer l'application pendant un voyage qu'il alloit faire. pendant 7 à 8 jours il en fit donc usage, mais arrivé à Paris il ne pouvoit plus parler. M. Culler ^{lui} conseilla de laisser le ^{nitrate} caustique, on lui avoit dit chez lui qu'il ne pouvoit guérir que par ce moyen. ^{on} le continua ^{deux} jours ^{plus} qu'il en que le voile du palais les piliers et la membrane muqueuse furent presque détruits... il se repentit trop tard. on ne put lui restituer la perte de substance. cependant la deglutition put se faire et la maladie fut guérie de la maladie revint dans 3 à 4 semaines. cependant comme les remèdes qu'il avoit vus dans les traitemens antérieurs n'avoient pas été continués assez longtemps, on continua encore l'usage de anti-vénéreux. si le malade eut été docile dès son arrivée à Paris un traitement convenable auroit remédié aux désastres produits par les caustiques.

Lorsque la maladie a attaqué le voile du palais, quelquefois de l'estomac

53

en l'intérieur, quelquefois de l'intérieur à l'extérieur
ou au vu de malade s'échapper les quels la membrane palatine ne fait
ulcères qu'à près cela de os et réciproquement, quelquefois cela tient
ou la membrane ne se développe point, ainsi si l'os
est carié, il faut bien que la membrane palatine soit percée par la suite
ou ne pourrait certainement pas être empêché.

quand la membrane palatine se gonfle quand il y a
une douleur profonde depuis quelque temps quand en pressant la
membrane il y a gonflement et qu'on ^{entend} un petit bruit comme
s'il y avait un peu d'air en dedans, alors on peut prévoir que
l'élévation est intérieure et il est bon de prévenir
le malade.

quand ces ulcères sont anciens, quand l'ulcération est
plus grande que l'ouverture, on peut laisser les choses dans
leur état ordinaire.

mais si l'os qui veut sortir ne trouve pas un passage
assez ample il se fait agrandir l'ouverture quand l'os ne peut
être cassé et entraîné par portions... sans cela il survient
un engorgement au pourtour de l'ouverture &c

la maladie fait quelquefois de tels progrès dans
parties que le mal se propage dans les os, même par suite jus qu'à
dans les sinus ou carie les os, et même la membrane palatine
alors quand on ne peut arrêter la maladie, quand elle
est dans les sinus frontaux, sphénoïdaux, l'air ne peut rien faire
et souvent le malade est épuisé par l'abondance de la suppuration
et par le chagrin &c et la mort vient enfin.

Les frictions mercurielles peuvent guérir les ulcères des
Voies du palais, mais si la salivation est la suite une
irritation est produite. La liqueur de vaussier en fait
disparaître quelquefois elle seule les accidents, mais alors la
maladie n'est pas tout-à-fait guérie, ainsi il faut avoir
recours en même temps aux sudorifiques, et il faut même que
les Aïssures soient très rapprochées qu'elles soient
comme en extrait. avec cette précaution les sudorifiques
peuvent même guérir... à même si on donne de légères
frictions

Les ulcères vénériens attaquent le pharynx
à l'organe ^{quo} rarement le siège, cependant

Il en vint des exemples, & presque toutes les époques de l'antiquité
 et cependant ^{de} praticiens très-âgés qui n'en ont pas
 les 1^{eres} fois qu'il leur en a parlé ils sont tombés les
 nez au vent en doute. ... pour les en convaincre, il leur a été
 obligé de leur en administrer les preuves par
 l'inspection et encore vient il pas voulu ajouter
 foi aux faits. ... oculos habent et non vident: sciat quod

quand ils sont superficiels adoucis. J'ontouvez ins
 deloyans & mais quelquefois fois que la maladie
 ait été méconnue soit que les médicaments susceptibles
 n'aient pas été administrés, les membranes du tégument cellulaire
 se trouvent détruits et enfin la maladie va se
 porter jusqu'au corps de nerf libre cervical. dans ces cas
 la maladie ne peut être qu'extrêmement longue. il faudra
 la traiter doucement et longuement pour tâcher d'obtenir
 la réparation des parties nécrosées. injections garga
 ris mes adoucisants & avec du temps et la patience la
 Maladie pourra guérir, mais (c'est un cas très-grave
 et il ne la vu ~~de~~ qu'une fois depuis 18 ans -
 cependant la maladie a guéri dans lespace d'un an -
 tout au quel la déglutition se faisait bien de même
 que la prononciation des sons.

Le larynx peut être attaqué de dedans ou
 dehors, ou des deux au dedans. le 1^{er} cas est le
 plus commun. il s'en a ~~3~~ 3 exemples. les diennes
 ont tellement perforé le larynx que la respiration se
 faisait...

Nicolas Massa rapporte qu'un prince français ~~protestant~~
 fut d'une maladie vénérienne avait longtemps senti
 de la douleur vis à vis du larynx. il y eut extinction
 de voix. tantôt les frictions tantôt des sudorifiques
 avaient été mis à contribution sans pouvoir
 le guérir. ~~mais~~ il y avait ouverture au larynx
 il eût pu parler si n'eût fait une
 ouverture sur cette fenêtre. nicolas -

55

meaffo lui fit prendre de la tisane de falfe-parille et de gaba gaba en forme de catrait... au bout de 66 jours l'ulcere et la fistule aeriennne furent gueris.

Dans les memoires de l'acad. de chirurgie on trouva un exemple de guerison de fistule aeriennne egalemeut gueris par un traitement venerien - j. l. petit

Le 3e exemple lui est particulier. un chancre avoit lieu sur un indid malade dans l'interieur du larynx de dedans au au dehors. il perfora le cartilage et se faisoit jour dans l'interieur du baspe. long ans la maladie et l'ouverture ont ete gueries. celle-ci etoit tres petite voy aut qui deux lignes de diametre. (siicolas meaffer dit quelle en avoit 6 à 8 sur son malade). sans doute, si on etait appelle avertiens on pourroit arreter une semblable maladie par un traitement anti-venerien... Dans feuillet cas G. a. d. dans celui de phthisie laryngee... comme Moyere d'aprovee on pourroit employer les anti-veneriens; mais il faut qu'ils soient en quelque sorte enchaines dans des mixtures... car d'ailleurs il est d'ailleurs tres difficile de distinguer si l'on soupconne le virus venerien.

Si l'individo est faible le cacochyme et prouvenant de l'age on se developpe la phthisie sans symptomes venerien, ni sans qu'il se soit expose au danger de l'avoir... il faut mettre de cote les anti-veneriens... dans le cas contraire on peut les employer mais avec la plus grande meunagement. et s'ils ne servent qu'a affaiblir le malade, il faudroit s'abstenir.

Les phthises laryngees gutturales Bien prononcies ne peuvent etre gueries... il n'en a jamais vu de cures radicales.

Entre des sangs de pied et de la base des - lorsque il arrive quelquefois qu'il y a beaucoup de chancres. il n'y en a pas dans le moment dans l'hospital parce qu'il est au lieu sur un symptome est dominant, et en un autre

56

c'est un nouveau symptôme. ils ont l'appareil des
 regards et à cause de celui on les a appelé *gouffé*... ou bien
 on les a nommés *ulcères longs*. c'est un effet ordinaire
 de la mal propreté c'est parmi les femmes publiques
 de la dernière classe qu'on les trouve. car celles qui se
 baignent les pieds n'y sont pas sujettes. ils sont toujours
 consécutifs... quand ils ont fait des progrès, soit par
 la malpropreté de l'individu, soit par sa négligence ou
 bien quand ils ont une *Dialthé* & *scaburique* ou dant
 alors ils résistent. & l'on en a vu durer mes années
 entières... (Coulange qui en avait eue chaque
 année l'abbé, comme il n'était pas précisément or-
 da révisé de doctes ils seroient bientôt guéris.)

Quant le professeur entra à Bietre il y
 avait une 30^e de femmes qui en avaient et on dit
 que c'était une maladie incurable... il ordonna des
 adoucissans de narcotiques même de mes des-
 avans depuis 6 mois l'autre depuis un an. il les
 fit purger avec de la charpie trempée dans le baume
 de Fioravanti... dans 6 semaines ils furent touz-
 cuites... depuis il a voulu répéter le même
 traitement et il a vu que deux de guéris bien-
 souvent les ulcères augmentent... c'est que dans le
 1^{er} cas il y avait indolence chronique de la
 maladie, qu'on n'y a pas vu. mais dans ceux qui ne sont
 pas aussi anciens le baume de Fioravanti, ne
 réussit pas... y a-t-il de la douleur; le larc est-il
 croissant? il faut de nécessité que tant d'années
 tant à l'intérieur qu'à l'extérieur... sont-ils
 inflammatoires? il faut employer des anti-
 phlogistiques. En malheur de luyans de catharsis
 qu'on il y a irritation d'ailleurs
 inflammatoires. & si on s'insure quand
 de la douleur

57

quelques fois les ulcères se font terminés par quinquaine mais
 mais cette terminaison a été rare, ou plutôt le ven-
 gere que quand tout ce qui est ulcère ^{les complications} est modifié
 par la nourriture hospitalière. l'organisation ^{Cancer}
 y est quelquefois aussi en quelque sorte générale par
 une influence atmosphérique qui a lieu d'une seule
 ignée une double modification partielle
 a la base du boudin les ulcères doivent être
 traités de la même manière. mais tant qu'ils
 restent en place l'irritation sera permanente. il se
 fait donc faire l'extraction (quod videtur) on
 fait détachement de cette partie avec des pince large
 pour porter sur une plus grande surface et pour
 supporter ce tout. quand cet arrachement est incom-
 plet il croit une sorte de organe qui fait
 arracher mais il est trop mallable pour qu'on puisse
 l'arracher de suite... souvent il a été alligé d'ongles
 de poisson de sel de mer de la consistance en
 de se sachant avec le de une de fermentation afin
 de pouvoir l'arracher avec totalité. Car si en
 reste une portion on ne peut obtenir la guérison
 de l'ulcère... Comme les ulcères ont été coupés
 à de la forme de ongles ou les appelle
 ongles mais par la nuit on doit entendre
 quelque autre chose dans il sera parlé dans la
 suite.

de
 pustules =

Maladie qui attaque les téguments mais qui ordi-
 nairement les attaque. h. s. v. il y a
 développement antérieur de la peau un bled
 suppuration qui prend ensuite de la consistance

58.

De l'ypispeur et qui forme des saillies.

une appellation pustule une saillie sur la peau tantôt avec développement du tissu quelquefois seulement avec l'interieur qui prend un aspect squameux ou croûteux. ainsi les saillies ont leur siège dans la peau.

Les pustules ont été le seul symptôme de la maladie vénérienne. fréquemment la figure en était le siège. mais qu'on remarquait la maladie au grand air aussi un auteur ne parle tel que des deux symptômes de la maladie vénérienne dont l'un se faisait remarquer aux parties génitales et l'autre au visage et la peau.

un autre observe que parmi les pustules, les unes étaient humides, les autres sèches, les unes avec ulcération, les autres sans ulcération.

Jean de Vigo décrit beaucoup de sortes de pustules, ainsi il distingue d'humides, de sèches, de jaunes, de blancs, de noirs, &c. et il croyait que ces couleurs différentes venaient de la différence de température. mais la plus importante observation qu'il ait faite à cet égard est que les unes étaient primitives, et les autres consécutives.

Il avait observé que les unes étaient croûteuses avec ulcération sur la croûte... que certains voyageurs dans les auteurs qui sont venus de puis en ont parlé comme s'ils en avaient vu à l'exception des espèces.

Les parties de la génération en sont spécialement affectées... un auteur ^{avait} déjà observé qu'elles étaient vides chez les personnes atteintes aux parties génitales. avant à lui, il a passé des années entières sans en voir en ville, et sans doute qu'une lésion propre le genre de vice la mauvaise nourriture contribuent encore à les produire.

59

Les os lepidocome est épaissi la maladie est contagieuse. Cependant quelquefois on en a vu sur les lèvres, sur la langue qui étaient certainement primitives, et même aux parties des loins.

On a vu fréquemment bien sur la figure sur les mains et sur les autres parties ^{parties} de la face. Ce qui donne du moins bien de le croire. C'est qu'autrefois on reconnut il y a la maladie à cette marque, puis qu'elle suffisoit pour faire arrêter les individus qui avoient des figures marquées à ce loins. On les conduisoit à l'hôpital où étoient punis, et on faisoit ceux qui avoient de quoi faire traiter et soigner chez eux. Les anciens règlements de Bicêtre et de la Salpêtrière défendoient d'admettre ceux qui portaient telles figures à la figure. à présent c'est l'inverse sur les malades, on ne les en a et on ne les en a pas. Les maladies de la face sont très-difficiles à guérir longtemps après le développement des autres symptômes. Si toute la habitude des os est atteinte il y a eu donc des parties qui en ont été plus fréquemment atteintes. — Il y a quel

Spécies
1^{re}

Il y a quelquefois seulement un changement de couleur de la peau qui est circonscrite. La peau paraît comme échinose dans des points multiples mais étendus cette disposition ressemble à la morsure des puces. C'est un petit point blanc dont la circonférence est colorée d'un rouge bleu plus ou moins foncé et d'une ligne du diamètre on a appelé ces pustules fourmilles elles ressemblent en effet à la piquée des fourmis ou des puces.

- 2^e Dans d'autres circonstances on a remarqué un point tendre transparent, et d'autre fois sec. on les a comparés aux grains de millet et quand ils étoient sans ulcération on les a appelés oracles.
- 3^e mais quand elles étoient oracles terminées par un point noir d'ulcération et non de suppuration et qu'elles étoient jaunes on les a comparés à

60.

à du millet et on les a appelle miliaires. dans les pays d'y
à développement arrondi dans les secondes la matiere est de couleur
et ressemble à du millet qui est colore en jaune.

4^e d'autres fois les maladies sont plus étendue que dans
circonscription, la surface est recouverte d'une multitude
légerement élevée. d'autres fois de lames de pechies, et semblables
à des gales... on les appelle ces pustules... pustules venériennes
galeuses ou galle syphilitique. = on se voit assez souvent
mais il n'y a point de pustules vésiculaires et dans
l'inter des de ferosite il n'y a point de puerit comme
dans les gales... elles ont différent même pour les formes.

5^e Les pustules les plus développées d'une couleur tirant sur
le brun ont été appelle lenticulaires, à cause de leur
forme. elles sont ordinairement accompagnées de pustules
galeuses, qui vus par eux même que le commencement de
celles qu'on appelle lenticulaires, ces pustules ont lieu
indistinctement sur toute les parties, mais on les trouve
pas dans les parties de la génération, elles sont toujours
conspicueuses, mais sont quelquefois inégales tantôt avec
suppuration tantôt sans suppuration... mais dans les ex.
ces est plutôt un accident provenant de la longueur
de la maladie et du mauvais traitement que de
leur caractère naturel.

6^e quand la surface est plus lisse, quand la couleur est
d'une rougeur moins foncée que les précédentes, plus
considérable qu'elles sont arrondies, ovales, et comparées
à de petites cerises à des fraises, mûres. ces pust.
quelques uns présentent de l'effacement avec les
précédentes, que par le volume le développement une
couleur plus rouge et une surface plus lisse. par
tout, elles sont conspécueuses cependant il en
a une de primitives. elles se guérissent par
des mêmes procédés que les précédentes
7^e celles ci se montrent avec un léger développ.

61

avec une excoeriation de la surface de la peau en fait de la suppuration avec les dartres ont été appellées pustules veroleux ou dartreux. il est bien des cas ou l'on ne peut les distinguer les uns des autres. Bien souvent on s'est mépris mais d'autres fois aussi les medecins anti-venereux ont très-bien réussi et les ont fait disparaitre et reciproquement.

70^e frequemment il arrive que les pustules sont avec des croûtes beaucoup plus epaisses plus developpees. la matiere qui limite de la surface prend de la consistence. Le distend et alors on a appelle cela pustules croûteuses. les croûtes sont epaisses, et ce n'est que le detachement de la matiere si on les entere il s'en forme de nouvelles. il est bien facile de les faire tomber mais il s'en forme toujours de nouvelles si l'on n'a recours au traitement qui, a mesure qu'il est fait admiestret, d'une nouvelle epaisseur des pustules qui se renouvellent. quand elles sont arrondies on les a appelle pustules rondes egales, quand elles sont inegales on les a appelle fontaines.

80^e on a vu des developpemens en forme de pyramides se developper sur les pustules dont la matiere est secretee et excretee avec rapidite. quelquefois dans l'espace de 24 heures il se forme des croûtes de 12-15 lignes d'epaisseur.

longeur qui est commun d'un individu en est d'une force de casse il est aut-acquis le poids le meme volume. si le tissu n'a pour pas y toucher allumerait pas un volume double. comme c'est commun il est obligé de se faire en public il durrait de deux ou d'un tiers.

90^e quelquefois l'absorption se fait en dehors et au dedans. c'est a dire, qu'entre le developpement de la peau, elle fait des progrès à l'interieur qui venant quelquefois jusqu'au tissu cellulaire. alors y ayeut solution de continuite on les appelle chancres pustuleux ou pustule ulcerees, cest le passage des pustules aux ulcers. Les pustules ulcerees sont

62

un tranquille, c'est à dire ne s'étendant pas au delà des
 parties où elle sont fixées et on les appelle stat ionnaires, on
 elle, se changeant de place le cicatrice peut être coté et en l'air
 les parties d'un côté opposé on les a appellés Pustules
 serpigineuses parce qu'elles marchent en zig-zag et
 quand les malades, restent un certain temps sans se faire
 penser il arrive quelques fois qu'elles sont h'atendues, qu'il
 a vu un malade qui en produisant d' si tendues, qu'il
 avait assez bien la forme de deux serpents, un
 mais quelques fois elle sont peu attendues, tantôt elles
 affectent une forme semi-lunaire, quelques tantôt celles d'un
 cercle, dans le 1^{er} cas elles se circonscrivent du bord droit
 du demi cercle et se portent du côté opposé, quand elles
 sont circulaires, elles se circonscrivent au centre et font des
 progrès à la circonférence. = une femme en a eu pendant
 une année entière... on avait beaucoup les pucierres
 d'un côté ils faisoient toujours des progrès de hauteur,
 une autre principe que le pucierres s'y mettoient sans s'inter
 pour produire de pareilles pustules.
 une Malade avait le bas ventre tout couvert
 de cicatrices superficielles, un jet blanchâtre semblable
 à de petits tubercules blancs et de quelques lignes de
 longueur avoient lieu, cette Maladie dura depuis plus
 d'un an... il a commencé par couper toute la peau
 blanchâtre qui contenait une matière purulente croissant
 par là de la faire cicatrifer, tout ce qui a été mis
 à decouvert (c. a. d. l'épiderme) se cicatrifia dans deux
 jours... on peut comparer cela à la que fait la
 cicatrification il y eut sur les côtés une fureur d'un
 genre il voulut le cicatrifer, il se fit un autre
 jet un peu plus tard - il voulut le circonscrive de
 fut au vain de sorte qu'il a renoué a guéri cette
 Maladie. en suite cependant il a fait prendre
 à la malade une grande quantité de bains avec des
 végétatifs de distance en distance de bords sous chior
 raies, il voulut appliquer un cautère mais la
 Malade ne le put ventu

63

une bubon a présenté le même phénomène que les ulcères qui rougent d'un côté tandis qu'ils se cicatrisent de l'autre. Quelque fois tantôt de dent arrière tantôt de dentérieure quelquefois de la circonférence au centre quelquefois du côté opposé. (ce n'est pas le seul exemple qu'il en ait eu) il a fait dans certains cas toute sorte de remède, il a fini enfin par appliquer des fers. Les cicatrices commencent mais l'ulcère est monté jusqu'à l'ombilic, a coup sûr il n'y avait plus de maladie vénérienne. aussi cet homme a-t-il eu communications avec ses femmes sans lui rien communiquer.

16° on appelle tuberculeux les pustules arrondies, pustules de celles qui ont avec pustules comprend les pustules avec développement et avec ség état.

on les appelle pustule végétative car la ligne de démarcation entre les pustules et les végétations, a côté de pustules moins développés on voit quelquefois souvent des végétations alors la transition est insensible.

La pustule était autrefois le seul symptôme de la maladie vénérienne vers des avant d'idées on primitiv et en (cuspatures, c. a d en cela, qui paraissent bientôt après le côté et en cela, qui ne paraissent que longtemps après, plusieurs éruptions ressemblent tellement avec les pustules qu'il faut confondre la cause avec le signe pour en distinguer les deux.

Les maladies avec lesquelles les pustules ont été on peuvent être confondues sont celles qui existaient quand la maladie vénérienne a paru. c. a d. L'éléphantiasis la lépre le lichens le pruna l'anthrax le galle les dartres et autres espèces de maladies cutanées.

à cette époque l'éléphantiasis était généralement regardé. la maladie a reçu le nom parce que plusieurs quelques uns les legumeux des pieds les effacèrent de manière qu'ils avaient la forme de ceux de l'épithème ainsi que la peau qui était brisée. il y avait engorgement de legumeux partiel ou général ainsi que dans l'éléphantiasis. la peau était recouverte de croûtes épaisses qui ressemblaient à la corne de charrue en avaient la dureté la couleur des décoloration inégales les tubercules de manière qu'on voyait dans certains endroits de, anfractuosités.

et des failles. J'abou des fortes d'engorgement lymphatique
 et sans scier mais ensuite les parties développées fut concurrencé
 les bords se renversèrent & - presque toujours la maladie
 qu'onombait par la suite de progrès de mal parce qu'il
 était difficile à guérir quand il était bien développé
 mais pris dans le commencement on l'arrêtaït affaïr
 facilement; mais était bien plus difficile chez les gens
 du peuple. on en a vu plusieurs fois à l'hôpital St. Louis
 ce n'est que dans les grandes villes qu'on veut au voir
 encore des exemples.

Quand le professeur étoit à bicyclette un jeune homme
 de Vitré âgé de 20 ans lui fut envoyé. ses jambes étoient
 aussi grosses que le corps d'un homme ord.^{re} ~~de St. Louis~~ ^{de St. Louis}
 La peau ressembloit à la corce de chêne vieux ou les
 anfractuosités sont bien profondes. cette maladie étoit
 le suite d'un autre, adynamique. quelques jours après
 son entrée dans l'hôpital la maladie d'uni mal il
 avait été cahoté pendant plus de 24 heures avant d'arriver
 à l'hospice... et il avait remarqué que ses. bouffissures
 avaient diminué. - en conséquence Mr. Cullerier fit
 bruyettes la maladie dans les cours.. il fit faire des lotions
 des cataplasmes trempés dans une liqueur composée
 d'un tiers de vinaigre et de deux tiers de fleurs de
 sulfur, fit donner la diète nuptiale de deluges de
 chicorées. Dans lespace de quelques mois tout
 l'engorgement fut dissipé, mais cet éléphantiasis
 étoit qu'accidentel.

Il y a une similitude entre des tumeurs des
 de tumeurs dans les parties qui étoient le siège du malheur
 pouvait le confondre avec la maladie n'importe. Des
 auteurs ont prétendu qu'il n'y avait aucune ressemblance
 d'autres que étoit la même. Dans ces hôpital
 quelques fois il a vu des pustules croûtes
 avec engorgement du tissu cellulaire et de parties
 environnantes qui avoient pu être regardés -
 comme un éléphantiasis non encore bien développé
 ainsi il pouvait bien y avoir une grande
 ressemblance entre ces deux maladies. en effet c'est
 des auteurs qui ont parlé de l'éléphantiasis

en donnant des symptômes différents parce que sans doute les
 Maladies étaient plus ou moins développées quand ils la voyaient
 et supposent de même que dans la maladie vénérienne tantôt
 on voit des bubons, tantôt des pustules, tantôt des chancres, etc
 et faut voir les maladies sur toutes leurs formes pour en
 tirer des caractères exacts.

Différences entre les pustules américaines, et l'éléphantiasis.

Les pustules font la suite de la maladie longtemps négligée
 quand elles sont consécutives à la ^{non de primum abrid} pustule sur toute la
 surface du corps indistinctement... L'éléphantiasis est
 au contraire fixé sur les membres, surtout aux 2 pour
 (probabilité) l'existence de la Maladie vénérienne.

La lepre existait fréquemment avant le fin du
 14^e siècle elle attaquait ordinairement les yeux des peuples, quoique
 les personnes riches n'en furent pas exemptes. La peau était
 tantôt seulement excoriée... Il y avait de ~~ces~~ écailles
 petites, courtes, pèpèrèrè, ^{ouverts} par des fissures, qui
 donnaient de la suppuration. La peau affectée était
 violente le tissu cellulaire toute la partie du corps
 en étaient affectés surtout la figure. aussi on la
 reconnaissait aux os affectés quand la maladie n'était
 pas traitée les ulcères rougeaient jusque aux os, avaient
 l'aspect de la suppuration et le docteur de ^{ulcères} Concérens
 et alors la maladie conduisait nécessairement à
 une mort prompte.

Il a vu des malades qui avaient les symptômes
 de la lepre primitive... esquameuses sur les parties enorgées
 couleurs rouges foncées ulcération superficielle et peu
 étendue qui prouvait la suite de l'écroulement... bien
 plus souvent il était difficile de décider si ces maladies
 étaient vénériennes ou non. Deux malades surtout
 présentaient les mêmes symptômes qui avait toute
 l'apparence de la lepre. L'un deux fut guéri par
 le traitement anti-vénérien tandis que l'autre traité
 de la même manière eut une exaspération dans
 les symptômes de la Maladie.

66. en sorte que celle qui ne guerissait pas par le traitement ressembloit
plus à la maladie vénérienne que l'autre, ainsi même
après, même forme ayant commencé des les mêmes Muni-
il a vu d'autres maladies de ces genres qui ont avoient impu-
avant le traitement qui s'est fait on s'est bien qu'on
commencement de la maladie vénérienne il devroit être
avoir bien des complications de la lepre avec les maladies
vénériennes et on ne doit pas être étonné qu'on les
confondait puis qu'à présent que les maladies lepreuses en-
si rare on s'est si trompé souvent... seulement pour
les distinguer une de l'autre il y a de la possibilité de
prescriptions. mais combien elles sont peu certaines? qu'on
qu'on voit bien souvent quand on ne voit que des
symptômes caractéristiques de la maladie vénérienne il ne
doivent pas la confusion de la maladie vénérienne
avec celle de la lepre commencent toujours par l'engorgement
de la coriariation et puis par l'ulcération.

L'année dernière un homme était comencé d'ulcération
qui ressembleroit plus à la lepre qu'à la maladie vénérienne
venu de l'hôpital St. Louis il fut parfaitement guéri.
rien cependant ne pouvait faire distinguer cette maladie
de la lepre. il en avait tous les symptômes, tant il qu'il
n'en avait aucun d'écailles, de pustules, de la finériens... C'était la
suite d'une maladie adynamique. il avait le cou très-
gros de tumeurs cellulaires infiltrées. oo

Ensuite les affections lepreuses sont très-rare
que les maladies vénériennes se portent à la peau, on peut
sans inconvénient commencer le traitement vénérien de
même d'abord sans les discontinuer. selon les cas

Le lichen est une maladie attaquant ulcération de
téguments, faisant des progrès dans un sens, tant il qu'elle
guérissait dans un autre. Il y a donc des pustules, vésicu-
leuses, qui lui ressemblent. Elle avait plus de
longueur que de largeur. La plus grande difficulté
s'est présentée, pour au commencement de la
maladie vénérienne, pour les distinguer
des autres qui ont

67

peints de signes positifs. Les signes commémoratifs peuvent servir
 Les signes commémoratifs rationnels, sont quand il y a quelques symptômes
 vénériens, alors c'est une présomption que c'est un signe de la
 Maladie vénérienne, mais c'est encore quelquel présomption
 cependant comme la pénétration est extrêmement
 rare cette présomption est plus de poids.

Il y avait une autre Maladie cutanée qu'on nomme
Volatilis parce qu'elle semblait voler d'une partie sur l'autre
 L'ulcération se cicatrisait un autre ulcère se formait à un
 autre endroit du corps, pendant que les pustules vénériennes se
 rapprochent, cependant on en venait à disparaître et elles
 étoient remplacées par d'autres beaucoup d'autres, mais
 les comparais on n'est pas exacte... parce que alors de
 Maladie vénérienne faisait des progrès.

Le chancres développement qui ne ressemblait
 par ses pustules vénériennes développement qui croissait
 rapidement.

Il existait encore une affection comme sans les noms
 de teigne dans le visage n'est pas toujours bornée
 mais peut en a vu sur presque toutes les parties du corps.
 (Il a vu des teignes sur la tête qui dépendent de la Maladie
 vénérienne). Comme des enfants en sont ordinairement affectés
 si on la rencontre sur des individus d'un âge plus avancé,
 il faudra s'informer si la teigne est héréditaire dans sa
 famille & ensuite la teigne fournit une matière jaunâtre
 fongueuse, tandis que quand les pustules sont vénériennes,
 elles sont brunes, elles se lèvent en masses et sont
 très couvées comme dans la teigne &c.

Il existait encore quelquefois des maladies cutanées
 très-graves qui marchaient avec une grande
 rapidité et qui attaquaient le tissu cellulaire sous
 cutané et la peau. C'était le charbon le charbon
 cependant le marche de la Maladie vénérienne
 est très-différente. Les pustules s'élevaient

par pénétration, douloureuses et inflammatoires très-légères, tandis que les pustules gangreneuses, le chancre, l'entropion, l'écrouelle, les douleurs et une inflammation très-intense. Les uns qui les a fait regarder comme une dépendance de la vérole, les autres, qui les avaient lieu chez des vieillards, dans les hôpitaux. ces pustules gangreneuses étoient très-fréquentes à Bicêtre, elles survinrent dans les hôpitaux ^{en 1783} ^{à Paris} où la vérole étoit endémique tous les ans et pendant toujours il y en avoit. ~~et~~ quand un bubon étoit ^{ou} une pustule étoit ulcérée, de mauvais air le local très-étroit l'encombrement des malades et tout ce qui en avoit engendré cette complication.

À l'hôpital des vénériens il y a 3 ans que 74 malades en furent atteints dans le département des femmes. On en mourut et furent ^{en} ^{un} ^{seul} ^{cas} ^{en} ^{un} ^{seul} affectés quand la maladie vénérienne étoit déjà détruite on chercha à en découvrir les causes. tout ce qu'on put trouver c'est que dans l'ouverture d'un dépôt de la cuisse d'une femme il s'en étoit échappé une suppuration si foible qu'on avoit été obligé d'ouvrir les fenêtres et de désobstruer... cependant cette opération avoit été faite dans l'infirmerie... ainsi l'inflammation ~~ne~~ avoit été morbifique et une cause suffisante des contagions, pourquoi la vérole elle-même étoit-elle indistinctement dans les salles? pourquoi n'auroit-elle pas fait des ravages dans les salles des hommes, dans les cuisines de leurs dîners, dans les dortoirs à 10 pieds de distance de l'infirmerie des femmes? Est-ce une disposition de l'air, de l'air de l'intérieur des salles? Les pestes de vanté de quibus nouveaux fut démontré un cas au usage quand une gangrène se déclara dans un hôpital le seul moyen de désinfection est de ~~mettre~~ de faire les salles, comme on la vu dans les hôpitaux militaires.

il y avait des esclades qui viciaient des regards aux ordes
barru les femmes la progne les emparais le d'acyle
troubaient successement pour les os de pieds

Le prognostic sur les pustules d'ordres anciens commences
des vintures guerissent alutet que les Confectioses. maru
celles-ci les vintures superficielles... alors prognostic favorable
guerison prompte. quand artance vegetation avec
desatoppement, prognostic avec favorable, quand on
plus lente. quelqfois il foud les extiper. Les pustules
avec ulceration guerissent plus lentement. quand
ulceration gagne d'un coté en se cicatrisant de
l'autre. Les prognostic est quelqfois difficile; quelqfois
il faut attendre avant que la guerison se opere,

Traitement pour les vintures fistules ou
mercurates. Les sudorifiques sont inutile. Le traitement
doit etre porte assez loin... ce sont les remèdes
les plus actifs, les moins incertains. quand au traitement
general conjointement avec les precedens, il faut des
bain pour ramollir la partie pour favoriser l'acton
des mercur admissibles d'une maniere quelconque
des la 1^{re} forme rafraichissante deluyante et la 2^{de}
deuxiemes une pinte. on doit eviter les a l'insens trop
actifs apres qd. pour que les remèdes agissent mieux.

Des pustules les unes sont arrandies depuis une demi
ligne jusqu'à 12. d'elles sont developpees au vices ou yoles
il y en a de plates. de persennées de distance
en distance. d'ulcers qui les yoles font. Le traitement
quoique a peu pres le meme devra varier.
quand les pustules sont accompagnées d'ulcerations au
leur surface, d'ailleurs une odeur de agreable, quand
il y a inflammation de parties circonvoisines.
les premiers jours il faut les laver et ny pas
laisser séjourner cette odeur qui peut y
augmenter l'inflammation. on y fera donc

lotions avec la decoction de racine de quinquina de Surcouf
 on fera usage de bain local & quand les accidents sont
 avec douleur on y ajoute de l'extrait d'opium, une tate
 de pavot, le vin d'opium Couperus & q
 quand les pustules sont seules on les frotte avec
 l'onguent mercuriel ou... une fois par jour ^{et} quelque
 deux fois par jour - pour les constitutibles les pustules on
 leur donne une action qui les font resorber les uns mêmes. si on
 n'y applique qu'un stimulant elles guérissent croiss
 vite. quelquefois on réussit avec une dissolution de sucre
 par oxygène de mercure, ... mais il faut observer que dans
 les pustules sèches qui ne ^{semblent} pas abondamment cette
 adournaux abonde qui les distingue des paraitent en
 vite avec cette substance qui avec le khat qui deux donne
 de la suppure et alors le mercure agit sur elles plus
 facilement. quand des pustules sont par des cloppes et
 adent dans 8-10 jours quand elles sont plus considérables
 il en faut 15-20.

celles qui sont avec tubercules ne donnent pas une
 adour disageable, sont lisses et se rapprochent beaucoup
 des pustules consécutives, elles prennent ce caractère
 parce qu'elles se ramouissent de tissu cellulaire se rapprochent

quelques fois dans les femmes grasses il y a gonflement
 dans les grandes les petites lèvres. il y a de l'écoulement
 dans ces parties, il y a douleur les pustules se crevent les
 malades ne peuvent supporter de croat mercuriel ou l'écou
 lularation devient plus considérable ainsi que l'inflammation
 il faut alors attacher donner des adoucesseurs de Calmar
 de gomme et un fente en resorber avec l'écou. ainsi
 quand il y a irritation Calmar, quand elle se
 dissipée le croat. il y a en telle femme s'écou les quelles il
 a été obligé de varier une 15^e de fois le traitement
 sur les pustules avec des cloppes générale en
 vesse le traitement local produit des effets plus

empêcher. quand des ulcères ordinaires, about pas guéris, qu'il y a des pustules avec végétations, on applique longuement mercurel alors les pustules se font le frottement et se en reste quelque chose en saibles, ne font plus véneriennes ce qu'il est en de reconnaître les flaccidités des parties.

quelquefois cependant la maladie ne cède pas et alors elle entre dans la classe des végétations. on a des ulcères contigus à l'instamment trauchant et quand il y a un pédicule étroit on en fait la ligature. le traitement intérieur doit être longuement continué après leurs disparitions. sans cela les pustules reparaitraient au bout de quelques semaines et voilà pourquoi on regardait les maladies comme incurable au commencement. on le abandonnant trop vite de la déclarations virulentes, contra les mercures qui étaient appliqués et même des auteurs le disent, les pustules reparaitraient bientôt. ~~à cause de~~

pour les symptômes consécutifs surtout quand il y a complication avec d'autres maladies que la maladie est ancienne ou est souvent tropes mais cela n'arrivera que deux fois sur cent et pour les affections véneriennes primitives jamais le traitement ne lui est parvenu de fait.

on ne pourrait guérir en joignant au mercure deux des sudorifiques mais c'est compliqué de traitement en quelque sorte, il faut mieux employer des onguents mercuriels quand des dissolutions mercurielles, les pustules comme il a été dit.

Pustules consécutives. Le traitement est à peu près le même. en général qu'on a les frottements mercuriels, ainsi que le mercure pur pour guérir la maladie néanmoins cependant lorsque le mercure est joint avec les sudorifiques, consistant mieux les guérisons on est plus sûr que bien au petit égale le savoir de frottements et de sudorifiques, de mercure de 16 du mercure en de 24 grains, quelquefois on le porte jusqu'à 40-50 mais le terme moyen est de

72. en de 24 à 36. Dans les frictions il entre de 2 à 3
jusques 6 onces de mercure doux. au reste de l'ouïe n'a
aucun signe certain qui indique la dose précise et
donner cependant quoique les pustules soient soulevées
il faut nous continuer le traitement ^{quand est} la suite d'une
maladie primitive qui date d'une période assez circons-
crite, et en on de même quand la maladie est simple
qu'il n'y a point de complications. mais quand il y a
quelques années que les symptômes primitifs ont disparu
alors la quantité de médicament doit être portée plus
loin et plus loin encore quand il y a complications
et que la maladie est plus longue. D'ailleurs cela dépend
de l'espèce de complication, car, quel quefois la
quantité de médicament doit être indéterminée et
quelquefois on en continue l'usage pendant six à huit
semaines. Le petit point blanc disparaît
et le pus se dessèche et il ne reste qu'un changement
de couleur de la peau. Des vésicules en ont présentées des
têtes jus qu'aux pieds... une femme surtout avait ~~toute~~
toute la peau ^{entièrement} changée de couleur à l'exception
de doigts et encore y en avait il quelques traces... dans
cette maladie le sang paraît être extravasé et il en
résulte une petite pustule veineuse à peine sensible. Ce
changement de couleur lasts longtemps et quand il a été
négligé qu'il existe pendant quelques années il en
faut une cure pour le faire disparaître.
une petite verrue d'aspérité fort dure
être délivrée (elle ven avant que par le trou ouvert)
il se ferait de la compresse trempée dans de l'eau
de rochers de sel et d'alcool. Les pustules
de rougeur qu'elle étaient devinrent jaunes
comme dans les eschymoses. il est commun

13 que ce moyen réussit... puis qu'il y a du sang extravasé... en donnant de l'action aux parties où on est... Cabry... on en accélère la résolution. Dans la maladie précédente on employa longtemps le traitement anti-vénérien et le fut complètement guéri. la peau reprit son ton ordinaire.

puustules cuticulaires quelque la maladie soit confluente elle est confluente de plus récente ou quelque part (c.à.d. qu'il n'y a que quelques mois que la maladie a eu lieu) que quelque temps après elle passe à l'état miliaire c.à.d. à la suppuration ce qui forme une petite croûte qu'on appelle miliaire, ainsi que les pustules, orties, artillées, font le commencement de miliaires. (comme il y a toujours chaleur, une légère inflammation à la peau. il faut avoir recours aux adouçifiants aux bains. le traitement général doit être administré avec précaution ainsi demi quart de potasse seulement... quand il n'y a plus que 29 croûtes miliaires, quelques bains les font tomber avec facilité.

Les pustules, galeuses, ainsi nommées, paraissent ressembler à peu près aux pustules de la galle... ou galle exarolique ou pustules elle diffèrent de celle de la galle proprement dite en ce qu'elle font plus grosses, insaisissables, couvertes de croûtes sans avoir été déchirées... de plus les croûtes tombent sans aucune application locale.

Le traitement local n'est nécessaire que quand la maladie est récente et n'est pas nécessaire à moins qu'on n'employe les bains... quand certains de ces pustules résistent ou les oint avec le corail ou l'onguent mercurel ou bien avec des compresses trempées dans la dissolution de chlorure ~~de mercure~~. le traitement général voy.

quelques uns de ces pustules font confluente de cette manière il résulte une irritation un peu vive d'humeurs ischoraïse qui excorie la surface et donne l'apparence d'ulcération. De ces pustules se rapprochant du caractère de...

pustules d'artreuses. Dans pareil cas le traitement
 local doit être employé. de l'ayon adouci ou calmant...
 bains plus fréquents sur les pustules exsiccées & croûtes, emolli-
 tes, sur la graine de lin, quand il n'y a pas beaucoup de
 douleurs avec les fleurs de sureau, et les têtes de pavots
 quand il y a douleurs &... ces pustules sont celles qui
 guérissent avec le plus de facilité.

Les pustules lenticulaires sont assez rares. on en
 voit cependant plusieurs exemples (2. N. 5) elles sont
 plus difficiles à guérir que les galeuses parce qu'il y a plus
 de congestion & ces pustules guérissent plus au moins
 promptement suivant que le grand a été plus ou moins
 organisé avec ce développement ou quelque part forte.

Lorsque les pustules ne céderont pas au traitement général, on
 aura recours au bain et qu'elle ne sont pas généralement repaues
 on y applique dessus le cérat mercurel. quand elles sont gué-
 rées on les repaues il faut éviter de les frotter du cérat parce
 qu'il pourrait résulter de son action une exhalation de sucs
 dans les voies digestives alimentaires ou bien l'infestation
 ainsi il faut les frotter avec précaution... quelquefois
 ne pouvant être repaues on suppose ces pustules ont
 été frappées de gangrène. il la vu quelquefois mais
 est rare. = une malade eut toute la peau frappée
 de gangrène; dans une 15^e de jours tout presque fut
 détruit mais la gangrène ne se porta pas plus profon-
 dement que dans les parties affectées... ce qui y a de
 singulier est qu'après toutes autres malades n'étant
 affectée de gangrène, il n'y eut pas perte de
 substance la gangrène étant circonscrite dans
 l'étendue de pustules. on a donné des emollients
 d'intérieurs avec un léger astringent comme
 oximel étendu dans de la tisane de chirenia
 chirenia & point de quinquina point

De canchères dans les parties de la peau qui ont le point de disposition généralement dépendant de faiblesse.

Les pustules ^{récurvées} ont une surface lisse, point de squames comme dans les pustules lenticulaires. Elles sont tantôt simples tantôt mêlées avec les précédentes. ordinairement elles sont consécutives. on en voit peu toutes les parties du corps on en voit quelquefois avec une surface lisse, quelquefois elles sont tellement lisses, tellement rouges qu'on les prendrait pour de véritables merises appliquées sur la peau. Elles ont une couleur ordinairement moins foncée que les autres après quelques jours existe un certain tumeur, et une desquamation du tissu cellulaire cutané il y a plus de peine à les faire disparaître. alors l'application locale est indispensible. car le traitement général serait insuffisant ou trop long. quelquefois même le sérum n'est pas suffisant. jamais il ne les a vues supurer ou tomber en gangrène mais quelquefois il se forme des ulcères pour les guérir. quand elles sont très volumineuses soulevant la peau de la longueur d'un doigt. et en effet plus une tumeur est volumineuse, plus elle est d'endurer plus difficilement elle revient par elle-même, surtout quand cet état a duré longtemps en la perçant, quelquefois on la fait autaut faillir que si c'étaient des pustules. elles sont ordinairement sans douleurs à moins que quelque fillet nerveux ne s'y trouve compris. à tort le malade éprouve d'ordinaire quelquefois même une douleur lancinante. si on l'applique des stimulans c'est un moyen de plus pour ^{les rendre} les rendre douloureux il y en a qui sont d'une insupportable gêne.

Les pustules avec excoriation ou squames frangées fendues, des pustules d'arthrite d'arthre récurvées & furent elles dépendent d'une vérole récurvée et furent elles ne dépendent pas, La.

Vertical text on the right margin, possibly bleed-through or notes from the reverse side. Includes words like "pustules", "lisses", "rouges", "tumeur", "douloureux", "insupportable", "gêne", "squames", "frangées", "fendues", "d'arthrite", "d'arthre", "vérole", "récurvée", "dépendent", "pas", "La".

Différence est bien considérable ici pour le distinguer
 quelques fois les dartres existent avant la maladie vénérienne,
 alors il peut y avoir d'abord une maladie vénérienne, mais
 l'affection ven. peut se compliquer avec elle. Le cas le plus
 en plus grand si la maladie est exposé à gagner
 la maladie l'affection d'abord n'a paru qu'après que
 dans les comme dans l'autre cas il y a esphacèle, fistules,
 croutes suppurées de distance en distance, fistules
 suppuratives qui donne de la démangeaison... du prurit
 et quelque fois de la douleur. La peau est très ou-
 verneuse & il n'y a point de signe caractéris-
 tique pour indiquer la séparation qui a lieu entre
 ces deux sortes de dartres, les symptômes au fond les mêmes
 il n'y a que le point à laquelle la maladie a com-
 mencé qui puisse fournir des données - mais cette
 elle peut encore équivoquer, il n'y a donc que
 le traitement qu'on administre qui fait des
 véritables preuves de louches... quand il y a
 dartres ^{lentes} vénériennes le traitement général
 aide à la guérison, ^{mais le faire d'abord} quand on l'entreprend il y a
 complication les symptômes ^{se font} le cas où
 la maladie vénérienne a développé l'affection
 d'artre. Les quand au contraire on emploie les
 sudorifiques et les mercuriaux dans des affections qui
 ne sont que d'artre cette eruption se fait comme
 sirite il se forme des gercures, des ulcérations
 les croutes deviennent plus épaisses les parties
 plus douloureuses il en résulte encore un malaise
 général & tant is que dans une 20^e de jours une
 affection vénérienne d'artre se dissipe...
 c'est à dire quand la maladie est ^{purement}
 ou d'artre ou vénérienne... mais si l'y a
 complication de ces deux affections alors on
 est obligé d'employer bien plus longtemps les

77

traitement, ainsi qu'on en a vu un exemple dans une femme qui
 se trouva dans le malheureux cas. tantôt il a employé les
 emollients tantôt les emollients calmes puis sur les indications il a
 donné à différentes reprises des adoucisseurs et même des laxatifs et enfin
 il a appliqué une excubine pour changer de mode d'irritation
 il aura peut-être d'entretenir les vésicatoires... cette femme guérira
 sans doute mais ce sera qu'avec beaucoup de lenteur.

pustules croûteuses. soit qu'elles soient rondes, soit qu'elles soient
 longitudinales, soit qu'elles aient une forme pyramidale & les
 bords soit pointus soit suffisants contre elles. employer le cérat
 mercurel pour faire tomber les croûtes, on verra les pommades
 de Cirillo = quand le traitement a été adouci très
 une 15^e de jours, les tubercules diminue les pustules font
 alors à vue, enfin la saillie d'is paraît totalement et la
 maladie guérit en apparence. car les symptômes dispa-
 raissent & souvent avant que la maladie vénérienne soit
 détruite dans son principe. = il a vu une pustule
 qu'on traitoit à l'usage de pommade & fois par jour, pour en
 traiter la guérison on se servoit du cérat et on bant
 d'un mois il n'en parut plus de traces.

pustules avec ulcères ou excoriation d'is
 continuée dans les téguments le tissu cellulaire sous
 cutané. pustules ulcérées

quoiqu'elles soient souvent les suites des pustules croûteuses
 elles demandent un traitement local différent. ces pustules
 ne sont presque jamais telles que lorsqu'elles sont à par-
 tir du défaut de traitement: elles ont commencé par être
 croûteuses. leur suppuration étoit corrosive &rimonieuse. -
 voyant pas trouver de voies pour s'échapper elles se réagis-
 sent par les parties. ces pustules se rapprochèrent de
 celles qui avoient lieu autrefois sous le nom de depre. dans
 ce cas il y a engorgement inflammation quelquefois
 dans le tissu cellulaire. quand les pustules sont
 d'is évacuées par-ci par-là alors elles s'en vont par

L'appareil, il faut en effet qu'elle finisse Coustumees pour
paraître, comme l'opercule, quelquefois d'y en une demi-
pouce de diamètre et même d'autant plus. Cette maladie
ou cede au traitement anti-vénérien. Le traitement
général est le même mais doit être porté plus loin.
mais quelquefois les parties affectées font au nouveau état
fit parce que le malade n'est traité d'une manière
incouvenante soit parce qu'il n'a pas été traité du tout.
Ou bien il a été obligé d'attendre plusieurs mois
afin de rappeler les forces du malade avant de les traiter
de la maladie vénérienne. Il faut aussi du quinquina
et des fortifiants. ensuite il a commencé par
donner le sirop anti-vénérien le sudorifique
et employé les toniques même et en même temps
de mercure pur exigent à une petite dose. Sans
ces précautions le malade ne résistait pas à ce
traitement anti-vénérien et il mourrait autant
par ce traitement que par les progrès de la
maladie. au reste le traitement est très-
long. il faut le continuer 6 mois ou un
quelquefois .8.

Lorsque la maladie a été traitée localement il
faut examiner si au quel point la guérison en est faite
de carat mercuriel irrité quelquefois trop la surface ulcérée
ainsi quelquefois on ne peut employer sans inconvénient
on y joint alors les détergents; quelquefois on employe
les digestifs quelquefois on y ajoute de la liqueur
de mercure les caquons appelle digestifs mercuriels
ordinairement est suffisant pour la déterger
mais il est des cas où ce médicament légèrement
irritant ne fait qu'augmenter la maladie. Dans ces
cas on relâche ou calme. ainsi on use quelquefois
de decoctions emollientes faites par exemple -

79

avec les graines de lin les caractiques, la dissolution se fait
 gomme d'opium ou vin d'opium composé.

quand l'irritation est encompée il faut au venir aux digestifs
 simples, et quelquefois aux digestifs mercuriels et quelquefois au vin
 il faut aller des remèdes les uns aux autres c. a. d. alterner les
 topiques, topiques suivant les circonstances, et par là on parvient
 à guérir les foyes, des pustules... au reste ces ulcères peuvent
 devenir cancéreux par un mauvais traitement.

quelquefois ces ulcères ont pénétré jusque aux os, dans
 quelquefois après avoir percé la peau ils se guérissent par eux
 mêmes si l'os cellulaire sous que l'ostéoclaste des légumes ont été
 attaqués... il en résulte des clapiers, et autres complications plus
 difficiles à guérir. Les médicaments ne peuvent être employés
 sur toute la surface altérée; alors il faut mettre à découvert
 les parties ulcérées ou plutôt les transporter et alors on employe
 de digestif mercuriel &c.

quand ces pustules ont attaqué des parties molles
 peu éloignées des os comme par exemple à la région
 de la tête &c. elles attaquent les os et on ne doit les
 laisser cicatrifer qu'après que l'os est guéri.

Les plus difficiles à guérir (de ces pustules) ce sont
 celles qui sont accompagnées de cicatrisant d'un côté tandis
 que de l'autre elles forment des progrès... l'ichon pustule
 ulcérée... en zig-zac serpiginosus &c. C'est toujours
 une maladie consécutive, elle peut quelquefois
 seulement vanerique, mais très-fréquemment elle peut
 compliquée de lichen liquis des vices serpiginosus qui
 existait avant la maladie vénérienne.

Dans le 1^{er} cas quand elle est récente la maladie
 guérit assez promptement. il en est de même quand dans
 l'espace de 15 jours malgré quelle est la suppuration de
 l'abord de durer longtemps.

il est quelquefois nécessaire d'administrer
 un traitement intermédiaire, quand la douleur est
 médiocre. traitement anti-vénérien comme pour
 une maladie consécutive. quand la douleur est
 très-grande qu'il y a inflammation dans les parties
 environnantes alors il faut le traitement &c.

quand la cicatrice commence à se faire sur elle-même; quelque
 fois douloureux calmant ou seulement soins de propreté,
 dans l'inflammation et la douleur molle, ou
 ulcères vésiculaires, tant intérieurement que localement,
 quand l'ulcère est devenu indolent ou plutôt que la
 douleur est calmée, il ne faut recourir aux remèdes anti-vénériés
 et quand on est parvenu à calmer les symptômes d'irritation
 le même traitement qui est administré dans les cas où la
 Maladie vénérienne n'est pas compliquée convient alors.

La quoique sans douleur si l'ulcère est rougeant il
 faut porter à une fois de grains de mercurate de s. les
 Maladies malgrés cela fait des progrès il faudrait
 changer le mode d'organisation de ces ulcères. C. a. d.
 les faire de ulcères artificiels. on commence par y
 appliquer un caustique actif tel que le nitrate
 d'argent fondus mélangés avec une très-petite quantité
 tandis que le bœuf d'anti même ou le mercurate d'antimoine.
 sublimé est plus actif. la potasse caustique fait faire
 une escharre plus profonde. le caustique végétal n'est
 pas encore suffisant quelquefois et il faut avoir recours
 dans ce cas au caustique actuel qui brûle non seulement
 les parties ulcérées, mais encore les parties environnantes
 et par ce moyen on a une plaie simple
 un homme avait un ulcère de plusieurs années
 matieres aux aines. Les ciseaux du chirurgien y tomberent
 sans succès... il en résulta une pustule ulcéreuse.
 L'ulcère fut traité par un certain temps à un certain
 éloignement de la partie pour y déterminer
 l'inflammation... il se forma une escharre
 volumineuse... qui se détacha forma un ulcère
 extrêmement étendu et noir qui se cicatrifa
 dans lespace d'un mois étant bientôt devenu
 de bonne nature. cet ulcère se rapprocha
 de plusieurs pustules rougeantes de la partie douloureuse.

81

Les pustules ulcérées soit fongueuses, soit d'une autre espèce, guérissent facilement mais quand elles sont compliquées, des vices crophuleux concubens &c. il faut les combattre d'une manière différente et être sur ses gardes par les moyens qu'on emploie quelquefois les principes concubens pour exemple est si fort qu'il faut toujours de progrès, quel médicament qu'on lui oppose.

Les pustules en forme de végétation. ce sont celles qui considérées d'excroissances, on a appelé ainsi tout ce qui survient notamment aux parties de la génération mais encore sur toutes les autres parties du corps. c'est au développement orginifère au dire de quelques auteurs ne sont pas organiques, c'est à dire qu'il n'y a point d'action de dedans.

Les excroissances ont été appelées Condylomes, charnues, tumeurs en forme de Condyle, elles ont ordinairement lieu dans les parties de peau flasque repliée. c'est ordinairement aux environs de l'anus qu'elles ont leur siège. quand les excroissances semblent percer la peau on les a nommées *De condylomatibus* par lesquelles se developent croissent à la manière de, végétations ou des, a nommé différemment.

quand elles ont une forme petite arrondie ressemblant à une pédicule d'herbe ou la surface ou la appelée végétation uniforme de grosseur.

quand la surface est inégale plus ou moins élevée couverte de petits points ou la appelée végétation en forme de fraise de framboise.

ensuyvant elle est inégale & celle se dit en branches ou ramification, on les appelle choux, il n'y a que la couleur qui leur fasse différer. quelquefois il y a une saillie qui... on la appelle porreau, il y a excroissance quand il y a un tubercule arrondi qui ressemble à la queue d'un poil. ce développement tient donc au caractère

de la végétation mais il soulève la peau sur la perinée
et alors il y a excroissances développement dans le tissu
de la peau et ceci lui fait avoir des rapports avec des
végétations.

Les végétations sont plus ou moins nombreuses et
s'approchent ou s'éloignent de maladies qui ont ailleurs des
excroissances, au porteur de l'un ou de l'autre à la vulve
d'autres ne présentent que quelques unes, ce n'est pas à
l'ancienneté de la maladie qu'il faut attribuer les
grandes volumes qu'elles peuvent présenter. Ces calls qui
sont volumineux sont ordinairement de très mauvais
très-pens de temps.

Choux fleurs

ils ont leur siège à la face interne et externe des lèvres
quelquefois dans les bourses. perinée porteur de l'un ou de l'autre
chez la femme entrée du vagin prépuce du clitoris.

ils sont primitifs quand ils sont venus sur les
parties, même où de virus a été déposé. Conscients
quand ils sont sur une partie où il n'y a pas eu de
contact. quelque fois ils s'élèvent de choses sèches pour
que conscients.

il n'est pas rare de trouver à l'intérieur de la
bouche. il en a vu sur la langue, et sur un enfant
à l'extrémité de la langue. mais alors ils sont
peu de volume et se présentent sous la forme de
frises de framboises avec cette différence qu'ils sont
aplatis apparemment à cause de la compression
qu'ils éprouvent dans les fonctions masticatoires et
la mastication et la production de jus.

à la face intérieure de la verge de la verge, une
femme avait une végétation à la verge sup.
à l'inférieure qui ressemblait à des choux fleurs
dans le conduit auditif il en a vu
un assez volumineux pour avoir pu être extirpé
sans difficulté, mais cette excroissance ne ressemblait

93 ni aux quereilles ni aux faibles, on aurait pu la proposer
à une Caries. c'était plutôt un polype qu'une excroissance.
rougeurs paraitte) est le seul exemple qu'il ait vu. dans l'urètre

Les parties au dedans comme en dedans au presentent
Rarément. cependant on en trouve quelque fois à des
parties supérieures internes et externes de la chete quelquefois sur
la peau du pubis recouverte de poils. il en a vu 3 ou 4 fois
au dessus de favoris.

il y a une excroissance qui vient fréquemment à
Lanus, et aux parties génitales, car la vérole de ce q espèces de
pyramide oblongue. exfoliation de petites végétations
de décolorées... après l'usage d'y a des végétations indépendantes
des virus vénériens

il y a une excroissance qu'une femme a eue des végétations sur les parties
et les grandes lèvres. Les végétations au lieu de se développer il
crut que c'était de produit de la maladie acécubrienne. il lui
lui dit. son mari jouissait d'une bonne santé ainsi que deux jours
jours qui les voyaient. Labatier consulta fut des favoris. cependant
le traitement fut administré et elle guérit

une jeune femme en eut des végétations à Lanus qui
guérissent sans traitement.

une femme grosse avant des chapeaux de végétations
en forme de papilles de chairs. son mari se portait fort bien. point
d'enfant. à la fin de la grossesse on bientôt après l'accouchement
le tout disparut sans autre moyen que d'un vaigre en lavage

une femme de 35 ans avait des végétations sur les
grandes lèvres. elle habitait ^{dans} avec une femme honnête sans. de singles
lotions les furent disparaitre. et se changea d'homme qui ne
gagnait rien de nouveau avec elle.

une femme jeune femme eut des végétations
alternativement. elle eut les os des parties sup. et les parties inf.
La première elle vint sur le cou porteur de chairs... au bout d'un
mois de jours il y en eut plus. quelques jours après le mari
en eut sur le prépuce. elle paraissait tout à fait
d'un état de santé. Depuis l'usage de la femme a accouché
3 fois d'enfants bien porteurs. Le mari eut encore affaire
à aller au vent de faire une expérience... il injecta
de prétendu virus vénérien à une jeune fille
voit de neal consommé.

Y est de toute impossibilité de distinguer entre elles
 les végétations non vénériennes de celles qui ^{ne} le sont. Il y a
 que des signes commémoratifs, et les signes rationnels concomitans
 et encore Dans les cas de doute il faut temporiser voir
 si les excoriationes viennent ou ne viennent point de
 développement si elles tombent sans traitement anti-ven.
 si la maladie récidive par elle-même le traitement
 est inutile mais il fatigue.

Le pronostic est des fachaux point de danger... mais
 les végétations sont désagréables à porter, elles sont souvent
 très difficiles à guérir. quelquefois elles reparoissent jusqu'à
 six ou 9 fois après avoir été enlevées... il y en a
 même qui reparoissent toujours quelques mois après leur
 excision.

traitement curative ou frictions. Les végétations
 cèdent quelquefois au traitement général mais c'est rare...
 dans une allumette, qui a dementi il est vrai l'opinion
 vulgaire qui fait regarder les maladies vénériennes comme
 incompatible avec la santé. vidi dans 3 jours les
^{gams de puer} ~~gams~~ ^{de puer} sont tombés. ou les attaque ou bien
 par les cathartiques ou bien les caustiques, ou bien
 ou enfin la ligature ou l'excision
 par moyen... de solution de sulfate de cuivre
 de zinc & réussissent souvent à la gaine et à la faire
 tomber. quand ils ont été inutile on fait usage
 d'un autre qui même plus rare réussit par toujours et qui
 est le plus souvent malgré qu'on l'ait prouvé il y a
 quelques années comme remède infaillible très-efficace.
 Dans les végétations premières dans celles qui sont rouges
 vermeilles et qui n'ont pas été épaissies ou ex-
 cessées dans le subit en poudre. chez les femmes
 elle ne réussit pas parce que la poche a tombé
 à cause de leur peu de patience à le tenir
 au danger.

85

convenablement car au velle elle réussit fort bien et alors
il n'est pas nécessaire de couper les végétations qui cèdent
à ce moyen fussent elle de plusieurs années... cependant les
pubiers ne doivent pas aller complètement à l'usage
des caustiques d'usage au velle et alors il faut se servir
soigneusement de divers instruments tranchants.

L'eau styptique ne peut être de succès quelquefois
contre des végétations... quand on l'applique immédiatement
elle agit plus longuement par les effets de l'organisme les parties ainsi
les cathartiques en substance guérissent mieux que ceux qui sont en
dissolution et même ils valent mieux que le plomb au velle.

Quand cela ne réussit pas on se recour aux caustiques
acides nitrique, sulfurique, nitrate d'arg. fondus, surtout la mixture
d'antimoine fulmineux qu'il préfère parce qu'il agit plus
complètement plus vigoureusement... le nitrate d'argent
en poudre ne va pas assez profondément. L'irritation
produite par la végétation doit être développée davantage et
souvent elle acquiescent plus de volume. mais les acides
muriatique, nitrique, sulfur. très rapprochés agissent plus effi-
cacement... les caustiques parviers plus adont ainsi que le
beurre d'antimoine. quelquefois une seule application suffit
ou la seconde ne sert que contre le pédicule. mais ces applications
méritent les plus grandes précautions surtout que dans les hôpitaux
on ne peut y avoir recours... il ne faut attaquer que les parties
altérées et si y a de la végétation il faut en appliquer
sur toutes. pour que le caustique ne passe pas par les
dans les parties environnantes, il faut avoir un tuyau de paille
dont on trempe l'extrémité dans le caustique on le tient
appliqué sur la végétation pour empêcher le caustique
de couler & ^{pour cette} précaution on se souvient d'ordinaire
de grands accidents comme de phymosis des parotides, nez &c
quand des végétations font à l'homme un bien
aux parties de la génération chez la femme, alors les
caustiques agissent avec plus de lenteur parce qu'il faut

plusieurs applications, et alors les plus grandes précautions sont nécessaires. il a vu appliquer les trois choses, de l'huile de plomb, un inflameur neant par trop, vire... la gangrène s'empare de toute la partie. La maladie fut guérie... une femme avait de semblables végétations aux parties génitales, à l'un des applications - huit jours il fallut la mettre dans le bain.

Dans de ces cas la destruction des végétations fait défaut pour produire de grands douleurs dans le lieu où elles avaient été abscées. ce qui montre que les caustiques ne courent pas à tous les individus, il faut tâter de leur sensibilité en quelque sorte... ainsi il ne faut faire l'application que sur une petite partie et quand on est assuré par là que la sensibilité n'est pas trop exaltée on peut l'appliquer sur toute la partie.

La ligature elle convient dans les tumeurs, mais non quand la base est large quand ce sont des verrues, quand ce sont des végétations en forme de fraise, et à base large quand les végétations sont confondues les unes avec les autres, quand elles sont en forme de pustules, ou au lieu que dans les végétations en forme de framboises de cerise, qu'on peut en faire usage de même que sur les crêtes de Coq quand elles sont arrondies et qu'elles n'ont pas une large base.

cette application est sans danger ordinairement, mais cependant pour de grands douleurs quand les végétations sont volumineuses, il faut faire saillir un peu les végétations pour leur prendre les téguments dans les téguments. La construction est plus douloureuse mais la guérison est aussi plus sûre.

quelque fois les malades ne veulent ni du fer ni des caustiques. alors il faut avoir recours à la ligature. une femme avait à l'un des crêtes des Coq volumineuse. il voulut en faire l'excision

87

elle s'y refuse. il en fit la ligature. la partie liée avoit
de 8 lignes à un pouce de diamètre et ferma la ligature pendant
5 jours son bon ami fut chargé de ce soin... Mais les malades
ont les règles dans cet intervalle... quand il revint il n'y avoit
presque rien à couper mais il y avoit néanmoins deux heures de coupe
il fallut avoir de nouveaux secours à la même opération...
aussi une fois qu'il y a une échancrure il faut mettre entre
de la charpie ou une emplâtre ou du linge

Ces cas sont ceux qui ont recours quand les autres moyens ne
peuvent être appliqués sans danger et même chez les malades
qui ne resteraient pas tranquilles après la ligature dans
les cas où elle convient. Les caustiques deviennent
beaucoup de temps quand les végétations sont nombreuses
ou les pourquois on ne peut s'en passer dans ces cas dans
cet hôpital.

quand les végétations sont en masse ou se font du rapide
ou du bistouri. celui-ci est préférable et est plus aisé à manier (auj.
surtout) quand les végétations sont prolongées, allongées, les cils
à plat l'un sur l'autre. quand elles sont dans de anfractuosités comme
derrière les courbes du gland au fillet entre la verge et la bourse et
dans les femmes entre les grandes lèvres sur les petites à l'intérieur
du vagin derrière la fourchette & dans la verge sur le porteur de
de l'anus & présentant une courbure les cils au comble cour-
ils se cassent aisément, objet. il faut faire alors des excisions méthod-
diques, c. à d. de bas en haut afin que le sang coule en bas
droit ou l'excision a été faite de haut en bas par les parties qui
sont encore à exciser.

Si de grosses végétations couvrent de petites. l'excision
doit se faire alors à des jours éloignés pour ne pas travailler
sans y voir et ne pas se fatiguer à l'excision de...
qui doivent être extirpés.

Si les végétations ne sont qu'à l'entrée de l'anus
et qu'on le développe on peut les saisir on fait
l'excision mais il est difficile de le faire quelquefois on se
fait alors des cils au comble. il en est de même dans le
vagin. ces végétations ne sont pas fréquentes dans l'anus.

Dans son intérieur.

Il y avait une femme, dont le vagin et l'anus étaient formés par des végétations. Il aurait fallu faire amputer toute la membrane interne du vagin. Il y introduisit donc une mèche conoïde d'ougnent Mercuriel recouvert de Sabine en poudre ou de sulfate de zinc. Les saillies furent diminuées et au bout de quelques mois le malade fut guéri.

Il y a dans ans qu'une fille de 20 à 25 ans avait des végétations considérables et les intérieurs très vénériens. Les extérieurs furent excisés, les intérieurs furent bistrés. Elle accoucha... il y en avait presque sur le col de la matrice. 15 jours après l'accouchement il n'y en eut plus aucune.

Si elles persistent malgré les applications extérieures, il faut faire usage des ciscaux aux branches, alongés et recourbés. Il faut que les végétations soient bien détachées et ne restent pas trop nombreuses, alors on peut les amputer en totalité sinon on applique les caustiques.

quelquefois les végétations repullulent sur les endroits qu'elles occupent soit dans les parties environnantes soit même part. Ces cas sont rares - mais il est de malades qui présentent cela de particulier.

une femme a été excisée 6 fois... ces végétations paraissent ^{vouloir} ~~elles~~ tomber spontanément à présent.

un jeune homme en ville en avait qui furent détruits par le sulfate en poudre. Elles reparurent l'excision en fut faite. Elles redoublèrent dans les parties environnantes et les excisa encore jusqu'à 3 fois. Elles reparurent encore alors il les excisa elle sont toujours revenues et les opérations furent faites qui ont été faites une 15^e fois.

80
105

de faire ont été insidés. voyant cela il s'engage à faire
 l'homme de les abandonner à elle-même et à faire usage de femmes
 comme auparavant. au bout de 4 mois elle ont disparu...
 peut-être l'imitation était elle la cause de leurs reproductions
 ainsi: quand les végétations ne dépendent pas de la
 maladie vénérienne, les individus qui les ont mes parents
 par la communication il ne faut plus les tourmenter lorsqu'ils
 résistent. Bubons vénériens page 89.

Bubons indolens.

Quand les bubons sont indolens il faut les ramener au
 point nécessaire pour qu'on puisse obtenir une bonne terminaison
 on doit entendre par bubon indolent une tumeur sèche
 laide, sans rougeur sans chaleur sans inflammation enfin.
 cependant il est bien reconnu aujourd'hui qu'il ne peut se
 former de tumeur sans inflammation, mais elle est faible
 cachée d'habitude dans ces sortes de cas, la douleur n'y est pas
 assez forte pour que la maladie puisse être plaignue, il n'y
 a point de changement de couleur à la peau.

On a prétendu que les bubons indolens étaient
 l'attribut des personnes débiles lymphatiques, que les bubons
 inflammatoires, étaient l'appanage des personnes sanguines
 et que chez les bilieux le bubon était accablé par le
 caractère prédominant de la douleur &c. tout cela est
 démenti par l'expérience. on voit tous les jours
 des individus très vigoureux être atteints de bubons
 indolens comme aussi des ^{gros} personnes lymphatiques
 avoir de très-inflammatoires. et ne voit on
 pas encore les symptômes de la même maladie
 prendre sur la même individus des caractères tout
 à fait opposés. c.à.d. les uns être inflammatoires
 tandis que d'autres sont indolens? &c.

ou voit quelquefois dans bubon liés à côté d'un de l'autre
dont celui d'un est inflammatoire et l'autre indolent =
sur le même sujet. (V. ind.)

il faut traiter ce bubon suivant l'indication
locale.

Si le tumeur existe depuis plusieurs semaines, si elle n'est
pas sensible au toucher. Si le malade marche en différents
sens sans en être incommodé. Le traitement qui convient
est d'abord le traitement général qui convient pour
combattre le principe de la maladie et ensuite des
traitements des symptômes doit être et général et local
on emploie ordinairement dans l'hôpital des pillules
fondantes ou plutôt stimulantes ^{factives} avec
deux quarts de savaunde de potasse deux quarts de rhubarbe
et un quart d'aloës superfine... elles font un peu
purgative, mais à la dose de 3 à 4 grains
mais d'un gramme ou deux elles ne sont que stimulantes,
on donne aussi avec succès des pillules de mercure
improprement appelées pill. de Belost.

Les pilles pas de mercure qui est fondant dans
ce médicament ce sont plutôt des autres substances
qui y entrent il y a outre du diacorde de La
Securionnée qui ne sont que stimulantes, données
de 16 à 24 decaigrammes. on peut donner de
tisane, de fumet ou de petite teulaurie et autres
plantes un peu stimulantes, mais c'est principalement
par des parties, elles mêmes qu'il faut porter de l'action
ainsi des emplâtres, qui ont l'avantage en retenant
la transpiration de les faire réagir sur le tumeur.
Les corps gras qui stimulent ainsi le diacorde
ou l'emplâtre de vieux avec le mercure et autres
ou il s'agit tantôt de substances résineuses tantôt
métalliques mais toujours associées avec des substances
grasses. quelquefois on fait des frictions mercurielles.

La tumeur est un peu au début... de bon d'act'on même de
 L'effection est un mouvement imprimé à la tumeur indolente, c'est
 L'act'on de l'onguent mercuriel qui est stimulant agit sur
 La surface de la peau. Le mercure est absorbé, stimule
 Les glandes lymphatiques, les vaisseaux et les préparés à ramener
 La tumeur à l'état de circulation. ces moyens isolés ou réunis
 Produisent la suppuration et la résolution. dans les cas où
 La tumeur comme la bubon ulcéré. dans le 2^e cas rien à faire.

Mais quelquefois la tumeur ne fait qu'aug menter
 De Perete; alors il faut faire usage des douces alkalines qui
 Agissent et par leur résorption et par la substance qui
 Les composent, produisent la résolution de tumeurs qui avaient
 Résisté plusieurs mois et même de années. puis ont après une
 Deux douces de surface de bubon se trouve excoriée. il est bon
 De laisser ulcères un peu profondément s'appartient parce qu'il
 Se produit par là souvent dans la tumeur une
 inflammation salutaire. quelquefois cependant il faut
 suspendre les douces, et c'est lors que la douleur est trop
 Considérable ou que l'ulcération pourrait aller trop
 profondément, mais on peut y revenir y à 8 jours après
 Car alors l'ulcération s'est cicatrisée.

Un homme avait 3 tumeurs comme des œufs de
 Poulet au sein. il n'osa se faire employer les médicaments
 Mercuriels - vénériens mais bien des douces qui
 Produisirent une diminution d'un tiers. il en fit usage
 Pendant trois mois et par là les tumeurs qui avaient
 Résisté à plusieurs moyens disparurent.

Quelques fois elles adhérent, parce qu'il y a des tumeurs
 qui sont tellement indolentes qu'on ne peut y
 Rappeller la circulation. en pareil cas quand la dou-
 ces peuvent rien faire il faut y appliquer une
 Gésicatoire qui, quelquefois ulcère non seulement les
 téguments mais agit encore plus loin par les douleurs
 qu'il y excite; on peut se servir de la tumeur
 de cantharide qui produit le même effet
 effet. cccccc

de même de l'alcali volatil avec de l'huile... mais il
en est encore qui y ont résisté et qui se font rangés dans
la classe des tumeurs qu'on appelle incurables.

Si après avoir employé les fondans à l'intérieur de
sur la tumeur on se percevait qu'elle devenait douloureuse
si la surface en devenait inégale, si la tumeur prenait
trop de consistence si elle prenait le caractère de
Squirre il ne faudrait pas continuer l'usage des
les moyens... si par exemple après l'emploi des
emplastiques avec les caractères précédens les tumeurs
se chauffent de venant plus dure alors emolliens, calmans
et quelquefois même narcotiques. &c.

Il en devrait être de même si elle prenait
ces caractères après le succe... et alors certainement
les spécifiques seroient nuisibles &c.

La tumeur inégale douloureuse on doit la traiter
comme quand une tumeur veut se terminer par le
squirre, alors il faut combattre ce qui peut chauffer irriter
la tumeur... ainsi relaxans, calmans, narcotiques. ^{comme} Baillon
adoucit. delay. grimes de lin avec l'etes de pavot
auxquel on ajoute le morche ou la saumure de
graines de lin avec le vin composé ^{pour varier} de
de ténacité de pavot de morche on y ajoute même
le vin de grimes composé, de grimes lui-même sur
la partie &c.

Si ces moyens sont administrés avec à temps
on ramène la tumeur à l'état d'indolence et alors on
peut se tenir sûr et respecter cet état.

Si malgré tous ces moyens locaux et généraux
la maladie continue à faire des progrès par exemple la
diathèse cancéreuse résiste dans l'individue, alors
la maladie se termine par cancer à à d par
Skirre déguisé en ~~cancer~~ ulcère ou ulcère
cancéreux - calmans narcotiques et ainsi que la
maladie est mortelle on peut en parler très
Loin la dose et présent

109

il a réussi par le trait de ciguë et le trait gommé
d'opium qui a donné ou s. jusqu'à 12 grammes, et quelquefois
même jusqu'à 15 par la suite du traitement. On ne peut l'attribuer
par ce moyen contre la maladie il y a plus de ressources
La maladie ne prend alors d'ailleurs qu'un caractère
cette terminaison des tumeurs qu'on a remarqué chez les sujets
chez lesquels la maladie a été trop irritée et chez ceux qui
ont affecté de la diathèse inflammatoire.

il y a 18 mois qu'un jeune homme avait un chancre
à la verge qui fut traité par l'onguent balsamique et le
précipité rouge. Cette tumeur se guérit avec l'acide nitrique
puis avec le nitrate d'argent fondu. L'ulcère était cancéreux
il y avait engorgement dans le tissu cellulaire environnant. L'ulcère
était douloureux saignant... il y avait engorgement dans les
glandes... Delayans donnans narcotiques, les bains onctifs
les bains locaux dans les substances opiacées. Le nitrate d'opium avec
la ciguë... amélioration de l'ulcère creusé dans 3 mois et deux
ulcères cancéreux se trouvant guéri le malade partit. il avait
communiqué avec sa femme vers l'époque où il avait le
chancre ou il l'avait eue de sa vie. cette femme n'ayant point
de signes de maladie vénérienne et n'ayant eue rien de
peu prendre de médicaments... cependant son mari revint
quelques temps après avec un bubon indolent commençant...
frictions boillons delayans ordonnés on lui avait recommandé
de revenir dans quelques jours il laissa passer deux mois sans
effort qui ayant continué le même traitement son bubon
devint au bout de ce temps douloureux sans inflammation
et volumineux. M^r Cullerier le vit alors se le trouva
et que c'était la suite de la première maladie. il fit donc cesser
le traitement tant général que local. il employa les mêmes
moyens que dans la première maladie. mais ils furent infructueux
Le gonflement était déjà évident il était douloureux ou plutôt
cancéreux occulte. L'ulcère suivit et le malade mourut
il croyait qu'il s'était trompé et qu'il eût été cause de
la mort du malade mais il avait eu tort de ne pas
venir le trouver plutôt; car malheureusement qu'il y ait sans

deux chez lui une disposition concolorée cependant on ne
 aura pas le venter d'abord que les douleurs commencent à se
 manifester à son bubon.

Tumeurs aux aisselles ... il y en a quelquefois des exemples
 de 12 malades qui ont traité en ville et on est deux qui en
 ont. Sur l'un deux il a emporté le prépuce. La cicatrice
 s'est ulcérée du côté du filet et il y a eu une ulcère à la suite
 duquel sont venus deux bubons à l'aisselle ... il a fini de suite
 ou de femmes car l'ulcération aux parties génitales n'aurait pas
 pris la forme de chancre vénérien, c'est une maladie
 nouvellement gagnée quoique l'individue dise que l'ulcération
 de son filet tiennent à la coutume c. d. de la mer turb. cet
 homme venait de se séparer de sa femme.

Ces bubons axillaires sont quelquefois indolents mais
 le plus souvent inflammatoires, assez fréquemment ils
 sont primitifs non tant qu'ils sont gagnés localement
 mais tant qu'ils paraissent peu de temps après les
 contusions ou peu de temps après ceux qui paraissent
 dans le droit ou la contagion a été prise.

Les bubons inguinaux avec fluctuation d'is paraissent
 au bout de 24 heures, il fin est développé aux aisselles
 c'est à dire par métastase. Dans d'autres circonstances
 les bubons axillaires sont consécutifs ou tant qu'ils
 paraissent seulement après que les symptômes primitifs
 ont eu lieu et ont été guéris primitivement.

Mais quelquefois le développement dans cette région
 sont indépendants de la vérole, le virus dartroy développe
 souvent la tisse cellulaire et les glandes axillaires.

Chez les femmes d'origine de l'Asie, on trouve
 une tumeur aux glandes de cette partie sans qu'on
 ait vu auparavant la maladie vénérienne.

Une femme entre autres de Siamois en
 17 mois avanta des tumeurs à ces parties qui suppurèrent
 et cela se répète pendant 3 ans sans y comprendre des

111

2 par fenestras quand l'ulcère fut sur le point de
guérir il y a 4 ans il se forma des ^{ulcères} ~~ulcères~~ ^{ulcères} ~~ulcères~~ ^{ulcères} ~~ulcères~~ ^{ulcères} ~~ulcères~~
un assésaire sur le bras qu'il a porté pendant deux ans
de foyes de la tumeur avait été détremé par les pustules
fondues.

il est assez difficile dans certains cas de savoir si ces
tumeurs sont ou ne sont pas vénériennes. signes communs
concorrent. utiles même traitement que pour ceux de
aine.

La plupart se terminent par suppuration (et les foyes
est bientôt rempli) peu par résolution peu par induration
dans ce cas voy. 661 ans ains pour le traitement

quant à la suppuration quand le foyes est formé
on peut ouvrir de 2 manières... mais ici la position
fait que la tumeur fait que l'ouverture du pus se fait avec
facilité. Le pus se termine rapidement pour être
si cela n'arrivait pas Comp. de lancette. Il y avait
6 coupes de peau amincies pot. fondue... mais grande
Circumference au comp. de vaisseaux plus superficiels de
qu'ils ains. il est rare qu'on soit obligé d'employer
aucun des deux moyens.

on peut les ouvrir avec le digestif simple ou suite
avec la dissolution opiacée, avec l'eau phagédémique.
s'ils guérissent assez assez de proéminent. quelquefois
il y a une déviation par la négligence du traitement
parangion aura tiré la peau en écartant les bras
pour sentir la plaie et alors de l'infirmité par
retardée quand beaucoup de peau sera tendue &
elle abandonnera le gland du foyes alors il faut mieux
éloigner la peau pour sentir en écartant mieux le bras,
avec cette sage précaution on guérit facilement. cependant
il reste quelquefois des fistules. un peu de charpie
le soin de ne pas éloigner le bras du trou
un avant un foyes

suffisent. un jeune carabin était dans ce cas les fistules
a gueri d'elle même =

Les tumeurs du col ou les bubons cervicaux
sont plus fréquents que les précédens. ils ont lieu tantôt dans
une partie tantôt dans une autre ainsi tantôt au dessus
de la mâchoire, du menton tantôt sur les parties latérales
du col dans le trajet de veiss. jugulaires. Il est rare
qu'il y ait une seule tumeur ou bien ~~peu de~~ ~~peu de~~
si elle est seule il y a engorgement dans les glandes
environnantes.

quand ces bubons sont purement vénériens il
n'y a qu'une tumeur et un léger engorgement dans les
glandes environnantes. quand il y a complication alors
il y a une collection de plusieurs glandes engorgées qui sont
quelquefois limitées, dans une partie qui d'autres fois
sont plus bornées et qui, d'autres fois, se portent vers les
glandes lymphatiques et souvent cela en a engorgé
~~ce n'est pas le cas~~

pour des varolides, squarres. quelquefois il y a que-
squarres, mais le plus souvent les tumeurs sont mixtes
c. a. d. qui commencent par être vénériennes elles se
complicitent de squarres d'affection d'artère et quelquefois
d'un principe particulier inconnu.

Dans certains cas comme quand il y a une
tumeur vénérienne cervicale par métastase il n'est
guère douteux qu'elle soit vénérienne ainsi qu'après qu'il
y a paru auparavant des chancres de bubons &c.

mais il survient des tumeurs sur qu'on se soit exposé
à la maladie vénérienne, il survient des engorgements
à la suite de transpiration supprimée

mais supposons qu'une tumeur ait été combattue
par des anti-vénériens... si elle persiste c'est une tumeur
vénérienne d'abord qui s'est compliquée d'une autre
cause qui a entraîné cet engorgement.

si on a donc la certitude que la maladie vénérienne
il faut la traiter simplement comme tumeur. si elle est
indépendante du virus on la traite d'une manière
convenable... si elle est unie au venimeux par
le traitement anti-vénérien en suite on combattra
l'engorgement dont la nature n'est pas connue on
traite qui est scrophuleux, si l'engorgement est comme
par la cause de la tumeur on emploiera les fondans
si elle est unie. traitement combiné, si elle est
particulièrement délayante &c.

si les glandes environnent dures & dures, il faut
abandonner la maladie à elle même &c.

De même si la tumeur est scrophuleuse il ne
faut pas trop insister sur le traitement mais faire comme
on fait dans les scrophules des enfans ainsi bon air, bon
aliments, exercice &c.

quand les glandes sont bien unies, qu'il y a de
trajets fistuleux il faut obtenir la suppuration de
ces foyers de pus on bien faire l'excision des glandes.

un verre qu'on y ajouta du bicêtre portait
plusieurs glandes engorgées depuis la clavicle jusqu'à
l'oreille. il y en avait une 12. elles suppuraient et
faisaient un trajet fistuleux... un de ces trajets de
fistuleux avec une forte dissolution de
potasse caustique dans tout le trajet fistuleux. La fièvre
fut portée au plus haut degré avec délire, il fut
sur le point de périr pendant 24 heures. l'infiamma-
tion fut si développée dans la région des tumeurs que
tout fut frappé de gangrène depuis la clavicle jusqu'à
l'oreille. cependant le charbon tomba les glandes tombèrent
facilement &c. et la maladie accéda guérie. il eut une
cicatrice extrêmement large et profonde mais
le sang des cravates vint. cet affai fut heureux on
peut se comparer ce qui y avait de trajets fistuleux
dans une pareille manœuvre à ce coup de pot qui
dit on a guéri un malade qui avait un foyer

De pus dans le poitrine

Lorsque les glandes sont détachées, séparées par les suppures, il est fort facile l'écoulement quand la première membrane est détruite. ce la peut se faire quand les glandes ne sont pas trop nombreuses, sont superficielles, ou bien quand la tumeur est volumineuse, difforme et que le malade ne peut pas avec elle se présenter en face.

M.^r Cullerier a fait de pareilles excisions et même d'autres très grandes, très-profondes.

un malade à 61 ans avait des tumeurs ^{carotides} qui se propageaient jusque au niveau de la clavicle, c'est à dire, la tumeur venant de se reposer jusque à la mâchoire. Les deux tumeurs réunies auraient eu le volume de la tête. ce homme n'avait pas l'apparence d'avoir eu jamais la Maladie vénérienne. incision de 9 à 10 pouces depuis l'oreille jusque à la clavicle & les glandes furent enlevées deux fois, avant la guérison d'un seul côté... il se trouva au dessous une autre carotide ^{de glande} qui fut aussi enlevée. quand la cicatrice fut faite de ce côté, d'une autre opération fut répétée au côté opposé. Les glandes étaient très-moyennes, mais les autres comme de ceux de pigeon & y en avait comme de ceux de poulet. Il y avait une glande près de la prostate ecartoides qui était très-grande et à large base. il la disséqua parce qu'il n'y avait pas de gros vaisseaux ^{art.} qui la traversaient. il dépassa la veine jugulaire interne & tenna dessous. au bout de 8 à 10 jours ce homme qui se sentait très-bien trouva que le côté qui était un élève de garde lui avait dit qu'il avait couru des grands dangers et que si l'opération n'avait pas réussi il serait mort sur l'heure de ce homme on lui dit que sans doute, il crut que le danger ~~était~~ était encore présent. L'artère carotide

soit été mis à découvert dans 6 ou 8 lignes. plusieurs
artères, étant comprises dans la ligature ainsi toutes les fibres
faciales

plusieurs fois on a cru avoir enlevé les glandes
parotides, mais c'est sans doute faux, puis qu'il a été enlevé
dans caeter de glandes... sans y toucher. mais ce qui se
peut donner crédit à cette opinion c'est que la glande
parotide est accompagnée de plusieurs glandes lymphatiques.
quant à lui il n'est à découvert des glandes parotides
elles étaient à peine sensibles, affaiblies par de autres
glandes qui les couvraient et cependant elles étaient
complètes. il n'y a point d'apparence d'autres que
l'extirpation de semblables glandes, lorsqu'on traverse dans
deux parties profondes par l'artere carotide peut à raison
de cela se faire sans être suivie de grands accidens.

il survient divers tumeurs venereuses sur
les différentes parties du corps

on me lad a vu sur un tumeur qui étoit le
milieu de la cuisse qui se rapprochoit de Bubon. ces
maladies sont assez difficile de distinguer de celles qui
sont venereuses. - signes communs. Couleur. mais si elle se
trouve sur des personnes traités antérieurement de mala-
die venereuse. le cas est douteux et il n'y a que les
traitements qui puissent faire sentir de l'incertitude. - mais
peu de plus de secret on peut s'en avoir recours.

si elle sont sur des parties molles, elle sont peu dangereuses,
si elles correspondent à des Parties ou des os, on ne peut pas
bien reconnaître de parties molles comme les tumeurs de la tête,
de coude des articulations & alors il est à craindre que
d'os ne soit atteint

il y a des tumeurs de cet ordre sur les articulations dont
la matiere est semblable à du suif à du miel. Et
mais qu'importe la nature du contenu de ces tumeurs? le
traitement est le même. quand les tumeurs sont

formées il se agit d'examiner si y a fluctuation
 et dans ce cas si le peau est amincie... si elle est
 sur le point de se ouvrir il faut en abandonner le
 soin à la nature... si y a indolence ou fait usage
 des emplâtres, foudans et quand l'inflammation est
 produite des amolliers pour les écoulements à cratère

Mais quand la maladie est soulevée de
 complication des caries faut il ouvrir la tumeur?

Les auteurs ont prétendu qu'il fallait l'abandonner
 au travail de la nature parce qu'on a craint que
 l'air en frappant les parties caries ne rendit la tumeur
 plus grosse... d'autres auteurs prétendent qu'il faut ouvrir
 la tumeur parce que la carie a été occasionnée par
 le séjour du pus sur elle et peut s'augmenter encore
 cependant la carie est quelquefois les causes de
 la tumeur alors il faut quelquefois d'urgence
 de mettre les à découvert et il faut bien laisser
 le temps de secher les parties intérieures de la partie
 vis à vis.

Il y a point de diathèse scorbutique
 scorbutique et autres qui produisent l'ulcère. alors
 il n'est pas de mauvais caractère. Dans ce
 cas contraire la suppuration est fautive & alors
 il faut plusieurs mois en ont de se obtenir la
 guérison et la guérison; la chose est difficile surtout
 chez ceux d'où la maladie récurrente est ancienne
 chez des sujets affaiblis encore plus sur ceux qui
 ont des complications scorbutiques &c. cette
 tumeur peut dégénérer en ulcère scorbutique
 en fistule ou cancer &c.

il se forme aussi des tumeurs appendues
 sur des articulations. tumeurs qui ont reçu
 divers noms, quelque fois les articulations

font volumineuses il semble qu'il y ait une grande nodosité
nodosité

quelques fois ces tumeurs contiennent une matière
blanchâtre semblable au suif. tumeurs tuffées
quelques fois semblable au de la gomme délayée ou les
appelées gommeux, gommolates, gommofites. on
ordinairement elles se trouvent dans les membres supérieurs
quelques fois aux inférieurs

de, quand font rarement occupés, peu de mal
révériens font. ordinairement il y a complication avec
le rhumatisme ou goutte de la goutte même. il est difficile
de distinguer si, tenant à la goutte ou à la
maladie révérienne. signes communs. & examinés si
y a une maladie révérienne. si elle a été bien traitée
si elle a disparu trop promptement. si elle n'est pas
une complication avec l'affection rhumatismale
goutteuse dans le temps de la maladie révérienne &c.

si y a des nodosités sans qu'il y ait une apparence
de maladie révérienne. si ces nodosités, ne sont pas
constantes. c. à d. si elles disparaissent de temps en
temps si elles sont accompagnées de rougeur si y a
ou aux parties environnantes &c. alors elles ne dépendent
pas de la maladie révérienne. alors on ne demeurera
pas d'anti-révériens qui développent la douleur de
l'irritation. mais dans les cas de doute on peut
employer des sudorifiques puis que c'est un moyen
curatif contre les maladies arthritiques

lors que les tumeurs existent depuis un certain
temps lorsqu'elles contiennent cette espèce de suif, il est
bien plus difficile de les guérir. la nuit elle
est portée là il est rare qu'elle se tarisse par
résolution ou suppuration & mêmes moyens pour la guér.
on reconnaît sa nature, cependant il sera
encore plus facile en rappelant tout ce qui

Les paffés de favoir s'ils ont font veneriennes que pour
 le nodus, & un fibe de malade porte une tumeur aux
 articulations depuis longtemps & il y a eu des douleurs
 périodiques avec les tumeurs fit y a eu inflammation
 momentanée, si des symptomes veneriens existans
 ils ont été combattus d'une manière convenable... alors
 il n'y a pas de probabilité d'existence de la maladie
 venerienne... mais si n'y a pas eu d'intermission
 dans les douleurs si elles se toujours et de la même
 fit n'y a pas eu de os rouges avec rougeurs conti-
 nues dans certains tems &c. alors il y a presque
 certitude que la maladie venerienne existe.

que quelquefois ces tumeurs font extrêmement gran-
 tes empêchant les mouvemens des doigts & la flexion
 surtout, formant saillie au bout en dehors de
 l'articulation en dedans, de la tiffu cellulaire qui
 forme la tumeur &c. alors les symptomes
 veneriens combattus il ne faudroit pas abandonner
 la maladie. il faudroit faire une incision sur
 la tumeur en enlever la matiere laquelle
 embarrasse les mouvemens. cette incision
 est d'ailleurs sans danger.

Les gommosités ont lieu surtout aux
 articulations du poignet quelquefois au coude de
 pied avec la jambe. la matiere qui les forme
 ressemble a de la gomme deluyée mais très-
 épaisse elle en dure 7 ans, fondé a une
 Consistance de pâte elle est contenue
 ordinairement dans une Kiste C. a. d. que
 la tiffu cellulaire comprime avec la matiere
 ressemble alors a un ligament a une enveloppe
 ces tumeurs font un symptome caractéristique.

de la maladie vénérienne ^{comme les autres} elle, viennent
 ordinairement chez ceux qui sont depuis longtemps infectés.
 Si il a vu plusieurs malades qui en étaient atteints
 la tumeur s'en suit par suite de la charbon interne des
 poignets... une
 Une femme avait une tumeur ^{supplétive} comme un œuf
 de poule, suppletive... au même temps douleurs ostéocopes
 elle ne peut que des tumeurs fongueses... des symptômes de
 la maladie vénère. Ils parurent. La gonorrhée avait
 déjà diminué de moitié quand l'inflammation fut
 survenue et au lieu de la terminer par résolution
 comme elle avait d'abord fait mine de vouloir le faire
 elle suppure. d'abord à la base ^{l'urètre} partie de la tumeur
 une matière blanche épaisse comme du miel qui
 était du pus... ~~la~~ la part supérieure était
 fluente filante et ressemblait à de la gomme délayée
 épaisse grêlée. Les Kistes avaient été fit des
 injections. il s'y forma de nouveau de la ^{supplétive} matière
 introduction de l'oboch trochique de polomb qui y
 appella l'inflammation... a lors agglutination des
 parois du tissu cellulaire... l'abaissement. cette
 tumeur s'ait recroissée. u cas quelque fois les
 tumeurs gonorrhéales se font indolentes... il se fait
 rupture de la membrane qui contient la matière
 ces tumeurs prennent de l'accroissement. il sera
 facile de les distinguer d'après les signes comm. et l'on
 cependant si ces tumeurs existent depuis un
 certain temps si elle ont bien pu des malades
 qui ont de affections vénériennes (notamment
 sans doute) alors le cas est douteux. beaucoup de
 tabillans quels nodes les gonorrhées & sont rares.

Tumeurs qui se rencontrent dans les parties dures ou Exostoses

Le mot exostose est un mot général qui indique le développement des os, cependant on ne les considère que pour ceux des os plats ou celui qui servent au corps des os longs. Quant ce n'est que la surface des os que fait le développement et dans le périoste on l'a appelée periostose

Tous les os peuvent se développer par une voie viciée cependant les os plats et les os longs y sont plus exposés. Presque toujours les exostoses ont lieu au tibia. Elles se trouvent rarement. On en trouve au radius au cubitus surtout à l'humérus quelquefois. Quant aux os de la tête, c'est assez fréquent ainsi qu'au sternum il est rare qu'il soit alors la seule partie affectée et que les parties molles qui recouvrent cet os n'y soient pour rien.

On a divisé les exostoses en superficielles et profondes

- 1^o superficielles quand la surface de l'os est seulement développée
- 2^o en profondes quand il y a un développement général dans des tumeurs partielles
- 3^o en exostoses circulaires quand la tumeur est arrondie. et à peu près d'une forme conique
- 4^o en exost. inégales irrégulières (sans doute) quand elles sont inégalement développées.
- 5^o en externes
- 6^o en internes ce sont celles qui se développent à l'intérieur ou bien elles se forment sur la table interne des os plats ou bien dans la cavité des os longs, ainsi si l'on a par exemple développement à la face interne de la clavicule ou du sternum

mais quel infirmité encore il y a exostose interne dans la
 lésion de la viende... il en a vu des exemples en fait
 que les preuves de l'acrobatement ~~une~~ exostose forme
 seulement tumeurs pure et simple quand il n'y a que
 développement
 mais les autres peut être délicate... il y a
 plusieurs espèces de complications, un ^{de l'os} ~~de l'os~~ est seulement
 à l'os ou bien elle s'étend aux parties molles... il y a des
 exostose dans les lésions ulcéreuses, mais ces dernières
 quelque fois les tumeurs sont intacts quoiqu'il y ait carie.
 Il y a des causes d'exostose indépendantes du vice
 vénérien. ces causes sont extérieures, quand un corps
 agissant sur la os les irrite les enflamme et y
 appelle un plus grand développement... une chute un coup
 peuvent produire des effets qui finissent une exostose
 vénérienne... il en a vu de cette espèce sur le tibia.

Des vices compliquent quelque fois la maladie vénérienne
 dans des exostose... on en voit de purement scorbutiques
 occasionnés par un développement osseux mais les signes qui
 les distinguent des vénériennes, sont faciles à saisir
 dans les exostose vénériennes il y aura des signes
 primitifs & ou bien il n'y aura pas ce qui se trouve
 dans le vice scorbutique ~~parce~~ ce n'est d'ailleurs qu'un
 3^e degré du scorbut qu'on trouvera des exostose
 scorbutiques voy. scorbut.

L'exostose perant elle seophulose on la reconnaît par
 aux signes qui sont reconnus cette maladie... les font
 le individu dans son enfance a préputé de signes de
 scorbut & des développement osseux a dans principale
 ment aux doigts.

Dans les vices consécutifs de développement osseux
 fait en masse cela arrive quelque fois dans la maladie
 vénérienne il est vrai, mais des signes positifs lui feront
 distinguer. les tumeurs se développeront à mesure
 que la maladie s'accroît et dans la maladie
 vénérienne quand le développement est porté à

un certain degré il s'arrête. Dans l'exostose cancéreuse
la douleur sera continuelle il viendra des accès de laque
aux gacades. Le tissu cutané la tisse cellulaire
verticalement de l'engorgement dont les artères...
dans la maladie vénérienne les principalement
la nuit que la douleur se fait sentir. de est que
il est rare qu'on en souffre le jour les téguments sont
ordinairement et ceux des mains ne sont pas altérés.
Il est de ces cas où l'on est bien embarrassé.

Voici un exemple.

une fille de 12 ans portait des exostoses qui étaient
venues par gradation sa mère se portait bien traitement anti-ven
les tumeurs n'ont pas diminué ni sont pas devenues douloureuses
point de scorbut ni de scrophules son faub se portait bien
d'autres point de diathèse ulcéreuse il y a 18 mois qu'il
n'en pour la 1^{re} fois. elle avait un ulcère en forme de
pustule entre les attaches de muscles et des os - exostose
de la pommette. des tumeurs à la jambe gauche =
des cloques dans le radius. elle fut admise dans
l'hôpital. bains sudorifiques mercuriels - dans le commen
cement il a cru que la maladie allait guérir l'ulcère
la pectine fut en effet cicatrisé dans 4 semaines. - de
celui de la pommette se detacha la carie se dessécha il y eut
cicatrice. Les tumeurs avaient un peu perdu de leur
volume. ~~effectuant~~ après un certain temps de stagnation
dans les tumeurs elles se sont irritées développées de nouveau
et après usage des évacués des douces on les ont encore
de nouveau perdu de leur volume. ~~de~~ nous nous elles
se sont irritées une 3^e tumeur fort manifeste à la
jambe gauche. Le développement du radius a
dégénéré en exostose. Les tumeurs se sont ouvertes
aux jambes en sorte qu'il y a 4 exostoses ulcérées
en outre il arrive des tumeurs considérables aux
membres supérieurs = il avait entrepris de
traitement anti-vénérien parce qu'il a vu
plusieurs fois de malades qui semblent avoir
la maladie vénérienne sans être exposés à lui

gagner & c. qui guérissent par les anti-vénériens.
 mais ici le temps n'est pas vénérien. Les en état morbide
 dont la nature ne peut être faite.

Le prognostic par les exostoses doit varier suivant leurs
 espèces. quand elles durent depuis peu, qu'elles sont ^{peu} complications
 ordinairement la guérison est prompte. quand elles sont
 anciennes que les os est orgueille en quelque sorte en exostose
 et quand il y a complications de maladie est fâcheuse très
 longue &c.

Le traitement consiste dans le mercure associé avec
 les sudorifiques. L'expectation les employait seuls demanderait
 trop de temps à moins que les mercuriels n'aient déjà été administrés
 très à faible dose. Très-forte très rapprochée donne les longeurs.

Le traitement local varie suivant les espèces.

il y a des exostoses avec une grande tension des ligaments avec
 douleur mais qui sont superficielles. elle dépend de la
 distension des ligaments soulevés par la tumeur osseuse. relâchez
 cataplasmes émollients, compresses trempées dans des liquides de
 même nature &c. ... quand les exostoses sont profondes
 les émollients seroient utiles encore en ce qu'ils pourroient porter
 leurs actions sur les nerfs qui vont se rendre dans les os
 mais il faut de moyens plus actifs pour enlever les
 tumeurs en quelque sorte. calmans narcotiques, fortes
 décoctions de gravoil de mercurie. extrait gommeux d'opium

quand les douleurs qui compliquent l'exostose sont
 vénériennes on peut les combattre par des moyens employés
 contre les douleurs vénériennes. C.à. d. les anti-vénériens appliqués
 sur la tumeur. on a conseillé fréquemment d'appliquer
 dessus et au dessous de la tumeur et pour les os
 au des tumeurs très douloureuses, guéries comme par
 enchantement. mais toujours ce moyen ne réussit
 pas. il semble qu'il ne parviennent pas jusqu'au mal.
 on a proposé le mercure préparé d'une manière
 si les qu'il est plus actif, c.à. d. en vapeurs. c'est
 ainsi qu'autrefois on employait avec succès les
 fumigations c.à. d. qu'on se faisait brûler avec
 la soufre cinabre. on a vu plusieurs fois des
 tumeurs refractaires aux frictions eider avec

Facilité au menues en vapeurs, inconvénient de faire seulement
que les parties affectées en fait le traitement et ne pas porter
trop long la fumigation.

Certains auteurs le servaient d'une forte decoction
de false perille de gayac... les autres, disaient qu'il fallait
les decoctions de sassafras. Catarrhales, il fallait en confire
le miel pour le faire passer en infusion contre les pustules et
les exostoses: il la employée sans succès, et il y a apparence
qu'une forte decoction conviendrait mieux.

Malgré les progrès de la maladie, durs depuis
longtemps il y a ulcération, si elle n'est que superficielle
aux attaques de virus on les fait diminuer, en combattant
l'inflammation des teguments ou les ramollit et l'ulcère se
détache aussi. Cette complication est peu importante.

Si l'ulcération est dans l'épaisseur même de l'exostose
est avec altération de l'os avec carie alors la maladie
les plus grandes difficultés pour la guérir ou compléter quelque
fois il faut un an entier. mais pour traiter la guérison
on peut se servir du fer rouge.

Lorsque ces complications de l'exostose ont été
détruites, il ne faut pas croire que la maladie soit terminée
ou aura bien fait diminuer de volume mais il n'est
pas plus possible de détruire une tumeur osseuse bien
organisée que de détruire un cal. Cependant quand
l'exostose est recente qu'il y a un développement qui
dépasse et qu'il y a encore inflammation dans la
partie que l'os n'est pas encore organisé en exostose
si l'on peut ainsi dire; alors on peut diminuer la
tumeur quelquefois en entier. quelquefois la tumeur
osseuse est si grande que l'exostose prend la forme d'éboulé
elle est extrêmement dure, il n'est possible qu'un
seul exemple.

Carie ^{elle} qui se rapporte aux ulcères, fumeurs de parties, ulcères, carie consiste dans l'altération de la surface osseuse. Les vaisseaux sont détruits à la superficie de os. La partie dure n'est pas action sans vie et il en résulte des inégalités, une suppuration parce que les vaisseaux sont rompus ou en un mot il arrive que tout ce qu'on se passe dans les parties molles, ulcères.

- Les caries s'étendent sur les os et tantôt est une partie de l'os tantôt d'autre. on les distingue
- 1^o en surface quand est l'os tendu de os qui est malade
 - 2^o en interne quand est de os dans l'intérieur de l'os carie de l'os on dans sa propre substance
 - 3^o en relente distinction pour conserver le nom elle-même
 - 4^o en ancienne mais qui peut être pour le trait ancien
 - 5^o en sèche demande ou avec humide c'est à dire celle dans laquelle il y a plusieurs trous (carie) si ces trous étoient fondés par les bords
 - 6^o en carie découverte quand on l'apperoit et qu'on peut y apporter du remède.
 - 7^o en une fonde quand l'ouverture est extérieure et qu'il y a beaucoup de parties molles qui sur la partie osseuse ulcère

9^o carie avec altération de la figure

10^o en carie sans altération de la figure

avant de combattre la carie il faut savoir des quelles causes elle dépend. il y a les mêmes observations, os fumeurs (pour les os qui regardent les complications) que pour les exostoses quand elle sera venue dans le os présentera aucune altération qui n'est digne que les caries dépend d'une autre cause. quand il y aura en apparence des symptômes vénéériens, qui n'auroient pas été combattus, ou qui l'auroient été d'une manière non convenable... quand la carie aura commencé par des endroits où existoient des ulcères vénéériens de pustules, ulcères etc. il y aura lieu de croire qu'elle est vénéérienne.

Mais si il y a carie extérieure à un os par un coup une chute ou venant après pour le pied ou quand la carie a lieu au os de quel du pied quand elle arrive chez un enfant qui a de la scorbutique ou scorbutique proprement dit si il y a un ulcère à bords renversés, dont la suppuration est ichoreuse avec fumeur dans la partie si les os sous-jacents sont cariés carie découverte

mais supposons qu'il y ait maladie vénérienne avec scorbut et
qu'il y ait carie. a laquelle des ces deux maladies, appartenant en-t-elle
toujours d'ait on combattra d'abord la vice scorbutique. v. n.
v. n. p. scorbute p. le sept. c.

La carie est superficielle et se ravive seulement par
de bieu cellulaire le pronostic est favorable, si c'est dans
une partie profonde il est moins. si elle existe depuis
longtemps si elle se rapproche de la necrose. la maladie est
difficile a guerir. encore plus si l'est incertaine quelle soit
revenue ou quelle depende d'un principe inconnu...

Le traitement general comme par. ex.
Le traitement local doit varier suivant l'etendue et
l'espere de la carie.

La maladie est elle simple? afin de proposer pour
etayer les complications qui pourraient survenir. injections
pures ou avec la que, de se fixer dans les intervalles, &
si la carie est plus profondement situee si elle n'est pas
sensible a la mere injection, encore on se propose
de l'application des resines de la col. aussi les tentes
de myrthe et de laos. ces resines ou substances d'histoire
comme, celui du Commandeur, le beaume vert de mel. &
M. tenon a fait de experiences dont il resulte que
la col. et les resines forment une espee de plaque qui
empêche l'assoliation irritant les parties et qu'avec
les acathies les injections de mere de propolis on
obtient une assoliation plus prompte. tantot d'un
quant tantot d'un tiers et quelqfois de la moitié de
tant, qui fallait pour guerir avec la col. les resines
de laos &c on se sert propre les travaux perforatifs
et assoliatif la resine de myrthe ratif. v. n. m. d. l.

Mais si la carie est plus ramolue il faut changer
d'organe et on se propose d'ouvrir la carie. il est rare que
malgré toutes les attentions possibles, les cauteries ne produisent
ne produisent un quelq accident aussi on aura recours au
fer rouge pour la carie humide ou verme mais pour
cela il faut que la maladie ne soit pas si tres
profondement

a bicat. v. n. p. un homme avoit une carie
tres considerable à l'anus. il y a applique le feu
dans toute son etendue. le docteur tando bicat.

Le saifoy pueril de la vigeur il est appliqué encore 2 fois
 et alors l'ulcère se prolonge. Le saifoy pueril de la
 Consistance de la vie s'élève devant qu'on le donne
 Cicatrice s'en fait. il y a 17 ans de cela. dernière
 il a examiné cette jambe, elle est très forte mais il
 reste toujours un gonflement à l'extrémité inférieure
 de la jambe. il croit que ces tumeurs de destruction
 de saifoy lymphatique, car le saifoy fut appliqué sur tout
 l'ulcère et il développait la jambe en entier. Les circulat.
 lymphatique se donne d'après une source détruite par
 la destruction de l'épave et du tissu cellulaire. et
 la pleure ou voit une espèce de substance formée insensible
 et si Consistante que plusieurs fois le malade a reçu de
 chocs sur la Cicatrice sans qu'elle se soit ouverte. est
 ainsi que la nature fait donner des moyens de défense
 à nos parties. — Carreau mis à découvert chez
 un homme. Battu avec des artères secondaires, & idi

traitement pour les caries intimes, c. à d. celles qui atterrissent
 les portions des os qui sont au centre ou bien les portions correspond
 à la cavité médullaire.
 on a présenté cette altération. nécrose

La douleur en est le seul signe mais la douleur peut être
 occasionnée par une excitation par un état particulier de la
 membrane de la moelle &.

Il n'y a d'autre moyen que de perforer les os pour donner
 issue à la portion ulcérée. mais il faudrait un oint avec
 des signes positifs. il n'est pas d'usage si les caries
 se trouvent dans quelques cavités c. à d. qu'on les y a
 ainsi suppurer que les caries attaquées les tables internes du
 sternum il se établit un foyer de suppuration qui vient
 se prononcer à l'extérieur pourvu que l'air soit corrigé soit
 la tumeur située & il n'y a qu'à découvrir la
 tumeur.

on a observé que les caries de os spongieux était plus
 difficile à guérir que dans les os durs et spongieux
 d'ailleurs fait de propriétés d'air de guérir cependant
 il y a bien des exceptions à cette règle qu'on a
 voulu donner pour générale.

bien souvent il a vu les os spongieux atteints
 de carie se débarrasser guérir plus promptement

si la carie de la face interne de os était bien tendue et qu'elle
 cause de leur situation l'infirmité parait sans faire alors
 le trapan pourroit produire le danger & mais il faut avoir
 des signes certains de l'existence de la maladie.

Un homme de 40 ans étoit carie à l'intérieur sans
 que la maladie parût à l'extérieur... il faut que les signes
 extérieurs soient réunis avec les autres sans doute
 à l'âge de 40 ans il avoit des chancres et un ulcère
 à la partie supérieure du bras avec des fongosités et une
 suppuration plus abondante que celle paroitre les ulcères
 bien étendus... il eut les fongosités et les lundemmes elles
 furent renouvelées... il eut des douleurs profondes à
 la partie correspondante à l'ulcère... d'ailleurs dans une
 excursion chez les filles publiques où il avoit été avec ses
 camarades on lui avoit fait sentir les degrés de
 manière qu'il avoit reçu à l'ulcère une contusion qui lui
 avoit fait perdre l'usage... et dans une autre
 rencontre du même genre il avoit reçu à la main
 partie un violent coup de baton. ce libertin fit depuis
 des voyages par mer voyant toujours les putains à tout
 les occasions qui se présentent il avoit fait dans
 longtemps des douleurs de tête. Depuis ces circonstances
 commémoratives Mr Cullerier publia une carie
 pour verrouiller. il se donna l'ulcère et se sentit des
 inégalités qui annoient une carie de l'os... l'opération
 du trapan fut pratiquée... il sortit 5 ou 6 onces de
 pus de bonne qualité. il y avoit une fosse pour les
 dont le fond étoit déprimé et sans doute formée par les
 membres de ce canal. les parties comprimées se mirent au
 peu à peu dans leur dimension et revinrent au
 niveau de os... l'infirmité fut guérie. il sortit
 de 6 à 8 onces de la maladie fut guérie. il sortit
 avec de l'angorisme des bras et des genoux
 pendant son traitement il ne pouvoit s'empêcher
 de le mastiquer et bien de fois quand on lui
 apportoit de la viande on le trouvoit avec
 la maladie était récidivée et sa
 cause elle-même étoit la chute et le coup

necrose ou mort de l'os pour les distinguer de
 La carie ou gangrene humide, ou laquelle est une gangrene
 facheuse.
 on a fait différentes espèces de carie
 quand elle attaque qu'une table d'os plats ou que la superficie
 d'os longs & se distingue en de la 1^{re} espèce
 on dit que c'est de la 2^e quand elle attaque les deux tables
 de os plats ou toute l'épaisseur de os longs, mais non dans
 la 3^e quand elle attaque dans toute l'étendue sur
 en largeur soit en profondeur ou la même chose
 de necrose pour attaqués d'un trait mortel
 L'os.

La carie tant au 1^{er} degré, ou vers qui par une irritation
 trop forte y est jointe la vie
 la production de médicaments trop actifs pour porter trop
 loin peuvent encore la déterminer.
 quelquefois la necrose a été la suite de la
 maladie venérienne... a été les gangrènes locales
 de tiffon spongieux de fibres d'un malade... s'il est
 une incision sur la partie regenerée de la partie
 très bien quand il apprit qu'un homme auquel il avait
 confié 300 francs s'était évadé; il en conçut un
 chagrin si violent qu'il mourut & 8 heures après cette
 sachant nouvelle. Depuis il n'avait voulu voir
 rien de nouveau.

quelquefois les médicaments ou mal qu'
 intempétiement administrés peuvent produire la necrose.
 une jeune fille a été tant traitée par les frictions
 comme le traitement était sus pendu aussitôt que les symptômes
 de sa pléiathion prochaine se manifestèrent, elle cacha
 son état... elle eut une salivation si grande qu'elle
 et l'inflammation furent portées au plus haut point
 que les digestions fut impossible &c... Les acides se
 calmèrent mais les malades qui ne pouvaient remuer la
 machine mourut un jour de inégalité de la
 machine inférieure. de necrose de la partie supérieure
 se separa puis la moitié d'en haut se cula 10 jours

après l'écoulement alvéolaire supérieur se détache. Les
 Les choses vont de la longueur. Mais après son entrée
 il n'y a que quelques lignes de séparation. Elles arrivent
 à l'âge de 20 ans la veule comme une vieille

Les virus syphilitiques ou galeux peuvent produire la
 nécrose. un homme fit une chute assez violente...
 apparemment qu'elle déterminait les gales à se porter
 les des parties que le tibia fut nécrosé dans toute sa
 longueur il y avait une 15^e de trous... il fit une incision
 depuis la genouillère jusqu'au tibia au pied. et parvint
 incision sur les os gagnés et un autre trou vers le
 peu à peu on fit porter un tibia au tibia...
 cet homme est venu depuis pour une maladie
 vénérienne et la cicatrice ~~est~~ ^{est} plus fraîche
 était des plus solides &c.

Douleurs vénériennes.

elles existaient dès le commencement de la maladie, elles
 avaient lieu peu après l'apparition des pustules, et au
 rapport d'agilanus. Quand elles se faisaient sentir
 il y avait à peine de pustules, car quand elles étaient
~~très~~ ^{très} développées, les douleurs n'existaient pas. à présent
 cela ne se remarque pas.

Les douleurs vénériennes attaquent indistinctement
 toutes les parties du corps mais principalement les
 membres.

Il y a des douleurs fixes de plusieurs espèces. Mais
 qu'elles peuvent dépendre de différents virus, d'une
 affection rhumatismale, quelquefois d'une suppression
 de transpiration diminuée ou d'une suppression
 de transpiration (cutanée).

on a distingué les douleurs en vagues
 et en fixes. Les vagues changent de place, les
 fixes sont celles qui restent attachées et liées
 au même point.

il est divers degrés dans le Douleur. L'un s'en porte le
 nom de Douleur de perforation &c.
 quand les Douleurs occupent la région lombaire il est
 rare qu'elle dépendent de la Maladie vénérienne. Lombago

Douleurs scorbuciques... elle arrivent au 2^e degré du
 scorbute... alors prostration de forces & malaise général... Les Douleurs
 est grave & tantôt dans un endroit tantôt dans un autre.
 tantôt elle est générale. La complication scorbucique
 est évidente... quelquefois cependant la Douleur a lieu au
 2^e & 3^e degré... mais encore il est facile de reconnaître le scorbute
 au changement de couleur de la peau au détachement
 des cheveux &c. Les Douleurs se font d'ailleurs sentir et les
 jours et la nuit et pendant le jour et le mauvais temps.

Les Douleurs rhumatismales se font sentir tantôt
 dans une partie dans une autre et principalement dans les
 Murs... elle ne sont pas constantes dans le même endroit,
 c. à d. elles n'y existent pas toujours... ainsi quelque
 le temps d'été finit ou termine, quand on s'expose
 à une cause quelconque qui diminue les transpiration
 elle se revoient ou bien font quand elle existent
 déjà, elle s'exasperent. Très-Vin, au grand air elle
 disparaissent ou diminuent d'intensité quand on
 s'approche du feu ou quand on reste au dit.

Il est une Douleur qui se fixe dans le nerf
 sciatique et on l'appelle sciaticque parce qu'elle se
 trouve dans la direction du nerf qui porte ce nom.
 il y a des Douleurs arthritiques, ou goutteuses, elle
 sur viennent dans les articulations dans les membres les ligaments
 les parties molles &c. &c. &c. Mais ces Douleurs n'existent
 que pendant un certain temps, elles se vont comme
 elles sont venues par gradations.

il y a des Douleurs qui se portent le long
 de la colonne vertébrale... Lombago de Masturbation
 Les excès vénériens... La diminution de la transpira
 tion chez les personnes exposées aux causes qui
 produisent cet effet &c. &c. &c. est peut-être la cause
 de plus les personnes qui sont courbées dans
 leurs occupations... Mais indépendamment
 de ces causes il est des personnes qui éprouvent

chaque jour les douleurs jusqu'à ce que les parties, qui ont
tout le jour, sont échauffées par le travail.
D'autres, en ont comme si c'était une affection
goutteuse.

Les douleurs ont lieu dans des parties profondes dans
les os dans douleurs ostéocopes. Elles sont senties quand
les parties sont échauffées par une chaleur artificielle (comme
le feu, ou par une chaleur naturelle comme quand on est dans
le lit. Elles se dissipent pendant la journée et durent
la nuit quand on se couche.

Longtemps il a cru ^{qu'il y avait} les douleurs ostéocopes mais dans
les maladies de tout genre toute la nuit avoir des douleurs à une
certaine époque du soir. Malgré qu'il ne fussent
pas exposés à une variation de température. ...
Cependant quoiqu'on ne puisse pas découvrir que
ces douleurs sont plus intenses lorsqu'on est bien
chaudement que lorsqu'on est à une température
ord. ou froide.

Un individu qui a servi à cette expérience
avait les douleurs depuis 10 heures du soir jusqu'à
12 heures du matin. Il se couchait à 11 heures
à 5 ou à 6 heures, il se levait tout à fait délassé...
Après jusqu'à 4 h. elles ^{diminuaient} ^{insensiblement} jusqu'à 6 heures de manière qu'elles étaient
supportables... Elles cessèrent plusieurs fois les mêmes
expériences... Cessation à 4 ou 5 h. ord. Des
douleurs n'empêchaient point ^{des} ^{mouvements}
Des membres, elles ne sont ni dans les muscles ni
dans de la tige cellulaire. Mais sont fixes dans les parties
profondes des membres, et n'attaquent pas les
parties molles. Elles se font sentir plus pendant
l'état de chaleur du corps que pendant le froid
30. Elles pendant la nuit qu'elles ont lieu
et sont supprimées pendant le jour; elles ont
des heures fixes et pour leur commencement
et pour leur terminaison...

Mais dans les complications des douleurs il est extrêmement
 difficile de distinguer celles qui dépendent de l'aine et de
 l'autre maladie. alors la difficulté est grande pour
 établir les lignes de démarcation de la douleur dépendante
 de telle ou telle maladie... mais il faut faire usage
 des médicaments qui doivent nécessairement
 détruire l'aine de ces douleurs... ainsi quand les
 douleurs rhumatismales est compliquée de véreux,
 véreux ou vice, admettez ces anti-véreux
 et la douleur qui dépend de la dernière affection
 sera guérie bientôt... cependant on peut
 dans ce cas combiner les médicaments de manière
 que les deux douleurs soient diminuées... ainsi les
 purgatifs drastiques et antispasmodiques qui conviennent
 dans les maladies rhumatismales, et la mercuriale
 est si efficace dans les affect. véreux, peuvent
 être administrés en même temps.

quand on est sûr de la cessation de
 l'affection véreux il ne faut plus donner de
 médicaments qui la combattent parce qu'on
 ne voit on résister pour la douleur rhumatismale
 et pour reconnaître celle-ci on aura recours à
 les
 et de même. On ne fait pas insister sur les
 médicaments quand on voit que les douleurs
 rhumatismales résistent, d'ailleurs on ne peut
 pas guérir cette maladie, on connaît que
 momentanément, tandis que la douleur
 véreux cesse complètement et pour
 toujours on ne peut plus véreux. à la
 2^e friction elle est souvent cessé.

Hors des exceptions pour les douleurs
 rhumatismales, on a dit qu'elles
 se font surtout principalement sentir dans les
 muscles et cela est vrai; mais un grand

jeune médecin a été en proie aux douleurs rhumatis-
 males dans toute les parties... il se forma une tumeur
 indolente dans les glandes de cou, tant quelle dura qu'elle d'affection
 rhumatismale... l'ulcère se détacha & se cicatrisa... les
 douleurs rhumatismales reparurent... ces douleurs...
 extérieures en quelque sorte venant à l'effort de
 prononcer en est affecté... et quand la poitrine se
 trouva dégagée les testicules prennent des volumes
 d'inflammation se manifeste... et alors ^{il y a} plus de temps
 plus de gêne dans la respiration... le malade se porta
 mieux ~~de~~ d'ailleurs se voyant diminuer, mais en-
 même temps les douleurs rhumatismales se portèrent
 à la tête et ne le quittèrent que pour se porter
 dans les muscles intercostaux... Mais les testicules se voyant
 de nouveau et tout cela ne resta aucun des
 symptômes précédents. l'irritation du testicule qui
 déterminoit l'inflammation qui se termina par une
 suppuration terminée... La maladie se trouva son
 siège dans le testicule et apparemment que si
 l'ulcère est terminé se dissipe il y aura une autre
 partie qui se trouvera affectée par le rhumatisme.
 D'ailleurs que le rhumatisme se porte sur les os
 la chose est évidente... il se forma il y a quelques
 années un rhumatisme qui lui a parcouru tout
 le corps... il commença par un engorgement aux
 genoux qui acquit par les 4 fois son volume
 ordinaire ce qui le força de rester trois semaines
 au lit... il se dissipa alors et il resta en ar-
 rière en être attaqué... le rhumatisme se porta
 alors tantôt au membre supérieur tantôt au
 l'inférieur, et il y a trois ans qu'il se porta à
 la région frontale dont les bosses furent
 développées de manière qu'elles ressemblaient
 à des exostoses... il y avait un battement
 considérable et un travail continuel pendant

135

2 semaines... se réchauffe d'uned'is parue avec le cataplasme
 il La éprouvé. Encore d'après moi, c'est peu de chose ap-
 paremment qu'il s'est affaibli par le moyen d'une fièvre
 tierce qu'il a eu l'année dernière... dans les fortes de cas
 ou on pour secours les lésions. Commémoratifs et concol-
 mitans pour éclairer sur la nature de la maladie -
 quand il y a complication vénérienne on donne
 les mercuriaux, et surtout ceux-ci avec les sudorifiques... dans
 une 20^e de jours, les douleurs vénériennes se dissipent &
 des jours vénériennes et font les chapper près les poses de
 du peu... Mais si elle peut scorbutique, il ne faut
 les faire usage de mercuriaux voy. scorbut.
 Il y avait au milieu du 16^e siècle un symptôme
 très fréquent de la maladie vénérienne, c'est la
 pelade... ou altération de tous les systèmes
 internes... quand il n'y avait d'affectés que les cheveux
 on donnait cette maladie.

Les auteurs qui ont vu cette maladie en ont parlé
 comme d'un symptôme commun... on prétend que
 c'est de lui qu'on doit attribuer le usage des
 hercules... c'était sans doute le prin cipe vénérien
 porté sur la bulbe de cheveux qui occasionait cette
 altération qui suspendait la circulation dans
 les poils et les cheveux, ceux-ci perissaient & se
 privés de vie tombaient. Le traitement qui
 convenait était l'anti-vénérien. Le traitement
 local a varié suivant les auteurs. Les uns faisaient
 des applications locales de cretaceous grasses comme
 la graisse de blaireau, d'autres celle de renard
 de l'homme &c mais tout cela ne pouvait
 empêcher la chute... il voit un ou
 deux maîtres pour les attaques de cette
 maladie et j'en ai vu un de trois.

• e encore ces pelades ne font elle, que partielles, il est certain
 cependant qu'elles forment d'ordinaire, des taches sans le t'entièrement.
 Le traitement local est inutile mais pour empêcher
 qu'ils ne tombent tout à fait il faut couper ce qui
 en reste... par le ^{9^e} il faut moins de substance pour les
 nourrir quand ils sont courts et alors quoique la racine
 soit atteinte, on empêche que la circulation soit complètement
 suspendue dans des cheveux, ensuite on les coupe souvent
 parce qu'il y a beaucoup de petits cheveux de poids qui
 sont intercalés entre les cheveux qui ne croissent per
 mais qui prennent de la consistance quand on les coupe
 et qui croissent et se développent alors de manière
 à devenir des cheveux... de la vient qu'on à l'air
 d'augmenter les cheveux sur les coupants, souvent mais
 c'est parce qu'on augmente le volume des petits poils
 et qu'on leur donne assez de consistance pour
 prendre la forme de cheveux.

Leuragement la maladie est très-rare quelquefois il
 passe des années entières sans en voir.
 Il est de même de l'ongle noir de celle qui consiste
 dans l'ulcère de la base des ongles, mais de celle où les
 ongles sont frappés de mort. La circulation n'est pas
 plus. L'ongle est pâle semblant il est d'un blanc
 tirant sur le brun, il n'adhère plus ny part en vivants,
 quelquefois les ongles tombent spontanément, quelquefois
 on est obligé de couper jusqu'à la partie vivante
 originelle et alors il se forme un ongle difforme inégal
 parce qu'on ne par de moule pour ainsi - dire pour
 le contenir et alors le développement n'est pas
 circonscrit dans des limites exactes.

Dans l'ongle arraché il y a quelques jours
 à une femme (vivi) il y avait des bords tranchants
 qui lui ont fait croire que l'arrachement en

137

avait été parfait, il croyait que la maladie allait se
 guérir... un nouvel ougla a reparu mais nous organides
 et sans vie mais séparés des parties vivantes; il y a une pitte
 indigale; car un corps étranger puis que l'ulcère s'aggrave
 par sa présence.

Les ouglades qui sont sans ulcération sont
 sans danger. Le traitement est le même que
 celui des maladies consécutes et que le traitement
 local il en a été parlé.

Mais des fois les ouglades ou il y a ulcère s'appellent
 ouglades d'ouglades. et on appelle ouglades sans ulcère
 d'ouglades quand les ougles sont sans altérés sans qu'il
 y ait solution de continuité de leurs bases. alors les
 ougles perdent leur vie tombent quelquefois de même
 et quelquefois on est obligé de les arracher.

Intiment d'oreilles. on a commencé à en parler

de la fin du 16^e siècle. Les rarement on
 symptôme de la maladie vénérienne; il a lieu
 fréquemment, mais ce n'est qu'un accident de la maladie
 presque toujours quand il y a ulcère au pharynx au voile
 du palais et quelquefois au côté de la trompe d'Eustache
 ou même un bruit de quelquefois semblable au
 tintement d'un clou de quelquefois au bruit d'un
 tambour ce qui est une altération de la trompe

de l'organisation de la trompe
 d'Eustache. L'air ne peut pas passer par ces endroits,
 catarrhes nécessaires on passe par ces endroits
 produit sans doute ces bruits d'oreilles... surtout

qu'il y a eu des maladies qui antérieurement au crissement
 entendu dans un tube de plomb et d'un
 un autre que celui d'une cloche de

il faut traiter les ulcères de la trompe
 sans avoir égard au tintement d'oreilles qui se
 le dissipera à moins que le désordre de la trompe
 portée dans les organes qui produisent ce
 tintement ne soit complète on traitera

une femme a perdu le palais & s'exprime de manière qu'on
voit les cavités nasales; ne sont presque fondées et causées
des bruits extraordinaires qu'elle entend et qui varie suivant
les modifications de l'air... on ne peut empêcher les
bruissement d'oreille mais on les diminue par des
à base de... la déglutition se fait assez bien mais
elle ne saurait distinguer les sons sans le moyen...

Épilepsie Vénérienne.

Les auteurs en citent plusieurs exemples. sur une 26. de
Mille malades il n'en a vu que deux exemples.

Le 1^{er} malade d'épilepsie vénérienne fut présenté
à Bicêtre en 1788. il était âgé de 30 et quelques années
avait eu ci devant plusieurs fois des symptômes de
Maladie vénérienne tels que gonorrhées, chancres &c
qui n'avaient été traités que palliativement par quelques
applications locales, quelques médicaments intérieurs qu'on
lui avait administrés, se sont été toujours discontinués
à la suite de la disparition des symptômes. à la suite
de la chute de la disparition d'un chancre il
éprouva un commencement d'épilepsie. d'abord la
perte de connaissance ne fut point complète. Le
second accès fut plus fort. car il eut perte totale
de connaissance. il eut 7 ou 8 accès, les uns
suivants. ^{8-15 en 15 jours =} il n'eut autre cause que la maladie vénér.
n'ayant pu produire cette affection. ni chagrin
ni nouveau ven. de chancre ou de purpura &c.
deux jours après son entrée il éprouva un accès aff.
fort que les précédents. cependant le traitement
était commencé. il eut vers le 7^o ou 8^o frictions
un mal-aise une fièvre affection malade
générale mais qui était plutôt un serrement
de poitrine un serrement de chagrin et de

139

Monopite qu'une accès épileptique. Le Malade resta
encore à l'hôpital ^{trois} mois environ sans rien
éprouver. il est venu des soins jusqu'à la fin de
89 sans éprouver de récidive. Mais comme après
M^r Cullerier fut malade et qu'il est homme ne
put lui parler de ^{rien} ne lui plus et depuis
La résolution peut être ^{de}

il y a deux ans ^{ou} quinze hommes se présentèrent devant
la consultation de la ^{de} gratuite de l'école de médecine
dont il est membre. il avait tous les huit jours
des accès épileptiques portés au plus haut degré. il avait
des tremblements de la partie gauche de la face du cou
et des membres supérieurs. certains lui avaient eu donné
auparavant la verrière la prisonne des officiers
plus il allait en avant plus les accès en

devenaient intenses. il interrogé le malade, il
convint qu'il avait eu beaucoup de Maladies véné-
reuses bubons &c. il s'était traité lui-même
quelque fois. Les symptômes avaient disparus à
différentes époques. cependant il ny avait que
probabilité qu'il y eut eu Maladie vénérienne
les panes n'avaient pas eu d'épilepsie, il ny
avait que 18 mois qu'il l'avait lui-même.
nulle cause efficiente ny avait donné lieu. on
le décida à entrer à l'hôpital. 2 jours après

accès épileptique de plus forte ^{involontairement}
convulsifs, la langue hors de la bouche verte des
connaissances ^{de} l'âme dura ~~1/2~~ 1/3 d'heure pour
le moins et se fit autant de temps pour qu'il
se dissipa tout à fait. ... sudorifique et
Mucilage pour la vie. - infusion de tilleul.
il devait éprouver une 2^e attaque 8 jours
après la 1^{re}. elle eut lieu mais elle fut
très faible et de courte durée. Le 3^e accès

~~malade~~ qui devait ~~survenir~~ ne fut autre chose que ce
 tuedium. ~~fites~~ qu'on remarque lors de l'incubation des
 virus Syphil. Depuis cette époque il a fait trois mois
 de séjour dans l'hôpital sans rien éprouver. Il
 avait outre cela de maux d'estomac une espèce de
 travaillement qui étoient plus forts quand le Malade
 étoit plus le point d'être attaqué d'un accès..... il ne
 les éprouvait ^{qu'après} la dinner, & ne se couchait
 il ne souffrait pas ces douleurs. C'est croyant que c'étoit
 causé par un dérangement de l'estomac = cela s'est
 dissipé = l'indolence. Ce Individu horloger de profession
 ou ouvrier, est venu depuis de voir plusieurs fois
 parce qu'il avoit été exempt de recevoir assisté que
 les symptômes de Maladie vénérienne se manifestent
 chez lui et pour cause.

GONORRHOEE Maladie contagieuse qui attaque
 le canal de l'urètre. elle a reçu différents noms. Les
 anciens croyoient que c'étoit un écoulement de matière
 féminine. Comme elle est affectée souvent accompagnée
 de douleur on l'appelle chaude pisse. ^{parce qu'il y a} écoulement
 avec chaleur; blenorragie lorsqu'il y a un
 déchirement superficiel des vaisseaux de l'écoulement
 est avec une légère perte de sang; blenorrhée quand
 il n'y a que le simple écoulement Muqueux.
 Le même écoulement urétral naviculaire
 fistulaire vaginal ou fœtal...
 Elle est quelquefois qu'une matière qui est fournie
 par des pores compris entre le prépuce et le gland
 a été prise pour un écoulement de l'urètre.
 quelquefois il vient de la matrice... une
 blancheur avait gagné à son insu la
 Maladie vénérienne que lui avoit apportée
 son mari. Comme elle l'eut négligée

141

il y eut descente de matrice... oncut dit au 1^{er} affect
 qui c'est un herniaphrodite et c'est par suite de
 de semblable accidens qu'on a autrefois attribués...
 chez cette femme le vagin pouvait s'écarter de la matrice
 et était dur comme la pierre & ainsi il vint clairement
 que la matrice de la matrice venait de la matrice
 Le canal de l'utérus des femmes se sert souvent le
 siège... certains auteurs ont prétendu et il y en a encore
 qui le pensent) que les écoulemens quand ils sont veruleux
 chez les femmes ~~se passent~~ ^{se passent} toujours bien dans
 l'utérus et après ont ceux qui ont leur siège dans
 le vagin sont les plus nombreux; ils sont même
 alors plus contagieux pour les hommes, ~~particulièrement~~
 et fait que pour s'apercevoir si l'écoulement y a son siège
 il faut appuyer cette partie la comprimant &c.

Dans l'un et l'autre sexe l'anus peut fournir
 un écoulement provenant d'une sécrétion plus abondante
 de mucosités et qui quand l'inflammation s'est emparée
 de la partie malade ~~peut~~ ^{peut} est jointe à une matière
 purulente... cela arrive quelquefois à la suite de
 introductions insolites = il y a 18 mois qu'une fille a
 subi un ~~accident~~ ^{accident} ~~de~~ ^{de} ~~ce~~ ^{ce} ~~genre~~ ^{genre}
 présente le même; elle est devenue de bonne foi
 de la cause de la maladie.

de l'oreille = il n'a lieu que dans ceux qui ont très enfoncés
 de rien, il y a des espèces si singulières.
 yeux. des primitifs alors chez les enfans nouveaux nés
 parce qu'ils ont les yeux appliqués contre le vagin de leur
 mère infectée. L'écoulement en est semblable à celui
 des parties inférieures. il est consensif chez les
 enfans de partant sur les yeux par rapet. c'est
 après avoir paru d'abord sur les parties qu'on a
 l'ophtalmie & éternelle est toujours consen-

142

Tirée à moins... la matière est ~~est~~ les mêmes qualités que celle qui sort de l'urètre. même nature, même quantité même couleur même consistance... y auroit il transport de la matière de l'écoulement uréthral aux yeux non sans doute mais sans doute qu'une éruption semblable s'y voit d'écouler.

Il peut y avoir des écoulements concentifs par les fosses nasales quoiqu'il n'en ait jamais vu.

Les écoulements primitifs viennent dans l'espace d'un mois ~~après~~ la contagion... ~~on~~ ^{voit} est le 3^e jour après assez fréquemment 5 à 8 jours rarement après 15 plus rarement ~~après~~ ^à un mois il en a vu quelques exemples.

Il y en a de concentifs on en a vu venir à la suite de bubons qui se dissipent, de même qu'on a vu des écoulements produire des bubons quand les uns se suppriment on a vu aussi l'écoulement avoir lieu par le développement d'un bubon ^{écoulement} on a distingué des bubons en malins et en benignes

Les écoulements inflammatoires sont avec douleurs et inflammation... cependant ~~un~~ ^{un} écoulement peut être inflammatoire sans qu'il détermine beaucoup de douleurs comme aussi il peut être douloureux sans beaucoup d'inflammation

Dans le premier cas ce n'est qu'une question de degré de la douleur se fait sentir à l'urètre... mais de l'eau seule en produirait, et que quand l'écoulement a lieu or, quand une partie est inflammée, elle ne prête pas autant de l'action que dans l'état ordinaire... et il y a une sorte de combat entre le corps caverneux et le canal de l'urètre qui ne peut obéir à son action. quand la douleur prédomine sur l'inflammation, alors cette douleur se fait sentir dans tous les lieux.

Les gonorrhées a été envoie d'écouler en habituelle et en intermittente

La 1^{re} est celle qui s'arrête quelque semaines quelques mois puis reparait ^{en suite} est toujours par un vice du canal par

143

un retrecissement ou par un point d'irritation
qui n'est pas contagieux mais dépend d'un autre (cause)
elle est simple ou compliquée... ainsi chancres pustuleux
et en même temps.

Si on la considère comme gagnée par le coït on
ne voit qu'incertitudes sur l'époque de son apparition.
Catane parle d'une maladie qui avait son siège dans
le commencement des oses de l'urètre... elle comme
elle pourrait bien n'être que le produit d'un chancre
ou a lieu de presumer qu'il n'y a eu intention de
parler que de ce symptôme d'autant plus qu'il n'en a
plus été question jus qu'à un bressaire qui a
décrit la gonorrhée avec beaucoup de développement
et qui l'a bien classée. Il dit que c'est un écoulement
gagné par le coït et il le décrit comme symptôme
de la maladie vénérienne.

mais comme maladie contagieuse résisterait
elle que depuis cette époque?

Dans le levitique on trouve qu'il y avait à
cette époque une maladie contagieuse gagnée par le coït
quand on en était atteint on était obligé de se séquestrer
de la société de faire de ~~plusieurs~~ abluions
il paraît que la maladie n'était d'abord que 8 jours.

on voit que la maladie qu'on a vu être
l'objet de l'attention des curateurs et. hardier et c'est
parce d'une maladie dans laquelle la chaleur et la
douleur de la verge se faisaient remarquer durant le
passage de l'urine c'était le point de contact
entre les deux sexes... de l'écoulement et il était avec
douleur de brûlure. on trouve dans quelque vieille
pharmacie de 1440 des médicaments contre les
écoulements du canal de l'urètre... de, reglément
faits à Londres et à Avignon la même année
de fonder de recevoir dans des hospices des hommes

ous de femmes, qui portaient des écoulements de sang.

Différentes causes peuvent produire les écoulements tantôt
Les écoulements de cause externe sont affectés multipliés.

Dans les deux sexes, une excitation, une éjaculation
trop répétée, l'excitation chez les personnes qui n'y sont
pas habituées, par la compression ou le battement du ca-
naux de l'urètre ainsi par un plus abondant de mucus
qui quelquefois est attiré et se rapproche de la source
du pus. L'introduction d'un corps étranger dans le
canaux, comme la sonde qui alors produit d'abord un
écoulement muqueux qui ensuite devient un blanc terne
qui tourne ensuite sur le jaune verd et qui a toutes
les apparences de celui qui est ordinairement produit de la source.
Le cathétérisme... un malade avait beaucoup de médicaments
pour lequel il avait fait usage de beaucoup de médicaments
il s'était livré avec rage à la masturbation il en
était venu au point que ne pouvant par les sollicitations
ordinaires appeler l'orgasme dans les parties, il introduisait
dans le canal un corps arrondi comme une sonde et

un autre se faisait d'un morceau de plomb qu'il
attachait avec un fil et auquel il avait donné une forme
arrondie qui présentait de petits quarrés... afin d'exciter et de faire
imiter par les ans canaux les ondulations, les mouvements
peristaltiques, d'urines... Le fil se fait casser ou bien de fois
et le plomb se fait introduire dans la vessie... on
vaseit de peur de foudre le plomb dans la vessie... mais
les moyens employés n'ayant pu y parvenir etc.
D'où lui fit l'opération de la taille.

Certains boissons peuvent produire l'écoulement
il en est de personnes par exemple qui ne peuvent boire
de la bière forte sans avoir un écoulement... mais
il n'est que momentané à moins qu'elle n'en fasse

usage habituel... pour l'arrêter ou pour le
propre il suffit de boire après un verre d'eau de vie

La rétention volontaire d'urine... un
vessie et de l'urètre... écoulement pendant 3 semaines
sont les colibacilles... Des écoulements purulents
quand la pierre s'est présentée au Col de la vessie.
il arrive souvent aux enfants à l'époque de la dentition,
aux filles au moment de la menstruation jusqu'à ce
qu'elle soit établie et persiste quelquefois après
Certains virus le produisent comme le dartreux
Le rhumatisme


Mais il y a des écoulements contagieux seulement
relativement à tel individu ou peut-être ce sont
des écoulements relatifs c'est à dire qu'une femme
qui n'a point le virus peut donner au virus indiciel
un écoulement contagieux plus que d'autres qui coïtent
avec cette même femme ne produisent aucunement cet
inconvénient et voici divers exemples.

un jeune homme ayant habituellement en jouissance
de sa maîtresse. elle est âgée de 19 ans bien portante et très fraîche
d'ailleurs. ce qui ne le dispense pas d'une blennorrhée douloureuse
inflammatoire. il ne pensait attribuer son mal à aucune
autre femme puisqu'il n'en avait point vu depuis deux mois
après l'ami de ce dernier n'avait rien pris après de sa
maîtresse ni avant ni après qu'elle eut couché avec les
gonorrhées. on ne pouvait pas dire que l'amant en titre
n'était pas apte à gagner des gonorrhées puisqu'il
avait déjà subi un traitement pour un pareil
symptôme par le père de M. Cullerier lui-même
La petite maîtresse ayant été comparée devant
le professeur on lui trouva par elle aucune trace
de maladie vénérienne elle n'avait qu'un écoulement
blanc ordinaire chez cette femme. cependant la
jeune femme ne craint de ces recherches. voulut
les pousser plus loin et pour cela il vint point de
répugnance de après avoir coïté sans aucun de
le faire coïter lui-même en procurant les jouissances
de la maîtresse commune à un autre jeune

hommes qui en étoit aussi ^{aprouvé} amoureux sans lui faire part
 cependant du petit accident qui résultait ^{de} l'usage des faveurs,
 de la belle. Le 3^e combattant fut assés très affligé pendant
 trois mois auprès de la femme benivoile qui se prêtait à ses plaisirs
 sans qu'il en résultât aucun inconvénient pour sa santé. Tandis
 que le plaignant ^{sans} trois ou 4 semaines ^{de} convalescence
 qu'il avoit ^{gagné} ~~par~~ ^{gagné} ~~sa~~ ^{sa} ~~conduite~~ ^{conduite} avoit gagné
 une gonorrhée inflammatoire qui malgré tous les
 moyens les plus rationels ne cessa qu'au bout de
 30 jours.

une jeune demoiselle arrivant de province à Paris y
 sollicita une place. on lui en donna une sous un
 condition. L'homme qui avoit été fait avec bonne confiance
 fut le dupe de la bigarrerie des maladies vénériennes, et
 il eut un écoulement gon. ~~de~~ ^{il} examina attentivement
 la cause officielle de l'accident il ne trouva qu'un
 écoulement blanc ~~très~~ ^{très} considérable envoie que celui qui
 est si commun chez les femmes de Paris. Cette fille d'après
 l'avis de M^r Cullerier eut une communication intime
 et assez prolongée avec un jeune homme qui se
 retira toujours serein et sans.

un jeune homme Marie devint pendant le
 séjour de la femme à la campagne, amoureux d'une
 autre femme Marie depuis un an. il résulte de ce
 double-coscubinage un écoulement inflammatoire
 Le 1^{er} infracteur du traité. Le mari de cette jeune
 femme qui l'exploitait avec assez de ~~de~~ ^{de} ~~de~~ ^{de}
 ce quelle étoit bien jolée et parce qu'il n'y avoit pas
 longtemps qu'ils étoient enchainés l'un à l'autre étoit
 bien portaut. Le frère de celui-ci éprouvait également
 l'innocence des faveurs de son aimable belle sœur.....
~~Le 2^e~~ il eut commission de visiter cette dame. on
 vit un écoulement bien moins considérable que celui
 qui se voit si commun à Paris. Le ~~jeune~~ ^{jeune} homme en
 question trois jours après qu'il fut été guéri de la pre-
 mière gonorrhée ne craignit point d'aller vite
 gagner une autre. il eut au effet nouvelles perquisitions
 aussi vaines que les ~~premières~~ ^{premières} pour tâcher de découvrir la
 source d'un mal si indigne d'un écoulement contagieux. M^r
 Cullerier lui ayant représenté que ne pouvant avec



89

Bubons vénériens Le nom de bubon a été pris de leur sit de la partie ou est ordinairement le siège de cette tumeur. **Bubon** iniquus ainsi quoique le bubon soit ordinairement situé dans cette partie il se trouve quelquefois ailleurs. on a aussi donné à cette tumeur le nom très-gros de poulain expression mise en vogue par Étienne lecoq chirurgien de paris parce qu'il y a été observé que la démarche de ceux qui s'en étoient affectés étoit gênée; il a cru y trouver de la ressemblance avec celle d'un poulain qui n'a pas encore l'allure de ses père et mère.

Le bubon a été très-probablement un symptôme de la maladie vénérienne seulement quelque temps après son apparition. quelle a paru en quelle elle a fixé l'attention des auteurs. au siège de Navarre en 1495 un auteur dit bien en avoir vu d'autres apparemment qu'ils étoient produits par une autre cause. acoris connus en 1497 ne les considéraient pas comme vénériens car il s'agit que c'étoit la crise des maladies pestilentielles affectées communes à cette époque. Les auteurs qui en ont ensuite fait mention tels que Jean de Vigo qui a parlé de plusieurs symptômes dont on s'est étoit occupé n'en disent rien. Fracastor lui-même quoiqu'il en parle ne s'en explique pas de manière à ce qu'on puisse les regarder comme un symptôme de la maladie vénérienne cependant ce n'est pas une preuve qu'ils n'existent pas alors car Fracastor ne voyait pas beaucoup de vénériens. après 1536 Nicolas Massa le décrit très-bien et il ne le présente pas comme nouveau de manière qu'il y a toujours du doute et de l'incertitude sur l'époque ou ce symptôme a commencé. Nicolas Massa explique même la formation du bubon qui vient selon lui de la région du foie ou soit en faisant l'ouverture pour en détacher la suppuration parce que dit-il la foie laime est le réservoir du foie. quelques auteurs tiennent encore à ce préjugé et des maladies de ce genre qu'on suppose l'ouverture de leurs bubons.

Les bubons vénériens occupent ordinairement laime. La tumeur a lieu dans le tissu cellulaire le plus souvent il commence par les glandes lymphatiques qui se gonflent et le tissu cellulaire n'est affecté que consécutivement dans ces cas le tout forme une masse arrondie qui par le développement de l'inflammation ne fait plus qu'un même corps et qui par une consistance générale est uniforme.

90

Le siège des bubons est dans laime tantôt au dessus tantôt dessous presque toujours dans le tissu cellulaire ou les glandes. cependant il en a vu situés qui étaient situés non seulement hors de l'endroit ou sont les glandes lymphatiques inguinales mais quelquefois même à la hauteur de l'ombilic d'autres à la partie inférieure à la même distance et souvent ils avaient lieu en même temps qu'il y en avait aux aines. Des auteurs prétendent en avoir vu aux grandes lèvres, mais apparemment que ce n'était qu'une inflammation des grandes lèvres mais si on reporte les bubons dans la classe générale des bubons phlegmones, lors il y en a eu dans toute la partie du corps

après la région de laime celle où ces tumeurs se développent le plus fréquemment est la région cervicale. Ces tumeurs sont souvent la suite des tumeurs inguinales, qui se sont terminées par dilatation. tantôt c'est à la partie inférieure tantôt à la moyenne mais le plus ordinairement à la supérieure qu'elles se montrent. quelquefois elles forment un chapelet une espèce de cascade qui va d'une oreille à l'autre quelquefois il y a une simple tumeur quelquefois aussi il y en a 3 ou 6 suite à la suite des unes des autres ~~mais~~ ces engorgements sont rarement des tumeurs purement vénériennes, mais sont compliqués du vice syphilitique le mal est d'abord vénérien il dégénère ensuite en syphilitique ou en développe le principe antérieurement caché ou non encore développé dans le malade. cette complication retarde singulièrement la ~~guérison~~ de la guérison de la maladie. quelquefois une année négligé de traitement n'est pas suffisante,

Les glandes axillaires en sont fréquemment le siège les bubons sont quelquefois primitifs comme au col ici ils surviennent à la suite d'un bubon de laime terminés par dilatation ordinairement ils marchent avec plus de rapidité ont une terminaison plus franche que ceux du col et il est rare qu'ils présentent plus de difficulté que ceux de laime il en a vu d'est grand à terminer par

91
induration mais est très-rare au lieu que c'est la terminaison la plus commune de celles du col
c'est à dire il y a sur toute le corps des tumeurs phlegmonieuses qui ne diffèrent des bubons que en ce qu'elles viennent pas lieu dans des glandes et peut être vuy à tel point même de parties où il ne s'en font point.

La cause des bubons est manifeste... mais les tumeurs peuvent avoir lieu à l'aîne par différentes causes d'abord il arrive assez fréquemment depuis 12 jusqu'à 16 ans des engorgemens lymphatiques dans l'aîne qu'on a appelle tumeurs de croissance. Serait ce parce que l'aîne s'approche et qu'à cause de cela il y a empêche ment de circulation.

un jeune homme avoit montré à son père un semblable engorgement qui le gênait dans la marche. Le père se décida de suite qu'il étoit vénérien ne douta pas que son fils n'eût la vérole parce qu'il avoit assez d'expérience pour savoir quels étoient les symptômes. il fit appeler le professeur la tumeur ressembloit beaucoup à un bubon vénérien il étoit arrondi et assez développé, mais il n'avoit pas le caractère d'une tumeur inflammatoire la peau n'étoit que soulevée sans être rouge elle n'avoit point de chaleur et il n'y avoit qu'une douleur de tension résultant du soulèvement de la peau. Le jeune homme déclara depuis ne s'être exposé à aucun danger il s'engagea à rester tranquille et annonça que la maladie se dissiperait sous cependant en être bien sûr parce qu'il y a des bubons indolens & au bout de quelque temps de repos dans une position horizontale les tumeurs disparurent.

une autre cause peut en imposer encore c'est le défaut de descente du testicule dans les bourses quelquefois il reste dans le tissu cellulaire et forme une tumeur sensible pres que douloureuse au toucher semblable à celle occasionnée par le virus vénérien. mais nous la distinguons de celle dernière il suffit de palper les bourses et si il manque un testicule, puis la nature de la douleur la sensibilité vive de la partie lorsqu'on les presse & tout bien différents de ces cas, aussi est il bien plus facile de connaître la nature de la tumeur que dans le cas où il n'y a point de testicule.

92

quelquefois il survient des engorgemens assez volumineux
produits par absorption si les engélures aux pieds ne sont
pas soignées si la suppuration en est absorbée, elle peut
agir sur les glandes lymphatiques, et y produire des
engorgemens ce qui lui est arrivé en 1783. et cela doit
s'entendre aussi de tout ulcère des pieds, des jambes, et des
cuisses et de toutes les parties situées au dessous de la laine.

quelquefois il se forme des tumeurs par congestion qui
ont le même caractère que les bubons quelquefois douloureux,
quelquefois indolents et qui font plus ou moins de saillie
suivant la position ou se tient le malade et en arrivant
plusieurs exemples dans l'hôpital mais en touchant les
tumeurs et en interrogeant le malade on ne peut
avoir plus de doute... La tumeur se perdit subitement
à la laine et fut accompagnée de fluctuation ^{de} douloureux
La gêne dans l'organe a précédé la tumeur
La tumeur est plus considérable quand l'homme est
debout que quand il est couché. &c.

quelquefois il vient des tumeurs à la laine qui sont critiques
ainsi dans la peste ces bubons ne se distinguent des
vénéériens que par les symptômes concomitans... de même
dans les maladies adynamiques quoique ce soient ordi-
nairement les parotides qui sont affectées.

quelquefois il se développe une tumeur lipopne
graisseuse dans le tissu cellulaire de la laine de laquelle du sérum
est ex. un homme avait à la laine une tumeur qui
avait toute l'apparence d'un bubon vénérien de plus
il avait des excoriations sur le gland qui paraissent et
disparaissent alternativement. plusieurs regardent
cet homme comme atteint de la maladie vénéérienne
mais celui-ci lui ayant observé qu'il y avait de l'air
qu'il portait cette tumeur lui fit changer d'avis
surtout l'opinion. C'était la tumeur d'un
révitable l'organe elle était dure mais cedait à
la compression comme un paquet de graisse

93 cependant au 1^{er} aspect elle avait l'apparence vénérienne, quelque
quelques fois ces hernies curables quand elles ne sont pas trop
bien développées peuvent être prises pour un bubon vénérien
qui est un peu douloureux
Lab.

à l'hôtel dieu de Nantes, une fille avait une tumeur à la main
un ectoplasme ~~forte~~ on administra la liqueur de Waus-Kriem. Le
chirurgien dit qu'il y avait fluctuation, le bistouri y est enfoncé.
Sortie d'air et de matières fécales quelques jours après mort.

Il en vut au même hôpital deux tumeurs anévrismales
surcitées par le bistouri parce qu'on les regardait comme des
près pour des ~~filles~~ tumeurs inflammatoires. Les deux malades
moururent subitement.

quand on prend un bubon pour une hernie pousse
mais une tumeur ~~ou une~~ hernie pour une tumeur
cependant on peut ~~traiter~~ une tumeur phlegmonique et
essayer d'y appliquer un bandage comme cela est arrivé
souvent. plusieurs fois il se est arrivé à l'hôpital des
hommes atteints de la maladie vénérienne enveloppés de
de grands bandages.

un homme avait une chancère et un bubon à la main
bandagiste lui dit que c'était une hernie il lui appliqua
deffut un bandage. comme il souffrait horriblement et qu'il
ne pouvait plus supporter l'appareil il revint chez le bandagiste
celui-ci lui dit que la matière de l'ulcération était absorbée
et avait produit la hernie, et que même l'application
morbifique pourrait le porter sur l'autre côté et y
determiner une seconde hernie pour les prévenir il
lui appliqua un double bandage. cet homme arriva
un beau matin à l'hôpital des capucins avec cet équipage
il ne lui avait coûté que 3 Louis y compris le 1^{er} bandage.

il y a des différences entre le bubon et la hernie qui peuvent
les faire distinguer l'un de l'autre. Le lieu de leur situation
est le même mais dans la seconde la tumeur se prolonge
dans l'aîne et y a sa base. La tumeur se forme
graduellement il y a douleur d'étranglement quand l'anneau

Le stranglement a lieu. Sans testicules dans la hernie, douleurs
 et y a colique souffrance ou envie de vomir. Les douleurs
 n'est qu'un local dans le bubon est une douleur d'inflammation
 ou fait dans la hernie, ou fait qu'il y ait de l'inflammation
 de la muqueuse d'abord et ensuite de la tension et c'est toute la
 contraire dans le bubon qui a d'ailleurs les bords sur une partie
 solid & c.

Lorsque la maladie vénérienne est sur le point de paraître
 on sent ordinairement une fatigue au malade tout particulièrement
 qui précède de 24 heures plus ou moins la manifestation de
 la maladie. c'est le commencement du toxième vital ou ne
 peut pas dire que c'est état d'inquiétude, de crainte de la crainte
 de la maladie puisque ceux même qui n'ont pas lieu de
 soulever les femmes qui leur ont inoculé le virus éprouvent
 ce symptôme que beaucoup de malades lui ont présenté. ...
 cette remarque a lieu surtout pour le bubon. ensuite petit
 développement qui va tantôt rapidement tantôt d'autant plus
 suivant que le bubon doit être inflammatoire ou indolent
 quelquefois après avoir fait des progrès assez rapides il reste
 stationnaire quelques jours pour reprendre ensuite son développ-
 pement avec beaucoup d'énergie ainsi 6-8 jours
 c'est son commencement et son développement les périodes, c. a. d.
 après 15 jours on peut caractériser le bubon inflammatoire
 ou indolent mais cet état peut changer de lieu en tant que
 4 sem. 4 unis & c.

il y a des bubons avec dureté des parties = bubons endurcis
 d'autres sont avec ulcères - - - - - ulcères
 d'autres - - avec fistule - - - - - fistuleux
 d'autres sont douloureux & bords renversés
 supuration de mauvaise nature & - - - - - Cancéreux.
 d'autres sont avec gangrène - - - - - gangrène
 ou les dissipe encore en - - - - - primitifs
 et en - - - - - compliqués

Les bubons primitifs paraissent ordinairement du 3^o
 au 20^o jour après l'inoculation de la maladie, un
 individu ne se en quelques 3 mois après l'ovide

93
 gagné. un espagnol avoit gagné le gros lot à la loterie de Bordeaux
 arrivé à Paris il fut bien surpris de se voir un bubon 6 mois après
 avoir vu une bordelaise. depuis il ne s'estait approuvé d'aucune
 femme. accouplé avec aucune femme.

Le traitement est toujours le même pour les bubons
 primitifs, qu'ils paraissent plutôt ou plus tard après la copulation,

terminaison. Le bubon est une tumeur inflammatoire
 et se termine par suppuration, par induration, par dilatation,
 par métastase par fluxion, par cancer, par gangrène, par

1° par résolution c'est la terminaison de la tumeur ^{dans laquelle}
 disparaissant peu à peu sous l'effet de suppuration, il faut que
 les vaisseaux reagissent sur les fluides qui distendent leurs parois
 de manière que la circulation soit rétablie car la tumeur sans
 inflammation est formée par l'agrandissement des vaisseaux et
 de l'écoulement des liquides.

2° par suppuration: il y a d'abord inflammation ensuite collection
 de pus fait par la destruction des tisses cellulaires soit par l'efflux
 plus considérable de liquides ordinairement de sang principal,
 en est dans le tissu cellulaire. La suppuration peut au
 disparaître soit par dévortement de ce foyer soit par
 absorption dans le premier cas il se forme un ulcère.

3° mais quelquefois la suppuration bien manifeste formée le
 foyer bien étendu la fluctuation manifeste il y a
 absorption du pus il en résulte dilatation c'est à dire
 disposition de pus. L'absorption du pus est la dilatation
 quand il rentre dans le torrent de la circulation mais
 quand il y a eu absorption et de plus de dépôt de la matière

4° par un autre point c'est métastase il y a des auteurs
 qui pensent que c'est une suppuration nouvelle.

La métastase est rare... il y a quelques années qu'une
 fille eut une tumeur axillaire avec une fluctuation suffi-
 sante que celle qui se trouvait précédemment dans
 l'aîne et cela dans l'espace de 36 heures.

Si le point d'irritation ou d'humeur est
 portée dans un organe intérieur alors la métastase
 est extrêmement dangereuse tandis qu'elle est très guérie

99

quand elle est extérieure
 5^o Le bubon ne se terminant ni par résolution ni par suppuration, & alors les fluides ne circulant pas les vaisseaux tombent dans une espèce d'indolence ainsi que les liquides qui s'y contiennent et de cette manière arrive l'induration. si le ressort des vaisseaux n'est pas encore leffé si c'est que d'innomé il y a encore remède mais si cet état est porté plus loin alors le bubon passe à celui des squirres et quand la squirre a persisté un certain temps qu'il s'y développe de la chaleur & alors il passe à l'état cancéreux
 1^o quand il n'y a qu'induration ... squirre ... squirre ... plus faible. 3^o Cancer ... tout espoir perdu il ne reste qu'à enlever la partie.

6^o pour gangrène ordinairement c'est la suite d'une inflammation trop forte pour que la circulation puisse se faire et alors la partie est frappée de mort et tout ce qui en est frappé se détache. cette terminaison n'est pas ordinairement dangereuse.
 quelquefois le bubon devient gangreneux ^{à une} époque où il est déjà ulcéré & lors cela est étranger à la nature de la tumeur et de l'inflammation c'est une complication des ulcères vénériens et non une terminaison de l'inflammation des bubons. c'est une maladie grave dont le pronostic varie suivant les cas. y. p. 117.

traitement des bubons primitifs ... est il récent il s'agit de savoir si est inflammatoire ou indolent dans le 1^{er} cas ou l'inflammation est modérée ou elle est très forte. si elle est modérée on peut traiter de suite le bubon. dans le cas contraire il faut s'occuper des accidents plutôt que de la maladie principale. ainsi supposons un bubon inflammatoire ordinaire dans lequel les accidents ne dominent pas sur la maladie principale alors on peut administrer le traitement anti-vénérien général. les sudorifiques sont inutile. 117

97 pillules mercurielles, la crémate de manneuse doit ne point pas
 aller plus ainsi il faut employer de crémate pur exigent
 ou bien les frictions locales.

Le traitement des accidents de l'inflammation (consiste)
 dans les bains adoucisants & bouillons de veau végétal
 bouillons d'herbes tièdes, de graines de lin de quinaures &c.

Pour traitement local topique, relâchant adoucisants cataplasmes
 mes avec parties égales de farine de ves et de lin qui contiennent de
 l'eau en état de chaleur et un principe adoucisant.
 Mais quelquefois les cataplasmes peuvent trop sur les parties et les
 fatiguent quelquefois la peau est tendue il en résulte de points
 blancs dont le siège est entre la peau et l'épiderme. cela
 tient ou au vice qu'accidentel tenant ou à la délicatesse
 de la peau ou à la nature de la graine de lin qui peut
 être avariée.

Le traitement ainsi administré suffit quelquefois
 lorsque la maladie est récente dans le cas opposé il la modère
 mais si malgré les parties adoucisantes de plus en plus inflame
 viciata il devient il est quelquefois nécessaire de faire une
 incision et même quelquefois de faire une saignée locale
 il est bien rare qu'on ne calme pas les accidents par ces
 moyens et qu'on ne obtienne vers la guérison soit par
 résolution soit par suppuration.

Le bubon parvenu à cet état où la peau est
 amincie que le pus est sur le point de sortir ou la
 nature fait effort pour se faire dehors en quelque sorte qui
 donne le bain où le bœuf pourvu de son lait même.
 soit à deux ou trois fois l'incision et la cautérisation
 quand le bubon est inflammatoire que les symptômes se
 font succéder avec rapidité que le pus est rassemblé en foyer
 quand la peau n'est amincie qu'au centre que la
 circulation se fait bien dans la tumeur que les symptômes
 marchent avec régularité et uniformité il faut
 abandonner l'ouverture à la nature. cette manière
 de donner issue au pus est celle qui est la plus à
 désirer par là on évite la douleur; l'ouverture étant
 petite la cicatrice n'est pas apparente il faut
 donc la favoriser cette terminaison mais dans

98

Beaucoup de cas d'inflammation marche lentement ou
 le peau s'ouvre dans tous les joints... quand le peau
 est d'un rouge foncé tirant un peu sur le brun qu'il y a
 du bouillonnement dans les parties environnantes. alors
 l'ouverture faite le peau ne se recollera pas et l'ulcère
 ne guérira pas abandonné à lui même, dans pareil
 cas il faut avant l'ouverture appliquer un
 caustique et le potasse caustique est préférable à tous
 les autres parce qu'elle agit efficacement et
 promptement pour détruire le foyer... ainsi l'est
 son, le cas où le foyer est étendu, ou le bubon après
 avoir marché avec promptitude. ~~le caustique est~~
 dessein en fait inutile que la potasse caustique
 elle détruit toutes les parties de la peau sur lesquelles elle
 est appliquée et il est bon de l'appliquer sur les parties
 de la peau les plus amincies, il y a la même inflammation
 accidentelle produite qui donne de la tumeur au
 tisse cellulaire engorge aux glandes et à la peau qui est
 dans le voisinage et qui n'a pas encore été altérée

Lorsque la maladie a marché rapidement vers
 la collection de pus quand le foyer n'est pas très-étendu
 quand la circulation s'y fait, que la couleur de la
 peau est d'un rouge vif, alors on peut dire la
 tumeur avec l'inflammation trauchant. la cicatrice qui
 se résulte sera moins apparente moins étendue qu'elle
 produite par le caustique... il vaudra mieux faire
 d'ailleurs que d'abandonner l'ouverture à la nature
 autrement il viendrait une époque où il faudrait
 nécessaire de faire usage de la potasse caustique
 il arrive rarement qu'on puisse employer l'incision
 à l'hôpital parce que les malades n'y sont pas
 après raisonnable, pour rester tranquille, &c.

Règle générale, toutes les fois que la peau est
 érysipélateuse il faut la détruire et stimuler
 les parties environnantes... supposez que la peau
 se sera ouverte d'elle-même ou qu'elle aura été
 ouverte trop tard se ou traite l'ulcère d'une manière
 telle que

92 ordinaire alors la peau ne peut pas se recolle sans ce laticif cellulaire pourvu qu'après il faut de courts quelquefois il faut des années, avant que la cicatrisation se fasse, alors il faut se servir de caustiques ou de d'instrument tranchant.

quand l'ouverture est petite ordinairement on se sert de caustiques... si on a pas beaucoup de peau à détruire si l'ouverture est petite on se sert de trochisques fait avec le minimum ou oxide de plomb rouge en commençant par les plus minces des peaux et par les ou formule un peu seulement les peaux moins minces les parties jointives. les trochisques appliqués une seule fois suffisent dans certaines circonstances... d'autres fois plusieurs fois cela dépend de l'état de l'organe.

il est de cas où les bubons ne peuvent se cicatriser lorsque les téguments sont amolés de l'organe très l'argement que l'ouverture est grande au lieu de caustiques on se plutôt fait des soies croisées à l'ouverture... pour détruire les communications les bandes établies par les ulcères, il est rare qu'on employe les caustiques, les trochisques suffisent ordinairement ou bien on se fait de soies qui conviennent toujours quand de peaux est déformée dans une grande étendue.

et de cas dans lesquels les bubons ne peuvent se cicatriser parce que plus profondément sous les glands lymphatiques et quelquefois sous les muscles, il y a des collections de pus qui forment des abscesses de laqueurs... ainsi quand en pressant les parties on ne fait sortir de pus quand on y sent des parties plus résistantes qu'd'autres et alors on est sûr qu'il y a des clapiers et il faut faire des paraites de complication ou clapier il faut employer les caustiques et les mettre leur leur doit on il existe. une fois ouvert l'ulcère guérira avec promptitude. si le clapier est ouvert à la partie supérieure alors il n'y faudrait pas venir de suite à la destruction des parties parce qu'alors on peut en peut en obtenir la réunion à cause que l'ouverture est à la partie la plus déclive quand on ne peut même parvenir à la réunion on fait des injections avec le sulfate de cuivre et d'autres stimulans qui agissent comme dans l'opération de l'hydrocèle. au contraire de clapier est situé à la partie inférieure il est si rare que la réunion se fasse sans détruire que par mille exemples on ne peut guère citer qu'un seul.

si le trajet fistuleux est compliqué d'une carie ou
 L'ischion. La maladie devient de plus en plus grave il faut
 détruire toutes les parties avoisinantes pour le faire dans tous
 les cas saignement et d'effusion. Mais si les fistules sont compliquées
 d'une carie aux os du pubis ou de la branche montante
 de l'ischion la chose ne pourrait se faire sans détruire les
 vaisseaux & dans ce cas il faut abandonner la
 maladie à la nature.

Il est de malades qui ont des fistules dont les foyers
 en dans le tissu cellulaire mais qui sont tout usés, indolents
 dans leur trajet; il faut mettre les foyers à découvert par
 les incisions qui peuvent être nécessaires.

entre ces complications du bubon ulcéré il peut
 se compliquer d'affection scorbutique &c.

Les bubons ouverts se compliquent d'engorgement des
 glandes ou ces glandes sont encore organisées et
 alors le nitrate d'argent suffira pour les se réprimer ou
 en fait la cautérisation avec le potasse fondue quand
 il n'y a point de signes de cicatrisation prochaine c'est à dire
 de petites granulations &c.

quand les glandes sont saillantes isolées situées
 superficiellement dont il convient de faire l'excision
 pour que la guérison soit plus prompte. on fait de
 glandes avec une encre à double branche ou la dissection
 en dedans et au dehors on porte le bistouri au dessous
 ou bien les glandes sont organisées mortes c. à d.

quelles ne tombent pas encore en suppuration mais conservent
 leur forme de glande sans qu'il y ait de circulation alors
 il faut faire de fortes compressions et alors on bien on creuse
 des glandes au bien ou les fait fortir. pour
 parvenir à guérir prompt il faut que les glandes
 soient parvenues à leur état de maturité superficielle
 (ou supposé un calibre large et leur ouverture petite).

301
 Il y a deux trois manières d'élever le pus des bubons
 1.° Sabandoumer l'ouverture de la tumeur à la nature c'est quand
 elle a marché rapidement que la partie centrale de la peau
 seulement est altérée
 2.° y appliquez la patette froide quand la tumeur a marché
 avec lenteur que le pus est légèrement semé d'amincie
 3.° employez l'instrument tranchant quand l'inflammation a été
 rapide et que le bubon ne sours pas &c. ... pour les clapiers
 tantôt peut caust. tantôt trochis que de plombs rouges

Complications d'affect. dartreuses
 quand il y a une éruption dartreuse sur les parties
 environnantes, les ulcères, des bubons ouverts apprennent des
 lacerations ou restent stationnaires quelquefois d'affect. ion
 dartreuse se porte sur le bubon lui même dans ce cas il
 faut admettre des parties employées à l'entour des delayes
 et de leur en leur des excrements pour diminuer la recolle
 des humeurs vicieuses, ou plutôt pour enlever le point
 d'irritation. ainsi employez purgatifs &c
 il faut laisser se diffuser l'éruption d'artreuses avant que
 de combattre les symptômes vénériens.

Complications combustives.
 elle est assez fréquente surtout à l'hyper, dans les saisons
 pluvieuses, chez les personnes qui habitent des lieux humides
 ou qui usent d'une mauvaise Nourriture, &c. il faut
 dans cette complication ajourner le traitement anti-vénérien
 car les malades étant fort faibles, nous leur avons
 de scorbut mais encore pour le corps qui y ont donné
 lieu l'affaiblissent davantage et nous des les guerir.
 les anti-vénériens nuisent des années à la
 vie mort. &c

Si l'ulcère du bubon est compliqué d'affect. ion
 cancéreuse il faut encore bien plus de temps pour
 l'augmenter de disposition. si un bubon subit et est
 bien d'ailleurs avec des médicaments irritants axiaux
 on pourroit se faire de guérir en ulcère cancéreux

(c.a.d. présenter des bords irréguliers, et une surface jaunâtre avec douleur et augmentation de l'ulcère). La morte -
 par un cancer, mais un ulcère qui prend tous les caractères
 cancéreux.

Dans ce cas il faut s'opposer tout traitement général
 faire usage de, adoucissants, de, émoulinants, calmants et même
 des narcotiques. par l'usage de ces moyens on diminue les
 bords, s'affaiblit le suppuration ^{de} de bonne qualité la
 couleur de l'ulcère reprend une couleur roseâtre... mais pour-
 ce il faut combattre les complications affe^{ct}ées. quand
 l'ulcère est redevenu simple on le traite convenablement.

Complications par gangrène

elles résultent d'une méconnaissance de disposition intérieure de
 l'individu ou de l'influence de l'air environnant ou de
 l'état inflammatoire de la partie

quand l'inflammation est la cause la partie gangrène
 se détache et il n'y a jamais d'accident qui empêche le sujet
 il suffit de modérer l'inflammation pour que la gangrène
 ne se porte pas vers la circonférence ainsi cataplasmes emolli-
 fians et boissons délayants &c.

quand la gangrène est le fruit d'un mauvais état de
 l'individu d'une éruption gangréneuse (car on ne peut pas
 expliquer comment cette complication a lieu) et c'est quand
 quelques ulcères, de bubons seulement sont corrigés de
 gangrène dans les hôpitaux... il faut étudier l'état de
 l'individu sur lequel s'est étendue la gangrène... si on
 même une vie bien possible... dans ce cas c'est un état
 d'asténie qu'il faut combattre par les toniques, les fortifiants
 les analeptiques... ainsi tisane de Bourneville des substances
 amères indigènes, acides végétaux attendus de ou bien acides
 minéraux tels que le sulfurique surtout &c
 on donne une décoction d'orge dans une dissolution
 de gomme arabique des extraits fortifiants comme
 la thériaque la quinquina de fumeterre. Quant à
 l'ulcère on le stimule par divers moyens.

Si le sujet est bien constitué s'il n'a pas été
 exposé aux ardeurs et aux courants de la mer.

aussi et recouvert tous les endroits où il y a des plaies
 par la femme et en mouvant les bras.
 supposez maintenant l'ulcère recouvert et pour être sûr
 alors il doit être traité comme toute lésion de continuité avec
 suppuration. ordinairement quand l'ouverture est faite
 d'elle-même on se contente d'appliquer de la charpie. à la
 suite d'ulcères qui ont été compliqués de gangrène ou de
 cancre on y met un dig artificiel. on veut qu'on
 de la charpie quand l'ulcère est véritable. quand il y a
 trop de développement dans les vaisseaux on trempe la charpie
 dans les préparations phagédéniques qui font légèrement
 stryptiques... quelquefois il y a une légère douleur et
 cependant l'action n'est pas marquée alors combinez on
 de stimulans et de calmans ainsi d'opium ou de douleurs
 considérables dans beaucoup de ces cas où il y a un peu de
 et où il est en même temps nécessaire de stimuler... lorsque
 les vaisseaux se développent encore plus fortement et qu'ils
 dépassent de beaucoup le niveau de l'équilibre on les resserme
 encore plus efficacement par le sulfate de quinine encore
 plus par le nitrate d'argent fondu qu'on applique de
 deux en deux jours suivant les cas.
 quand il se forme des espèces de charpie mou
 on fait usage de muriate d'antimoine sublimé qui
 agit plus efficacement plus profondément.
 quelquefois il est de l'ulcère qui ne présente une
 telle modification et si l'on ne peut faire étudier leur
 point particulier en quelques sortes.
 un ulcère de 18 lignes de diamètre appartenant
 à un militaire fut pansé avec le digestif les vaisseaux
 étaient bien développés... il prit de l'accroissement. Différent
 opiacés et le sang phagédénique ne le rendait plus employé
 ne l'amenèrent vers ou en revint au digestif. (il
 changea trois fois d'état en augmentant toujours)
 il était presque tout fait cicatrisé quand ayant
 supprimé le digestif on le pansa avec le digestif et le sang
 remplaça par de la charpie simplement l'ulcère
 ne se cicatrifia point de sorte qu'il fut obligé
 de reprendre l'usage du digestif qu'il fut

Si il n'a pas été affaibli par des maladies antérieures & si l'on a
embarras gastrique amatique on peut le faire avec des saignées
pris dans le classe des anti-septiques ainsi; tisanes avec l'acide
de potasse ou crème de tartre une décoction de camarin &c &c
quelques fois même il arrive que cette gangrène tient à une disposition
intérieure. et dans pareil cas même quoiqu'il n'y ait pas
d'indication locale pour évacuer le malade (car il n'y a pas
de signes de saburre &c) pour lui donner une saignée, cependant
l'amatique est utile en ce qu'il détermine une nouvelle manière
de saigner qui améliore souvent ces sortes d'ulcères, comme il en a eu
souvent l'expérience.

Si la maladie dépend d'une constitution atmosphérique
elle est plus grave plus difficile à arrêter parce qu'elle
cause de lais retent pas comme on ne peut l'attaquer
depuis 12. ans il a vu dans de ces complications... ce ne fut
que le froid qui peut amener le malade... il y a 3 ans
que le département de Brum. et fin. 74 femmes atteintes de gangrène
de Vindem. Brum. et fin. 74 femmes atteintes de gangrène
soit dans les bubons soit dans les chancres, soit dans les pustules
ulcérées. un cinquième ont eu recours au spécifique de quinquina-moss.

Dans ces circonstances après avoir fait évacuer la saignée
il faut employer il faut mettre en usage les anti-septiques
quinquina acides &c. pour le traitement local quoiqu'on
le fait beaucoup plus contre les amputations de l'hygie
à obtenu de bons succès... la vapeur empêche les
thérapeutiques ont aussi quelques fois été très-avantageuses.
on dit il est vrai que ces vapeurs nuisent aux
progrès de la maladie... mais d'autres moyens réussissent
ils davantage et ne faut il pas employer ceux qui réussissent
de plus promptement?

plusieurs fois à Bicêtre il a cherché à employer
d'autres moyens il a fait usage du fer rouge sur la maladie
le charbon de la brûlure étant plus considérable que celui de
la gangrène le charbon se détache et le malade guérit
guérit... cependant il faut avouer que lorsque cette
application s'empêche altère fut employé la
contagion était finie. et les mêmes moyens ayant
été depuis employés par lui sur les capucins n'ont pas

107, face à l'annexe... Ces ~~les~~ sont souvent répétées pour
 les yeux ainsi qu'on en fait de continuées d'applications
 du digestif on voit que quelquefois il est nécessaire de le employer
 pas plus que la cicatrisation est parfaitement établie —
 quelquefois la cicatrice se rompt parce que les vaisseaux
 des cloppes au dessus se rompent et il en résulte quelquefois des
 ulcères plus considérables que les autres dans ce cas il faut stimuler
 ou despecter des surfaces de la cicatrice en quelque sorte qui est
 trop tendue pour résister au frottement; dans d'autres cas l'ulcère
 cicatrice résulte consistant dans une croûte... si elle est rougeâtre
 les cicatrices ne sont pas encore solides. Les croûtes bruniâtres
 des croûtes sont emportées, et pour ce cas on employe au
 emolument on en use pour qu'on y applique dessus. La
 nature de ces croûtes doit être bien examinée et quelquefois
 il ne faut pas y toucher pour ne pas déchirer la
 Cicatrice &c.

quand les complications ont été combattues, pour
 obtenir une bonne Cicatrisation il faut que le personnel
 soit fait suivant l'application de l'ulcère. quand les
 détachés ne se font pas avec promptitude, on employe
 le digestif simple. quand les vaisseaux sont bien
 détachés on peut appliquer de la charpie qu'on
 trempe quelquefois dans une dissolution de muriate
 de mercure, tout est dans le vin d'opium composé &c.

Les cicatrices accompagnées de croûtes, quand elles
 sont inégales, bruniâtres, etc. contiennent de plus quand
 c'est une substance dure comme ligamenteuse, tenant
 comme les jointures, ne présentent pas d'humidité
 n'étant pas susceptible d'être détachées par les
 frottement... alors ces croûtes promettent une bonne
 Cicatrice et quand elles se détachent on se voit
 des bours indolents page 89. ou 103 &c.

