Bibliothèque numérique
medic@


Buffon, Georges-Louis Leclerc.


Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy. Tome premier[-dix-septième]


A Paris, de l'Imprimerie royale. M. DCCXLIX[-M. DCCLXXXIX], 1749.
Cote : BIU Santé Pharmacie 6262-4

PARIS biu Santé

Licence ouverte. - Exemplaire numérisé: BIU Santé (Paris)
Adresse permanente : http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?pharma_006262x04



6262
HISTOIR
NATURELL
TOM IV
6262




VERSANTUR HIS TRIBUS
Pharmacopœi Parisienses
Ex Dono M.M.
PIA. MAYOL,
BERT. DELAPIERE
1765




0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



6262

HISTOIRE NATURELLE, GÉNÉRALE ET PARTICULIÉRE, *AVEC LA DESCRIPTION* DU CABINET DU ROI.

Tome Quatrième.




ECOLE DE PHARMACIE DE PARIS

ECOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE DE PARIS BIBLIOTHÈQUE

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

M. DCCLIII.



TABLE

De ce qui eſt contenu dans ce Volume.

LETTRE de MM. les Députés & Syndic de la Faculté de Théologie, à M. de Buffon. page v

Réponſe de M. de Buffon à MM. les Députés & Syndic de la Faculté de Théologie. xj

Seconde Lettre de MM. les Députés & Syndic de la Faculté de Théologie, à M. de Buffon. xv

Diſcours ſur la nature des Animaux. page 1

Les Animaux domeſtiques. 169

Le Cheval. 174

L'Aſne. 377

Le Bœuf. 437

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ PHARMACIE PARIS

Par M. DE BUFFON.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 10 sur 615

De la description des Animaux. page 113

Exposition des distributions méthodiques des Animaux quadrupèdes. 142

Description du Cheval. 258

Description de la partie du Cabinet qui a rapport à l'Histoire Naturelle du Cheval. 368

Description de l'Asne. 404

Description de la partie du Cabinet qui a rapport à l'Histoire Naturelle de l'Asne. 433

Description du Taureau. 474

Description de la partie du Cabinet qui a rapport à l'Histoire Naturelle du Taureau. 531

Par M. DAUBENTON.

LETTRE de MM. les Députés & Syndic de la Faculté de Théologie, à M. de Buffon.

MONSIEUR,

NOUS avons été informés, par un d'entre nous de votre part, que lorſque vous avez appris que l'Hiſtoire Naturelle, dont vous êtes auteur, étoit un des ouvrages qui ont été choiſis par ordre de la Faculté de Théologie pour être examinés & cenſurés, comme renfermant des principes & des maximes qui ne ſont pas conformes à ceux de la Religion, vous lui avez déclaré que vous n'aviez pas eu intention de vous en écarter, & que vous étiez diſpoſé à ſatisfaire la Faculté ſur chacun des articles qu'elle trouveroit répréhenſibles dans votredit ouvrage; nous ne pouvons, Monſieur, donner trop d'éloges à une

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 12 sur 615

réſolution auſſi chrétienne, & pour vous mettre en état de l'éxécuter, nous vous envoyons les propoſitions extraites de votre livre, qui nous ont paru contraires à la croyance de l'Égliſe.

Nous avons l'honneur d'être avec une parfaite conſidération,

MONSIEUR,

Vos très-humbles & très-obéiſſans ſerviteurs,

Les Députés & Syndic de la Faculté de Théologie de Paris.

En la Maiſon de la Faculté, le 15 janvier 1751.

PROPOSITIONS extraites d'un ouvrage qui a pour titre, Hiſtoire Naturelle, & qui ont paru répréhenſibles à MM. les Députés de la Faculté de Théologie de Paris.

I.

CE ſont les eaux de la mer qui ont produit les montagnes, les vallées de la terre ..... ce ſont les eaux du ciel qui ramenant tout au niveau, rendront un jour cette terre à la mer, qui s'en emparera ſucceſſivement en laiſſant à découvert de nouveaux continens ſemblables à ceux que nous habitons. *édit. in-4.° tome I, page 124; in-12, tome I, page 181.*

II.

Ne peut-on pas s'imaginer ..... qu'une comète tombant ſur la ſurface du ſoleil aura déplacé cet aſtre, & qu'elle en aura ſéparé quelques petites parties auxquelles elle aura communiqué un mouvement d'impulſion ..... en ſorte que les planètes auroient autrefois appartenu au corps du ſoleil, & qu'elles en auroient été détachées, &c. *édit in-4.° p. 133; in-12, p. 193.*

III.

Voyons dans quel état elles (les planètes, & ſur-tout la terre) ſe ſont trouvées, après avoir été ſéparées de la maſſe du ſoleil. *édit. in-4.° p. 143; in 12, p. 208.*

IV.

Le ſoleil s'éteindra probablement . . . . . faute de matière combuſtible . . . . . la terre au ſortir du ſoleil étoit donc brûlante & dans un état de liquéfaction. *édit. in-4.° page 149 ; in-12 , page 217.*

V.

Le mot de vérité ne fait naître qu'une idée vague... & la définition elle-même, priſe dans un ſens général & abſolu, n'eſt qu'une abſtraction qui n'exiſte qu'en vertu de quelque ſuppoſition, *édit. in-4.° tome I, p. 53 ; in-12 , tome I, page 76.*

VI.

Il y a pluſieurs eſpèces de vérités, & on a coûtume de mettre dans le premier ordre les vérités mathématiques ; ce ne ſont cependant que des vérités de définition : ces définitions portent ſur des ſuppoſitions ſimples, mais abſtraites, & toutes les vérités en ce genre ne ſont que des conſéquences compoſées, mais toûjours abſtraites de ces définitions. *Idem.*

VII.

La ſignification du terme de vérité eſt vague & compoſée, il n'étoit donc pas poſſible de la définir généralement, il falloit, comme nous venons de le faire, en diſtinguer les genres, afin de s'en former une idée nette. *édit in-4.° tome I, page 55 ; in-12, tome I, page 79.*

VIII.

VIII.

Je ne parlerai point des autres ordres de vérités, celles de la morale, par exemple, qui ſont en partie réelles & en partie arbitraires..... elles n'ont pour objet que des convenances & des probabilités. *édition in-4.° tome I, page 55; in-12, tome I, page 79.*

IX.

L'évidence mathématique & la certitude phyſique ſont donc les deux ſeuls points ſous leſquels nous devons conſidérer la vérité; dès qu'elle s'éloignera de l'un ou de l'autre, ce n'eſt plus que vrai-ſemblance & probabilité. *édition in-4.° page 55; in-12, page 80.*

X.

L'exiſtence de notre ame nous eſt démontrée, ou pluſtôt nous ne faiſons qu'un, cette exiſtence & nous. *édition in-4.° tome II, page 432; in-12, tome IV, page 154.*

XI.

L'exiſtence de notre corps & des autres objets extérieurs eſt douteuſe pour quiconque raiſonne ſans préjugé; car cette étendue en longueur, largeur & profondeur, que nous appelons *notre corps*, & qui ſemble nous appartenir de ſi près, qu'eſt-elle autre choſe, ſinon un rapport de nos ſens? *édit. in-4.° tome II, page 432; in-12, tome IV, page 155.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 16 sur 615

XII.

Nous pouvons croire qu'il y a quelque choſe hors de nous, mais nous n'en ſommes pas ſûrs, au lieu que nous ſommes aſſurés de l'exiſtence réelle de tout ce qui eſt en nous : celle de notre ame eſt donc certaine, & celle de notre corps paroît douteuſe, dès qu'on vient à penſer que la matière pourroit bien n'être qu'un mode de notre ame, une de ſes façons de voir. *édit. in-4.° tome II, page 434; in-12, tome IV, page 157.*

XIII.

Elle (notre ame) verra d'une manière bien plus différente encore après notre mort, & tout ce qui cauſe aujourd'hui ſes ſenſations, la matière en général, pourroit bien ne pas plus exiſter pour elle alors que notre propre corps, qui ne ſera plus rien pour nous. *édition in-4.° idem; in-12, page 158.*

XIV.

L'ame..... eſt impaſſible par ſon eſſence. *édit. in-4.° tome II, page 430; in-12, tome IV, page 152.*

RÉPONSE de M. de Buffon, à MM. les Députés & Syndic de la Faculté de Théologie.

MESSIEURS,

J'ai reçû la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, avec les propoſitions qui ont été extraites de mon livre, & je vous remercie de m'avoir mis à portée de les expliquer d'une manière qui ne laiſſe aucun doute ni aucune incertitude ſur la droiture de mes intentions; & ſi vous le deſirez, Meſſieurs, je publierai bien volontiers, dans le premier volume de mon ouvrage qui paroîtra, les explications que j'ai l'honneur de vous envoyer. Je ſuis avec reſpect,

MESSIEURS,

Votre très-humble & très-obéiſſant ſerviteur,
BUFFON.

Le 12 mars 1751.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 18 sur 615

JE déclare,

1.° Que je n'ai eu aucune intention de contredire le texte de l'Écriture; que je crois très-fermement tout ce qui y eſt rapporté ſur la création, ſoit pour l'ordre des temps, ſoit pour les circonſtances des faits; & que j'abandonne ce qui, dans mon livre, regarde la formation de la terre, & en général tout ce qui pourroit être contraire à la narration de Moïſe, n'ayant préſenté mon hypothèſe ſur la formation des planètes que comme une pure ſuppoſition philoſophique.

2.° Que par rapport à cette expreſſion, *le mot de vérité ne fait naître qu'une idée vague*, je n'ai entendu que ce qu'on entend dans les écoles par idée générique, qui n'exiſte point en ſoi-même, mais ſeulement dans les eſpèces dans leſquelles elle a une exiſtence réelle; & par conſéquent il y a réellement des vérités certaines en elles-mêmes, comme je l'explique dans l'article ſuivant.

3.° Qu'outre les vérités de conſéquence & de ſuppoſition, il y a des premiers principes abſolument vrais & certains dans tous les cas, & indépendamment de toutes les ſuppoſitions, & que ces conſéquences déduites avec évidence de ces principes, ne ſont pas des vérités arbitraires, mais des vérités éternelles & évidentes; n'ayant uniquement entendu par vérités de définitions que les ſeules vérités mathématiques.

4.° Qu'il y a de ces principes évidens & de ces

conſéquences évidentes dans pluſieurs ſciences, & ſur-tout dans la métaphyſique & la morale; que tels ſont en particulier dans la métaphyſique l'exiſtence de Dieu, ſes principaux attributs, l'exiſtence, la ſpiritualité & l'immortalité de notre ame; & dans la morale, l'obligation de rendre un culte à Dieu, & à un chacun ce qui lui eſt dû, & en conſéquence qu'on eſt obligé d'éviter le larcin, l'homicide & les autres actions que la raiſon condamne.

5.° Que les objets de notre Foi ſont très-certains, ſans être évidens; & que Dieu qui les a révélés, & que la raiſon même m'apprend ne pouvoir me tromper, m'en garantit la vérité & la certitude; que ces objets ſont pour moi des vérités du premier ordre, ſoit qu'ils regardent le dogme, ſoit qu'ils regardent la pratique dans la morale; ordre de vérités dont j'ai dit expreſſément que je ne parlerois point, parce que mon ſujet ne le demandoit pas.

6.° Que quand j'ai dit que les vérités de la morale n'ont pour objet & pour fin que des convenances & des probabilités, je n'ai jamais voulu parler des vérités réelles, telles que ſont non-ſeulement les préceptes de la Loi divine, mais encore ceux qui appartiennent à la Loi naturelle; & que je n'entends par vérités arbitraires en fait de morale, que les loix qui dépendent de la volonté des hommes & qui ſont différentes dans différens pays, & par rapport à la conſtitution des différens États.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 20 sur 615

7.° Qu'il n'eſt pas vrai que l'exiſtence de notre ame & nous ne ſoient qu'un, en ce ſens que l'homme ſoit un être purement ſpirituel, & non un compoſé de corps & d'ame : que l'exiſtence de notre corps & des autres objets extérieurs eſt une vérité certaine, puiſque non-ſeulement la Foi nous l'apprend, mais encore que la ſageſſe & la bonté de Dieu ne nous permettent pas de penſer qu'il voulût mettre les hommes dans une illuſion perpétuelle & générale ; que par cette raiſon, cette étendue en longueur, largeur & profondeur (notre corps) n'eſt pas un ſimple rapport de nos ſens.

8.° Qu'en conſéquence nous ſommes très-ſûrs qu'il y a quelque choſe hors de nous ; & que la croyance que nous avons des vérités révélées préſuppoſe & renferme l'exiſtence de pluſieurs objets hors de nous ; & qu'on ne peut croire que la matière ne ſoit qu'une modification de notre ame, même en ce ſens, que nos ſenſations exiſtent véritablement, mais que les objets qui ſemblent les exciter n'exiſtent point réellement.

9.° Que quelle que ſoit la manière dont l'ame verra dans l'état où elle ſe trouvera depuis ſa mort juſqu'au jugement dernier, elle ſera certaine de l'exiſtence des corps, & en particulier de celle du ſien propre, dont l'état futur l'intéreſſera toûjours, ainſi que l'Écriture nous l'apprend,

10.° Que quand j'ai dit que l'ame étoit impaſſible par ſon eſſence, je n'ai prétendu dire rien autre choſe, ſinon que l'ame par ſa nature n'eſt pas ſuſceptible des

impreſſions extérieures qui pourroient la détruire ; & je n'ai pas cru que par la puiſſance de Dieu elle ne pût être ſuſceptible des ſentimens de douleur, que la Foi nous apprend devoir faire dans l'autre vie la peine du péché & le tourment des méchans.

Le 12 mars 1751. *Signé* BUFFON.

SECONDE LETTRE de MM. les Députés & Syndic de la Faculté de Théologie, à M. de Buffon.

MONSIEUR,

NOUS avons reçû les explications que vous nous avez envoyées, des propoſitions que nous avions trouvé répréhenſibles dans votre ouvrage qui a pour titre, l'Hiſtoire Naturelle ; *& après les avoir lûes dans notre aſſemblée particulière, nous les avons préſentées à la Faculté dans ſon aſſemblée générale du premier avril 1751, préſente année ; & après en avoir entenau la lecture, elle les a*



De Seve inv. Baquoy Sculp.

HISTOIRE NATURELLE.

DISCOURS

Sur la nature des Animaux.

BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ * PHARMACIE PARIS

COMME ce n'eſt qu'en comparant que nous pouvons juger que nos connoiſſances roulent même entièrement ſur les rapports que les choſes ont avec celles qui leur reſſemblent ou qui en diffèrent, & que s'il n'exiſtoit point d'animaux, la nature de l'homme ſeroit encore plus incompréhenſible; après avoir conſidéré l'homme en lui-même, ne devons-nous pas nous ſervir de cette voie de comparaiſon? ne faut-il pas examiner

la nature des animaux, comparer leur organiſation, étudier l'économie animale en général, afin d'en faire des applications particulières, d'en ſaiſir les reſſemblances, rapprocher les différences, & de la réunion de ces combinaiſons tirer aſſez de lumières pour diſtinguer nettement les principaux effets de la méchanique vivante, & nous conduire à la ſcience importante dont l'homme même eſt l'objet!

Commençons par ſimplifier les choſes, reſſerrons l'étendue de notre ſujet, qui d'abord paroît immenſe, & tâchons de le réduire à ſes juſtes limites. Les propriétés qui appartiennent à l'animal, parce qu'elles appartiennent à toute matière, ne doivent point être ici conſidérées, du moins d'une manière abſolue *. Le corps de l'animal eſt étendu, peſant, impénétrable, figuré, capable d'être mis en mouvement, ou contraint de demeurer en repos par l'action ou par la réſiſtance des corps étrangers; toutes ces propriétés qui lui ſont communes avec le reſte de la matière, ne ſont pas celles qui caractériſent la nature des animaux, & ne doivent être employées que d'une manière relative, en comparant, par exemple, la grandeur, le poids, la figure, &c. d'un animal, avec la grandeur, le poids, la figure, &c. d'un autre animal.

De même nous devons ſéparer de la nature particulière des animaux les facultés qui ſont communes à l'animal

* Voyez ce que j'en ai dit au commencement du premier chapitre du ſecond volume de cette Hiſtoire Naturelle.

& au végétal ; tous deux ſe nourriſſent, ſe développent & ſe reproduiſent ; nous ne devons donc pas comprendre dans l'économie animale, proprement dite, ces facultés qui appartiennent auſſi au végétal, & c'eſt par cette raiſon que nous avons traité de la nutrition, du développement, de la reproduction, & même de la génération des animaux, avant que d'avoir traité de ce qui appartient en propre à l'animal, ou pluſtôt de ce qui n'appartient qu'à lui.

Enſuite, comme on comprend dans la claſſe des animaux pluſieurs êtres animés dont l'organiſation eſt très-différente de la notre & de celle des animaux dont le corps eſt à peu près compoſé comme le nôtre, nous devons éloigner de nos conſidérations cette eſpèce de nature animale particulière, & ne nous attacher qu'à celle des animaux qui nous reſſemblent le plus ; l'économie animale d'une huître, par exemple, ne doit pas faire partie de celle dont nous avons à traiter.

Mais comme l'homme n'eſt pas un ſimple animal, comme ſa nature eſt ſupérieure à celle des animaux, nous devons nous attacher à démontrer la cauſe de cette ſupériorité, & établir, par des preuves claires & ſolides, le degré précis de cette infériorité de la nature des animaux, afin de diſtinguer ce qui n'appartient qu'à l'homme, de ce qui lui appartient en commun avec l'animal.

Pour mieux voir notre objet, nous venons de le circonſcrire, nous en avons retranché toutes les extrémités

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 26 sur 615

excédentes, & nous n'avons conſervé que les parties néceſſaires. Diviſons-le maintenant pour le conſidérer avec toute l'attention qu'il exige, mais diviſons-le par grande maſſe; avant d'examiner en détail les parties de la machine animale & les fonctions de chacune de ces parties, voyons en général le réſultat de cette méchanique, & ſans vouloir d'abord raiſonner ſur les cauſes, bornons-nous à conſtater les effets.

L'animal a deux manières d'être, l'état de mouvement & l'état de repos, la veille & le ſommeil, qui ſe ſuccèdent alternativement pendant toute la vie: dans le premier état, tous les reſſorts de la machine animale ſont en action, dans le ſecond, il n'y en a qu'une partie, & cette partie qui eſt en action dans le ſommeil, eſt auſſi en action pendant la veille : cette partie eſt donc d'une néceſſité abſolue, puiſque l'animal ne peut exiſter d'aucune façon ſans elle; cette partie eſt indépendante de l'autre, puiſqu'elle agit ſeule; l'autre au contraire dépend de celle-ci, puiſqu'elle ne peut ſeule exercer ſon action: l'une eſt la partie fondamentale de l'économie animale, puiſqu'elle agit continuellement & ſans interruption; l'autre eſt une partie moins eſſentielle, puiſqu'elle n'a d'exercice que par intervalles & d'une manière alternative.

Cette première diviſion de l'économie animale me paroît naturelle, générale & bien fondée: l'animal qui dort ou qui eſt en repos eſt une machine moins compliquée & plus aiſée à conſidérer que l'animal qui veille

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 27 sur 615

ou qui eſt en mouvement. Cette différence eſt eſſentielle & n'eſt pas un ſimple changement d'état, comme dans un corps inanimé qui peut également & indifféremment être en repos ou en mouvement; car un corps inanimé qui dans l'un ou dans l'autre de ces états, reſtera perpétuellement dans cet état, à moins que des forces ou des réſiſtances étrangères ne le contraignent à en changer; mais c'eſt par ſes propres forces que l'animal change d'état; il paſſe du repos à l'action, & de l'action au repos, naturellement & ſans contrainte: le moment de l'*éveil* revient auſſi néceſſairement que celui du ſommeil, & tous deux arriveroient indépendamment des cauſes étrangères, puiſque l'animal ne peut exiſter que pendant un certain temps dans l'un ou dans l'autre état, & que la continuité non interrompue de la veille ou du ſommeil, de l'action ou du repos, amèneroit également la ceſſation de la continuité du mouvement vital.

Nous pouvons donc diſtinguer dans l'économie animale deux parties, dont la première agit perpétuellement ſans aucune interruption, & la ſeconde n'agit que par intervalles. L'action du cœur & des poumons dans l'animal qui reſpire, l'action du cœur dans le fœtus, paroiſſent être cette première partie de l'économie animale: l'action des ſens & le mouvement du corps & des membres, ſemblent conſtituer la ſeconde.

Si nous imaginions donc des êtres auxquels la Nature n'eût accordé que cette premère partie de l'économie

animale, ces êtres, qui ſeroient néceſſairement privés de ſens & de mouvement progreſſif, ne laiſſeroient pas d'être des êtres inanimés, qui ne différeroient en rien des animaux qui dorment. Une huître, un zoophyte, qui ne paroît avoir ni mouvement extérieur ſenſible, ni ſens externe, eſt un être formé pour dormir toûjours; un végétal n'eſt dans ce ſens qu'un animal qui dort, & en général les fonctions de tout être organiſé qui n'auroit ni mouvemens, ni ſens, pourroient être comparées aux fonctions d'un animal qui ſeroit par ſa nature contraint à dormir perpétuellement.

Dans l'animal, l'état de ſommeil n'eſt donc pas un état accidentel, occaſionné par le plus ou moins grand exercice de ſes fonctions pendant la veille; cet état eſt au contraire une manière d'être eſſentielle, & qui ſert de baſe à l'économie animale. C'eſt par le ſommeil que commence notre exiſtence; le fœtus dort preſque continuellement, & l'enfant dort beaucoup plus qu'il ne veille.

Le ſommeil, qui paroît être un état purement paſſif, une eſpèce de mort, eſt donc au contraire le premier état de l'animal vivant & le fondement de la vie; ce n'eſt point une privation, un anéantiſſement, c'eſt une manière d'être, une façon d'exiſter tout auſſi réelle & plus générale qu'aucune autre; nous exiſtons de cette façon avant d'exiſter autrement; tous les êtres organiſés qui n'ont point de ſens n'exiſtent que de cette façon, aucun n'exiſte dans un état de mouvement continuel, &

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 29 sur 615

& l'exiſtence de tous participe plus ou moins à cet état de repos.

Si nous réduiſons l'animal même le plus parfait à cette partie qui agit ſeule & continuellement, il ne nous paroîtra pas différent de ces êtres auxquels nous avons peine à accorder le nom d'Animal; il nous paroîtra, quant aux fonctions extérieures, preſque ſemblable au végétal; car quoique l'organiſation intérieure ſoit différente dans l'animal & dans le végétal, l'un & l'autre ne nous offriront plus que les mêmes réſultats, ils ſe nourriront, ils croîtront, ils ſe développeront, ils auront les principes d'un mouvement interne, ils poſſéderont une vie végétale; mais ils ſeront également privés de mouvement progreſſif, d'action, de ſentiment, & ils n'auront aucun ſigne extérieur, aucun caractère apparent de vie animale. Mais revêtons cette partie intérieure d'une enveloppe convenable, c'eſt-à-dire, donnons-lui des ſens & des membres, bien-tôt la vie animale ſe manifeſtera; & plus l'enveloppe contiendra de ſens, de membres & d'autres parties extérieures, plus la vie animale nous paroîtra complète, & plus l'animal ſera parfait. C'eſt donc par cette enveloppe que les animaux diffèrent entre eux, la partie intérieure qui fait le fondement de l'économie animale appartient à tous les animaux ſans aucune exception, & elle eſt à peu près la même, pour la forme, dans l'homme & dans les animaux qui ont de la chair & du ſang, mais l'enveloppe extérieure eſt très-différente, & c'eſt aux extrémités de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 30 sur 615

cette enveloppe que ſont les plus grandes différences.

Comparons, pour nous faire mieux entendre, le corps de l'homme avec celui de l'animal, par exemple, avec le corps du cheval, du bœuf, du cochon, &c. la partie intérieure qui agit continuellement, c'eſt-à-dire, le cœur & les poumons, ou plus généralement les organes de la circulation & de la reſpiration, ſont à peu près les mêmes dans l'homme & dans l'animal; mais la partie extérieure, l'enveloppe, eſt fort différente. La charpente du corps de l'animal, quoique compoſée de parties ſimilaires à celles du corps humain, varie prodigieuſement pour le nombre, la grandeur & la poſition; les os y ſont plus ou moins alongés, plus ou moins accourcis, plus ou moins arrondis, plus ou moins aplatis, &c. leurs extrémités ſont plus ou moins élevées, plus ou moins cavées, pluſieurs ſont ſoudés enſemble, il y en a même quelques-uns qui manquent abſolument, comme les clavicules; il y en a d'autres qui ſont en plus grand nombre, comme les cornets du nez, les vertèbres, les côtes, &c. d'autres qui ſont en plus petit nombre, comme les os du carpe, du métacarpe, du tarſe, du métatarſe, les phalanges, &c. ce qui produit des différences très-conſidérables dans la forme du corps de ces animaux, relativement à la forme du corps de l'homme.

De plus, ſi nous y faiſons attention, nous verrons que les plus grandes différences ſont aux extrémités, & que c'eſt par ces extrémités que le corps de l'homme diffère le plus du corps de l'animal; car diviſons le

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 31 sur 615

corps en trois parties principales, le tronc, la tête & les membres; la tête & les membres, qui ſont les extrémités du corps, ſont ce qu'il y a de plus différent dans l'homme & dans l'animal : enſuite, en conſidérant les extrémités de chacune de ces trois parties principales; nous reconnoîtrons que la plus grande différence dans la partie du tronc ſe trouve à l'extrémité ſupérieure & inférieure de cette partie, puiſque dans le corps de l'homme il y a des clavicules en haut, au lieu que ces parties manquent dans la pluſpart des animaux : nous trouverons pareillement à l'extrémité inférieure du tronc un certain nombre de vertèbres extérieures qui forment une queue à l'animal; & ces vertèbres extérieures manquent à cette extrémité inférieure du corps de l'homme. De même l'extrémité inférieure de la tête, les mâchoires, & l'extrémité ſupérieure de la tête, les os du front, diffèrent prodigieuſement dans l'homme & dans l'animal : les mâchoires dans la pluſpart des animaux ſont fort alongées, & les os frontaux ſont au contraire fort raccourcis. Enfin en comparant les membres de l'animal avec ceux de l'homme, nous reconnoîtrons encore aiſément que c'eſt par leurs extrémités qu'ils diffèrent le plus, rien ne ſe reſſemblant moins au premier coup d'œil que la main humaine, & le pied d'un cheval ou d'un bœuf.

En prenant donc le cœur pour centre dans la machine animale, je vois que l'homme reſſemble parfaitement aux animaux par l'économie de cette partie &

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 32 sur 615

des autres qui en ſont voiſines; mais plus on s'éloigne de ce centre, plus les différences deviennent conſidérables, & c'eſt aux extrémités où elles ſont les plus grandes; & lorſque dans ce centre même il ſe trouve quelque différence, l'animal eſt alors infiniment plus différent de l'homme, il eſt, pour ainſi dire, d'une autre nature, & n'a rien de commun avec les eſpèces d'animaux que nous conſidérons. Dans la pluſpart des inſectes, par exemple, l'organiſation de cette principale partie de l'économie animale eſt ſingulière; au lieu de cœur & de poumons on y trouve des parties qui ſervent de même aux fonctions vitales, & que par cette raiſon l'on a regardées comme analogues à ces viſcères, mais qui réellement en ſont très-différentes, tant par la ſtructure que par le réſultat de leur action: auſſi les Inſectes diffèrent-ils, autant qu'il eſt poſſible, de l'homme & des autres animaux. Une légère différence dans ce centre de l'économie animale eſt toûjours acompagnée d'une différence infiniment plus grande dans les parties extérieures. La tortue dont le cœur eſt ſingulièrement conformé, eſt auſſi un animal extraordinaire, qui ne reſſemble à aucun autre animal.

Que l'on conſidère l'homme, les animaux quadrupèdes, les oiſeaux, les cétacées, les poiſſons, les amphibies, les reptiles; quelle prodigieuſe variété dans la figure, dans la proportion de leur corps, dans le nombre & dans la poſition de leurs membres, dans la ſubſtance de leur chair, de leurs os, de leurs

tégumens! Ces quadrupèdes ont assez généralement des queues, des cornes, & toutes les extrémités du corps différentes de celles de l'homme : les cétacées vivent dans un autre élément, & quoiqu'ils se multiplient par une voie de génération semblable à celle des quadrupèdes, ils en sont très-différens par la forme, n'ayant point d'extrémités inférieures : les oiseaux semblent en différer encore plus par leur bec, leurs plumes, leur vol, & leur génération par des œufs : les poissons & les amphibies sont encore plus éloignés de la forme humaine : les reptiles n'ont point de membres. On trouve donc la plus grande diversité dans toute l'enveloppe extérieure, tous ont au contraire à peu près la même conformation intérieure; ils ont tous un cœur, un foie, un estomac, des intestins, des organes pour la génération : ces parties doivent donc être regardées comme les plus essentielles à l'économie animale, puisqu'elles sont de toutes les plus constantes & les moins sujettes à la variété.

Mais on doit observer que dans l'enveloppe même il y a aussi des parties plus constantes les unes que les autres; les sens, sur-tout certains sens, ne manquent à aucuns de ces animaux. Nous avons expliqué dans l'article des sens, *(vol. III)* quelle peut être leur espèce de toucher : nous ne savons pas de quelle nature est leur odorat & leur goût, mais nous sommes assurés qu'ils ont tous le sens de la vûe, & peut-être aussi celui de l'ouïe. Les sens peuvent donc être regardés comme une autre partie

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 34 sur 615

eſſentielle de l'économie animale, auſſi-bien que le cerveau & ſes enveloppes, qui ſe trouve dans tous les animaux qui ont des ſens, & qui en effet eſt la partie dont les ſens tirent leur origine, & ſur laquelle ils exercent leur première action. Les Inſectes mêmes, qui diffèrent ſi fort des autres animaux par le centre de l'économie animale, ont une partie dans la tête, analogue au cerveau, & des ſens dont les fonctions ſont ſemblables à celles des autres animaux; & ceux qui, comme les huîtres, paroiſſent en être privés, doivent être regardés comme des demi-animaux, comme des êtres qui font la nuance entre les animaux & les végétaux.

Le cerveau & les ſens forment donc une ſeconde partie eſſentielle à l'économie animale; le cerveau eſt le centre de l'enveloppe, comme le cœur eſt le centre de la partie intérieure de l'animal. C'eſt cette partie qui donne à toutes les autres parties extérieures le mouvement & l'action, par le moyen de la moëlle, de l'épine & des nerfs, qui n'en ſont que le prolongement: & de la même façon que le cœur & toute la partie intérieure communiquent avec le cerveau & avec toute l'enveloppe extérieure par les vaiſſeaux ſanguins qui s'y diſtribuent, le cerveau communique auſſi avec le cœur & toute la partie intérieure par les nerfs qui s'y ramifient. L'union paroît intime & réciproque, & quoique ces deux organes aient des fonctions abſolument différentes les unes des autres lorſqu'on les conſidère

à part, ils ne peuvent cependant être ſéparés ſans que l'animal périſſe à l'inſtant.

Le cœur & toute la partie intérieure agiſſent continuellement, ſans interruption, &, pour ainſi dire, méchaniquement & indépendamment d'aucune cauſe extérieure; les ſens au contraire & toute l'enveloppe n'agiſſent que par intervalles alternatifs, & par des ébranlemens ſucceſſifs cauſés par les objets extérieurs. Les objets exercent leur action ſur les ſens, les ſens modifient cette action des objets, & en portent l'impreſſion modifiée dans le cerveau, où cette impreſſion devient ce que l'on appelle ſenſation; le cerveau, en conſéquence de cette impreſſion, agit ſur les nerfs, & leur communique l'ébranlement qu'il vient de recevoir, & c'eſt cet ébranlement qui produit le mouvement progreſſif & toutes les autres actions extérieures du corps & des membres de l'animal. Toutes les fois qu'une cauſe agit ſur un corps, on ſait que ce corps agit lui-même par ſa réaction ſur cette cauſe: ici les objets agiſſent ſur l'animal par le moyen des ſens, & l'animal réagit ſur les objets par ſes mouvemens extérieurs; en général l'action eſt la cauſe, & la réaction l'effet.

On me dira peut-être qu'ici l'effet n'eſt point proportionnel à la cauſe; que dans les corps ſolides qui ſuivent les loix de la méchanique la réaction eſt toûjours égale à l'action; mais que dans le corps animal il paroît que le mouvement extérieur ou la réaction eſt incomparablement plus grande que l'action, & que par

conſéquent le mouvement progreſſif & les autres mouvemens extérieurs ne doivent pas être regardés comme de ſimples effets de l'impreſſion des objets ſur les ſens. Mais il eſt aiſé de répondre que ſi les effets nous paroiſſent proportionnels à leurs cauſes dans certains cas & dans certaines circonſtances, il y a dans la Nature un bien plus grand nombre de cas & de circonſtances où les effets ne ſont en aucune façon proportionnels à leurs cauſes apparentes. Avec une étincelle on enflamme un magaſin à poudre, & l'on fait ſauter une citadelle; avec un léger frottement on produit par l'électricité un coup violent, une ſecouſſe vive, qui ſe fait ſentir dans l'inſtant même à de très-grandes diſtances, & qu'on n'affoiblit point en la partageant, en ſorte que mille perſonnes qui ſe touchent ou ſe tiennent par la main, en ſont également affectées, & preſque auſſi violemment que ſi le coup n'avoit porté que ſur une ſeule; par conſéquent il ne doit pas paroître extraordinaire qu'une légère impreſſion ſur les ſens puiſſe produire dans le corps animal une violente réaction, qui ſe manifeſte par les mouvemens extérieurs.

Les cauſes que nous pouvons meſurer, & dont nous pouvons en conſéquence eſtimer au juſte la quantité des effets, ne ſont pas en auſſi grand nombre que celles dont les qualités nous échappent, dont la manière d'agir nous eſt inconnue, & dont nous ignorons par conſéquent la relation proportionnelle qu'elles peuvent avoir avec leurs effets. Il faut, pour que nous puiſſions meſurer une cauſe;

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 37 sur 615

cauſe, qu'elle ſoit ſimple, qu'elle ſoit toûjours la même, que ſon action ſoit conſtante, ou, ce qui revient au même, qu'elle ne ſoit variable que ſuivant une loi qui nous ſoit exactement connue. Or dans la Nature, la pluſpart des effets dépendent de pluſieurs cauſes différemment combinées, de cauſes dont l'action varie, de cauſes dont les degrés d'activité ne ſemblent ſuivre aucune règle, aucune loi conſtante, & que nous ne pouvons par conſéquent, ni meſurer, ni même eſtimer que comme on eſtime des probabilités, en tâchant d'approcher de la vérité par le moyen des vrai-ſemblances.

Je ne prétends donc pas aſſurer comme une vérité démontrée, que le mouvement progreſſif & les autres mouvemens extérieurs de l'animal aient pour cauſe, & pour cauſe unique, l'impreſſion des objets ſur les ſens: je le dis ſeulement comme une choſe vrai-ſemblable, & qui me paroît fondée ſur de bonnes analogies; car je vois que dans la Nature tous les êtres organiſés qui ſont dénués de ſens, ſont auſſi privés du mouvement progreſſif, & que tous ceux qui en ſont pourvûs ont tous auſſi cette qualité active de mouvoir leurs membres & changer de lieu. Je vois de plus qu'il arrive ſouvent que cette action des objets ſur les ſens met à l'inſtant l'animal en mouvement, ſans même que la volonté paroiſſe y avoir part, & qu'il arrive toûjours, lorſque c'eſt la volonté qui détermine le mouvement, qu'elle a été elle-même excitée par la ſenſation qui réſulte de l'impreſſion actuelle des

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 38 sur 615

objets ſur les ſens, ou de la réminiſcence d'une impreſſion antérieure.

Pour le faire mieux ſentir, conſidérons-nous nous-mêmes, & analyſons un peu le phyſique de nos actions. Lorſqu'un objet nous frappe par quelque ſens que ce ſoit, que la ſenſation qu'il produit eſt agréable, & qu'il fait naître un deſir, ce deſir ne peut être que relatif à quelques-unes de nos qualités & à quelques-unes de nos manières de jouir; nous ne pouvons deſirer cet objet que pour le voir, pour le goûter, pour l'entendre, pour le ſentir, pour le toucher; nous ne le deſirons que pour ſatisfaire plus pleinement le ſens avec lequel nous l'avons aperçû, ou pour ſatisfaire quelques-uns de nos autres ſens en même temps, c'eſt-à-dire, pour rendre la première ſenſation encore plus agréable, ou pour en exciter une autre, qui eſt une nouvelle manière de jouir de cet objet : car ſi dans le moment même que nous l'apercevons, nous pouvions en jouir pleinement & par tous les ſens à la fois, nous ne pourrions rien deſirer. Le deſir ne vient donc que de ce que nous ſommes mal ſitués par rapport à l'objet que nous venons d'apercevoir, nous en ſommes trop loin ou trop près : nous changeons donc naturellement de ſituation, parce qu'en même temps que nous avons apercû l'objet, nous avons auſſi apercû la diſtance ou la proximité qui fait l'incommodité de notre ſituation, & qui nous empêche d'en jouir pleinement. Le mouvement que nous faiſons en conſéquence du deſir, & le deſir lui-même, ne

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 39 sur 615

viennent donc que de l'impreſſion qu'a fait cet objet ſur nos ſens.

Que ce ſoit un objet que nous ayons apercû par les yeux & que nous deſirions de toucher, s'il eſt à notre portée nous étendons le bras pour l'atteindre, & s'il eſt éloigné nous nous mettons en mouvement pour nous en approcher. Un homme profondément occupé d'une ſpéculation, ne ſaiſira-t-il pas, s'il a grand faim, le pain qu'il trouvera ſous ſa main ! il pourra même le porter à ſa bouche & le manger ſans s'en apercevoir. Ces mouvemens ſont une ſuite néceſſaire de la première impreſſion des objets; ces mouvemens ne manqueroient jamais de ſuccéder à cette impreſſion, ſi d'autres impreſſions qui ſe réveillent en même temps ne s'oppoſoient ſouvent à cet effet naturel, ſoit en affoibliſſant, ſoit en détruiſant l'action de cette première impreſſion.

Un être organiſé qui n'a point de ſens, une huître, par exemple, qui probablement n'a qu'un toucher fort imparfait, eſt donc un être privé, non ſeulement de mouvement progreſſif, mais même de ſentiment & de toute intelligence, puiſque l'un ou l'autre produiroient également le deſir, & ſe manifeſteroient par le mouvement extérieur. Je n'aſſurerai pas que ces êtres privés de ſens ſoient auſſi privés du ſentiment même de leur exiſtence, mais au moins peut-on dire qu'ils ne la ſentent que très-imparfaitement, puiſqu'ils ne peuvent apercevoir ni ſentir l'exiſtence des autres êtres.

C'eſt donc l'action des objets ſur les ſens qui fait

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 40 sur 615

naître le desir, & c'est le desir qui produit le mouvement progressif. Pour le faire encore mieux sentir, supposons un homme, qui dans l'instant où il voudroit s'approcher d'un objet, se trouveroit tout-à-coup privé des membres nécessaires à cette action, cet homme, auquel nous retranchons les jambes, tâcheroit de marcher sur ses genoux ; ôtons-lui encore les genoux & les cuisses, en lui conservant toûjours le desir de s'approcher de l'objet, il s'efforcera alors de marcher sur ses mains ; privons-le encore des bras & des mains, il rampera, il se traînera, il emploiera toutes les forces de son corps & s'aidera de toute la flexibilité des vertèbres pour se mettre en mouvement, il s'accrochera par le menton ou avec les dents à quelque point d'appui pour tâcher de changer de lieu ; & quand même nous réduirions son corps à un point physique, à un atome globuleux, si le desir subsiste, il emploiera toûjours toutes ses forces pour changer de situation : mais comme il n'auroit alors d'autre moyen pour se mouvoir que d'agir contre le plan sur lequel il porte, il ne manqueroit pas de s'élever plus ou moins haut pour atteindre à l'objet. Le mouvement extérieur & progressif ne dépend donc point de l'organisation & de la figure du corps & des membres, puisque de quelque manière qu'un être fût extérieurement conformé, il ne pouroit manquer de se mouvoir, pourvû qu'il eût des sens & le desir de les satisfaire.

C'est à la vérité de cette organisation extérieure que dépend la facilité, la vîtesse, la direction, la

continuité, &c. du mouvement; mais la cauſe, le principe, l'action, la détermination, viennent uniquement du deſir occaſionné par l'impreſſion des objets ſur les ſens : car ſuppoſons maintenant que la conformation extérieure étant toûjours la même, un homme ſe trouvât privé ſucceſſivement de ſes ſens, il ne changera pas de lieu pour ſatisfaire ſes yeux, s'il eſt privé de la vûe ; il ne s'approchera pas pour entendre, ſi le ſon ne fait aucune impreſſion ſur ſon organe; il ne fera jamais aucun mouvement pour reſpirer une bonne odeur ou pour en éviter une mauvaiſe, ſi ſon odorat eſt détruit ; il en eſt de même du toucher & du goût, ſi ces deux ſens ne ſont plus ſuſceptibles d'impreſſion, il n'agira pas pour les ſatisfaire; cet homme demeurera donc en repos, & perpétuellement en repos, rien ne pourra le faire changer de ſituation & lui imprimer le mouvement progreſſif, quoique par ſa conformation extérieure il fût parfaitement capable de ſe mouvoir & d'agir.

Les beſoins naturels, celui, par exemple, de prendre de la nourriture, ſont des mouvemens intérieurs dont les impreſſions font naître le deſir, l'appétit, & même la néceſſité; ces mouvemens intérieurs pourront donc produire des mouvemens extérieurs dans l'animal, & pourvû qu'il ne ſoit pas privé de tous les ſens extérieurs, pourvû qu'il ait un ſens relatif à ſes beſoins, il agira pour les ſatisfaire. Le beſoin n'eſt pas le deſir, il en diffère comme la cauſe diffère de l'effet, & il ne peut le produire ſans le concours des ſens. Toutes les fois

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 42 sur 615

que l'animal aperçoit quelque objet relatif à ſes beſoins, le deſir ou l'appétit naît, & l'action ſuit.

Les objets extérieurs exerçant leur action ſur les ſens, il eſt donc néceſſaire que cette action produiſe quelque effet, & on concevroit aiſément que l'effet de cette action ſeroit le mouvement de l'animal, ſi toutes les fois que ſes ſens ſont frappés de la même façon, le même effet, le même mouvement ſuccédoit toûjours à cette impreſſion : mais comment entendre cette modification de l'action des objets ſur l'animal, qui fait naître l'appétit ou la répugnance ! comment concevoir ce qui s'opère au-delà des ſens à ce terme moyen entre l'action des objets & l'action de l'animal ! opération dans laquelle cependant conſiſte le principe de la détermination du mouvement, puiſqu'elle change & modifie l'action de l'animal, & qu'elle la rend quelquefois nulle malgré l'impreſſion des objets.

Cette queſtion eſt d'autant plus difficile à réſoudre, qu'étant par notre nature différens des animaux, l'ame a part à preſque tous nos mouvemens, & peut-être à tous, & qu'il nous eſt très-difficile de diſtinguer les effets de l'action de cette ſubſtance ſpirituelle, de ceux qui ſont produits par les ſeules forces de notre être matériel : nous ne pouvons en juger que par analogie & en comparant à nos actions les opérations naturelles des animaux ; mais comme cette ſubſtance ſpirituelle n'a été accordée qu'à l'homme, & que ce n'eſt que par elle qu'il penſe & qu'il réfléchit ; que l'animal eſt au contraire

un être purement matériel, qui ne penſe ni ne réfléchit, & qui cependant agit & ſemble ſe déterminer, nous ne pouvons pas douter que le principe de la détermination du mouvement ne ſoit dans l'animal un effet purement méchanique, & abſolument dépendant de ſon organiſation.

Je conçois donc que dans l'animal l'action des objets ſur les ſens en produit une autre ſur le cerveau, que je regarde comme un ſens intérieur & général qui reçoit toutes les impreſſions que les ſens extérieurs lui tranſmettent. Ce ſens interne eſt non ſeulement ſuſceptible d'être ébranlé par l'action des ſens & des organes extérieurs, mais il eſt encore, par ſa nature, capable de conſerver long-temps l'ébranlement que produit cette action; & c'eſt dans la continuité de cet ébranlement que conſiſte l'impreſſion, qui eſt plus ou moins profonde à proportion que cet ébranlement dure plus ou moins de temps.

Le ſens intérieur diffère donc des ſens extérieurs, d'abord par la propriété qu'il a de recevoir généralement toutes les impreſſions, de quelque nature qu'elles ſoient; au lieu que les ſens extérieurs ne les reçoivent que d'une manière particulière & relative à leur conformation, puiſque l'œil n'eſt jamais ni pas plus ébranlé par le ſon que l'oreille par la lumière. Secondement, ce ſens intérieur diffère des ſens extérieurs par la durée de l'ébranlement que produit l'action des cauſes extérieures; mais pour tout le reſte, il eſt de la même nature que

les ſens extérieurs. Le ſens intérieur de l'animal eſt, auſſi-bien que ſes ſens extérieurs, un organe, un réſultat de méchanique, un ſens purement matériel. Nous avons, comme l'animal, ce ſens intérieur matériel, & nous poſſédons de plus un ſens d'une nature ſupérieure & bien différente, qui réſide dans la ſubſtance ſpirituelle qui nous anime & nous conduit.

Le cerveau de l'animal eſt donc un ſens interne général & commun, qui reçoit également toutes les impreſſions que lui tranſmettent les ſens externes, c'eſt-à-dire, tous les ébranlemens que produit l'action des objets, & ces ébranlemens durent & ſubſiſtent bien plus long-temps dans ce ſens interne que dans les ſens externes : on le concevra facilement, ſi l'on fait attention que même dans les ſens externes il y a une différence très-ſenſible dans la durée de leurs ébranlemens. L'ébranlement que la lumière produit dans l'œil, ſubſiſte plus long-temps que l'ébranlement de l'oreille par le ſon; il ne faut pour s'en aſſurer, que réfléchir ſur des phénomènes fort connus. Lorſqu'on tourne avec quelque vîteſſe un charbon allumé, ou que l'on met le feu à une fuſée volante, ce charbon allumé forme à nos yeux un cercle de feu, & la fuſée volante une longue trace de flamme : on ſait que ces apparences viennent de la durée de l'ébranlement que la lumière produit ſur l'organe, & de ce que l'on voit en même temps la première & la dernière image du charbon ou de la fuſée volante : or le temps entre la première & la dernière

dernière impreſſion ne laiſſe pas d'être ſenſible. Meſurons cet intervalle, & diſons qu'il faut une demi-ſeconde, ou, ſi l'on veut, un quart de ſeconde pour que le charbon allumé décrive ſon cercle & ſe retrouve au même point de la circonférence; cela étant, l'ébranlement cauſé par la lumière dure une demi-ſeconde ou un quart de ſeconde au moins. Mais l'ébranlement que produit le ſon n'eſt pas à beaucoup près d'une auſſi longue durée, car l'oreille ſaiſit de bien plus petits intervalles de temps : on peut entendre diſtinctement trois ou quatre fois le même ſon, ou trois ou quatre ſons ſucceſſifs dans l'eſpace d'un quart de ſeconde, & ſept ou huit dans une demi-ſeconde, & la dernière impreſſion ne ſe confond point avec la première, elle en eſt diſtincte & ſéparée; au lieu que dans l'œil la première & la dernière impreſſion ſemblent être continues, & c'eſt par cette raiſon qu'une ſuite de couleurs, qui ſe ſuccéderoient auſſi vîte que des ſons, doit ſe brouiller néceſſairement, & ne peut pas nous affecter d'une manière diſtincte comme le fait une ſuite de ſons.

Nous pouvons donc préſumer avec aſſez de fondement, que les ébranlemens peuvent durer beaucoup plus long-temps dans le ſens intérieur qu'ils ne durent dans les ſens extérieurs, puiſque dans quelques-uns de ces ſens même l'ébranlement dure plus long-temps que dans d'autres, comme nous venons de le faire voir de l'œil, dont les ébranlemens ſont plus durables

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 46 sur 615

que ceux de l'oreille : c'eſt par cette raiſon que les impreſſions que ce ſens tranſmet au ſens intérieur, ſont plus fortes que les impreſſions tranſmiſes par l'oreille, & que nous nous repréſentons les choſes que nous avons vûes, beaucoup plus vivement que celles que nous avons entendues. Il paroît même que de tous les ſens l'œil eſt celui dont les ébranlemens ont le plus de durée, & qui doit par conſéquent former les impreſſions les plus fortes, quoiqu'en apparence elles ſoient les plus légères ; car cet organe paroît par ſa nature participer plus qu'aucun autre à la nature de l'organe intérieur. On pourroit le prouver par la quantité de nerfs qui arrivent à l'œil ; il en reçoit preſque autant lui ſeul que l'ouïe, l'odorat & le goût pris enſemble.

L'œil peut donc être regardé comme une continuation du ſens intérieur ; ce n'eſt, comme nous l'avons dit à l'article des ſens, qu'un gros nerf épanoui, un prolongement de l'organe dans lequel réſide le ſens intérieur de l'animal ; il n'eſt donc pas étonnant qu'il approche plus qu'aucun autre ſens de la nature de ce ſens intérieur : en effet, non ſeulement ſes ébranlemens ſont plus durables, comme dans le ſens intérieur, mais il a encore des propriétés éminentes au deſſus des autres ſens, & ces propriétés ſont ſemblables à celles du ſens intérieur.

L'œil rend au dehors les impreſſions intérieures, il exprime le deſir que l'objet agréable qui vient de le frapper a fait naître ; c'eſt, comme le ſens intérieur, un

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 47 sur 615

ſens actif; tous les autres ſens au contraire ſont preſque purement paſſifs, ce ſont de ſimples organes faits pour recevoir les impreſſions extérieures, mais incapables de les conſerver, & plus encore de les réfléchir au dehors. L'œil les réfléchit, parce qu'il les conſerve; & il les conſerve, parce que les ébranlemens dont il eſt affecté ſont durables, au lieu que ceux des autres ſens naiſſent & finiſſent preſque dans le même inſtant.

Cependant lorſqu'on ébranle très-fortement & très-long-temps quelque ſens que ce ſoit, l'ébranlement ſubſiſte & continue long-temps après l'action de l'objet extérieur. Lorſque l'œil eſt frappé par une lumière trop vive ou lorſqu'il ſe fixe trop long-temps ſur un objet, ſi la couleur de cet objet eſt éclatante, il reçoit une impreſſion ſi profonde & ſi durable, qu'il porte enſuite l'image de cet objet ſur tous les autres objets. Si l'on regarde le ſoleil un inſtant, on verra pendant pluſieurs minutes, & quelquefois pendant pluſieurs heures, & même pluſieurs jours, l'image du diſque du ſoleil ſur tous les autres objets. Lorſque l'oreille a été ébranlée pendant quelques heures de ſuite par le même air de muſique, par des ſons forts auxquels on aura fait attention, comme par des hautbois ou par des cloches, l'ébranlement ſubſiſte, on continue d'entendre les cloches & les hautbois, l'impreſſion dure quelquefois pluſieurs jours, & ne s'efface que peu à peu. De même lorſque l'odorat & le goût ont été affectés par une odeur très-forte & par une ſaveur très-deſagréable,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 48 sur 615

on ſent encore long-temps après cette mauvaiſe odeur ou ce mauvais goût: & enfin lorſqu'on exerce trop le ſens du toucher ſur le même objet, lorſqu'on applique fortement un corps étranger ſur quelque partie de notre corps, l'impreſſion ſubſiſte auſſi pendant quelque temps, & il nous ſemble encore toucher & être touché.

Tous les ſens ont donc la faculté de conſerver plus ou moins les impreſſions des cauſes extérieures, mais l'œil l'a plus que les autres ſens; & le cerveau, où réſide le ſens intérieur de l'animal, a éminemment cette propriété, non ſeulement il conſerve les impreſſions qu'il a reçûes, mais il en propage l'action en communiquant aux nerfs les ébranlemens. Les organes des ſens extérieurs, le cerveau qui eſt l'organe du ſens intérieur, la moëlle épinière, & les nerfs qui ſe répandent dans toutes les parties du corps animal, doivent être regardés comme faiſant un corps continu, comme une machine organique dans laquelle les ſens ſont les parties ſur leſquelles s'appliquent les forces ou les puiſſances extérieures; le cerveau eſt l'hypomochlion ou la maſſe d'appui, & les nerfs ſont les parties que l'action des puiſſances met en mouvement. Mais ce qui rend cette machine ſi différente des autres machines, c'eſt que l'hypomochlion eſt non ſeulement capable de réſiſtance & de réaction, mais qu'il eſt lui-même actif, parce qu'il conſerve long-temps l'ébranlement qu'il a reçû; & comme cet organe intérieur, le cerveau & les membranes qui l'environnent, eſt d'une très-grande capacité

& d'une très-grande ſenſibilité, il peut recevoir un très-grand nombre d'ébranlemens ſucceſſifs & contemporains, & les conſerver dans l'ordre où il les a reçûs, parce que chaque impreſſion n'ébranle qu'une partie du cerveau, & que les impreſſions ſucceſſives ébranlent différemment la même partie, & peuvent ébranler auſſi des parties voiſines & contigues.

Si nous ſuppoſions un animal qui n'eût point de cerveau, mais qui eût un ſens extérieur fort ſenſible & fort étendu, un œil, par exemple, dont la rétine eût une auſſi grande étendue que celle du cerveau, & eût en même temps cette propriété du cerveau de conſerver long-temps les impreſſions qu'elle auroit reçûes; il eſt certain qu'avec un tel ſens l'animal verroit en même temps, non ſeulement les objets qui le frapperoient actuellement, mais encore tous ceux qui l'auroient frappé auparavant, parce que dans cette ſuppoſition les ébranlemens ſubſiſtant toûjours, & la capacité de la rétine étant aſſez grande pour les recevoir dans des parties différentes, il apercevroit également & en même temps les premières & les dernières images; & voyant ainſi le paſſé & le préſent du même coup d'œil, il ſeroit déterminé méchaniquement à faire telle ou telle action en conſéquence du degré de force & du nombre plus ou moins grand des ébranlemens produits par les images relatives ou contraires à cette détermination. Si le nombre des images propres à faire naître l'appétit, ſurpaſſe celui des images propres à faire naître la

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 50 sur 615

répugnance, l'animal ſera néceſſairement déterminé à faire un mouvement pour ſatisfaire cet appétit; & ſi le nombre ou la force des images d'appétit ſont égaux au nombre ou à la force des images de répugnance, l'animal ne ſera pas déterminé, il demeurera en équilibre entre ces deux puiſſances égales, & il ne fera aucun mouvement, ni pour atteindre ni pour éviter. Je dis que ceci ſe fera méchaniquement & ſans que la mémoire y ait aucune part; car l'animal voyant en même temps toutes les images, elles agiſſent par conſéquent toutes en même temps: celles qui ſont relatives à l'appétit ſe réuniſſent & s'oppoſent à celles qui ſont relatives à la répugnance, & c'eſt par la prépondérance, ou pluſtôt par l'excès de la force & du nombre des unes ou des autres, que l'animal ſeroit dans cette ſuppoſition néceſſairement déterminé à agir de telle ou telle façon.

Ceci nous fait voir que dans l'animal le ſens intérieur ne diffère des ſens extérieurs que par cette propriété qu'a le ſens intérieur de conſerver les ébranlemens, les impreſſions qu'il a reçûes; cette propriété ſeule eſt ſuffiſante pour expliquer toutes les actions des animaux & nous donner quelque idée de ce qui ſe paſſe dans leur intérieur; elle peut auſſi ſervir à démontrer la différence eſſentielle & infinie qui doit ſe trouver entre eux & nous, & en même temps à nous faire reconnoître ce que nous avons de commun avec eux.

Les animaux ont les ſens excellens, cependant ils ne les ont pas généralement tous auſſi bons que l'homme,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 51 sur 615

& il faut obſerver que les degrés d'excellence des ſens ſuivent dans l'animal un autre ordre que dans l'homme. Le ſens le plus relatif à la penſée & à la connoiſſance eſt le toucher; l'homme, comme nous l'avons prouvé *, a ce ſens plus parfait que les animaux. L'odorat eſt le ſens le plus relatif à l'inſtinct, à l'appétit; l'animal a ce ſens infiniment meilleur que l'homme: auſſi l'homme doit plus connoître qu'appéter, & l'animal doit plus appéter que connoître. Dans l'homme, le premier des ſens pour l'excellence eſt le toucher, & l'odorat eſt le dernier; dans l'animal, l'odorat eſt le premier des ſens, & le toucher eſt le dernier; cette différence eſt relative à la nature de l'un & de l'autre. Le ſens de la vûe ne peut avoir de ſûreté, & ne peut ſervir à la connoiſſance que par le ſecours du ſens du toucher; auſſi le ſens de la vûe eſt-il plus imparfait, ou pluſtôt acquiert moins de perfection dans l'animal que dans l'homme. L'oreille, quoique peut-être auſſi bien conformée dans l'animal que dans l'homme, lui eſt cependant beaucoup moins utile par le défaut de la parole, qui dans l'homme eſt une dépendance du ſens de l'ouïe, un organe de communication, organe qui rend ce ſens actif, au lieu que dans l'animal l'ouïe eſt un ſens preſque entièrement paſſif. L'homme a donc le toucher, l'œil & l'oreille plus parfaits, & l'odorat plus imparfait que l'animal; & comme le goût eſt un odorat intérieur, & qu'il eſt

* Voyez le traité des Sens, vol. III de cette Hiſtoire Naturelle, *page 352.*

encore plus relatif à l'appétit qu'aucun des autres ſens; on peut croire que l'animal a auſſi ce ſens plus ſûr & peut-être plus exquis que l'homme : on pourroit le prouver par la répugnance invincible que les animaux ont pour certains alimens, & par l'appétit naturel, qui les porte à choiſir, ſans ſe tromper, ceux qui leur conviennent, au lieu que l'homme, s'il n'étoit averti, mangeroit le fruit du mancenillier comme la pomme, & la cigue comme le perſil.

L'excellence des ſens vient de la Nature, mais l'art & l'habitude peuvent leur donner auſſi un plus grand degré de perfection; il ne faut pour cela que les exercer ſouvent & long-temps ſur les mêmes objets : un peintre accoûtumé à conſidérer attentivement les formes, verra du premier coup d'œil une infinité de nuances & de différences qu'un autre homme ne pourra ſaiſir qu'avec beaucoup de temps, & que même il ne pourra peut-être ſaiſir. Un Muſicien, dont l'oreille eſt continuellement exercée à l'harmonie, ſera vivement choqué d'une diſſonance; une voix fauſſe, un ſon aigre l'offenſera, le bleſſera ; ſon oreille eſt un inſtrument qu'un ſon diſcordant démonte & deſaccorde. L'œil du Peintre eſt un tableau où les nuances les plus légères ſont ſenties, où les traits les plus délicats ſont tracés. On perfectionne auſſi les ſens, & même l'appétit des animaux; on apprend aux oiſeaux à répéter des paroles & des chants; on augmente l'ardeur d'un chien pour la chaſſe en lui faiſant curée.

Mais

Mais cette excellence des ſens & la perfection même qu'on peut leur donner, n'ont des effets bien ſenſibles que dans l'animal; il nous paroîtra d'autant plus actif & plus intelligent, que ſes ſens ſeront meilleurs ou plus perfectionnés. L'homme au contraire n'en eſt pas plus raiſonnable, pas plus ſpirituel, pour avoir beaucoup exercé ſon oreille & ſes yeux. On ne voit pas que les perſonnes qui ont les ſens obtus, la vûe courte, l'oreille dure, l'odorat détruit ou inſenſible, aient moins d'eſprit que les autres; preuve évidente qu'il y a dans l'homme quelque choſe de plus qu'un ſens intérieur animal: celui-ci n'eſt qu'un organe matériel, ſemblable à l'organe des ſens extérieurs, & qui n'en diffère que parce qu'il a la propriété de conſerver les ébranlemens qu'il a reçûs: l'ame de l'homme au contraire eſt un ſens ſupérieur, une ſubſtance ſpirituelle, entièrement différente, par ſon eſſence & par ſon action, de la nature des ſens extérieurs.

Ce n'eſt pas qu'on puiſſe nier pour cela qu'il y ait dans l'homme un ſens interieur matériel, relatif, comme dans l'animal, aux ſens extérieurs, l'inſpection ſeule le démontre: la conformité des organes dans l'un & dans l'autre, le cerveau qui eſt dans l'homme comme dans l'animal, & qui même eſt d'une plus grande étendue, relativement au volume du corps, ſuffiſent pour aſſurer dans l'homme l'exiſtence de ce ſens intérieur matériel. Mais ce que je prétends, c'eſt que ce ſens eſt infiniment ſubordonné à l'autre; la ſubſtance ſpirituelle le

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 54 sur 615

commande, elle en détruit ou en fait naître l'action : ce ſens, en un mot, qui fait tout dans l'animal, ne fait dans l'homme que ce que le ſens ſupérieur n'empêche pas ; il fait auſſi ce que le ſens ſupérieur ordonne. Dans l'animal ce ſens eſt le principe de la détermination du mouvement & de toutes les actions, dans l'homme ce n'en eſt que le moyen ou la cauſe ſecondaire.

Développons, autant qu'il nous ſera poſſible, ce point important ; voyons ce que ce ſens intérieur matériel peut produire : lorſque nous aurons fixé l'étendue de la ſphère de ſon activité, tout ce qui n'y ſera pas compris dépendra néceſſairement du ſens ſpirituel : l'ame fera tout ce que ce ſens matériel ne peut faire. Si nous établiſſons des limites certaines entre ces deux puiſſances, nous reconnoîtrons clairement ce qui appartient à chacune ; nous diſtinguerons aiſément ce que les animaux ont de commun avec nous, & ce que nous avons au deſſus d'eux.

Le ſens intérieur matériel reçoit également toutes les impreſſions que chacun des ſens extérieurs lui tranſmet : ces impreſſions viennent de l'action des objets, elles ne font que paſſer par les ſens extérieurs, & ne produiſent dans ces ſens qu'un ébranlement très-peu durable, &, pour ainſi dire, inſtantané ; mais elles s'arrêtent ſur le ſens intérieur, & produiſent dans le cerveau, qui en eſt l'organe, des ébranlemens durables & diſtincts. Ces ébranlemens ſont agréables ou deſagréables,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 55 sur 615

c'eſt-à-dire, ſont relatifs ou contraires à la nature de l'animal, & font naître l'appétit ou la répugnance, ſelon l'état & la diſpoſition préſente de l'animal. Prenons un animal au moment de ſa naiſſance; dès que par les ſoins de la mère il ſe trouve débarraſſé de ſes enveloppes, qu'il a commencé à reſpirer & que le beſoin de prendre de la nourriture ſe fait ſentir, l'odorat, qui eſt le ſens de l'appétit, reçoit les émanations de l'odeur du lait qui eſt contenu dans les mamelles de la mère: ce ſens ébranlé par les particules odorantes, communique cet ébranlement au cerveau, & le cerveau agiſſant à ſon tour ſur les nerfs, l'animal fait des mouvemens & ouvre la bouche pour ſe procurer cette nourriture dont il a beſoin. Le ſens de l'appétit étant bien plus obtus dans l'homme que dans l'animal, l'enfant nouveau-né ne ſent que le beſoin de prendre de la nourriture, il l'annonce par des cris; mais il ne peut ſe la procurer ſeul, il n'eſt point averti par l'odorat, rien ne peut déterminer ſes mouvemens pour trouver cette nourriture; il faut l'approcher de la mamelle, & la lui faire ſentir & toucher avec la bouche: alors ces ſens ébranlés communiqueront leur ébranlement à ſon cerveau, & le cerveau agiſſant ſur les nerfs, l'enfant fera les mouvemens néceſſaires pour recevoir & ſuccer cette nourriture. Ce ne peut être que par l'odorat & par le goût, c'eſt-à-dire, par les ſens de l'appétit, que l'animal eſt averti de la préſence de la nourriture & du lieu où il faut la chercher: ſes yeux ne ſont point encore ouverts,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 56 sur 615

& le fuſſent-ils, ils ſeroient, dans ces premiers inſtans, inutiles à la détermination du mouvement. L'œil, qui eſt un ſens plus relatif à la connoiſſance qu'à l'appétit, eſt ouvert dans l'homme au moment de ſa naiſſance, & demeure dans la pluſpart des animaux fermé pour pluſieurs jours. Les ſens de l'appétit, au contraire, ſont bien plus parfaits & bien plus développés dans l'animal que dans l'enfant : autre preuve que dans l'homme les organes de l'appétit ſont moins parfaits que ceux de la connoiſſance, & que dans l'animal ceux de la connoiſſance le ſont moins que ceux de l'appétit.

Les ſens relatifs à l'appétit ſont donc plus développés dans l'animal qui vient de naître, que dans l'enfant nouveau-né. Il en eſt de même du mouvement progreſſif & de tous les autres mouvemens extérieurs : l'enfant peut à peine mouvoir ſes membres, il ſe paſſera beaucoup de temps avant qu'il ait la force de changer de lieu ; le jeune animal au contraire acquiert en très-peu de temps toutes ces facultés : comme elles ne ſont dans l'animal que relatives à l'appétit, que cet appétit eſt véhément & promptement développé, & qu'il eſt le principe unique de la détermination de tous les mouvemens ; que dans l'homme au contraire l'appétit eſt foible, ne ſe développe que plus tard, & ne doit pas influer autant que la connoiſſance, ſur la détermination des mouvemens ; l'homme eſt à cet égard plus tardif que l'animal.

Tout concourt donc à prouver, même dans le phyſique,

que l'animal n'eſt remué que par l'appétit, & que l'homme eſt conduit par un principe ſupérieur : s'il y a toûjours eu du doute ſur ce ſujet, c'eſt que nous ne concevons pas bien comment l'appétit ſeul peut produire dans l'animal des effets ſi ſemblables à ceux que produit chez nous la connoiſſance ; & que d'ailleurs nous ne diſtinguons pas aiſément ce que nous faiſons en vertu de la connoiſſance, de ce que nous ne faiſons que par la force de l'appétit. Cependant il me ſemble qu'il n'eſt pas impoſſible de faire diſparoître cette incertitude, & même d'arriver à la conviction, en employant le principe que nous avons établi. Le ſens intérieur matériel, avons-nous dit, conſerve long-temps les ébranlemens qu'il a reçûs ; ce ſens exiſte dans l'animal, & le cerveau en eſt l'organe, ce ſens reçoit toutes les impreſſions que chacun des ſens extérieurs lui tranſmet : lorſqu'une cauſe extérieure, un objet de quelque nature qu'il ſoit, exerce donc ſon action ſur les ſens extérieurs, cette action produit un ébranlement durable dans le ſens intérieur, cet ébranlement communique du mouvement à l'animal ; ce mouvement ſera déterminé, ſi l'impreſſion vient des ſens de l'appétit, car l'animal avancera pour atteindre, ou ſe détournera pour éviter l'objet de cette impreſſion, ſelon qu'il en aura été flatté ou bleſſé ; ce mouvement peut auſſi être incertain, lorſqu'il ſera produit par les ſens qui ne ſont pas relatifs à l'appétit, comme l'œil & l'oreille. L'animal qui voit ou qui entend pour la première fois, eſt à la vérité ébranlé par la lumière ou par

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 58 sur 615

le ſon ; mais l'ébranlement ne produira d'abord qu'un mouvement incertain, parce que l'impreſſion de la lumière ou du ſon n'eſt nullement relative à l'appétit ; ce n'eſt que par des actes répétés, & lorſque l'animal aura joint aux impreſſions du ſens de la vûe ou de l'ouïe celles de l'odorat, du goût ou du toucher, que le mouvement deviendra déterminé, & qu'en voyant un objet ou en entendant un ſon, il avancera pour atteindre, ou reculera pour éviter la choſe qui produit ces impreſſions devenues par l'expérience relatives à ſes appétits.

Pour nous faire mieux entendre, conſidérons un animal inſtruit, un chien, par exemple, qui quoique preſſé d'un violent appétit, ſemble n'oſer toucher & ne touche point en effet à ce qui pourroit le ſatisfaire, mais en même temps fait beaucoup de mouvemens pour l'obtenir de la main de ſon maître ; cet animal ne paroît-il pas combiner des idées ? ne paroît-il pas deſirer & craindre, en un mot raiſonner à peu près comme un homme qui voudroit s'emparer du bien d'autrui, & qui, quoique violemment tenté, eſt retenu par la crainte du châtiment ? voilà l'interprétation vulgaire de la conduite de l'animal. Comme c'eſt de cette façon que la choſe ſe paſſe chez nous, il eſt naturel d'imaginer, & on imagine en effet, qu'elle ſe paſſe de même dans l'animal : l'analogie, dit-on, eſt bien fondée, puiſque l'organiſation & la conformation des ſens, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ſont ſemblables dans l'animal & dans l'homme. Cependant ne devrions-nous pas voir que pour que cette

analogie fût en effet bien fondée, il faudroit quelque choſe de plus, qu'il faudroit du moins que rien ne pût la démentir, qu'il ſeroit néceſſaire que les animaux puſſent faire, & fiſſent dans quelques occaſions, tout ce que nous faiſons ! or le contraire eſt évidemment démontré ; ils n'inventent, ils ne perfectionnent rien, ils ne réfléchiſſent par conſéquent ſur rien, ils ne font jamais que les mêmes choſes, de la même façon : nous pouvons donc déjà rabattre beaucoup de la force de cette analogie, nous pouvons même douter de ſa réalité, & nous devons chercher ſi ce n'eſt pas par un autre principe différent du nôtre qu'ils ſont conduits, & ſi leurs ſens ne ſuffiſent pas pour produire leurs actions, ſans qu'il ſoit néceſſaire de leur accorder une connoiſſance de réflexion.

Tout ce qui eſt relatif à leur appétit ébranle très-vivement leur ſens intérieur, & le chien ſe jetteroit à l'inſtant ſur l'objet de cet appétit, ſi ce même ſens intérieur ne conſervoit pas les impreſſions antérieures de douleur dont cette action a été précédemment accompagnée ; les impreſſions extérieures ont modifié l'animal, cette proie qu'on lui préſente n'eſt pas offerte à un chien ſimplement, mais à un chien battu ; & comme il a été frappé toutes les fois qu'il s'eſt livré à ce mouvement d'appétit, les ébranlemens de douleur ſe renouvellent en même temps que ceux de l'appétit ſe font ſentir, parce que ces deux ébranlemens ſe ſont toûjours faits enſemble. L'animal étant donc pouſſé tout-à-la-fois

par deux impulſions contraires qui ſe détruiſent mutuellement, il demeure en équilibre entre ces deux puiſſances égales, la cauſe déterminante de ſon mouvement étant contre-balancée, il ne ſe mouvra pas pour atteindre à l'objet de ſon appétit. Mais les ébranlemens de l'appétit & de la répugnance, ou, ſi l'on veut, du plaiſir & de la douleur, ſubſiſtant toûjours enſemble dans une oppoſition qui en détruit les effets, il ſe renouvelle en même temps dans le cerveau de l'animal un troiſième ébranlement, qui a ſouvent accompagné les deux premiers; c'eſt l'ébranlement cauſé par l'action de ſon maître, de la main duquel il a ſouvent reçû ce morceau qui eſt l'objet de ſon appétit; & comme ce troiſième ébranlement n'eſt contre-balancé par rien de contraire, il devient la cauſe déterminante du mouvement. Le chien ſera donc déterminé à ſe mouvoir vers ſon maître & à s'agiter juſqu'à ce que ſon appétit ſoit ſatisfait en entier.

On peut expliquer de la même façon, & par les mêmes principes toutes les actions des animaux, quelque compliquées qu'elles puiſſent paroître, ſans qu'il ſoit beſoin de leur accorder, ni la penſée, ni la réflexion, leur ſens intérieur ſuffit pour produire tous leurs mouvemens. Il ne reſte plus qu'une choſe à éclaircir, c'eſt la nature de leurs ſenſations, qui doivent être, ſuivant ce que nous venons d'établir, bien différentes des nôtres. Les animaux, nous dira-t-on, n'ont-ils donc aucune connoiſſance! leur ôtez-vous la conſcience de leur

leur exiſtence, le ſentiment! puiſque vous prétendez expliquer méchaniquement toutes leurs actions, ne les réduiſez-vous pas à n'être que de ſimples machines, que d'inſenſibles automates!

Si je me ſuis bien expliqué, on doit avoir déjà vû que bien loin de tout ôter aux animaux, je leur accorde tout, à l'exception de la penſée & de la réflexion; ils ont le ſentiment, ils l'ont même à un plus haut degré que nous ne l'avons; ils ont auſſi la conſcience de leur exiſtence actuelle, mais ils n'ont pas celle de leur exiſtence paſſée; ils ont des ſenſations, mais il leur manque la faculté de les comparer, c'eſt-à-dire, la puiſſance qui produit des idées; car les idées ne ſont que des ſenſations comparées, ou, pour mieux dire, des aſſociations de ſenſations.

Conſidérons en particulier chacun de ces objets. Les animaux ont le ſentiment, même plus exquis que nous ne l'avons: je crois ceci déjà prouvé par ce que nous avons dit de l'excellence de ceux de leurs ſens qui ſont relatifs à l'appétit; par la répugnance naturelle & invincible qu'ils ont pour de certaines choſes, & l'appétit conſtant & décidé qu'ils ont pour d'autres choſes; par cette faculté qu'ils ont bien ſupérieurement à nous, de diſtinguer ſur le champ & ſans aucune incertitude ce qui leur convient de ce qui leur eſt nuiſible. Les animaux ont donc comme nous de la douleur & du plaiſir; ils ne connoiſſent pas le bien & le mal, mais ils le ſentent: ce qui leur eſt agréable eſt bon, ce qui leur

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 62 sur 615

eſt deſagréable eſt mauvais ; l'un & l'autre ne ſont que des rapports convenables ou contraires à leur nature, à leur organiſation. Le plaiſir que le chatouillement nous donne, la douleur que nous cauſe une bleſſure, ſont des douleurs & des plaiſirs qui nous ſont communs avec les animaux, puiſqu'ils dépendent abſolument d'une cauſe extérieure matérielle, c'eſt-à-dire, d'une action plus ou moins forte ſur les nerfs qui ſont les organes du ſentiment. Tout ce qui agit mollement ſur ces organes, tout ce qui les remue délicatement, eſt une cauſe de plaiſir ; tout ce qui les ébranle violemment, tout ce qui les agite fortement, eſt une cauſe de douleur. Toutes les ſenſations ſont donc des ſources de plaiſir tant qu'elles ſont douces, tempérées & naturelles ; mais dès qu'elles deviennent trop fortes, elles produiſent la douleur, qui, dans le phyſique, eſt l'extrême pluſtôt que le contraire du plaiſir.

En effet une lumière trop vive, un feu trop ardent, un trop grand bruit, une odeur trop forte, un mets inſipide ou groſſier, un frottement dur, nous bleſſent ou nous affectent deſagréablement ; au lieu qu'une couleur tendre, une chaleur tempérée, un ſon doux, un parfum délicat, une ſaveur fine, un attouchement léger nous flattent & ſouvent nous remuent délicieuſement. Tout effleurement des ſens eſt donc un plaiſir, & toute ſecouſſe forte, tout ébranlement violent, eſt une douleur ; & comme les cauſes qui peuvent occaſionner des commotions & des ébranlemens violens ſe trouvent plus

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 63 sur 615

rarement dans la Nature que celles qui produiſent des mouvemens doux & des effets modérés ; que d'ailleurs les animaux, par l'exercice de leurs ſens, acquièrent en peu de temps les habitudes non ſeulement d'éviter les rencontres offenſantes, & de s'éloigner des choſes nuiſibles, mais même de diſtinguer les objets qui leur conviennent & de s'en approcher; il n'eſt pas douteux qu'ils n'aient beaucoup plus de ſenſations agréables que de ſenſations deſagréables, & que la ſomme du plaiſir ne ſoit plus grande que celle de la douleur.

Si dans l'animal le plaiſir n'eſt autre choſe que ce qui flatte les ſens, & que dans le phyſique ce qui flatte les ſens ne ſoit que ce qui convient à la Nature ; ſi la douleur au contraire n'eſt que ce qui bleſſe les organes & ce qui répugne à la Nature; ſi, en un mot, le plaiſir eſt le bien & la douleur le mal phyſiques, on ne peut guère douter que tout être ſentant n'ait en général plus de plaiſir que de douleur : car tout ce qui eſt convenable à ſa nature, tout ce qui peut contribuer à ſa conſervation, tout ce qui ſoûtient ſon exiſtence eſt plaiſir; tout ce qui tend au contraire à ſa deſtruction, tout ce qui peut déranger ſon organiſation, tout ce qui change ſon état naturel, eſt douleur. Ce n'eſt donc que par le plaiſir qu'un être ſentant peut continuer d'exiſter ; & ſi la ſomme des ſenſations flatteuſes, c'eſt-à-dire, des effets convenables à ſa nature, ne ſurpaſſoit pas celle des ſenſations douloureuſes ou des effets qui lui ſont contraires, privé de plaiſir il languiroit d'abord faute de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 64 sur 615

bien ; chargé de douleur il périroit enſuite par l'abondance du mal.

Dans l'homme le plaiſir & la douleur phyſiques ne ſont que la moindre partie de ſes peines & de ſes plaiſirs, ſon imagination qui travaille continuellement fait tout, ou pluſtôt ne fait rien que pour ſon malheur; car elle ne préſente à l'ame que des fantômes vains ou des images exagérées, & la force à s'en occuper; plus agitée par ces illuſions qu'elle ne le peut être par les objets réels, l'ame perd ſa faculté de juger, & même ſon empire, elle ne compare que des chimères, elle ne veut plus qu'en ſecond, & ſouvent elle veut l'impoſſible ; ſa volonté qu'elle ne détermine plus lui devient donc à charge, ſes deſirs outrés ſont des peines, & ſes vaines eſpérances ſont tout au plus de faux plaiſirs qui diſparoiſſent & s'évanouiſſent dès que le calme ſuccède, & que l'ame prenant ſa place vient à les juger.

Nous nous préparons donc des peines toutes les fois que nous cherchons des plaiſirs ; nous ſommes malheureux dès que nous deſirons d'être plus heureux. Le bonheur eſt au dedans de nous-mêmes, il nous a été donné ; le malheur eſt au dehors & nous l'allons chercher. Pourquoi ne ſommes-nous pas convaincus que la jouiſſance paiſible de notre ame eſt notre ſeul & vrai bien, que nous pouvons l'augmenter ſans riſquer de le perdre, que moins nous deſirons & plus nous poſſédons ; qu'enfin tout ce que nous voulons au delà de ce

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 65 sur 615

que la Nature peut nous donner, eſt peine, & que rien n'eſt plaiſir que ce qu'elle nous offre.

Or la Nature nous a donné & nous offre encore à tout inſtant des plaiſirs ſans nombre; elle a pourvû à nos beſoins, elle nous a munis contre la douleur; il y a dans le phyſique infiniment plus de bien que de mal; ce n'eſt donc pas la réalité, c'eſt la chimère qu'il faut craindre; ce n'eſt, ni la douleur du corps, ni les maladies, ni la mort, mais l'agitation de l'ame, les paſſions & l'ennui qui ſont à redouter.

Les animaux n'ont qu'un moyen d'avoir du plaiſir, c'eſt d'exercer leur ſentiment pour ſatisfaire leur appétit; nous avons cette même faculté, & nous avons de plus un autre moyen de plaiſir, c'eſt d'exercer notre eſprit, dont l'appétit eſt de ſavoir. Cette ſource de plaiſirs ſeroit la plus abondante & la plus pure, ſi nos paſſions, en s'oppoſant à ſon cours, ne venoient à la troubler, elles détournent l'ame de toute contemplation; dès qu'elles ont pris le deſſus, la raiſon eſt dans le ſilence, ou du moins elle n'élève plus qu'une voix foible & ſouvent importune, le dégoût de la vérité ſuit, le charme de l'illuſion augmente, l'erreur ſe fortifie, nous entraîne & nous conduit au malheur: car quel malheur plus grand que de ne plus rien voir tel qu'il eſt, de ne plus rien juger que relativement à ſa paſſion, de n'agir que par ſon ordre, de paroître en conſéquence injuſte ou ridicule aux autres, & d'être forcé de ſe mépriſer ſoi-même lorſqu'on vient à s'examiner!

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 66 sur 615

Dans cet état d'illuſion & de ténèbres, nous voudrions changer la nature même de notre ame; elle ne nous a été donnée que pour connoître, nous ne voudrions l'employer qu'à ſentir; ſi nous pouvions étouffer en entier ſa lumière, nous n'en regréterions pas la perte, nous envierions volontiers le ſort des inſenſés: comme ce n'eſt plus que par intervalles que nous ſommes raiſonnables, & que ces intervalles de raiſon nous ſont à charge & ſe paſſent en reproches ſecrets, nous voudrions les ſupprimer; ainſi marchant toûjours d'illuſions en illuſions, nous cherchons volontairement à nous perdre de vûe pour arriver bien-tôt à ne nous plus connoître, & finir par nous oublier.

Une paſſion ſans intervalles eſt démence, & l'état de démence eſt pour l'ame un état de mort. De violentes paſſions avec des intervalles ſont des accès de folie, des maladies de l'ame d'autant plus dangereuſes qu'elles ſont plus longues & plus fréquentes. La ſageſſe n'eſt que la ſomme des intervalles de ſanté que ces accès nous laiſſent, cette ſomme n'eſt point celle de notre bonheur, car nous ſentons alors que notre ame a été malade, nous blâmons nos paſſions, nous condamnons nos actions. La folie eſt le germe du malheur, & c'eſt la ſageſſe qui le développe; la pluſpart de ceux qui ſe diſent malheureux ſont des hommes paſſionnés, c'eſt-à-dire, des fous, auxquels il reſte quelques intervalles de raiſon, pendant leſquels ils connoiſſent leur folie, & ſentent par conſéquent leur malheur; & comme il y a

dans les conditions élevées plus de faux deſirs, plus de vaines prétentions, plus de paſſions deſordonnées, plus d'abus de ſon ame, que dans les états inférieurs, les Grands ſont ſans doute de tous les hommes les moins heureux.

Mais détournons les yeux de ces triſtes objets & de ces vérités humiliantes, conſidérons l'homme ſage, le ſeul qui ſoit digne d'être conſidéré : maître de lui-même, il l'eſt des évènemens ; content de ſon état, il ne veut être que comme il a toûjours été, ne vivre que comme il a toûjours vécu ; ſe ſuffiſant à lui-même, il n'a qu'un foible beſoin des autres, il ne peut leur être à charge ; occupé continuellement à exercer les facultés de ſon ame, il perfectionne ſon entendement, il cultive ſon eſprit, il acquiert de nouvelles connoiſſances, & ſe ſatisfait à tout inſtant ſans remords, ſans dégoût, il jouit de tout l'Univers en jouiſſant de lui-même.

Un tel homme eſt ſans doute l'être le plus heureux de la Nature, il joint aux plaiſirs du corps, qui lui ſont communs avec les animaux, les joies de l'eſprit, qui n'appartiennent qu'à lui : il a deux moyens d'être heureux, qui s'aident & ſe fortifient mutuellement ; & ſi par un dérangement de ſanté, ou par quelque autre accident, il vient à reſſentir de la douleur, il ſouffre moins qu'un autre, la force de ſon ame le ſoûtient, la raiſon le conſole ; il a même de la ſatisfaction en ſouffrant, c'eſt de ſe ſentir aſſez fort pour ſouffrir.

La ſanté de l'homme eſt moins ferme & plus

chancelante que celle d'aucun des animaux, il eſt malade plus ſouvent & plus long-temps, il périt à tout âge, au lieu que les animaux ſemblent parcourir d'un pas égal & ferme l'eſpace de la vie. Cela me paroît venir de deux cauſes, qui, quoique bien différentes, doivent toutes deux contribuer à cet effet; la première eſt l'agitation de notre ame, elle eſt occaſionnée par le dérèglement de notre ſens intérieur matériel : les paſſions & les malheurs qu'elles entraînent influent ſur la ſanté, & dérangent les principes qui nous animent : ſi l'on obſervoit les hommes, on verroit que preſque tous mènent une vie ou timide ou contentieuſe, & que la pluſpart meurent de chagrin. La ſeconde eſt l'imperfection de ceux de nos ſens qui ſont relatifs à l'appétit. Les animaux ſentent bien mieux que nous ce qui convient à leur nature, ils ne ſe trompent pas dans le choix de leurs alimens, ils ne s'excèdent pas dans leurs plaiſirs; guidés par le ſeul ſentiment de leurs beſoins actuels, ils ſe ſatisfont ſans chercher à en faire naître de nouveaux. Nous, indépendamment de ce que nous voulons tout à l'excès, indépendamment de cette eſpèce de fureur avec laquelle nous cherchons à nous détruire en cherchant à forcer la nature, nous ne ſavons pas trop ce qui nous convient ou ce qui nous eſt nuiſible, nous ne diſtinguons pas bien les effets de telle ou telle nourriture, nous dédaignons les alimens ſimples, & nous leur préférons des mets compoſés, parce que nous avons corrompu notre goût, & que d'un ſens de plaiſir nous en

en avons fait un organe de débauche, qui n'eſt flatté que de ce qui l'irrite.

Il n'eſt donc pas étonnant que nous ſoyons, plus que les animaux, ſujets à des infirmités, puiſque nous ne ſentons pas auſſi-bien qu'eux ce qui nous eſt bon ou mauvais, ce qui peut contribuer à conſerver ou à détruire notre ſanté; que notre expérience eſt à cet égard bien moins ſûre que leur ſentiment; que d'ailleurs nous abuſons infiniment plus qu'eux, de ces mêmes ſens de l'appétit qu'ils ont meilleurs & plus parfaits que nous, puiſque ces ſens ne ſont pour eux que des moyens de conſervation & de ſanté, & qu'ils deviennent pour nous des cauſes de deſtruction & de maladies. L'intempérance détruit & fait languir plus d'hommes elle ſeule que tous les autres fléaux de la nature humaine réunis.

Toutes ces réflexions nous portent à croire que les animaux ont le ſentiment plus ſûr & plus exquis que nous ne l'avons, car quand même on voudroit m'oppoſer qu'il y a des animaux qu'on empoiſonne aiſément, que d'autres s'empoiſonnent eux-mêmes, & que par conſéquent ces animaux ne diſtinguent pas mieux que nous ce qui peut leur être contraire; je répondrai toûjours qu'ils ne prennent le poiſon qu'avec l'appas dont il eſt enveloppé ou avec la nourriture dont il ſe trouve environné; que d'ailleurs ce n'eſt que quand ils n'ont point à choiſir, quand la faim les preſſe, & quand le beſoin devient néceſſité, qu'ils dévorent en effet tout ce qu'ils trouvent ou tout ce qui leur eſt préſenté, &

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 70 sur 615

encore arrive-t-il que la pluſpart ſe laiſſent conſumer d'inanition & périr de faim, pluſtôt que de prendre des nourritures qui leur répugnent.

Les animaux ont donc le ſentiment, même à un plus haut degré que nous ne l'avons; je pourrois le prouver encore par l'uſage qu'ils font de ce ſens admirable, qui ſeul pourroit leur tenir lieu de tous les autres ſens. La pluſpart des animaux ont l'odorat ſi parfait qu'ils ſentent de plus loin qu'ils ne voient, non ſeulement ils ſentent de très-loin les corps préſens & actuels, mais ils en ſentent les émanations & les traces long-temps après qu'ils ſont abſens & paſſés. Un tel ſens eſt un organe univerſel de ſentiment, c'eſt un œil qui voit les objets, non ſeulement où ils ſont, mais même par-tout où ils ont été; c'eſt un organe de goût par lequel l'animal ſavoure non ſeulement ce qu'il peut toucher & ſaiſir, mais même ce qui eſt éloigné & qu'il ne peut atteindre; c'eſt le ſens par lequel il eſt le plus tôt, le plus ſouvent & le plus ſûrement averti, par lequel il agit, il ſe détermine, par lequel il reconnoît ce qui eſt convenable ou contraire à ſa nature, par lequel enfin il aperçoit, ſent & choiſit ce qui peut ſatisfaire ſon appétit.

Les animaux ont donc les ſens relatifs à l'appétit plus parfaits que nous ne les avons, & par conſéquent ils ont le ſentiment plus exquis & à un plus haut degré que nous ne l'avons; ils ont auſſi la conſcience de leur exiſtence actuelle, mais ils n'ont pas celle de leur

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 71 sur 615

exiſtence paſſée. Cette ſeconde propoſition mérite, comme la première, d'être conſidérée; je vais tâcher d'en prouver la vérité.

La conſcience de ſon exiſtence, ce ſentiment intérieur qui conſtitue le *moi*, eſt compoſé chez nous de la ſenſation de notre exiſtence actuelle, & du ſouvenir de notre exiſtence paſſée. Ce ſouvenir eſt une ſenſation toute auſſi préſente que la première, elle nous occupe même quelquefois plus fortement, & nous affecte plus puiſſamment que les ſenſations actuelles; & comme ces deux eſpèces de ſenſations ſont différentes, & que notre ame a la faculté de les comparer & d'en former des idées, notre conſcienee d'exiſtence eſt d'autant plus certaine & d'autant plus étendue, que nous nous repréſentons plus ſouvent & en plus grand nombre les choſes paſſées, & que par nos réflexions nous les comparons & les combinons davantage entre elles & avec les choſes préſentes. Chacun conſerve dans ſoi-même un certain nombre de ſenſations relatives aux différentes exiſtences, c'eſt-à-dire, aux différens états où l'on s'eſt trouvé; ce nombre de ſenſations eſt devenu une ſucceſſion & a formé une ſuite d'idées, par la comparaiſon que notre ame a faites de ces ſenſations entre elles. C'eſt dans cette comparaiſon de ſenſations que conſiſte l'idée du temps, & même toutes les autres idées ne ſont, comme nous l'avons déjà dit, que des ſenſations comparées. Mais cette ſuite de nos idées, cette chaîne de nos exiſtences, ſe préſente à nous ſouvent dans un

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 72 sur 615

ordre fort différent de celui dans lequel nos ſenſations nous ſont arrivées; c'eſt l'ordre de nos idées, c'eſt-à-dire, des comparaiſons que notre ame a faites de nos ſenſations, que nous voyons, & point du tout l'ordre de ces ſenſations, & c'eſt en cela principalement que conſiſte la différence des caractères & des eſprits; car de deux hommes que nous ſuppoſerons ſemblablement organiſés, & qui auront été élevés enſemble & de la même façon, l'un pourra penſer bien différemment de l'autre, quoique tous deux aient reçû leurs ſenſations dans le même ordre; mais comme la trempe de leurs ames eſt différente, & que chacune de ces ames a comparé & combiné ces ſenſations ſemblables, d'une manière qui lui eſt propre & particulière, le réſultat général de ces comparaiſons, c'eſt-à-dire, les idées, l'eſprit & le caractère acquis, ſeront auſſi différens.

Il y a quelques hommes dont l'activité de l'ame eſt telle qu'ils ne reçoivent jamais deux ſenſations ſans les comparer & ſans en former par conſéquent une idée; ceux-ci ſont les plus ſpirituels, & peuvent, ſuivant les circonſtances, devenir les premiers des hommes en tout genre. Il y en a d'autres en aſſez grand nombre dont l'ame moins active laiſſe échapper toutes les ſenſations qui n'ont pas un certain degré de force, & ne compare que celles qui l'ébranlent fortement; ceux-ci ont moins d'eſprit que les premiers, & d'autant moins que leur ame ſe porte moins fréquemment à comparer leurs ſenſations & à en former des idées; d'autres enfin, & c'eſt

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 73 sur 615

la multitude, ont ſi peu de vie dans l'ame, & une ſi grande indolence à penſer, qu'ils ne comparent & ne combinent rien, rien au moins du premier coup d'œil; il leur faut des ſenſations fortes & répétées mille & mille fois pour que leur ame vienne enfin à en comparer quelqu'une & à former une idée: ces hommes ſont plus ou moins ſtupides, & ſemblent ne différer des animaux que par ce petit nombre d'idées que leur ame a tant de peine à produire.

La conſcience de notre exiſtence étant donc compoſée, non ſeulement de nos ſenſations actuelles, mais même de la ſuite d'idées qu'a fait naître la comparaiſon de nos ſenſations & de nos exiſtences paſſées, il eſt évident que plus on a d'idées, & plus on eſt ſûr de ſon exiſtence; que plus on a d'eſprit, plus on exiſte; qu'enfin c'eſt par la puiſſance de réfléchir qu'a notre ame, & par cette ſeule puiſſance que nous ſommes certains de nos exiſtences paſſées & que nous voyons nos exiſtences futures, l'idée de l'avenir n'étant que la comparaiſon inverſe du préſent au paſſé, puiſque dans cette vûe de l'eſprit le préſent eſt paſſé, & l'avenir eſt préſent.

Cette puiſſance de réfléchir ayant été refuſée aux animaux. *, il eſt donc certain qu'ils ne peuvent former d'idées, & que par conſéquent leur conſcience d'exiſtence eſt moins ſûre & moins étendue que la nôtre;

* Voyez vol. 11 de cette Hiſtoire Naturelle, art. *de la nature de l'Homme.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 74 sur 615

car ils ne peuvent avoir aucune idée du temps, aucune connoiſſance du paſſé, aucune notion de l'avenir : leur conſcience d'exiſtence eſt ſimple, elle dépend uniquement des ſenſations qui les affectent actuellement, & conſiſte dans le ſentiment intérieur que ces ſenſations produiſent.

Ne pouvons-nous pas concevoir ce que c'eſt que cette conſcience d'exiſtence dans les animaux, en faiſant réflexion ſur l'état où nous nous trouvons lorſque nous ſommes fortement occupés d'un objet, ou violemment agités par une paſſion qui ne nous permet de faire aucune réflexion ſur nous-mêmes ! On exprime l'idée de cet état en diſant qu'on eſt hors de ſoi, & l'on eſt en effet hors de ſoi dès que l'on n'eſt occupé que des ſenſations actuelles, & l'on eſt d'autant plus hors de ſoi que ces ſenſations ſont plus vives, plus rapides, & qu'elles donnent moins de temps à l'ame pour les conſidérer : dans cet état nous nous ſentons, nous ſentons même le plaiſir & la douleur dans toutes leurs nuances ; nous avons donc alors le ſentiment, la conſcience de notre exiſtence, ſans que notre ame ſemble y participer. Cet état où nous ne nous trouvons que par inſtans, eſt l'état habituel des animaux ; privés d'idées & pourvûs de ſenſations, ils ne ſavent point qu'ils exiſtent, mais ils le ſentent.

Pour rendre plus ſenſible la différence que j'établis ici entre les ſenſations & les idées, & pour démontrer en même temps que les animaux ont des ſenſations &

qu'ils n'ont point d'idées, conſidérons en détail leurs facultés & les nôtres, & comparons leurs opérations à nos actions. Ils ont comme nous des ſens, & par conſéquent ils reçoivent les impreſſions des objets extérieurs; ils ont comme nous un ſens intérieur, un organe qui conſerve les ébranlemens cauſés par ces impreſſions, & par conſéquent ils ont des ſenſations qui, comme les nôtres, peuvent ſe renouveler, & ſont plus ou moins fortes & plus ou moins durables: cependant ils n'ont ni l'eſprit, ni l'entendement, ni la mémoire, comme nous l'avons, parce qu'ils nont pas la puiſſance de comparer leurs ſenſations, & que ces trois facultés de notre ame dépendent de cette puiſſance.

Les animaux nont pas la mémoire! le contraire paroît démontré, me dira-t-on; ne reconnoiſſent-ils pas après une abſence les perſonnes auprès deſquelles ils ont vécu, les lieux qu'ils ont habités, les chemins qu'ils ont parcourus! ne ſe ſouviennent-ils pas des châtimens qu'ils ont eſſuyés, des careſſes qu'on leur a faites, des leçons qu'on leur a données! Tout ſemble prouver qu'en leur ôtant l'entendement & l'eſprit, on ne peut leur refuſer la mémoire, & une mémoire active, étendue, & peut-être plus fidèle que la nôtre. Cependant, quelque grandes que ſoient ces apparences, & quelque fort que ſoit le préjugé quelles ont fait naître, je crois qu'on peut démontrer qu'elles nous trompent, & que les animaux n'ont aucune connoiſſance du paſſé, aucune idée du temps, & que par conſéquent ils n'ont pas la mémoire.

Chez nous la mémoire émane de la puiſſance de réfléchir, car le ſouvenir que nous avons des choſes paſſées ſuppoſe, non ſeulement la durée des ébranlemens de notre ſens intérieur matériel, c'eſt-à-dire, le renouvellement de nos ſenſations antérieures, mais encore les comparaiſons que notre ame a faites de ces ſenſations, c'eſt-à-dire, les idées qu'elle en a formées. Si la mémoire ne conſiſtoit que dans le renouvellement des ſenſations paſſées, ces ſenſations ſe repréſenteroient à notre ſens intérieur ſans y laiſſer une impreſſion déterminée; elles ſe préſenteroient ſans aucun ordre, ſans liaiſon entre elles, à peu près comme elles ſe préſentent dans l'ivreſſe ou dans certains rêves, où tout eſt ſi découſu, ſi peu ſuivi, ſi peu ordonné, que nous ne pouvons en conſerver le ſouvenir, car nous ne nous ſouvenons que des choſes qui ont des rapports avec celles qui les ont précédées ou ſuivies; & toute ſenſation iſolée, qui n'auroit aucune liaiſon avec les autres ſenſations, quelque forte qu'elle pût être, ne laiſſeroit aucune trace dans notre eſprit: or c'eſt notre ame qui établit ces rapports entre les choſes, par la comparaiſon qu'elle fait des unes avec les autres; c'eſt elle qui forme la liaiſon de nos ſenſations & qui ourdit la trame de nos exiſtences par un fil continu d'idées. La mémoire conſiſte donc dans une ſucceſſion d'idées, & ſuppoſe néceſſairement la puiſſance qui les produit.

Mais pour ne laiſſer, s'il eſt poſſible, aucun doute ſur ce point important, voyons quelle eſt l'eſpèce de

ſouvenir

ſouvenir que nous laiſſent nos ſenſations, lorſqu'elles n'ont point été accompagnées d'idées. La douleur & le plaiſir ſont de pures ſenſations, & les plus fortes de toutes, cependant lorſque nous voulons nous rappeler ce que nous avons ſenti dans les inſtans les plus vifs de plaiſir ou de douleur, nous ne pouvons le faire que foiblement, confuſément; nous nous ſouvenons ſeulement que nous avons été flattés ou bleſſés, mais notre ſouvenir n'eſt pas diſtinct, nous ne pouvons nous repréſenter, ni l'eſpèce, ni le degré, ni la durée de ces ſenſations qui nous ont cependant ſi fortement ébranlés, & nous ſommes d'autant moins capables de nous les repréſenter, qu'elles ont été moins répétées & plus rares. Une douleur, par exemple, que nous n'aurons éprouvée qu'une fois, qui n'aura duré que quelques inſtans, & qui ſera différente des douleurs que nous éprouvons habituellement, ſera néceſſairement bien-tôt oubliée, quelque vive qu'elle ait été; & quoique nous nous ſouvenions que dans cette circonſtance nous avons reſſenti une grande douleur, nous n'avons qu'une foible réminiſcence de la ſenſation même, tandis que nous avons une mémoire nette des circonſtances qui l'accompagnoient & du temps où elle nous eſt arrivée.

Pourquoi tout ce qui s'eſt paſſé dans notre enfance eſt-il preſque entièrement oublié? & pourquoi les vieillards ont-ils un ſouvenir plus préſent de ce qui leur eſt arrivé dans le moyen âge, que de ce qui leur arrive dans leur vieilleſſe? y a-t-il une meilleure preuve que

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 78 sur 615

les ſenſations toutes ſeules ne ſuffiſent pas pour produire la mémoire, & qu'elle n'exiſte en effet que dans la ſuite des idées que notre ame peut tirer de ces ſenſations! car dans l'enfance les ſenſations ſont auſſi & peut-être plus vives & plus rapides que dans le moyen âge, & cependant elles ne laiſſent que peu ou point de traces, parce qu'à cet âge la puiſſance de réfléchir, qui ſeule peut former des idées, eſt dans une inaction preſque totale, & que dans les momens où elle agit, elle ne compare que des ſuperficies, elle ne combine que de petites choſes pendant un petit temps, elle ne met rien en ordre, elle ne réduit rien en ſuite. Dans l'âge mûr, où la raiſon eſt entièrement développée, parce que la puiſſance de réfléchir eſt en entier exercice, nous tirons de nos ſenſations tout le fruit qu'elles peuvent produire, & nous nous formons pluſieurs ordres d'idées & pluſieurs chaînes de penſées dont chacune fait une trace durable, ſur laquelle nous repaſſons ſi ſouvent, qu'elle devient profonde, inéfaçable, & que pluſieurs années après, dans le temps de notre vieilleſſe, ces mêmes idées ſe préſentent avec plus de force que celles que nous pouvons tirer immédiatement des ſenſations actuelles, parce qu'alors ces ſenſations ſont foibles, lentes, émouſſées, & qu'à cet âge l'ame même participe à la langueur du corps. Dans l'enfance le temps préſent eſt tout, dans l'âge mûr on jouit également du paſſé, du préſent & de l'avenir, & dans la vieilleſſe on ſent peu le préſent, on détourne les yeux de l'avenir, & on

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 79 sur 615

ne vit que dans le paſſé. Ces différences ne dépendent-elles pas entièrement de l'ordonnance que notre ame a faite de nos ſenſations, & ne ſont-elles pas relatives au plus ou moins de facilité que nous avons dans ces différens âges à former, à acquerir & à conſerver des idées? L'enfant qui jaſe & le vieillard qui radote n'ont ni l'un ni l'autre le ton de la raiſon, parce qu'ils manquent également d'idées; le premier ne peut encore en former, & le ſecond n'en forme plus.

Un imbécille, dont les ſens & les organes corporels nous paroiſſent ſains & bien diſpoſés, a comme nous des ſenſations de toutes eſpèces, il les aura auſſi dans le même ordre s'il vit en ſociété & qu'on l'oblige à faire ce que font les autres hommes; cependant, comme ces ſenſations ne lui font point naître d'idées, qu'il n'y a point de correſpondance entre ſon ame & ſon corps, & qu'il ne peut réfléchir ſur rien, il eſt en conſéquence privé de la mémoire & de la connoiſſance de ſoi-même. Cet homme ne diffère en rien de l'animal, quant aux facultés extérieures, car quoiqu'il ait une ame, & que par conſéquent il poſsède en lui le principe de la raiſon, comme ce principe demeure dans l'inaction & qu'il ne reçoit rien des organes corporels avec leſquels il n'a aucune correſpondance, il ne peut influer ſur les actions de cet homme, qui dès-lors ne peut agir que comme un animal uniquement déterminé par ſes ſenſations & par le ſentiment de ſon exiſtence actuelle & de ſes beſoins préſens. Ainſi l'homme imbécille & l'animal

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 80 sur 615

ſont des êtres dont les réſultats & les opérations ſont les mêmes à tous égards, parce que l'un n'a point d'ame, & que l'autre ne s'en ſert point; tous deux manquent de la puiſſance de réfléchir, & n'ont par conſéquent ni entendement, ni eſprit, ni mémoire, mais tous deux ont des ſenſations, du ſentiment & du mouvement.

Cependant, me répétera-t-on toûjours, l'homme imbécille & l'animal n'agiſſent-ils pas ſouvent comme s'ils étoient déterminés par la connoiſſance des choſes paſſées? ne reconnoiſſent-ils pas les perſonnes avec leſquelles ils ont vécu, les lieux qu'ils ont habités, &c. ces actions ne ſuppoſent-elles pas néceſſairement la mémoire? & cela ne prouveroit-il pas au contraire qu'elle n'émane point de la puiſſance de réfléchir?

Si l'on a donné quelque attention à ce que je viens de dire, on aura déjà ſenti que je diſtingue deux eſpèces de mémoire infiniment différentes l'une de l'autre par leur cauſe, & qui peuvent cependant ſe reſſembler en quelque ſorte par leurs effets; la première eſt la trace de nos idées, & la ſeconde que j'appellerois volontiers réminiſcence pluſtôt que mémoire, n'eſt que le renouvellement de nos ſenſations, ou pluſtôt des ébranlemens qui les ont cauſées; la première émane de l'ame, &, comme je l'ai prouvé, elle eſt pour nous bien plus parfaite que la ſeconde; cette dernière au contraire n'eſt produite que par le renouvellement des ébranlemens du ſens intérieur matériel, & elle eſt la ſeule qu'on

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 81 sur 615

puiſſe accorder à l'animal ou à l'homme imbécille : leurs ſenſations antérieures ſont renouvelées par les ſenſations actuelles, elles ſe réveillent avec toutes les circonſtances qui les accompagnoient, l'image principale & préſente appelle les images anciennes & acceſſoires, ils ſentent comme ils ont ſenti, ils agiſſent donc comme ils ont agi, ils voient enſemble le préſent & le paſſé, mais ſans les diſtinguer, ſans les comparer, & par conſéquent ſans les connoître.

Une ſeconde objection qu'on me fera ſans doute, & qui n'eſt cependant qu'une conſéquence de la première, mais qu'on ne manquera pas de donner comme une autre preuve de l'exiſtence de la mémoire dans les animaux, ce ſont leurs rêves. Il eſt certain que les animaux ſe repréſentent dans le ſommeil les choſes dont ils ont été occupés pendant la veille; les chiens jappent ſouvent en dormant, & quoique cet aboiement ſoit ſourd & foible, on y reconnoît cependant la voix de la chaſſe, les accens de la colère, les ſons du deſir ou du murmure, &c. on ne peut donc pas douter qu'ils n'aient des choſes paſſées un ſouvenir très-vif, très-actif & différent de celui dont nous venons de parler, puiſqu'il ſe renouvelle indépendamment d'aucune cauſe extérieure qui pourroit y être relative.

Pour éclaircir cette difficulté & y répondre d'une manière ſatisfaiſante, il faut examiner la nature de nos rêves, & chercher s'ils viennent de notre ame ou s'ils dépendent ſeulement de notre ſens intérieur matériel;

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 82 sur 615

ſi nous pouvions prouver qu'ils y réſident en entier, ce ſeroit non ſeulement une réponſe à l'objection, mais une nouvelle démonſtration contre l'entendement & la mémoire des animaux.

Les imbécilles, dont l'ame eſt ſans action, rêvent comme les autres hommes; il ſe produit donc des rêves indépendamment de l'ame, puiſque dans les imbécilles l'ame ne produit rien : les animaux qui n'ont point d'ame peuvent donc rêver auſſi; & non ſeulement il ſe produit des rêves indépendamment de l'ame, mais je ſerois fort porté à croire que tous les rêves en ſont indépendans. Je demande ſeulement que chacun réfléchiſſe ſur ſes rêves, & tâche à reconnoître pourquoi les parties en ſont ſi mal liées & les évènemens ſi bizarres; il m'a paru que c'étoit principalement parce qu'ils ne roulent que ſur des ſenſations & point du tout ſur des idées. L'idée du temps, par exemple, n'y entre jamais, on ſe repréſente bien les perſonnes que l'on n'a pas vûes, & même celles qui ſont mortes depuis pluſieurs années, on les voit vivantes & telles qu'elles étoient, mais on les joint aux choſes actuelles & aux perſonnes préſentes, ou à des choſes & à des perſonnes d'un autre temps; il en eſt de même de l'idée du lieu, on ne voit pas où elles étoient; les choſes qu'on ſe repréſente, on les voit ailleurs, où elles ne pouvoient être : ſi l'ame agiſſoit, il ne lui faudroit qu'un inſtant pour mettre de l'ordre dans cette ſuite découſue, dans ce cahos de ſenſations; mais ordinairement elle n'agit point, elle laiſſe les

repréſentations ſe ſuccéder en deſordre, & quoique chaque objet ſe préſente vivement, la ſucceſſion en eſt ſouvent confuſe & toûjours chimérique ; & s'il arrive que l'ame ſoit à demi réveillée par l'énormité de ces diſparates, ou ſeulement par la force de ces ſenſations, elle jettera ſur le champ une étincelle de lumière au milieu des ténèbres, elle produira une idée réelle dans le ſein même des chimères ; on rêvera que tout cela pourroit bien n'être qu'un rêve, je devrois dire on penſera, car quoique cette action ne ſoit qu'un petit ſigne de l'ame, ce n'eſt point une ſenſation ni un rêve, c'eſt une penſée, une réflexion, mais qui n'étant pas aſſez forte pour diſſiper l'illuſion, s'y mêle, en devient partie, & n'empêche pas les repréſentations de ſe ſuccéder, en ſorte qu'au réveil on imagine avoir rêvé cela même qu'on avoit penſé.

Dans les rêves on voit beaucoup, on entend rarement, on ne raiſonne point, on ſent vivement, les images ſe ſuivent, les ſenſations ſe ſuccèdent ſans que l'ame les compare ni les réuniſſe; on n'a donc que des ſenſations & point d'idées, puiſque les idées ne ſont que les comparaiſons des ſenſations ; ainſi les rêves ne réſident que dans le ſens intérieur matériel, l'ame ne les produit point, ils feront donc partie de ce ſouvenir animal, de cette eſpèce de réminiſcence matérielle dont nous avons parlé : la mémoire au contraire ne peut exiſter ſans l'idée du temps, ſans la comparaiſon des idées antérieures & des idées actuelles, & puiſque ces

idées n'entrent point dans les rêves, il paroît démontré qu'ils ne peuvent être, ni une conſéquence, ni un effet, ni une preuve de la mémoire. Mais quand même on voudroit ſoûtenir qu'il y a quelquefois des rêves d'idées, quand on citeroit pour le prouver les ſomnambules, les gens qui parlent en dormant & diſent des choſes ſuivies, qui répondent à des queſtions, &c. & que l'on en infèreroit que les idées ne ſont pas exclues des rêves, du moins auſſi abſolument que je le prétends, il me ſuffiroit, pour ce que j'avois à prouver, que le renouvellement des ſenſations puiſſe les produire; car dès-lors les animaux n'auront que des rêves de cette eſpèce, & ces rêves, bien loin de ſuppoſer la mémoire, n'indiquent au contraire que la réminiſcence matérielle.

Cependant je ſuis bien éloigné de croire que les ſomnambules, les gens qui parlent en dormant, qui répondent à des queſtions, &c. ſoient en effet occupés d'idées: l'ame ne me paroît avoir aucune part à toutes ces actions; car les ſomnambules vont, viennent, agiſſent ſans réflexion, ſans connoiſſance de leur ſituation, ni du péril, ni des inconvéniens qui accompagnent leurs démarches, les ſeules facultés animales ſont en exercice, & même elles n'y ſont pas toutes; un ſomnambule eſt dans cet état plus ſtupide qu'un imbécille, parce qu'il n'y a qu'une partie de ſes ſens & de ſon ſentiment qui ſoit alors en exercice, au lieu que l'imbécille diſpoſe de tous ſes ſens, & jouit du ſentiment dans toute ſon étendue: & à l'égard des gens qui parlent en dormant, je ne crois

crois pas qu'ils diſent rien de nouveau; la réponſe à certaines queſtions triviales & uſitées, la répétition de quelques phraſes communes, ne prouvent pas l'action de l'ame, tout cela peut s'opérer indépendamment du principe de la connoiſſance & de la penſée. Pourquoi dans le ſommeil ne parleroit-on pas ſans penſer, puiſqu'en s'examinant ſoi-même lorſqu'on eſt le mieux éveillé, on s'aperçoit, ſur-tout dans les paſſions, qu'on dit tant de choſes ſans réflexion!

A l'égard de la cauſe occaſionnelle des rêves, qui fait que les ſenſations antérieures ſe renouvellent ſans être excitées par les objets préſens ou par des ſenſations actuelles, on obſervera que l'on ne rêve point lorſque le ſommeil eſt profond, tout eſt alors aſſoupi, on dort en dehors & en dedans; mais le ſens intérieur s'endort le dernier & ſe réveille le premier, parce qu'il eſt plus vif, plus actif, plus aiſé à ébranler que les ſens extérieurs; le ſommeil eſt dès-lors moins complet & moins profond, c'eſt-là le temps des ſonges illuſoires; les ſenſations antérieures, ſur-tout celles ſur leſquelles nous n'avons pas réfléchi ſe renouvellent; le ſens intérieur ne pouvant être occupé par des ſenſations actuelles à cauſe de l'inaction des ſens externes, agit & s'exerce ſur ſes ſenſations paſſées; les plus fortes ſont celles qu'il ſaiſit le plus ſouvent, plus elles ſont fortes, plus les ſituations ſont exceſſives, & c'eſt par cette raiſon que preſque tous les rêves ſont effroyables ou charmans.

Il n'eſt pas même néceſſaire que les ſens extérieurs

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 86 sur 615

ſoient abſolument aſſoupis pour que le ſens intérieur matériel puiſſe agir de ſon propre mouvement, il ſuffit qu'ils ſoient ſans exercice. Dans l'habitude où nous ſommes de nous livrer régulièrement à un repos anticipé, on ne s'endort pas toûjours aiſément; le corps & les membres mollement étendus ſont ſans mouvement; les yeux doublement voilés par la paupière & les ténèbres ne peuvent s'exercer; la tranquillité du lieu & le ſilence de la nuit rendent l'oreille inutile; les autres ſens ſont également inactifs, tout eſt en repos, & rien n'eſt encore aſſoupi: dans cet état, lorſqu'on ne s'occupe pas d'idées, & que l'ame eſt auſſi dans l'inaction, l'empire appartient au ſens intérieur matériel, il eſt alors la ſeule puiſſance qui agiſſe, c'eſt-là le temps des images chimériques, des ombres voltigeantes; on veille, & cependant on éprouve les effets du ſommeil: ſi l'on eſt en pleine ſanté, c'eſt une ſuite d'images agréables, d'illuſions charmantes; mais pour peu que le corps ſoit ſouffrant ou affaiſſé, les tableaux ſont bien différens, on voit des figures grimaçantes, des viſages de vieilles, des fantômes hideux qui ſemblent s'adreſſer à nous, & qui ſe ſuccèdent avec autant de bizarrerie que de rapidité, c'eſt la lanterne magique, c'eſt une ſcène de chimères qui rempliſſent le cerveau vuide alors de toute autre ſenſation, & les objets de cette ſcène ſont d'autant plus vifs, d'autant plus nombreux, d'autant plus deſagréables que les autres facultés animales ſont plus lézées, que les nerfs ſont plus délicats, & que l'on eſt plus foible, parce que

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 87 sur 615

les ébranlemens cauſés par les ſenſations réelles étant, dans cet état de foibleſſe ou de maladie, beaucoup plus forts & plus deſagréables que dans l'état de ſanté, les repréſentations de ces ſenſations, que produit le renouvellement de ces ébranlemens, doivent auſſi être plus vives & plus deſagréables.

Au reſte nous nous ſouvenons de nos rêves, par la même raiſon que nous nous ſouvenons des ſenſations que nous venons d'éprouver, & la ſeule différence qu'il y ait ici entre les animaux & nous, c'eſt que nous diſtinguons parfaitement ce qui appartient à nos rêves de ce qui appartient à nos idées ou à nos ſenſations réelles, & ceci eſt une comparaiſon, une opération de la mémoire, dans laquelle entre l'idée du temps; les animaux au contraire, qui ſont privés de la mémoire & de cette puiſſance de comparer les temps, ne peuvent diſtinguer leurs rêves de leurs ſenſations réelles, & l'on peut dire que ce qu'ils ont rêvé leur eſt effectivement arrivé.

Je crois avoir déjà prouvé d'une manière démonſtrative, dans ce que j'ai écrit* ſur la nature de l'homme, que les animaux n'ont pas la puiſſance de réfléchir; or l'entendement eſt, non ſeulement une faculté de cette puiſſance de réfléchir, mais c'eſt l'exercice même de cette puiſſance, c'en eſt le réſultat, c'eſt ce qui la manifeſte; ſeulement nous devons diſtinguer dans l'entendement deux opérations différentes, dont la première

* Voyez l'article de la nature de l'Homme, vol. II de cette Hiſtoire Naturelle.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 88 sur 615

ſert de baſe à la ſeconde & la précède néceſſairement, cette première action de la puiſſance de réfléchir eſt de comparer les ſenſations & d'en former des idées, & la ſeconde eſt de comparer les idées mêmes & d'en former des raiſonnemens : par la première de ces opérations nous acquérons des idées particulières & qui ſuffiſent à la connoiſſance de toutes les choſes ſenſibles, par la ſeconde, nous nous élevons à des idées générales, néceſſaires pour arriver à l'intelligence des choſes abſtraites. Les animaux n'ont ni l'une ni l'autre de ces facultés, parce qu'ils n'ont point d'entendement, & l'entendement de la pluſpart des hommes paroît être borné à la première de ces opérations.

Car ſi tous les hommes étoient également capables de comparer des idées, de les généraliſer & d'en former de nouvelles combinaiſons, tous manifeſteroient leur génie par des productions nouvelles, toûjours différentes de celles des autres, & ſouvent plus parfaites; tous auroient le don d'inventer, ou du moins les talens de perfectionner. Mais non; réduits à une imitation ſervile, la pluſpart des hommes ne font que ce qu'ils voient faire, ne penſent que de mémoire & dans le même ordre que les autres ont penſé; les formules, les méthodes, les métiers rempliſſent toute la capacité de leur entendement, & les diſpenſent de réfléchir aſſez pour créer.

L'imagination eſt auſſi une faculté de l'ame: ſi nous entendons par ce mot imagination la puiſſance que nous avons de comparer des images avec des idées, de

donner des couleurs à nos penſées, de repréſenter & d'agrandir nos ſenſations, de peindre le ſentiment, en un mot de ſaiſir vivement les circonſtances & de voir nettement les rapports éloignés des objets que nous conſidérons, cette puiſſance de notre ame en eſt même la qualité la plus brillante & la plus active, c'eſt l'eſprit ſupérieur, c'eſt le génie, les animaux en ſont encore plus dépourvûs que d'entendement & de mémoire; mais il y a une autre imagination, un autre principe qui dépend uniquement des organes corporels, & qui nous eſt commun avec les animaux; c'eſt cette action tumultueuſe & forcée qui s'excite au dedans de nous-mêmes par les objets analogues ou contraires à nos appétits; c'eſt cette impreſſion vive & profonde des images de ces objets, qui malgré nous ſe renouvelle à tout inſtant, & nous contraint d'agir comme les animaux, ſans réflexion, ſans déliberation; cette repréſentation des objets, plus active encore que leur préſence, exagère tout, falſifie tout. Cette imagination eſt l'ennemie de notre ame, c'eſt la ſource de l'illuſion, la mère des paſſions qui nous maitriſent, nous emportent malgré les efforts de la raiſon, & nous rendent le malheureux théatre d'un combat continuel, où nous ſommes preſque toûjours vaincus.

Homo duplex.

L'homme intérieur eſt double, il eſt compoſé de deux principes différens par leur nature, & contraires par leur

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 90 sur 615

action. L'ame, ce principe ſpirituel, ce principe de toute connoiſſance, eſt toûjours en oppoſition avec cet autre principe animal & purement matériel : le premier eſt une lumière pure qu'accompagnent le calme & la ſérénité, une ſource ſalutaire dont émanent la ſcience, la raiſon, la ſageſſe; l'autre eſt une fauſſe lueur qui ne brille que par la tempête & dans l'obſcurité, un torrent impétueux qui roule & entraîne à ſa ſuite les paſſions & les erreurs.

Le principe animal ſe développe le premier; comme il eſt purement matériel & qu'il conſiſte dans la durée des ébranlemens & le renouvellement des impreſſions formées dans notre ſens intérieur matériel par les objets analogues ou contraires à nos appétits, il commence à agir dès que le corps peut ſentir de la douleur ou du plaiſir ; il nous détermine le premier & auſſi-tôt que nous pouvons faire uſage de nos ſens. Le principe ſpirituel ſe manifeſte plus tard, il ſe développe, il ſe perfectionne au moyen de l'éducation; c'eſt par la communication des penſées d'autrui que l'enfant en acquiert & devient lui-même penſant & raiſonnable, & ſans cette communication il ne ſeroit que ſtupide ou fantaſque, ſelon le degré d'inaction ou d'activité de ſon ſens intérieur matériel.

Conſidérons un enfant lorſqu'il eſt en liberté & loin de l'œil de ſes maîtres, nous pouvons juger de ce qui ſe paſſe au dedans de lui par le réſultat de ſes actions extérieures, il ne penſe ni ne réfléchit à rien, il ſuit

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 91 sur 615

indifféremment toutes les routes du plaiſir, il obéit à toutes les impreſſions des objets extérieurs, il s'agite ſans raiſon, il s'amuſe, comme les jeunes animaux, à courir, à exercer ſon corps, il va, vient & revient ſans deſſein, ſans projet, il agit ſans ordre & ſans ſuite; mais bien-tôt, rappelé par la voix de ceux qui lui ont appris à penſer, il ſe compoſe, il dirige ſes actions, & donne des preuves qu'il a conſervé les penſées qu'on lui a communiquées. Le principe matériel domine donc dans l'enfance, & il continueroit de dominer & d'agir preſque ſeul pendant toute la vie, ſi l'éducation ne venoit à développper le principe ſpirituel & à mettre l'ame en exercice.

Il eſt aiſé, en rentrant dans ſoi-même, de reconnoître l'exiſtence de ces deux principes: il y a des inſtans dans la vie, il y a même des heures, des jours, des ſaiſons où nous pouvons juger, non ſeulement de la certitude de leur exiſtence, mais auſſi de leur contrariété d'action. Je veux parler de ces temps d'ennui, d'indolence, de dégoût où nous ne pouvons nous déterminer à rien, où nous voulons ce que nous ne faiſons pas & faiſons ce que nous ne voulons pas; de cet état ou de cette maladie à laquelle on a donné le nom de vapeurs, état où ſe trouvent ſi ſouvent les hommes oiſifs, & même les hommes qu'aucun travail ne commande. Si nous nous obſervons dans cet état, notre *moi*, nous paroîtra diviſé en deux perſonnes, dont la première, qui repréſente la faculté raiſonnable, blâme ce que fait la ſeconde, mais n'eſt pas aſſez forte pour s'y oppoſer efficacement

& la vaincre, au contraire cette dernière étant formée de toutes les illuſions de nos ſens & de notre imagination, elle contraint, elle enchaîne, & ſouvent elle accable la première, & nous fait agir contre ce que nous penſons, ou nous force à l'inaction, quoique nous ayons la volonté d'agir.

Dans le temps où la faculté raiſonnable domine, on s'occupe tranquillement de ſoi-même, de ſes amis, de ſes affaires, mais on s'aperçoit encore, ne fût-ce que par des diſtractions involontaires, de la préſence de l'autre principe, lorſque celui-ci vient à dominer à ſon tour, on ſe livre ardemment à la diſſipation, à ſes goûts, à ſes paſſions, & à peine réfléchit-on par inſtans ſur les objets mêmes qui nous occupent & qui nous rempliſſent tout entiers. Dans ces deux états nous ſommes heureux, dans le premier nous commandons avec ſatisfaction, & dans le ſecond nous obéiſſons encore avec plus de plaiſir; comme il n'y a que l'un des deux principes qui ſoit alors en action, & qu'il agit ſans oppoſition de la part de l'autre, nous ne ſentons aucune contrariété intérieure, notre *moi* nous paroît ſimple, parce que nous n'éprouvons qu'une impulſion ſimple, & c'eſt dans cette unité d'action que conſiſte notre bonheur : car pour peu que par des réflexions nous venions à blâmer nos plaiſirs, ou que par la violence de nos paſſions nous cherchions à haïr la raiſon, nous ceſſons dès-lors d'être heureux, nous perdons l'unité de notre exiſtence en quoi conſiſte notre tranquillité; la contrariété

contrariété intérieure ſe renouvelle, les deux perſonnes ſe repréſentent en oppoſition, & les deux principes ſe font ſentir & ſe manifeſtent par les doutes, les inquiétudes & les remords.

De-là on peut conclurre que le plus malheureux de tous les états eſt celui où ces deux puiſſances ſouveraines de la nature de l'homme ſont toutes deux en grand mouvement, mais en mouvement égal & qui fait équilibre; c'eſt-là le point de l'ennui le plus profond & de cet horrible dégoût de ſoi-même, qui ne nous laiſſe d'autre deſir que celui de ceſſer d'être, & ne nous permet qu'autant d'action qu'il en faut pour nous détruire, en tournant froidement contre nous des armes de fureur.

Quel état affreux! je viens d'en peindre la nuance la plus noire; mais combien n'y a-t-il pas d'autres ſombres nuances qui doivent la précéder! Toutes les ſituations voiſines de cette ſituation, tous les états qui approchent de cet état d'équilibre, & dans leſquels les deux principes oppoſés ont peine à ſe ſurmonter, & agiſſent en même temps & avec des forces preſque égales, ſont des temps de trouble, d'irréſolution & de malheur; le corps même vient à ſouffrir de ce deſordre & de ces combats intérieurs, il languit dans l'accablement, ou ſe conſume par l'agitation que cet état produit.

Le bonheur de l'homme conſiſtant dans l'unité de ſon intérieur, il eſt heureux dans le temps de l'enfance, parce que le principe matériel domine ſeul & agit preſque

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 94 sur 615

continuellement. La contrainte, les remontrances, & même les châtimens, ne ſont que de petits chagrins, l'enfant ne les reſſent que comme on ſent les douleurs corporelles, le fond de ſon exiſtence n'en eſt point affecté, il reprend dès qu'il eſt en liberté, toute l'action, toute la gaieté que lui donnent la vivacité & la nouveauté de ſes ſenſations : s'il étoit entièrement livré à lui-même, il ſeroit parfaitement heureux; mais ce bonheur ceſſeroit, il produiroit même le malheur pour les âges ſuivans ; on eſt donc obligé de contraindre l'enfant, il eſt triſte, mais néceſſaire de le rendre malheureux par inſtans, puiſque ces inſtans même de malheur ſont les germes de tout ſon bonheur à venir.

Dans la jeuneſſe, lorſque le principe ſpirituel commence à entrer en exercice & qu'il pourroit déjà nous conduire, il naît un nouveau ſens matériel qui prend un empire abſolu, & commande ſi impérieuſement à toutes nos facultés, que l'ame elle-même ſemble ſe prêter avec plaiſir aux paſſions impétueuſes qu'il produit : le principe matériel domine donc encore, & peut-être avec plus d'avantage que jamais; car non ſeulement il efface & ſoûmet la raiſon, mais il la pervertit & s'en ſert comme d'un moyen de plus; on ne penſe & on n'agit que pour approuver & pour ſatisfaite ſa paſſion : tant que cette ivreſſe dure, on eſt heureux, les contradictions & les peines extérieures ſemblent reſſerrer encore l'unité de l'intérieur, elles fortifient la paſſion, elles en rempliſſent les intervalles languiſſans, elles réveillent l'orgueil,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 95 sur 615

& achèvent de tourner toutes nos vûes vers le même objet & toutes nos puiſſances vers le même but.

Mais ce bonheur va paſſer comme un ſonge, le charme diſparoît, le dégoût ſuit, un vuide affreux ſuccède à la plénitude des ſentimens dont on étoit occupé. L'ame, au ſortir de ce ſommeil létargique, a peine à ſe reconnoître, elle a perdu par l'eſclavage l'habitude de commander, elle n'en a plus la force, elle regrette même la ſervitude, & cherche un nouveau maître, un nouvel objet de paſſion qui diſparoît bien-tôt à ſon tour, pour être ſuivi d'un autre qui dure encore moins : ainſi les excès & les dégoûts ſe multiplient, les plaiſirs fuient, les organes s'uſent, le ſens matériel, loin de pouvoir commander, n'a plus la force d'obéir. Que reſte-t-il à l'homme après une telle jeuneſſe! un corps énervé, une ame amollie, & l'impuiſſance de ſe ſervir de tous deux.

Auſſi a-t-on remarqué que c'eſt dans le moyen âge que les hommes ſont le plus ſujets à ces langueurs de l'ame, à cette maladie intérieure, à cet état de vapeurs dont j'ai parlé. On court encore à cet âge après les plaiſirs de la jeuneſſe, on les cherche par habitude & non par beſoin ; & comme à meſure qu'on avance il arrive toûjours plus fréquemment qu'on ſent moins le plaiſir que l'impuiſſance d'en jouir, on ſe trouve contredit par ſoi-même, humilié par ſa propre foibleſſe, ſi nettement & ſi ſouvent, qu'on ne peut s'empêcher de ſe blâmer, de condamner ſes actions, & de ſe reprocher même ſes deſirs.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 96 sur 615

D'ailleurs, c'eſt à cet âge que naiſſent les ſoucis & que la vie eſt la plus contentieuſe ; car on a pris un état, c'eſt-à-dire, qu'on eſt entré par haſard ou par choix dans une carrière qu'il eſt toûjours honteux de ne pas fournir, & ſouvent très-dangereux de remplir avec éclat. On marche donç péniblement entre deux écueils également formidables, le mépris & la haine, on s'affoiblit par les efforts qu'on fait pour les éviter, & l'on tombe dans le découragement ; car lorſqu'à force d'avoir vécu & d'avoir reconnu, éprouvé les injuſtices des hommes, on a pris l'habitude d'y compter comme ſur un mal néceſſaire, lorſqu'on s'eſt enfin accoûtumé à faire moins de cas de leurs jugemens que de ſon repos, & que le cœur endurci par les cicatrices mêmes des coups qu'on lui a portés, eſt devenu plus inſenſible, on arrive aiſément à cet état d'indifférence, à cette quiétude indolente, dont on auroit rougi quelques années auparavant. La gloire, ce puiſſant mobile de toutes les grandes ames, & qu'on voyoit de loin comme un but éclatant qu'on s'efforçoit d'atteindre par des actions brillantes & des travaux utiles, n'eſt plus qu'un objet ſans attraits pour ceux qui en ont approché, & un fantôme vain & trompeur pour les autres qui ſont reſtés dans l'éloignement. La pareſſe prend ſa place, & ſemble offrir à tous des routes plus aiſées & des biens plus ſolides, mais le dégoût la précède & l'ennui la ſuit, l'ennui, ce triſte tyran de toutes les ames qui penſent, contre lequel la ſageſſe peut moins que la folie.

C'eſt donc parce que la nature de l'homme eſt compoſée de deux principes oppoſés, qu'il a tant de peine à ſe concilier avec lui-même; c'eſt de-là que viennent ſon inconſtance, ſon irréſolution, ſes ennuis.

Les animaux au contraire, dont la nature eſt ſimple & purement matérielle, ne reſſentent ni combats intérieurs, ni oppoſition, ni trouble; ils n'ont ni nos regrets, ni nos remords, ni nos eſpérances, ni nos craintes.

Séparons de nous tout ce qui appartient à l'ame, ôtons-nous l'entendement, l'eſprit & la mémoire, ce qui nous reſtera ſera la partie matérielle par laquelle nous ſommes animaux, nous aurons encore des beſoins, des ſenſations, des appétits, nous aurons de la douleur & du plaiſir, nous aurons même des paſſions; car une paſſion eſt-elle autre choſe qu'une ſenſation plus forte que les autres, & qui ſe renouvelle à tout inſtant? or nos ſenſations pourront ſe renouveler dans notre ſens intérieur matériel; nous aurons donc toutes les paſſions, du moins toutes les paſſions aveugles que l'ame, ce principe de la connoiſſanc, ne peut ni produire, ni fomenter.

C'eſt ici le point le plus difficile: comment pourrons-nous, ſur-tout avec l'abus que l'on a fait des termes, nous faire entendre & diſtinguer nettement les paſſions qui n'appartiennent qu'à l'homme, de celles qui lui ſont communes avec les animaux? eſt-il certain, eſt-il croyable que les animaux puiſſent avoir des paſſions? n'eſt-il pas

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 98 sur 615

au contraire convenu que toute paſſion eſt une émotion de l'ame! doit-on par conſéquent chercher ailleurs que dans ce principe ſpirituel les germes de l'orgueil, de l'envie, de l'ambition, de l'avarice & de toutes les paſſions qui nous commandent!

Je ne ſais, mais il me ſemble que tout ce qui commande à l'ame eſt hors d'elle, il me ſemble que le principe de la connoiſſance n'eſt point celui du ſentiment, il me ſemble que le germe de nos paſſions eſt dans nos appétits, que les illuſions viennent de nos ſens & réſident dans notre ſens intérieur matériel, que d'abord l'ame n'y a de part que par ſon ſilence, que quand elle s'y prête elle eſt ſubjuguée, & pervertie lorſqu'elle s'y complaît.

Diſtinguons donc dans les paſſions de l'homme le phyſique & le moral, l'un eſt la cauſe, l'autre l'effet; la première émotion eſt dans le ſens intérieur matériel, l'ame peut la recevoir, mais elle ne la produit pas: diſtinguons auſſi les mouvemens inſtantanés des mouvemens durables, & nous verrons d'abord que la peur, l'horreur, la colère, l'amour, ou pluſtôt le deſir de jouir, ſont des ſentimens qui, quoique durables, ne dépendent que de l'impreſſion des objets ſur nos ſens, combinée avec les impreſſions ſubſiſtantes de nos ſenſations antérieures, & que par conſéquent ces paſſions doivent nous être communes avec les animaux. Je dis que les impreſſions actuelles des objets ſont combinées avec les impreſſions ſubſiſtantes de nos ſenſations

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 99 sur 615

antérieures, parce que rien n'eſt horrible, rien n'eſt effrayant, rien n'eſt attrayant pour un homme ou pour un animal qui voit pour la première fois : on peut en faire l'épreuve ſur de jeunes animaux ; j'en ai vû ſe jeter au feu la première fois qu'on les y préſentoit : ils n'acquièrent de l'expérience que par des actes réitérés, dont les impreſſions ſubſiſtent dans leur ſens intérieur ; & quoique leur expérience ne ſoit point raiſonnée, elle n'en eſt pas moins ſûre, elle n'en eſt même que plus circonſpecte ; car un grand bruit, un mouvement violent, une figure extraordinaire, qui ſe préſente ou ſe fait entendre ſubitement & pour la première fois, produit dans l'animal une ſecouſſe dont l'effet eſt ſemblable aux premiers mouvemens de la peur, mais ce ſentiment n'eſt qu'inſtantané ; comme il ne peut ſe combiner avec aucune ſenſation précédente, il ne peut donner à l'animal qu'un ébranlement momentané, & non pas une émotion durable, telle que la ſuppoſe la paſſion de la peur.

Un jeune animal, tranquille habitant des forêts, qui tout-à-coup entend le ſon éclatant d'un cors, ou le bruit ſubit & nouveau d'une arme à feu, treſſaillit, bondit, & fuit par la ſeule violence de la ſecouſſe qu'il vient d'éprouver. Cependant ſi ce bruit eſt ſans effet, s'il ceſſe, l'animal reconnoît d'abord le ſilence ordinaire de la Nature, il ſe calme, s'arrête, & regagne à pas égaux ſa paiſible retraite. Mais l'âge & l'expérience le rendront bien-tôt circonſpect & timide, dès qu'à

l'occaſion d'un bruit pareil il ſe ſera ſenti bleſſé, atteint ou pourſuivi : ce ſentiment de peine ou cette ſenſation de douleur ſe conſerve dans ſon ſens intérieur; & lorſque le même bruit ſe fait encore entendre, elle ſe renouvelle, & ſe combinant avec l'ébranlement actuel, elle produit un ſentiment durable, une paſſion ſubſiſtante, une vraie peur, l'animal fuit & fuit de toutes ſes forces il fuit très-loin, il fuit long-temps, il fuit toûjours, puiſque ſouvent il abandonne à jamais ſon ſéjour ordinaire.

La peur eſt donc une paſſion dont l'animal eſt ſuſceptible, quoiqu'il n'ait pas nos craintes raiſonnées ou prévûes; il en eſt de même de l'horreur, de la colère, de l'amour, quoiqu'il n'ait, ni nos averſions réfléchies, ni nos haines durables, ni nos amitiés conſtantes. L'animal a toutes ces paſſions premières; elles ne ſuppoſent aucune connoiſſance, aucune idée, & ne ſont fondées que ſur l'expérience du ſentiment, c'eſt-à-dire, ſur la répétition des actes de douleur ou de plaiſir, & le renouvellement des ſenſations antérieures du même genre. La colère, ou, ſi l'on veut, le courage naturel, ſe remarque dans les animaux qui ſentent leurs forces, c'eſt-à-dire, qui les ont éprouvées, meſurées, & trouvé ſupérieures à celles des autres; la peur eſt le partage des foibles, mais le ſentiment d'amour leur appartient à tous.

Amour! deſir inné! ame de la Nature! principe inépuiſable d'exiſtence! puiſſance ſouveraine qui peut tout, & contre laquelle rien ne peut, par qui tout agit, tout reſpire

reſpire & tout ſe renouvelle ! divine flamme ! germe de perpétuité que l'Éternel a répandu dans tout avec le ſouffle de vie ! précieux ſentiment qui peux ſeul amollir les cœurs féroces & glacés, en les pénétrant d'une douce chaleur ! cauſe première de tout bien, de toute ſociété, qui réunis ſans contrainte & par tes ſeuls attraits les natures ſauvages & diſperſées ! ſource unique & féconde de tout plaiſir, de toute volupté ! amour ! pourquoi fais-tu l'état heureux de tous les êtres & le malheur de l'homme !

C'eſt qu'il n'y a que le phyſique de cette paſſion qui ſoit bon, c'eſt que, malgré ce que peuvent dire les gens épris, le moral n'en vaut rien. Qu'eſt-ce en effet que le moral de l'amour ! la vanité ; vanité dans le plaiſir de la conquête, erreur qui vient de ce qu'on en fait trop de cas ; vanité dans le deſir de la conſerver excluſivement, état malheureux qu'accompagne toûjours la jalouſie, petite paſſion, ſi baſſe qu'on voudroit la cacher ; vanité dans la manière d'en jouir, qui fait qu'on ne multiplie que ſes geſtes & ſes efforts ſans multiplier ſes plaiſirs ; vanité dans la façon même de la perdre, on veut rompre le premier ; car ſi l'on eſt quitté, quelle humiliation ! & cette humiliation ſe tourne en deſeſpoir lorſqu'on vient à reconnoître qu'on a été long-temps dupe & trompé.

Les animaux ne ſont point ſujets à toutes ces misères, ils ne cherchent pas des plaiſirs où il ne peut y en avoir ; guidés par le ſentiment ſeul, ils ne ſe trompent jamais

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 102 sur 615

dans leur choix, leurs desirs sont toûjours proportionnés à la puissance de jouir, ils sentent autant qu'ils jouissent, & ne jouissent qu'autant qu'ils sentent ; l'homme au contraire, en voulant inventer des plaisirs, n'a fait que gâter la Nature, en voulant se forcer sur le sentiment il ne fait qu'abuser de son être, & creuser dans son cœur un vuide que rien ensuite n'est capable de remplir.

Tout ce qu'il y a de bon dans l'amour appartient donc aux animaux tout aussi-bien qu'à nous, & même, comme si ce sentiment ne pouvoit jamais être pur, ils paroissent avoir une petite portion de ce qu'il y a de moins bon, je veux parler de la jalousie. Chez nous cette passion suppose toûjours quelque défiance de soi-même, quelque connoissance sourde de sa propre foiblesse ; les animaux au contraire semblent être d'autant plus jaloux qu'ils ont plus de force, plus d'ardeur & plus d'habitude au plaisir, c'est que notre jalousie dépend de nos idées, & la leur du sentiment : ils ont joui, ils desirent de jouir encore, ils s'en sentent la force, ils écartent donc tous ceux qui veulent occuper leur place, leur jalousie n'est point réfléchie, ils ne la tournent pas contre l'objet de leur amour, ils ne sont jaloux que de leurs plaisirs.

Mais les animaux sont-ils bornés aux seules passions que nous venons de décrire ! la peur, la colère, l'horreur, l'amour & la jalousie sont-elles les seules affections durables qu'ils puissent éprouver ! Il me semble qu'indépendamment des ces passions, dont le sentiment naturel

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 103 sur 615

ou pluſtôt l'expérience du ſentiment rend les animaux ſuſceptibles, ils ont encore des paſſions qui leur ſont communiquées, & qui viennent de l'éducation, de l'exemple, de l'imitation & de l'habitude : ils ont leur eſpèce d'amitié, leur eſpèce d'orgueil, leur eſpèce d'ambition; & quoiqu'on puiſſe déjà s'être aſſuré, par ce que nous avons dit, que dans toutes leurs opérations & dans tous les actes qui émanent de leurs paſſions il n'entre ni réflexion, ni penſée, ni même aucune idée, cependant comme les habitudes dont nous parlons ſont celles qui ſemblent le plus ſuppoſer quelque degré d'intelligence, & que c'eſt ici où la nuance entr'eux & nous eſt la plus délicate & la plus difficile à ſaiſir, ce doit être auſſi celle que nous devons examiner avec le plus de ſoin.

Y a-t-il rien de comparable à l'attachement du chien pour la perſonne de ſon maître ! on en a vû mourir ſur le tombeau qui la renfermoit; mais (ſans vouloir citer les prodiges ni les héros d'aucun genre) quelle fidelité à accompagner, quelle conſtance à ſuivre, quelle attention à défendre ſon maître ! quel empreſſement à rechercher ſes careſſes ! quelle docilité à lui obéir ! quelle patience à ſouffrir ſa mauvaiſe humeur & des châtimens ſouvent injuſtes ! quelle douceur & quelle humilité pour tâcher de rentrer en grace ! que de mouvemens, que d'inquiétudes, que de chagrin s'il eſt abſent ! que de joie lorſqu'il ſe retrouve ! à tous ces traits peut-on méconnoître l'amitié ? ſe marque-t-elle même parmi nous par des caractères auſſi énergiques !

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 104 sur 615

Il en eſt de cette amitié comme de celle d'une femme pour ſon ſerin, d'un enfant pour ſon jouet, &c. toutes deux ſont auſſi peu réfléchies, toutes deux ne ſont qu'un ſentiment aveugle ; celui de l'animal eſt ſeulement plus naturel, puiſqu'il eſt fondé ſur le beſoin, tandis que l'autre n'a pour objet qu'un inſipide amuſement auquel l'ame n'a point de part. Ces habitudes puériles ne durent que par le deſœuvrement, & n'ont de force que par le vuide de la tête ; & le goût pour les magots & le culte des idoles, l'attachement en un mot aux choſes inanimées, n'eſt-il pas le dernier degré de la ſtupidité ! Cependant que de créateurs d'idoles & de magots dans ce monde ! que de gens adorent l'argile qu'ils ont paîtrie ! combien d'autres ſont amoureux de la glèbe qu'ils ont remuée !

Il s'en faut donc bien que tous les attachemens viennent de l'ame, & que la faculté de pouvoir s'attacher ſuppoſe néceſſairement la puiſſance de penſer & de réfléchir, puiſque c'eſt lorſqu'on penſe & qu'on réfléchit le moins que naiſſent la pluſpart de nos attachemens, que c'eſt encore faute de penſer & de réfléchir qu'ils ſe confirment & ſe tournent en habitude, qu'il ſuffit que quelque choſe flatte nos ſens pour que nous l'aimions, & qu'enfin il ne faut que s'occuper ſouvent & long-temps d'un objet pour en faire une idole.

Mais l'amitié ſuppoſe cette puiſſance de réfléchir, c'eſt de tous les attachemens le plus digne de l'homme & le ſeul qui ne le dégrade point ; l'amitié n'émane

que de la raiſon, l'impreſſion des ſens n'y fait rien, c'eſt l'ame de ſon ami qu'on aime, & pour aimer une ame il faut en avoir une, il faut en avoir fait uſage, l'avoir connue, l'avoir comparée & trouvée de niveau à ce que l'on peut connoître de celle d'un autre : l'amitié ſuppoſe donc, non ſeulement le principe de la connoiſſance, mais l'exercice actuel & réfléchi de ce principe.

Ainſi l'amitié n'appartient qu'à l'homme, & l'attachement peut appartenir aux animaux : le ſentiment ſeul ſuffit pour qu'ils s'attachent aux gens qu'ils voient ſouvent, à ceux qui les ſoignent, qui les nourriſſent, &c. le ſeul ſentiment ſuffit encore pour qu'ils s'attachent aux objets dont ils ſont forcés de s'occuper. L'attachement des mères pour leurs petits ne vient que de ce qu'elles ont été fort occupées à les porter, à les produire, à les débarraſſer de leurs enveloppes, & qu'elles le ſont encore à les allaiter; & ſi dans les oiſeaux les pères ſemblent avoir quelque attachement pour leurs petits, & paroiſſent en prendre ſoin comme les mères, c'eſt qu'ils ſe ſont occupés comme elle de la conſtruction du nid, c'eſt qu'ils l'ont habité, c'eſt qu'ils y ont eu du plaiſir avec leurs femelles, dont la chaleur dure encore long-temps après avoir été fécondées, au lieu que dans les autres eſpèces d'animaux où la ſaiſon des amours eſt fort courte, où, paſſé cette ſaiſon, rien n'attache plus les mâles à leurs femelles, où il n'y a point de nid, point d'ouvrage à faire en commun, les pères ne ſont pères

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 106 sur 615

que comme on l'étoit à Sparte, ils n'ont aucun ſouci de leur poſtérité.

L'orgueil & l'ambition des animaux tiennent à leur courage naturel, c'eſt-à-dire, au ſentiment qu'ils ont de leur force, de leur agilité, &c. les grands dédaignent les petits & ſemblent mépriſer leur audace inſultante, on augmente même par l'éducation ce ſang froid, cet *à propos* de courage, on augmente auſſi leur ardeur, on leur donne de l'éducation par l'exemple, car ils ſont ſuſceptibles & capables de tout, excepté de raiſon; en général les animaux peuvent apprendre à faire mille fois tout ce qu'ils ont fait une fois, à faire de ſuite ce qu'ils ne faiſoient que par intervalles, à faire pendant long-temps ce qu'ils ne faiſoient que pendant un inſtant, à faire volontiers ce qu'ils ne faiſoient d'abord que par force, à faire par habitude ce qu'ils ont fait une fois par haſard, à faire d'eux-mêmes ce qu'ils voient faire aux autres. L'imitation eſt de tous les réſultats de la machine animale le plus admirable, c'en eſt le mobile le plus délicat & le plus étendu, c'eſt ce qui copie de plus près la penſée; & quoique la cauſe en ſoit dans les animaux purement matérielle & méchanique, c'eſt par ſes effets qu'ils nous étonnent davantage. Les hommes n'ont jamais plus admiré les ſinges que quand ils les ont vû imiter les actions humaines; en effet, il n'eſt point trop aiſé de diſtinguer certaines copies de certains originaux; il y a ſi peu de gens d'ailleurs qui voient nettement combien il y a de diſtance entre faire & contrefaire,

que les ſinges doivent être pour le gros du genre humain des êtres étonnans, humilians au point qu'on ne peut guère trouver mauvais qu'on ait donné ſans héſiter plus d'eſprit au ſinge, qui contrefait & copie l'homme, qu'à l'homme (ſi peu rare parmi nous) qui ne fait ni ne copie rien.

Cependant les ſinges ſont tout au plus des gens à talens que nous prenons pour des gens d'eſprit; quoiqu'ils aient l'art de nous imiter, ils n'en ſont pas moins de la nature des bêtes, qui toutes ont plus ou moins le talent de l'imitation. A la vérité, dans preſque tous les animaux ce talent eſt borné à l'eſpèce même, & ne s'étend point au-delà de l'imitation de leurs ſemblables, au lieu que le ſinge, qui n'eſt pas plus de notre eſpèce que nous ſommes de la ſienne, ne laiſſe pas de copier quelques-unes de nos actions; mais c'eſt parce qu'il nous reſſemble à quelques égards, c'eſt parce qu'il eſt extérieurement à peu près conformé comme nous, & cette reſſemblance groſſière ſuffit pour qu'il puiſſe ſe donner des mouvemens, & même des ſuites de mouvemens ſemblables aux nôtres, pour qu'il puiſſe en un mot nous imiter groſſièrement, en ſorte que tous ceux qui ne jugent des choſes que par l'extérieur, trouvent ici comme ailleurs du deſſein, de l'intelligence & de l'eſprit, tandis qu'en effet il n'y a que des rapports de figure, de mouvement & d'organiſation.

C'eſt par les rapports de mouvement que le chien prend les habitudes de ſon maître, c'eſt par les rapports

de figure que le ſinge contrefait les geſtes humains, c'eſt par les rapports d'organiſation que le ſerin répète des airs de muſique, & que le perroquet imite le ſigne le moins équivoque de la penſée, la parole qui met à l'extérieur autant de différence entre l'homme & l'homme qu'entre l'homme & la bête, puiſqu'elle exprime dans les uns la lumière & la ſupériorité de l'eſprit, qu'elle ne laiſſe apercevoir dans les autres qu'une confuſion d'idées obſcures ou empruntées, & que dans l'imbécille ou le perroquet elle marque le dernier degré de la ſtupidité, c'eſt-à-dire, l'impoſſibilité où ils ſont tous deux de produire intérieurement la penſée, quoiqu'il ne leur manque aucun des organes néceſſaires pour la rendre au dehors.

Il eſt aiſé de prouver encore mieux que l'imitation n'eſt qu'un effet méchanique, un réſultat purement machinal, dont la perfection dépend de la vivacité avec laquelle le ſens intérieur matériel reçoit les impreſſions des objets, & de la facilité de les rendre au dehors par la ſimilitude & la ſoupleſſe des organes extérieurs. Les gens qui ont les ſens exquis, délicats, faciles à ébranler, & les membres obéiſſans, agiles & flexibles ſont, toutes choſes égales d'ailleurs, les meilleurs acteurs, les meilleurs pantomimes, les meilleurs ſinges : les enfans ſans y ſonger prennent les habitudes du corps, empruntent les geſtes, imitent les manières de ceux avec qui ils vivent; ils ſont auſſi très-portés à répéter & à contrefaire. La pluſpart des jeunes gens les plus vifs & les moins

moins penſans, qui ne voient que par les yeux du corps, ſaiſiſſent cependant merveilleuſement le ridicule des figures; toute forme bizarre les affecte, toute repréſentation les frappe, toute nouveauté les émeut; l'impreſſion en eſt ſi forte qu'ils repréſentent eux-mêmes, ils racontent avec enthouſiaſme, ils copient facilement & avec grace; ils ont donc ſupérieurement le talent de l'imitation qui ſuppoſe l'organiſation la plus parfaite, les diſpoſitions du corps les plus heureuſes, & auquel rien n'eſt plus oppoſé qu'une forte doſe de bon ſens.

Ainſi parmi les hommes ce ſont ordinairement ceux qui réfléchiſſent le moins qui ont le plus ce talent de l'imitation; il n'eſt donc pas ſurprenant qu'on le trouve dans les animaux qui ne réfléchiſſent point du tout, ils doivent même l'avoir à un plus haut degré de perfection, parce qu'ils n'ont rien qui s'y oppoſe, parce qu'ils n'ont aucun principe par lequel ils puiſſent avoir la volonté d'être différens les uns des autres. C'eſt par notre ame que nous différons entre nous, c'eſt par notre ame que nous ſommes nous, c'eſt d'elle que vient la diverſité de nos caractères & la variété de nos actions; les animaux, au contraire, qui n'ont point d'ame n'ont point le *moi* qui eſt le principe de la différence, la cauſe qui conſtitue la perſonne, ils doivent donc, lorſqu'ils ſe reſſemblent par l'organiſation ou qu'ils ſont de la même eſpèce, ſe copier tous, faire tous les mêmes choſes & de la même façon, s'imiter en un mot beaucoup plus parfaitement que les hommes ne peuvent

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 110 sur 615

s'imiter les uns les autres; & par conſéquent ce talent d'imitation, bien loin de ſuppoſer de l'eſprit & de la penſée dans les animaux, prouve au contraire qu'ils en ſont abſolument privés.

C'eſt par la même raiſon que l'éducation des animaux, quoique fort courte, eſt toûjours heureuſe; ils apprennent en très-peu de temps preſque tout ce que ſavent leurs père & mère, & c'eſt par l'imitation qu'ils l'apprennent; ils ont donc, non ſeulement l'expérience qu'ils peuvent acquerir par le ſentiment, mais ils profitent encore par le moyen de l'imitation, de l'expérience que les autres ont acquiſe. Les jeunes animaux ſe modèlent ſur les vieux, ils voient que ceux-ci s'approchent ou fuient lorſqu'ils entendent certains bruits, lorſqu'ils aperçoivent certains objets: lorſqu'ils ſentent certaines odeurs: ils s'approchent auſſi ou fuient d'abord avec eux ſans autre cauſe déterminante que l'imitation, & enſuite ils s'approchent ou fuient d'eux-mêmes & tout ſeuls, parce qu'ils ont pris l'habitude de s'approcher ou de fuir toutes les fois qu'ils ont éprouvé les mêmes ſenſations.

Après avoir comparé l'homme à l'animal, pris chacun individuellement, je vais comparer l'homme en ſociété avec l'animal en troupe, & rechercher en même temps quelle peut être la cauſe de cette eſpèce d'induſtrie qu'on remarque dans certains animaux, même dans les eſpèces les plus viles & les plus nombreuſes · que de choſes ne dit-on pas de celle de certains inſectes! nos obſervateurs admirent à l'envi l'intelligence & les talens

des abeilles, elles ont, diſent-ils, un génie particulier, un art qui n'appartient qu'à elles, l'art de ſe bien gouverner, il faut ſavoir obſerver pour s'en apercevoir; mais une ruche eſt une république où chaque individu ne travaille que pour la ſociété, où tout eſt ordonné, diſtribué, réparti avec une prévoyance, une équité, une prudence admirables; Athènes n'étoit pas mieux conduite ni mieux policée : plus on obſerve ce panier de mouches, & plus on découvre de merveilles, un fond de gouvernement inaltérable & toûjours le même, un reſpect profond pour la perſonne en place, une vigilance ſingulière pour ſon ſervice, la plus ſoigneuſe attention pour ſes plaiſirs, un amour conſtant pour la patrie, une ardeur inconcevable pour le travail, une aſſiduité à l'ouvrage que rien n'égale, le plus grand deſintéreſſement joint à la plus grande économie, la plus fine géométrie employée à la plus élégante architecture, &c. je ne finirois point ſi je voulois ſeulement parcourir les annales de cette république, & tirer de l'hiſtoire de ces inſectes tous les traits qui ont excité l'admiration de leurs hiſtoriens.

C'eſt qu'indépendamment de l'enthouſiaſme qu'on prend pour ſon ſujet, on admire toûjours d'autant plus qu'on obſerve davantage & qu'on raiſonne moins. Y a-t-il en effet rien de plus gratuit que cette admiration pour les mouches, & que ces vûes morales qu'on voudroit leur prêter, que cet amour du bien commun qu'on leur ſuppoſe, que cet inſtinct ſingulier qui

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 112 sur 615

équivaut à la géométrie la plus ſublime, inſtinct qu'on leur a nouvellement accordé, par lequel les abeilles réſolvent, ſans héſiter, le problème de *bâtir le plus ſolidement qu'il ſoit poſſible dans le moindre eſpace poſſible, & avec la plus grande économie poſſible ?* que penſer de l'excès auquel on a porté le détail de ces éloges? car enfin une mouche ne doit pas tenir dans la tête d'un Naturaliſte plus de place qu'elle n'en tient dans la Nature; & cette république merveilleuſe ne ſera jamais aux yeux de la raiſon, qu'une foule de petites bêtes qui n'ont d'autre rapport avec nous que celui de nous fournir de la cire & du miel.

Ce n'eſt point la curioſité que je blâme ici, ce ſont les raiſonnemens & les exclamations : qu'on ait obſervé avec attention leurs manœuvres, qu'on ait ſuivi avec ſoin leurs procédés & leur travail, qu'on ait décrit exactement leur génération, leur multiplication, leurs métamorphoſes, &c. tous ces objets peuvent occuper le loiſir d'un Naturaliſte; mais c'eſt la morale, c'eſt la théologie des inſectes que je ne puis entendre prêcher; ce ſont les merveilles que les obſervateurs y mettent & ſur leſquelles enſuite ils ſe récrient comme ſi elles y étoient en effet, qu'il faut examiner; c'eſt cette intelligence, cette prévoyance, cette connoiſſance même de l'avenir qu'on leur accorde avec tant de complaiſance, & que cependant on doit leur refuſer rigoureuſement, que je vais tâcher de réduire à ſa juſte valeur.

Les mouches ſolitaires n'ont, de l'aveu de ces obſervateurs, aucun eſprit en comparaiſon des mouches qui vivent enſemble ; celles qui ne forment que de petites troupes en ont moins que celles qui ſont en grand nombre ; & les abeilles, qui de toutes ſont peut-être celles qui forment la ſociété la plus nombreuſe, ſont auſſi celles qui ont le plus de génie. Cela ſeul ne ſuffit-il pas pour faire penſer que cette apparence d'eſprit ou de génie n'eſt qu'un réſultat purement méchanique, une combinaiſon de mouvemens proportionnelle au nombre, un rapport qui n'eſt compliqué que parce qu'il dépend de pluſieurs milliers d'individus ! Ne ſait-on pas que tout rapport, tout deſordre même, pourvû qu'il ſoit conſtant, nous paroît une harmonie dès que nous en ignorons les cauſes, & que de la ſuppoſition de cette apparence d'ordre à celle de l'intelligence il n'y a qu'un pas, les hommes aimant mieux admirer qu'approfondir !

On conviendra donc d'abord, qu'à prendre les mouches une à une, elles ont moins de génie que le chien, le ſinge & la pluſpart des animaux ; on conviendra qu'elles ont moins de docilité, moins d'attachement, moins de ſentiment, moins en un mot de qualités relatives aux nôtres : dès-lors on doit convenir que leur intelligence apparente ne vient que de leur multitude réunie ; cependant cette réunion même ne ſuppoſe aucune intelligence, car ce n'eſt point par des vûes morales qu'elles ſe réuniſſent, c'eſt ſans leur conſentement qu'elles ſe trouvent enſemble. Cette ſociété n'eſt donc

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 114 sur 615

qu'un assemblage physique ordonné par la Nature, & indépendant de toute vûe, de toute connoissance, de tout raisonnement. La mère abeille produit dix mille individus tout-à-la-fois & dans un même lieu ; ces dix mille individus, fussent-ils encore mille fois plus stupides que je ne le suppose, seront obligés, pour continuer seulement d'exister, de s'arranger de quelque façon : comme ils agissent tous les uns contre les autres avec des forces égales, eussent-ils commencé par se nuire, à force de se nuire ils arriveront bien-tôt à se nuire le moins qu'il sera possible, c'est-à-dire à s'aider; ils auront donc l'air de s'entendre & de concourir au même but. L'observateur leur prêtera bien-tôt des vûes & tout l'esprit qui leur manque, il voudra rendre raison de chaque action, chaque mouvement aura bien-tôt son motif, & de-là sortiront des merveilles ou des monstres de raisonnement sans nombre, car ces dix mille individus, qui ont été tous produits à la fois, qui ont habité ensemble, qui se sont tous métamorphosés à peu près en même temps, ne peuvent manquer de faire tous la même chose, &, pour peu qu'ils aient de sentiment, de prendre des habitudes communes, de s'arranger, de se trouver bien ensemble, de s'occuper de leur demeure, d'y revenir après s'en être éloignés, &c. & de là l'architecture, la géométrie, l'ordre, la prévoyance, l'amour de la patrie, la république en un mot, le tout fondé, comme l'on voit, sur l'admiration de l'observateur.

La Nature n'est-elle pas assez étonnante par elle-même,

ſans chercher encore à nous ſurprendre en nous étourdiſſant de merveilles qui n'y ſont pas & que nous y mettons! Le Créateur n'eſt-il pas aſſez grand par ſes ouvrages, & croyons-nous le faire plus grand par notre imbécillité! ce ſeroit, s'il pouvoit l'être, la façon de le rabaiſſer. Lequel en effet a de l'Être ſuprême la plus grande idée, celui qui le voit créer l'Univers, ordonner les exiſtences, fonder la Nature ſur des loix invariables & perpétuelles, ou celui qui le cherche & veut le trouver attentif à conduire une république de mouches, & fort occupé de la manière dont ſe doit plier l'aîle d'un ſcarabée!

Il y a parmi certains animaux une eſpèce de ſociété qui ſemble dépendre du choix de ceux qui la compoſent, & qui par conſéquent approche bien davantage de l'intelligence & du deſſein, que la ſociété des abeilles, qui n'a d'autre principe qu'une néceſſité phyſique : les éléphans, les caſtors, les ſinges & pluſieurs autres eſpèces d'animaux ſe cherchent, ſe raſſemblent, vont par troupe, ſe ſecourent, ſe défendent, s'avertiſſent & ſe ſoûmettent à des alures communes : ſi nous ne troublions pas ſi ſouvent ces ſociétés, & que nous puſſions les obſerver auſſi facilement que celle des mouches, nous y verrions ſans doute bien d'autres merveilles, qui cependant ne ſeroient que des rapports & des convenances phyſiques. Qu'on mette enſemble & dans un même lieu un grand nombre d'animaux de même eſpèce, il en réſultera néceſſairement un certain arrangement,

un certain ordre, de certaines habitudes communes, comme nous le dirons dans l'hiſtoire du daim, du lapin, &c. Or toute habitude commune, bien loin d'avoir pour cauſe le principe d'une intelligence éclairée, ne ſuppoſe au contraire que celui d'une aveugle imitation.

Parmi les hommes, la ſociété dépend moins des convenances phyſiques que des relations morales. L'homme a d'abord meſuré ſa force & ſa foibleſſe, il a comparé ſon ignorance & ſa curioſité, il a ſenti que ſeul il ne pouvoit ſuffire ni ſatisfaire par lui-même à la multiplicité de ſes beſoins, il a reconnu l'avantage qu'il auroit à renoncer à l'uſage illimité de ſa volonté pour acquerir un droit ſur la volonté des autres, il a réfléchi ſur l'idée du bien & du mal, il l'a gravé au fond de ſon cœur à la faveur de la lumière naturelle qui lui a été départie par la bonté du Créateur, il a vû que la ſolitude n'étoit pour lui qu'un état de danger & de guerre, il a cherché la ſûreté & la paix dans la ſociété, il y a porté ſes forces & ſes lumières pour les augmenter en les réuniſſant à celles des autres: cette réunion eſt de l'homme l'ouvrage le meilleur, c'eſt de ſa raiſon l'uſage le plus ſage. En effet il n'eſt tranquille, il n'eſt fort, il n'eſt grand, il ne commande à l'Univers que parce qu'il a ſû ſe commander à lui-même, ſe dompter, ſe ſoûmettre & s'impoſer des loix; l'homme en un mot n'eſt homme que parce qu'il a ſû ſe réunir à l'homme.

Il eſt vrai que tout a concouru à rendre l'homme ſociable;

ſociable ; car quoique les grandes ſociétés, les ſociétés policées, dépendent certainement de l'uſage & quelquefois de l'abus qu'il a fait de ſa raiſon, elles ont ſans doute été précédées par de petites ſociétés, qui ne dépendoient, pour ainſi dire, que de la Nature. Une famille eſt une ſociété naturelle, d'autant plus ſtable, d'autant mieux fondée, qu'il y a plus de beſoins, plus de cauſes d'attachement. Bien différent des animaux, l'homme n'exiſte preſque pas encore lorſqu'il vient de naître ; il eſt nu, foible, incapable d'aucun mouvement, privé de toute action, réduit à tout ſouffrir, ſa vie dépend des ſecours qu'on lui donne. Cet état de l'enfance imbécille, impuiſſante, dure long-temps ; la néceſſité du ſecours devient donc une habitude, qui ſeule ſeroit capable de produire l'attachement mutuel de l'enfant & des père & mère ; mais comme à meſure qu'il avance, l'enfant acquiert de quoi ſe paſſer plus aiſément de ſecours, comme il a phyſiquement moins beſoin d'aide ; que les parens au contraire continuent à s'occuper de lui beaucoup plus qu'il ne s'occupe d'eux, il arrive toûjours que l'amour deſcend beaucoup plus qu'il ne remonte : l'attachement des père & mère devient exceſſif, aveugle, idolâtre, & celui de l'enfant reſte tiède & ne reprend des forces que lorſque la raiſon vient à développer le germe de la reconnoiſſance.

Ainſi la ſociété, conſidérée même dans une ſeule famille, ſuppoſe dans l'homme la faculté raiſonnable ; la ſociété, dans les animaux qui ſemblent ſe réunir

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 118 sur 615

librement & par convenance, ſuppoſe l'expérience du ſentiment; & la ſociété des bêtes, qui comme les abeilles, ſe trouvent enſemble ſans s'être cherchées, ne ſuppoſe rien; quels qu'en puiſſent être les réſultats, il eſt clair qu'ils n'ont été, ni prévûs, ni ordonnés, ni conçus par ceux qui les exécutent, & qu'ils ne dépendent que du méchaniſme univerſel & des loix du mouvement établies par le Créateur. Qu'on mette enſemble dans le même lieu, dix mille automates animés d'une force vive & tous déterminés, par la reſſemblance parfaite de leur forme extérieure & intérieure, & par la conformité de leurs mouvemens, à faire chacun la même choſe dans ce même lieu; il en réſultera néceſſairement un ouvrage régulier; les rapports d'égalité, de ſimilitude, de ſituation s'y trouveront, puiſqu'ils dépendent de ceux de mouvement que nous ſuppoſons égaux & conformes; les rapports de juxta-poſition, d'étendue, de figure s'y trouveront auſſi, puiſque nous ſuppoſons l'eſpace donné & circonſcrit; & ſi nous accordons à ces automates le plus petit degré de ſentiment, celui ſeulement qui eſt néceſſaire pour ſentir ſon exiſtence, tendre à ſa propre conſervation, éviter les choſes nuiſibles, appéter les choſes convenables, &c. l'ouvrage ſera, non ſeulement régulier, proportionné, ſitué, ſemblable, égal; mais il aura encore l'air de la ſymmétrie, de la ſolidité, de la commodité, &c. au plus haut point de perfection, parce qu'en le formant, chacun de ces dix mille individus a cherché à s'arranger de la manière

la plus commode pour lui, & qu'il a en même temps été forcé d'agir & de ſe placer de la manière la moins incommode aux autres.

Dirai-je encore un mot; ces cellules des abeilles, ces hexagones tant vantés, tant admirés, me fourniſſent une preuve de plus contre l'enthouſiaſme & l'admiration: cette figure, toute géométrique & toute régulière qu'elle nous paroît, & qu'elle eſt en effet dans la ſpéculation, n'eſt ici qu'un réſultat méchanique & aſſez imparfait qui ſe trouve ſouvent dans la Nature, & que l'on remarque même dans ſes productions les plus brutes; les cryſtaux & pluſieurs autres pierres, quelques ſels, &c. prennent conſtamment cette figure dans leur formation. Qu'on obſerve les petites écailles de la peau d'une rouſſette, on verra qu'elles ſont hexagones, parce que chaque écaille croiſſant en même temps ſe fait obſtacle, & tend à occuper le plus d'eſpace qu'il eſt poſſible dans un eſpace donné: on voit ces mêmes hexagones dans le ſecond eſtomac des animaux ruminans, on les trouve dans les graines, dans leurs capſules, dans certaines fleurs, &c. Qu'on rempliſſe un vaiſſeau de pois, ou pluſtôt de quelqu'autre graine cylindrique, & qu'on le ferme exactement après y avoir verſé autant d'eau que les intervalles qui reſtent entre ces graines peuvent en recevoir; qu'on faſſe bouillir cette eau, tous ces cylindres deviendront des colonnes à ſix pans. On en voit clairement la raiſon, qui eſt purement méchanique, chaque graine, dont la figure eſt

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 120 sur 615

cylindrique, tend par ſon renflement à occuper le plus d'eſpace poſſible dans un eſpace donné, elles deviennent donc toutes néceſſairement hexagones par la compreſſion réciproque. Chaque abeille cherche à occuper de même le plus d'eſpace poſſible dans un eſpace donné, il eſt donc néceſſaire auſſi, puiſque le corps des abeillles eſt cylindrique, que leurs cellules ſoient hexagones, par la même raiſon des obſtacles réciproques.

On donne plus d'eſprit aux mouches dont les ouvrages ſont les plus réguliers; les abeilles ſont, dit-on, plus ingénieuſes que les guêpes, que les frêlons, &c. qui ſavent auſſi l'architecture, mais dont les conſtructions ſont plus groſſières & plus irrégulières que celles des abeilles: on ne veut pas voir, ou l'on ne ſe doute pas que cette régularité, plus ou moins grande, dépend uniquement du nombre & de la figure, & nullement de l'intelligence de ces petites bêtes; plus elles ſont nombreuſes, plus il y a de forces qui agiſſent également & qui s'oppoſent de même, plus il y a par conſéquent de contrainte méchanique, de régularité forcée & de perfection apparente dans leurs productions.

Les animaux qui reſſemblent le plus à l'homme par leur figure & par leur organiſation, ſeront donc, malgré les apologiſtes des inſectes, maintenus dans la poſſeſſion où ils étoient, d'être ſupérieurs à tous les autres pour les qualités intérieures; & quoiqu'elles ſoient infiniment différentes de celles de l'homme, qu'elles ne ſoient, comme nous l'avons prouvé, que des réſultats de

l'exercice & de l'expérience du ſentiment, ces animaux ſont par ces facultés mêmes fort ſupérieurs aux inſectes; & comme tout ſe fait & que tout eſt par nuance dans la Nature, on peut établir une échelle pour juger des degrés des qualités intrinsèques de chaque animal, en prenant pour premier terme la partie matérielle de l'homme, & plaçant ſucceſſivement les animaux à différentes diſtances, ſelon qu'en effet ils en approchent ou s'en éloignent davantage, tant par la forme extérieure, que par l'organiſation intérieure: en ſorte que le ſinge, le chien, l'éléphant & les autres quadrupèdes ſeront au premier rang; les cétacées qui, comme les quadrupèdes & l'homme, ont de la chair & du ſang, qui ſont comme eux vivipares, ſeront au ſecond; les oiſeaux au troiſième, parce qu'à tout prendre, ils diffèrent de l'homme plus que les cétacées & que les quadrupèdes; & s'il n'y avoit pas des êtres qui, comme les huîtres ou les polypes, ſemblent en différer autant qu'il eſt poſſible, les inſectes ſeroient avec raiſon les bêtes du dernier rang.

Mais ſi les animaux ſont dépourvûs d'entendement, d'eſprit & de mémoire, s'ils ſont privés de toute intelligence, ſi toutes leurs facultés dépendent de leurs ſens, s'ils ſont bornés à l'exercice & à l'expérience du ſentiment ſeul, d'où peut venir cette eſpèce de prévoyance qu'on remarque dans quelques-uns d'entr'eux! le ſeul ſentiment peut-il faire qu'ils ramaſſent des vivres pendant l'été pour ſubſiſter pendant l'hiver! ceci ne ſuppoſe-t-il pas une comparaiſon des temps, une notion de l'avenir,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 122 sur 615

une inquiétude raiſonnée ! pourquoi trouve-t-on à la fin de l'automne dans le trou d'un mulot aſſez de gland pour le nourrir juſqu'à l'été ſuivant ! pourquoi cette abondante récolte de cire & de miel dans les ruches ! pourquoi les fourmis font-elles des proviſions ! pourquoi les oiſeaux feroient-ils des nids, s'ils ne ſavoient pas qu'ils en auront beſoin pour y dépoſer leurs œufs & y élever leurs petits, &c. & tant d'autres faits particuliers que l'on raconte de la prévoyance des renards, qui cachent leur gibier en différens endroits pour le retrouver au beſoin & s'en nourrir pendant pluſieurs jours ; de la ſubtilité raiſonnée des hiboux, qui ſavent ménager leur proviſion de ſouris en leur coupant les pattes pour les empêcher de fuir : de la pénétration merveilleuſe des abeilles, qui ſavent d'avance que leur reine doit pondre dans un tel temps tel nombre d'œufs d'une certaine eſpèce, dont il doit ſortir des vers de mouches mâles, & tel autre nombre d'œufs d'une autre eſpèce qui doivent produire les mouches neutres, & qui, en conſéquence de cette connoiſſance de l'avenir, conſtruiſent tel nombre d'alvéoles plus grandes pour les premières, & tel autre nombre d'alvéoles plus petites pour les ſecondes ! &c. &c. &c.

Avant que de répondre à ces queſtions, & même de raiſonner ſur ces faits, il faudroit être aſſuré qu'ils ſont réels & avérés, il faudroit qu'au lieu d'avoir été racontés par le peuple ou publiés par des obſervateurs amoureux du merveilleux, ils euſſent été vûs par des

gens ſenſés, & recueillis par des philoſophes : je ſuis perſuadé que toutes les prétendues merveilles diſparoîtroient, & qu'en y réfléchiſſant on trouveroit la cauſe de chacun de ces effets en particulier. Mais admettons pour un inſtant la vérité de tous ces faits, accordons avec ceux qui les racontent, le preſſentiment, la préviſion, la connoiſſance même de l'avenir aux animaux, en réſultera-t-il que ce ſoit un effet de leur intelligence ! ſi cela étoit elle ſeroit bien ſupérieure à la nôtre : car notre prévoyance eſt toûjours conjecturale, nos notions ſur l'avenir ne ſont que douteuſes ; toute la lumière de notre ame ſuffit à peine pour nous faire entrevoir les probabilités des choſes futures ; dès-lors les animaux qui en voient la certitude, puiſqu'ils ſe déterminent d'avance & ſans jamais ſe tromper ; auroient en eux quelque choſe de bien ſupérieur au principe de notre connoiſſance, ils auroient une ame bien plus pénétrante & bien plus clairvoyante que la nôtre. Je demande ſi cette conſéquence ne répugne pas autant à la religion qu'à la raiſon.

Ce ne peut donc être par une intelligence ſemblable à la nôtre que les animaux aient une connoiſſance certaine de l'avenir, puiſque nous n'en avons que des notions très-douteuſes & très-imparfaites : pourquoi donc leur accorder ſi légèrement une qualité ſi ſublime ! pourquoi nous dégrader mal à propos ! ne ſeroit-il pas moins déraiſonnable, ſuppoſé qu'on ne pût pas douter des faits, d'en rapporter la cauſe à des loix méchaniques,

établies, comme toutes les autres loix de la Nature, par la volonté du Créateur! La ſûreté avec laquelle on ſuppoſe que les animaux agiſſent, la certitude de leur détermination, ſuffiroit ſeule pour qu'on dût en conclurre que ce ſont les effets d'un pur méchaniſme. Le caractère de la raiſon le plus marqué, c'eſt le doute, c'eſt la délibération, c'eſt la comparaiſon; mais des mouvemens & des actions qui n'annoncent que la déciſion & la certitude, prouvent en même temps le méchaniſme & la ſtupidité.

Cependant, comme les loix de la Nature, telles que nous les connoiſſons, n'en ſont que les effets généraux, & que les faits dont il s'agit, ne ſont au contraire que des effets très-particuliers, il ſeroit peu philoſophique & peu digne de l'idée que nous devons avoir du Créateur, de charger mal à propos ſa volonté de tant de petites loix, ce ſeroit déroger à ſa toute-puiſſance & à la noble ſimplicité de la Nature que de l'embarraſſer gratuitement de cette quantité de ſtatuts particuliers, dont l'un ne ſeroit fait que pour les mouches, l'autre pour les hiboux, l'autre pour les mulots, &c. ne doit-on pas au contraire faire tous ſes efforts pour ramener ces effets particuliers aux effets généraux, &, ſi cela n'étoit pas poſſible, mettre ces faits en réſerve & s'abſtenir de vouloir les expliquer juſqu'à ce que, par de nouveaux faits & par de nouvelles analogies, nous puiſſions en connoître les cauſes?

Voyons donc en effet s'ils ſont inexplicables, s'ils ſont

ſont ſi merveilleux, s'ils ſont même avérés. La prévoyance des fourmis n'étoit qu'un préjugé, on la leur avoit accordée en les obſervant, on la leur a ôtée en les obſervant mieux; elles ſont engourdies tout l'hiver, leurs proviſions ne ſont donc que des amas ſuperflus, amas accumulés ſans vûes, ſans connoiſſance de l'avenir, puiſque par cette connoiſſance même elles en auroient prévû toute l'inutilité. N'eſt-il pas très-naturel que des animaux qui ont une demeure fixe où ils ſont accoûtumés à tranſporter les nourritures dont ils ont actuellement beſoin, & qui flattent leur appétit, en tranſportent beaucoup plus qu'il ne leur en faut, déterminés par le ſentiment ſeul & par le plaiſir de l'odorat ou de quelques autres de leurs ſens, & guidés par l'habitude qu'ils ont priſe d'emporter leurs vivres pour les manger en repos! cela même ne démontre-t-il pas qu'ils n'ont que du ſentiment & point de raiſonnement! c'eſt par la même raiſon que les abeilles ramaſſent beaucoup plus de cire & de miel qu'il ne leur en faut; ce n'eſt donc point du produit de leur intelligence, c'eſt des effets de leur ſtupidité que nous profitons; car l'intelligence les porteroit néceſſairement à ne ramaſſer qu'à peu près autant qu'elles ont beſoin, & à s'épargner la peine de tout le reſte, ſur-tout après la triſte expérience que ce travail eſt en pure perte, qu'on leur enlève tout ce qu'elles ont de trop, qu'enfin cette abondance eſt la ſeule cauſe de la guerre qu'on leur fait, & la ſource de la déſolation & du trouble de leur ſociété. Il eſt ſi vrai

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 126 sur 615

que ce n'eſt que par ſentiment aveugle qu'elles travaillent, qu'on peut les obliger à travailler, pour ainſi dire, autant que l'on veut : tant qu'il y a des fleurs qui leur conviennent dans le pays qu'elles habitent, elles ne ceſſent d'en tirer le miel & la cire; elles ne diſcontinuent leur travail & ne finiſſent leur récolte que parce qu'elles ne trouvent plus rien à ramaſſer. On a imaginé de les tranſporter & de les faire voyager dans d'autres pays où il y a encore des fleurs; alors elles reprennent le travail, elles continuent à ramaſſer, à entaſſer juſqu'à ce que les fleurs de ce nouveau canton ſoient épuiſées ou flétries, & ſi on les porte dans un autre qui ſoit encore fleuri, elles continueront de même à recueillir, à amaſſer : leur travail n'eſt donc point une prévoyance ni une peine qu'elles ſe donnent dans la vûe de faire des proviſions pour elles, c'eſt au contraire un mouvement dicté par le ſentiment, & ce mouvement dure & ſe renouvelle autant & auſſi long-temps qu'il exiſte des objets qui y ſont relatifs.

Je me ſuis particulièrement informé des mulots, & j'ai vû quelques-uns de leurs trous, ils ſont ordinairement diviſés en deux, dans l'un ils font leurs petits, dans l'autre ils entaſſent tout ce qui flatte leur appétit. Lorſqu'ils font eux-mêmes leurs trous, ils ne les font pas grands, & alors ils ne peuvent y placer qu'une aſſez petite quantité de graines; mais lorſqu'ils trouvent ſous le tronc d'un arbre un grand eſpace, ils s'y logent, & ils le rempliſſent, autant qu'ils peuvent, de blé, de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 127 sur 615

noix, de noiſettes, de glands, ſelon le pays qu'ils habitent; en ſorte que la proviſion, au lieu d'être proportionnée au beſoin de l'animal ne l'eſt au contraire qu'à la capacité du lieu.

Voilà donc déjà les proviſions des fourmis, des mulots, des abeilles, réduites à des tas inutiles, diſproportionnés & ramaſſés ſans vûes, voilà les petites loix particulières de leur prévoyance ſuppoſée ramenées à la loi réelle & générale du ſentiment; il en ſera de même de la prévoyance des oiſeaux. Il n'eſt pas néceſſaire de leur accorder la connoiſſance de l'avenir, ou de recourir à la ſuppoſition d'une loi particulière que le Créateur auroit établie en leur faveur, pour rendre raiſon de la conſtruction de leurs nids; ils ſont conduits par degrés à les faire, ils trouvent d'abord un lieu qui convient, ils s'y arrangent, ils y portent ce qui le rendra plus commode; ce nid n'eſt qu'un lieu qu'ils reconnoîtront, qu'ils habiteront ſans inconvénient, & où ils ſéjourneront tranquillement : l'amour eſt le ſentiment qui les guide & les excite à cet ouvrage, ils ont beſoin mutuellement l'un de l'autre, ils ſe trouvent bien enſemble, ils cherchent à ſe cacher, à ſe dérober au reſte de l'Univers devenu pour eux plus incommode & plus dangereux que jamais; ils s'arrêtent donc dans les endroits les plus touffus des arbres, dans les lieux les plus inacceſſibles ou les plus obſcurs, &, pour s'y ſoûtenir, pour y demeurer d'une manière moins incommode, ils entaſſent des feuilles, ils arrangent de petits matériaux,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 128 sur 615

& travaillent à l'envi à leur habitation commune; les uns moins adroits ou moins ſenſuels ne font que des ouvrages groſſièrement ébauchés, d'autres ſe contentent de ce qu'ils trouvent tout fait, & n'ont pas d'autre domicile que les trous qui ſe préſentent ou les pots qu'on leur offre. Toutes ces manœuvres ſont relatives à leur organiſation & dépendantes du ſentiment qui ne peut, à quelque degré qu'il ſoit, produire le raiſonnement, & encore moins donner cette préviſion intuitive, cette connoiſſance certaine de l'avenir, qu'on leur ſuppoſe.

On peut le prouver par des exemples familiers; non ſeulement ces animaux ne ſavent pas ce qui doit arriver; mais ils ignorent même ce qui eſt arrivé. Une poule ne diſtingue pas ſes œufs de ceux d'un autre oiſeau, elle ne voit point que les petits canards qu'elle vient de faire éclorre ne lui appartiennent point, elle couve des œufs de craie, dont il ne doit rien réſulter, avec autant d'attention que ſes propres œufs; elle ne connoît donc ni le paſſé, ni l'avenir, & ſe trompe encore ſur le préſent. Pourquoi les oiſeaux de baſſe-cour ne font-ils pas des nids comme les autres? ſeroit-ce parce que le mâle appartient à pluſieurs femelles? ou pluſtôt n'eſt-ce pas qu'étant domeſtiques, familiers & accoûtumés à être à l'abri des inconvéniens & des dangers, ils n'ont aucun beſoin de ſe ſouſtraire aux yeux, aucune habitude de chercher leur ſûreté dans la retraite & dans la ſolitude? Cela même pourroit encore ſe prouver par le fait, car


dans la même eſpèce l'oiſeau ſauvage fait ſouvent ce que l'oiſeau domeſtique ne fait point; la gelinotte & la canne ſauvage font des nids, la poule & la canne domeſtiques n'en font point. Les nids des oiſeaux, les cellules des mouches, les proviſions des abeilles, des fourmis, des mulots, ne ſuppoſent donc aucune intelligence dans l'animal, & n'émanent pas de quelques loix particulièrement établies pour chaque eſpèce, mais dépendent, comme toutes les autres opérations des animaux, du nombre, de la figure, du mouvement, de l'organiſation & du ſentiment, qui ſont les loix de la Nature, générales & communes à tous les êtres animés.

IL N'EST pas étonnant que l'homme, qui ſe connoît ſi peu lui-même, qui confond ſi ſouvent ſes ſenſations & ſes idées, qui diſtingue ſi peu le produit de ſon ame de celui de ſon cerveau, ſe compare aux animaux, & n'admette entr'eux & lui qu'une nuance, dépendante d'un peu plus ou d'un peu moins de perfection dans les organes; il n'eſt pas étonnant qu'il les faſſe raiſonner, s'entendre & ſe déterminer comme lui, & qu'il leur attribue, non ſeulement les qualités qu'il a, mais encore celles qui lui manquent. Mais que l'homme s'examine, s'analyſe & s'approfondiſſe, il reconnoîtra bien-tôt la nobleſſe de ſon être, il ſentira l'exiſtence de ſon ame, il ceſſera de s'avilir, & verra d'un coup d'œil la diſtance infinie que l'Être ſuprême a miſe entre les bêtes & lui.

DIEU ſeul connoît le paſſé, le préſent & l'avenir, il eſt de tous les temps, & voit dans tous les temps:

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 130 sur 615

l'homme, dont la durée eſt de ſi peu d'inſtans, ne voit que ces inſtans; mais une Puiſſance vive, immortelle, compare ces inſtans, les diſtingue, les ordonne, c'eſt par Elle qu'il connoît le préſent, qu'il juge du paſſé, & qu'il prévoit l'avenir. Otez à l'homme cette lumière divine, vous effacez, vous obſcurciſſez ſon être, il ne reſtera que l'animal; il ignorera le paſſé, ne ſoupçonnera pas l'avenir, & ne ſaura même ce que c'eſt que le préſent.



HISTOIRE NATURELLE.

De la Deſcription des Animaux.

DE LA

DE LA

DESCRIPTION DES ANIMAUX.

LA deſcription eſt une des principales parties de l'Hiſtoire Naturelle des Animaux, puiſque les autres en dépendent pour la certitude & pour l'intelligence des faits ; car ce n'eſt qu'après avoir bien obſervé chaque animal, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, que l'on peut découvrir la méchanique de ſes organes, & comprendre ſes différentes opérations. Nous ſommes ſujets à tomber dans l'erreur, dès que nous nous livrons à nos conjectures : les ouvrages du Créateur ſont ſi merveilleux & nos lumières ſi foibles, que nous ne pouvons connoître dans les productions de la Nature, que ce que nous avons vû, & nous ne pouvons les juger qu'autant que nous les avons obſervées. L'obſervation & la deſcription ſont donc les meilleurs moyens que nous ayons pour acquerir des connoiſſances en Hiſtoire Naturelle, & pour les tranſmettre aux autres : mais chacun a une façon d'obſerver proportionnée à l'étendue de ſon ſavoir & de ſon eſprit ; plus on ſait plus on découvre en obſervant, & on ſait, valoir ſes découvertes ſelon la force de génie dont on eſt doué : il n'y a par conſéquent ni principes ni règles à établir pour guider l'obſervateur, les routes que l'on pourroit lui ouvrir ne ſeroient pas convenables à ſa marche, il eſt

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 134 sur 615

obligé de reſter d'abord dans celles où il ſe trouve placé, & il ne peut s'en frayer de nouvelles qu'à meſure qu'il fait des progrès.

Celui qui décrit doit au contraire rendre compte au public de la méthode qu'il ſuit en faiſant ſes deſcriptions : le choix de cette méthode eſt très-important, puiſque non ſeulement la clarté de la deſcription en dépend, mais encore les conſéquences que l'on en peut tirer. Il eſt donc abſolument néceſſaire de convenir de principes & de règles qui ſoient exactement ſuivis dans toutes les deſcriptions, & de ſe propoſer une méthode de deſcription au lieu des méthodes de nomenclature, qui ont occupé juſqu'ici la pluſpart des Naturaliſtes.

Une nomenclature raiſonnée n'eſt qu'une ſuite de définitions. Que l'on examine toutes les diſtributions méthodiques, qui ont été faites ſur les différens règnes de l'Hiſtoire Naturelle, on verra clairement que chaque phraſe eſt la définition d'une eſpèce : les caractères génériques repréſentent une définition générale de toutes les eſpèces contenues ſous un même genre ; enfin on trouvera dans les *ordres* ou dans les claſſes, des définitions encore plus générales, qui comprennent toutes celles des genres : telles ſont les méthodes de nomenclature que l'on donne pour principes dans l'étude de l'Hiſtoire Naturelle ; c'eſt l'état préſent de cette ſcience dans la pluſpart des auteurs. Les Naturaliſtes ſont-ils donc encore de ces ſiècles de ténèbres, où les *univerſaux* & les *cathégories* de la ſcholaſtique étoient l'objet

des méditations de tous les Savans! on s'efforçoit alors de réunir toutes les parties des Sciences dans une formule, en repréſentant l'Univers entier dans l'arbre de *Porphyre*, qui n'eſt cependant qu'une méthode de nomenclature & une ſuite de définitions, comme nos diſtributions méthodiques d'Hiſtoire Naturelle.

Pour peu que l'on réfléchiſſe ſur les progrès des Sciences, on verra que moins elles ont été avancées, plus les hommes ſe ſont cru capables de tout entendre & de tout expliquer. On ne doutoit de rien dans la philoſophie de l'école; comme on faiſoit conſiſter la ſcience dans les définitions, chacun vouloit définir avant que d'avoir bien connu, & on n'avoit par ce moyen qu'un ſimulacre trompeur des ſciences humaines : à meſure que l'on a acquis de vraies connoiſſances, on a reconnu l'erreur. Aujourd'hui on eſt bien convaincu qu'il eſt très-difficile de définir les choſes que l'on connoît le mieux, parce que la définition n'eſt que le réſultat de nos connoiſſances, qui ſont toûjours bornées & même fautives. Les Naturaliſtes nomenclateurs ſont les ſeuls qui gardent l'ancien préjugé, ils retardent l'avancement de l'Hiſtoire Naturelle de la même façon que les philoſophes ſcholaſtiques ont arrêté pendant ſi long-temps le progrès des Sciences; ils veulent définir les différentes productions de la Nature avant que de les avoir bien décrites : c'eſt vouloir juger avant que d'avoir connu, & vouloir apprendre aux autres ce que l'on ignore ſoi-même. Auſſi les méthodes de nomenclature,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 136 sur 615

& les définitions qu'elles renferment, ne ſont que des eſquiſſes très-imparfaites du tableau de la Nature, qui ne peut être exprimé que par des deſcriptions complètes.

La deſcription d'une choſe renferme ſa définition & lèvent toutes les difficultés qui pourroient naître de l'incertitude du nom, par conſéquent une bonne méthode de deſcription, non ſeulement équivaut aux meilleures méthodes de nomenclature, mais même les renferme toutes, tant pour les définitions que pour les noms; & la méthode de deſcription ne peut pas être arbitraire ni ſujette aux erreurs des conventions des hommes, parce que les deſcriptions préſentent leur ſujet en entier, & tel que la Nature le produit.

En Hiſtoire Naturelle les deſcriptions ne peuvent être vraies qu'autant qu'elles ſont complètes; car ſi on ne décrit qu'une ou pluſieurs parties de chaque objet, ſans comprendre la totalité du ſujet, on ne préſente qu'un tableau défectueux ou chimérique: en effet, quelle idée peut-on prendre d'un animal dont on n'offre que les dents, les mamelles ou les doigts? qu'eſt-ce que nous repréſente un compoſé ſi abſurde? c'eſt tout au plus, une énigme dont les Naturaliſtes ont le mot, & que les autres ne peuvent pas deviner. Prenons un exemple pour le faire mieux ſentir, & demandons: *Quels ſont les animaux, qui diffèrent de bien d'autres pour les dents, qui en ont ſix inciſives à chaque mâchoire, recourbées dans celles du deſſus & dirigées en avant dans celle du deſſous,*

qui ont les dents canines fort courtes & éloignées des autres, & qui n'ont qu'une corne au pied & deux mamelles inguinales (a) ! un Naturaliſte répondra à l'inſtant, votre expoſé eſt trop long des trois quarts, Ariſtote l'a dit en un mot: ce cont les ſolipèdes, c'eſt-à-dire, les chevaux, les ânes, les mulets & les zèbres. Mais que penſeront les gens qui veulent s'inſtruire ! que feront-ils de ces dents, de cette corne, de ces mamelles, qui ſont les ſeules choſes qu'on leur préſente ! ils n'iront pas ouvrir la bouche de tous les animaux pour compter les dents d'ailleurs elles leur feroient méconnoître les femelles, qui n'en ont pas autant que les mâles, au moins dans la pluſpart des animaux dont il s'agit ici; chercheront-ils les mamelles ! on n'en voit point dans le plus grand nombre des mâles, & s'il y en a, elles ne ſont pas placées dans l'endroit indiqué *(b)*; il ne leur reſte donc que la troiſième condition de l'énigme, ſavoir, quels ſont les animaux qui n'ont qu'une corne à chaque pied ! ce caractère eſt le ſeul des trois qui ſoit eſſentiel & conſtant. Mais en croira-t-on le méthodiſte ſur ſa parole, après avoir été trompé ſur les dents & ſur les mamelles ! faudra-t-il donc voir tous les animaux de l'Univers pour s'aſſurer qu'il n'y a que les chevaux, les ânes, les mulets & les zèbres qui n'aient qu'une ſeule corne au pied ! Pourſuivons, & examinons les moyens que les méthodiſtes nous donnent pour diſtinguer les animaux

(a) Linnæi, Syſt. Nat. 1748, pag. 11.

(b) Voyez la deſcription du Cheval.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 138 sur 615

ſolipèdes : les voici. Le cheval, l'âne & le mulet diffèrent par la queue ; celle du cheval eſt garnie de crins dans toute ſa longueur, celle de l'âne & du mulet n'en a qu'à l'extrémité, & le zèbre a pour caractère diſtinctif les bandes tranſverſales de différentes couleurs qui ſont ſur ſa peau : voilà tout. Le méthodiſte eſt ſatisfait, il ne prendra jamais un cheval pour un âne, dès qu'il en verra la queue. Mais quelle idée a-t-on des chevaux, parce qu'on connoîtra le nombre & la poſition de la moitié de leurs dents & de leurs mamelles, la figure de la corne de leurs pieds, & l'arrangement des crins de leur queue ! Voyons un cheval parmi d'autres animaux, obſervons quels ſont les caractères qui nous le feront diſtinguer : ce ne ſeront certainement ni les dents ni les mamelles, on ne les voit pas, & cependant perſonne ne s'eſt jamais mépris à connoître un cheval : ce qui caractériſe un animal à nos yeux, c'eſt l'enſemble de ſa figure, ſon attitude, ſon port, ſa démarche, & les proportions des différentes parties de ſon corps : voilà ce qui nous le fait reconnoître à l'inſtant que nous l'apercevons : en l'obſervant de plus près, nous ſuivons le détail de ces différentes parties, & nous ne le connoiſſons bien qu'après avoir tout vû, autant qu'il nous eſt poſſible de voir.

L'Hiſtoi. Naturelle n'eſt pas bornée aux connoiſſances de l'exiérieur, elle s'étend bien plus loin ; ſon objet principal eſt de développer l'intérieur, & de reconnoître, par l'inſpection du dedans, le méchaniſme

des mouvemens qui paroiſſent au dehors, & les cauſes des appétits & des inclinations qui ſont propres à chaque eſpèce d'animaux; par conſéquent leurs deſcriptions ne ſont complètes qu'autant qu'elles s'étendent à l'intérieur. Les Naturaliſtes ont trop négligé cette partie, la pluſpart ſemblent s'être reſtreints à ne connoître les productions de la Nature que par l'écorce; ſemblables à des voyageurs qui ne voudroient voir que les murs des villes ou les façades des palais, au lieu d'entrer dans l'intérieur & d'examiner en détail tous les chefs-d'œuvre de l'art qui y ſont renfermés. N'imitons pas ces obſervateurs ſuperficiels, approfondiſſons notre ſujet dans tous ſes points intéreſſans, mais gardons-nous des détails minutieux, qui nous jetteroient dans de vaines recherches, tandis qu'il y a tant de choſes importantes à découvrir dans la Nature.

Tout ce qui peut contribuer à perfectionner les connoiſſances de l'économie animale, doit entrer dans les deſcriptions d'Hiſtoire Naturelle; c'eſt-là l'objet que l'hiſtorien ne doit jamais perdre de vûe, c'eſt la règle qui ſert de guide à tout obſervateur intelligent: ceux au contraire qui n'aperçoivent pas ce but, & qui ne ſe propoſent aucun plan qui puiſſe les y conduire, loin de faire des réflexions ſur leur ſujet, contemplent ſans diſcernement tout ce qui ſe préſente à leurs yeux. Toutes les actions des animaux leur paroiſſent également intéreſſantes, ils ne négligeroient pas même celles que le haſard occaſionne indépendamment de l'animal;

ils décrivent, avec l'exactitude la plus ſcrupuleuſe, toutes les parties du corps des animaux les plus informes, ils ſemblent même préférer celles qui paroiſſent les moins importantes, & dont les variétés ſont les plus accidentelles. Ces obſervateurs appeſantis dans les détails, ne s'élèvent jamais au deſſus de leur ſujet pour en apprécier la valeur; les matériaux qu'ils raſſemblent ſont ſi frêles, qu'ils ne peuvent jamais entrer dans la conſtruction d'un édifice ſolide : cependant ils s'efforcent de les décrire avec une emphaſe, que la futilité du ſujet rend encore plus ridicule ; ils croient que tout ce qu'ils ont pris la peine de voir, mérite celle d'être lû : mais quelque ardeur que l'on ait dans ce ſiècle pour l'étude de l'Hiſtoire Naturelle, on ne peut pas faire grand cas de ces prétendues merveilles, & on doit craindre de s'engager dans des détails ſi infructueux.

Le choix des faits eſt la partie eſſentielle de la compoſition des deſcriptions, mais il ne ſuffiroit pas ſeul ſans le choix de l'expreſſion. Toute deſcription conçûe en termes inuſités ou équivoques eſt nulle pour la pluſpart des lecteurs, parce qu'il en eſt peu qui veuillent étudier & deviner des choſes qui devroient être claires & faciles, ou qui ſoient en état de ſuppléer au défaut de l'expreſſion : la deſcription eſt un tableau, ſi ſes couleurs ſont fauſſes & confuſes elles n'expriment aucune image vraie & terminée ; on ne voit qu'un nuage, & on ne diſtingue rien. Telles ſont les deſcriptions compoſées de termes barbares que perſonne n'entend,

n'entend, & qui n'ont de ſignification que dans la tête des auteurs qui les ont créés. Il ne faut pas s'imaginer que les lecteurs apprendront volontiers une nouvelle langue pour lire une deſcription ; & encore quand ils le voudroient, comment parviendroient-ils à entendre des mots compoſés ſans aucune règle conſtante, & un idiome étranger dans toutes les langues ! Il en eſt de ces nouveautés dans l'expreſſion comme du changement des noms le plus généralement reçûs : je ne conçois pas qu'un auteur ſoit aſſez déraiſonnable pour donner des noms à des choſes déjà nommées, & pour employer des expreſſions inintelligibles ; c'eſt vouloir parler pour n'être pas écouté, & écrire pour n'être pas entendu. Il faut appeler chaque choſe par le nom le plus connu, nommons-la comme elle a été nommée, & épuiſons toutes les expreſſions de notre langue avant que d'en emprunter dans une autre : notre ſeul objet eſt de faire connoître la choſe & de nous exprimer de la manière la plus claire, car les noms n'ont jamais manqué aux choſes connues, & les langues ſont aſſez riches pour qui ſait écrire.

Il doit encore y avoir dans les deſcriptions une autre ſorte d'expreſſion bien différente de celle des mots ; c'eſt l'expreſſion de la choſe, c'eſt la compoſition du tableau, qui eſt bien plus difficile que celle des couleurs. Chaque objet ſe préſente ſous un aſpect qui lui eſt particulier, par conſéquent chaque objet doit être décrit d'une manière particulière pour que la

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 142 sur 615

deſcription ſoit conforme à ſon ſujet. Cependant il y a quelques règles générales que l'on pourroit appliquer à toutes les deſcriptions, parce que les organes ſont les mêmes dans tous les hommes, quoique les objets ſur leſquels ils les exercent ſoient différens : au premier coup d'œil que nous jetons ſur une choſe, nous en apercevons l'enſemble & la totalité avant que d'en diſtinguer les parties; ainſi dans la deſcription d'un animal on ne peut ſe diſpenſer de ſuivre l'ordre naturel, qui eſt de commencer par exprimer la figure totale de l'animal avant que de détailler les parties de ſon corps; on doit auſſi décrire l'extérieur avant de paſſer à l'intérieur, &c. & toûjours deſcendre du général au particulier. Mais cette figure totale, cet enſemble & cette deſcription de l'extérieur peuvent être exprimés de bien des façons différentes, c'eſt-là l'expreſſion de la choſe qui doit varier dans les différens objets à proportion de la différence qui eſt entre eux. Que l'on compare un cheval & un cochon, un cerf & un rhinocéros, on verra aiſément que le premier coup de pinceau ne doit pas être le même pour les uns & pour les autres.

Les êtres animés paſſent de l'état de repos à l'état de mouvement, & exigent par ce changement deux parties dans leur deſcription : il faut toûjours commencer par décrire un animal dans l'état de repos, c'eſt le fondement de la deſcription de l'état de mouvement, parce que dans celui-ci on n'aperçoit plus aſſez diſtinctement les différentes parties du corps, on n'en

voit que le déplacement, & on a encore assez de peine à reconnoître la succession des mouvemens & des attitudes; mais chaque animal doit être décrit différemment dans l'état de mouvement comme dans l'état de repos, puisque la force & la suite des mouvemens varient dans les différentes espèces d'animaux, comme la figure des parties de leur corps. La description de l'animal, considéré dans l'état de repos, renferme l'exposition de toutes les parties du corps & l'expression de l'ensemble de la figure totale; ce doit être un *portrait*, dans lequel on reconnoisse l'habitude du corps & les traits de l'animal : la description du même animal, vû dans l'état de mouvement, devient un *tableau d'histoire* qui le représente dans les différentes attitudes qui lui sont propres, & dans tous les degrés de mouvement auxquels il se livre par son penchant naturel, lorsqu'il est excité par ses besoins ou agité par ses passions. Pour faire voir combien ces deux descriptions sont nécessaires & combien elles diffèrent l'une de l'autre, supposons que dans un tableau on représente, par exemple, un lion arrêté sur ses quatre pattes, la tête baissée, l'œil tranquille, la crinière pendante & la queue traînante; & que dans un autre tableau le même lion paroisse rugissant de colère, la tête levée, l'œil hagard, la gueule écumante, la queue menaçante, les pattes tendues, les griffes déployées, & tout le corps dans une attitude violente; reconnoîtrions-nous dans ces deux tableaux le même animal, si on ne nous avoit donné l'idée du

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 144 sur 615

lion dans l'état de repos, avant que de l'avoir repréſenté dans les mouvemens de ſa fureur! non, puiſque nous ne voyons plus dans le viſage d'un homme tranſporté de colère les traits naturels de ſa phyſionomie.

Les animaux ont auſſi leur phyſionomie, c'eſt-à-dire qu'en comparant les principaux traits de leur face avec les traits qui caractériſent les phyſionomies des hommes, on y trouve une ſorte de reſſemblance éloignée; & quelque groſſière que ſoit cette reſſemblance, elle ſuffit pour nous rappeler en voyant la face des animaux, les idées de fineſſe ou de ſtupidité, de douceur ou de férocité, &c. que nous donnent les phyſionomies de certains hommes. Les traits qui varient le plus dans les animaux ſont ceux qui dépendent de la longueur des mâchoires & des os du nez, & de la diſtance des yeux: ces mêmes traits influent beaucoup ſur la phyſionomie des hommes, auſſi a-t-on prétendu que chaque homme avoit une reſſemblance particulière avec quelque animal, dont le caractère influoit ſur le ſien. De telles chimères ſont ſi abſurdes qu'on n'en doit rien conclurre, ſi ce n'eſt qu'indépendamment de la reſſemblance groſſière qui eſt entre la face des animaux & le viſage de l'homme, il y a encore une ſorte de rapport entre les principaux traits de la phyſionomie, rapport purement matériel, qui ne ſuppoſe dans les animaux que des paſſions produites par leur inſtinct & par leur tempérament, & qui peuvent être comparées à celles

qui ne dépendent que de la partie animale de l'homme.

C'eſt la phyſionomie des animaux, priſe dans ce ſens, qu'il eſt très-difficile de ſaiſir & de rendre, l'expreſſion de ce portrait eſt d'une exécution bien fine & bien délicate; auſſi voyons-nous la pluſpart des deſſinateurs & des peintres exprimer parfaitement tous les traits de la face d'un homme ou d'un animal, ſans donner cependant le caractère de la phyſionomie. Il y a moins de difficulté à faire des tableaux, les paſſions qui y dominent ne peuvent guère être équivoques; auſſi les peintres ont-ils un très-grand avantage à repréſenter les animaux dans des chaſſes ou des combats; il n'y a que les grands maîtres qui réuſſiſſent à en faire de ſimples portraits, tels qu'il faudroit les avoir pour accompagner la deſcription des animaux conſidérés dans l'état de repos. Mais la fineſſe de ces portraits rendus au naturel échappe à la pluſpart des connoiſſeurs, parce qu'ils n'ont pas aſſez obſervé dans la Nature les caractères de la phyſionomie des animaux, qui ſont ſi ſenſibles, comme la fineſſe du renard, la timidité du chevreuil, l'imbécillité du cochon, &c. On eſt bien plus frappé à l'aſpect d'un tableau où l'on reconnoit la fierté d'un taureau qui ſe défend contre l'opiniâtreté d'un dogue ou la férocité d'un ſanglier bleſſé par les chiens, cependant cet air de fierté dans le taureau & de férocité dans le ſanglier eſt l'expreſſion d'un état violent & forcé, & très-différent de l'état de repos, dans lequel le taureau ne nous paroît qu'un animal

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 146 sur 615

groſſier, & le ſanglier un animal ſtupide; le portrait qui les repréſenteroit dans cet état ſeroit le moins recherché, quoique le plus néceſſaire pour la vraie connoiſſance du caractère de ces animaux: de même la deſcription d'un animal, vû dans l'état de repos, ne ſera intéreſſante que pour ceux qui voudront étudier la Nature, parce que cette deſcription eſt inſéparable d'une ſorte de ſéchereſſe dans les détails, toûjours déplaiſante pour ceux qui ne ſont flattés que de l'agrément, & qui négligent leur inſtruction.

Toute deſcription des parties extérieures des animaux ne peut reſſortir qu'à l'Hiſtoire Naturelle; mais les deſcriptions des parties intérieures peuvent être faites dans différentes vûes, & appartenir à pluſieurs ſciences: chaque ſcience, chaque art, emploie les moyens qui lui ſont propres pour parvenir à ſon but; mais ces moyens diffèrent peu dans certaines ſciences, dont les objets ſont analogues, telles ſont l'Hiſtoire Naturelle & l'Anatomie, toutes les deux traitent de la deſcription des parties intérieures des animaux; cependant les deſcriptions des Naturaliſtes doivent être faites différemment de celles des Anatomiſtes, parce que l'objet de l'Hiſtoire Naturelle n'eſt pas préciſément le même que celui de l'Anatomie. Mais ceci pourroit paſſer pour un paradoxe, ainſi il eſt néceſſaire de l'expliquer.

Si l'on conſidère l'Hiſtoire Naturelle dans toute l'étendue que l'on pourroit donner à ſa dénomination, en la faiſant paſſer au-delà de ſes limites ordinaires, il

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 147 sur 615

eſt certain que cette ſcience comprendroit toutes les connoiſſances qui ont rapport aux animaux, aux végétaux & aux minéraux ; & dans la ſeule partie qui traiteroit des animaux, on trouveroit l'anatomie, la médecine, la chirurgie, la chymie, & tous les arts que l'on exerce ſur les animaux, ou ſeulement ſur quelques parties des animaux ; enfin toutes ces ſciences, tous ces arts, ne feroient que des diviſions d'Hiſtoire Naturelle, ou pluſtôt une compilation de connoiſſances ſous le nom d'Hiſtoire Naturelle. On auroit des branches & des rameaux ſans qu'il y eût de tronc qui les ſoûtînt, ni de racine qui les nourrît : une telle ſuppoſition ſeroit abſurde, auſſi l'Hiſtoire Naturelle comprend-elle des connoiſſances qui n'appartiennent en propre, ni à l'anatomiſte, ni au médecin, ni au chirurgien, ni au chymiſte, &c. mais qui caractériſent le naturaliſte ; c'eſt pourquoi cette ſcience eſt bien diſtincte des ſciences & des arts qui en dépendent. On pourroit peut-être le prouver par des définitions, mais comme ce genre de preuve eſt toûjours équivoque, laiſſons les définitions, diſcutons le fond de la ſcience, &, pour en juger, prenons l'exemple de la deſcription des parties intérieures des animaux, en tant qu'elle a rapport à l'Hiſtoire Naturelle & à l'Anatomie, voyons en quoi ces deux ſciences diffèrent l'une de l'autre dans des deſcriptions dont le ſujet leur eſt commun.

L'anatomiſte diſsèque ſon ſujet, le naturaliſte l'obſerve, & tous les deux le décrivent. Je conſidère ici

l'anatomie ſéparément de la phyſiologie, & ſeulement comme l'art de diſſéquer : c'eſt dans ce ſens que l'anatomiſte ne voit que l'individu qu'il a ſous les yeux, tandis que le naturaliſte s'occupe autant des caractères ſpécifiques que des qualités individuelles ; il cherche dans les productions de la Nature des différences & des reſſemblances, ainſi en obſervant l'une il ne perd jamais de vûe les autres ; toutes doivent faire partie de ſes connoiſſances & fournir des faits à l'Hiſtoire Naturelle : cette ſcience parcourt d'un pas égal les eſpèces, les genres, les claſſes & les règnes, ſes limites ſont auſſi étendues que celles de la Nature. L'anatomiſte au contraire s'attache à l'individu qu'il a préſent, il l'examine dans toutes ſes parties, il le contemple ſi attentivement, qu'il le voit s'agrandir ſous ſes yeux ; à force de le détailler & de le diviſer, il croit développer un monde entier. Cet objet, immenſe dans les détails, devient immenſe dans les deſcriptions, & occupe ſeul l'anatomiſte ; il y applique tout ſon art, art dont les opérations ſont ſi fines & ſi délicates qu'elles ſuppoſent la plus grande ſagacité & la dextérité la plus parfaite. Tout ſe développe aux yeux d'un habile anatomiſte, il ſépare les membranes les plus minces, il voit la direction des fibres les plus déliées, il ſuit les vaiſſeaux & les nerfs juſque dans leurs plus petites ramifications, il pénètre dans les cavités les plus ſecrettes, il obſerve l'intérieur des filtres les plus ſerrés, il déploie les organes des parties les plus ſolides, il ſait raffermir, par des préparations, celles qui ſont les plus

plus molles, il coupe, il écarte, il enlève tout ce qui lui fait obſtacle, il porte la lumière ſur ſon ſujet en y injectant des liqueurs colorées, qui rendent ſenſibles à la vûe les parties les moins apparentes, il les groſſit à l'aide du microſcope; enfin l'Anatomiſte particulariſe ſon ſujet dans tous ſes points, & deſcend juſqu'aux plus grandes profondeurs de l'analyſe pour le conſidérer dans ſes premiers élémens, tandis que le Naturaliſte généraliſe toutes ſes obſervations, & s'élève aſſez pour reconnoître d'un coup d'œil les réſultats généraux de la Nature.

Des Sciences, dont la conduite eſt ſi différente, doivent néceſſairement employer différens procédés pour la même opération, c'eſt ce qui doit arriver dans les deſcriptions des parties intérieures des animaux. Toute deſcription anatomique de ces parties eſt bonne dès qu'elle eſt claire & conforme à la vérité; la prolixité y eſt peut-être plus à rechercher qu'à éviter; nous pourrions rapporter pour exemple pluſieurs ouvrages de ce genre, dont les longueurs ont fait le principal mérite: il n'en eſt pas de même pour les deſcriptions d'Hiſtoire Naturelle, elles ont des limites que l'on ne peut paſſer ſans ſe jeter dans l'obſcurité ou dans la minutie, tout détail ſuperflu eſt au-delà de ces limites, & l'on n'en peut jamais tirer aucune conſéquence fondée.

Il eſt donc queſtion de ſavoir quelles ſont les bornes que l'on doit ſe preſcrire dans les deſcriptions d'Hiſtoire Naturelle, & comment on peut éviter ces détails

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 150 sur 615

qui, bien loin d'être néceſſaires, ſont nuiſibles; il y a un moyen facile & évident pour quiconque aura réfléchi ſur l'objet des deſcriptions des animaux. On ſe propoſe de faire connoître les qualités eſſentielles à chaque animal, & on ne peut y parvenir qu'en rapportant les reſſemblances & les différences principales qui ſont entre les différens animaux; il faut les comparer les uns aux autres, pour apprendre à les diſtinguer; dès-lors on doit faire des deſcriptions dont chacune puiſſe être comparée aux autres. Il réſultera de cette comparaiſon, non ſeulement la connoiſſance diſtincte de chaque animal, mais encore des connoiſſances générales de tous les animaux, qui ſont les principales connoiſſances que nous puiſſions tirer de l'Hiſtoire Naturelle. Dès que l'on eſt bien convaincu que les deſcriptions doivent être comparées, on ne doutera pas qu'il ne ſoit abſolument néceſſaire de les faire toutes ſur le même plan. Un plan de deſcription eſt la méthode que l'on ſe propoſe de ſuivre en obſervant les animaux; chaque obſervateur peut s'en faire une à ſon gré, elle ſera toûjours bonne ſi elle eſt conſtamment la même dans toutes les deſcriptions, parce qu'on pourra comparer ces deſcriptions dans tous leurs points, & tirer de ces comparaiſons des réſultats; il eſt vrai que ces réſultats ſeront plus ou moins étendus, plus ou moins concluans, en raiſon de la ſagacité & du génie avec leſquels le plan de la méthode aura été concerté.

En faiſant toutes nos deſcriptions ſur un même plan,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 151 sur 615

nous évitons les détails ſuperflus; car quelqu'étendues qu'elles ſoient, toutes les parties en ſeront utiles; ſi chacune de ces parties ſe trouve dans toutes les deſcriptions, il réſultera quelque conſéquence de la comparaiſon que l'on en fera. J'avoue qu'il y a tels réſultats qui ſont fort indifférens pour l'avancement de nos connoiſſances, tout obſervateur intelligent les prévoit & les néglige; mais s'il s'en trouve qui n'aient pas aſſez de diſcernement pour faire un bon choix, on ne perdra pas tout le fruit de leurs travaux, lorſque leurs deſcriptions ſeront méthodiques, on ſaura ſéparer le bon grain de l'ivroye. C'eſt par la même raiſon que les deſcriptions tronquées & imparfaites, celles qui, loin de renfermer toutes les parties eſſentielles, n'en comprennent qu'un nombre incomplet, peuvent contribuer à l'avancement de la ſcience, ſi les mêmes parties ſont rapportées dans toutes les deſcriptions, & ſi elles y ſont décrites ſur le même plan; on peut les comparer & achever enſuite la deſcription totale: voilà l'utilité que l'on peut tirer des méthodes de nomenclature. Ces méthodes ne comprennent que la deſcription de quelques parties des productions de la Nature ſur leſquelles elles ont été faites; c'eſt trop peu pour les faire connoître en entier; mais c'eſt déjà un pas de fait, puiſque ces parties de deſcription ſont méthodiques & peuvent être comparées. Auſſi les nomenclateurs les moins enthouſiaſtes pour le ſyſtème de la Nature, conviennent-ils que le principal avantage que l'on puiſſe

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 152 sur 615

tirer de la multiplicité des méthodes de nomenclature, eſt d'avancer les deſcriptions, parce que plus on fait de méthodes dans ce genre, plus on décrit de parties. En effet, lorſque les nomenclateurs auront épuiſé toutes les parties de leur objet à force de nouvelles méthodes, faute de reſſources ils deſeſpéreront ſans doute de pouvoir trouver le ſyſtème de la Nature, & il faut eſpérer qu'ils s'en dédommageront en profitant des débris de leurs propres ſyſtèmes, & en les réuniſſant ſur un même plan pour compléter la deſcription totale.

Les Anatomiſtes, trop long-temps occupés à détailler toutes les parties du corps humain, ſont enfin parvenus à épuiſer leur objet; n'y ayant plus de choſes importantes à décrire, ils ſe ſont jetés dans des diſcuſſions frivoles; ils ont employé plus d'adreſſe & de ſagacité, pour apercevoir des choſes imperceptibles, qu'il n'en auroit fallu pour faire des découvertes réelles. Ce défaut de conduite vient d'une erreur qui a prévalu; on a cru qu'il ſuffiſoit d'obſerver le corps humain pour découvrir tous ſes organes, & on a négligé toutes les lumières que l'on pouvoit tirer de l'obſervation du corps des animaux : c'étoit mal raiſonner, ou pluſtôt on n'avoit pas raiſonné ſur cette matière, on s'étoit contenté de regarder, ſans chercher la bonne façon de voir. Lorſque nous examinons les productions de la Nature, nous rencontrons ſouvent des nuages ſi obſcurs, que nous ne pouvons les diſſiper qu'en

empruntant des lumières de toutes parts, & en les tirant de la variété de ſes ouvrages, pour tâcher de les connoître en les comparant les uns aux autres. Lorſqu'on n'examine que le corps de l'homme, on ne peut avoir idée que des organes qui y ſont ſenſibles; mais lorſque l'on compare le corps de l'homme au corps des animaux, on juge des organes qui ſont cachés dans l'homme, par ceux du même genre qui ſont apparens dans les animaux. Cette voie de comparaiſon & d'induction nous conduit à des termes que nous n'aurions jamais pû apercevoir par l'examen d'un ſeul objet.

Il s'eſt trouvé parmi les anatomiſtes des obſervateurs qui ont ſenti la néceſſité de comparer les différens animaux pour parvenir à la connoiſſance de l'économie animale, & ils ont donné à ces recherches le nom d'anatomie comparée. On a décrit dans cette vûe pluſieurs eſpèces d'animaux *, mais il manque dans la pluſpart de ces deſcriptions l'uniformité du plan, ſans laquelle toute deſcription eſt preſque inutile pour l'anatomie comparée. Chacun a décrit ſon objet par l'endroit qui l'a le plus frappé, & n'a conſidéré que l'objet même, ſans ſe ſoucier de la comparaiſon que l'on en pourroit faire avec d'autres objets du même genre, de ſorte que dans la deſcription de certains animaux il y a des parties qui ſont très-amplement détaillées, tandis

* Voyez les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, les Éphémérides des curieux de la Nature, les Tranſactions philoſophiques, les recueils de Berlin, de Copenhague, de Leipſick, &c.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 154 sur 615

qu'il n'eſt fait preſque aucune mention de ces mêmes parties dans la deſcription d'autres animaux. Cela ſe trouve dans les meilleurs ouvrages que nous ayons ſur cette matière, quoiqu'il paroiſſe dans pluſieurs endroits que les auteurs n'étoient pas trop éloignés de la bonne méthode, & qu'ils auroient bien ſû la trouver ſi leur travail avoit eu des ſuites. On voit dans les deſcriptions d'animaux, qui ont été dreſſées par M. Perrault, & qui ſont dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, que les animaux les plus analogues ſont comparés enſemble dans la même deſcription, par exemple, le hériſſon & le porc-épic, le loir & la marmotte. Quelqu'un qui avoit eu l'idée de comparer un animal à celui qui lui reſſembloit le plus, pouvoit bien le comparer en même temps à un autre animal qui lui reſſemble un peu moins, & étoit bien près d'étendre la comparaiſon à tous les animaux: ce projet étant bien concerté, on ne pouvoit pas manquer de faire toutes les deſcriptions ſur un même plan, ou au moins on en auroit ſenti la néceſſité ſi on avoit voulu faire un corps complet d'anatomie comparée. La compilation de Valentini*, qui eſt le recueil le plus étendu que nous ayons dans ce genre, pourroit déjà fournir de grands réſultats & des faits importants pour l'économie animale, ſi les deſcriptions qu'elle renferme étoient toutes conformes à une méthode générale; mais heureuſement ce

* *Amphiteatrum Zootomicum, &c. Mich. Bern. Valentini.* Francofurti ad Mœnum, in-fol. 1720.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 155 sur 615

défaut de méthode eſt réparable en quelque façon, car il eſt poſſible de réduire une partie de chacune de ces deſcriptions à un plan uniforme. J'ai bien compté puiſer dans ces ſources, lorſque j'ai entrepris de faire la deſcription des animaux; mais avant que d'expliquer quelles ſont les parties des deſcriptions déjà faites qui peuvent convenir à mon plan, il eſt néceſſaire d'en expoſer la méthode.

J'aurois voulu examiner toutes les eſpèces d'animaux, s'il étoit poſſible de les rencontrer, & mon deſſein a été de les obſerver, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour décrire les proportions des parties principales de leur corps, parce que cette deſcription des parties extérieures ſuffit pour faire diſtinguer chaque animal, & celle des parties intérieures pourra donner une idée des principaux organes qui ſervent aux animaux, & des modifications de chacun de ces organes dans les différentes eſpèces. Une telle expoſition du corps des animaux peut fournir, par la comparaiſon que l'on fera des uns aux autres, des réſultats importans pour l'économie animale, qui eſt le principal objet de l'Hiſtoire Naturelle.

La deſcription des parties extérieures d'un animal n'eſt que l'énoncé des différentes dimenſions de ſon corps; il eſt vrai qu'il y a du choix à faire dans la manière dont on les prend, mais les plus ſimples ſont les meilleures, par exemple, la longueur, la largeur, l'épaiſſeur, le diamètre, la circonférence, &c. Je ne ferai pas ici le détail des dimenſions que j'ai rapportées

pour chaque animal, on les verra dans la ſuite de cet ouvrage. Les dimenſions & les proportions varient dans les animaux en raiſon de l'âge, de la grandeur & de la groſſeur de chaque individu; on ſait aſſez que l'on ne peut éviter cet inconvénient, & qu'il en eſt des animaux comme des hommes, parmi leſquels on ne peut pas trouver deux individus parfaitement ſemblables. De toutes les femmes les plus belles & les mieux faites qui ſont ſur la terre, il n'y en a aucune qui reſſemble en tout point à la ſtatue de la Vénus de Médicis, par la même raiſon il n'y aura peut-être jamais aucun animal qui ait préciſément les dimenſions des individus qui ont ſervi à nos deſcriptions. Cependant on pourra rapporter à chaque deſcription tous les animaux de l'eſpèce de l'animal qui y eſt décrit, parce qu'on y trouvera ſon âge, ſon poids, & une principale dimenſion qui eſt indépendante des variétés de la groſſeur du corps. Cette dimenſion eſt priſe en ligne droite, depuis l'extrémité du muſeau juſqu'à l'anus, la tête & le col étant étendus autant qu'il eſt poſſible dans la direction de la portion de la colonne vertébrale, qui eſt compoſée par les vertèbres du dos & des lombes. Les couleurs ſont plus conſtantes que les dimenſions dans les animaux ſauvages, auſſi ſont-elles partie de la deſcription extérieure, & elles y ſont rapportées en détail ; mais celles des animaux domeſtiques ne ſont qu'indiquées en général, parce qu'elles varient de toutes façons dans différens individus d'une même eſpèce.

La

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 157 sur 615

La deſcription de l'intérieur ſeroit très-longue & très-compliquée ſi on y développoit toutes les parties ſolides qui compoſent le corps des animaux, par exemple, les os, les muſcles, les vaiſſeaux, les nerfs, les viſcères; un travail auſſi étendu occuperoit pluſieurs hommes pendant toute leur vie; mais quelle ſeroit l'immenſité de ce détail, ſi on entreprenoit de décrire les cartilages, les tendons, les membranes, la direction des fibres, les vaiſſeaux lymphatiques, & tous les filtres des ſecrétions, les corps glanduleux, vaſculeux, &c. enfin ſi on vouloit faire ſur chaque animal ce qui a été fait ſur le corps humain! Une telle deſcription eſt du reſſort de l'Anatomie, & ſeroit peut-être néceſſaire pour apprendre à développer, encore mieux qu'on ne l'a fait, les parties les plus fines & les plus déliées du corps humain, & pour faire connoître les maladies des animaux & les remèdes qui leur conviennent; mais les Naturaliſtes doivent abandonner ces détails, pour ne jamais perdre de vûe les rapports généraux qui ſont entre les différentes eſpèces d'animaux, les reſſemblances & les différences eſſentielles qui ſe trouvent dans le méchaniſme de leur corps: auſſi m'en ſuis-je tenu à l'examen des parties principales, & n'ai-je eu en vûe que la ſituation, la figure, les dimenſions & les proportions des os, du cerveau, du cœur, des poumons, du diaphragme, de l'eſtomac, des inteſtins, du foie, de la rate, du pancreas, des reins, de la veſſie, & des parties de la génération du mâle & de la femelle,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 158 sur 615

de l'embryon & de ſes enveloppes, &c. Il ne ſera pas fait mention de muſcles, d'artères, de veines ni de nerfs, &c. parce que j'ai cru que les lumières que l'on pourroit tirer de la deſcription de ces parties, n'influeroient pas autant ſur les connoiſſances de l'économie animale, que les réſultats que produira la comparaiſon des viſcères & des os.

Le plan de ces deſcriptions eſt le même pour tous les animaux, de ſorte que la deſcription de la ſouris eſt auſſi étendue que celle du cheval, parce qu'en effet le corps de la ſouris eſt compoſé d'à peu près autant de viſcères & d'os que celui du cheval, & qu'il faut les comparer tous les uns avec les autres. J'ai obſervé à l'extérieur & à l'intérieur tous les animaux du pays, & ceux que j'ai pû avoir des pays étrangers; j'ai examiné le mâle, la femelle & l'embryon toutes les fois que j'ai pû les avoir; j'ai répété mes obſervations ſur pluſieurs individus de chaque eſpèce, pour diſtinguer ce qui eſt d'une nature conſtante & ce qui n'eſt que variété; mais il y a pluſieurs animaux étrangers qu'il ne m'a pas été poſſible d'obſerver, à meſure qu'il en viendra je pourrai augmenter le corps d'obſervations que je donne au public. J'eſpère auſſi qu'il ſe trouvera des Médecins, des Chirurgiens & des Naturaliſtes dans nos colonies & dans les pays étrangers, qui voudront bien concourir à la perfection de cet ouvrage, en décrivant les animaux qu'ils ſeront à portée d'obſerver, & en ſe conformant au plan de nos deſcriptions.

La pluſpart des hommes ont, pour les diſſections des cadavres, & pour les deſcriptions des parties intérieures des animaux, une répugnance naturelle, cependant on gagne beaucoup à la ſurmonter; j'en aurois eu moi-même autant qu'un autre pour ce genre de travail, ſi je n'avois été ſoûtenu contre le dégoût qui l'accompagne néceſſairement, par le plaiſir de voir chaque jour des choſes nouvelles. En ouvrant un animal que l'on n'a pas encore obſervé, on découvre, pour ainſi dire, un pays nouveau, & on a, pour le reconnoître, tout l'empreſſement que pourroit avoir un voyageur pour voir une ville qu'il ſeroit allé chercher au bout du monde. Le Naturaliſte eſt ſujet, comme le voyageur, à s'égarer dans le pays où il eſt nouvellement arrivé; le premier animal que l'on ouvre ne ſuffit pas pour une deſcription; cette première inſpection n'eſt qu'un coup d'œil incertain, ſouvent jeté au haſard, & toûjours fautif: on ne remarque d'abord que les objets principaux, & un moment après qu'on les a aperçûs, tout eſt déjà dérangé, déplacé & en deſordre, on a pris tout au plus quelques connoiſſances générales; mais lorſqu'on ouvre le ſecond ou le troiſième animal de la même eſpèce, on ſe trouve en pays aſſez connu pour pouvoir le parcourir en détail. Quand même on ne voudroit pas prendre la peine de faire une deſcription entière, ce ſeroit déjà beaucoup que d'avoir quelques obſervations principales ſur les animaux les moins connus, nous les recevrions toûjours avec la

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 160 sur 615

plus grande reconnoiſſance, & nous ne manquerions pas d'apprendre au public de quelle part elles nous ſeroient venues. Sans ces ſecours on ne pourroit pas eſpérer de faire un corps complet de deſcriptions; mais toutes les obſervations particulières, tous les faits détachés y concourront ſi on les recueille & ſi on les raſſemble ſur un même plan : c'eſt dans cette vûe que je tirerai, des deſcriptions des animaux étrangers déjà faites par différens auteurs, toutes les obſervations qui ont rapport à celles que j'ai faites ſur les autres. Ainſi tous les faits connus & relatifs au plan de nos deſcriptions ſeront réunis dans cet ouvrage, & nous donneront les moyens de tirer des réſultats généraux mieux fondés, puiſqu'ils le ſeront ſur les deſcriptions d'un plus grand nombre d'animaux.

Nous avons déjà en Hiſtoire Naturelle quelques obſervations ſuivies ſur les différentes eſpèces d'animaux, ce ſont les caractères employés dans les diſtributions méthodiques que l'on en a faites. On trouve dans ces méthodes une deſcription uniforme des mêmes parties dans chaque animal; cela eſt très-conforme à notre plan, par conſéquent nous aurons recours à ces deſcriptions pour les animaux étrangers que nous n'aurons pas vûs : il y a encore un autre avantage à tirer des méthodes; elles nous préſentent des réſultats généraux, acquis par un grand nombre d'obſervations particulières. La reſſemblance de quelques parties, entre les animaux de différentes eſpèces, forme des caractères

génériques; la reſſemblance qui ſe trouve entre les animaux de quelques genres, forme un caractère plus étendu, par lequel les *ordres* ou les claſſes ſont déterminés; ainſi les caractères des genres, des *ordres* & des claſſes ſont autant de réſultats tirés des obſervations particulières, & par conſéquent des faits néceſſaires pour la connoiſſance des animaux. Ces obſervations, qui ont été combinées ſur un plan ſuivi, ſont ſi importantes, que nous ne devons pas oublier de les expoſer dans notre ouvrage, puiſque ces diſtributions méthodiques donnent quelques connoiſſances générales qui doivent précéder la deſcription particulière de chaque animal; d'ailleurs cette expoſition eſt encore néceſſaire pour ceux qui ne voudront ſe ſervir des méthodes que pour la nomenclature des animaux, d'autant plus que dans leurs hiſtoires nous ne ſuivrons aucune méthode de nomenclature, parce que nous voulons faire des deſcriptions les plus complètes qu'il nous ſera poſſible, & non pas de ſimples définitions.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 162 sur 615

EXPOSITION

Des distributions méthodiques des Animaux quadrupèdes.

IL faut remonter jusqu'à Aristote pour trouver les principes les plus généraux de la division des animaux; cet auteur étoit aussi grand Philosophe que grand Naturaliste, aussi ne doutoit-il pas qu'on ne pût employer plusieurs caractères qui, quoique différens, fussent également bons pour distinguer les animaux les uns des autres, soit par leur manière de se nourrir, soit par leurs actions, soit par leurs mœurs, soit par les parties de leur corps *(a)*; il observe une différence principale entre les animaux terrestres, en ce que les uns respirent, tel est l'homme, tels sont tous les animaux qui ont des poumons, & que les autres ne respirent pas, quoiqu'ils restent sur la terre & qu'ils y vivent, ce sont les guêpes, les abeilles & tous les insectes *(b)*. Il y a des animaux qui ont des aîles, il y en a qui n'en ont point, ceux-ci rampent, marchent ou se traînent *(c)*: la plupart des animaux ont du sang, mais il s'en trouve qui n'en ont point; les uns ne rendent qu'un œuf dont

(a) Animalium verò differentias, aut per vitas, aut per actiones, aut per mores, aut per partes constitui dignum est. Arist. hist. Anim. lib. 1, cap. 1.

(b) Idem.

(c) Idem.

l'animal doit ſortir, notre auteur les nomme, pour cette raiſon, ovipares; les autres produiſent un fœtus, c'eſt-à-dire, un petit animal, & il les appelle vivipares *(d)*. Les quadrupèdes ont les pieds faits de trois façons différentes; il donne le nom de *ſolipèdes* à ceux qui les ont terminés par une corne d'une ſeule pièce, les *pieds fourchus* ont deux cornes à chaque pied, enfin les *fiſſipèdes* ont les pieds diviſés en pluſieurs doigts *(e)*.

Ariſtote ne donne ces diviſions générales que comme une formule qui indique les principales choſes dont il doit traiter plus au long *(f)*; mais il connoiſſoit trop bien les animaux pour admettre des diſtributions méthodiques, des diviſions ſuivies & détaillées, en claſſes, genres, eſpèces, &c. s'il reconnoît des genres, ce n'eſt qu'à la façon du vulgaire, qui donne le même nom à toutes les choſes qui paroiſſent de même nature, comme les oiſeaux, les poiſſons, &c. & il ne prétend tirer aucun autre avantage des dénominations génériques, que la facilité de retracer en un mot des qualités générales que l'on ſeroit obligé de détailler trop ſouvent, ſi l'on n'étoit convenu de les exprimer en un ſeul terme *(g)*;

(d) Hiſt. Anim. lib. 1, cap. 6.

(e) De part. Anim. l. 1, cap. 3.

(f) Hæc ita impræſentiarum formula expoſuiſſe quâdam præguſtandi gratiâ placuit, videlicet, ut quibus de rebus tractandum, & quatenus eſſet perſequendum intelligeretur. De hiſt. Anim. lib. 1, cap. 6.

(g) Quapropter generatim ſumere animalia tentandum eſt, ut à vulgo jam autore diſtinctum eſt genus avis, piſcis, cæterorum, quæ ſingula multis differentiis deſcribuntur. De part. Anim. lib. 1, cap. 3. *Sed ſi ita eveniet ut ſæpe de eodem dicatur affectu (quoniam communis pluribus ſit)*

mais il proſcrit formellement toutes ſous-diviſions de genre, & ſur-tout celles qui ſeroient déterminées par des différences, & il ſoûtient que de telles diviſions ſont en partie forcées, & en partie abſolument impoſſibles, & qu'en formant les différentes branches de la diviſion, on ſépare, on écarte, on éloigne les unes des autres des choſes qui cependant doivent toûjours ſe trouver ſous le même point de vûe, par exemple, les oiſeaux ſont diſperſés dans des genres oppoſés, il ſe rencontre des animaux à pluſieurs pieds dans le genre des animaux terreſtres, comme dans celui des aquatiques *(h)*; d'ailleurs, pour faire ces ſous-diviſions de genre, on eſt obligé d'employer des caractères négatifs, par exemple, il y a des animaux qui ont des pieds, d'autres n'en ont point, il y en a qui ont des plumes, d'autres en ſont privés. Ariſtote rejette ces caractères de privation, parce qu'on ne peut pas établir une différence ſur une idée de privation, & que ce qui n'eſt pas, ne peut pas avoir des eſpèces; leur rapport à ce genre ſeroit chimérique, puiſque le fondement de la relation ſeroit purement négatif *(i)*.

efficietur ſane, ut ſeorsùm referre de ſingulis, & ſubabſurdum ſit, & prolixum. Cæterum ſcite fortaſſe agetur, ſi quæ ad genera attinent, ea communi negotio explicemus: videlicet quæ rectè ab hominibus definita dicuntur, quæque naturam ſortiuntur communem, & ſpecies non longè inter ſe differentes complectuntur, ut avis, ut piſcis, & ſi quid aliud ſit, nomine quidem vacans, ſed genere pari modo ſpecies continens. Quæ autem non ejuſmodi ſunt, hæc ſingillatim doceamus: ut de homine, & ſi quid aliud tale habeatur. De part. Anim. lib. 1, cap. 4.

(h) Idem, cap. 2.

(i) At privationis, qua privatio

Ces

Ces principes ſont bien dignes du philoſophe qui les a donnés, & prouvent aſſez que ce grand homme avoit autant d'élévation de génie que d'étendue de connoiſſances; mais pour bien comprendre la vérité de ces principes, il faut réfléchir ſur l'idée que nous préſente une diviſion d'animaux établie ſur deux caractères, dont l'un eſt poſitif & l'autre négatif. Pour faire cet examen, reprenons l'exemple que nous donne Ariſtote, & ſuppoſons que l'on diviſe les animaux en deux claſſes, dont l'une comprenne ceux qui ont des pieds ou des plumes, & l'autre ceux qui n'ont point de pieds ou point de plumes. La première claſſe étant déterminée par un caractère poſitif, nous donne une idée claire & diſtincte en nous repréſentant les animaux qui ont des pieds ou des plumes; mais la ſeconde n'étant fondée que ſur un caractère négatif, nous n'en tirons qu'une idée vague & indéterminée, nous n'imaginons qu'une privation de pieds ou de plumes, & nous n'apercevons d'abord aucun être réel & qui fixe notre attention; car on ne peut pas conclurre que, parce qu'un animal n'aura ni pieds ni plumes, il doive être tel ou tel animal. Pour porter ce jugement, il faudroit néceſſairement multiplier les caractères négatifs juſqu'au point de déterminer l'objet par voie d'excluſion, ce qui ſeroit le plus ſouvent fort long & fort difficile : il vaut bien mieux admettre un caractère

eſt, nulla eſt differentia; non enim fieri poteſt ut ſpecies ejus ſit quod non eſt, velut impedati, aut impennati, ſicut pennati & pedati. De part. Anim. lib. 1, cap. 3.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 166 sur 615

positif, par exemple, un animal qui rampe n'a point de pieds, un animal qui est couvert d'écailles n'a point de plumes. Voilà des caractères positifs, par conséquent l'équivoque cesse, & il n'y a plus d'incertitude sur l'objet dont il s'agit : c'est pourquoi Aristote conclud qu'on ne doit établir les divisions que sur des caractères positifs & opposés, & non pas sur des caractères en partie positifs & en partie négatifs, parce que les caractères opposés sont toûjours bien distingués les uns des autres & bien tranchés. Il donne pour exemple une division, dont l'une des branches est déterminée par le caractère de la couleur blanche, & l'autre par celui de la couleur noire, ou par l'opposition d'une ligne droite à une ligne courbe : cette division seroit bien moins équivoque & bien plus certaine que telle autre division d'animaux, dont les uns auroient pour caractère la propriété de nager, tandis que les marques distinctives des autres seroient dans leurs couleurs *(k)*.

Cependant Aristote n'a exécuté aucun plan de distribution méthodique des animaux ; ce sublime métaphysicien qui avoit sû réduire l'art de penser en système, & le raisonnement en formule, ne nous a tracé aucune suite de classes, de genres, d'espèces pour la division des animaux ; il s'en est tenu aux définitions générales

(k) Oppositis item dividendum est : distant enim inter se opposita omnia, ut albedo & nigredo, ut rectitudo & curvitas. Quod si altera diversa sunt, dividendum per opposita est, & non ita, ut alterum natatione, alterum colore distinguatur. De part. Anim. lib. 1, cap. 3.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 167 sur 615

le plus communément reçûes, & ne s'eſt pas ſoucié de combiner des méthodes de nomenclature, parce qu'il étoit bien perſuadé que ces combinaiſons ſeroient trop compliquées pour qu'il fût poſſible d'éviter les réſultats équivoques ou faux qui rendroient infructueux tous les travaux de ce genre *(l)*; il en avertiſſoit certains auteurs de ſes contemporains *(m)*, & ſon opinion a été confirmée par la deſtruction ſucceſſive du grand nombre de ſyſtèmes méthodiques qui ont été faits dans ces derniers ſiècles ſur différentes parties de l'Hiſtoire Naturelle. Les maximes d'Ariſtote ſur ce ſujet peuvent éclairer les plus grands Naturaliſtes, & leur prouver qu'en Hiſtoire Naturelle, comme en toute autre Science, on s'égare dès le premier pas, ſi on n'a de bons principes de métaphyſique. Nous voyons l'application de ces principes dans les ouvrages qu'Ariſtote nous a laiſſés ſur les animaux : ce Naturaliſte, ſi fameux depuis tant de ſiècles & en tant de genres de Sciences, ſera encore d'autant plus célèbre en Hiſtoire Naturelle, que cette Science fera plus de progrès, & que l'on ſera plus en état de comprendre & de vérifier ce qu'a écrit ce grand homme. On ſait qu'Alexandre lui avoit donné des facilités pour obſerver des animaux de toutes eſpèces;

(l) Cum idem in plures cadat diviſiones, & contraria veniant in eadem. De part. Anim. l. 1, c. 3.

(m) Species igitur individuas colligi ita non poſſe, ut dividunt qui animalia, aut quodvis aliud genus ſeorſum in duo ſecant, apertum jam eſt. Fit enim autoribus illis, ut ultimas differentias totidem eſſe, quot animalia omnia individuâ ſpecie neceſſe ſit. Ibidem.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 168 sur 615

on ſait auſſi que le génie de l'obſervateur étoit bien capable de le guider & d'éclairer ſes recherches : c'eſt dans de ſi heureuſes circonſtances qu'Ariſtote a poſé les premiers fondemens de l'Hiſtoire Naturelle, en nous donnant de bons principes ſur la façon de diſtinguer & de diviſer les animaux ; il a élevé enſuite l'édifice à un haut point, par la comparaiſon qu'il a faite des différentes parties des animaux, pour tirer des réſultats de leurs reſſemblances ou de leurs différences, ſoit pour la conformation de leur corps, ſoit pour les différentes façons dont ils perpétuent leur eſpèce, ſoit pour leurs ſens, ſoit pour leurs fonctions, &c. Ce plan ne pouvoit venir que d'un grand maître, qui ſavoit diſtinguer les connoiſſances réelles des conventions arbitraires, & qui cherchoit à reconnoître dans le méchaniſme des animaux le vrai ſyſtème de leurs opérations, au lieu de faire de vaines tentatives pour deviner leur nature avant que de l'avoir bien obſervée, & pour faire des échelles de claſſes, de genres & d'eſpèces, comme on l'a fait tant de fois, avant que d'avoir bien connu les individus : ſes profondes connoiſſances ſur ce ſujet lui avoient appris au contraire que cette diviſion n'eſt point dans la Nature, & que de pareils ſyſtèmes ne peuvent pas être d'accord avec l'hiſtoire de ſes productions.

Je ne ferai pas mention des diſtributions méthodiques des animaux que Geſner, Aldrovande, Jonſton, &c. ont ſuivies, parce qu'elles ſont trop incomplètes ; je viens à celle que M. Rai donna ſur la fin du dernier

ſiècle *(n)*. La première diviſion de cette méthode eſt tirée d'Ariſtote ; les animaux en général ſont diviſés en deux claſſes, dont la première comprend ceux qui ont du ſang, & l'autre ceux qui n'ont point de ſang *(o)* : mais l'emploi que M. Rai fait de cette différence générale qui ſe trouve entre les animaux, eſt contraire aux principes d'Ariſtote, qui ſoûtient qu'on ne doit pas diviſer les genres ; auſſi la méthode eſt-elle en défaut dès la première diviſion, de l'aveu même de l'auteur, qui convient que le ver de terre a du ſang, quoiqu'il ſe trouve dans la claſſe des animaux qui n'en ont point. Ce caractère négatif dans les animaux qui n'ont point de ſang, étant donné comme caractère générique, eſt encore contraire aux maximes d'Ariſtote, qui n'admet, en pareil cas, que des caractères poſitifs & oppoſés : il me ſemble qu'il étoit aiſé de le rendre tel, en déterminant cette première diviſion par les couleurs de la liqueur qui circule dans le corps des animaux ; on auroit prévenu l'objection par laquelle on prétend que la couleur rouge n'eſt pas eſſentielle au ſang, mais le ver de terre ſe ſeroit toûjours trouvé placé parmi les animaux qui ont le ſang rouge, & l'auteur auroit toûjours été obligé de dire, comme il l'a dit, qu'il n'y a point de règles générales ſans exception, c'eſt-à-dire, qu'il ne donne pas ſa méthode comme complète.

(n) Synopſis methodica Animalium quadrupedum & ſerpentini generis, &c. Londini, 1693, vol. 1, in-8.°

(o) Sanguinea & exſanguia. Idem, pag. 50.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 170 sur 615

Reprenons la claſſe des animaux qui ont du ſang, c'eſt celle qui comprend les quadrupèdes; pour y arriver, il faut la ſous-diviſer en deux parties, dont la première renferme les animaux qui reſpirent par le moyen d'un poumon, & la ſeconde ceux qui ont des ouïes pour organe de la reſpiration. Parmi les premiers, les uns ont le cœur compoſé de deux ventricules, & les autres d'un ſeul; les animaux dont le cœur a deux ventricules ſont vivipares ou ovipares; les premiers ſont les quadrupèdes vivipares & les poiſſons cétacées, les ſeconds ſont les oiſeaux: les animaux qui n'ont qu'un ventricule dans le cœur ſont les quadrupèdes ovipares & les ſerpens.

Après cet expoſé, l'auteur conſent à laiſſer les cétacées avec les poiſſons, pour ſe conformer, dit-il, au préjugé du vulgaire, qui répugneroit peut-être à réunir les cétacées avec les quadrupèdes vivipares, quoiqu'ils n'en diffèrent qu'en ce qu'ils n'ont ni poil ni pieds, & qu'ils vivent dans l'eau. Ce qu'il y a de vrai dans tous ces rapports, c'eſt que les cétacées ont beaucoup de reſſemblance avec les quadrupèdes dans la conformation intérieure, & même en quelques parties de l'extérieure, & qu'ils reſſemhlent aux autres poiſſons par leurs nageoires, par l'élément dans lequel ils vivent, &c. ce ſont des animaux qui tiennent des quadrupèdes & des poiſſons. Les méthodiſtes les placeront à leur gré dans la branche de leurs méthodes qu'ils croiront la plus convenable; mais les cétacées n'en

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 171 sur 615

ſeront pour cela ni plus ni moins reſſemblans aux quadrupèdes & aux poiſſons.

M. Rai, en donnant ſa méthode, ne prétend pas rejeter abſolument la diviſion générale des animaux en quadrupèdes, oiſeaux, poiſſons & inſectes, il voudroit ſeulement que l'on comprît ſous le nom de quadrupèdes toutes les bêtes terreſtres, & même les ſerpens, parce qu'ils ne diffèrent des lézards & de pluſieurs autres, qu'en ce qu'ils n'ont point de pieds. Cette diviſions générale eſt auſſi bonne qu'une autre, quoique les ſerpens n'aient point de pieds; ils n'en ont point non plus dans la méthode de M. Rai, qui les met avec les quadrupèdes ovipares. L'inconvénient qu'il y auroit à mêler les vivipares avec les ovipares, en diviſant les animaux en quadrupèdes, oiſeaux, poiſſons & inſectes, ne me paroît pas plus grand que celui que l'on pourroit trouver à laiſſer, comme fait M. Rai, la vipère, qui ſelon lui eſt vivipare, avec les autres ſerpens qui ſont ovipares : toute diſtribution méthodique en Hiſtoire Naturelle a ſes défauts, il ne s'agit que du plus ou du moins. La diviſion des animaux en animaux terreſtres, aquatiques, & en amphibies, paroît à notre auteur être peu conforme à la Nature & à la raiſon : cela peut être, & perſonne ne doit en être ſurpris, puiſque toutes les méthodes en ce genre ſont des conventions arbitraires, qui ne dépendent ni de la Nature ni de la raiſon, mais de la commodité & de la volonté des méthodiſtes. Cette diviſion en trois claſſes

eſt régulière par rapport à ſon objet, qui eſt de raſſembler dans l'une de ces claſſes les animaux qui vivent ſur la terre, dans l'autre ceux qui reſtent dans l'eau, & dans la troiſième ceux qui vivent ſur la terre & dans l'eau. La même diviſion ſera irrégulière par rapport aux autres méthodes qui ont été faites ſur d'autres conventions, leurs genres y ſeront confondus ou diviſés ; on ſéparera les cétacées les uns des autres, les quadrupèdes vivipares & ovipares amphibies ſeront dans une claſſe, & les autres quadrupèdes vivipares & ovipares dans une autre ; les inſectes aquatiques ſeront d'un côté, & les terreſtres d'un autre, &c. qu'importe ! ce ſera une méthode : autant vaut diſtinguer les cétacées en aquatiques & en amphibies, que de les balancer & de les *baloter* pour les faire tomber avec les quadrupèdes ou avec les poiſſons : on peut bien mêler les vivipares avec les ovipares, puiſque de l'aveu de M. Rai cette diſtinction n'eſt pas aſſez ſûre pour déterminer les différens genres d'animaux *(p)* ; pourquoi enfin ne renfermeroit-on pas les inſectes terreſtres dans une claſſe, tandis que les inſectes aquatiques ſeroient dans une autre ! Dès que l'on voudra diviſer le genre des inſectes & tout autre genre, on fera de mauvaiſes diviſions ; mais à cette condition, on les pourra faire de quelle façon l'on voudra.

Revenons à la méthode de M. Rai ; les quadrupèdes vivipares, c'eſt-à-dire, les animaux que l'on entend communément par le nom de quadrupèdes, ont du

(p) Synop. meth. Anim. quadr. pag. 47.

ſang,

ſang, ils reſpirent par l'organe d'un poumon, & leur cœur eſt compoſé de deux ventricules: mais n'allons pas plus loin avant de changer la dénomination générale de quadrupèdes, parce que l'auteur s'aviſe ici de comprendre dans cette claſſe un animal qui n'a que deux pieds, c'eſt la vache marine, *manati;* elle a des poumons, ſon cœur eſt compoſé de deux ventricules, par conſéquent elle doit être miſe avec les quadrupèdes, quoiqu'elle n'ait que deux pieds, cependant on ne peut pas la ranger ſous la dénomination de quadrupèdes ſans lui faire quatre pieds; mais l'auteur aime mieux changer la dénomination de quadrupèdes vivipares en celle d'animaux vivipares couverts de poil, parce que la vache marine a du poil.

M. Rai change la diviſion des animaux quadrupèdes en *ſolipèdes, pieds fourchus,* & *fiſſipèdes,* & n'en fait que deux claſſes générales, dont la première comprend les animaux qui ont l'extrémité des doigts enveloppée dans une matière de corne ſur laquelle ils marchent, *animalia ungulata;* la ſeconde claſſe renferme ceux qui ont un ongle qui tient à l'extrémité de chaque doigt, & qui laiſſe à nud la partie qui porte ſur la terre, *animalia unguiculata.*

L'auteur ſous-diviſe les animaux qui ont de la corne aux pieds, en ſolipèdes, qui ſont le cheval, l'âne & le zèbre, en pieds fourchus, tels que le taureau, le bélier, le bouc, &c. & en animaux qui ont les pieds diviſés en quatre parties, comme ſont le rhinocéros & l'hippo-

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 174 sur 615

potame. Il rapporte à cette classe quelques animaux étrangers qu'il donne comme anomaux, parce qu'ils diffèrent un peu des deux précédens. Il y a deux sortes d'animaux à pieds fourchus, les uns ne ruminent pas, tels sont le cochon, le sanglier, le cochon de Guinée, le babyroussa, le tajacu, &c. les autres ruminent, ce sont le taureau, le bélier, le bouc, &c. & ils ont des cornes sur la tête. On pourroit, dit M. Rai, établir des différences entre ces animaux, en ce que les uns quittent leurs cornes dans certains temps pour en produire de nouvelles, & que les autres gardent toûjours les mêmes; en ce qu'il y a des femelles & même des mâles qui n'en ont jamais, & en ce que les cornes sont solides ou creuses. Il y a trois genres de ruminans à pieds fourchus qui ont des cornes creuses & qui ne les quittent jamais, le premier porte le nom du bœuf, *bovium genus,* & comprend le taureau, l'orocs, le bison, le buffle, &c. le nom du second est dérivé de celui des brebis, *ovinum genus,* & renferme le bélier, les brebis d'Arabie, de Crète, d'Afrique, de Guinée ou d'Angole, &c. & la dénomination du troisième genre vient du nom de la chèvre, *caprinum genus,* ses espèces sont le bouc, le bouquetin, le chamois, les gazelles, &c. on a fait un quatrième genre des animaux ruminans à pieds fourchus, dont les cornes sont solides & branchues, & tombent chaque année; le nom de ce genre est tiré de celui de cerf, *cervinum genus,* on y rapporte le cerf, le daim, l'élan, le renne, le chevreuil, la giraffe, &c.

Parmi les animaux qui ſont armés d'ongles, il s'en trouve qui les ont larges, & qui reſſemblent plus à l'homme que les autres bêtes, ce ſont les ſinges. Les animaux qui ont les ongles étroits & pointus pour la pluſpart, ſont diſtingués par leurs pieds, les uns ont le pied fourchu & n'ont que deux ongles, comme le chameau qui eſt un ruminant; les animaux de ce même genre ſont le dromadaire, le mouton du Pérou & le paco; les autres animaux qui ont des ongles ſont fiſſipèdes. M. Rai donne l'éléphant comme anomal en ce genre, parce que ces doigts ſont réunis & recouverts par la peau, &c.

Les animaux fiſſipèdes ſont diviſés en deux claſſes: la première comprend ceux que l'auteur appelle *analogues,* c'eſt-à-dire, ceux qui ſe reſſemblent, ſur-tout par rapport aux dents, ſoit pour leur forme, ſoit pour leur ſituation. Les animaux fiſſipèdes de la ſeconde claſſe ſont déſignés par le nom d'*anomaux*, parce qu'ils diffèrent des autres; ou ils n'ont point de dents, ou celles qu'ils ont ſont différentes des dents des autres animaux, ſoit pour la forme, ſoit pour l'arrangement.

Les animaux fiſſipèdes analogues ont plus de deux dents inciſives dans chaque mâchoire, comme le lion, le chien, &c. ou n'en ont ſeulement que deux, comme le caſtor, le lièvre, le lapin, &c. & tous ceux qui ſe nourriſſent de plantes.

L'auteur propoſe d'abord de diviſer en deux claſſes les animaux fiſſipèdes analogues qui ont plus de deux

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 176 sur 615

dents inciſives dans chaque mâchoire, & de déterminer ces claſſes par les différens alimens qu'ils prennent, parce que les uns mangent la chair des animaux, les autres ne vivent que d'inſectes, ou prennent une nourriture mêlée d'inſectes & de plantes; mais ayant reconnu qu'on ne ſavoit pas encore aſſez bien quelle étoit la nourriture de ces animaux, il renonce à cette diviſion, & les met tous au rang des animaux carnaciers; je crois que c'eſt avec raiſon, au moins pour la pluſpart, car j'ai vû un blaireau & un hériſſon manger de la chair.

Les animaux carnaciers ſont diſtingués par leur grandeur, il y en a de grands & de petits: les grands ſont de deux ſortes; les uns ont la tête arrondie & le muſeau court, comme le chat, c'eſt pourquoi on appelle le genre ſous lequel ils ſont raſſemblés, genre de chats, *felinum genus*, il comprend le lion, le tigre, le léopard, le loup-cervier, le chat, l'ours, &c. les autres ont la tête & le muſeau alongé, comme le chien, d'où vient le nom de canin que l'on a donné à ce genre, *genus caninum*; ces eſpèces ſont le loup, le chien, le renard, la civette, le coati-mondi, le blaireau ou taiſſon, la loutre, le veau de mer, l'hippopotame ou cheval marin, la vache marine, &c. Les petits animaux carnaciers ne diffèrent pas ſeulement des grands par leur volume, mais encore parce qu'ils ont la tête plus petite, les pattes plus courtes & le corps plus effilé, ce qui leur donne de la facilité pour ſe gliſſer, comme des vers, dans des endroits fort étroits; auſſi le nom générique de ces animaux a-t-il été

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 177 sur 615

dérivé de celui de ver ou vermine, *genus vermineum ;* on l'appelle auſſi *genus muſtellinum,* parce que la belette, *muſtela,* eſt l'animal le plus connu de ce genre, qui renferme auſſi l'hermine, le furet, le putoire, la martre, la fouine & la martre zibeline, &c.

Les animaux fiſſipèdes analogues qui n'ont que deux dents inciſives à chaque mâchoire, ſont le lièvre, le lapin, le cochon d'Inde, le porc-épic, le caſtor, les écureuils, le rat, le rat muſqué, le rat d'eau, la ſouris, le mulot, le loir, le lérot, la marmotte, &c.

Les animaux fiſſipèdes anomaux ſont le hériſſon, le tatou, la taupe, la muſaraigne, le tamandua, la chauve-ſouris & le pareſſeux : les cinq premiers ont le muſeau alongé comme les chiens ou les belettes, mais ils en diffèrent par la forme & l'arrangement des dents, le tamandua n'en a point, la chauve-ſouris & le pareſſeux ont le muſeau court.

Le projet de diſtribution méthodique des animaux que M. Klein a publié en 1750 *(q)*, a aſſez de rapport à la méthode de M. Rai, pour que l'on rende compte de ce projet immédiatement après, quoique l'expoſition de la diviſion des quadrupèdes, que M. Linnæus a donnée dès l'année 1735 *(r)*, dût précéder ſelon l'ordre des dates.

M. Klein diſtingue les animaux de tous les autres

(q) Jac. Theod. Klein hiſt. avium prodromus, cum præfatione de ordine animalium in genere, &c. Lubecæ, 1750, vol. 1, in-4.°

(r) Car. Linnæi Syſt. Nat. &c. Lugduni Batavorum, 1735, in-fol.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 178 sur 615

êtres de la Nature par la faculté qu'ils ont de ſe mouvoir & de changer de lieu ; il les diviſe & détermine leurs claſſes par les différences qui ſe trouvent entre les parties du corps qui opèrent ce mouvement & ce déplacement : les uns y parviennent à l'aide de leurs pieds ou de certaines parties qui leur tiennent lieu de pieds, d'autres ont des pieds qui leur ſervent dans l'eau comme ſur la terre, & des ailes qui les tranſportent en l'air. Il y a des animaux qui, par le moyen de pluſieurs pieds fort courts, ou ſans avoir de pieds, rampent ſur la terre ou dans l'eau, & même dans l'eau comme ſur la terre ; il en eſt qui ne changent de lieu que dans l'eau, & qui n'ont que des nageoires ; d'autres ne ſe déplacent qu'en ébranlant leur coquille ; on en trouve enfin qui ne ſe meuvent qu'en un certain temps de l'année, dit notre auteur, comme les orties de mer, les holothuries, &c. Mais n'y en a-t-il pas auſſi qui ne changent jamais de lieu & qui vivent toûjours fixés dans le même endroit ! ceux-là ne trouveront point de place dans la méthode de M. Klein ; cependant ils n'en appartiennent pas moins au règne animal, parce que le mouvement des animaux ne ſuppoſe pas toûjours un déplacement.

Parmi les animaux qui ne ſe meuvent que ſur la terre & dans l'eau, les uns n'ont que deux pieds, les autres en ont quatre ou un plus grand nombre, & d'autres n'en ont point du tout, ou au moins n'ont aucunes parties de leur corps auxquelles on puiſſe donner proprement le nom de pieds.

Les quadrupèdes, c'eſt-à-dire, les animaux à quatre pieds, qui pour l'ordinaire ne ſe meuvent & ne ſe déplacent que ſur la terre, ſont diviſés en deux *ordres (ſſ)*, le premier renferme ceux qui ont de la corne à l'extrémité des pieds, & le ſecond ceux qui ont des doigts *(t)*. Chacun de ces ordres eſt ſous-diviſé en quatre familles, la première famille des quadrupèdes qui ont de la corne à l'extrémité des pieds, comprend ceux qui n'ont la corne que d'une ſeule pièce à chaque pied, ce ſont les ſolidipèdes; la ſeconde ceux qui ont la corne diviſée en deux pièces, ce ſont les pieds fourchus; le rhinocéros eſt dans la troiſième famille, parce que la corne de chacun de ſes pieds eſt diviſée en trois pièces; l'éléphant eſt dans la quatrième, il a la corne du pied partagée en cinq pièces *(u)*.

(ſſ) Les dénominations de claſſe, de genre & d'eſpèce n'étant pas en nombre ſuffiſant pour exprimer toutes les diviſions que les méthodiſtes ont été obligés de faire pour deſcendre depuis la diviſion la plus générale des claſſes juſqu'aux caractères ſpécifiques, ils ont imaginé une ſuite plus nombreuſe de dénominations, qui correſpondît à la ſuite détaillée de leurs diviſions : c'eſt pourquoi nous trouvons dans les méthodes des claſſes, des *ordres*, des *tributs*, des *légions*, des *cohortes*, des *familles*, des genres & des eſpèces. Les nomenclateurs ont abuſé de la pluſpart de ces noms, dont l'acception n'a jamais eu de rapport qu'aux hommes, ainſi on ne peut guère les appliquer à des êtres différens, comme des plantes, & ſur-tout des minéraux, ſans tomber dans un défaut de goût & de préciſion, qui n'eſt point pardonnable dans le ſiècle où nous vivons.

(t) 1 Pedibus cheliferis, 2 pedibus digitatis. Præf. de ord. Anim.

(u) 1 Monochela ſive onochela, 2 dichela, 3 trichela, 4 pentachela. Idem.

La première famille du ſecond ordre, c'eſt-à-dire des quadrupèdes qui ont des doigts, comprend ceux qui en ont deux à chaque pied, comme le chameau, &c. les animaux de la ſeconde famille ont trois doigts, ceux de la troiſième en ont quatre, & enfin ceux de la quatrième en ont cinq *(x)*.

M. Klein a fait la diviſion générale des animaux d'une manière ingénieuſe en établiſſant un caractère eſſentiel à tous les animaux, qui eſt la faculté de changer de lieu, & en le déterminant par les parties du corps qui ſervent à ce mouvement, d'autant plus que le même caractère s'étend juſqu'à la diviſion des quadrupèdes: cependant on peut objecter à M. Klein, comme à M. Rai, le caractère négatif qui entre dans la première diviſion des animaux; car avoir deux pieds, en avoir quatre ou plus de quatre, ſont des marques poſitives & diſtinctives; mais n'avoir point de pieds n'eſt qu'une privation dont nous ne tirons aucune idée diſtincte: ſur cet expoſé nous reſtons en ſuſpens, & nous attendons qu'on nous apprenne qu'eſt-ce qu'ont donc ces animaux qui n'ont point de pieds: ſi on nous dit qu'ils ont la faculté de ſe traîner, de ramper au lieu de marcher, on nous donne, par ce caractère poſitif, l'idée d'un reptile, nous nous figurons à l'inſtant un ſerpent qui ſe déplace ſans avoir de pieds.

Je me permettrai encore de faire une réflexion ſur

(x) Familia 1 didactyla, 2 tridactyla, 3 tetradactyla, 4 pentadactyla. Præf. de ord. Anim.

le

le projet de méthode de M. Klein, & ſur toutes les méthodes dont les branches des diviſions principales ſont ſi peu en équilibre, qu'on ne voit qu'un animal d'un côté, tandis qu'il y en a une multitude de l'autre. Ces diviſions repréſentent la Nature comme ſi on la dépeignoit ſous la figure d'une Déeſſe manchotte, qui auroit un bras fort long d'un côté, & ſeulement un moignon de l'autre. Lorſque M. Rai diviſe en deux claſſes les animaux qui ont des ongles, il ne met dans l'une que le genre des chameaux, tandis que tous les autres animaux à ongles reſtent dans l'autre claſſe : de même, M. Klein fait de ſa quatrième *famille* du ſecond genre une *nation* entière, en y comprenant tous les animaux qui ont cinq doigts, & il en laiſſe ſi peu dans les trois autres familles, qu'on croiroit qu'elles ſeroient près de s'éteindre. Je ne prétends pas qu'on doive mettre en équilibre parfait les branches d'une diviſion, en diſtribuant autant d'eſpèces dans l'une que dans l'autre; cependant je ne voudrois pas qu'une eſpèce figurât ſeule dans une méthode vis-à-vis un très-grand nombre d'eſpèces, cette inégalité ſemble être contraire à l'ordre de la Nature : au reſte, cela eſt peut-être inévitable dans les diſtributions méthodiques, mais cela prouve que ces méthodes ne ſont que des conventions arbitraires que l'on modifie ſelon le beſoin, en multipliant les conditions autant de fois qu'il ſe trouve des ſingularités dans la Nature, par rapport au caractère qui détermine la méthode; car ſi on obſervoit les animaux en entier,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 182 sur 615

tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, on trouveroit ſouvent des rapports eſſentiels qui effaceroient les petites différences ſur leſquelles les méthodes ſont établies. On en verra des exemples dans la deſcription des animaux, où je me réſerve de diſcuter les caractères particuliers qui ont été employés dans les méthodes.

Venons maintenant à la diſtribution méthodique des quadrupèdes, faite par M. Linnæus, telle qu'il l'a donnée dans la dernière édition que nous avons du *Syſtème de la Nature (y)*. Par le titre du livre, l'auteur ne laiſſe aucun doute ſur ſes prétentions; on croiroit qu'il ne s'agiroit pas de moins que de développer & d'expoſer le Syſtème de la Nature, cependant ce n'eſt qu'une diſtribution méthodique établie, comme les autres méthodes en ce genre, ſur des conditions arbitraires qui ſont, pour la pluſpart, indépendantes des loix naturelles. M. de Buffon, dans ſon diſcours ſur la manière d'étudier & de traiter l'Hiſtoire Naturelle *(z)*, a rapporté la diviſion générale des animaux en ſix claſſes, donnée par M. Linnæus, & l'a diſcutée de façon à ne rien laiſſer à deſirer ſur ce ſujet, de même que ſur la juſte valeur de toutes les méthodes que l'on a faites en Hiſtoire Naturelle. M. de Buffon a auſſi fait mention de la diviſion des quadrupèdes *(a)*, d'après la quatrième édition du ſyſtème de

(y) Car. Linnæi ſyſtema Naturæ, ſiſtens tria regna Naturæ, &c. Lipſiæ, 1748, tom. I, in-8.°

(z) Tome I, page 37 & ſuivantes.

(a) Idem, page 38 & ſuivantes.

M. Linnæus ; mais comme il n'étoit pas de ſon objet de ſuivre les détails de la diſtribution des quadrupèdes, & comme M. Linnæus a fait depuis des changemens que nous avons reconnus dans la ſixième édition de ſon ouvrage qui nous eſt parvenue, il eſt à propos de détailler cette nouvelle méthode ſur les quadrupèdes.

M. Linnæus diſtingue ces animaux de tous les autres en ce qu'ils ont du poil ſur le corps & quatre pieds, & en ce que les femelles ſont vivipares & ont du lait. Il diviſe les quadrupèdes en ſix ordres ; le troiſième, qui eſt ſous le nom d'*Agriæ*, a été ajoûté & démembré du premier ordre.

Cet ordre ne contient plus que trois genres d'animaux *(b)*, qui portent pour caractères communs quatre dents inciſives dans chaque mâchoire, & les mamelles ſur la poitrine. Je ſuis toûjours ſurpris de trouver l'homme dans le premier genre, immédiatement au deſſous de la dénomination générale de quadrupèdes, qui fait le titre de la claſſe : l'étrange place pour l'homme ! quelle injuſte diſtribution, quelle fauſſe méthode met l'homme au rang des bêtes à quatre pieds ! Voici le raiſonnement ſur lequel elle eſt fondée. L'homme a du poil ſur le corps & quatre pieds, la femme met au monde des enfans vivans & non pas des œufs, & porte du lait dans ſes mamelles ; donc l'homme & la femme ſont des animaux quadrupèdes. Les hommes & les femmes ont quatre dents inciſives dans chaque mâchoire.

(b) Antropomorpha.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 184 sur 615

& les mamelles ſur la poitrine; donc les hommes & les femmes doivent être mis dans le même ordre, c'eſt-à-dire, au même rang, avec les ſinges & les guenons, & avec les mâles & les femelles des animaux appelés *pareſſeux*. Voilà des rapports que l'auteur a ſingulièrement combinés pour acquérir le droit de ſe confondre avec tout le genre humain dans la claſſe des quadrupèdes, & de s'aſſocier les ſinges & les pareſſeux pour faire pluſieurs genres du même ordre. C'eſt ici que l'on voit bien clairement que le méthodiſte oublie les caractères eſſentiels, pour ſuivre aveuglément les conditions arbitraires de ſa méthode; car, quoi qu'il en ſoit des dents, du poil, des mamelles, du lait & du fœtus, il eſt certain que l'homme par ſa nature, ne doit pas être confondu avec aucune eſpèce d'animal, & que par conſéquent il ne faut pas le renfermer dans une claſſe de quadrupèdes, ni le comprendre dans le même *ordre* avec les ſinges & les pareſſeux, qui compoſent le ſecond & le troiſième genre du premier ordre de la claſſe des quadrupèdes dans la méthode dont il s'agit.

Les animaux du ſecond ordre *(c)* ont pour caractères diſtinctifs ſix dents de devant dans chaque mâchoire, & les dents canines alongées : ces animaux ſont l'ours, le chat, la belette, la loutre, le chien, le veau marin, le blaireau, le hériſſon, le tatou, la taupe & la chauve-ſouris. Mais il ne faut pas prendre ici ces dénominations au pied de la lettre, car dans l'ouvrage de M. Linnæus

(c) Feræ.

un ours n'eſt pas toûjours un ours, ni un chat n'eſt pas toûjours un chat; il change le nom des animaux, & il les diſtribue à ſon gré; il donne au coati-mondi le nom d'ours à queue alongée; le lion, le tigre, le léopard, le chat-pard, le loup-cervier, &c. ſont différentes eſpèces de chats. La martre, le putoire, le furet, l'hermine, la martre zibeline, &c. portent chacun le nom de belette, *muſtela;* le loup, le renard, &c. ſont des chiens; la civette eſt un taiſſon, &c.

Le troiſième ordre *(d)* ne renferme que deux genres d'animaux, dont les caractères ſont la privation des dents, & la langue très-longue & cylindrique; le premier genre eſt ſous le nom de mangeurs de fourmis, il a pour eſpèce le tamandua-guacu, le tamandua, &c. le ſecond genre eſt appelé *manis*, il n'a qu'une ſeule eſpèce qui eſt le lézard écailleux.

Le caractère des animaux du quatrième ordre *(e)* eſt d'avoir deux dents de devant fort ſaillantes: les genres compris dans cet ordre ſont le porc-épic, l'écureuil, le lièvre, le caſtor, le rat, la muſaraigne & l'opoſſum; mais le nom de lièvre s'étend au lapin & au cochon d'Inde, le rat d'eau eſt une eſpèce de caſtor, &c.

Les animaux du cinquième ordre *(f)* ont des dents irrégulières, & différentes de celles de tous les animaux qui compoſent les cinq autres ordres de la claſſe des

(d) Agriæ.
(e) Glires.
(f) Jumenta.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 186 sur 615

quadrupèdes : tel eſt le caractère du cinquième ordre. Il nous indique cinq privations, c'eſt-à-dire, cinq caractères négatifs, & pas un ſeul qui ſoit poſitif; ces animaux ſi myſtérieux pour les dents ſont l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame, le cheval & le cochon; mais il faut remarquer que l'âne & le zèbre ſont des chevaux.

Enfin les animaux du ſixième ordre *(g)* ſont diſtingués par les caractères ſuivans, ils n'ont point de dents de devant dans la mâchoire du deſſus, mais ils en ont ſix ou huit dans celle de deſſous, leurs pieds ſont terminés par une matière de corne : les genres compris dans cet ordre ſont le chameau, l'animal qui porte le muſc, le cerf, la chèvre, la brebis & le bœuf. Le dromadaire, le mouton du Pérou & le paco ſont compris ſous la dénomination de chameau; celle de cerf s'étend beaucoup plus loin qu'on ne le croiroit, car elle ſe rapporte à la giraffe, à l'élan, au cef, au renne, au dain & au chevreuil; ſous le nom de chèvre on trouve le bouc, le cerf de Guinée, le chamois, le bouquetin, les gazelles, &c.

Pour ne pas rendre l'expoſition de cette méthode trop longue & trop compliquée, je renvoie à la deſcription particulière de chaque animal pour l'examen des caractères génériques & ſpécifiques. On peut voir, par ce qui a été rapporté des principales méthodes de diſtribution des quadrupèdes, en quoi conſiſte l'art des méthodes, & à quoi peuvent ſervir ces ſyſtèmes pour

(g) Pecora

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 187 sur 615

la vraie connoiſſance des animaux. On a vû que chaque méthodiſte ne nous préſente que quelques parties de leur corps, & qu'en vertu de la comparaiſon & de la combinaiſon qu'il fait de ces mêmes parties dans chaque eſpèce d'animal, il les approche ou il les éloigne, il les place, il les range, il en diſpoſe à ſon gré, l'ordre auquel il les ſoûmet n'eſt déterminé que par des conventions arbitraires, ſi peu eſſentielles pour la pluſpart, qu'elles varient, qu'elles diffèrent & qu'elles changent dans chaque méthode, de façon que les méthodiſtes ſemblent ſe jouer des animaux & de la Nature, au lieu d'en faire des obſervations ſuivies & une étude ſérieuſe; cependant il y a un préjugé qui n'eſt que trop répandu dans ce ſiècle, & qui donne aux méthodes beaucoup plus de conſidération qu'elles n'en méritent : on croit qu'elles ſont de vrais tableaux de la Nature, & qu'on y voit le dénouement de ſon ſyſtème. Ceux qui ſont dominés par ce préjugé le reſpectent d'autant plus, qu'ils ont employé plus de temps dans ce genre d'étude, & tombent dans l'illuſion en ſe perſuadant qu'ils connoiſſent parfaitement les animaux, parce qu'ils ſavent quelle eſt la forme, le nombre & la ſituation de leurs dents, de leurs mamelles, de leurs pieds, de leurs doigts, &c. on ſe contente de cette connoiſſance ſuperficielle, ſans s'inquiéter du reſte de l'animal que l'on ne peut bien connoître que par des deſcriptions complètes. Il faut que les hommes ſe ſuccèdent par plus d'une génération avant que de parvenir à l'extinction totale

d'un faux préjugé; mais ceux qui ſont les premiers à reconnoître l'erreur, doivent travailler à la détruire ſans aucune diſſimulation : c'eſt pourquoi nous ne ſuivrons dans l'Hiſtoire Naturelle & dans la deſcription des animaux quadrupèdes que l'ordre le plus ſimple & le plus éloigné de toute diſtribution méthodique; nous commençons par les animaux domeſtiques, enſuite viendront les animaux ſauvages, & enfin les animaux étrangers. Les motifs de cette ſucceſſion ont été ſi bien expliqués par M. de Buffon, qu'il ſuffit de renvoyer à ſon diſcours ſur la manière d'étudier & de traiter l'Hiſtoire Naturelle *(h)*.

(h) Tome I, page 31 & ſuiv.

HISTOIRE

HISTOIRE NATURELLE.

Les Animaux domeſtiques.

L'HOMME change l'état naturel des animaux en les forçant à lui obéir, & les faiſant ſervir à ſon uſage : un animal domeſtique eſt un eſclave dont on s'amuſe, dont on ſe ſert, dont on abuſe, qu'on altère, qu'on dépayſe & que l'on dénature, tandis que l'animal ſauvage, n'obéiſſant qu'à la Nature, ne connoît d'autres loix que celles du beſoin & de la liberté. L'hiſtoire d'un animal ſauvage eſt donc bornée à un petit nombre de faits émanés de la ſimple Nature, au lieu que l'hiſtoire d'un animal domeſtique eſt compliquée de tout ce qui a rapport à l'art que l'on emploie pour l'apprivoiſer ou pour le ſubjuguer ; & comme on ne ſait pas aſſez combien l'exemple, la contrainte, la force de l'habitude peuvent influer ſur les animaux & changer leurs mouvemens, leurs déterminations, leurs penchans, le but d'un Naturaliſte doit être de les obſerver aſſez pour pouvoir diſtinguer des faits qui dépendent de l'inſtinct, de ceux qui ne viennent que de l'éducation ; reconnoître ce qui leur appartient & ce qu'ils ont emprunté, ſéparer ce qu'ils font de ce qu'on leur fait faire, & ne jamais confondre l'animal avec l'eſclave, la bête de ſomme avec la créature de Dieu.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 190 sur 615

L'empire de l'homme ſur les animaux eſt un empire légitime qu'aucune révolution ne peut détruire, c'eſt l'empire de l'eſprit ſur la matière, c'eſt non ſeulement un droit de Nature, un pouvoir fondé ſur des loix inaltérables, mais c'eſt encore un don de Dieu, par lequel l'homme peut reconnoître à tout inſtant l'excellence de ſon être; car ce n'eſt pas parce qu'il eſt le plus parfait, le plus fort ou le plus adroit des animaux qu'il leur commande : s'il n'étoit que le premier du même ordre, les ſeconds ſe réuniroient pour lui diſputer l'empire; mais c'eſt par la ſupériorité de Nature que l'homme règne & commande, il penſe, & dès-lors il eſt maître des êtres qui ne penſent point.

Il eſt maître des corps bruts, qui ne peuvent oppoſer à ſa volonté qu'une lourde réſiſtance ou qu'une inflexible dureté, que ſa main ſait toûjours ſurmonter & vaincre en les faiſant agir les uns contre les autres; il eſt maître des végétaux, que par ſon induſtrie il peut augmenter, diminuer, renouveler, dénaturer, détruire ou multiplier à l'infini; il eſt maître des animaux, parce que non ſeulement il a comme eux du mouvement & du ſentiment, mais qu'il a de plus la lumière de la penſée, qu'il connoît les fins & les moyens, qu'il ſait diriger ſes actions, concerter ſes opérations, meſurer ſes mouvemens, vaincre la force par l'eſprit, & la vîteſſe par l'emploi du temps.

Cependant parmi les animaux les uns paroiſſent être plus ou moins familiers, plus ou moins ſauvages, plus

ou moins doux, plus ou moins féroces : que l'on compare la docilité & la ſoûmiſſion du chien avec la fierté & la férocité du tigre, l'un paroît être l'ami de l'homme & l'autre ſon ennemi ; ſon empire ſur les animaux n'eſt donc pas abſolu, combien d'eſpèces ſavent ſe ſouſtraire à ſa puiſſance par la rapidité de leur vol, par la légèreté de leur courſe, par l'obſcurité de leur retraite, par la diſtance que met entre eux & l'homme l'élément qu'ils habitent ! combien d'autres eſpèces lui échappent par leur ſeule petiteſſe ! & enfin combien y en a-t-il qui, bien loin de reconnoître leur ſouverain, l'attaquent à force ouverte ! ſans parler de ces inſectes qui ſemblent l'inſulter par leurs piqûres, de ces ſerpens dont la morſûre porte le poiſon & la mort, & de tant d'autres bêtes immondes, incommodes, inutiles, qui ſemblent n'exiſter que pour former la nuance entre le mal & le bien, & faire ſentir à l'homme combien, depuis ſa chûte, il eſt peu reſpecté.

C'eſt qu'il faut diſtinguer l'empire de Dieu du domaine de l'homme : Dieu créateur des êtres eſt ſeul maître de la Nature, l'homme ne peut rien ſur le produit de la création, il ne peut rien ſur les mouvemens des corps céleſtes, ſur les révolutions de ce globe qu'il habite, il ne peut rien ſur les animaux, les végétaux, les minéraux en général, il ne peut rien ſur les eſpèces, il ne peut que ſur les individus ; car les eſpèces en général & la matière en bloc appartiennent à la Nature, ou pluſtôt la conſtituent ; tout ſe paſſe, ſe ſuit, ſe ſuccède, ſe

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 192 sur 615

renouvelle & ſe meut par une Puiſſance irréſiſtible; l'homme entraîné lui-même par le torrent des temps, ne peut rien pour ſa propre durée; lié par ſon corps à la matière, enveloppé dans le tourbillon des êtres, il eſt forcé de ſubir la loi commune, il obéit à la même Puiſſance, &, comme tout le reſte, il naît, croît & périt.

Mais le rayon divin dont l'homme eſt animé, l'anoblit & l'élève au deſſus de tous les êtres matériels; cette ſubſtance ſpirituelle, loin d'être ſujette à la matière, a le droit de la faire obéir, & quoiqu'elle ne puiſſe pas commander à la Nature entière, elle domine ſur les êtres particuliers: Dieu, ſource unique de toute lumière & de toute intelligence, régit l'Univers & les eſpèces entières avec une puiſſance infinie: l'homme, qui n'a qu'un rayon de cette intelligence, n'a de même qu'une puiſſance limitée à de petites portions de matière, & n'eſt maître que des individus.

C'eſt donc par les talens de l'eſprit & non par la force & par les autres qualités de la matière, que l'homme a ſû ſubjuguer les animaux: dans les premiers temps ils devoient être tous également indépendans, l'homme, devenu criminel & féroce, étoit peu propre à les apprivoiſer, il a fallu du temps pour les approcher; pour les reconnoître, pour les choiſir, pour les dompter, il a fallu qu'il fût civiliſé lui-même pour ſavoir inſtruire & commander, & l'empire ſur les animaux, comme tous les autres empires, n'a été fondé qu'après la ſociété.

C'eſt d'elle que l'homme tient ſa puiſſance; c'eſt par

elle qu'il a perfectionné ſa raiſon, exercé ſon eſprit & réuni ſes forces, auparavant l'homme étoit peut-être l'animal le plus ſauvage & le moins redoutable de tous; nud, ſans armes & ſans abri, la terre n'étoit pour lui qu'un vaſte deſert peuplé de monſtres, dont ſouvent il devenoit la proie; & même long-temps après, l'hiſtoire nous dit que les premiers héros n'ont été que des deſtructeurs de bêtes.

Mais lorſqu'avec le temps, l'eſpèce humaine s'eſt étendue, multipliée, répandue, & qu'à la faveur des arts & de la ſociété l'homme a pû marcher en force pour conquérir l'Univers, il a fait reculer peu à peu les bêtes féroces, il a purgé la terre de ces animaux giganteſques dont nous trouvons encore les oſſemens énormes, il a détruit ou réduit à un petit nombre d'individus les eſpèces voraces & nuiſibles, il a oppoſé les animaux aux animaux, & ſubjuguant les uns par adreſſe, domptant les autres par la force, ou les écartant par le nombre, & les attaquant tous par des moyens raiſonnés, il eſt parvenu à ſe mettre en ſûreté, & à établir un empire qui n'eſt borné que par les lieux inacceſſibles, les ſolitudes reculées, les ſables brûlans, les montagnes glacées, les cavernes obſcures, qui ſervent de retraites au petit nombre d'eſpèces d'animaux indomptables.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 194 sur 615

LE CHEVAL.

LA plus noble conquête que l'homme ait jamais faite eſt celle de ce fier & fougueux animal qui partage avec lui les fatigues de la guerre & la gloire des combats; auſſi intrépide que ſon maître, le cheval voit le péril & l'affronte, il ſe fait au bruit des armes, il l'aime, il le cherche, il s'anime de la même ardeur; il partage auſſi ſes plaiſirs, à la chaſſe, au tournois, à la courſe, il brille, il étincelle; mais docile autant que courageux, il ne ſe laiſſe point emporter à ſon feu, il ſait réprimer ſes mouvemens, non ſeulement il fléchit ſous la main de celui qui le guide, mais il ſemble conſulter ſes deſirs, & obéiſſant toûjours aux impreſſions qu'il en reçoit, il ſe précipite, ſe modère ou s'arrête, & n'agit que pour y ſatisfaire; c'eſt une créature qui renonce à ſon être pour n'exiſter que par la volonté d'un autre, qui ſait même la prévenir, qui par la promptitude & la préciſion de ſes mouvemens l'exprime & l'exécute, qui ſent autant qu'on le deſire, & ne rend qu'autant qu'on veut, qui ſe livrant ſans réſerve ne ſe refuſe à rien, ſert de toutes ſes forces, s'excède & même meurt pour mieux obéir.

Voilà le cheval dont les talens ſont développés, dont l'art a perfectionné les qualités naturelles, qui dès le premier âge a été ſoigné & enſuite exercé, dreſſé au

ſervice de l'homme ; c'eſt par la perte de ſa liberté que commence ſon éducation, & c'eſt par la contrainte qu'elle s'achève : l'eſclavage ou la domeſticité de ces animaux eſt même ſi univerſelle, ſi ancienne que nous ne les voyons que rarement dans leur état naturel, ils ſont toûjours couverts de harnois dans leurs travaux, on ne les délivre jamais de tous leurs liens, même dans les temps du repos, & ſi on les laiſſe quelquefois errer en liberté dans les pâturages, ils y portent toûjours les marques de la ſervitude, & ſouvent les empreintes cruelles du travail & de la douleur ; la bouche eſt déformée par les plis que le mors a produits, les flancs ſont entamés par des plaies, ou ſillonnés de cicatrices faites par l'éperon ; la corne des pieds eſt traverſée par des clous, l'attitude du corps eſt encore gênée par l'impreſſion ſubſiſtante des entraves habituelles, on les en délivreroit en vain, ils n'en ſeroient pas plus libres ; ceux même dont l'eſclavage eſt le plus doux, qu'on ne nourrit, qu'on n'entretient que pour le luxe & la magnificence, & dont les chaînes dorées ſervent moins à leur parure qu'à la vanité de leur maître, ſont encore plus deshonorés par l'élégance de leur toupet, par les treſſes de leurs crins, par l'or & la ſoie dont on les couvre, que par les fers qui ſont ſous leurs pieds.

La Nature eſt plus belle que l'art, & dans un être animé la liberté des mouvemens fait la belle Nature : voyez ces chevaux qui ſe ſont multipliés dans les contrées de l'Amérique Eſpagnole, & qui y vivent en

chevaux libres, leur démarche, leur courſe, leurs ſauts, ne ſont ni gênés, ni meſurés; fiers de leur indépendance, ils fuient la préſence de l'homme, ils dédaignent ſes ſoins, ils cherchent & trouvent eux-mêmes la nourriture qui leur convient, ils errent, ils bondiſſent en liberté dans des prairies immenſes où ils cueillent les productions nouvelles d'un printemps toûjours nouveau; ſans habitation fixe, ſans autre abri que celui d'un ciel ſerein, ils reſpirent un air plus pur que celui de ces Palais voûtés où nous les renfermons en preſſant les eſpaces qu'ils doivent occuper; auſſi ces chevaux ſauvages ſont-ils beaucop plus forts, plus légers, plus nerveux que la pluſpart des chevaux domeſtiques, ils ont ce que donne la Nature, la force & la nobleſſe, les autres n'ont que ce que l'art peut donner, l'adreſſe & l'agrément.

Le naturel de ces animaux n'eſt point féroce, ils ſont ſeulement fiers & ſauvages; quoique ſupérieurs par la force à la pluſpart des autres animaux, jamais ils ne les attaquent, & s'ils en ſont attaqués, ils les dédaignent, les écartent ou les écraſent; ils vont auſſi par troupes & ſe réuniſſent pour le ſeul plaiſir d'être enſemble, car ils n'ont aucune crainte, mais ils prennent de l'attachement les uns pour les autres: comme l'herbe & les végétaux ſuffiſent à leur nourriture, qu'ils ont abondamment de quoi ſatisfaire leur appétit, & qu'ils n'ont aucun goût pour la chair des animaux, ils ne leur font point la guerre, ils ne ſe la font point entre eux, ils ne ſe diſputent pas leur ſubſiſtance, ils n'ont jamais occaſion de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 197 sur 615

de ravir une proie ou de s'arracher un bien, ſources ordinaires de querelles & de combats parmi les autres animaux carnaciers; ils vivent donc en paix, parce que leurs appétits ſont ſimples, & modérés, & qu'ils ont aſſez pour ne ſe rien envier.

Tout cela peut ſe remarquer dans les jeunes chevaux qu'on élève enſemble & qu'on mène en troupeaux, ils ont les mœurs douces & les qualités ſociales, leur force & leur ardeur ne ſe marquent ordinairement que par des ſignes d'émulation; ils cherchent à ſe devancer à la courſe, à ſe faire & même s'animer au péril en ſe défiant à traverſer une rivière, ſauter un foſſé, & ceux qui dans ces exercices naturels donnent l'exemple, ceux qui d'eux-mêmes vont les premiers, ſont les plus généreux, les meilleurs, & ſouvent les plus dociles & les plus ſouples lorſqu'ils ſont une fois domptés.

Quelques anciens auteurs parlent des chevaux ſauvages, & citent même les lieux où ils ſe trouvoient; Hérodote dit que ſur les bords de l'Hypanis en Scythie, il y avoit des chevaux ſauvages qui étoient blancs, & que dans la partie ſeptentrionale de la Thrace au-delà du Danube, il y en avoit d'autres qui avoient le poil long de cinq doigts par tout le corps; Ariſtote cite la Syrie, Pline les pays du nord, Strabon les Alpes & l'Eſpagne comme des lieux où l'on trouvoit des chevaux ſauvages. Parmi les modernes, Cardan dit la même choſe de l'Écoſſe & des Orcades *(a)*, Olaus de la

(a) Vide Aldrovand. de quadrupedib. ſoliped. lib. 1, pag. 19.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 198 sur 615

Moſcovie, Dapper de l'iſle de Chypre, où il y avoit, dit-il *(b)*, des chevaux ſauvages qui étoient beaux & qui avoient de la force & de la vîteſſe, Struys *(c)* de l'iſle de May au Cap vert, où il y avoit des chevaux ſauvages fort petits; Léon l'Africain *(d)* rapporte auſſi qu'il y avoit des chevaux ſauvages dans les deſerts de l'Afrique & de l'Arabie, & il aſſure qu'il a vû lui-même dans les ſolitudes de Numidie, un poulain dont le poil étoit blanc & la crinière crépue. Marmol *(e)* confirme ce fait, en diſant qu'il y en a quelques uns, dans les deſerts de l'Arabie & de la Lybie, qu'ils ſont petits & de couleur cendrée, qu'il y en a auſſi de blancs, qu'ils ont la crinière & les crins fort courts & hériſſés, & que les chiens ni les chevaux domeſtiques ne peuvent les atteindre à la courſe; on trouve auſſi dans les Lettres édifiantes *(f)* qu'à la Chine il y a des chevaux ſauvages fort petits.

Comme toutes les parties de l'Europe ſont aujourd'hui peuplées & preſque également habitées, on n'y trouve plus de chevaux ſauvages, & ceux que l'on voit en Amérique ſont des chevaux domeſtiques & Européens d'origine, que les Eſpagnols y ont tranſportés, & qui ſe ſont multipliés dans les vaſtes deſerts de ces

(b) Voyez la deſcription des iſles de l'Archipel, *page 50.*
(c) Voy. les voyages de Jean Struys. *Rouen, 1719, tome I, p. 11.*
(d) *De Africæ deſcriptione*, part. II, vol II, p. 750 & 751.
(e) Voy. l'Afrique de Marmol. *Paris, 1667, tome I, page 50.*
(f) Voy. les Lettres édifiantes, *recueil XXVI, page 371.*

contrées inhabitées ou dépeuplées ; car cette eſpèce d'animaux manquoit au nouveau monde. L'étonnement & la frayeur que marquèrent les habitans du Mexique & du Pérou à l'aſpect des chevaux & des cavaliers, firent aſſez voir aux Eſpagnols que ces animaux étoient abſolument inconnus dans ces climats ; ils en tranſportèrent donc un grand nombre, tant pour leur ſervice & leur utilité particulière, que pour en propager l'eſpèce, ils en lâchèrent dans pluſieurs iſles, & même dans le continent, où ils ſe ſont multipliés comme les autres animaux ſauvages. M. de la Salle *(g)* en a vû en 1685 dans l'Amérique ſeptentrionale, près de la baie S.t Louis, ces chevaux paiſſoient dans les prairies, & ils étoient ſi farouches, qn'on ne pouvoit les approcher. L'auteur *(h)* de l'hiſtoire des aventuriers flibuſtiers dit « qu'on voit quelquefois dans l'iſle S.t Domingue des troupes de plus « de cinq cents chevaux qui courent tous enſemble, & « que lorſqu'ils aperçoivent un homme ils s'arrêtent tous, « que l'un d'eux s'approche à une certaine diſtance, ſouffle « des naſeaux, prend la fuite, & que tous les autres le « ſuivent » ; il ajoûte qu'il ne ſait ſi ces chevaux ont dégénéré en devenant ſauvages, mais qu'il ne les a pas trouvé auſſi beaux que ceux d'Eſpagne, quoiqu'ils ſoient de cette race ; « ils ont, dit-il, la tête fort groſſe

(g) Voy. les dernières découvertes dans l'Amérique ſeptentrionale de M. de la Salle, miſes au jour par M. le chevalier Tonti. *Paris, 1697. page 250.*

(h) Voy. l'hiſtoire des avanturiers flibuſtiers, par Oexmelin. *Paris, 1686, tome I, pages 110 & 111.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 200 sur 615

» auſſi-bien que les jambes, qui de plus ſont raboteuſes, ils » ont auſſi les oreilles & le cou longs, les habitans du pays » les apprivoiſent aiſément & les font enſuite travailler, » les chaſſeurs leur font porter leurs cuirs; on ſe ſert » pour les prendre de lacs de corde, qu'on tend dans » les endroits où ils fréquentent, ils s'y engagent aiſé- » ment, & s'ils ſe prennent par le cou ils s'étranglent » eux-mêmes, à moins qu'on n'arrive aſſez tôt pour les » ſecourir, on les arrête par le corps & les jambes, & » on les attache à des arbres, où on les laiſſe pendant » deux jours ſans boire ni manger; cette épreuve ſuffit » pour commencer à les rendre dociles, & avec le temps » ils le deviennent autant que s'ils n'euſſent jamais été » farouches, & même, ſi par quelque haſard ils ſe retrou- » vent en liberté, ils ne deviennent pas ſauvages une » ſeconde fois, ils reconnoiſſent leurs maîtres, & ſe laiſſent approcher & reprendre aiſément *(i)*. »

(i) M. de Garſault donne un autre moyen d'apprivoiſer les chevaux farouches : « quand on n'a » point apprivoiſé, dit-il, les pou- » lains dès leur tendre jeuneſſe, il » arrive ſouvent que l'approche & » l'attouchement de l'homme leur » cauſent tant de frayeur, qu'ils » s'en défendent à coups de dents » & de pieds, de façon qu'il eſt » preſque impoſſible de les panſer » & de les ferrer; ſi la patience & » la douceur ne ſuffiſent pas, il faut, pour les apprivoiſer, ſe ſer- « vir du moyen qu'on emploie en « fauconnerie pour priver un oi- « ſeau qu'on vient de prendre & « qu'on veut dreſſer au vol, c'eſt « de l'empêcher de dormir juſqu'à « ce qu'il tombe de foibleſſe, il « faut en uſer de même à l'égard « d'un cheval farouche, & pour « cela il faut le tourner à ſa place le « derrière à la mangeoire, & avoir « un homme toute la nuit & tout le « jour à ſa tête, qui lui donne de «

Cela prouve que ces animaux ſont naturellement doux & très-diſpoſés à ſe familiariſer avec l'homme & à s'attacher à lui, auſſi n'arrive-t-il jamais qu'aucun d'eux quitte nos maiſons pour ſe retirer dans les forêts ou dans les deſerts, ils marquent au contraire beaucoup d'empreſſement pour revenir au gîte, où cependant ils ne trouvent qu'une nourriture groſſière, toûjours la même, & ordinairement meſurée ſur l'économie beaucoup plus que ſur leur appétit; mais la douceur de l'habitude leur tient lieu de ce qu'ils perdent d'ailleurs; après avoir été excédés de fatigue, le lieu du repos eſt un lieu de délices, ils le ſentent de loin, ils ſavent le reconnoître au milieu des plus grandes villes, & ſemblent préférer en tout l'eſclavage à la liberté; ils ſe font même une ſeconde nature des habitudes auxquelles on les a forcés ou ſoûmis, puiſqu'on a vû des chevaux, abandonnés dans les bois, hennir continuellement pour ſe faire entendre, accourir à la voix des hommes, & en même temps maigrir & dépérir en peu de temps, quoiqu'ils euſſent abondamment de quoi varier leur nourriture & ſatisfaire leur appétit.

Leurs mœurs viennent donc preſque en entier de leur éducation, & cette éducation ſuppoſe des ſoins & des peines que l'homme ne prend pour aucun autre animal,

» temps en temps une poignée de » foin & l'empêche de ſe coucher, » on verra avec étonnement com- » me il ſera ſubitement adouci; il y a cependant des chevaux qu'il « faut veiller ainſi pendant huit « jours. » *Voyez le nouveau parfait Maréchal, page 89.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 202 sur 615

mais dont il eſt dédommagé par les ſervices continuels que lui rend celui-ci. Dès le temps du premier âge on a ſoin de ſéparer les poulains de leur mère, on les laiſſe téter pendant cinq, ſix ou tout au plus ſept mois, car l'expérience a fait voir que ceux qu'on laiſſe téter dix ou onze mois, ne valent pas ceux qu'on sèvre plus tôt, quoiqu'ils prennent ordinairement plus de chair & de corps : après ces ſix ou ſept mois de lait on les sèvre pour leur faire prendre une nourriture plus ſolide que le lait, on leur donne du ſon deux fois par jour & un peu de foin, dont on augmente la quantité à meſure qu'ils avancent en âge; & on les garde dans l'écurie tant qu'ils marquent de l'inquiétude pour retourner à leur mère; mais lorſque cette inquiétude eſt paſſée, on les laiſſe ſortir par le beau temps, & on les conduit aux pâturages, ſeulement il faut prendre garde de les laiſſer paître à jeun, il faut leur donner le ſon & les faire boire une heure avant de les mettre à l'herbe, & ne jamais les expoſer au grand froid ou à la pluie; ils paſſent de cette façon le premier hiver : au mois de mai ſuivant, non ſeulement on leur permettra de pâturer tous les jours, mais on les laiſſera coucher à l'air dans les pâturages pendant tout l'été & juſqu'à la fin d'octobre, en obſervant ſeulement de ne leur pas laiſſer paître les regains; s'ils s'accoûtumoient à cette herbe trop fine, ils ſe dégoûteroient du foin, qui doit cependant faire leur principale nourriture pendant le ſecond hiver avec du ſon mêlé d'orge ou d'avoine moulus; on

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 203 sur 615

les conduit de cette façon en les laiſſant pâturer le jour pendant l'hiver & la nuit pendant l'été juſqu'à l'âge de quatre ans, qu'on les retire du pâturage pour les nourrir à l'herbe sèche: cē changement de nourriture demande quelques précautions, on ne leur donnera pendant les premiers huit jours que de la paille, & on fera bien de leur faire prendre quelques breuvages contre les vers, que les mauvaiſes digeſtions d'une herbe trop crue peuvent avoir produits. M. de Garſault *(k)*, qui recommande cette pratique, eſt ſans doute fondé ſur l'expérience; cependant on verra qu'à tout âge & dans tous les temps l'eſtomac de tous les chevaux eſt farci d'une ſi prodigieuſe quantité de vers, qu'ils ſemblent faire partie de leur conſtitution; nous les avons trouvés *(l)* dans les chevaux ſains comme dans les chevaux malades, dans ceux qui paiſſoient l'herbe comme dans ceux qui ne mangeoient que de l'avoine & du foin; & les ânes, qui de tous les animaux ſont ceux qui approchent le plus de la nature du cheval, ont auſſi cette prodigieuſe quantité de vers dans l'eſtomac, & n'en ſont pas plus incommodés; ainſi l'on ne doit pas regarder les vers, du moins ceux dont nous parlons, comme une maladie accidentelle, cauſée par les mauvaiſes digeſtions d'une herbe crue, mais pluſtôt comme un effet dépendant de

(k) Voy. le nouveau parfait Maréchal, par M. de Garſault. *Paris, 1746, pages 84 & 85.*

(l) Voy. ci-après dans ce volume la deſcription de l'eſtomac du cheval, & la planche qui y a rapport.

la nourriture & de la digeſtion ordinaire de ces animaux.

Il faut avoir attention, lorſqu'on sèvre les jeunes poulains, de les mettre dans une écurie propre, qui ne ſoit pas trop chaude, crainte de les rendre trop délicats & trop ſenſibles aux impreſſions de l'air; on leur donnera ſouvent de la litière fraîche, on les tiendra propres en les bouchonnant de temps en temps; mais il ne faudra ni les attacher, ni les panſer à la main qu'à l'âge de deux ans & demi ou trois ans, ce frottement trop rude leur cauſeroit de la douleur, leur peau eſt encore trop délicate pour le ſouffrir, & ils dépériroient au lieu de profiter; il faut auſſi avoir ſoin que le ratelier & la mangeoire ne ſoient pas trop élevés, la néceſſité de lever la tête trop haut pour prendre leur nourriture pourroit leur donner l'habitude de la porter de cette façon, ce qui leur gâteroit l'encolure. Lorſqu'ils auront un an ou dix-huit mois, on leur tondra la queue, les crins repouſſeront & deviendront plus forts & plus touffus. Dès l'âge de deux ans il faut ſéparer les poulains, mettre les mâles avec les chevaux, & les femelles avec les jumens; ſans cette précaution les jeunes poulains ſe fatigueroient autour des poulines, & s'énerveroient ſans aucun fruit.

A l'âge de trois ans ou de trois ans & demi on doit commencer à les dreſſer & à les rendre dociles; on leur mettra d'abord une ſelle légère & aiſée, & on les laiſſera ſellés pendant deux ou trois heures chaque jour; on les accoûtumera de même à recevoir un bridon dans la bouche & à ſe laiſſer lever les pieds ſur leſquels on frappera

frappera quelques coups comme pour les ferrer ; & ſi ce ſont des chevaux deſtinés au carroſſe ou au trait, on leur mettra un harnois ſur le corps & un bridon : dans les commencemens, il ne faut point de bride, ni pour les uns, ni pour les autres, on les fera troter enſuite à la longe avec un caveſſon ſur le nez ſur un terrein uni ſans être montés, & ſeulement avec la ſelle ou le harnois ſur le corps; & lorſque le cheval de ſelle tournera facilement & viendra volontiers auprès de celui qui tient la longe, on le montera & deſcendra dans la même place & ſans le faire marcher juſqu'à ce qu'il ait quatre ans, parce qu'avant cet âge il n'eſt pas encore aſſez fort pour n'être pas, en marchant, ſurchargé du poids du cavalier; mais à quatre ans on le montera pour le faire marcher au pas ou au trot, & toûjours à petites repriſes *(m)* : quand le cheval de carroſſe ſera accoûtumé au harnois, on l'atellera avec un autre cheval fait, en lui mettant une bride, & on le conduira avec une longe paſſée dans la bride, juſqu'à ce qu'il commence à être ſage au trait; alors le cocher eſſayera de le faire reculer, ayant pour aide un homme devant, qui le pouſſera en arrière avec douceur, & même lui donnera de petits coups pour l'obliger à reculer : tout cela doit ſe faire avant que les jeunes chevaux aient changé de nourriture, car quand une fois ils ſont ce qu'on appelle engrainés, c'eſt-à-dire, lorſqu'ils ſont au grain & à la

(m) Voyez les Élémens de cavalerie de M. de la Guérinière. *Paris, 1741, tome I, page 140 & ſuiv.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 206 sur 615

paille, comme ils ſont plus vigoureux, on a remarqué qu'ils étoient auſſi moins dociles, & plus difficiles à dreſſer *(n)*.

Le mors & l'éperon ſont deux moyens qu'on a imaginés pour les obliger à recevoir le commandement, le mors pour la préciſion, & l'éperon pour la promptitude des mouvemens. La bouche ne paroiſſoit pas deſtinée par la Nature à recevoir d'autres impreſſions que celles du goût & de l'appétit, cependant elle eſt d'une ſi grande ſenſibilité dans le cheval, que c'eſt à la bouche, par préférence à l'œil & à l'oreille, qu'on s'adreſſe pour tranſmettre au cheval les ſignes de la volonté; le moindre mouvement ou la plus petite preſſion du mors ſuffit pour avertir & déterminer l'animal, & cet organe de ſentiment n'a d'autre défaut que celui de ſa perfection même, ſa trop grande ſenſibilité veut être ménagée, car ſi on en abuſe, on gâte la bouche du cheval en la rendant inſenſible à l'impreſſion du mors : les ſens de la vûe & de l'ouïe ne ſeroient pas ſujets à une telle altération & ne pourroient être émouſſés de cette façon, mais apparemment on a trouvé des inconvéniens à commander aux chevaux par ces organes, & il eſt vrai que les ſignes tranſmis par le toucher font beaucoup plus d'effet ſur les animaux en général, que ceux qui leur ſont tranſmis par l'œil ou par l'oreille; d'ailleurs, la ſituation des chevaux par rapport à celui qui les monte ou qui les conduit, rend les yeux preſque inutiles à cet effet,

(n) V. le nouveau parfait Maréchal, par M. de Garſault, *page 86*.

puiſqu'ils ne voient que devant eux, & que ce n'eſt qu'en tournant la tête qu'ils pourroient apercevoir les ſignes qu'on leur feroit ; & quoique l'oreille ſoit un ſens par lequel on les anime & on les conduit ſouvent, il paroît qu'on a reſtreint & laiſſé aux chevaux groſſiers l'uſage de cet organe, puiſqu'au manège, qui eſt le lieu de la plus parfaite éducation, l'on ne parle preſque point aux chevaux, & qu'il ne faut pas même qu'il paroiſſe qu'on les conduiſe : en effet, lorſqu'ils ſont bien dreſſés, la moindre preſſion des cuiſſes, le plus léger mouvement du mors ſuffit pour les diriger, l'éperon eſt même inutile, ou du moins on ne s'en ſert que pour les forcer à faire des mouvemens violens; & lorſque, par l'ineptie du cavalier, il arrive, qu'en donnant de l'éperon il retient la bride, le cheval ſe trouvant excité d'un côté & retenu de l'autre, ne peut que ſe cabrer en faiſant un bond ſans ſortir de ſa place.

On donne à la tête du cheval, par le moyen de la bride, un air avantageux & relevé, on la place comme elle doit être, & le plus petit ſigne ou le plus petit mouvement du cavalier ſuffit pour faire prendre au cheval ſes différentes allures ; la plus naturelle eſt peut-être le trot, mais le pas & même le galop ſont plus doux pour le cavalier, & ce ſont auſſi les deux allures qu'on s'applique le plus à perfectionner. Lorſque le cheval lève la jambe de devant pour marcher, il faut que ce mouvement ſoit fait avec hardieſſe & facilité, & que le genou ſoit aſſez plié ; la jambe levée doit paroître ſoûtenue un

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 208 sur 615

inſtant, & lorſqu'elle retombe le pied doit être ferme & appuyer également ſur la terre, ſans que la tête du cheval reçoive aucune impreſſion de ce mouvement; car lorſque la jambe retombe ſubitement, & que la tête baiſſe en même temps, c'eſt ordinairement pour ſoulager promptement l'autre jambe qui n'eſt pas aſſez forte pour ſupporter ſeule tout le poids du corps; ce défaut eſt très-grand auſſi-bien que celui de porter le pied en dehors ou en dedans, car il retombe dans cette même direction : l'on doit obſerver auſſi que lorſqu'il appuie ſur le talon, c'eſt une marque de foibleſſe, & que quand il poſe ſur la pince, c'eſt une attitude fatigante & forcée que le cheval ne peut ſoûtenir long-temps.

Le pas, qui eſt la plus lente de toutes les allures, doit cependant être prompt, il faut qu'il ne ſoit ni trop alongé ni trop accourci, & que la démarche du cheval ſoit légère : cette légèreté dépend beaucoup de la liberté des épaules, & ſe reconnoît à la manière dont il porte la tête en marchant; s'il la tient haute & ferme, il eſt ordinairement vigoureux & léger : lorſque le mouvement des épaules n'eſt pas aſſez libre, la jambe ne ſe lève point aſſez, & le cheval eſt ſujet à faire des faux pas & à heurter du pied contre les inégalités du terrein; & lorſque les épaules ſont encore plus ſerrées & que le mouvement des jambes en paroît indépendant, le cheval ſe fatigue, fait des chûtes, & n'eſt capable d'aucun ſervice : le cheval doit être ſur la hanche, c'eſt-à-dire, hauſſer les épaules & baiſſer la hanche en marchant, il

doit auſſi ſoûtenir ſa jambe & la lever aſſez haut, mais s'il la ſoûtient trop long-temps, s'il la laiſſe retomber trop lentement, il perd tout l'avantage de la légèreté, il devient dur, & n'eſt bon que pour l'appareil & pour piaffer.

Il ne ſuffit pas que les mouvemens du cheval ſoient légers, il faut encore qu'ils ſoient égaux & uniformes dans le train du devant & dans celui du derrière, car ſi la croupe balance tandis que les épaules ſe ſoûtiennent, le mouvement ſe fait ſentir au cavalier par ſecouſſes & lui devient incommode; la même choſe arrive lorſque le cheval alonge trop de la jambe de derrière, & qu'il la poſe au-delà de l'endroit où le pied de devant a porté: les chevaux dont le corps eſt court ſont ſujets à ce défaut, ceux dont les jambes ſe croiſent ou s'atteignent n'ont pas la démarche ſûre, & en général ceux dont le corps eſt long ſont les plus commodes pour le cavalier parce qu'il ſe trouve plus éloigné des deux centres de mouvement, les épaules & les hanches, & qu'il en reſſent moins les impreſſions & les ſecouſſes.

Les quadrupèdes marchent ordinairement en portant à la fois en avant une jambe de devant & une jambe de derrière; lorſque la jambe droite de devant part, la jambe gauche de derrière ſuit & avance en même temps, & ce pas étant fait, la jambe gauche de devant part à ſon tour conjointement avec la jambe droite de derrière, & ainſi de ſuite: comme leur corps porte ſur quatre points d'appui qui forment un quarré long, la

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 210 sur 615

manière la plus commode de ſe mouvoir eſt d'en changer deux à la fois en diagonale, de façon que le centre de gravité du corps de l'animal ne faſſe qu'un petit mouvement & reſte toûjours à peu près dans la direction des deux points d'appui qui ne ſont pas en mouvement ; dans les trois allures naturelles du cheval, le pas, le trot & le galop, cette règle de mouvement s'obſerve toûjours, mais avec des différences. Dans le pas il y a quatre temps dans le mouvement, ſi la jambe droite de devant part la première, la jambe gauche de derrière ſuit un inſtant après, enſuite la jambe gauche de devant part à ſon tour pour être ſuivie un inſtant après de la jambe droite de derrière, ainſi le pied droit de devant poſe à terre le premier, le pied gauche de derrière poſe à terre le ſecond, le pied gauche de devant poſe à terre le troiſième, & le pied droit de derrière poſe à terre le dernier, ce qui fait un mouvement à quatre temps & à trois intervalles, dont le premier & le dernier ſont plus courts que celui du milieu. Dans le trot il n'y a que deux temps dans le mouvement, ſi la jambe droite de devant part, la jambe gauche de derrière part auſſi en même temps, & ſans qu'il y ait aucun intervalle entre le mouvement de l'une & le mouvement de l'autre, enſuite la jambe gauche de devant part avec la droite de derrière auſſi en même temps, de ſorte qu'il n'y a dans ce mouvement du trot que deux temps & un intervalle, le pied droit de devant & le pied gauche de derrière poſent à terre en même

temps, & enſuite le pied gauche de devant & le droit de derrière poſent auſſi à terre en même temps. Dans le galop il y a ordinairement trois temps, mais comme dans ce mouvement, qui eſt une eſpèce de ſaut, les parties antérieures du cheval ne ſe meuvent pas d'abord d'elles-mêmes, & qu'elles ſont chaſſées par la force des hanches & des parties poſtérieures, ſi des deux jambes de devant la droite doit avancer plus que la gauche, il faut auparavant que le pied gauche de derrière poſe à terre pour ſervir de point d'appui à ce mouvement d'élancement, ainſi c'eſt le pied gauche de derrière qui fait le premier temps du mouvement & qui poſe à terre le premier, enſuite la jambe droite de derrière ſe lève conjointement avec la gauche de devant & elles retombent à terre en même temps, & enfin la jambe droite de devant, qui s'eſt levée un inſtant après la gauche de devant & la droite de derrière, ſe poſe à terre la dernière, ce qui fait le troiſième temps; ainſi dans ce mouvement du galop il y a trois temps & deux intervalles, & dans le premier de ces intervalles, lorſque le mouvement ſe fait avec viteſſe, il y a un inſtant où les quatre jambes ſont en l'air en même temps & où l'on voit les quatre fers du cheval à la fois : lorſque le cheval a les hanches & les jarets ſouples, & qu'il les remue avec vîteſſe & agilité, ce mouvement du galop eſt plus parfait, & la cadence s'en fait à quatre temps; il poſe d'abord le pied gauche de derrière qui marque le premier temps, enſuite le pied droit de derrière

retombe le premier & marque le ſecond temps, le pied gauche de devant tombant un inſtant après marque le troiſième temps, & enfin le pied droit de devant qui retombe le dernier marque le quatrième temps.

Les chevaux galopent ordinairement ſur le pied droit, de la même manière qu'ils partent de la jambe droite de devant pour marcher & pour troter, ils entament auſſi le chemin en galopant par la jambe droite de devant qui eſt plus avancée que la gauche, & de même la jambe droite de derrière, qui ſuit immédiatement la droite de devant, eſt auſſi plus avancée que la gauche de derrière, & cela conſtamment tant que le galop dure; de là il réſulte que la jambe gauche, qui porte tout le poids & qui pouſſe les autres en avant, eſt la plus fatiguée, en ſorte qu'il ſeroit bon d'exercer les chevaux à galoper alternativement ſur le pied gauche auſſi-bien que ſur le droit, ils ſuffiroient plus long-temps à ce mouvement violent, & c'eſt auſſi ce que l'on fait au manège, mais peut-être par une autre raiſon, qui eſt que comme on les fait ſouvent changer de main, c'eſt-à-dire, décrire un cercle dont le centre eſt tantôt à droite, tantôt à gauche, on les oblige auſſi à galoper tantôt ſur le pied droit, tantôt ſur le gauche.

Dans le pas les jambes du cheval ne ſe lèvent qu'à une petite hauteur & les pieds raſent la terre d'aſſez près, au trot elles s'élèvent davantage & les pieds ſont entièrement détachés de terre, dans le galop les jambes s'élèvent encote plus haut & les pieds ſemblent bondir ſur

ſur la terre; le pas pour être bon, doit être prompt, léger, doux & ſûr; le trot doit être ferme, prompt & également ſoûtenu, il faut que le derrière chaſſe bien le devant, le cheval dans cette allure doit porter la tête haute & avoir les reins droits; car ſi les hanches hauſſent & baiſſent alternativement à chaque temps du trot, ſi la croupe balance & ſi le cheval ſe berce, il trotte mal par foibleſſe; s'il jette en dehors les jambes de devant c'eſt un autre défaut, les jambes de devant doivent être ſur la même ligne que celles de derrière, & toûjours les effacer. Lorſqu'une des jambes de derrière ſe lance, ſi la jambe de devant du même côté reſte en place un peu trop long-temps, le mouvement devient plus dur par cette réſiſtance; & c'eſt pour cela que l'intervalle entre les deux temps du trot doit être court; mais, quelque court qu'il puiſſe être, cette réſiſtance ſuffit pour rendre cette allure plus dure que le pas & le galop; parce que dans le pas le mouvement eſt plus liant, plus doux, & la réſiſtance moins forte, & que dans le galop il n'y a preſque point de réſiſtance horizontale, qui eſt la ſeule incommode pour le cavalier, la réaction du mouvement des jambes de devant ſe faiſant preſque toute de bas en haut dans la direction perpendiculaire.

Le reſſort des jarrets contribue autant au mouvement du galop que celui des reins; tandis que les reins font effort pour élever & pouſſer en avant les parties antérieures, le pli du jarret fait reſſort, rompt le coup &

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 214 sur 615

adoucit la ſecouſſe ; auſſi plus ce reſſort du jarret eſt liant & ſouple, plus le mouvement du galop eſt doux ; il eſt auſſi d'autant plus prompt & plus rapide, que les jarrets ſont plus forts, & d'autant plus ſoûtenu, que le cheval porte plus ſur les hanches & que les épaules ſont plus ſoûtenues par la force des reins. Au reſte, les chevaux qui dans le galop lèvent bien haut les jambes de devant ne ſont pas ceux qui galopent le mieux, ils avancent moins que les autres & ſe fatiguent davantage, & cela vient ordinairement de ce qu'ils n'ont pas les épaules aſſez libres.

Le pas, le trot & le galop ſont donc des allures naturelles les plus ordinaires ; mais il y a quelques chevaux qui ont naturellement une autre allure qu'on appelle l'*amble*, qui eſt très-différente des trois autres, & qui du premier coup d'œil paroît contraire aux loix de la méchanique & très-fatigante pour l'animal, quoique dans cette allure la vîteſſe du mouvement ne ſoit pas ſi grande que dans le galop ou dans le grand trot : dans cette allure le pied du cheval raſe la terre encore de plus près que dans le pas, & chaque démarche eſt beaucoup plus alongée ; mais ce qu'il y a de ſingulier, c'eſt que les deux jambes du même côté, par exemple, celles de devant & de derrière du côté droit, partent en même temps pour faire un pas, & qu'enſuite les deux jambes du côté gauche partent auſſi en même temps pour en faire un autre, & ainſi de ſuite ; en ſorte que les deux côtés du corps manquent alternativement d'appui, &

qu'il n'y a point d'équilibre de l'un à l'autre; ce qui ne peut manquer de fatiguer beaucoup le cheval, qui eſt obligé de ſe ſoûtenir dans un balancement forcé, par la rapidité d'un mouvement qui n'eſt preſque pas détaché de terre ; car s'il levoit les pieds dans cette allure autant qu'il les lève dans le trot ou même dans le bon pas, le balancement ſeroit ſi grand qu'il ne pourroit manquer de tomber ſur le côté; & ce n'eſt que parce qu'il raſe la terre de très-près, & par des alternatives promptes de mouvement, qu'il ſe ſoûtient dans cette allure, où la jambe de derrière doit, non ſeulement partir en même temps que la jambe de devant du même côté, mais encore avancer ſur elle & poſer un pied ou un pied & demi au-delà de l'endroit où celle-ci a poſé : plus cet eſpace dont la jambe de derrière avance de plus que la jambe de devant, eſt grand, mieux le cheval marche l'amble, & plus le mouvement total eſt rapide. Il n'y a donc dans l'amble, comme dans le trot, que deux temps dans le mouvement; & toute la différence eſt que dans le trot les deux jambes qui vont enſemble ſont oppoſées en diagonale, au lieu que dans l'amble ce ſont les deux jambes du même côté qui vont enſemble : cette allure, qui eſt très-fatigante pour le cheval, & qu'on ne doit lui laiſſer prendre que dans les terreins unis, eſt fort douce pour le cavalier, elle n'a pas la dureté du trot, qui vient de la réſiſtance que fait la jambe de devant lorſque celle de derrière ſe lève, parce que dans l'amble cette jambe de devant ſe

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 216 sur 615

lève en même temps que celle de derrière du même côté ; au lieu que dans le trot cette jambe de devant du même côté demeure en repos & réſiſte à l'impulſion pendant tout le temps que ſe meut celle de derrière. Les connoiſſeurs aſſurent que les chevaux qui naturellement vont l'amble ne trottent jamais & qu'ils ſont beaucoup plus foibles que les autres ; en effet les poulains prennent aſſez ſouvent cette allure, ſur-tout lorſqu'on les force à aller vîte, & qu'ils ne ſont pas encore aſſez forts pour troter ou pour galoper, & l'on obſerve auſſi que la pluſpart des bons chevaux, qui ont été trop fatigués & qui commencent à s'uſer, prennent eux-mêmes cette allure lorſqu'on les force à un mouvement plus rapide que celui du pas *(o)*.

L'amble peut donc être regardée comme une allure défectueuſe, puiſqu'elle n'eſt pas ordinaire & qu'elle n'eſt naturelle qu'à un petit nombre de chevaux ; que ces chevaux ſont preſque toûjours plus foibles que les autres ; & que ceux qui paroiſſent les plus forts ſont ruinés en moins de temps que ceux qui trottent & galopent : mais il y a encore deux autres allures, l'entrepas & l'aubin, que les chevaux foibles ou excédés prennent d'eux-mêmes, qui ſont beaucoup plus défectueuſes que l'amble ; on a appelé ces mauvaiſes allures des *trains rompus*, *deſunis* ou *compoſés* : l'entrepas tient du pas & de l'amble, & l'aubin tient du trot & du

(o) Voyez l'école de cavalerie de M. de la Guérinière, *Paris, 1751, in-folio, page 77.*

galop, l'un & l'autre viennent des excès d'une longue fatigue ou d'une grande foibleſſe de reins; les chevaux de meſſagerie qu'on ſurcharge, commencent à aller l'entrepas au lieu du trot à meſure qu'ils ſe ruinent, & les chevaux de poſte ruinés, qu'on preſſe de galoper, vont l'aubin au lieu du galop.

Le cheval eſt de tous les animaux celui qui, avec une grande taille, a le plus de proportion & d'élégance dans les parties de ſon corps; car en lui comparant les animaux qui ſont immédiatement au deſſus & au deſſous, on verra que l'âne eſt mal fait, que le lion a la tête trop groſſe, que le bœuf a les jambes trop minces & trop courtes pour la groſſeur de ſon corps, que le chameau eſt difforme, & que les plus gros animaux, le rhinocéros & l'éléphant, ne ſont, pour ainſi dire, que des maſſes informes. Le grand alongement des mâchoires eſt la principale cauſe de la différence entre la tête des quadrupèdes & celle de l'homme, c'eſt auſſi le caractère le plus ignoble de tous; cependant, quoique les mâchoires du cheval ſoient fort alongées, il n'a pas, comme l'âne, un air d'imbécillité, ou de ſtupidité comme le bœuf; la régularité des proportions de ſa tête lui donne au contraire un air de légèreté qui eſt bien ſoûtenu par la beauté de ſon encolure. Le cheval ſemble vouloir ſe mettre au deſſus de ſon état de quadrupède en élevant ſa tête; dans cette noble attitude il regarde l'homme face à face; ſes yeux ſont vifs & bien ouverts, ſes oreilles ſont bien faites & d'une juſte grandeur, ſans

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 218 sur 615

être courtes comme celles du taureau, ou trop longues comme celles de l'âne; ſa crinière accompagne bien ſa tête, orne ſon cou, & lui donne un air de force & de fierté; ſa queue traînante & touffue couvre & termine avantageuſement l'extrémité de ſon corps : bien différente de la courte queue du cerf, de l'éléphant, &c. & de la queue nue de l'âne, du chameau, du rhinocéros, &c. la queue du cheval eſt formée par des crins épais & longs qui ſemblent ſortir de la croupe, parce que le tronçon dont ils ſortent eſt fort court : il ne peut relever ſa queue comme le lion, mais elle lui ſied mieux quoiqu'abaiſſée; & comme il peut la mouvoir de côté, il s'en ſert utilement pour chaſſer les mouches qui l'incommodent; car quoique ſa peau ſoit très-ferme, & qu'elle ſoit garnie par-tout d'un poil épais & ſerré, elle eſt cependant très-ſenſible.

L'attitude de la tête & du cou contribue plus que celle de toutes les autres parties du corps à donner au cheval un noble maintien; la partie ſupérieure de l'encolure dont ſort la crinière, doit s'élever d'abord en ligne droite en ſortant du garrot, & former enſuite, en approchant de la tête une courbe à peu près ſemblable à celle du cou d'un cygne; la partie inférieure de l'encolure ne doit former aucune courbure, il faut que ſa direction ſoit en ligne droite depuis le poitrail juſqu'à la ganache & un peu penchée en avant; ſi elle étoit perpendiculaire l'encolure ſeroit fauſſe : il faut auſſi que la partie ſupérieure du cou ſoit mince, & qu'il y ait peu

de chair auprès de la crinière, qui doit être médiocrement garnie de crins longs & déliés : une belle encolure doit être longue & relevée, & cependant proportionnée à la taille du cheval ; lorſqu'elle eſt trop longue & trop menue, les chevaux donnent ordinairement des coups de tête & quand elle eſt trop courte & trop charnue, ils ſont peſans à la main ; & pour que la tête ſoit le plus avantageuſement placée, il faut que le front ſoit perpendiculaire à l'horizon.

La tête doit être sèche & menue ſans être trop longue, les oreilles peu diſtantes, petites, droites, immobiles, étroites, déliées & bien plantées ſur le haut de la tête, le front étroit & un peu convexe, les ſalières remplies, les paupières minces, les yeux clairs, vifs, pleins de feu, aſſez gros & avancés à fleur de tête, la prunelle grande, la ganache décharnée & peu épaiſſe, le nez un peu arqué, les naſeaux bien ouverts & bien fendus, la cloiſon du nez mince, les lèvres déliées, la bouche médiocrement fendue, le garrot élevé & tranchant, les épaules sèches, plattes & peu ſerrées, le dos égal, uni, inſenſiblement arqué ſur la longueur, & relevé des deux côtés de l'épine qui doit paroître enfoncée, les flancs pleins & courts, la croupe ronde & bien fournie, la hanche bien garnie, le tronçon de la queue épais & ferme, les bras & les cuiſſes gros & charnus, le genou rond en devant, le jarret ample & évidé, les canons minces ſur le devant & larges ſur les côtés, le nerf bien détaché, le boulet menu, le fanon peu garni,

le paturon gros & d'une médiocre longueur, la couronne peu élevée, la corne noire, unie & luiſante, le ſabot haut, les quartiers ronds, les talons larges & médiocrement élevés, la fourchette menue & maigre, & la ſole épaiſſe & concave.

Mais il y a peu de chevaux dans leſquels on trouve toutes ces perfections raſſemblées : les yeux ſont ſujets à pluſieurs défauts qu'il eſt quelquefois difficile de reconnoître ; dans un œil ſain on doit voir à travers la cornée deux ou trois taches couleur de ſuie au deſſus de la prunelle, car pour voir ces taches il faut que la cornée ſoit claire, nette & tranſparente, ſi elle paroît double ou de mauvaiſe couleur l'œil n'eſt pas bon ; la prunelle petite, longue & étroite ou environnée d'un cercle blanc, déſigne auſſi un mauvais œil ; & lorſqu'elle a une couleur de bleu verdâtre, l'œil eſt certainement mauvais & la vûe trouble.

Je renvoie à l'article des deſcriptions l'énumération détaillée des défauts du cheval, & je me contenterai d'ajoûter encore quelques remarques par leſquelles, comme par les précédentes, on pourra juger de la pluſpart des perfections ou des imperfections d'un cheval. On juge aſſez bien du naturel & de l'état actuel de l'animal par le mouvement des oreilles, il doit, lorſqu'il marche, avoir la pointe des oreilles en avant ; un cheval fatigué a les oreilles baſſes, ceux qui ſont colères & malins portent alternativement l'une des oreilles en avant & l'autre en arrière ; tous portent les oreilles du côté

côté où ils entendent quelque bruit, & lorſqu'on les frappe ſur le dos ou ſur la croupe, ils tournent les oreilles en arrière. Les chevaux qui ont les yeux enfoncés ou un œil plus petit que l'autre, ont ordinairement la vûe mauvaiſe, ceux dont la bouche eſt sèche ne ſont pas d'un auſſi bon tempérament que ceux dont la bouche eſt fraîche & devient écumeuſe ſous la bride. Le cheval de ſelle doit avoir les épaules plattes, mobiles & peu chargées; le cheval de trait au contraire doit les avoir groſſes, rondes & charnues: ſi cependant les épaules d'un cheval de ſelle ſont trop sèches, & que les os paroiſſent trop avancer ſous la peau, c'eſt un défaut qui déſigne que les épaules ne ſont pas libres, & que par conſéquent le cheval ne pourra ſupporter la fatigue: un autre défaut pour le cheval de ſelle eſt d'avoir le poitrail trop avancé & les jambes de devant retirées en arrière, parce qu'alors il eſt ſujet à s'appuyer ſur la main en galopant, & même à broncher & à tomber, la longueur des jambes doit être proportionnée à la taille du cheval; lorſque celles de devant ſont trop longues, il n'eſt pas aſſuré ſur ſes pieds; ſi elles ſont trop courtes, il eſt peſant à la main; on a remarqué que les jumens ſont plus ſujettes que les chevaux à être baſſes du devant, & que les chevaux entiers ont le cou plus gros que les jumens & les hongres.

Une des choſes les plus importantes à connoître, c'eſt l'âge du cheval; les vieux chevaux ont ordinairement les ſalières creuſes, mais cet indice eſt équivoque, puiſque de jeunes chevaux engendrés de vieux étalons,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 222 sur 615

ont auſſi les ſalières creuſes : c'eſt par les dents qu'on peut avoir une connoiſſance plus certaine de l'âge, le cheval en a quarante, vingt-quatre mâchelières, quatre canines & douze inciſives ; les jumens n'ont pas de dents canines, ou les ont fort courtes : les mâchelières ne ſervent point à la connoiſſance de l'âge, c'eſt par les dents de devant & enſuite par les canines qu'on en juge. Les douze dents de devant commencent à pouſſer quinze jours après la naiſſance du poulain ; ces premières dents ſont rondes, courtes, peu ſolides, & tombent en différens temps pour être remplacées par d'autres : à deux ans & demi les quatre de devant du milieu tombent les premières, deux en haut, deux en bas ; un an après il en tombe quatre autres, une de chaque côté des premières qui ſont déjà remplacées ; à quatre ans & demi environ il en tombe quatre autres, toûjours à côté de celles qui ſont tombées & remplacées ; ces quatre dernières dents de lait ſont remplacées par quatre autres, qui ne croiſſent pas à beaucoup près auſſi vîte que celles qui ont remplacé les huit premières ; & ce ſont ces quatre dernières dents qu'on appelle les coins, & qui remplacent les quatre dernières dents de lait, qui marquent l'âge du cheval ; elles ſont aiſées à reconnoître, puiſqu'elles ſont les troiſièmes tant en haut qu'en bas, à les compter depuis le milieu de l'extrémité de la mâchoire ; ces dents ſont creuſes & ont une marque noire dans leur concavité ; à quatre ans & demi ou cinq ans elles ne débordent preſque pas au deſſus de la gencive, & le creux

eſt fort ſenſible; à ſix ans & demi il commence à ſe remplir, la marque commence auſſi à diminuer & à ſe rétrécir, toûjours de plus en plus juſqu'à ſept ans & demi ou huit ans, que le creux eſt tout-à-fait rempli & la marque noire effacée; après huit ans, comme ces dents ne donnent plus connoiſſance de l'âge, on cherche à en juger par les dents canines ou crochets; ces quatre dents ſont à côté de celles dont nous venons de parler: ces dents canines, non plus que les mâchelières, ne ſont pas précédées par d'autres dents qui tombent; les deux de la mâchoire inférieure pouſſent ordinairement les premières à trois ans & demi, & les deux de la mâchoire ſupérieure à quatre ans, & juſqu'à l'âge de ſix ans ces dents ſont fort pointues; à dix ans celles d'en haut paroiſſent déjà émouſſées, uſées & longues, parce qu'elles ſont déchauſſées, la gencive ſe retirant avec l'âge, & plus elles le ſont, plus le cheval eſt âgé: de dix juſqu'à treize ou quatorze ans, il y a peu d'indice de l'âge, mais alors quelques poils des ſourcils commencent à devenir blancs; cet indice eſt cependant auſſi équivoque que celui qu'on tire des ſalières creuſes, puiſqu'on a remarqué que les chevaux engendrés de vieux étalons & de vieilles jumens ont des poils blans aux ſourcils dès l'âge de neuf ou dix ans. Il y a des chevaux dont les dents ſont ſi dures qu'elles ne s'uſent point, & ſur leſquelles la marque noire ſubſiſte & ne s'efface jamais; mais ces chevaux, qu'on appelle *béguts*, ſont aiſés à reconnoître par le creux de la dent qui eſt abſolument rempli,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 224 sur 615

& auſſi par la longueur des dents canines (p) : au reſte on a remarqué qu'il y a plus de jumens que de chevaux béguts. On peut auſſi connoître, quoique moins préciſément, l'âge d'un cheval par les ſillons du palais, qui s'effacent à meſure que le cheval vieillit.

Dès l'âge de deux ans ou deux ans & demi le cheval eſt en état d'engendrer, & les jumens, comme toutes les autres femelles, ſont encore plus précoces que les mâles; mais ces jeunes chevaux ne produiſent que des poulains mal conformés ou mal conſtitués: il faut que le cheval ait au moins quatre ans ou quatre ans & demi avant que de lui permettre l'uſage de la jument, & encore ne le permettra-t-on de ſi bonne heure qu'aux chevaux de trait & aux gros chevaux, qui ſont ordinairement formés plus tôt que les chevaux fins; car pour ceux-ci il faut attendre juſqu'à ſix ans, & même juſqu'à ſept pour les beaux étalons d'Eſpagne; les jumens peuvent avoir un an de moins: elles ſont ordinairement en chaleur au printemps depuis la fin de mars juſqu'à la fin de juin; mais le temps de la plus forte chaleur ne dure guère que quinze jours ou trois ſemaines, & il faut être attentif à profiter de ce temps pour leur donner l'étalon; il doit être bien choiſi, beau, bien fait, relevé du devant, vigoureux, ſain par tout le corps, & ſur-tout de bonne race & de bon pays. Pour avoir de beaux chevaux de ſelle fins & bien faits, il faut prendre des étalons étrangers; les Arabes,

(p) Voyez l'École de cavalerie de M. de la Guérinière, *page 25 & ſuiv.*

les Turcs, les Barbes & les chevaux d'Andalouſie ſont ceux qu'on doit préférer à tous les autres; & à leur défaut on ſe ſervira de beaux chevaux Anglois, parce que ces chevaux viennent des premiers, & qu'ils n'ont pas beaucoup dégénéré, la nourriture étant excellente en Angleterre, où l'on a auſſi un très-grand ſoin de renouveler les races: les étalons d'Italie, ſur-tout les Napolitains, ſont auſſi fort bons, & ils ont le double avantage de poduire des chevaux fins de monture, lorſqu'on leur donne des jumens fines, & de beaux chevaux de carroſſe avec des jumens étoffées & de bonne taille. On prétend qu'en France, en Angleterre, &c. les chevaux Arabes & Barbes engendrent ordinairement des chevaux plus grands qu'eux, & qu'au contraire les chevaux d'Eſpagne n'en produiſent que de plus petits qu'eux. Pour avoir de beaux chevaux de carroſſe, il faut ſe ſervir d'étalons Napolitains, Danois, ou de chevaux de quelques endroits d'Allemagne & de Hollande, comme du Holſtein & de Friſe. Les étalons doivent être de belle taille, c'eſt-à-dire, de quatre pieds huit, neuf & dix pouces pour les chevaux de ſelle, & de cinq pieds au moins pour les chevaux de carroſſe: il faut auſſi qu'un étalon ſoit d'un bon poil, comme noir de jais, beau gris, bai, alezan, iſabelle doré avec la raie de mulet, les crins & les extrémités noires; tous les poils qui ſont d'une couleur lavée & qui paroiſſent mal teints doivent être bannis des haras, auſſi-bien que les chevaux qui ont les extrémités blanches. Avec un très-bel extérieur,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 226 sur 615

l'étalon doit avoir encore toutes les bonnes qualités intérieures, du courage, de la docilité, de l'ardeur, de l'agilité, de la ſenſibilité dans la bouche, de la liberté dans les épaules, de la ſûreté dans les jambes, de la ſoupleſſe dans les hanches, du reſſort par tout le corps, & ſur-tout dans les jarrets, & même il doit avoir été un peu dreſſé & exercé au manège: le cheval eſt de tous les animaux celui qu'on a le plus obſervé, & on a remarqué qu'il communique, par la génération, preſque toutes ſes bonnes & mauvaiſes qualités naturelles & acquiſes: un cheval naturellement hargneux, ombrageux, rétif, &c. produit des poulains qui ont le même naturel; & comme les défauts de conformation & les vices des humeurs ſe perpétuent encore plus ſûrement que les qualités du naturel, il faut avoir grand ſoin d'exclurre du haras tout cheval difforme, morveux, pouſſif, lunatique, &c.

Dans ces climats la jument contribue moins que l'étalon à la beauté du poulain, mais elle contribue peut-être plus à ſon tempérament & à ſa taille; ainſi il faut que les jumens aient du corps, du ventre, & qu'elles ſoient bonnes nourrices: pour avoir de beaux chevaux fins on préfère les jumens Eſpagnoles & Italiennes, & pour des chevaux de carroſſe les jumens Angloiſes & Normandes; cependant avec de beaux étalons, des jumens de tout pays pourront donner de beaux chevaux, pourvû qu'elles ſoient elles-mêmes bien faites & de bonne race; car ſi elles ont été engendrées d'un mauvais

cheval, les poulains qu'elles produiront ſeront ſouvent eux-mêmes de mauvais chevaux : dans cette eſpèce d'animaux, comme dans l'eſpèce humaine, la progéniture reſſemble aſſez ſouvent aux aſcendans paternels ou maternels ; ſeulement il ſemble que dans les chevaux la femelle ne contribue pas à la génération tout-à-fait autant que dans l'eſpèce humaine, le fils reſſemble plus ſouvent à ſa mère que le poulain ne reſſemble à la ſienne ; & lorſque le poulain reſſemble à la jument qui l'a produit, c'eſt ordinairement par les parties antérieures du corps, & par la tête & l'encolure.

Au reſte, pour bien juger de la reſſemblance des enfans à leurs parens, il ne faudroit pas les comparer dans les premières années, mais attendre l'âge où, tout étant développé, la comparaiſon en ſeroit plus certaine & plus ſenſible : indépendamment du développement dans l'accroiſſement, qui ſouvent altère ou change en bien les formes, les proportions & la couleur des chevaux, il ſe fait, dans le temps de la puberté, un développement prompt & ſubit, qui change ordinairement les traits, la taille, l'attitude des jambes, &c. le viſage s'alonge, le nez groſſit & grandit, la mâchoire s'avance ou ſe charge, la taille s'élève ou ſe courbe, les jambes s'alongent & ſouvent deviennent cagneuſes ou effilées ; en ſorte que la phyſionomie & le maintien du corps changent quelquefois ſi fort, qu'il ſeroit très-poſſible de méconnoître, au moins du premier coup d'œil, après la puberté, une perſonne qu'on auroit bien connue avant ce temps, &

qu'on n'auroit pas vûe depuis. Ce n'eſt donc qu'après cet âge quon doit comparer l'enfant à ſes parens, ſi l'on veut juger exactement de la reſſemblance ; & alors on trouve dans l'eſpèce humaine que ſouvent le fils reſſemble à ſon père, & la fille à ſa mère; que plus ſouvent ils reſſemblent à l'un & à l'autre à la fois, & qu'ils tiennent quelque choſe de tous deux ; qu'aſſez ſouvent ils reſſemblent aux grand-pères ou aux grand-mères; que quelquefois ils reſſemblent aux oncles ou aux tantes; que preſque toûjours les enfans du même père & de la même mère ſe reſſemblent plus entre eux qu'ils ne reſſemblent à leurs deſcendans, & que tous ont quelque choſe de commun & un air de famille. Dans les chevaux, comme le mâle contribue plus à la génération que la femelle, les jumens produiſent des poulains qui ſont aſſez ſouvent ſemblables en tout à l'étalon, ou qui toûjours lui reſſemblent plus qu'à la mère; elles en produiſent auſſi qui reſſemblent aux grand-pères; & lorſque la jument mère a été elle-même engendrée d'un mauvais cheval, il arrive aſſez ſouvent que, quoiqu'elle ait eu un bel étalon, & qu'elle ſoit belle elle-même, elle ne produit qu'un poulain qui, quoiqu'en apparence beau & bien fait dans ſa première jeuneſſe, décline toûjours en croiſſant; tandis qu'une jument qui ſort d'une bonne race donne des poulains qui, quoique de mauvaiſe apparence d'abord, embelliſſent avec l'âge.

Au reſte, ces obſervations que l'on a faites ſur le produit des jumens, & qui ſemblent concourir toutes à prouver

prouver que dans les chevaux le mâle influe beaucoup plus que la femelle ſur la progéniture, ne me paroiſſent pas encore ſuffiſantes pour établir ce fait d'une manière indubitable & irrévocable; il ne ſeroit pas impoſſible que ces obſervations ſubſiſtaſſent, & qu'en même temps & en général les jumens contribuaſſent autant que les chevaux au produit de la génération : il ne me paroît pas étonnant que des étalons, toûjours choiſis dans un grand nombre de chevaux, tirés ordinairement de pays chauds, nourris dans l'abondance, entretenus & ménagés avec grand ſoin, dominent dans la génération ſur des jumens communes, nées dans un climat froid, & ſouvent réduites à travailler; & comme dans les obſervations tirées des haras, il y a toûjours plus ou moins de cette ſupériorité de l'étalon ſur la jument, on peut très-bien imaginer que ce n'eſt que par cette raiſon qu'elles ſont vraies & conſtantes; mais en même temps il pourroit être tout auſſi vrai que de très-belles jumens des pays chauds, auxquelles on donneroit des chevaux communs, influeroient peut-être beaucoup plus qu'eux ſur leur progéniture, & qu'en général dans l'eſpèce des chevaux comme dans l'eſpèce humaine, il y eût égalité dans l'influence du mâle & de la femelle ſur leur progéniture; cela me paroît naturel & d'autant plus probable, qu'on a remarqué, même dans les haras, qu'il naiſſoit à peu près un nombre égal de poulains & de poulines; ce qui prouve qu'au moins pour le ſexe la femelle influe pour ſa moitié.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 230 sur 615

Mais ne ſuivons pas plus loin ces conſidérations, qui nous éloigneroient de notre ſujet : lorſque l'étalon eſt choiſi, & que les jumens qu'on veut lui donner ſont raſſemblées, il faut avoir un autre cheval entier qui ne ſervira qu'à faire connoître les jumens qui ſeront en chaleur, & qui même contribuera par ſes attaques à les y faire entrer ; on fait paſſer toutes les jumens l'une après l'autre devant ce cheval entier, qui doit être ardent & hennir fréquemment ; il veut les attaquer toutes, celles qui ne ſont point en chaleur ſe défendent, & il n'y a que celles qui y ſont qui ſe laiſſent approcher, mais au lieu de le laiſſer approcher tout-à-fait, on le retire & on lui ſubſtitue le veritable étalon. Cette épreuve eſt utile pour reconnoître le vrai temps de la chaleur des jumens, & ſur-tout de celles qui n'ont pas encore produit ; car celles qui viennent de pouliner entrent ordinairement en chaleur neuf jours après leur accouchement, ainſi on peut les mener à l'étalon dès ce jour même & les faire couvrir ; enſuite eſſayer neuf jours après, au moyen de l'épreuve ci-deſſus, ſi elles ſont encore en chaleur ; & ſi elles y ſont en effet, les faire couvrir une ſeconde fois, & ainſi de ſuite une fois tous les neuf jours tant que leur chaleur dure, car lorſqu'elles ſont pleines la chaleur diminue & ceſſe peu de jours après.

Mais pour que tout cela puiſſe ſe faire aiſément, commodément, avec ſuccès & fruit, il faut beaucoup d'attention, de dépenſe & de précautions ; il faut établir le haras dans un bon terrein & dans un lieu convenable

& proportionné à la quantité de jumens & d'étalons qu'on veut employer ; il faut partager ce terrein en plusieurs parties, fermées de palis ou de foſſés avec de bonnes haies; mettre les jumens pleines & celles qui alaitent leurs poulains dans la partie où le pâturage eſt le plus gras, ſéparer celles qui n'ont pas conçû ou qui n'ont pas encore été couvertes, & les mettre avec les jeunes poulines dans un autre parquet où le pâturage ſoit moins gras, afin qu'elles n'engraiſſent pas trop, ce qui s'oppoſeroit à la génération; enfin il faut mettre les jeunes poulains entiers ou hongres dans la partie du terrein la plus sèche & la plus inégale, pour qu'en montant & en deſcendant les colines ils acquièrent de la liberté dans les jambes & les épaules : ce dernier parquet, où l'on met les poulains mâles, doit être ſéparé de ceux des jumens avec grand ſoin, de peur que ces jeunes chevaux ne s'échappent & ne s'énervent avec les jumens. Si le terrein eſt aſſez grand pour qu'on puiſſe partager en deux parties chacun de ces parquets, pour y mettre alternativement des chevaux & des bœufs l'année ſuivante, le fond du pâturage durera bien plus long-temps que s'il étoit continuellement mangé par les chevaux; le bœuf répare le pâturage & le cheval l'amaigrit : il faut auſſi qu'il y ait des mares dans chacun de ces parquets; les eaux dormantes ſont meilleures pour les chevaux que les eaux vives, qui leur donnent ſouvent des tranchées; & s'il y a quelques arbres dans ce terrein il ne faut pas les détruire; les chevaux ſont bien aiſes de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 232 sur 615

trouver cette ombre dans les grandes chaleurs ; mais s'il y a des troncs, des chicots ou des trous, il faut arracher, combler, aplanir, pour prévenir tout accident. Ces pâturages ſerviront à la nourriture de votre haras pendant l'été ; & il faudra pendant l'hiver mettre les jumens à l'écurie & les nourrir avec du foin, auſſi-bien que les poulains, qu'on ne mènera pâturer que dans les beaux jours d'hiver. Les étalons doivent être toújours nourris à l'écurie avec plus de paille que de foin, & entretenus dans un exercice modéré juſqu'au temps de la monte qui dure ordinairement depuis le commencement d'avril juſqu'à la fin de juin ; on ne leur fera faire aucun autre exercice pendant ce temps, & on les nourrira largement, mais avec les mêmes nourritures qu'à l'ordinaire.

Lorſqu'on mènera l'étalon à la jument, il faudra le panſer auparavant, cela ne fera qu'augmenter ſon ardeur ; il faut auſſi que la jument ſoit propre & déferrée des pieds de derrière, car il y en a qui ſont chatouilleuſes & qui ruent à l'approche de l'étalon ; un homme tient la jument par le licol, & deux autres conduiſent l'étalon par des longes, lorſqu'il eſt en ſituation, on aide à l'accouplement en le dirigeant & en détournant la queue de la jument, car un ſeul crin qui s'oppoſeroit pourroit le bleſſer, même dangereuſement : il arrive quelquefois que dans l'accouplement l'étalon ne conſomme pas l'acte de la génération, & qu'il ſort de deſſus la jument ſans lui avoir rien laiſſé ; il faut donc être attentif à obſerver ſi dans les derniers momens de la copulation le tronçon de la

queue de l'étalon n'a pas un mouvement de balancier près de la croupe, car ce mouvement accompagne toûjours l'émiſſion de la liqueur ſéminale : s'il a conſommé, il ne faut pas lui laiſſer réitérer l'accouplement, il faut au contraire le ramener tout de ſuite à l'écurie & le laiſſer juſqu'au ſurlendemain ; car, quoiqu'un bon étalon puiſſe ſuffire à couvrir tous les jours une fois pendant les trois mois que dure le temps de la monte, il vaut mieux le ménager davantage & ne lui donner une jument que tous les deux jours, il dépenſera moins & produira davantage ; dans les premiers ſept jours, on lui donnera donc ſucceſſivement quatre jumens différentes, & le neuvième jour on lui ramènera la première, & ainſi des autres, tant qu'elles ſeront en chaleur ; mais dès qu'il y en aura quelqu'une dont la chaleur ſera paſſée, on lui en ſubſtituera une nouvelle, pour la faire couvrir à ſon tour auſſi tous les neuf jours ; & comme il y en a pluſieurs qui retiennent dès la première, ſeconde ou troiſième fois, on compte qu'un étalon ainſi conduit peut couvrir quinze ou dix-huit jumens, & produire dix ou douze poulains dans les trois mois que dure cet exercice. Dans ces animaux la quantité de la liqueur ſéminale eſt très-grande, & dans l'émiſſion ils en répandent fort abondamment : on verra dans les deſcriptions la grande capacité des réſervoirs qui la contiennent, & les inductions qu'on peut tirer de l'étendue & de la forme de ces réſervoirs. Dans les jumens il ſe fait auſſi une émiſſion, ou pluſtôt une ſtillation de la liqueur ſéminale

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 234 sur 615

pendant tout le temps qu'elles ſont en amour ; car elles jettent au dehors une liqueur gluante & blancheâtre qu'on appelle des chaleurs, & dès qu'elles ſont pleines ces émiſſions ceſſent : c'eſt cette liqueur que les Grecs ont appelée l'*hippomanès* de la jument, & dont ils prétendent qu'on peut faire des filtres, ſur-tout pour rendre un cheval frénétique d'amour : cet hippomanès eſt bien différent de celui qui ſe trouve dans les enveloppes du poulain, dont M. Daubenton *(q)* a le premier connu & ſi bien décrit la nature, l'origine & la ſituation : cette liqueur que la jument jette au dehors, eſt le ſigne le plus certain de ſa chaleur ; mais on le reconnoît encore au gonflement de la partie inférieure de la vulve & aux fréquens henniſſemens de la jument, qui dans ce temps cherche à s'approcher des chevaux : lorſqu'elle a été couverte par l'étalon, il faut ſimplement la mener au pâturage ſans aucune autre précaution. Le premier poulain d'une jument n'eſt jamais ſi étoffé que ceux qu'elle produit par la ſuite, ainſi on obſervera de lui donner la première fois un étalon plus gros, afin de compenſer le défaut de l'accroiſſement par la grandeur même de la taille ; il faut avoir grande attention à la différence ou à la réciprocité des figures du cheval & de la jument, afin de corriger les défauts de l'un par les perfections de l'autre, & ſur-tout ne jamais faire d'accouplement diſproportionné, comme d'un petit

(q) Voyez les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, *année 1751.*

cheval avec une groſſe jument, ou d'un grand cheval avec une petite jument, parce que le produit de cet accouplement ſeroit petit ou mal proportionné : pour tâcher d'approcher de la belle nature, il faut aller par nuances ; donner, par exemple, à une jument un peu trop épaiſſe un cheval étoffé, mais fin ; à une petite jument un cheval un peu plus haut qu'elle, à une jument qui pèche par l'avant-main un cheval qui ait la tête belle & l'encolure noble, &c.

On a remarqué que les haras établis dans des terreins ſecs & légers produiſoient des chevaux ſobres, légers & vigoureux, avec la jambe nerveuſe & la corne dure, tandis que dans les lieux humides & dans les pâturages les plus gras ils ont preſque tous la tête groſſe & peſante, le corps épais, les jambes chargées, la corne mauvaiſe & les pieds plats : ces différences viennent de celle du climat & de la nourriture, ce qui peut s'entendre aiſément ; mais ce qui eſt plus difficile à comprendre, & qui eſt encore plus eſſentiel que tout ce que nous venons de dire, c'eſt la néceſſité où l'on eſt de toûjours croiſer les races, ſi on veut les empêcher de dégénérer.

Il y a dans la Nature un prototype général dans chaque eſpèce ſur lequel chaque individu eſt modelé, mais qui ſemble, en ſe réaliſant, s'altérer ou ſe perfectionner par les circonſtances ; en ſorte que relativement à de certaines qualités, il y a une variation bizarre en apparence dans la ſucceſſion des individus, & en même

temps une conſtance qui paroît admirable dans l'eſpèce entière : le premier animal, le premier cheval, par exemple, a été le modèle extérieur & le moule intérieur ſur lequel tous les chevaux qui ſont nés, tous ceux qui exiſtent & tous ceux qui naîtront ont été formés; mais ce modèle dont nous ne connoiſſons que les copies, a pû s'altérer ou ſe perfectionner en communiquant ſa forme & ſe multipliant, l'empreinte originaire ſubſiſte en ſon entier dans chaque individu; mais quoiqu'il y en ait des millions, aucun de ces individus n'eſt cependant ſemblable en tout à un autre individu, ni par conſéquent au modèle dont il porte l'empreinte : cette différence qui prouve combien la Nature eſt éloignée de rien faire d'abſolu, & combien elle ſait nuancer ces ouvrages, ſe trouve dans l'eſpèce humaine, dans celles de tous les animaux, de tous les végétaux, de tous les êtres en un mot qui ſe reproduiſent; & ce quil y a de ſingulier, c'eſt qu'il ſemble que le modèle du beau & du bon ſoit diſperſé par toute la terre, & que dans chaque climat il n'en réſide qu'une portion qui dégénère toûjours, à moins qu'on ne la réuniſſe avec une autre portion priſe au loin; en ſorte que pour avoir de bon grain, de belles fleurs, &c. il faut en échanger les graines & ne jamais les ſemer dans le même terrein qui les a produits; & de même, pour avoir de beaux chevaux, de bons chiens, &c. il faut donner aux femelles du pays des mâles étrangers, & réciproquement aux mâles du pays des femelles étrangères; ſans cela les grains, les fleurs,

fleurs, les animaux dégénèrent, ou plutôt prennent une si forte teinture du climat, que la matière domine sur la forme & semble l'abâtardir : l'empreinte reste, mais défigurée par tous les traits qui ne lui sont pas essentiels ; en mêlant au contraire les races, & sur-tout en les renouvelant toûjours par des races étrangères, la forme semble se perfectionner, & la Nature se relever & donner tout ce qu'elle peut produire de meilleur.

Ce n'est point ici le lieu de donner les raisons générales de ces effets, mais nous pouvons indiquer les conjectures qui se présentent au premier coup d'œil : on sait par expérience que des animaux ou des végétaux transplantés d'un climat lointain, souvent dégénèrent & quelquefois se perfectionnent en peu de temps, c'est-à-dire, en un très-petit nombre de générations : il est aisé de concevoir que ce qui produit cet effet est la différence du climat & de la nourriture ; l'influence de ces deux causes doit à la longue rendre ces animaux exempts ou susceptibles de certaines affections, de certaines maladies ; leur tempérament doit changer peu à peu ; le développement de la forme, qui dépend en partie de la nourriture & de la qualité des humeurs, doit donc changer aussi dans les générations : ce changement est à la vérité presque insensible à la première génération, parce que les deux animaux, mâle & femelle, que nous supposons être les souches de cette race, ont pris leur consistance & leur forme avant d'avoir été dépaysés, & que le nouveau climat & la nourriture nouvelle

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 238 sur 615

peuvent à la vérité changer leur tempérament ; mais ne peuvent pas influer assez sur les parties solides & organiques, pour en altérer la forme, sur-tout si l'accroissement de leur corps étoit pris en entier ; par conséquent la première génération ne sera point altérée, la première progéniture de ces animaux ne dégénérera pas, l'empreinte de la forme sera pure, il n'y aura aucun vice de souche au moment de la naissance ; mais le jeune animal essuyera, dans un âge tendre & foible les influences du climat, elles lui feront plus d'impression qu'elles n'en ont pû faire sur le père & la mère, celles de la nourriture seront aussi bien plus grandes & pourront agir sur les parties organiques dans le temps de l'accroissement, en altérer un peu la forme originaire, & y produire des germes de défectuosités qui se manifesteront ensuite d'une manière très-sensible dans la seconde génération, où la progéniture a non seulement ses propres défauts, c'est-à-dire, ceux qui lui viennent de son accroissement, mais encore les vices de la seconde souche, qui ne s'en développeront qu'avec plus d'avantage ; & enfin à la troisième génération les vices de la seconde & de la troisième souche, qui proviennent de cette influence du climat & de la nourriture, se trouvant encore combinés avec ceux de l'influence actuelle dans l'accroissement, deviendront si sensibles, que les caractères de la première souche en seront effacés : ces animaux de race étrangère n'auront plus rien d'étranger, ils ressembleront en tout à ceux

du pays : des chevaux d'Eſpagne ou de Barbarie, dont on conduit ainſi les générations, deviennent en France des chevaux françois, ſouvent dès la ſeconde génération, & toûjours à la troiſième; on eſt donc obligé de croiſer les races au lieu de les conſerver, on renouvelle la race à chaque génération, en faiſant venir des chevaux barbes ou d'Eſpagne pour les donner aux jumens du pays, & ce qu'il y a de ſingulier, c'eſt que ce renouvellement de race, qui ne ſe fait qu'en partie, &, pour ainſi dire, à moitié, produit cependant de bien meilleurs effets que ſi le renouvellement étoit entier : un cheval & une jument d'Eſpagne ne produiront pas enſemble d'auſſi beaux chevaux en France que ceux qui viendront de ce même cheval d'Eſpagne avec une jument du pays; ce qui ſe concevra encore aiſément, ſi l'on fait attention à la compenſation néceſſaire des défauts, qui doit ſe faire lorſqu'on met enſemble un mâle & une femelle de différens pays : chaque climat par ſes influences & par celles de la nourriture, donne une certaine conformation qui pèche par quelque excès ou par quelque défaut; mais dans un climat chaud il y aura en excès ce qui ſera en défaut dans un climat froid, & réciproquement; de manière qu'il doit ſe faire une compenſation du tout lorſqu'on joint enſemble des animaux de ces climats oppoſés; & comme ce qui a le plus de perfection dans la Nature eſt ce qui a le moins de défauts, & que les formes les plus parfaites ſont ſeulement celles qui ont le moins de difformités, le produit de deux animaux, dont les défauts ſe compenſeroient

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 240 sur 615

exactement, ſeroit la production la plus parfaite de cette eſpèce : or ils ſe compenſent d'autant mieux, qu'on met enſemble des animaux de pays plus éloignés, ou pluſtôt de climats plus oppoſés; le compoſé qui en réſulte eſt d'autant plus parfait, que les excès ou les défauts de l'habitude du père ſont plus oppoſés aux défauts ou aux excès de l'habitude de la mère.

Dans le climat tempéré de la France il faut donc, pour avoir de beaux chevaux, faire venir des étalons de climats plus chauds ou plus froids : les chevaux Arabes, ſi l'on peut en avoir, & les Barbes doivent être préférés, & enſuite les chevaux d'Eſpagne & du royaume de Naples; & pour les climats froids ceux de Danemarck, & enſuite ceux du Holſtein & de Friſe : tous ces chevaux produiront en France, avec les jumens du pays, de très-bons chevaux, qui ſeront d'autant meilleurs & d'autant plus beaux, que la température du climat ſera plus éloignée de celle du climat de la France, en ſorte que les Arabes feront mieux que les Barbes, les Barbes mieux que ceux d'Eſpagne, & de même les chevaux tirés de Danemarck produiront de plus beaux chevaux que ceux de Friſe. Au défaut de ces chevaux de climats beaucoup plus froids ou plus chauds, il faudra faire venir des étalons Anglois ou Allemands, ou même des provinces méridionales de la France dans les provinces ſeptentrionales : on gagnera toûjours à donner aux jumens des chevaux étrangers, & au contraire on perdra beaucoup à laiſſer multiplier enſemble dans un

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 241 sur 615

haras des chevaux de même race, car ils dégénèrent infailliblement & en très-peu de temps.

Dans l'eſpèce humaine, le climat & la nourriture n'ont pas d'auſſi grandes influences que dans les animaux, & la raiſon en eſt aſſez ſimple; l'homme ſe défend, mieux que l'animal, de l'intempérie du climat, il ſe loge, il ſe vêtit convenablement aux ſaiſons, ſa nourriture eſt auſſi beaucoup plus variée, & par conſéquent elle n'influe pas de la même façon ſur tous les individus; les défauts ou les excès qui viennent de ces deux cauſes, & qui ſont ſi conſtans & ſi ſenſibles dans les animaux, le ſont beaucoup moins dans les hommes; d'ailleurs, comme il y a eu de fréquentes migrations de peuples, que les nations ſe ſont mêlées, & que beaucoup d'hommes voyagent & ſe répandent de tous côtés, il n'eſt pas étonnant que les races humaines paroiſſent être moins ſujettes au climat, & qu'il ſe trouve des hommes forts, bien faits, & même ſpirituels dans tous les pays. Cependant on peut croire que par une expérience dont on a perdu toute mémoire, les hommes ont autrefois connu le mal qui réſultoit des alliances du même ſang, puiſque chez les nations les moins policées, il a rarement été permis au frère d'épouſer ſa ſœur : cet uſage, qui eſt pour nous de droit divin, & qu'on ne rapporte chez les autres peuples qu'à des vûes politiques, a peut-être été fondé ſur l'obſervation; la politique ne s'étend pas d'une manière ſi générale & ſi abſolue, à moins qu'elle ne tienne au phyſique; mais ſi les hommes ont

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 242 sur 615

une fois connu par expérience que leur race dégénéroit toutes les fois qu'ils ont voulu la conſerver ſans mélange dans une même famille, ils auront regardé comme une loi de la Nature celle de l'alliance avec des familles étrangères, & ſe ſeront tous accordés à ne pas ſouffrir de mélange entre leurs enfans. Et en effet, l'analogie peut faire préſumer que dans la pluſpart des climats les hommes dégénéreroient, comme les animaux, après un certain nombre de générations.

Une autre influence du climat & de la nourriture eſt la variété des couleurs dans la robe des animaux, ceux qui ſont ſauvages & qui vivent dans le même climat, ſont d'une même couleur, qui devient ſeulement un peu plus claire ou plus foncée dans les différentes ſaiſons de l'année; ceux au contraire qui vivent ſous des climats différens, ſont de couleurs différentes, & les animaux domeſtiques varient prodigieuſement par les couleurs, en ſorte qu'il y a des chevaux, des chiens, &c. de toute ſorte de poils, au lieu que les cerfs, les lièvres, &c. ſont tous de la même couleur; les injures du climat toûjours les mêmes, la nourriture toûjours la même, produiſent dans les animaux ſauvages cette uniformité; le ſoin de l'homme, la douceur de l'abri, la variété dans la nourriture, effacent & font varier cette couleur dans les animaux domeſtiques, auſſi-bien que le mélange des races étrangères lorſqu'on n'a pas ſoin d'aſſortir la couleur du mâle avec celle de la femelle, ce qui produit quelquefois de belles ſingularités, comme on le

voit ſur les chevaux pies, où le blanc & le noir ſont appliqués d'une manière ſi bizarre & tranchent l'un ſur l'autre ſi ſingulièrement, qu'il ſemble que ce ne ſoit pas l'ouvrage de la Nature, mais l'effet du caprice d'un peintre.

Dans l'accouplement des chevaux on aſſortira donc le poil & la taille, on contraſtera les figures, on croiſera les races en oppoſant les climats, & on ne joindra jamais enſemble les chevaux & les jumens nés dans le même haras; toutes ces conditions ſont eſſentielles, & il y a encore quelques autres attentions qu'il ne faut pas négliger, par exemple, il ne faut point dans un haras, de jumens à queue courte, parce que ne pouvant ſe défendre des mouches, elles en ſont beaucoup plus tourmentées que celles qui ont tous leurs crins, & l'agitation continuelle que leur cauſe la piqûre de ces inſectes, fait diminuer la quantité de leur lait, ce qui influe beaucoup ſur le tempérament & la taille du poulain qui, toutes choſes égales d'ailleurs, ſera d'autant plus vigoureux que ſa mère ſera meilleure nourrice. Il faut tâcher de n'avoir pour ſon haras que des jumens qui aient toûjours pâturé & qui n'aient point fatigué; les jumens qui ont toûjours été à l'écurie nourries au ſec, & qu'on met enſuite au pâturage, ne produiſent pas d'abord; il leur faut du temps pour s'accoûtumer à cette nouvelle nourriture.

Quoique la ſaiſon ordinaire de la chaleur des jumens ſoit depuis le commencement d'avril juſqu'à la fin de juin, il arrive aſſez ſouvent que dans un grand nombre

il y en a quelques-unes qui ſont en chaleur avant ce temps : on fera bien de laiſſer paſſer cette chaleur ſans les faire couvrir, parce que le poulain naîtroit en hiver, ſouffriroit de l'intempérie de la ſaiſon, & ne pourroit ſuccer qu'un mauvais lait ; & de même lorſqu'une jument ne vient en chaleur qu'après le mois de juin, on ne devroit pas la laiſſer couvrir, parce que le poulain naiſſant alors en été, n'a pas le temps d'acquérir aſſez de force pour réſiſter aux injures de l'hiver ſuivant.

Beaucoup de gens, au lieu de conduire l'étalon à la jument pour la faire couvrir, le lâchent dans le parquet où les jumens ſont raſſemblées, & l'y laiſſent en liberté choiſir lui-même celles qui ont beſoin de lui, & les ſatisfaire à ſon gré ; cette manière eſt bonne pour les jumens, elles produiront même plus ſûrement que de l'autre façon, mais l'étalon ſe ruine plus en ſix ſemaines qu'il ne feroit en pluſieurs années par un exercice modéré & conduit comme nous l'avons dit.

Lorſque les jumens ſont pleines & que leur ventre commence à s'appeſantir, il faut les ſéparer des autres qui ne le ſont point, & qui pourroient les bleſſer ; elles portent ordinairement onze mois & quelques jours, elles accouchent debout, au lieu que preſque tous les autres quadrupèdes ſe couchent : on aide celles dont l'accouchement eſt difficile, on y met la main, on remet le poulain en ſituation, & quelquefois même, lorſqu'il eſt mort, on le tire avec des cordes. Le poulain ſe préſente ordinairement la tête la première, comme dans toutes les

les autres eſpèces d'animaux, il rompt ſes enveloppes en ſortant de la matrice, & les eaux abondantes qu'elles contiennent s'écoulent, il tombe en même temps un ou pluſieurs morceaux ſolides formés par le ſédiment de la liqueur épaiſſie de l'allantoïde *(r)*; ce morceau, que les anciens ont appelé l'*hippomanès* du poulain, n'eſt pas, comme ils le diſent, un morceau de chair attaché à la tête du poulain, il en eſt au contraire ſéparé par la membrane amnios; la jument lèche le poulain après ſa naiſſance, mais elle ne touche pas à l'hippomanès, & les anciens ſe ſont encore trompés lorſqu'ils ont aſſuré qu'elle le devoroit à l'inſtant.

L'uſage ordinaire eſt de faire couvrir une jument neuf jours après qu'elle a pouliné, c'eſt pour ne point perdre de temps, & pour tirer de ſon haras tout le produit que l'on peut en attendre; cependant il eſt ſûr que la jument ayant enſemble à nourrir ſon poulain né & ſon poulain à naître, ſes forces ſont partagées, & qu'elle ne peut leur donner autant que ſi elle n'avoit que l'un ou l'autre à nourrir : il ſeroit donc mieux, pour avoir d'excellens chevaux, de ne laiſſer couvrir les jumens que de deux années l'une, elles dureroient plus long-temps & retiendroient plus ſûrement; car dans les haras ordinaires il s'en faut bien que toutes les jumens qui ont été couvertes produiſent tous les ans, c'eſt beaucoup lorſque dans la même année il s'en trouve

(r) Voyez ci-après la deſcription des enveloppes de l'hippomanès du poulain.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 246 sur 615

la moitié ou les deux tiers qui donnent des poulains.

Les jumens, quoique pleines, peuvent ſouffrir l'accouplement, & cependant il n'y a jamais de ſuperfétation; elles produiſent ordinairement juſqu'à l'âge de quatorze ou quinze ans, & les plus vigoureuſes ne produiſent guère au-delà de dix-huit ans : les chevaux, lorſqu'ils ont été ménagés, peuvent engendrer juſqu'à l'âge de vingt & même au-delà, & l'on a fait ſur ces animaux la même remarque que ſur les hommes, c'eſt que ceux qui ont commencé de bonne heure finiſſent auſſi plus tôt; car les gros chevaux, qui ſont plus tôt formés que les chevaux fins, & dont on fait des étalons dès l'âge de quatre ans, ne durent pas ſi long-temps, & ſont communément hors d'état d'engendrer avant l'âge de quinze ans (ſſ).

La durée de la vie des chevaux eſt, comme dans toutes les autres eſpèces d'animaux, proportionnée à la durée du temps de leur accroiſſement, l'homme qui eſt quatorze ans à croître, peut vivre ſix ou ſept fois autant de temps, c'eſt-à-dire, quatre-vingt-dix ou cent ans; le cheval, dont l'accroiſſement ſe fait en quatre ans, peut vivre ſix ou ſept fois autant, c'eſt-à-dire vingt-cinq ou trente ans, les exemples qui pourroient être contraires à cette règle ſont ſi rares, qu'on ne doit pas même les regarder comme une exception dont on puiſſe tirer des conſéquences; & comme les gros chevaux prennent leur entier accroiſſement en moins de temps que les

(ſſ) Voyez le nouveau parfait Maréchal de M. de Garſault, *page 68 & ſuivantes.*

chevaux fins, ils vivent auſſi moins de temps, & ſont vieux dès l'âge de quinze ans.

Il paroîtroit au premier coup d'œil que dans les chevaux & la pluſpart des autres animaux quadrupèdes, l'accroiſſement des parties poſtérieures eſt d'abord plus grand que celui des parties antérieures, tandis que dans l'homme les parties inférieures croiſſent moins d'abord que les parties ſupérieures; car dans l'enfant les cuiſſes & les jambes ſont, à proportion du corps, beaucoup moins grandes que dans l'adulte; dans le poulain au contraire les jambes de derrière ſont aſſez longues pour qu'il puiſſe atteindre à ſa tête avec le pied de derrière, au lieu que le cheval adulte ne peut plus y atteindre; mais cette différence vient moins de l'inégalité de l'accroiſſement total des parties antérieures & poſtérieures, que de l'inégalité des pieds de devant & de ceux de derrière, qui eſt conſtante dans toute la Nature, & plus ſenſible dans les animaux quadrupèdes; car dans l'homme les pieds ſont plus gros que les mains, & ſont auſſi plus tôt formés; & dans le cheval, dont une grande partie de la jambe de derrière n'eſt qu'un pied, puiſqu'elle n'eſt compoſée que des os relatifs au tarſe, au métatarſe, &c. il n'eſt pas étonnant que ce pied ſoit plus étendu & plus tôt développé que la jambe de devant, dont toute la partie inférieure repréſente la main, puiſqu'elle n'eſt compoſée que des os du carpe, du métacarpe, &c. Lorſqu'un poulain vient de naître on remarque aiſément cette différence, les jambes de devant

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 248 sur 615

comparées à celles de derrière paroiſſent, & ſont en effet, beaucoup plus courtes alors qu'elles ne le ſeront dans la ſuite, & d'ailleurs l'épaiſſeur que le corps acquiert, quoiqu'indépendante des proportions de l'accroiſſement en longueur, met cependant plus de diſtance entre les pieds de derrière & la tête, & contribue par conſéquent à empêcher le cheval d'y atteindre lorſqu'il a pris ſon accroiſſement.

Dans tous les animaux, chaque eſpèce eſt variée ſuivant les différens climats, & les réſultats généraux de ces variétés forment & conſtituent les différentes races, dont nous ne pouvons ſaiſir que celles qui ſont les plus marquées, c'eſt-à-dire, celles qui diffèrent ſenſiblement les unes des autres; en négligeant toutes les nuances intermédiaires qui ſont ici, comme en tout, infinies; nous en avons même encore augmenté le nombre & la confuſion en favoriſant le mélange de ces races, & nous avons, pour ainſi dire, bruſqué la Nature en amenant en ces climats des chevaux d'Afrique ou d'Aſie, nous avons rendu méconnoiſſables les races primitives de France en y introduiſant des chevaux de tout pays, & il ne nous reſte, pour diſtinguer les chevaux, que quelques légers caractères, produits par l'influence actuelle du climat : ces caractères ſeroient bien plus marqués & les différences ſeroient bien plus ſenſibles, ſi les races de chaque climat s'y fuſſent conſervées ſans mélange; les petites variétés auroient été moins nuancées, moins nombreuſes, mais il y auroit eu un certain nombre de

grandes variétés bien caractérisées, que tout le monde auroit aisément distinguées; au lieu qu'il faut de l'habitude, & même une assez longue expérience, pour connoître les chevaux des différens pays; nous n'avons sur cela que les lumières que nous avons pû tirer des livres des voyageurs, des ouvrages des plus habiles écuyers, tels que M.rs de Newcastle, de Garsault, de la Guérinière, &c. & de quelques remarques que M. de Pignerolles, écuyer du Roi, & chef de l'Académie d'Angers a eu la bonté de nous communiquer.

Les chevaux Arabes sont les plus beaux que l'on connoisse en Europe, ils sont plus grands & plus étoffés que les Barbes, & tout aussi bien faits, mais comme il en vient rarement en France, les Écuyers n'ont pas d'observations détaillées de leurs perfections & de leurs défauts.

Les chevaux Barbes sont plus communs, ils ont l'encolure longue, fine, peu chargée de crins & bien sortie du garrot, la tête belle, petite & assez ordinairement moutonnée, l'oreille belle & bien placée, les épaules légères & plates, le garrot mince & bien relevé, les reins courts & droits, le flanc & les côtes rondes sans trop de ventre, les hanches bien effacées, la croupe le plus souvent un peu longue & la queue placée un peu haut, la cuisse bien formée & rarement plate, les jambes belles, bien faites & sans poil, le nerf bien détaché, le pied bien fait, mais souvent le paturon long; on en voit de tous poils, mais plus communément de gris: les Barbes ont un peu de négligence

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 250 sur 615

dans leur allure, ils ont beſoin d'être recherchés, & on leur trouve beaucoup de vîteſſe & de nerf; ils ſont fort légers & très-propres à la courſe : ces chevaux paroiſſent être les plus propres pour en tirer race; il ſeroit ſeulement à ſouhaiter qu'ils fuſſent de plus grande taille; les plus grands ſont de quatre pieds huit pouces, & il eſt rare d'en trouver qui aient quatre pieds neuf pouces; il eſt confirmé par expérience qu'en France, en Angleterre, &c. ils engendrent des poulains qui ſont plus grands qu'eux : on prétend que parmi les Barbes, ceux du royaume de Maroc ſont les meilleurs, enſuite les Barbes de montagne; ceux du reſte de la Mauritanie ſont au deſſous, auſſi-bien que ceux de Turquie, de Perſe & d'Arménie : tous ces chevaux des pays chauds ont le poil plus ras que les autres. Les chevaux Turcs ne ſont pas ſi bien proportionnés que les Barbes, ils ont pour l'ordinaire l'encolure éfilée, le corps long, les jambes trop menues; cependant ils ſont grands travailleurs & de longue haleine : on n'en ſera pas étonné, ſi l'on fait attention que dans les pays chauds les os des animaux ſont plus durs que dans les climats froids, & c'eſt par cette raiſon que quoiqu'ils aient le canon plus menu que ceux de ce pays-ci, ils ont cependant plus de force dans les jambes.

Les chevaux d'Eſpagne, qui tiennent le ſecond rang après les Barbes, ont l'encolure longue, épaiſſe & beaucoup de crins, la tête un peu groſſe, & quelquefois moutonnée, les oreilles longues, mais bien placées,

les yeux pleins de feu, l'air noble & fier, les épaules épaiſſes & le poitrail large, les reins aſſez ſouvent un peu bas, la côte ronde, & ſouvent un peu trop de ventre, la croupe ordinairement ronde & large, quoique quelques-uns l'aient un peu longue, les jambes belles & ſans poil, le nerf bien détaché, le paturon quelquefois un peu long, comme les Barbes, le pied un peu alongé, comme celui d'un mulet, & ſouvent le talon trop haut : les chevaux d'Eſpagne de belle race ſont épais, bien étoffés, bas de terre, ils ont auſſi beaucoup de mouvement dans leur démarche, beaucoup de ſouplеſſe, de feu & de fierté ; leur poil le plus ordinaire eſt noir ou bai-marron, quoiqu'il y en ait quelques-uns de toutes ſortes de poils ; ils ont très-rarement des jambes blanches & des nez blancs ; les Eſpagnols, qui ont de l'averſion pour ces marques, ne tirent point race des chevaux qui les ont, ils ne veulent qu'une étoile au front, ils eſtiment même les chevaux zains autant que nous les mépriſons : l'un & l'autre de ces préjugés, quoique contraires, ſont peut-être tout auſſi mal fondés, puiſqu'il ſe trouve de très-bons chevaux avec toutes ſortes de marques, & de même d'excellens chevaux qui ſont zains ; cette petite différence dans la robe d'un cheval ne ſemble en aucune façon dépendre de ſon naturel ou de ſa conſtitution intérieure, puiſqu'elle dépend en effet d'une qualité extérieure, & ſi ſuperficielle, que par une légère bleſſure dans la peau on produit une tache blanche : au reſte, les chevaux

d'Eſpagne, zains ou autres, ſont tous marqués à la cuiſſe hors le montoir, de la marque du haras dont ils ſont ſortis; ils ne ſont pas communément de grande taille, cependant on en trouve quelques-uns de quatre pieds neuf ou dix pouces; ceux de la haute Andalouſie paſſent pour être les meilleurs de tous, quoiqu'ils ſoient aſſez ſujets à avoir la tête trop longue, mais on leur fait grace de ce défaut en faveur de leurs rares qualités; ils ont du courage, de l'obéiſſance, de la grace, de la fierté, & plus de ſoupleſſe que les Barbes, c'eſt par tous ces avantages qu'on les préfère à tous les autres chevaux du monde, pour la guerre, pour la pompe & pour le manège.

Les plus beaux chevaux Anglois ſont, pour la conformation, aſſez ſemblables aux Arabes & aux Barbes, dont ils ſortent en effet; ils ont cependant la tête plus grande, mais bien faite & moutonnée, & les oreilles plus longues, mais bien placées: par les oreilles ſeules on pourroit diſtinguer un cheval Anglois d'un cheval Barbe, mais la grande différence eſt dans la taille, les Anglois ſont bien étoffés & beaucoup plus grands; on en trouve communément de quatre pieds dix pouces & même de cinq pieds de hauteur, il y en a de tous poils & de toutes marques; ils ſont généralement forts, vigoureux, hardis, capables d'une grande fatigue, excellens pour la chaſſe & la courſe, mais il leur manque la grace & la ſoupleſſe, ils ſont durs & ont peu de liberté dans les épaules.

On

On parle ſouvent de courſes de chevaux en Angleterre, & il y a des gens extrêmement habiles dans cette eſpèce d'art gymnaſtique. Pour en donner une idée, je ne puis mieux faire que de rapporter ce qu'un homme reſpectable (t), que j'ai déjà eu occaſion de citer dans le premier volume de cet ouvrage, m'a écrit de Londres le 18 février 1748. M. Thornhill, maître de poſte à Stilton, fit gageure de courir à cheval trois fois de ſuite le chemin de Stilton à Londres, c'eſt-à-dire, de faire deux cens quinze milles d'Angleterre (environ ſoixante-douze lieues de France) en quinze heures. Le 29 avril 1745, vieux ſtile, il ſe mit en courſe, partit de Stilton, fit la première courſe juſqu'à Londres en trois heures cinquante-une minutes, & monta huit différens chevaux dans cette courſe; il repartit ſur le champ & fit la ſeconde courſe, de Londres à Stilton, en trois heures cinquante-deux minutes, & ne monta que ſix chevaux; il ſe ſervit pour la troiſième courſe des mêmes chevaux qui lui avoient déjà ſervi, dans les quatorze il en monta ſept, & il acheva cette dernière courſe en trois heures quarante-neuf minutes; en ſorte que, non ſeulement il remplit la gageure, qui étoit de faire ce chemin en quinze heures, mais il le fit en onze heures trente-deux minutes: je doute que dans les jeux Olympiques il ſe ſoit jamais fait une courſe auſſi rapide que cette courſe de M. Thornhill.

Les chevaux d'Italie étoient autrefois plus beaux qu'ils

(t) Mylord comte de Morton.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 254 sur 615

ne le ſont aujourd'hui, parce que depuis un certain temps on y a négligé les haras; cependant il ſe trouve encore de beaux chevaux Napolitains, ſur-tout pour les attelages, mais en général ils ont la tête groſſe & l'encolure épaiſſe, ils ſont indociles, & par conſéquent difficiles à dreſſer · ces défauts ſont compenſés par la richeſſe de leur taille, par leur fierté & par la beauté de leurs mouvemens; ils ſont excellens pour l'appareil, & ont beaucoup de diſpoſitions à piaffer.

Les chevaux Danois ſont de ſi belle taille & ſi étoffés, qu'on les préfère à tous les autres pour en faire des attelages; il y en a de parfaitement bien moulés, mais en petit nombre, car le plus ſouvent ces chevaux n'ont pas une conformation fort régulière: la pluſpart ont l'encolure épaiſſe, les épaules groſſes, les reins un peu longs & bas, la croupe trop étroite pour l'épaiſſeur du devant; mais ils ont tous de beaux mouvemens, & en général ils ſont très-bons pour la guerre & pour l'appareil, ils ſont de tous poils; & même les poils ſinguliers, comme pie & tigre, ne ſe trouvent guère que dans les chevaux Danois.

Il y a en Allemagne de fort beaux chevaux, mais en général ils ſont peſans & ont peu d'haleine, quoiqu'ils viennent pour la pluſpart de chevaux Turcs & Barbes dont on entretient les haras, auſſi-bien que de chevaux d'Eſpagne & d'Italie; ils ſont donc peu propres à la chaſſe & à la courſe de viteſſe, au lieu que les chevaux Hongrois, Tranſilvains, &c. ſont au contraire légers &

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 255 sur 615

bons coureurs : les Houſards & les Hongrois leur fendent les naſeaux, dans la vûe, dit-on, de leur donner plus d'haleine, & auſſi pour les empêcher de hennir à la guerre ; on prétend que les chevaux auxquels on a fendu les naſeaux ne peuvent plus hennir : je n'ai pas été à portée de vérifier ce fait, mais il me ſemble qu'ils doivent ſeulement hennir plus foiblement : on a remarqué que les chevaux Hongrois, Cravates & Polonois ſont fort ſujets à être béguts.

Les chevaux de Hollande ſont fort bons pour le carroſſe, & ce ſont ceux dont on ſe ſert le plus communément en France ; les meilleurs viennent de la province de Friſe, il y en a auſſi de fort bons dans le pays de Bergues & de Juliers. Les chevaux Flamands ſont fort au deſſous des chevaux de Hollande, ils ont preſque tous la tête groſſe, les pieds plats, les jambes ſujètes aux eaux, & ces deux derniers défauts ſont eſſentiels dans des chevaux de carroſſe.

Il y a en France des chevaux de toute eſpèce, mais les beaux ſont en petit nombre ; les meilleurs chevaux de ſelle viennent du Limoſin ; ils reſſembent aſſez aux Barbes, & ſont comme eux excellens pour la chaſſe, mais ils ſont tardifs dans leur accroiſſement ; il faut les ménager dans leur jeuneſſe, & même ne s'en ſervir qu'à l'âge de huit ans : il y a auſſi de très-bons bidets en Auvergne, en Poitou, dans le Morvant en Bourgogne ; mais après le Limoſin, c'eſt la Normandie qui fournit les plus beaux chevaux ; ils ne ſont pas ſi bons

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 256 sur 615

pour la chaſſe, mais ils ſont meilleurs pour la guerre, ils ſont plus étoffés & plus tôt formés. On tire de la baſſe Normandie & du Cotentin de très-beaux chevaux de carroſſe, qui ont plus de légèreté & de reſſource que les chevaux de Hollande; la Franche-Comté & le Boulonnois fourniſſent de très-bons chevaux de tirage : en général les chevaux François pèchent par avoir de trop groſſes épaules, au lieu que les Barbes pèchent par les avoir trop ſerrées.

Après l'énumération de ces chevaux qui nous ſont le mieux connus, nous rapporterons ce que les voyageurs diſent des chevaux étrangers que nous connoiſſons peu. Il y a de fort bons chevaux dans toutes les iſles de l'Archipel; ceux de l'iſle de Crète *(u)* étoient en grande réputation chez les anciens pour l'agilité & la vîteſſe, cependant aujourd'hui on s'en ſert peu dans le pays même, à cauſe de la trop grande aſpérité du terrein, qui eſt preſque par-tout fort inégal & fort montueux : les beaux chevaux de ces iſles, & même ceux de Barbarie, ſont de race Arabe. Les chevaux naturels du royaume de Maroc ſont beaucoup plus petits que les Arabes, mais très-légers & très-vigoureux *(x)*. M. Shaw prétend *(y)* que les haras d'Égypte & de Tingitanie

(u) Voyez la deſcription des iſles de l'Archipel, par Dapper, *page 462.*

(x) Voy. l'Afrique de Marmol. *Paris, 1667, tome II, page 124.*

(y) Voy. les voyages de M. Shaw, traduits en françois. *La Haie, 1748, tome I, page 308.*

l'emportent aujourd'hui ſur tous ceux des pays voiſins ; au lieu qu'on trouvoit, il y a environ un ſiècle, d'auſſi bons chevaux dans tout le reſte de la Barbarie : l'excellence de ces chevaux Barbes conſiſte, dit-il, à ne s'abattre jamais, & à ſe tenir tranquilles lorſque le cavalier deſcend ou laiſſe tomber la bride ; ils ont un grand pas & un galop rapide, mais on ne les laiſſe point troter ni marcher l'amble : les habitans du pays regardent ces allures du cheval comme des mouvemens groſſiers & ignobles. Il ajoûte que les chevaux d'Égypte ſont ſupérieurs à tous les autres pour la taille & pour la beauté ; mais ces chevaux d'Égypte, auſſi-bien que la pluſpart des chevaux de Barbarie, viennent des chevaux Arabes qui ſont, ſans contredit, les premiers & les plus beaux chevaux du monde.

Selon Marmol *(z)*, ou pluſtôt, ſelon Léon l'Africain *(a)*, car Marmol l'a ici copié preſque mot à mot, les chevaux Arabes viennent des chevaux ſauvages des deſerts d'Arabie, dont on a fait très-anciennement des haras, qui les ont tant multipliés, que toute l'Aſie & l'Afrique en ſont pleines ; ils ſont ſi légers, que quelques-uns d'entre eux devancent les autruches à la courſe : les Arabes du deſert & les peuples de Lybie élèvent une grande quantité de ces chevaux pour la chaſſe, ils ne s'en ſervent ni pour voyager ni pour combattre, ils les font pâturer lorſqu'il y a de l'herbe ;

(z) Voyez l'Afrique de Marmol, *tome I, page 50.*

(a) Vide Leonis Afric. de Africæ deſcript. t. II, p. 750 & 751.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 258 sur 615

& lorſque l'herbe manque, ils ne les nourriſſent que de dattes & de lait de chameau, ce qui les rend nerveux, légers & maigres. Ils tendent des pièges aux chevaux ſauvages, ils en mangent la chair, & diſent que celle des jeunes eſt fort délicate : ces chevaux ſauvages ſont plus petits que les autres, ils ſont communément de couleur cendrée, quoiqu'il y en ait auſſi de blancs, & ils ont le crin & le poil de la queue fort court & hériſſé. D'autres voyageurs *(b)* nous ont donné ſur les chevaux Arabes des relations curieuſes, dont nous ne rapporterons ici que les principaux faits.

Il n'y a point d'Arabe, quelque miſérable qu'il ſoit, qui n'ait des chevaux ; ils montent ordinairement les jumens, l'expérience leur ayant appris qu'elles réſiſtent mieux que les chevaux à la fatigue, à la faim & à la ſoif ; elles ſont auſſi moins vicieuſes, plus douces & henniſſent moins fréquemment que les chevaux : ils les accoûtument ſi bien à être enſemble, qu'elles demeurent en grand nombre, quelquefois des jours entiers, abandonnées à elles-mêmes ſans ſe frapper les unes les autres, & ſans ſe faire aucun mal. Les Turcs au contraire n'aiment point les jumens, & les Arabes leur vendent les chevaux qu'ils ne veulent pas garder pour étalons ; ils conſervent avec grand ſoin, & depuis très-long-temps, les races de leurs chevaux, ils en

(b) Voyez le voyage de M. de la Roque, fait par ordre de Louis XIV. *Paris, 1714, page 194 & ſuiv.* & auſſi l'hiſtoire générale des Voyages. *Paris, 1746, tome II, page 626.*

connoiſſent les générations, les alliances & toute la généalogie, ils diſtinguent les races par des noms différens, & ils en font trois claſſes; la première eſt celle des chevaux nobles, de race pure & ancienne des deux côtés; la ſeconde eſt celle des chevaux de race ancienne, mais qui ſe ſont meſalliés, & la troiſième eſt celle des chevaux communs: ceux-ci ſe vendent à bas prix, mais ceux de la première claſſe, & même ceux de la ſeconde, parmi leſquels il s'en trouve d'auſſi bons que ceux de la première, ſont exceſſivement chers; ils ne font jamais couvrir les jumens de cette première claſſe noble, que par des étalons de la même qualité; ils connoiſſent par une longue expérience toutes les races de leurs chevaux & de ceux de leurs voiſins, ils en connoiſſent en particulier le nom, le ſurnom, le poil, les marques, &c. Quand ils n'ont pas des étalons nobles, ils en empruntent chez leurs voiſins, moyennant quelque argent, pour faire couvrir leurs jumens, ce qui ſe fait en préſence de témoins qui en donnent une atteſtation ſignée & ſcellée par-devant le ſecrétaire de l'Émir, ou quelque autre perſonne publique; & dans cette atteſtation, le nom du cheval & de la jument eſt cité, & toute leur génération expoſée; lorſque la jument a pouliné, on appelle encore des témoins, & l'on fait une autre atteſtation dans laquelle on fait la deſcription du poulain qui vient de naître, & on marque le jour de ſa naiſſance. Ces billets donnent le prix aux chevaux, & on les remet

à ceux qui les achettent. Les moindres jumens de cette première claſſe ſont de cinq cens écus, & il y en a beaucoup qui ſe vendent mille écus, & même quatre, cinq & ſix mille livres. Comme les Arabes n'ont qu'une tente pour maiſon, cette tente leur ſert auſſi d'écurie; la jument, le poulain, le mari, la femme & les enfans couchent tous pêle-mêle les uns avec les autres: on y voit les petits enfans ſur le corps, ſur le cou de la jument & du poulain, ſans que ces animaux les bleſſent ni les incommodent; on diroit qu'ils n'oſent ſe remuer, de peur de leur faire du mal: ces jumens ſont ſi accoûtumées à vivre dans cette familiarité, qu'elles ſouffrent toute ſorte de badinage. Les Arabes ne les battent point, ils les traitent doucement, ils parlent & raiſonnent avec elles, ils en prennent un très-grand ſoin, ils les laiſſent toûjours aller au pas, & ne les piquent jamais ſans néceſſité; mais auſſi dès qu'elles ſe ſentent chatouiller le flanc avec le coin de l'étrier, elles partent ſubitement & vont d'une viteſſe incroyable, elles ſautent les haies & les foſſés auſſi légèrement que des biches; & ſi leur cavalier vient à tomber, elles ſont ſi bien dreſſées, qu'elles s'arrêtent tout court, même dans le galop le plus rapide. Tous les chevaux des Arabes ſont d'une taille médiocre, fort dégagés & pluſtôt maigres que gras; ils les panſent ſoir & matin fort régulièrement & avec tant de ſoin, qu'ils ne leur laiſſent pas la moindre craſſe ſur la peau; ils leur lavent les jambes, le crin & la queue qu'ils laiſſent toute longue
&

& qu'ils peignent rarement pour ne pas rompre le poil; ils ne leur donnent rien à manger de tout le jour, ils leur donnent ſeulement à boire deux ou trois fois, & au coucher du ſoleil ils leur paſſent un ſac à la tête, dans lequel il y a environ un demi-boiſſeau d'orge bien net: ces chevaux ne mangent donc que pendant la nuit, & on ne leur ôte le ſac que le lendemain matin lorſqu'ils ont tout mangé; on les met au verd au mois de mars, quand l'herbe eſt aſſez grande; c'eſt dans cette même ſaiſon que l'on fait couvrir les jumens, & on a grand ſoin de leur jeter de l'eau froide ſur la croupe, immédiatement après qu'elles ont été couvertes: lorſque la ſaiſon du printemps eſt paſſée, on retire les chevaux du pâturage & on ne leur donne ni herbe ni foin de tout le reſte de l'année, ni même de paille que très-rarement, l'orge eſt leur unique nourriture. On ne manque pas de couper auſſi les crins aux poulains dès qu'ils ont un an ou dix-huit mois, afin qu'ils deviennent plus touffus & plus longs; on les monte dès l'âge de deux ans ou deux ans & demi tout au plus tard, on ne leur met la ſelle & la bride qu'à cet âge; & tous les jours, du matin juſqu'au ſoir, tous les chevaux des Arabes demeurent ſellés & bridés à la porte de la tente.

La race de ces chevaux s'eſt étendue en Barbarie, chez les Maures, & même chez les Nègres de la rivière de Gambie & du Sénégal, les ſeigneurs du pays en ont quelques-uns qui ſont d'une grande beauté; au lieu d'orge ou d'avoine on leur donne du maïs concaſſé ou

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 262 sur 615

réduit en farine qu'on mêle avec du lait lorſqu'on veut les engraiſſer, & dans ce climat ſi chaud on ne les laiſſe boire que rarement *(c)*. D'un autre côté les chevaux Arabes ont peuplé l'Égypte, la Turquie, & peut-être la Perſe, où il y avoit autrefois des haras très-conſidérables: Marc Paul *(d)* cite un haras de dix mille jumens blanches, & il dit que dans la province de Balaſcie il y avoit une grande quantité de chevaux grands & légers, avec la corne du pied ſi dure, qu'il étoit inutile de les ferrer.

Tous les chevaux du Levant ont, comme ceux de Perſe & d'Arabie, la corne fort dure, on les ferre cependant, mais avec des fers minces, légers, & qu'on peut clouer par-tout: en Turquie, en Perſe & en Arabie on a auſſi les mêmes uſages pour les ſoigner, les nourrir, & leur faire de la litière de leur fumier, qu'on fait auparavant ſécher au ſoleil pour en ôter l'odeur, & enſuite on le réduit en poudre & on en fait une couche dans l'écurie ou dans la tente, d'environ quatre ou cinq pouces d'épaiſſeur: cette litière ſert fort long-temps, car quand elle eſt infectée de nouveau, on la relève pour la faire ſecher au ſoleil une ſeconde fois, & cela lui fait perdre entièrement ſa mauvaiſe odeur.

Il y a en Turquie des chevaux Arabes, des chevaux

(c) Voyez l'hiſt. générale des voyages, *tome III, page 297.*

(d) Voy. la deſcript. géogr. de l'Inde, par Marc Paul, Vénitien. *Paris, 1566, tome I, page 41; & liv. I, page 21.*

Tartares, des chevaux Hongrois & des chevaux de race du pays; ceux-ci ſont beaux & très-fins *(e)*, ils ont beaucoup de feu, de vîteſſe, & même d'agrément, mais ils ſont trop délicats, ils ne peuvent ſupporter la fatigue, ils mangent peu, ils s'échauffent aiſément, & ont la peau ſi ſenſible, qu'ils ne peuvent ſupporter le frottement de l'étrille; on ſe contente de les frotter avec l'épouſſette & de les laver : ces chevaux, quoique beaux, ſont, comme l'on voit, fort au deſſous des Arabes, ils ſont même au deſſous des chevaux de Perſe, qui ſont, après les Arabes *(f)*, les plus beaux & les meilleurs chevaux de l'Orient; les pâturages des plaines de Médie, de Perſépolis, d'Ardebil, de Derbent ſont admirables, & on y élève, par les ordres du Gouvernement, une prodigieuſe quantité de chevaux, dont la pluſpart ſont très-beaux, & preſque tous excellens: Pietro della Valle *(g)* préfère les chevaux communs de Perſe aux chevaux d'Italie, & même, dit-il, aux plus excellens chevaux du royaume de Naples; communément ils ſont de taille médiocre *(h)*, il y en a

(e) Voyez le voyage de M. Dumont. *La Haie, 1699, tome III, page 253 & ſuivantes.*

(f) Voy. les voyages de Thévenot. *Paris, 1664, t. II, p. 220;* de Chardin. *Amſt. 1711, t. II, p. 25 & ſuiv.* d'Adam Olearius. *Paris, 1656, t. I, p. 560 & ſuiv.*

(g) Voy. les voyages de Pietro della Valle. *Rouen, 1745, in-12, tome V, page 284 & ſuivantes.*

(h) Voy. les voyages de Tavernier. *Rouen, 1713, tome II, pages 19 & 20.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 264 sur 615

même de fort petits *(i)*, qui n'en ſont pas moins bons ni moins forts, mais il s'en trouve auſſi beaucoup de bonne taille & plus grands que les chevaux de ſelle Anglois *(k)*. Ils ont tous la tête légère, l'encolure fine, le poitrail étroit; les oreilles bien faites & bien placées, les jambes menues, la croupe belle, & la corne dure; ils ſont dociles, vifs, légers, hardis, courageux, & capables de ſupporter une grande fatigue; ils courent d'une très-grande vîteſſe, ſans jamais s'abattre ni s'affaiſſer; ils ſont robuſtes & très-aiſés à nourrir, on ne leur donne que de l'orge mêlée avec de la paille hachée menu, dans un ſac qu'on leur paſſe à la tête, & on ne les met au verd que pendant ſix ſemaines au printemps; on leur laiſſe la queue longue, on ne ſait ce que c'eſt que de les faire hongres; on leur donne des couvertures pour les défendre des injures de l'air, on les ſoigne avec une attention particulière, on les conduit avec un ſimple bridon & ſans éperon, & on en tranſporte une très-grande quantité en Turquie, & ſur-tout aux Indes; ces voyageurs, qui font tous l'éloge des chevaux de Perſe, s'accordent cependant à dire que les chevaux Arabes ſont encore ſupérieurs pour l'agilité, le courage & la force, & même la beauté, & qu'ils ſont beaucoup plus recherchés, en Perſe même, que les plus beaux chevaux du pays.

Les chevaux qui naiſſent aux Indes ne ſont pas

(i) Voyez les voyages de Thévenot, *tome II, page 220.*

(k) Voy. les voyages de Chardin, *tome II, page 25 & ſuivantes.*

bons *(l)*, ceux dont ſe ſervent les Grands du pays y ſont tranſportés de Perſe & d'Arabie; on leur donne un peu de foin le jour, & le ſoir on leur fait cuire des pois avec du ſucre & du beurre au lieu d'avoine ou d'orge; cette nourriture les ſoûtient & leur donne un peu de force, ſans cela ils dépériroient en très-peu de temps, le climat leur étant contraire. Les chevaux naturels du pays ſont en général fort petits, il y en a même de ſi petits, que Tavernier rapporte que le jeune prince du Mogol, âgé de ſept ou huit ans, montoit ordinairement un petit cheval très-bien fait, dont la taille n'excédoit pas celle d'un grand lévrier *(m)*. Il ſemble que les climats exceſſivement chauds ſoient contraires aux chevaux; ceux de la côte d'Or, de celle de Juida, de Guinée, &c. ſont, comme ceux des Indes, fort mauvais; ils portent la tête & le cou fort bas, leur marche eſt ſi chancelante, qu'on les croit toûjours prêts à tomber, ils ne ſe remueroient pas ſi on ne les frappoit continuellement, & la pluſpart ſont ſi bas que les pieds de ceux qui les montent touchent preſque à terre *(n)*; ils ſont de plus fort indociles, & propres ſeulement à ſervir de nourriture aux Nègres, qui en aiment la chair autant que celle des chiens *(o)*: ce goût pour la chair

(l) Voyez le voyage de la Boullaye-le-Gouz. *Paris, 1657, page 256*; & le recueil des voyages qui ont ſervi à l'établiſſement de la Compagnie des Indes. *Amſt. 1702, tome IV, page 424.*

(m) Voy. les voyages de Tavernier, *tome III, page 334.*

(n) Voy. hiſt. générale des voyages, *tome IV, page 228.*

(o) Idem, *tome IV, page 353.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 266 sur 615

du cheval eſt donc commun aux Nègres & aux Arabes, il ſe retrouve en Tartarie, & même à la Chine *(p)*. Les chevaux Chinois ne valent pas mieux que ceux des Indes *(q)*, ils ſont foibles, lâches, mal faits, & fort petits : ceux de la Corée n'ont que trois pieds de hauteur: à la Chine preſque tous les chevaux ſont hongres, & ils ſont ſi timides, qu'on ne peut s'en ſervir à la guerre; auſſi peut-on dire que ce ſont les chevaux Tartares qui ont fait la conquête de la Chine : ces chevaux ſont très-propres pour la guerre, quoique communément ils ne ſoient que de taille médiocre, ils ſont forts, vigoureux, fiers, ardens, légers & grands coureurs; ils ont la corne du pied fort dure, mais trop étroite, la tête fort légère, mais trop petite; l'encolure longue & roide, les jambes trop hautes ; avec tous ces défauts ils peuvent paſſer pour de très-bons chevaux, ils ſont infatigables & courent d'une viteſſe extrême. Les Tartares vivent avec leurs chevaux à peu près comme les Arabes, ils les font monter dès l'âge de ſept ou huit mois par de jeunes enfans qui les promènent & les font courir à petites repriſes; ils les dreſſent ainſi peu à peu, & leur font ſouffrir de grandes diètes, mais ils ne les montent pour aller en courſe que quand ils

(p) Voyez le voyage de M. le Gentil. *Paris, 1725, tome II, page 24.*

(q) Voy. les anciennes relations des Indes & de la Chine, traduites de l'Arabe. *Paris, 1718, page 204;* l'hiſtoire générale des voyages, *tome VI, pages 492 & 535 ;* l'hiſt. de la conquête de la Chine, par Palafox. *Paris, 1670, page 426.*

ont ſix ou ſept ans, & ils leur font ſupporter alors des fatigues incroyables *(r)*, comme de marcher deux ou trois jours ſans s'arrêter, d'en paſſer quatre ou cinq ſans autre nourriture qu'une poignée d'herbe de huit heures en huit heures, & d'être en même temps vingt-quatre heures ſans boire, &c. ces chevaux qui paroiſſent, & qui ſont en effet ſi robuſtes dans leur pays, dépériſſent dès qu'on les tranſporte à la Chine & aux Indes, mais ils réuſſiſſent aſſez en Perſe & en Turquie. Les petits Tartares ont auſſi une race de petits chevaux dont ils font tant de cas, qu'ils ne ſe permettent jamais de les vendre à des étrangers: ces chevaux ont toutes les bonnes & mauvaiſes qualités de ceux de la grande Tartarie, ce qui prouve combien les mêmes mœurs & la même éducation donnent le même naturel & la même habitude à ces animaux. Il y a auſſi en Circaſſie & en Mingrélie beaucoup de chevaux qui ſont même plus beaux que les chevaux Tartares; on trouve encore d'aſſez beaux chevaux en Ukraine, en Valachie, en Pologne & en Suède, mais nous n'avons pas d'obſervations particulières de leurs qualités & de leurs défauts.

Maintenant, ſi l'on conſulte les anciens ſur la nature & les qualités des chevaux des différens pays, on trouvera *(ſſ)* que les chevaux de Grèce, & ſur-tout ceux de

(r) Voy. Palafox, *pag. 427;* le recueil des voyag. du Nord. *Rouen, 1716, tome III, page 156;* Tavernier, *tome I, page 472 & ſuiv.* hiſt. gén. des voyag. *tome VI, page 603, & tome VII, page 214.*

(ſſ) Voy. Aldrovand. Hiſt. Nat. de ſoliped. *page 48 — 63.*

la Theſſalie & de l'Épire, avoient de la réputation, & étoient très-bons pour la guerre; que ceux de l'Achaïe étoient les plus grands que l'on connût: que les plus beaux de tous étoient ceux d'Égypte où il y en avoit une très-grande quantité, & où Salomon envoyoit en acheter à un très-grand prix: qu'en Éthiopie, les chevaux réuſſiſſoient mal à cauſe de la trop grande chaleur du climat; que l'Arabie & l'Afrique fourniſſoient les chevaux les mieux faits, & ſur-tout les plus légers & les plus propres à la monture & à la courſe; que ceux d'Italie, & ſur-tout de la Pouille, étoient auſſi très-bons; qu'en Sicile, Cappadoce, Syrie, Arménie, Médie & Perſe, il y avoit d'excellens chevaux, & recommandables par leur vîteſſe & leur légèreté; que ceux de Sardaigne & de Corſe étoient petits, mais vifs & courageux; que ceux d'Eſpagne reſſembloient à ceux des Parthes, & étoient excellens pour la guerre; qu'il y avoit auſſi en Tranſilvanie & en Valachie des chevaux à tête légère, à grands crins pendans juſqu'à terre, & à queue touffue, qui étoient très-prompts à la courſe; que les chevaux Danois étoient bien faits & bons ſauteurs; que ceux de Scandinavie étoient petits, mais bien moulés & fort agiles; que les chevaux de Flandre étoient forts; que les Gaulois fourniſſoient aux Romains de bons chevaux pour la monture & pour porter des fardeaux; que les chevaux des Germains étoient mal faits & ſi mauvais, qu'ils ne s'en ſervoient pas; que les Suiſſes en avoient beaucoup & de très-bons pour la guerre;

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 269 sur 615

guerre; que les chevaux de Hongrie étoient auſſi fort bons; & enfin, que les chevaux des Indes étoient fort petits & très-foibles.

Il réſulte de tous ces faits, que les chevaux Arabes ont été de tous temps & ſont encore les premiers chevaux du monde, tant pour la beauté que pour la bonté; que c'eſt d'eux que l'on tire, ſoit immédiatement, ſoit médiatement par le moyen des Barbes, les plus beaux chevaux qui ſoient en Europe, en Afrique & en Aſie; que le climat de l'Arabie eſt peut-être le vrai climat des chevaux, & le meilleur de tous les climats, puiſqu'au lieu d'y croiſer les races par des races étrangères, on a grand ſoin de les conſerver dans toute leur pureté; que ſi ce climat n'eſt pas par lui-même le meilleur climat pour les chevaux, les Arabes l'ont rendu tel par les ſoins particuliers qu'ils ont pris de tous les temps, d'anoblir les races, en ne mettant enſemble que les individus les mieux faits & de la première qualité; que par cette attention ſuivie pendant des ſiècles, ils ont pû perfectionner l'eſpèce au-delà de ce que la Nature auroit fait dans le meilleur climat, on peut encore en conclurre que les climats plus chauds que froids, & ſur-tout les pays ſecs, ſont ceux qui conviennent le mieux à la nature de ces animaux; qu'en général les petits chevaux ſont meilleurs que les grands; que le ſoin leur eſt auſſi néceſſaire à tous que la nourriture; qu'avec de la familiarité & des careſſes on en tire beaucoup plus que par la force & les châtimens; que

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 270 sur 615

les chevaux des pays chauds ont les os, la corne, les muſcles plus durs que ceux de nos climats; que quoique la chaleur convienne mieux que le froid à ces animaux, cependant le chaud exceſſif ne leur convient pas; que le grand froid leur eſt contraire; qu'enfin leur habitude & leur naturel dépendent preſque en entier du climat, de la nourriture, des ſoins & de l'éducation.

En Perſe, en Arabie & dans pluſieurs autres lieux de l'Orient, on n'eſt pas dans l'uſage de hongrer les chevaux, comme on le fait ſi généralement en Europe & à la Chine; cette opération leur ôte beaucoup de force, de courage, de fierté, &c. mais leur donne de la douceur, de la tranquillité, de la docilité; pour la faire, on leur attache les jambes avec des cordes, on les renverſe ſur le dos, on ouvre les bourſes avec un biſtouri, on en tire les teſticules, on coupe les vaiſſeaux qui y aboutiſſent & les ligamens qui les ſoûtiennent, & après les avoir enlevés on referme la plaie, & on a ſoin de faire baigner le cheval deux fois par jour pendant quinze jours, ou de l'étuver ſouvent avec de l'eau fraîche, & de le nourrir pendant ce temps avec du ſon détrempé dans beaucoup d'eau, afin de le rafraîchir : cette opération ſe doit faire au printemps ou en automne, le grand chaud & le grand froid y étant également contraires. A l'égard de l'âge auquel on doit la faire, il y a des uſages différens : dans certaines provinces on hongre les chevaux dès l'âge d'un an ou dix-huit mois, auſſi-tôt que les teſticules ſont bien apparens au dehors; mais l'uſage

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 271 sur 615

le plus général & le mieux fondé eſt de ne les hongrer qu'à deux & même à trois ans, parce qu'en les hongrant tard ils conſervent un peu plus des qualités attachées au ſexe maſculin. Pline *(t)* dit que les dents de lait ne tombent point à un cheval qu'on fait hongre avant qu'elles ſoient tombées : j'ai été à portée de vérifier ce fait, & il ne s'eſt pas trouvé vrai; les dents de lait tombent également aux jeunes chevaux hongres & aux jeunes chevaux entiers, & il eſt probable que les anciens n'ont haſardé ce fait que parce qu'ils l'ont cru fondé ſur l'analogie de la chûte des cornes du cerf, du chevreuil, &c. qui en effet ne tombent point lorſque l'animal a été coupé. Au reſte, un cheval hongre n'a plus la puiſſance d'engendrer, mais il peut encore s'accoupler, & l'on en a vû des exemples.

Les chevaux, de quelque poil qu'ils ſoient, muent comme preſque tous les autres animaux couverts de poil, & cette mue ſe fait une fois l'an, ordinairement au printemps, & quelquefois en automne; ils ſont alors plus foibles que dans les autres temps, il faut les ménager, les ſoigner davantage, & les nourrir un peu plus largement. Il y a auſſi des chevaux qui muent de corne, cela arrive ſur-tout à ceux qui ont été élevés dans des pays humides & marécageux, comme en Hollande.

Les chevaux hongres & les jumens henniſſent moins fréquemment que les chevaux entiers, ils ont auſſi la

(t) Voy. Plin. Hiſt. Nat. *in-8.° Paris, 1685, tome II, liv. II, parag. LXXIV, page 558.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 272 sur 615

voix moins pleine & moins grave : on peut diſtinguer dans tous cinq *(u)* ſortes de henniſſemens différens, relatifs à différentes paſſions ; le henniſſement d'allégreſſe dans lequel la voix ſe fait entendre aſſez longuement, monte & finit à des ſons plus aigus, le cheval rue en même temps, mais légèrement & ne cherche point à frapper ; le henniſſement du deſir, ſoit d'amour, ſoit d'attachement, dans lequel le cheval ne rue point, & la voix ſe fait entendre longuement & finit par des ſons plus graves ; le henniſſement de la colère, pendant lequel le cheval rue & frappe dangereuſement, eſt très-court & aigu ; celui de la crainte, pendant lequel il rue auſſi n'eſt guère plus long que celui de la colère, la voix eſt grave, rauque, & ſemble ſortir en entier des naſeaux, ce henniſſement eſt aſſez ſemblable au rugiſſement d'un lion ; celui de la douleur eſt moins un henniſſement qu'un gémiſſement ou ronflement d'oppreſſion qui ſe fait à voix grave, & ſuit les alternatives de la reſpiration. Au reſte, on a remarqué que les chevaux qui henniſſent le plus ſouvent, ſur-tout d'allégreſſe & de deſir, ſont les meilleurs & les plus généreux : les chevaux entiers ont auſſi la voix plus forte que les hongres & les jumens ; dès la naiſſance le mâle a la voix plus forte que la femelle ; à deux ans ou deux ans & demi, c'eſt-à-dire, à l'age de puberté, la voix des mâles & des femelles devient plus forte & plus grave, comme dans l'homme & dans la pluſpart des autres animaux. Lorſque

(u) Vide Cardan. de rerum varietate, lib. VII, cap. 32.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 273 sur 615

le cheval eſt paſſionné d'amour, de deſir, d'appétit, il montre les dents & ſemble rire, il les montre auſſi dans la colère lorſqu'il veut mordre; il tire quelquefois la langue pour lécher, mais moins fréquemment que le bœuf, qui lèche beaucoup plus que le cheval & qui cependant eſt moins ſenſible aux careſſes: le cheval ſe ſouvient auſſi beaucoup plus long-temps des mauvais traitemens, & il ſe rebute bien plus aiſément que le bœuf; ſon naturel ardent & courageux lui fait donner d'abord tout ce qu'il poſsède de forces, & lorſqu'il ſent qu'on exige encore davantage, il s'indigne & refuſe, au lieu que le bœuf, qui de ſa nature eſt lent & pareſſeux, s'excède & ſe rebute moins aiſément.

Le cheval dort beaucoup moins que l'homme; lorſqu'il ſe porte bien il ne demeure guère que deux ou trois heures de ſuite couché, il ſe relève enſuite pour manger, & lorſqu'il a été trop fatigué il ſe couche une ſeconde fois après avoir mangé, mais en tout il ne dort guère que trois ou quatre heures en vingt-quatre; il y a même des chevaux qui ne ſe couchent jamais & qui dorment toûjours debout, ceux qui ſe couchent dorment auſſi quelquefois ſur leurs pieds: on a remarqué que les hongres dorment plus ſouvent & plus long-temps que les chevaux entiers.

Les quadrupèdes ne boivent pas tous de la même manière, quoique tous ſoient également obligés d'aller chercher avec la tête la liqueur qu'ils ne peuvent ſaiſir autrement, à l'exception du ſinge, du maki & de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 274 sur 615

quelques autres qui ont des mains, & qui par conſéquent peuvent boire comme l'homme, lorſqu'on leur donne un vaſe qu'ils peuvent tenir, car ils le portent à leur bouche, l'inclinent, verſent la liqueur, & l'avalent par le ſimple mouvement de la déglutition; l'homme boit ordinairement de cette manière, parce que c'eſt en effet la plus commode; mais il peut encore boire de pluſieurs autres façons, en approchant les lèvres & les contractant pour aſpirer la liqueur, ou bien en y enfonçant le nez & la bouche aſſez profondément pour que la langue en ſoit environnée & n'ait d'autres mouvemens à faire que celui qui eſt néceſſaire pour la déglutition, ou encore en mordant, pour ainſi dire, la liqueur avec les lèvres, ou enfin, quoique plus difficilement, en tirant la langue, l'élargiſſant & faiſant une eſpèce de petit godet qui rapporte un peu d'eau dans la bouche : la pluſpart des quadrupèdes pourroient auſſi chacun boire de pluſieurs manières, mais ils font comme nous, ils choiſiſſent celle qui leur eſt la plus commode & la ſuivent conſtamment. Le chien, dont la gueule eſt fort ouverte & la langue longue & mince, boit en lapant, c'eſt-à-dire, en léchant la liqueur, & formant avec ſa langue un godet qui ſe remplit à chaque fois & rapporte une aſſez grande quantité de liqueur : il préfère cette façon à celle de ſe mouiller le nez: le cheval au contraire, qui a la bouche plus petite & la langue trop épaiſſe & trop courte pour former un grand godet, & qui d'ailleurs boit encore plus avidement qu'il ne mange, enfonce la bouche &

le nez bruſquement & profondément dans l'eau, qu'il avale abondamment par le ſimple mouvement de la déglutition; mais cela même le force à boire tout d'une haleine, au lieu que le chien reſpire à ſon aiſe pendant qu'il boit; auſſi doit-on laiſſer aux chevaux la liberté de boire à pluſieurs repriſes, ſur-tout après une courſe, lorſque le mouvement de la reſpiration eſt court & preſſé; on ne doit pas non plus leur laiſſer boire de l'eau trop froide, parce qu'indépendamment des coliques que l'eau froide cauſe ſouvent, il leur arrive auſſi, par la néceſſité où ils ſont d'y tremper les naſeaux, qu'ils ſe refroidiſſent le nez, s'enrhument, & prennent peut-être les germes de cette maladie à laquelle on a donné le nom de *morve*, la plus formidable de toutes pour cette eſpèce d'animaux; car on ſait depuis peu que le ſiége de la morve eſt dans la membrane pituitaire *(x)*; que c'eſt par conſéquent un vrai rhume, qui à la longue cauſe une inflammation dans cette membrane, & d'autre côté les voyageurs qui rapportent dans un aſſez grand détail les maladies des chevaux dans les pays chauds, comme l'Arabie, la Perſe, la Barbarie, ne diſent pas que la morve y ſoit auſſi fréquente que dans les climats froids; ainſi je crois être fondé à conjecturer que l'une des cauſes de cette maladie eſt la froideur de l'eau, parce que ces animaux ſont obligés

(x) M. de la Foſſe, maréchal du Roi, a le premier démontré que le ſiége de la morve eſt dans la membrane pituitaire, & il a eſſayé de guérir des chevaux en les trépanant.

d'y enfoncer & d'y tenir le nez & les naſeaux pendant un temps conſidérable, ce que l'on préviendroit en ne leur donnant jamais d'eau froide, & en leur eſſuyant toûjours les naſeaux après qu'ils ont bû. Les ânes, qui craignent le froid beaucoup plus que les chevaux, & qui leur reſſemblent ſi fort par la ſtructure intérieure, ne ſont cependant pas ſi ſujets à la morve, ce qui ne vient peut-être que de ce qu'ils boivent différemment des chevaux; car au lieu d'enfoncer profondément la bouche & le nez dans l'eau, ils ne font preſque que l'atteindre des lèvres.

Je ne parlerai pas des autres maladies des chevaux, ce ſeroit trop étendre l'Hiſtoire Naturelle que de joindre à l'hiſtoire d'un animal celle de ſes maladies; cependant je ne puis terminer l'hiſtoire du cheval, ſans marquer quelques regrets de ce que la ſanté de cet animal utile & précieux a été juſqu'à préſent abandonnée aux ſoins & à la pratique, ſouvent aveugles, de gens ſans connoiſſance & ſans lettres. La Médecine que les anciens ont appelée *Médecine Vétérinaire*, n'eſt preſque connue que de nom : je ſuis perſuadé que ſi quelque Médecin tournoit ſes vûes de ce côté-là, & faiſoit de cette étude ſon principal objet il en ſeroit bien-tôt dédommagé par d'amples ſuccès; que non ſeulement il s'enrichiroit, mais même qu'au lieu de ſe dégrader il s'illuſtreroit beaucoup, & cette Médecine ne ſeroit pas ſi conjecturale & ſi difficile que l'autre; la nourriture, les mœurs, l'influence du ſentiment, toutes

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 277 sur 615

toutes les cauſes, en un mot, étant plus ſimples dans l'animal que dans l'homme, les maladies doivent auſſi être moins compliquées, & par conſéquent plus faciles à juger & à traiter avec ſuccès; ſans compter la liberté qu'on auroit toute entière de faire des expériences, de tenter de nouveaux remèdes, & de pouvoir arriver ſans crainte & ſans reproches à une grande étendue de connoiſſances en ce genre, dont on pourroit même par analogie tirer des inductions utiles à l'art de guérir les hommes.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 278 sur 615

DESCRIPTION
DU CHEVAL.

DE tous les animaux que nous avons à décrire, le Cheval eſt le mieux connu, ſoit pour les parties extérieures de ſon corps, ſoit pour celles de l'intérieur; il reçoit auſſi de l'homme la plus belle éducation, tous ſes mouvemens, toutes ſes allures ſont dirigés par un art qui a ſes principes. C'eſt au manège qu'il faut voir tout ce que l'on fait apprendre aux chevaux à force d'habitude, tout ce qu'on leur fait faire à l'aide du mors & de l'éperon, &c. cet art, qui n'eſt pas dédaigné par les Princes & par les Rois, met le cheval dans une carrière glorieuſe : c'eſt-là que l'on donne de la nobleſſe à ſon port, & de l'agrément à ſon maintien, on met à l'épreuve toutes ſes forces & toute ſa légèreté; on le livre à ſa plus grande vîteſſe, on augmente ſon ardeur, on anime ſon courage, enfin on éprouve ſa conſtance, on cultive ſa docilité, & on emploie toutes les reſſources de ſon inſtinct. La ſcience dont l'objet eſt d'affermir ou de rétablir la ſanté, d'éloigner la mort & de conſerver la vie de l'homme, la Médecine, n'exclud point le cheval dans la recherche de ſes connoiſſances & dans l'adminiſtration de ſes remèdes, auſſi s'eſt-il formé un art dans lequel on ſe propoſe de prévenir les maladies des chevaux, de les reconnoître, de les juger & de les guérir, & de déterminer les opérations que l'on doit faire ſur les différentes parties du cheval lorſqu'elles ſont affligées *; ce même art s'étend à tous les beſoins des chevaux, ceux qui l'exercent ſe dévouent à leur ſervice; enfin ces animaux

* *Medicina veterinaria.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 279 sur 615

trouvent dans les haras des ſoins particuliers & continuels pour la conſervation & la propagation de leur eſpèce ; & même ces ſoins influent ſur eux avant qu'ils exiſtent, car on contribue à la perfection de leur être par le choix du mâle & de la femelle qui doivent les engendrer ; en combinant les qualités de l'étalon & de la jument on a ſû prévoir le réſultat de leur mélange, & perpétuer la force & la beauté des chevaux, & la fineſſe de leur inſtinct.

En faiſant tant de recherches & d'obſervations ſur les chevaux, on a formé, pour ainſi dire, un langage particulier, dont les termes ſont affectés aux arts qui concernent ces animaux ; ainſi on ne pourroit pas décrire le cheval d'une manière ſatisfaiſante, ſi on ne commençoit par donner l'intelligence de ces termes, en expliquant les dénominations des différentes parties de ſon corps, & en énonçant leurs perfections ou leurs défauts, avant que de faire la deſcription de cet animal, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Cette explication préliminaire eſt d'autant plus néceſſaire, que la pluſpart de ces termes ſerviront à la deſcription de pluſieurs autres animaux ; car on verra dans la ſuite, qu'en les conſidérant tous par rapport à leurs différences ou à leurs reſſemblances avec le corps humain, il ſe trouve que le cheval & les autres ſolipèdes ſont ceux qui en diffèrent le plus, comme le ſinge & les autres animaux à cinq doigts ſont ceux qui y reſſemblent le plus. Le cheval & le ſinge ſeront donc les deux extrêmes dans la comparaiſon que nous ferons des animaux ; auſſi nous commençons par l'hiſtoire naturelle du cheval, & nous finirons par celle du ſinge, nous comparerons chaque animal au cheval ou au ſinge, ſelon qu'ils reſſembleront plus à l'un ou à l'autre, & nous emploierons dans le premier cas les termes uſités pour le cheval, & dans le ſecond ceux qui ſont

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 280 sur 615

en uſage pour le corps humain, puiſque le ſinge eſt de tous les animaux celui dont le corps diffère le moins du corps de l'homme.

En expliquant les termes d'art qui ont rapport aux différentes parties extérieures du cheval, nous commencerons par celles de la tête, & nous ſuivrons l'ordre le plus naturel, qui eſt de rapporter les parties du corps avant de paſſer à celles des extrémités, quoique la pluſpart des auteurs qui ont écrit ſur cette matière aient fait mention des extrémités antérieures avant qu'il fût queſtion du corps.

On appelle *larmiers* les deux parties *(A, pl. 1)* de la tête du cheval, qui correſpondent aux temples de la tête de l'homme.

Les ſalières *(B)* ſe trouvent entre l'œil & l'oreille, au deſſus des ſourcils, une de chaque côté.

On ne diſtingue dans certains cas que deux parties dans l'œil, qui ſont la vitre & le fond de l'œil; la vitre eſt la partie extérieure de l'œil, c'eſt-à-dire, la cornée; le fond de l'œil ſignifie les parties intérieures, c'eſt-à-dire, les parties que l'on aperçoit en regardant à travers la vitre par l'ouverture de la prunelle: on a auſſi déſigné le fond de l'œil par le mot de prunelle; mais comment ce mot peut-il ſignifier le fond de l'œil, puiſque la prunelle ou pupille n'eſt qu'une ouverture de l'uvée, qui communique dans l'intérieur de l'œil?

On donne le nom d'*avives* aux glandes parotides *(C)*, qui ſont ſituées entre l'oreille & le coin de la ganache.

Le chanfrein *(D)* eſt le devant de la tête, depuis les yeux juſqu'aux naſeaux; cette partie correſpond à la partie ſupérieure du nez de l'homme: mais le mot de chanfrein ne ſignifie, le plus ſouvent, qu'une bande de couleur blanche qui s'étend ſur cette même partie, & occupe plus ou moins d'eſpace entre les

yeux & les naſeaux, comme nous le dirons dans la ſuite.

Le cartilage *(E)*, qui forme le tour des naſeaux, & qui les borde en haut & en devant, eſt appelé la *ſouris*.

Le bout du nez du cheval eſt la cloiſon *(F)* qui ſépare les deux naſeaux, cette partie eſt formée par le bas du chanfrein, elle ſe termine à la lèvre ſupérieure; cependant Solleyſel * donne le nom de nez à la partie de cette lèvre qui eſt au deſſous des naſeaux.

La mâchoire inférieure des chevaux eſt appelée *ganache* ou *ganaſſe*; les deux os de la ganache s'étendent des deux côtés de la tête, depuis l'œil juſqu'à l'endroit *(G)* près du goſier, & depuis le goſier juſqu'au menton *(H)*.

La *barbe* ou le *barbouchet* eſt l'endroit *(I)* où les deux os de la ganache ſe réuniſſent au deſſus du menton & au dehors de la mâchoire inférieure.

On appelle *canal*, *braie* ou *auget*, la cavité qui eſt formée par les deux os de la ganache, & qui s'étend en forme de gouttière depuis le goſier juſqu'à la barbe; on nomme auſſi du même nom de *canal*, la cavité dans laquelle la langue eſt logée.

On a donné différens noms aux ſix dents inciſives que le cheval a dans chaque mâchoire; on nomme *pinces* les deux dents du devant, celles qui touchent aux pinces ſont appelées *mitoyennes*, & les dernières de chaque côté ſont nommées les *coins*.

Les deux dents canines qui ſont dans chaque mâchoire, une de chaque côté, à quelque diſtance des inciſives, portent le nom de *crocs*, *crochets* ou *écaillons*.

On nomme *barres* les eſpaces des deux mâchoires qui ſont vuides, entre les dents inciſives & les mâchelières.

* Le véritable & parfait Maréchal. *Paris*, *1672*, *page 3*.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 282 sur 615

Les inegalités ou les rides qui traverſent le palais du cheval, ſont appelées *crans* ou *ſillons*.

Le cou du cheval eſt déſigné par le mot d'*encolure*, ainſi l'encolure eſt bordée d'un bout à l'autre, en deſſus par la crinière & en deſſous par le goſier *(K)*.

La partie *(L)* de la crinière qui ſe trouve au deſſus de la tête entre les deux oreilles & qui tombe ſur le front, eſt nommée le *toupet*.

Le goſier s'étend d'un bout à l'autre de l'encolure en deſſous, depuis les os de la ganache *(G)* juſqu'au poitrail.

L'endroit *(M)* où les deux épaules s'approchent par le haut entre l'encolure & le dos, eſt nommé *garrot*, c'eſt à cet endroit que finiſſent la crinière & l'encolure.

Les épaules *(N)* s'étendent depuis le garrot juſqu'au haut du bras *(O)*, c'eſt-à-dire juſqu'à la partie ſupérieure de la jambe de devant, comme on le verra dans la ſuite.

Il y a des chevaux Turcs, Barbes & Eſpagnols qui ont au cou ou à l'épaule, ou à la jonction du cou & de l'épaule, tantôt plus haut, tantôt plus bas, un creux aſſez profond que l'on appelle le *coup de lance*, parce qu'on a prétendu que cette marque venoit originairement d'un étalon Turc ou Barbe, qui avoit reçû un coup de lance dans l'endroit où elle ſe trouve, & que cette même marque avoit paſſé à tous les chevaux qui étoient venus de cet étalon, par une ſuite de générations qui dure encore. On dit auſſi que le coup de lance traverſa de devant en arrière, parce que la marque dont il eſt queſtion ſe trouve devant l'épaule au défaut de l'encolure, & par derrière au défaut de l'épaule, comme une cavité qu'une grande plaie auroit formée; mais il n'y a aucune apparence de cicatrice. L'hiſtoire du coup de lance paſſe pour une fable, & je crois que c'eſt avec raiſon,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 283 sur 615

quoiqu'au fond il ne ſoit peut-être pas impoſſible qu'un étalon tranſmette aux chevaux qu'il engendre, les marques qu'il auroit, de quelque eſpèce qu'elles fuſſent; mais il n'eſt pas probable que ces marques ſe perpétuaſſent dans pluſieurs générations: il eſt plus vrai-ſemblable que le prétendu coup de lance ſoit l'effet d'une conformation particulière à certains chevaux, qui forme une cavité à peu près pareille à celle des ſalières qui ſont fort creuſes dans un très-grand nombre de chevaux: au reſte, je n'en ai jamais vû qui euſſent le coup de lance, & pour ſavoir ce que c'eſt, il faudroit au moins en avoir diſſéqué.

On donne le nom de *poitrail* à la partie *(P)* qui eſt au devant de la poitrine & au deſſous du goſier, à l'endroit où les épaules ſe terminent par devant.

Le dos du cheval *(Q)* eſt déſigné communément par le nom de *reins:* il commence au garrot, & s'étend le long de l'épine juſqu'à la croupe & juſqu'aux reins proprement dits, que l'on déſigne auſſi par le nom de *rognons.* Lorſque les chevaux ſont en embonpoint, & qu'ils ont l'épine du dos large, elle eſt enfoncée, & les muſcles qui s'élèvent de chaque côté forment une ſorte de canal tout le long du dos, c'eſt ce qu'on appelle avoir les *reins doubles:* ce canal s'étend ſur la croupe juſqu'à la queue.

On a donné le nom de *nombril* à l'endroit *(R)* qui eſt entre le dos & les reins.

Les vrais reins ou rognons *(S)*, à prendre cette dénomination dans la ſignification qu'elle a pour le corps de l'homme, commencent à l'endroit où finiſſent les côtes, & ſont terminés par la croupe; mais dans l'uſage ordinaire on donne le nom de *reins* à la colonne vertébrale du cheval dans toute ſon étendue.

Les côtés *(T)* ſont formés par les côtes, & ſe trouvent à droite & à gauche au deſſous du dos.

La capacité qui eſt formée par le contour des côtes, eſt appelée particulièrement le *coffre*. On donne auſſi le nom de *ventre* à la partie inférieure du corps qui eſt à l'endroit du ſternum *(V)*, & des parties inférieures des côtes ; dans ce ſens le ventre du cheval correſpond à la partie antérieure de la poitrine de l'homme.

Les flancs *(X)* ſont à l'extrémité du ventre, au défaut des côtes & au deſſous des rognons, ils s'étendent juſqu'aux os des hanches.

La hanche *(Y)* eſt formée, comme dans l'homme, par l'os de la hanche ; cet os termine le haut du flanc dans le cheval, & ſe trouve à côté de la croupe.

La croupe *(Z)* eſt ronde, & s'étend depuis les rognons juſqu'à la queue.

On diſtingue deux parties dans la queue, ce ſont les crins & le tronc, c'eſt-à-dire, la queue dépouillée de ſes crins.

Les feſſes du cheval *(a)* ſont placées au deſſous de la croupe & de l'origine de la queue, & elles s'étendent juſqu'à l'endroit où les jambes de derrière joignent le corps.

Pour expliquer les noms que l'on a donnés aux différentes parties des jambes de devant, il faut revenir à l'épaule ; elle comprend dans les chevaux l'omoplate *(b)* & l'humérus *(c)*, & par conſéquent les parties qui correſpondent à l'épaule & au bras de l'homme ; ainſi le vrai bras du cheval paroît être confondu avec l'épaule, parce qu'il eſt réuni avec le corps ſous la même peau. Le coude *(d)* eſt donc placé en arrière, comme dans l'homme ; mais dans le cheval il ſe trouve contre les côtes au haut de la jambe de devant, à l'endroit où elle commence à être ſéparée du corps ; c'eſt la première jointure qui paroiſſe au dehors, car celle du bras avec l'épaule eſt cachée ſous la peau de l'animal.

La

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 285 sur 615

La première partie de la jambe de devant du cheval qui eſt ſéparée du corps, eſt appelée le *bras*, quoiqu'elle correſponde à l'avant-bras de l'homme; la partie extérieure *(e)* du bras du cheval eſt nommée le *gros du bras*, il paſſe ſur la face intérieure une veine appelée *ars*.

On a donné le nom de *genou* à la jointure *(f)* qui eſt au deſſous du bras, elle ſe trouve à l'endroit du poignet de l'homme, & en effet elle forme un angle en devant lorſque la jambe eſt pliée.

Le canon eſt la ſeconde partie *(g)* de la jambe de devant, il commence à l'articulation du genou, & correſpond au métacarpe de l'homme.

Il y a derrière le canon un tendon *(h)* qui s'étend d'un bout à l'autre, & que l'on appelle communément & fort improprement le *nerf de la jambe*.

Le boulet eſt l'articulation *(i)* qui ſe trouve au deſſous du canon.

Le fanon eſt un bouquet de poil *(k)* qui couvre une eſpèce de corne molle ſituée derrière le boulet, & que l'on appelle l'*ergot*.

Le paturon *(l)* eſt la partie de la jambe qui s'étend depuis le boulet juſqu'au pied: on donne quelquefois au paturon le nom de *jointure*, mais ce terme eſt équivoque; car, à proprement parler, il doit ſignifier ici une articulation.

La couronne eſt une élévation *(m)* qui ſe trouve au bas du paturon, & qui eſt garnie de poils longs qui tombent ſur la corne tout autour du pied.

Le ſabot eſt, pour ainſi dire, l'ongle du cheval, il eſt formé par la corne; la partie antérieure du ſabot *(n)* eſt appelée la *pince*, les côtés *(o)* portent le nom de *quartiers*; on nomme le

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 286 sur 615

quartier extérieur de chaque pied *quartier de dehors*, & l'intérieur *quartier de dedans:* la partie poſtérieure du ſabot eſt un peu élevée & ſéparée en deux pièces, auxquelles on a donné le nom de *talon*, elles s'étendent juſqu'au milieu du deſſous du pied, & forment la fourchette par leur réunion ſous la ſolle qui eſt, pour ainſi dire, la plante du pied; ſa ſubſtance eſt de corne comme le reſte du ſabot dont elle fait partie, mais la corne de la ſolle eſt plus dure que celle de la fourchette, & plus tendre que celle du ſabot.

Pour déterminer les noms des parties qui compoſent les jambes de derrière, il faut remonter juſqu'aux feſſes du cheval, chacune renferme le fémur, ainſi elle correſpond à la cuiſſe de l'homme: c'eſt proprement la cuiſſe du cheval qui eſt réunie avec le corps & qui porte le nom de *feſſe*, elle eſt terminée en bas & en devant par le graſſet *(p)*, qui eſt proprement l'articulation du genou où ſe trouve la rotule. Le graſſet eſt donc placé au bas de la hanche à la hauteur du flanc; il change de place lorſque le cheval marche.

La première partie *(q)* de la jambe de derrière du cheval qui ſoit détachée du corps, eſt celle que l'on appelle la *cuiſſe*, elle s'étend depuis le graſſet & le bas des feſſes juſqu'au jarret *(r)*, & elle correſpond à la jambe de l'homme; auſſi y a-t-il dans la cuiſſe du cheval une partie charnue *(ſ)* qui a rapport au gras de notre jambe, & que l'on nomme le *gros de la cuiſſe* ou le *graſſet*, quoiqu'on ait auſſi donné une autre ſignification à ce dernier nom, comme nous venons de le dire. Il y a ſur la face intérieure de la cuiſſe une veine, que l'on nomme la *veine du plat de la cuiſſe.*

Le jarret eſt la jointure *(t)* qui eſt au bas de la cuiſſe & qui ſe plie en avant, cette articulation a rapport au cou-de-pied

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 287 sur 615

de l'homme, c'eſt-à-dire, au tarſe; la partie du jarret qui eſt en arrière, & que l'on appelle la *pointe du jarret*, eſt proprement le talon: ce que l'on appelle vulgairement le *gros nerf du jarret*, qui ſe termine à la pointe du jarret, eſt un tendon qui correſpond au tendon d'Achille, qui eſt attaché au talon de l'homme.

C'eſt ici le lieu de nommer une partie qui ſe trouve dans chacune des quatre jambes du cheval, elle eſt placée dans les jambes de devant en dedans du bras, & un peu au deſſus & à côté du genou, & dans les jambes de derrière un peu au deſſous & à côté du jarret, auſſi en dedans; c'eſt une petite tumeur ſans poil, de la groſſeur d'une châtaigne & de la conſiſtance d'une corne molle; on lui a donné les noms de *châtaigne*, de *lichène* ou d'*ergot*, mais il ne faudroit pas ſe ſervir du dernier, parce qu'il pourroit faire confondre la partie dont il s'agit ici avec une autre dont il a déjà été fait mention ſous le nom d'*ergot*. La châtaigne croît dans certains chevaux, & s'alonge de la longueur d'un pouce & d'un pouce & demi, elle tombe alors & repouſſe enſuite.

Au deſſous de la partie des jambes de derrière, qui porte le nom de *jarret*, ſont le canon *(u)*, le boulet *(x)*, le paturon *(y)* & le pied *(z)*, comme dans les jambes de devant: ce qui en a été dit ſuffit pour les jambes de derrière, on fera ſeulement remarquer que le canon de celles-ci eſt appelé la *jambe* par quelques auteurs.

Après avoir donné l'explication des dénominations particulières, celle des dénominations générales devient plus facile & plus ſimple: on diviſe le cheval en trois parties principales, qui ſont, l'avant-main, le corps & l'arrière-main; l'avant-main comprend la tête, l'encolure, le garrot, les épaules, le poitrail & les jambes de devant; le corps eſt compoſé des reins, des

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 288 sur 615

rognons, des côtés, du ventre & des flancs; l'arrière-main renferme la croupe, les hanches, la queue, les feſſes, le graſſet, les cuiſſes, le jarret & le reſte des jambes de derrière.

On a fait encore une autre diviſion générale du cheval en quatre parties, ſavoir, la tête, le corps, le train de devant & le train de derrière; le dos, les rognons, le ventre, les côtés & les flancs compoſent le corps; le train de devant eſt formé par l'encolure, les épaules, le poitrail & les jambes de devant; & le train de derrière par la croupe, la queue, les hanches & les jambes de derrière.

On doit toûjours regretter le temps qui eſt employé à expliquer & définir des termes d'art qui pourroient être changés en d'autres termes généralement connus; par exemple, pourquoi dans le cheval le nez eſt-il appelé *chanfrein!* pourquoi les narines ont-elles le nom de *naſeaux*, & la mâchoire inférieure celui de *ganache*, tandis qu'on a conſervé les vrais noms du front, des lèvres, de la bouche & du menton, &c? il eſt certain que les naſeaux du cheval ne reſſemblent pas moins à des narines que ſon menton ou ſa ganache ne reſſemble à un menton ou à une mâchoire inférieure; ainſi les naſeaux devroient porter le nom de *narines*, comme le menton porte le nom de *menton*. Il y a d'autres parties, comme les falières du cheval, pour leſquelles il faut des noms particuliers, parce qu'elles ne ſe trouvent que dans certains animaux; mais à quoi bon s'impoſer la néceſſité d'apprendre de nouveau des choſes que l'on ſait déjà, en les tenant déguiſées par des noms peu uſités, au lieu de les préſenter ſous le nom le plus univerſellement reçû? c'eſt un reſte de barbarie groſſière, ou peut-être de pédanterie myſtérieuſe; car ces différens noms pour la même choſe ne viennent que d'un mélange de langues ou de jargons. Les charlatans, qui ne

peuvent étaler qu'une vaine ſcience de noms, en conſervent l'uſage, & obligent les autres à les apprendre; les artiſans reſpectent cet uſage, & ne ſont pas même en état de s'y ſouſtraire, ceux qui peuvent le faire doivent donc proſcrire peu à peu toutes les dénominations ſuperflues. Nous ne les emploierons que le moins que nous pourrons dans la ſuite de cet ouvrage, & une des principales raiſons qui nous a obligés à en rapporter les définitions, a été pour faire voir que l'on peut ſe paſſer de ces noms, parce qu'il y en a de meilleurs & de plus faciles, puiſqu'on les ſait d'avance.

On emploie des termes d'art pour dénommer les différentes couleurs du poil des chevaux, comme pour déſigner les parties de leur corps, parce que la grande variété qui ſe trouve dans les couleurs & dans leurs nuances a fait multiplier les noms: comme la pluſpart ne ſont connus que des gens qui ſe ſont appliqués à la connoiſſance des chevaux, il eſt à propos, pour faire entendre le langage des connoiſſeurs en ce genre, d'expliquer ces noms en même temps que nous détaillerons les différentes couleurs que l'on a remarquées dans ces animaux. On auroit déjà pû faire obſerver que nous nous ſervons de termes impropres en diſant que les chevaux ſont de différentes couleurs; l'uſage eſt de dire qu'un cheval eſt de tel poil ou de telle robe, & non pas de telle couleur; cependant il eſt certain que ces deux expreſſions, *poil* & *couleur*, ne ſont pas équivalentes, c'eſt pourquoi nous les emploierons chacune dans leur propre ſignification.

Quoiqu'il y ait beaucoup de diverſité dans les couleurs des chevaux, cependant elles ne ſont pas aſſez variées pour que l'on ſoit obligé, dans le détail que l'on fera, de ſuivre un ordre méthodique afin de les faire retenir de mémoire plus aiſément;

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 290 sur 615

ainſi nous ne les diſtribuerons pas, comme on l'a déjà fait, en couleurs ſimples qui s'étendent ſur tout le corps du cheval ſans aucun mélange d'autres couleurs, en couleurs compoſées, c'eſt-à-dire, celles qui ſont mêlées d'autres couleurs, & en couleurs bizarres & extraordinaires. Selon cette méthode, les couleurs ſimples ſont, le blanc, l'iſabelle, l'alzan, le bai & le noir: les couleurs compoſées ſont, le gris, le louvet, le rouan & le rubican; enfin les couleurs extraordinaires ſont, le tigre, la pie, la porcelaine & l'aubert ou fleur de pêcher. Au lieu de ſuivre ces diviſions, il vaut mieux commencer tout ſimplement, comme pluſieurs auteurs, par les couleurs les plus communes & qui paroiſſent les plus naturelles au cheval, tandis que les autres ne ſemblent lui appartenir qu'en tant qu'il ſe trouve au rang des animaux domeſtiques. En effet, ſi l'on obſerve que le jaune, le roux ou le brun, ou, pour tout dire en un mot, le fauve, eſt la couleur la plus ordinaire &, pour ainſi dire, la plus naturelle aux animaux ſauvages, & que le bai, c'eſt-à-dire, le mélange & les différentes teintes des mêmes couleurs que nous venons de nommer, eſt la couleur la plus commune aux chevaux, on ne ſera pas éloigné de croire que ſi ces animaux étoient ſauvages, ils ſeroient tous de couleur baie, au moins dans notre climat, & que l'explication de cette couleur doit précéder toutes les autres.

Le bai eſt la couleur de châtaigne rougeâtre, elle a pluſieurs nuances que l'on diſtingue par les dénominations ſuivantes; bai clair ou lavé, bai châtain, bai marron, bai brun, bai doré, bai ſanguin ou d'écarlatte & bai à miroir: les chevaux bais bruns ſont d'une couleur brune très-obſcure & preſque noire, excepté aux flancs & au bout du nez où ils ont une couleur rouſſe; c'eſt ce qu'on appelle *avoir du feu.* On conçoit aiſément

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 291 sur 615

que le bai doré n'eſt qu'une couleur jaune. Les chevaux bais à miroir ou bais miroités, ſont ceux qui ont ſur la croupe des marques d'un bai plus obſcur que le reſte du corps; cependant on donne auſſi le même nom de bai à miroir ou de bai miroité aux chevaux bais châtains qui ont beaucoup de taches rondes d'un bai plus clair, ou pluſtôt à ceux qui ont ſur la croupe des marques d'un bai plus obſcur, de ſorte qu'on pourroit dire qu'ils ſont pommelés s'il étoit d'uſage d'employer ce mot pour d'autres que pour des chevaux gris. En général, tous les chevaux bais ont les extrémités, les crins & la queue noirs.

Il y a trois ſortes de couleurs noires, qui ſont le noir mal teint, le noir ordinaire & le noir gai ou jais. Le premier a une teinte de brun ou de rouſſeâtre, on pourroit peut-être en faire une ſorte de bai brun, auſſi le noir n'eſt-il guère moins commun que le bai. Les chevaux noirs mal teints ont les flancs & les extrémités d'une couleur lavée & moins foncée que celle du reſte du corps. Le noir gai eſt clair, liſſe & très-noir. On a auſſi donné au noir fort vif le nom de *noire more* ou *moreau.*

Le poil iſabelle eſt jaune; les crins & la queue ſont blancs dans certains chevaux, de couleur iſabelle & noirs dans d'autres: ceux-ci ont une raie noire qui s'étend le long de l'épine du dos juſqu'à la queue; c'eſt ce qu'on appelle la *raie de mulet.* L'iſabelle a pluſieurs nuances, celle où il y a le moins de jaune eſt nommée *ſoupe de lait,* c'eſt un blanc ſale ou mêlé d'une teinte de jaune très-légère; on l'a comparée à la couleur d'une ſoupe au lait dans laquelle on a mêlé des jaunes d'œufs. L'iſabelle clair a un peu plus de jaune, l'iſabelle commun encore davantage; l'iſabelle doré eſt d'un jaune plus vif, & enfin l'iſabelle foncé eſt d'un jaune plus ſaturé.

Le louvet ou poil de loup approche de la couleur de cet animal, il y a des louvets clairs & d'autres obſcurs; ils ont tous des teintes d'iſabelle, & quelquefois on y voit la raie de mulet.

L'alzan eſt une ſorte de bai roux ou canelle; il y en a pluſieurs nuances qui ſont l'alzan clair, comme la couleur du poil de vache, l'alzan commun, qui n'eſt ni brun ni clair, l'alzan bai qui tire ſur le roux, l'alzan obſcur & l'alzan brûlé qui eſt foncé & fort brun. Il ſe trouve des chevaux alzans qui ont les crins & la queue blancs, & d'autres qui les ont noirs.

Lorſqu'un cheval bai, noir ou alzan a des poils blancs parſemés ſur le corps, principalement ſur les flancs, on dit qu'il a du rubican.

Le rouan eſt mêlé de rouge & de blanc, on l'a auſſi défini comme un mélange de blanc, de gris ſale & de bai. On diſtingue deux ou trois ſortes de rouan qui ſont, le rouan ordinaire, le rouan vineux qui tire plus ſur le rouge & qui approche de la couleur du vin, & le rouan cap-de-maure ou caveſſe-de-more: les chevaux de cette couleur ont la tête & les extrémités blanches, & le reſte du corps eſt rouan, ou, ſelon quelques auteurs, gris ſale.

Les chevaux gris ont le poil mêlé de blanc & de noir ou de bai. On diſtingue pluſieurs ſortes de chevaux gris, ſavoir, les gris pommelés, les gris argentés, gris ſales, &c. les gris pommelés ont ſur la croupe & ſur le corps pluſieurs taches rondes, les unes plus noires, les autres plus blanches, aſſez également diſtribuées; les chevaux gris argentés n'ont que très-peu de poils noirs qui ſont parſemés ſur un fond blanc, liſſe, & luiſant en quelque façon comme de l'argent; le poil des chevaux que l'on appelle *gris ſale*, a beaucoup de brun & de noir avec le blanc: on

on a vanté les crins blancs dans les chevaux de cette couleur; les gris bruns ont beaucoup de noir & peu de blanc; les gris rouges ſont mêlés de bai, de noir & de blanc; le gris vineux eſt mêlé de bai par-tout; le gris truité eſt un fond blanc parſemé de roux par petites taches oblongues répandues aſſez également ſur la tête & ſur le corps; le gris tourdille eſt un gris ſale qui approche de la couleur des groſſes grives, comme le déſigne le mot tourdille, qui vient de *turdus* grive: les chevaux de cette couleur ont des poils rougeâtres & beaucoup de noir dans le blanc; le gris étourneau a auſſi été dénommé de la ſorte, parce qu'il reſſemble en quelque façon à la couleur des étourneaux ou ſanſonnets, il eſt encore plus brun que le gris ſale, & on conſerve le même nom quoiqu'il y ait beaucoup de noir; les chevaux gris tiſonnés ou charbonnés ont ſur un fond blanc ou gris des taches noires, larges à peu près comme la main, & diſpoſées irrégulièrement comme ſi on les avoit formées avec un tiſon: lorſque ces taches ſont larges, on donne auſſi à ces chevaux le nom de *tigres*. Les chevaux gris de ſouris ont pour l'ordinaire les extrémités noires & la raie de mulet: tous les chevaux gris deviennent blancs en vieilliſſant, parce que leurs poils bais ou noirs blanchiſſent avec l'âge; mais il eſt très-rare de voir des poulains entièrement blancs, & on peut reconnoître ſi un vieux cheval a été de poil gris, par les reſtes de cette même couleur qui paroiſſent aux genoux & aux jarrets.

La couleur appelée *porcelaine*, eſt un gris mêlé de taches de couleur bleuâtre d'ardoiſe, à peu près comme la porcelaine blanche & bleue.

On nomme *aubert*, *mille-fleur* ou *fleur de pêcher*, un mélange aſſez confus, de bai, de blanc & d'alzan, dont le compoſé approche de la couleur des fleurs de pêcher.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 294 sur 615

Les chevaux pies ont du blanc & d'autres couleurs qui forment de grandes taches comme de grands placards, diſpoſés irrégulièrement : on diſtingue pluſieurs ſortes de chevaux pies, par les différentes couleurs qui ſe trouvent avec le blanc, ſavoir, les pies noirs qui ſont blancs & noirs, les pies bais qui ſont blancs & bais, & les pies alzans qui ſont blancs & alzans.

De quelque couleur que ſoient les chevaux, ceux qui ont les extrémités, les crins & la queue noirs, ſont les plus recherchés & paſſent pour être les plus beaux ; ceux qui ont les flancs & les extrémités de couleur moins foncée que celle du reſte du corps, &, pour ainſi dire, lavée, ſont les moins eſtimés.

On donne le nom de *zain* aux chevaux qui n'ont point de poils blancs, ainſi les chevaux blancs, & tous ceux dont les couleurs ſont mélangées de blanc, ne peuvent pas être appelés zains.

Lorſqu'il y a au front une marque blanche, on la nomme la *pelotte* ou l'*étoile ;* cette marque eſt plus ou moins grande, mais ſi elle deſcend depuis le front juſqu'au bas de la tête, on lui donne le nom de *chanfrein blanc* ou de *belle face :* c'eſt une bande blanche qui s'étend depuis le front juſqu'aux naſeaux le long des os du nez, c'eſt-à-dire, de cette partie que l'on appelle auſſi le *chanfrein*, comme nous l'avons déjà dit : on n'aime pas que la marque blanche anticipe ſur les ſourcils, ni qu'elle ſoit prolongée juſqu'au bout du nez ; s'il y a une tache blanche ſur cette partie, & qu'elle occupe toute la lèvre ſupérieure, on dit que le cheval boit dans ſon blanc : le même individu peut avoir tout à la fois la pelotte, le chanfrein & le bout du nez blanc. Il y a pluſieurs moyens de faire des pelottes artificielles, c'eſt-à-dire, de changer en blanc la couleur du poil ; pour cela on le détruit en entamant la peau ou en la brûlant, &c. le poil qui revient après que la plaie eſt guérie ſe trouve blanc. On a auſſi

divers procédés pour teindre les ſourcils blancs & le poil gris ou blanc, en bai ou en noir, mais la couleur ne dure que juſqu'au temps de la mue, car le nouveau poil reparoît avec ſa couleur naturelle.

Si un cheval a le bas de la jambe blanc, cette marque eſt nommée *balzane;* lorſqu'elle eſt frangée par le haut, ou terminée irrégulièrement par des pointes en forme de dents de ſcie, on lui donne le nom de *balzane dentelée;* ſi elle eſt marquée de noir, c'eſt une *balzane herminée* ou *mouchetée*, ou une *jambe herminée;* ſi elle s'étend juſqu'auprès du genou ou du jarret, on dit que le cheval eſt chauſſé trop haut; s'il y en a une à la jambe de derrière & à la jambe de devant du même côté, on déſigne le cheval par le nom de *travat;* mais ſi les balzanes ſont à la jambe droite de devant & à la jambe gauche de derrière, ou lorſque c'eſt au contraire à la jambe gauche de devant & à la jambe droite de derrière, le cheval eſt appelé *traſtravat* ou *tranſtravat;* enfin s'il y a du blanc au bas des quatre jambes, on dit que c'eſt un cheval balzan des quatre pieds.

On ne peut exprimer toutes les teintes & toutes les nuances des couleurs des chevaux, ni déterminer la grandeur & la figure des marques & des taches que l'on obſerve ſur ces animaux: ce n'eſt pas qu'il y ait dans les chevaux beaucoup de couleurs eſſentiellement différentes, car je crois qu'on pourroit les imiter preſque toutes avec du blanc, du noir & de l'orangé; mais il y a tant de variétés dans ce mélange, qu'il n'eſt pas poſſible d'avoir autant de noms qu'il y a de différences ſenſibles dans les teintes. On trouvera donc ſouvent des chevaux dont les couleurs ne ſeront d'accord avec aucune des définitions de couleurs que nous venons de rapporter, mais il ſuffira qu'elles en approchent pour que l'on puiſſe les exprimer, en modifiant

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 296 sur 615

les dénominations reçûes, & dans certains cas il faut en employer d'autres.

La poſition, la figure & l'étendue des taches varient plus ou moins, de même que les couleurs, dans chaque individu des animaux domeſtiques. On a prétendu que ces différences, ſenſibles à l'extérieur, pouvoient nous faire juger de l'intérieur des chevaux, & on a pris les teintes des couleurs & leur arrangement pour des ſignes réels, qui dénotoient les bonnes ou les mauvaiſes qualités de ces animaux, non ſeulement par rapport à la conſtitution du tempérament, mais encore par rapport à l'inſtinct & aux mœurs de chaque cheval. Si on avoit pû ſe fier à de tels indices, il auroit fallu, avant que d'en tirer des conſéquences, faire des recherches ſur les animaux ſauvages; leurs couleurs ſont beaucoup plus conſtantes & ne varient guère que par l'âge, le climat & les ſaiſons; auſſi chaque eſpèce a ſes couleurs diſtinctes, chaque eſpèce a auſſi des qualités relatives au tempérament & à l'inſtinct, qui ſont plus évidentes qu'elles ne peuvent l'être dans les individus de la même eſpèce; ainſi en oppoſant une eſpèce à une autre pour les couleurs du poil & pour les bonnes & mauvaiſes qualités des individus en général, on a l'avantage de comparer des extrêmes, tandis qu'en n'obſervant que les individus d'une ſeule eſpèce, on ne découvre que les mêmes qualités individuelles, plus ou moins marquées, mais toûjours reſſemblantes par rapport aux caractères ſpécifiques.

Si on avoit fait de bonnes recherches ſur ce ſujet, le faux préjugé n'auroit pas duré ſi long-temps, & aujourd'hui tous les connoiſſeurs en chevaux ſeroient d'accord avec les meilleurs obſervateurs en ce genre, qui ne font aucun cas des prétendus ſignes que l'on a tirés de la couleur du poil: l'expérience a détruit cette

erreur, & on a mis en axiome qu'il y a de bons chevaux de tout poil. Tout ce qu'on peut dire en faveur de l'ancien préjugé, c'eſt que l'on ſoupçonne que les chevaux de poil gris, & principalement de gris ſale, ſont ſujets à avoir mauvaiſe vûe, & qu'il y a moins de force & de vigueur dans ceux dont le poil eſt de couleur claire, ſur-tout s'il eſt de couleur encore moins foncée ſur les flancs & au bout du nez que ſur le reſte du corps: on ſuppoſe au contraire qu'ils ſont vigoureux s'il y a du feu, c'eſt-à-dire, du bai vif dans ces mêmes endroits; mais on a vû par l'expérience, que ces marques ſont très-fautives: on ne doit donc avoir égard aux couleurs, qu'autant qu'elles influent ſur la beauté & ſur le prix des chevaux; la rareté de certaines couleurs les fait auſſi beaucoup valoir, car le bon goût n'a jamais pû empêcher que les choſes les plus rares ne ſoient ſouvent préférées aux plus belles.

Je crois que certaines couleurs, & ſur-tout les marques ou les taches qui ſe trouvent ſur la face de pluſieurs chevaux, nous en impoſent & nous trompent par une fauſſe apparence; car elles changent la phyſionomie de l'animal & le maſquent, pour ainſi dire: par exemple, on a cru que les chevaux qui avoient la bande du chanfrein blanc, diſcontinuée & interrompue dans le milieu de la face, étoient bizarres & fantaſques; n'eſt-ce pas parce que cette interruption leur donne un air extraordinaire, comme des cicatrices ſur le viſage d'un homme rendent ſa phyſionomie plus dure? L'étoile au front des chevaux n'a peut-être paſſé pour un bon augure, que parce qu'elle eſt placée dans le milieu du front, & qu'il n'y a pas dans toute la face un endroit plus favorable pour qu'elle rende la phyſionomie ouverte, & pour qu'elle ne choque pas la vûe: je croirois auſſi que les balzanes n'ont été ſi bien obſervées, que parce qu'étant ſur une

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 298 sur 615

partie qui eſt ſouvent en mouvement, elles ont plus frappé la vûe que les autres taches, & qu'on ne les a priſes le plus ſouvent pour de mauvais ſignes, que parce qu'en rendant les pieds ſur leſquels elles ſe trouvent plus apparens par leur blancheur, on s'eſt imaginé en voyant le cheval en marche, que les pieds balzans s'approchoient de plus près que les autres, & qu'il étoit ſujet à ſe laiſſer tomber, ceux qui ont les quatre pieds balzans n'en ont pas été ſoupçonnés, parce qu'il n'y a pas la même apparence d'inégalité dans leur démarche; mais il eſt inutile de diſcuter plus long-temps cette matière, & de combattre des préjugés que les meilleurs connoiſſeurs en chevaux ont abandonnés; leur exemple détrompera mieux les autres que des raiſons: quand la vérité eſt connue, il ne faut plus que du temps pour détruire l'erreur.

Je reviens aux obſervations que l'on a faites ſur le poil des chevaux, & principalement par rapport à ſon arrangement ſur certaines parties.

Tous les chevaux des pays orientaux & méridionaux, c'eſt-à-dire, des pays les plus chauds, comme les chevaux Turcs; les Perſans, les Arabes & les Barbes, ont le poil beaucoup plus ras que les autres: on voit bien que la température du climat en eſt la cauſe, mais il ſeroit difficile d'en donner la raiſon.

L'épi ou la molette eſt un arrangement de poils diſpoſés à peu près comme les pétales d'une fleur ſimple, c'eſt pourquoi on a comparé l'épi à un petit œillet; c'eſt un point d'où les poils partent comme d'un centre, & ſe renverſent de façon qu'ils forment une cavité conique comme un petit entonnoir: il y a ordinairement de ces épis au front, au poitrail & ſur le ventre près des cuiſſes; il ſe trouve des chevaux qui en ont

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 299 sur 615

en d'autres endroits: on en voit quelquefois deux ou trois ſéparés ou réunis ſur le front ou ſur le pli de la cuiſſe par derrière.

L'épée romaine eſt une eſpèce de ſillon formé par le poil qui eſt renverſé; c'eſt un épi alongé, dont on a comparé la figure à celle des épées qui étoient en uſage chez les Romains: cette épée romaine s'étend le long du haut de l'encolure près de la crinière, il n'y a que peu de chevaux qui l'aient, & ils ſont fort recherchés par les gens qui ſont les plus difficiles à ſatisfaire ſur le poil des chevaux; quelquefois il ſe trouve une épée romaine de chaque côté de la crinière, le cheval en eſt encore plus eſtimé.

On pourroit juger au ſimple énoncé des termes dont nous avons fait mention, que le cheval eſt un des animaux qui nous ſont le plus utiles, puiſque la pluſpart des parties de ſon corps & des variétés de ſes couleurs ont des noms particuliers qui ne ſont uſités que pour lui. Une pareille attention pour le cheval n'a pû avoir d'autres motifs que notre propre intérêt; mais la perfection que nous exigeons dans toutes les parties de cet animal pour le rendre beau, eſt autant une preuve du plaiſir qu'il nous fait, que de l'utilité que nous en tirons. Le bœuf nous eſt bien auſſi utile que le cheval, puiſqu'il nous ſert d'alimens; cependant un beau bœuf n'eſt qu'un bœuf gros & gras: on a vû au contraire dans l'hiſtoire naturelle du cheval, de combien de conditions dépend la beauté de cet animal, que M. de Buffon a repréſenté dans l'état de la belle nature. On a fait des règles pour juger de la beauté des chevaux, mais en déterminant toutes les proportions de leur corps on n'a pas eu ſeulement en vûe l'élégance de leur taille, on a auſſi conſidéré les différens uſages auxquels nous employons ces animaux; ainſi, toute proportion

par laquelle leur corps eſt affoibli ou appeſanti, toute proportion qui le rend moins propre au ſervice ou mal ſain, n'eſt pas un moindre défaut que celle qui y cauſeroit une difformité. Je vais expoſer les moyens de connoître quelques-uns de ces défauts, ſelon les obſervations des meilleurs Écuyers *, & de juger des imperfections qui défigurent la pluſpart des chevaux; car la perfection & la beauté ſont très-rares en tout genre.

Lorſque le cheval a la tête groſſe & quarrée au lieu de l'avoir petite, elle eſt difforme, & elle pèſe ordinairement à la main; ſi elle eſt chargée de chair de façon qu'on puiſſe la mettre au rang de celles que l'on appelle *têtes graſſes*, le cheval eſt ſujet au mal des yeux; cependant ſi elle étoit sèche au point d'être décharnée, les yeux n'en ſeroient pas plus ſains, car les extrêmes ſont toûjours dangereux; mais ſi elle étoit groſſe ſans être graſſe, cette difformité n'influeroit pas ſur les yeux; cependant elle ne défigureroit pas moins le cheval, car cet animal ne peut avoir aucun air de nobleſſe ou d'agrément avec une groſſe tête. C'eſt un défaut pour les chevaux d'avoir la tête trop alongée, on l'appelle *tête de vieille.* Le cheval porte mal ſa tête lorſque le bout du nez ne ſe trouve pas dans la direction d'une ligne perpendiculaire avec le front; ſi le bout du nez eſt en avant, c'eſt ce qu'on appelle *tendre le nez, porter au vent, tirer à la main;* s'il ſe trouve en arrière, la tête eſt peſante; mais ſi ce défaut va à l'excès & que le bout du nez approche du goſier, on dit que le cheval eſt encapuchonné; enfin, la tête eſt mal attachée lorſque ſa partie ſupérieure eſt plus élevée que l'encolure.

* Le véritable & parfait Maréchal, &c. par le ſieur de Solleyſel, *in-4.° Paris, 1672;* le nouveau parfait Maréchal, &c. par M. de Garſault, *in-4.° Paris, 1746;* l'École de cavalerie, &c. par M. de la Guérinière, *in-fol. Paris, 1751.*

On

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 301 sur 615

On appelle *oreillards* les chevaux qui ont les oreilles trop épaiſſes & pendantes, au lieu de les avoir petites & déliées. Lorſqu'il y a trop de diſtances entre les oreilles, ſur-tout dans le bas, elles ſont mal placées; & lorſqu'elles ne s'approchent pas encore de plus près au deſſus qu'au deſſous, le cheval n'a pas l'oreille hardie; c'eſt un défaut, de même que de baiſſer les oreilles à chaque pas comme les cochons.

Si le front eſt bas & enfoncé, c'eſt une difformité que l'on déſigne en diſant que le cheval eſt camus, au lieu d'avoir le front avancé comme les béliers.

Lorſque les yeux ſont gros, proéminens, & qu'ils ſortent, pour ainſi dire, hors de la tête, le cheval paroît morne & ſtupide; ſi au contraire les yeux ſont petits & enfoncés, on les appelle *yeux de cochon*, & le cheval a le regard triſte & ſouvent la vûe mauvaiſe.

Il faut examiner avec grande attention les yeux d'un cheval pour pouvoir être aſſuré qu'il a la vûe bonne, on doit ſe mettre à portée de la lumière, & prendre garde d'en être offuſqué: c'eſt une épreuve équivoque que d'approcher la main contre l'œil pour ſavoir s'il le fermera, car l'impreſſion de l'air qui eſt agité par ce mouvement, peut faire fermer l'œil ſans que le cheval ait aperçû ce qu'on lui a préſenté. On eſt auſſi dans l'uſage de s'approcher de l'œil pour voir ſi la cornée repréſente les objets comme un miroir; c'eſt une épreuve fautive, car il ſuffit pour cet effet que la cornée ſoit polie, elle peut l'être dans le plus mauvais œil, même ſans être tranſparente; il faut donc que l'on puiſſe voir à travers pour s'aſſurer de cette tranſparence, ou pour reconnoître ſi la vitre eſt trouble ou double, ou de mauvaiſe couleur, au lieu d'être aſſez claire & aſſez tranſparente pour qu'on puiſſe voir diſtinctement la

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 302 sur 615

prunelle : lorſque la vitre eſt trouble & couverte, c'eſt une marque que le cheval eſt ſujet à avoir des fluxions ; ſi cette maladie a altéré l'œil à un certain point, il eſt plus petit que l'autre, ce qui prouve qu'il ſe deſsèche, par conſéquent il eſt entièrement gâté. Un œil peut être bon quoiqu'il paroiſſe plus petit que l'autre, parce que la paupière aura été rétrécie par quelque accident, mais dans ce cas il n'eſt ni trouble, ni brun. Il y a auſſi des maladies paſſagères qui rendent la vûe trouble pour un temps, c'eſt la gourme, l'éruption des dents de lait & des crochets de la mâchoire ſupérieure : ſi on voit au fond de l'œil une petite tache blanche, c'eſt ce qu'on appelle le *dragon*, elle s'étend avec le temps & occupe la prunelle, de ſorte que le cheval devient borgne ſans qu'il y ait de remède : cette tache peut auſſi être rouſſe ou noire, elle a quelquefois la figure d'un petit ver ou d'un petit ſerpent tortueux, d'où vient le nom de *dragon*. Lorſque la prunelle paroît d'un blanc verdâtre, c'eſt un *œil* cul de verre ; ce défaut ne rend pas toûjours le cheval borgne, mais il y a beaucoup à craindre qu'il ne le devienne ; ſi on voit dans la prunelle plus de blanc que de verdâtre, on dit alors que le cheval a l'œil vairon.

Lorſque les deux os de la mâchoire inférieure ſont trop gros, trop ronds ou trop chargés de chair, on dit que la ganache eſt quarrée, c'eſt une difformité ; mais ſi ces deux os ſont trop près l'un de l'autre, & ſi le canal qu'ils forment n'eſt pas aſſez large & aſſez évidé, c'eſt un défaut, parce que le cheval ne pouvant pas faire toucher les parois de ce canal contre ſon goſier, ce que l'on appelle *ſe ramener*, cet obſtacle empêche qu'il ne porte bien ſa tête, à moins que l'encolure ne ſoit mince à proportion du reſſerrement du canal ; ſi on y ſent quelque tumeur, c'eſt un ſigne de maladie.

Quand la bouche du cheval eſt trop grande ou trop petite, c'eſt un inconvénient pour la poſition du mors; dans le premier cas il approche des dents mâchelières, on dit alors que le cheval *boit la bride;* dans l'autre cas le mors fait froncer les lèvres ou porte ſur les crochets. Si les lèvres ſont trop groſſes & trop charnues, elles couvrent les barres & empêchent l'effet du mors, c'eſt ce qu'on appelle *s'armer des lèvres.* Le palais eſt trop ſenſible au mors lorſque ſes ſillons ſont trop gras & trop épais; mais il faut remarquer qu'en général les vieux chevaux ont le palais & les gencives moins charnus que les jeunes: les barres doivent être élevées & former un canal qui ſoit ſuffiſant pour loger la langue ſans qu'elle déborde, & décharnées au point d'être ſenſibles au mors; lorſqu'elles ſont trop tranchantes, c'eſt un défaut, parce que le cheval a trop de ſenſibilité, & il l'eſt trop peu ſi les barres ſont baſſes, rondes & charnues. La langue doit être proportionnée à la capacité du canal dans lequel elle eſt placée; ſi elle en ſort, ou ſi elle eſt épaiſſe au point de s'élever au deſſus des barres, c'eſt un défaut qui s'oppoſe à l'impreſſion du mors.

La barbe eſt une partie qui contribue auſſi beaucoup à la bonté de la bouche; ſi les deux os qui la compoſent ſont trop éloignés l'un de l'autre & trop peu ſaillans, elle eſt trop plate & trop peu ſenſible, parce que la gourmette n'appuie que ſur les côtés; lorſque les deux os ſont trop près l'un de l'autre & trop ſaillans, la barbe eſt au contraire trop relevée & trop ſenſible, parce que la gourmette n'appuie que dans le milieu; enfin ſi la barbe a trop de poil, ou ſi elle eſt trop charnue, s'il y a des durettes ou des calus, ce ſont des défauts qui marquent que le cheval n'eſt pas aſſez ſenſible, ou qu'il a été mal ſoigné ou mal conduit.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 304 sur 615

On diſtingue trois principales ſortes d'encolures mal faites, ſavoir, l'encolure renverſée, l'encolure fauſſe & l'encolure penchante; la première eſt auſſi appelée *encolure de cerf*, parce qu'elle eſt diſpoſée comme le cou de cet animal, elle forme une convexité par-devant depuis la tête juſqu'au poitrail; la fauſſe encolure eſt perpendiculaire le long du goſier (comme on l'a déjà dit dans l'hiſtoire du cheval), & par-derrière au deſſus du garrot il y a un enfoncement que l'on appelle le *cou de hache*; enfin les encolures penchantes ſont celles qui ſemblent en effet incliner d'un côté ou d'un autre, parce qu'il y a près de la crinière trop de chair qui tombe d'un côté.

Les groſſes & larges crinières qui chargent l'encolure & la font quelquefois pencher, ſont difformes & mal propres.

Lorſque le garrot eſt rond & trop charnu, les épaules ne ſont pas libres, la ſelle peut tomber deſſus & y cauſer des plaies difficiles à guérir; cependant le garrot ne doit pas être trop élevé dans les chevaux de bât ou dans ceux qui portent des trouſſes de fourrage.

Les chevaux qui ont la pointe des épaules groſſe & ronde, & en général les épaules trop groſſes, trop charnues, & qui ſont, comme on dit en un mot, chargés d'épaules, ſont peſans, ſujets à broncher, & ils ne peuvent ſervir que pour le tirage, à moins qu'ils n'aient les épaules mouvantes: ceux qui ont de plus les jointures de chaque côté du poitrail groſſes & avancées, ne peuvent ſervir qu'aux voitures, la peſanteur de leurs épaules les rend plus forts à tirer; on dit de ces chevaux qu'ils ſont larges du devant, ce qui eſt fort différent d'être ouverts du devant, c'eſt-à-dire, d'avoir le poitrail large; lorſqu'il eſt étroit & ſerré par les épaules, au point que les jambes de devant ſont ſi près l'une de l'autre par le haut, que peu s'en faut

qu'elles ne ſe touchent, le cheval eſt foible ſur le devant & ſujet à ſe mêler les jambes en marchant & à tomber. On appelle *épaules chevillées* celles qui paroiſſent engourdies, liées & ſans mouvement, ce défaut rend la démarche des chevaux rude & peſante, les expoſe à broncher, & leur ruine bien-tôt les jambes; la pluſpart des chevaux de ſelle qui ont les épaules trop décharnées, les ont ainſi chevillées; enfin certains chevaux lèvent bien les jambes, quoiqu'ils aient les épaules chevillées, parce que le mouvement ne vient que du bras.

La poitrine large & ouverte rend peſans les gros chevaux; mais ce ne ſeroit pas un défaut pour les chevaux fins, qui pour la pluſpart l'ont trop étroite.

Plus un cheval a les reins courts, c'eſt-à-dire, le dos, mieux il galoppe ſur les hanches, mais il ne va pas ſi bien au pas, & le centre du mouvement ſe trouvant trop près de la ſelle, le cavalier en eſt incommodé; ſi le dos eſt long, le cheval marche plus aiſément, parce qu'il a plus de liberté pour étendre les jambes, mais auſſi il a de la difficulté à galopper: lorſque le dos eſt bas & enfoncé, on dit que le cheval eſt *enſellé;* cette conformation lui donne de la légèreté & de l'avantage pour avoir un bel avant-main, ſon encolure eſt relevée & ſa tête placée haut, mais il ſe laſſe bien-tôt, & il ne peut pas porter de gros fardeaux.

On appele *chevaux plats* ceux dont les côtes n'ont pas aſſez de convexité & ſont ſerrées & avalées, ce défaut empêche qu'ils ne prennent du corps, leur ventre deſcend & s'avale, ils ſont lourds, ils ont peu d'haleine, & leur croupe n'eſt jamais belle, mais ils peuvent avoir les reins bons.

Lorſque le ventre s'élève vers le train de derrière, comme celui d'un levrier, on dit que le cheval n'a pas de corps, ou

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 306 sur 615

qu'il eſt étroit de boyau ; ceux qui ſont ainſi conformés, mangent peu pour la pluſpart, cependant ils ont preſque tous de l'ardeur.

Si le ventre deſcend plus bas que les côtes, & ſi cette partie eſt trop pleine, on dit que le ventre eſt avalé, & que c'eſt un ventre de vache ; ſi avec cela le cheval eſt jeune, s'il mange beaucoup & s'il touſſe ſouvent, on doit craindre qu'il ne devienne pouſſif.

Les flancs qui ne ſont pas aſſez remplis ſont appelés *flancs retrouſſés ;* lorſqu'ils ſont creux, c'eſt une autre difformité, & ſi la dernière des fauſſes côtes eſt trop éloignée de l'os de la hanche, ou ſi elle ne deſcend pas aſſez bas, le cheval ne prend point de corps ou le perd aiſément, pour le diſtinguer on dit qu'il a la côte trop courte.

En général les chevaux ſont efflanqués, c'eſt-à-dire, manquent de flanc dès qu'ils reſſentent de la douleur dans quelque partie du train de derrière. Lorſque les flancs battent plus qu'à l'ordinaire, ſans qu'il y ait d'excès de fatigue, le flanc eſt altéré ; mais ſi c'eſt ſeulement parce que le cheval reſpire difficilement lorſqu'il s'exerce, on l'appelle *ſouffleur*, ou *gros d'haleine* ſi ce défaut eſt moins ſenſible, & on le diſtingue aiſément de ceux qui ont le flanc altéré, parce que les battemens du ſouffleur s'arrêtent dès qu'il eſt en repos.

Les croupes qui ne ſont pas aſſez arrondies depuis les reins juſqu'à la queue, & qui paroiſſent courtes parce qu'elles tombent trop tôt, paſſent pour être difformes ; on les appelle des *croupes avalées* ou des *culs de prune ;* les croupes coupées ſont celles qui n'ont pas aſſez de ſaillie & d'étendue en arrière, & enfin on donne le nom de *croupe de mulet* à celles qui ſont tranchantes, parce que les feſſes ſont aplaties : ces défauts ne ſont d'aucune conſéquence pour la bonté du cheval.

Lorſque les os du haut des hanches ſont trop élevés dans un cheval qui n'eſt pas fort maigre, il paſſe pour avoir les hanches hautes, mais s'il eſt fort gras, on dit que le cheval eſt cornu; ordinairement la côte plate & le ventre avalé le rendent tel, cette difformité donne toûjours l'apparence de la maigreur. Si l'une des hanches eſt plus baſſe que l'autre, on dit que le cheval eſt épointé ou échanché: on peut juger de la conformation des hanches par la ſituation du jarret; s'il eſt trop en arrière, les hanches ſont trop longues, & le cheval n'eſt jamais bien fort; ſi les hanches s'étendent à plomb ſur le boulet, elles ſont trop courtes, alors le jarret ne plie que difficilement.

La queue placée trop haut rend la croupe pointue, celle qui eſt trop baſſe dénote que les reins ſont trop foibles. On peut juger qu'un cheval eſt vigoureux, s'il ſerre la queue lorſqu'on veut la relever: on appelle *queues de rat* celles qui n'ont que peu de poil, elles ſont défectueuſes de même que les queues courtes & celles qui tombent à plomb au lieu de former une convexité en ſortant de la croupe, ce qu'on appelle *porter la queue en trompe.*

Les chevaux qui ont le coude trop ſerré entre les côtes, portent la jambe & le pied en dehors; ceux qui l'ont trop ouvert, c'eſt-à-dire, trop éloigné des côtes, portent le pied en dedans; l'une & l'autre poſition dénotent de la foibleſſe.

Les bras longs ſont les plus forts, les bras courts ſont plus favorables pour le mouvement & le pli de la jambe; le bras menu eſt difforme, & de plus on en peut conclurre que la jambe n'a pas de force.

Les genoux gros & enflés font ſoupçonner que la jambe eſt travaillée; mais c'en eſt une preuve certaine lorſqu'ils ſont couronnés, c'eſt-à-dire, pelés dans le milieu, & lorſqu'on eſt ſûr

que le poil n'a été détruit que par les chûtes fréquentes que le cheval a faites ſur ſes genoux, & non par d'autres cauſes. Le genou gros marque que le cheval eſt peſant; lorſque le genou eſt naturellement un peu plié en avant, de ſorte que le canon n'eſt pas à plomb, le cheval eſt appelé *braſſicour;* ce défaut de conformation ne préjudicie pas à la bonté du cheval; mais s'il n'a pas été ainſi conformé de naiſſance, & ſi c'eſt l'effet de la fatigue & du travail, ou des entraves qu'on lui auroit miſes pendant un long temps, on dit que le cheval eſt arqué: les jambes uſées ne deviennent pas d'abord arquées, elles commencent par être droites par-devant depuis le genou juſqu'à la couronne, comme celles des chèvres; on exprime ce défaut en diſant que le cheval eſt droit ſur ſes jambes, dans cet état il eſt ſujet à ſe laiſſer tomber; ſi on continue à l'excéder de travail, les jambes ne peuvent plus s'étendre, elles reſtent courbées, & elles tremblent lorſqu'il s'arrête après avoir marché; dans cet état d'épuiſement on le croiroit incapable de fournir au travail, cependant il peut encore ſervir, ſur-tout s'il a de grands reins. On appelle *jambes de veau* celles qui ſont un peu pliées en arrière à l'endroit du genou; ce défaut eſt tout contraire à celui des chevaux braſſicourts & arqués, dont les jambes ſont pliées en devant.

Si le canon eſt trop menu, c'eſt une marque de foibleſſe pour la jambe dans les chevaux des pays froids & humides; il faut examiner s'il n'y a point de tumeurs ſur le canon, parce qu'elles dénotent des maladies de l'os, qui ſont plus ou moins dangereuſes.

Lorſque le nerf eſt menu, les chevaux ne réſiſtent pas long-temps à la fatigue, ils bronchent & leurs jambes s'arrondiſſent, c'eſt-à-dire que le nerf ne paroît plus détaché, c'eſt un indice de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 309 sur 615

de maladie: auſſi eſt-il néceſſaire de paſſer la main ſur le nerf pour ſentir s'il eſt dans l'état naturel, ſans tumeur & ſans engorgement; lorſqu'il ſe trouve peu éloigné de l'os, ce défaut fait donner à la jambe le nom de *jambe de bœuf* ou *de veau*, dans ce cas le nerf eſt menu & la jambe n'eſt pas long-temps ſaine: ſi le nerf devient trop petit près du genou, c'eſt ce qu'on appelle *nerf failli*, c'eſt une marque de foibleſſe dans cette articulation, mais elle eſt rare.

Les boulets menus ſont trop flexibles & ſujets par ce défaut aux tumeurs que l'on appelle des *mollettes*, cependant les chevaux qui ont la jointure du boulet un peu pliante, ont les reſſorts plus doux & plus plians; par conſéquent ils valent mieux pour le manège & pour la parade, mais ils ſont mauvais pour le tirage, & peu propres à reculer & à retenir dans les deſcentes. Lorſque le boulet eſt couronné, c'eſt-à-dire, lorſqu'il déborde tout autour plus que le ſabot ſans qu'il y ait de bleſſure ou d'autre accident qui ait cauſé ce défaut, c'eſt une preuve que la jambe eſt uſée, & on l'appelle *jambe boutée* ou *bouletée*.

Les paturons qui ſont trop menus, ou qui ſont longs & qui ſe ſoûtiennent ſi mal que l'ergot touche preſque toûjours la terre, n'ont jamais aſſez de force: lorſque cette partie, quoique longue, ſe maintient dans une bonne ſituation, c'eſt une marque qu'il y a de la force, ſur-tout dans le nerf, qui empêche le boulet de trop plier; alors le cheval n'eſt bon que pour la parade, & il ne réſiſte pas à la fatigue: dans l'un & dans l'autre cas on dit que les chevaux ſont *longs-jointés*, parce que les paturons portent auſſi le nom de *jointure*, comme nous l'avons déjà fait obſerver; ceux qui ont au contraire le paturon trop courts, ſont appelés *courts-jointés*. Si le genou, le canon & la couronne de ces chevaux ſe trouvent ſur une même ligne

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 310 sur 615

perpendiculaire, on dit qu'ils ſont *droits ſur leurs jambes*, & les maquignons les appellent *chevaux huchés;* ils ſont ſujets à broncher, à tomber & à devenir bouletés, ſur-tout ſi on laiſſe le talon trop haut: ils ſont auſſi plus incommodes pour le cavalier que ceux qui ſont longs-jointés. Il y a des chevaux qui ont l'un des côtés du paturon plus élevé que l'autre, c'eſt un défaut léger que l'on peut corriger par la ferrure, de même que celui qui rend le cheval droit ſur ſes jambes. Il ne faut pas que le poil du paturon ſoit hériſſé, ſur-tout près de la couronne, on ſeroit en droit de ſoupçonner que la gratelle farineuſe, que l'on appelle *peignes*, en ſeroit la cauſe.

Lorſque la couronne eſt plus élevée que le pied, c'eſt une marque que le pied eſt deſſéché, ou qu'elle eſt enflée: cette partie eſt fort expoſée aux coups que l'on appelle des *atteintes*, que le cheval reçoit d'un autre qui le ſuit, ou qu'il ſe donne en heurtant les pieds de derrière contre ceux de devant, ou en ſe bleſſant avec les crampons ou les clous à glace que l'on met aux fers.

Le pied trop petit à proportion du corps eſt foible & ſouvent douloureux, & a les talons ſerrés; celui qui a médiocrement de talon & peu d'épaiſſeur de pied, s'échauffe ſur un chemin dur, & le cheval boite: un pied qui eſt trop gros & dont la corne du ſabot & la ſole ont peu d'épaiſſeur, eſt appelé *pied gras*, c'eſt auſſi un pied foible; les chevaux qui ont les pieds trop grands ſont lourds & peſans.

La corne blanche eſt plus caſſante que la corne d'une autre couleur, c'eſt un défaut fort incommode; on le reconnoît aiſément, il ſuffit de voir ſi elle a été caſſée par les clous des fers. Les pieds cerclés ſont ceux dont le ſabot eſt cerclé tout autour par des ſortes de gouttières tranſverſales: cette irrégularité dans

l'accroiſſement de la corne vient de chaleur & de ſéchereſſe dans le pied, ce défaut rend ſouvent le cheval boiteux : ſi quelque partie de la corne eſt entamée & emportée, il s'en forme une nouvelle; on appelle ce remplacement un *quartier neuf* ou une *avalure*, parce que la nouvelle corne pouſſe l'ancienne en bas; c'eſt une difformité en ce que la nouvelle corne eſt plus raboteuſe, plus groſſe & plus molle que l'ancienne.

Lorſque les quartiers ſont trop ſerrés, que le ſabot eſt trop étroit auprès de la fente de la fourchette, que les talons ſont terminés en pointe & colés l'un contre l'autre, on dit que les *pieds ſont encaſtelés;* les talons & les quartiers ainſi conformés preſſent le petit pied, c'eſt-à-dire, un des os contenus dans l'intérieur du pied, dont nous ferons mention dans la ſuite, & font boiter le cheval, ou au moins ils l'empêchent de marcher à ſon aiſe. Si les talons ſont alongés en arrière, le pied eſt trop long & ſujet à l'encaſtelure, qui peut auſſi produire des ſeimes, c'eſt-à-dire, des fentes, qui ſont dans l'un des quartiers, & qui s'étendent quelquefois depuis la couronne juſqu'au bas du ſabot. Les talons foibles obéiſſent ſous la main, les talons bas ne ſont pas aſſez épais, ces deux défauts peuvent faire boiter le cheval, parce que les talons n'ont pas aſſez de réſiſtance.

Lorſque le ſabot eſt trop large par le bas & que les quartiers ſe jettent en dehors, on dit que *le pied eſt plat;* dans ce cas la fourchette porte ſur la terre, ce qui fait que le cheval boite ſouvent.

Il eſt ſujet à la même incommodité, & par la même cauſe, lorſque la corne de la fourchette eſt trop large, ce qu'on appelle *fourchette graſſe*, & ce qui arrive ordinairement lorſque les talons ſont bas; la fourchette maigre, ſerrée, petite & deſſéchée doit faire ſoupçonner une encaſtelure.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 312 sur 615

Lorſque la ſole eſt trop mince, elle eſt aiſément foulée; lorſqu'elle eſt trop haute & qu'elle déborde ſur la corne, c'eſt-à-dire, lorſque le deſſous du pied n'eſt pas creux, on dit que le cheval a le *pied comble*, il marche ſur la ſole, ainſi il doit ſe bleſſer & boiter; les chevaux qui ont les pieds ainſi conformés ne peuvent ſervir que pour la charrue.

Ce qui a été dit par rapport au canon, au boulet, au paturon, à la couronne & au pied des jambes de devant, ſervira pour les mêmes parties des jambes de derrière; il ne reſte donc qu'à parler de la cuiſſe & du jarret.

Les cuiſſes maigres, qui n'ont pas le gros de la cuiſſe bien exprimé, dénotent de la foibleſſe dans le train de derrière; lorſque les cuiſſes ne ſont pas ouvertes en dedans, c'eſt-à-dire, lorſqu'elles ſont trop près l'une de l'autre, on dit que le cheval eſt *mal gigoté*, c'eſt un ſigne de foibleſſe.

Les petits jarrets ſont foibles; on appelle *jarrets gras*, ceux qui ne ſont pas aſſez décharnés, ce défaut les rend ſujets à pluſieurs maladies, qui ſont la cauſe des maux de jambes; lorſque les jarrets ſont trop près l'un de l'autre, on dit que le cheval eſt *crochu* ou *jarté*, ou qu'il eſt *clos du derrière*, dans ce cas il eſt foible du train de derrière, cependant il peut avoir aſſez de reins; ſi le boulet, au lieu d'être à plomb ſous le jarret, comme il doit être naturellement, ſe trouve poſé en avant, c'eſt-à-dire, ſi le bas des jambes de derrière eſt trop en devant, le cheval paſſe auſſi pour être crochu; lorſque les jarrets ſont trop tournés en dehors, ils empêchent le cheval de s'aſſeoir ſur les hanches, c'eſt-à-dire, d'avoir la croupe plus baſſe que les épaules; les jarrets qui ſe jettent en dehors lorſque le cheval marche, & que l'on appelle pour cette raiſon *jarrets mous*, affoibliſſent toûjours le train de derrière; lorſque le boulet avance de façon que le

cheval n'appuie que ſur la pince, on l'appelle *rampin* ou *juché;* ce défaut augmente avec l'âge, & n'eſt indifférent que lorſqu'il vient de naiſſance, & qu'il eſt, pour ainſi dire, naturel.

Il faut conſidérer les jambes les unes par rapport aux autres, lorſque le cheval eſt arrêté & en repos, pour ſavoir ſi leur poſition n'eſt pas défectueuſe, car celles de devant peuvent être trop ſerrées par le haut, ce qui rend la démarche difficile, les jambes ſe touchant ſouvent lorſqu'elles ſont en mouvement, le cheval peut culbuter. Si les pieds de derrière ſont poſés trop en avant ſous le ventre, cette attitude prouve que le cheval eſt bien fatigué, il tâche de diminuer le poids qui porte ſur ſes jambes de devant en avançant celles de derrière ſous le corps autant qu'il eſt poſſible; lorſque les pieds de derrière ſont au contraire poſés en arrière, de ſorte que l'origine de la queue ne ſe trouve pas perpendiculairement au deſſus des jarrets, mais plus en avant, quoique cette ſituation ſoit mauvaiſe à l'œil, elle n'eſt pas fort nuiſible aux chevaux, ils peuvent ſeulement avoir les hanches trop longues, ce défaut ne les empêche pas de bien aller au pas, mais le train de derrière eſt plus tôt ruiné que dans un cheval différemment conformé: ceux qui n'ont pas le jarret reculé en arrière, comme il doit l'être naturellement, & dont les hanches, les jarrets & les jambes ſuivent une même direction en ligne droite, ne marchent que difficilement au pas; ſi le boulet eſt ſaillant en avant comme s'il étoit déboité, c'eſt encore une mauvaiſe poſition; les chevaux qui poſent leurs pieds ſur la pince, au lieu d'être poſés plats, ſont mal ſitués, & s'ils tournent en dehors les pieds de derrière, ils n'ont point de force dans les hanches en deſcendant, & ne peuvent reculer qu'à peine.

Les chevaux qui, étant arrêtés, meuvent alternativement leurs

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 314 sur 615

jambes au lieu de reſter tranquilles, ſont ſoupçonnés d'être excédés ou uſés par le travail, comme ceux qui poſent une des jambes de derrière ſur la pince, ou ceux qui avancent une des jambes de devant & qui demeurent dans cette attitude, ce que l'on appelle vulgairement *montrer le chemin de S.t Jacques;* cependant ces ſignes peuvent être équivoques, parce qu'ils ſont familiers à certains chevaux qui ſont inquiets & pleins d'ardeur, il y en a d'autres à qui ces mouvemens & ces mauvaiſes attitudes ſont naturelles; d'ailleurs une laſſitude momentanée peut en être la cauſe, & même faire tenir en l'air une jambe de devant, car il arrive aſſez ſouvent à ces animaux de ſe repoſer ſur trois jambes; mais s'ils appuient une jambe de derrière ſur la pince, tandis qu'une des jambes de devant eſt en l'air, c'eſt une marque certaine qu'ils reſſentent de la douleur dans les jambes.

Voilà la pluſpart des ſignes par leſquels on peut reconnoître les difformités & les défauts des chevaux, j'aurois pû en rapporter un plus grand nombre, mais j'ai été arrêté par la crainte de rendre ce détail trop long; je ne me le ſerois pas même permis, s'il n'étoit ici queſtion d'un animal qu'il importe de connoître, parce qu'on ne trouve que très-rarement des chevaux qui n'aient point de mauvaiſes qualités, & qu'il eſt très-difficile de ne ſe pas laiſſer tromper ſur les défauts des autres. Le choix de ces animaux demande beaucoup d'attention, auſſi les a-t-on examinés très-ſcrupuleuſement, car je ne crois pas qu'il y ait aucun autre animal ſur lequel on ait fait autant d'obſervations que ſur le cheval: tout ce que je viens de dire des différentes parties de ſon corps n'eſt que pour faire connoître par leur extérieur ce que l'on doit en attendre lorſqu'elles ſont en mouvement, c'eſt dans cet état que le cheval tourne toutes

ſes forces à notre avantage, qu'il nous obéit avec autant de docilité que de conſtance, & qu'il nous ſert avec autant de fineſſe d'inſtinct que de courage : c'eſt alors que l'on peut le juger avec le plus de certitude, puiſqu'il eſt dans l'exercice actuel de ſes bonnes ou de ſes mauvaiſes qualités.

M. de Buffon, dans ſon hiſtoire du cheval, a décrit ce bel animal dans l'état de repos & dans l'état de mouvement, & en expoſant ſes différentes allures, il a fait mention des défauts qui peuvent les vicier. M. de Buffon a conſidéré tous les chevaux en général, & a diſtingué les principales races de ces animaux ; il ne reſte donc plus qu'à détailler les différentes ſortes de chevaux que nous employons à divers uſages, & qu'à décrire le cheval comme individu, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour le comparer aux autres animaux, & diſtinguer ſon eſpèce relativement à toute autre.

Le mélange des différentes races de chevaux produit dans nos haras des poulains qui diffèrent, pour ainſi dire, tous pour la taille, les proportions du corps & les qualités du tempérament & de l'inſtinct, &c. c'eſt dans cette grande variété que l'on choiſit pour chaque uſage les chevaux qui paroiſſent y être le plus convenables ; ainſi on emploie différens chevaux pour les voyages, pour la guerre, pour le tirage, pour le bât, &c.

Les chevaux que l'on deſtine à ſervir de monture dans les voyages, & que l'on appelle *chevaux de maître*, doivent être dans la force de leur âge & de bonne taille pour réſiſter à la fatigue, il faut qu'ils aient la jambe ſûre, le pied bien fait, la corne bonne, la bouche légère & les mouvemens doux : on recherche ceux qui n'ont pas trop d'ardeur, mais qui ſont tranquilles ſans être pareſſeux ; pourvû qu'ils aient un grand pas, on n'exige pas d'autres allures pour les voyages : on rejette les

chevaux peureux & ceux qui ſont ſi délicats pour le manger, qu'on n'eſt pas aſſuré de trouver par-tout de quoi les nourrir : ces conditions ſont néceſſaires pour un cheval de maître, mais on n'en demande pas tant pour un cheval de ſuite, il ſuffit qu'il ſoit de taille étoffée & aſſez fort pour porter les fardeaux dont il eſt chargé, la bouche de ces ſortes de chevaux doit être auſſi ferme que la main qui les conduit peut être groſſière ; certaines gens montent auſſi en voyage des bidets qui vont l'amble ou qui aubinent.

On prend ordinairement des chevaux entiers pour ſervir de bidets de poſte, afin qu'ils réſiſtent mieux à leur pénible emploi ; il faut de plus qu'ils ſoient étoffés, courts & ramaſſés, qu'ils aient la jambe & le pied bons, & qu'ils galoppent aiſément ſans faire ſentir leurs reins ; on doit craindre qu'ils ne ſoient rétifs ou qu'ils n'aient des fantaiſies ; au reſte, on ne s'inquiète pas des qualités de leur bouche ni de l'élégance de leur taille.

On ne choiſit pour le manège, c'eſt-à-dire, on ne dreſſe pour la guerre que des chevaux qui ſoient beaux, légers, vigoureux, brillans & vifs, ils ne peuvent pas avoir la bouche trop bonne ni les mouvemens trop doux, il faut que leur pas & leur galop ſoient vifs & raccourcis, les jarrets & les reins bons, &c.

Les chevaux de guerre que montent les Officiers doivent être fins, ſenſibles, ſouples, adroits, courageux & légers, ceux qui ſont peureux, ou trop délicats, ou trop ardens, ne conviennent pas à ce genre de ſervice ; mais il ſuffit pour les chevaux de troupes qu'ils ſoient étoffés, robuſtes & bons trotteurs, qu'ils aient bien de la jambe & la bouche ferme.

On ne recherche que de beaux dehors dans les chevaux d'appareil, ainſi leurs principales qualités ſont la beauté du poil, de la figure & des crins ; mais il n'eſt pas moins néceſſaire qu'ils

qu'ils ſoient inquiets & relevés, qu'ils aient la bouche bonne & écumante, & qu'ils mâchent continuellement leur mors : les piaffeurs font un très-bon effet dans ce genre d'étalage, où il ſuffit d'avoir du faux brillant.

Lorſqu'on veut avoir un cheval ſur lequel on puiſſe prendre le plaiſir de la promenade, on le choiſit de taille médiocre, & pluſtôt petit que grand, parce que les mouvemens d'un double bidet ſont moins fatigans que ceux d'un grand cheval : il faut qu'il ſoit paiſible & qu'il marche très-bien le pas, on n'en exige pas trop de vigueur, il ſuffit qu'il ait jambe ſûre & la bouche bonne; les plus doux & les plus tranquilles des chevaux de ce genre ſont ceux que l'on appelle *des chevaux de femmes.*

Les chevaux de maître que l'on deſtine pour la chaſſe des chiens courans, doivent avoir de la vîteſſe, de la légèreté, du fond & de l'haleine; il faut qu'ils aient la bouche bonne, cependant s'ils l'avoient trop ſenſible, ce ſeroit un inconvénient à cauſe des branches qui touchent à la bride : on demande auſſi qu'ils ſoient froids, car s'ils ſe laiſſoient emporter au bruit du cor & des chiens, la tête pourroit leur tourner; on donne aux piqueurs des chevaux plus étoffés & plus communs, mais cependant prompts & vigoureux.

Pour chaſſer au chien couchant, on accoûtume les chevaux à entendre un coup de fuſil ſans s'effrayer, & on les appelle *chevaux d'arquebuſe ;* on les prend de la taille de double bidet, c'eſt-à-dire médiocre, afin qu'il ſoit plus facile de les monter; il faut qu'ils ſoient tranquilles & ſans aucune eſpèce de volonté, il ſuffit qu'ils marchent bien le pas.

En général, les chevaux de carroſſe doivent avoir un bon trot, les hanches baſſes, les reins droits & la tête haute, la

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 318 sur 615

bouche bonne, les jambes nerveuſes & les pieds bien conditionnés.

Pour les chaiſes de poſte, il faut que le cheval de brancart ſoit de bonne taille, étoffé & alongé, & qu'il trotte vîte facilement; il n'eſt pas néceſſaire que le bricolier, c'eſt-à-dire, celui qui porte le poſtillon, ſoit ſi étoffé, mais il doit avoir un galop raccourci & aiſé.

On prend ordinairement pour mettre aux charrettes, à la charrue, &c. des chevaux entiers, de race commune, & épais, que l'on appelle des *rouſſins*: comme ils tirent avec un colier, il eſt néceſſaire qu'ils ſoient bien étoffés, qu'ils aient le poitrail large & les épaules nourries.

Les chevaux de bât, qui ſervent à porter des fardeaux, doivent être étoffés & avoir les côtes larges & de bons reins; mais il faut que les chevaux de meſſager ſoient plus minces & plus légers, parce qu'ils vont ſouvent au trot *.

Voilà les principaux uſages auxquels les chevaux ſervent, & les principales qualités qui les y rendent propres: ceux qui viennent de race commune & groſſière ne ſont pas moins néceſſaires que les plus fins & les plus beaux, qui ne réſiſteroient pas ſi bien au travail pénible de la culture des terres & du tirage des voitures. Quand nous n'aurions donc que des chevaux de cette ſorte, ils ne ſeroient pas indignes de notre attention & de nos ſoins, par les ſervices qu'ils nous rendent pour les choſes les plus néceſſaires; ſi nous les mépriſons à d'autres égards, ce n'eſt que par la comparaiſon que nous en faiſons avec des chevaux nés dans un climat différent, & doués de qualités plus brillantes, mais ſouvent oppoſées à celles qui ſont les plus utiles

* Voyez le nouveau parfait Maréchal, par M. de Garſault, ſeconde édition, *page 44 & ſuivantes.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 319 sur 615

à l'homme. Un Naturaliſte s'élève au deſſus de toutes ces vûes particulières, pour ne conſidérer tous les chevaux enſemble que comme des individus appartenans à la même eſpèce: toutes les races qui proviennent de divers climats ne peuvent être regardées que comme des variétés, puiſque les différences que l'on y remarque, ne ſont conſtantes, pour ainſi dire, en aucun pays, & que la migration de ces races & leur mêlange dans l'accouplement les changent & les combinent preſque à l'infini dans la ſuite des générations, mais les parties eſſentielles à l'eſpèce ne peuvent être dénaturées par aucune de ces variations. Tous les chevaux ſe reſſemblent dans toutes les parties qui les conſtituent, relativement à l'eſpèce, par conſéquent, de quelque race qu'ils puiſſent être, ils ſont également propres à ſervir de ſujets dans les obſervations qui ont rapport à l'eſpèce des chevaux; auſſi n'ai-je pas fait grand choix pour ceux que j'ai obſervés, je les ai pris, à peu près, tels que j'ai pû les trouver, ſur-tout pour l'inſpection des parties intérieures.

Les précautions que l'on prend dans les haras pour faire naître des chevaux bien proportionnés dans toutes les parties de leur corps, les rendent fort différens à cet égard de ceux que produiſent des chevaux & des jumens de race commune & groſſière, qui ſont pris ſans choix ou qui ſe rencontrent par haſard: c'eſt pourquoi ſi l'on ne conſidéroit les chevaux que par rapport à leurs différentes races, on pourroit trouver des différences dans les meſures que l'on prendroit ſur eux pour déterminer les proportions des parties extérieures de leur corps; mais pour que l'inégalité des meſures fût ſenſible & conſtante, il faudroit comparer des chevaux choiſis dans les races les plus diſproportionnées entre elles pour la hauteur & la groſſeur des individus; ſi on comparoit au contraire toutes les races les unes

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 320 sur 615

aux autres, on n'auroit plus que des degrés de variété très-peu étendus, & des nuances fort légères en paſſant d'une race à une autre; on trouveroit même des différences plus marquées entre les individus d'une même race, de ſorte que les moyens que l'on donneroit pour reconnoître leur origine, la feroient le plus ſouvent méconnoître, & on attribueroit à une race, des chevaux qui viendroient d'une autre: de telles règles ne pourroient donc ſervir que pour juger des extrêmes, qui ſont toûjours aſſez reconnoiſſables, ſans que l'on ſoit obligé de deſcendre dans un auſſi grand détail. Mais la pluſpart des différences qui ſe trouvent entre les individus d'une même eſpèce, deviennent très-légères lorſqu'on les compare aux individus d'une autre eſpèce, c'eſt pourquoi il ne m'a pas paru néceſſaire de faire beaucoup de recherches pour avoir un cheval ſur lequel je puſſe prendre les meſures qui doivent être comparées aux meſures priſes ſur le corps des animaux des autres eſpèces; d'ailleurs on ſeroit fort embarraſſé dans ce choix, &, toute réflexion faite, on viendroit peut-être à préférer le cheval le plus commun du pays où l'on eſt, comme plus analogue aux autres animaux que l'on y obſerve: mais on pourroit auſſi regarder ce cheval de race groſſière, comme un individu qui auroit dégénéré dans ſon eſpèce, & qui ne pourroit la repréſenter qu'imparfaitement; c'eſt ce qui m'a déterminé à prendre les meſures dont il s'agit ſur un beau cheval d'Eſpagne, c'eſt par la même raiſon que nous avons fait graver la figure d'un beau cheval de chaſſe des écuries du Roi, de poil tigre, dont les taches étoient bai-brunes *(pl. 1)*. Il a été peint par M. Oudry, Peintre ordinaire du Roi, & Profeſſeur en ſon Académie Royale de Peinture & Sculpture, & on l'a copié ſous ſes yeux.

Le cheval d'Eſpagne dont il vient d'être fait mention, eſt

d'une taille médiocre, qui m'a paru la plus convenable à des obſervations pour leſquelles il ne falloit ni un grand cheval ni un petit, mais un individu reſſemblant au plus grand nombre des autres individus, & qui fût par conſéquent le plus éloigné des extrêmes, que l'on ne peut trop éviter lorſqu'on veut prendre une idée juſte des produits de la Nature, & en comparer différentes eſpèces. Le poil du cheval qui m'a ſervi de ſujet, eſt d'une longueur qui varie entre ſix lignes & un pouce & demi: ce cheval avoit ſix pieds un pouce de longueur meſurée en ligne droite, depuis l'entre-deux des oreilles juſqu'à l'anus, quatre pieds cinq pouces de hauteur priſe à l'endroit des jambes de devant, & autant à l'endroit des jambes de derrière, ce qui eſt un défaut; la longueur de la tête étoit d'un pied dix pouces depuis le bout des lèvres juſqu'à l'occiput: cette meſure jointe à celle qui s'étend tout le long du cou & du corps juſqu'à l'origine de la queue, donne près de huit pieds de longueur à ce cheval depuis le bout du muſeau juſqu'à l'anus, ce qui n'a pû être meſuré qu'à deux fois, parce que l'animal étant vivant, il n'étoit pas facile de lui faire lever le muſeau aſſez haut pour effacer autant qu'il eſt poſſible la courbure de l'occiput, comme on peut le faire ſur les animaux morts pour prendre cette meſure principale, qui doit s'étendre en ligne droite depuis l'extrémité des lèvres juſqu'à l'anus, & qui eſt la plus ſûre que l'on puiſſe avoir pour comparer enſemble des animaux de même eſpèce.

Le bout du muſeau avoit un pied quatre pouces de circonférence priſe entre les naſeaux & l'extrémité des lèvres; le contour de l'ouverture de la bouche étoit de onze pouces, meſurés ſur les lèvres depuis l'une des commiſſures juſqu'à l'autre; la mâchoire inférieure avoit cinq pouces de largeur à l'endroit

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 322 sur 615

de ſes angles, c'eſt-à-dire, à l'endroit où le canal de la ganache eſt le plus large & le plus près du goſier; les naſeaux ſont un peu plus éloignés l'un de l'autre par le haut que par le bas, l'eſpace qui les ſéparoit étoit de deux pouces & demi de largeur dans le milieu; il y avoit un pied un pouce & demi de diſtance entre l'angle antérieur de l'œil & le bout des lèvres, & cinq pouces entre l'angle poſtérieur & l'oreille; la longueur de l'œil, depuis l'un de ſes angles juſqu'à l'autre, étoit d'un pouce dix lignes, & l'ouverture de onze lignes, c'eſt-à-dire que les deux paupières s'écartoient l'une de l'autre juſqu'à cette diſtance lorſque l'œil étoit ouvert; celle qui ſe trouvoit entre les angles antérieurs des deux yeux, étoit de ſept pouces en ſuivant la courbure du chanfrein, & ſeulement de cinq pouces dix lignes en ſuppoſant cette diſtance en ligne droite; la tête avoit deux pieds dix pouces de circonférence, priſe devant les oreilles en paſſant en deſſous près du goſier; la longueur des oreilles étoit de cinq pouces & demi, & leur baſe avoit cinq pouces de largeur priſe ſur ſa courbure extérieure; les deux oreilles étoient éloignées l'une de l'autre de quatre pouces & demi dans le bas.

Le cou avoit environ deux pieds de longueur depuis la tête juſqu'aux épaules, deux pieds & demi de circonférence près de la tête, treize pouces de largeur depuis la crinière juſqu'au goſier, trois pieds ſept pouces de circonférence près des épaules, & un pied & demi de largeur; le corps avoit cinq pieds deux pouces de circonférence, priſe derrière les jambes de devant, ſix pieds un pouce dans le milieu à l'endroit le plus gros, & cinq pieds & demi devant les pattes de derrière; le bas du ventre étoit à la hauteur de deux pieds quatre pouces au deſſus de terre; le dos, ou les reins en termes de l'art, étoient concaves ſur leur longueur, & l'endroit le plus profond étoit éloigné de

deux pouces trois lignes de la ligne droite qui auroit paſſé ſur le garrot & ſur la croupe; le tronçon de la queue avoit un pied cinq pouces de longueur, & huit pouces de circonférence à ſon origine.

La longueur du bras étoit d'un pied cinq pouces depuis le coude juſqu'au genou, il avoit un pied quatre pouces de circonférence à ſa partie ſupérieure près du coude, & neuf pouces dix lignes dans ſa partie inférieure près du genou; le renflement que produit cette articulation étoit de trois pouces & demi de longueur, & de dix pouces & demi de circonférence; le canon avoit huit pouces de longueur & cinq pouces de circonférence, celle du boulet étoit de neuf pouces ſix lignes; le paturon avoit trois pouces de longueur & ſix pouces & demi de circonférence, celle de la couronne étoit de près d'un pied; il y avoit un pied quatre pouces & demi de hauteur depuis le bas du pied juſqu'au milieu du genou; la diſtance du coude au garrot étoit de deux pieds trois pouces, & celle du coude juſqu'au bas du pied de deux pieds ſix pouces; les deux bras étoient éloignés de cinq pouces dans le haut près du ventre; & les pieds ſeulement de trois pouces.

La cuiſſe avoit un pied & demi de longueur depuis le graſſet, c'eſt-à-dire, depuis l'endroit de la rotule juſqu'au jarret, & deux pieds huit pouces de circonférence meſurée près du ventre; la largeur de la cuiſſe, priſe de devant en arrière au deſſus du jarret, étoit de quatre pouces & demi, & la circonférence de onze pouces; le canon avoit un pied quatre pouces de longueur depuis le jarret juſqu'au boulet, & ſept pouces trois lignes de circonférence, celle du boulet étoit de onze pouces & demi; le paturon avoit trois pouces & demi de longueur, & deux pouces & demi de largeur, priſe de devant en arrière; la

circonférence de la couronne étoit d'un peu plus d'un pied; il y avoit un pied neuf pouces de hauteur depuis le bas du pied juſqu'au jarret.

Le ſabot avoit cinq pouces de longueur depuis la pince juſqu'au talon, quatre pouces de largeur d'un quartier à l'autre, environ trois pouces & demi de hauteur en devant, un pied de circonférence près de la couronne, & quinze pouces dans le bas.

Toutes ces dimenſions ſont autant d'élémens qui entreront dans la comparaiſon que nous ferons du cheval avec les autres animaux, mais elles ne nous repréſentent que des traits trop vagues & trop imparfaits pour donner une idée diſtincte de cet animal; il faudroit donc tâcher de les rapprocher & d'exprimer leur union pour parfaire une eſquiſſe. Le cheval a la tête alongée & le front aplati, les yeux éloignés l'un de l'autre & placés un peu de côté, les naſeaux ſont ouverts près de l'extrémité du muſeau, & ſa bouche eſt placée un peu en deſſous, de ſorte que la lèvre ſupérieure eſt plus avancée que celle de deſſous: cet enſemble lui donne un air de douceur & de docilité; le muſeau en entier, c'eſt-à-dire la partie inférieure de la tête, qui eſt compoſée par les deux mâchoires & le nez, & qui s'étend preſque juſqu'aux yeux, eſt fort longue en comparaiſon de l'eſpace qui ſe trouve entre les yeux & les oreilles: cette même partie eſt étroite, elle paroît comprimée ſur les côtés, & un peu arquée ſur la longueur du nez, que l'on appelle le *chanfrein;* les oreilles ſont terminées en pointe, élevées au haut de la tête, & placées l'une près de l'autre: ces traits donnent de la fineſſe à ſa phyſionomie; le front court & étroit, les oreilles pointées en avant, & les yeux prompts à s'animer, indiquent l'ardeur & le feu dont le cheval eſt ſuſceptible; ſa tête, qui eſt petite à proportion

proportion du corps, & ſon cou étroit, alongé & relevé, ſes jambes minces & longues indiquent ſa légèreté; les juſtes proportions de ſon corps & l'arrondiſſement de la croupe marquent ſa force; ſon cou robuſte & ſes jambes nerveuſes annoncent qu'il eſt ferme & aſſuré dans toutes ſes attitudes, & qu'il eſt capable de réprimer ſes efforts juſque dans la plus grande ardeur. Voilà ce qu'on pourroit juger du cheval à ne le voir que dans l'état de repos; mais dès qu'il ſe meut, il a une démarche fière & un port noble, tous ſes mouvemens ſont ſouples & lians, il ſe livre à la plus grande vîteſſe, & il ſupporte la plus grande fatigue : cet animal peut encore fournir à l'un & à l'autre de ces exercices, après avoir été à moitié uſé par le travail, ce qui prouve qu'il eſt auſſi-bien conſtitué à l'intérieur pour la force, qu'à l'extérieur pour l'élégance des proportions.

Avant que de donner le détail des obſervations que j'ai faites ſur les parties intérieures du cheval, il eſt néceſſaire de rapporter les principales dimenſions de l'individu qui m'a ſervi de ſujet pour cette deſcription, afin que l'on puiſſe juger de ſa taille : ce cheval ne marquoit plus & étoit âgé, je le fis tuer au commencement du printemps; il avoit ſept pieds de longueur meſurée en ligne droite depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue; la longueur de la tête, depuis le bout des lèvres juſque derrière les oreilles, étoit d'un pied huit pouces, & la circonférence, priſe au deſſus des yeux, de deux pieds & demi; le cou avoit un pied dix pouces depuis l'omoplate juſqu'à l'oreille, un pied onze pouces de circonférence près de la tête, & trois pieds auprès des épaules : la hauteur de ce cheval étoit de quatre pieds cinq pouces depuis terre juſqu'au garrot, & de quatre pieds trois pouces depuis le bas du pied juſqu'au deſſus de l'os de la hanche; le corps avoit quatre pieds ſept pouces

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 326 sur 615

de circonférence prise derrière les jambes de devant, cinq pieds quatre pouces au milieu du corps à l'endroit le plus gros, & quatre pieds neuf pouces devant les jambes de derrière : il pesoit environ quatre cens livres.

A l'ouverture de l'abdomen on n'a point vû d'épiploon sur les intestins, il étoit si court qu'ils le cachoient, de même que l'estomac; il n'a paru que des portions d'intestins qui occupent toute l'étendue du ventre en longueur & en largeur; leur figure & leur position sont remarquables, car on ne distingue d'abord que trois grosses poches placées les unes à côté des autres, comme on peut le voir dans la *planche 11*, où l'on a fait représenter une jument dont les intestins sont à découvert. Les portions d'intestins *(A B & C D)* appartiennent au colon, & la portion *(E F)* fait la plus grande partie du cæcum : outre ces trois poches il paroît encore quatre petites portions d'intestins, car on voit le colon à l'endroit marqué par *(H)*, le jejunum aux endroits *(I K)*, & l'ileum à celui qui est désigné par *(L)*; mais pour bien connoître ces portions d'intestins, il faut décrire le canal intestinal dans toute sa longueur pour la position & pour la figure.

Le duodenum, au sortir de l'estomac, s'étend en avant de la longueur de trois pouces, il se replie en dehors derrière le foie, & se prolonge en arrière sur une portion du colon jusqu'au milieu du flanc, où il se recourbe en dedans derrière le rein droit, & passe de l'autre côté vers le rein gauche. Le jejunum fait plusieurs circonvolutions dans la partie gauche de la région ombilicale, entre les dernières circonvolutions du colon & les branches gauches du double arc de cet intestin, dont nous parlerons dans la suite. L'ileum fait ces circonvolutions dans la région hypogastrique, dans le flanc gauche & dans une partie

de la région ombilicale, ſur l'extrémité poſtérieure des branches gauches du double arc du colon. Le cæcum va obliquement en avant dans la partie poſtérieure de l'abdomen, depuis la région iliaque droite *(E, pl. 11)* juſqu'au milieu du ventre, un peu du côté gauche *(F)*; quelquefois cet inteſtin ſe trouve placé dans le flanc droit, quelquefois auſſi il s'étend tranſverſalement de droite à gauche. Avant de décrire la poſition du colon, il faut faire remarquer qu'il forme, à quelque diſtance de ſa jonction avec le cæcum, deux groſſes poches oblongues, qui ne ſont ſéparées que par un étranglement, & qui ſont à peu près d'égale longueur; qu'enſuite il y a une partie qui eſt bien moins groſſe & à peu près auſſi longue que l'une des groſſes poches, & qui aboutit à une troiſième poche, dont la longueur eſt preſque la même que celle des deux premières. Le colon commence dans le flanc droit où il eſt joint au cæcum, & forme un arc *(ABCD)* qui environne le cæcum par devant & par les côtés : cet arc occupe le côté droit & le gauche de la partie inférieure de l'abdomen par ſes deux premières poches, dont l'étranglement ſe trouve derrière le diaphragme ſous l'eſtomac du côté gauche; le colon forme quelques ſinuoſités dans la région hypogaſtrique à l'extrémité de l'arc dont nous venons de parler, & en fait un ſecond qui s'étend ſur le premier auquel il adhère par un tiſſu cellulaire, & qui eſt terminé dans le côté droit par ſa troiſième poche, dont l'extrémité s'étend en arrière juſqu'au rein droit, & à gauche juſqu'à l'autre rein : au ſortir de cette poche, le colon forme des circonvolutions dans toute l'étendue du côté gauche ſur le jejunum, & ſur l'ileum pour la plus grande partie; enfin il ſe joint au rectum par une courbure qui vient du même côté : lorſque le cæcum eſt dans le flanc droit, les deux premiers arcs du colon ſont à gauche

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 328 sur 615

preſque en entier. On conçoit aiſément comment le déplacement du cæcum influe ſur la poſition du double arc du colon, par lequel il eſt en partie environné; il ſe rencontre des ſujets dans leſquels on ne voit à l'ouverture de l'abdomen que les trois groſſes portions du colon qui l'occupent d'un bout à l'autre; dans ce cas le cæcum eſt placé ſur les parties poſtérieures de ces trois portions du colon, & il s'étend de droite à gauche dans les régions iliaques & hypogaſtrique. Le colon va du flanc droit dans la région ombilicale, & ſe replie à gauche derrière le diaphragme, enſuite il ſe prolonge tout le long du côté gauche : voilà les deux premières poches du colon qui occupent le milieu & le côté gauche de l'abdomen, enſuite il ſe recourbe en haut ſur lui-même, & revient en avant vers le diaphragme, là il ſe replie à droite, & la troiſième poche s'étend tout le long du côté droit. Si on compare cette poſition du colon avec celle qui eſt repréſentée dans la *planche 11*, on verra qu'elles ſont à peu près les mêmes, puiſqu'elles ne diffèrent qu'en ce que la troiſième poche du colon, au lieu d'être ſur la première, comme dans la *planche 11*, ſe trouve à ſon côté droit, & la rejette dans le milieu de l'abdomen qui ſeroit reſté vuide par le déplacement du cæcum, dont la partie qui s'étendoit dans la région ombilicale eſt tombée dans la région iliaque gauche ſur l'extrémité poſtérieure des deux portions gauches du double arc du colon.

Malgré cette variété dans la poſition du cæcum & du colon, on voit que le cæcum ſe porte toûjours de droite à gauche plus ou moins obliquement ou tranſverſalement, & que le colon forme deux arcs poſés l'un ſur l'autre, qui ne ſe dérangent que dans les branches droites lorſqu'elles ſont placées l'une à côté de l'autre, au lieu d'être l'une ſur l'autre. Il faut auſſi remarquer

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 329 sur 615

que ces deux branches droites, qui ſont fort groſſes, ſur-tout celle du deſſus, & le cæcum, occupent le côté droit, de façon que les autres inteſtins ſont repouſſés à gauche pour la plus grande partie.

Avant de rapporter les dimenſions du canal inteſtinal, je dois faire obſerver que dans tous les animaux ſur leſquels j'ai pris ces meſures, j'ai toûjours fait enfler les inteſtins & les autres viſcères qui en étoient ſuſceptibles, pour avoir leur diamètre ou leur circonférence, & qu'on les a ſeulement enflés à l'aide d'un ſoufflet, comme ils pourroient l'être naturellement par la préſence des matières qu'ils renferment, en ſuppoſant qu'ils en fuſſent entièrement remplis, mais ſans les diſtendre au point de forcer les fibres & de les déſunir : on reconnoîtra dans les figures des planches les pièces qui ont été ſoufflées, par les ligatures qui ſont repréſentées telles qu'elles ont été faites ſur les pièces réelles qui ont ſervi de ſujet.

Les inteſtins grêles avoient cinquante-ſix pieds de longueur depuis le pylore juſqu'au cæcum, la circonférence du duodenum étoit de ſix pouces dans les endroits les plus gros, & de deux pouces trois lignes dans les plus étroits; le jejunum avoit auſſi différentes groſſeurs, la circonférence des endroits les plus gros étoit de cinq pouces neuf lignes; il y avoit beaucoup d'étranglemens à différentes diſtances, les plus proches n'étoient éloignés que de trois pouces, mais il s'en trouvoit qui étoient à un pied l'un de l'autre; les plus profonds réduiſoient l'inteſtin à deux pouces de circonférence, mais tous ces étranglemens n'étoient qu'apparens, car on pouvoit les faire diſparoître en conduiſant dans les endroits les plus ſerrés aſſez d'air pour les diſtendre au même point que les plus gros; l'ileum avoit ſept pouces de circonférence.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 330 sur 615

Le cæcum *(AB, pl. III, & fig. 1 de la pl. IV)* avoit deux pieds & demi de longueur; on a repréſenté cet inteſtin dans la *pl. III* avec une petite portion de l'ileum & une partie du colon, & dans la *fig. 1 de la pl. IV* ces mêmes parties ſont vûes par le côté oppoſé; la portion du colon *(GH)* qui eſt dans cette figure eſt beaucoup plus courte que celle de la *pl. III*. Le cæcum avoit deux pieds de circonférence à l'endroit le plus gros, qui ſe trouvoit à huit pouces de diſtance de ſon inſertion *(C, pl. III, & pl. IV, fig. 1)* avec l'ileum *(D)*; la circonférence du cæcum étoit d'un pied dix pouces auprès de cette inſertion, & d'un pied deux pouces à quatre pouces au deſſous de ſon extrémité, qui eſt conique & terminée en pointe *(B)*. La première partie du colon forme un cul-de-ſac *(E)* qui eſt recourbé en forme de croſſe *(pl. IV, fig. 1)* & terminé par une pointe crochue, c'eſt pourquoi on pourroit prendre cette cavité pour un ſecond cæcum, quelque diſproportion qu'il eût avec le premier: cette première portion du colon avoit un pied huit pouces de circonférence, celle de l'étranglement qui la ſépare du cæcum n'étoit que de treize pouces, elle avoit deux pieds un pouce de longueur ſur ſa grande courbure, les deux bouts n'étoient éloignés que de deux pouces & demi à l'endroit de la concavité de la croſſe; l'étranglement qui ſépare du reſte de l'inteſtin la partie du colon dont nous venons de parler, n'avoit que quatre pouces de circonférence; à un pouce & demi plus loin il ſe trouvoit un autre renflement plus petit *(F, pl. IV, fig. 1)* de forme arrondie, de huit pouces & demi de circonférence, & qui ſembloit être ſitué à côté de l'inteſtin; l'étranglement qui ſéparoit cette eſpèce de boule du reſte du colon, n'avoit que trois pouces & demi de circonférence, mais ce renflement n'eſt pas dans tous les individus. La partie du colon, qui forme l'arc inférieur

(ABCD, pl. 11) qui ſe voit à l'ouverture de l'abdomen, eſt compoſé de deux branches *(FG & HI, pl. 111)* qui ſont les deux premières poches du colon, entre leſquelles il y a un étranglement *(K)*; la première branche *(FG)* s'étend depuis le flanc droit juſqu'au diaphragme, & la ſeconde *(HI)* ſe prolonge depuis le diaphragme juſqu'à la région iliaque gauche; elles avoient chacune deux pieds un pouce de circonférence dans le milieu, celle de l'étranglement par lequel ſe réuniſſent les deux branches pour former un angle derrière le diaphragme, n'étoit que d'un pied cinq pouces; la branche droite avoit deux pieds trois pouces de longueur, & la gauche deux pieds ſept pouces : cette dernière branche ſe réduiſoit peu à peu à la circonférence de dix pouces & demi, enſuite l'inteſtin étoit de cette groſſeur ſur la longueur de deux pieds & demi, cette partie formoit la portion gauche *(LM)* de l'arc ſupérieur du colon; la portion droite *(NO)* étoit beaucoup plus groſſe; c'eſt la troiſième poche de cet inteſtin, ſa groſſeur augmentoit peu à peu ſur la longueur de deux pieds & demi, dans laquelle elle formoit un renflement *(O)* qui avoit deux pieds quatre pouces de circonférence à l'endroit le plus gros, & ſe réduiſoit enſuite à un pied cinq pouces; plus loin le colon *(P)* forme de petits renflemens dans leſquels les excrémens ſe moulent, ils n'avoient que ſept pouces & demi de circonférence, qui étoit à peu près la même dans tout le reſte de cet inteſtin & dans le rectum : cette dernière portion du colon & le rectum n'avoient en tout que huit pieds de longueur, mais la longueur du colon en entier & celle du rectum priſes enſemble, étoient de vingt-un pieds, auxquels il faut ajoûter celle des inteſtins grêles qui avoit cinquante-ſix pieds, pour faire la longueur du canal inteſtinal en entier, qui étoit de ſoixante-dix-ſept pieds, non compris le cæcum.

Il ſera plus aiſé d'expoſer la poſition de l'eſtomac du cheval, ſi on la compare à celle de l'eſtomac de l'homme; la grande courbure *(A, pl. V, fig. 1)* ſe trouve en deſſous dans tous les deux, & la partie inférieure de l'œſophage *(B)* dans le deſſus; mais le plan qui s'étend depuis la grande courbure juſquà l'œſophage, au lieu de ſuivre la longueur du corps comme dans l'homme, eſt ſitué tranſverſalement dans celui du cheval, de ſorte que la face qui eſt vis-à-vis les muſcles de l'abdomen dans l'homme, ſe trouve vis-à-vis le diaphragme dans le cheval; au reſte ces deux eſtomacs ont quelque reſſemblance entre eux pour la figure, qui approche dans l'un & dans l'autre de celle d'une cornemuſe. L'eſtomac du cheval eſt poſé plus à gauche qu'à droite, la partie gauche *(C)* eſt élevée & un peu recourbée en dedans, car après avoir été ſoufflée elle approchoit de la partie droite *(D)* juſqu'à la diſtance d'un pouce & demi, qui étoit l'eſpace qu'occupoit l'œſophage; l'eſtomac avoit trois pieds un pouce de circonférence priſe ſur la grande convexité & ſur le vuide qui eſt à l'endroit de l'œſophage, celle du grand cul-de-ſac, meſurée au côté gauche de l'œſophage, étoit d'un pied ſept pouces & demi; ce cul-de-ſac ne s'étendoit que de trois pouces quatre lignes dans le côté gauche; la partie droite de l'eſtomac, meſurée à ſon extrémité près du rétréciſſement du pylore *(E)*, avoit ſeize pouces de circonférence, celle du milieu *(A)* de l'eſtomac, priſe au côté droit de l'œſophage, étoit d'un pied dix pouces. L'eſtomac des chevaux a ordinairement, au milieu de la grande courbure, un enfoncement plus ou moins profond, & qui s'étend en remontant de chaque côté, mais il n'étoit pas ſenſible dans celui qui a été deſſiné; le pylore avoit cinq pouces de circonférence, le commencement du duodenum à l'endroit le plus gros *(F)*

un

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 333 sur 615

un pied, l'œſophage quatre pouces près de l'eſtomac, l'enfoncement de la partie ſupérieure de l'eſtomac avoit au côté droit de l'œſophage quatre pouces de profondeur au deſſous de la partie droite & de la partie gauche.

La partie ſupérieure de l'eſtomac eſt revêtue intérieurement d'une membrane liſſe, de couleur de chair pâle *(A, pl. V, fig. 2,* dans laquelle on a repréſenté l'eſtomac ouvert) qui s'étend plus loin à gauche qu'à droite autour de l'orifice *(B)* de l'œſophage *(C)*, & qui eſt une continuation de la membrane qui le tapiſſe intérieurement. On diſtingue les bords qui terminent cette membrane ſur les parois intérieures de l'eſtomac; ils ſont dentelés & plus élevés que le velouté qui revêt le reſte de ce viſcère. Il s'eſt trouvé un grand nombre de vers dans cet eſtomac, comme dans tous les autres eſtomacs des chevaux que nous avons ouverts, au nombre de plus de ſoixante, dont il y en avoit de mâles & de femelles, & d'âges très-différens; j'ai compté juſqu'à ſix cents ſoixante de ces vers dans un ſeul eſtomac, & outre cela il y en avoit encore pluſieurs à l'anus; mais nous n'en avons point vû dans le canal inteſtinal : ces vers ſont oblongs & de différentes grandeurs, les plus petits n'avoient que trois lignes de longueur & environ une ligne de diamètre; la longueur des plus grands étoit de huit lignes, la largeur de trois lignes, & l'épaiſſeur de deux lignes; les uns avoient une couleur jaunâtre, & les autres étoient rougeâtres, ſur-tout les plus petits. Ces inſectes ont l'extrémité antérieure plus petite que la poſtérieure, ce qui rend leur figure conique; le corps eſt entouré de huit ou neuf cercles, ſur leſquels il y a de petites pointes aſſez fermes *(Voyez planche V, figures 3 & 4* où ces vers ſont repréſentés de grandeur naturelle); lorſqu'on les regarde par-deſſous, on voit à leur extrémité antérieure des

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 334 sur 615

crochets *(fig. 3)*, à l'aide desquels ils s'attachent de façon qu'ils ne sont pas entraînés par les alimens ; les pointes qui sortent du corps contribuent aussi à les affermir, car elles sont dirigées en arrière : nous avons toûjours trouvé ces vers, dans le commencement du duodenum près du pylore, en plus grand nombre qu'en aucun autre endroit ; ils sont rangés les uns contre les autres, comme on le voit en *D (pl. V, fig. 2)*, leur partie antérieure est enfoncée dans de petites cavités qu'ils ont creusées sur les parois de l'intestin ; ils se dispersent aussi dans toute l'étendue de l'estomac ; & on y voit différens endroits *(E F)* du velouté, qui paroissent avoir été rongés & détruits ; on a observé que quelquefois ils y font des trous & y causent la gangrène [a], & on prétend que ces vers sont produits par des mouches qui entrent dans l'anus des chevaux pour les y déposer, ou au moins des œufs qui éclosent bien-tôt : ces insectes parcourent, dit-on, toute la longueur du canal intestinal & parviennent jusqu'à l'estomac, mais n'y restent qu'un certain temps, après lequel ils reviennent à l'anus ; on en a vû sortir dans les mois de mai & de juin, pour se métamorphoser dans l'espèce de mouche que l'on croit qui les reproduit de nouveau [b]. Ce n'est pas ici le lieu de faire l'histoire de ces mouches ni de ces vers, si ce n'est pour les rapports qu'ils ont avec le cheval. Il n'est pas douteux qu'ils ne soient funestes à un grand nombre de chevaux, puisqu'ils peuvent causer des ulcères dans leur estomac, & même le percer. On prétend que les huiles ne les font pas mourir comme tant d'autres insectes ; mais on les recommande contre les vers blancs, qui sont

[a] Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, *année 1746, page 39.*

[b] Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes, *tome IV, page 541 & suivantes.*

pointus par les deux bouts, & qui ont juſqu'à un demi-pied & plus de longueur, & contre ceux dont la figure reſſemble à une groſſe aiguille, on dit qu'ils ſont fort dangereux [a]; je n'en ai jamais trouvé dans les chevaux que j'ai fait ouvrir, mais j'y ai ſouvent rencontré des vers longs, & quelquefois de petits vers plats, très-blancs, & formés de pluſieurs anneaux. On a propoſé les remèdes mercuriels contre les vers coniques, mais on ne les a pas éprouvés, cependant cet objet eſt intéreſſant; d'ailleurs, l'eſtomac & les inteſtins du cheval ſont conformés de façon à attirer l'attention des Médecins auſſi-bien que des Naturaliſtes; la digeſtion s'y opère d'une manière particulière, puiſque l'eſtomac eſt fort petit en comparaiſon du corps de l'animal, & que le colon a au contraire des poches très-grandes qui ſemblent ſuppléer à l'eſtomac. On ſait déjà que la conformation de ce viſcère s'oppoſe au vomiſſement par l'inſertion de l'œſophage, qui eſt oblique & comprimée par un ſphincter, & en partie occupée par un rebord, &c. [b] L'étendue du colon & ſa poſition doivent auſſi influer ſur l'eſtomac, & en général ſur la conſtitution du cheval, ſur ſes fonctions, ſur ſes maladies, &c. mais avant que d'aller plus loin à ce ſujet, il faut ſe rappeler que notre objet eſt de comparer les différentes eſpèces d'animaux, pour tirer enſuite de cette comparaiſon des lumières qui retomberont ſur chacune en particulier, c'eſt pourquoi je reviens à la deſcription du cheval.

Le foie s'étendoit preſque autant à gauche qu'à droite, il étoit diſtingué en quatre lobes, dont l'un eſt placé contre le

[a] Nouveau parfait Maréchal, par M. de Garſault, *page 220.*

[b] Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, *année 1746, page 23 & ſuivantes.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 336 sur 615

diaphragme dans le milieu ; il y avoit trois échancrures assez profondes dans la partie inférieure de ce lobe, le ligament suspensoir passoit dans la première échancrure à gauche, il n'y avoit qu'un seul lobe du côté gauche, dans le bas ; la partie droite du foie étoit composée de deux lobes, dont l'un étoit le plus grand de tous, l'autre étoit très-petit & situé derrière le grand ; il y avoit dans le petit lobe une sciſſure qui le partageoit en deux parties inégales, qu'on pourroit ne prendre dans plusieurs individus que pour des éminences ou des prolongemens, plustôt que pour un lobe séparé. Le foie avoit un pied & demi dans sa plus grande étendue, celle du lobe droit étoit de dix pouces & demi de haut en bas ; le lobe gauche avoit neuf pouces de longueur, & celle du lobe moyen n'étoit que de huit pouces & demi ; ce foie pesoit quatre livres trois quarts, il n'y avoit point de véſicule du fiel, mais le canal hépatique étoit fort gros ; la couleur de ce viscère étoit noirâtre, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

La figure de la rate approchoit de celle d'un triangle alongé ; elle étoit située obliquement, la base en haut & en arrière, & la pointe en bas & en avant ; elle se trouvoit posée contre l'estomac dans le côté gauche : la rate étoit longue de neuf pouces trois lignes, sa base avoit quatre pouces & demi de longueur, la plus grande épaisseur étoit de dix lignes, elle pesoit douze onces & demie, elle étoit de couleur grise au dehors, & d'un rouge noirâtre au dedans.

Le pancréas est situé entre le rein gauche, l'estomac, le duodenum, le foie & la première portion du colon, sur la troisième poche de cet intestin ; sa figure est irrégulière, cependant il a trois branches, l'une aboutit au duodenum, c'est la plus courte, une autre s'étend sous le rein droit, & la troisième va

juſqu'au rein gauche; ces trois branches forment, en ſe réuniſſant, une maſſe plate, que l'on pourroit appeler *le corps du pancréas*; ſa plus grande épaiſſeur n'étoit que d'un demi-pouce.

Les reins avoient à peu près la figure d'un trèfle, dont les vaiſſeaux émulgens auroient repréſenté le pédicule; cette figure ſe trouvoit quelquefois arrondie: le rein droit étoit plus avancé d'un pouce, & plus gros que le gauche, il avoit cinq pouces de longueur & autant de largeur au deſſus & au deſſous de l'enfoncement qui étoit de deux pouces; le rein gauche étoit plus étroit à ſa partie antérieure, le baſſinet des reins paroiſſoit fort petit à proportion de leur groſſeur, les mamelons ſe réuniſſoient les uns aux autres dans les parois du baſſin.

Le centre nerveux du diaphragme étoit fort étendu, il avoit un pied trois pouces de largeur dans le milieu, & neuf pouces depuis la veine-cave juſqu'à la partie voiſine du ſternum, & il s'étendoit en arrière juſqu'à la dernière des fauſſes côtes: il eſt très-mince; la partie charnue n'avoit qu'une ligne d'épaiſſeur auprès du centre nerveux, mais elle étoit plus épaiſſe près des côtes, elle avoit ſept pouces de largeur ſur les côtés, & quatre pouces au deſſus du ſternum; le pilier gauche du diaphragme eſt beaucoup plus petit que le droit, leurs tendons ſe réuniſſoient entre la première & la ſeconde des vertèbres des lombes, & le tendon commun aboutiſſoit à la dernière.

Le poumon droit n'étoit compoſé que d'un ſeul lobe, dont la partie antérieure étoit échancrée ſur le bord inférieur; le poumon gauche n'avoit auſſi qu'un lobe, mais ſa partie antérieure étoit échancrée en deux endroits du bord inférieur: il ſe trouvoit un troiſième lobe fort petit en comparaiſon des autres, qui étoit ſitué près de la baſe du cœur, & qui s'étendoit à droite & à gauche, ce petit lobe tenoit en partie au lobe droit.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 338 sur 615

Le cœur étoit ſitué dans le milieu de la poitrine entre les quatrièmes & les cinquièmes côtes, la baſe en haut & la pointe en bas & un peu en arrière ; il paroiſſoit gros à proportion de l'animal & fort pointu, ſa baſe avoit un pied trois pouces de circonférence, ſa hauteur étoit de ſix pouces & demi depuis la pointe juſqu'à la naiſſance de l'artère pulmonaire, & de cinq pouces & demi depuis la pointe juſqu'au ſac pulmonaire ; l'aorte a un pouce cinq lignes de diamètre, pris de dehors en dehors au ſortir du cœur, & elle ſe partage en deux branches.

La langue avoit un pied de longueur, & trois pouces depuis le filet juſqu'à l'extrémité qui eſt arrondie, aſſez mince, & large de deux pouces : cette largeur ſe réduiſoit à un pouce à l'endroit qui eſt entre les premières dents molaires. La partie antérieure de la langue, depuis cet endroit, étoit liſſe ſans aucuns filets ni éminences ſenſibles, il y avoit ſeulement quelques mamelons ronds & plats ſur les côtés un peu en deſſous : la partie moyenne étoit couverte de filets ſi fins, qu'ils formoient une ſorte de velouté ; on voyoit entre les dernières dents mâchelières deux glandes qui avoient chacune un demi-pouce de longueur ſur environ une ligne & demie de largeur ; ces glandes étoient environnées d'une ſorte de calice, & peu élevées, l'extrémité poſtérieure de la langue étoit couverte de tubercules glanduleux aſſez gros, qui ſe touchoient les uns aux autres ; il y avoit ſur les faces inférieures quelques tubercules ronds & plats, & de chaque côté une glande ſillonnée.

Le palais étoit traverſé par environ dix-ſept ſillons courbes & convexes en devant, les plus larges ſe trouvoient ſur la partie antérieure du palais entre les barres, ils avoient environ huit lignes de largeur, la hauteur de leurs bords étoit de trois lignes : la partie du milieu eſt moins élevée ; les ſillons de la partie

poſtérieure du palais ſont partagés en deux parties égales par une ſorte de canal longitudinal.

L'épiglotte eſt pointue & terminée par un globule, de ſorte qu'elle reſſemble au croupion d'une poule, qui ſeroit aplati; les bords de l'entrée du larinx, formés par les cartilages ariſténoïdes, avoient chacun environ un pouce de longueur & trois lignes d'épaiſſeur, c'eſt-à-dire, de largeur; ils étoient éloignés de ſept lignes à leur extrémité inférieure.

Le cerveau avoit quatre pouces neuf lignes de longueur, trois pouces ſept lignes de largeur, & deux pouces d'épaiſſeur; la longueur du cervelet étoit de deux pouces huit lignes, ſa plus grande largeur de deux pouces une ligne, & ſa plus grande épaiſſeur d'un pouce quatre lignes : le cerveau peſoit quatorze onces, & le cervelet deux onces.

Le ſcrotum *(A, pl. VI)* étoit à neuf pouces de diſtance de l'anus, il s'étendoit en bas au deſſous du ventre de la longueur d'un demi-pied, & il n'y avoit que trois pouces & demi d'intervalle entre le ſcrotum & l'orifice du prépuce; on a ſenti le gland qui en étoit éloigné à une auſſi grande diſtance.

La verge avoit un pied de longueur depuis la bifurcation du corps caverneux *(B)* juſqu'à l'extrémité du gland *(C)*; la circonférence du corps de la verge *(D)* dépouillée de la peau, étoit de quatre pouces & demi; le prépuce *(E)* eſt fort grand, il formoit pluſieurs plis; le gland avoit une figure preſque cylindrique d'un demi-pied de longueur & de trois ou quatre pouces de circonférence, & plus à ſon extrémité; le bout de l'urètre étoit détaché du gland de la longueur d'un demi-pouce.

On n'a ſû juſqu'ici ſur les mamelles des chevaux que ce qu'en a écrit Ariſtote, qui dit qu'ils n'en ont point, excepté

ceux qui reſſemblent à leur mère [a] : ce grand Naturaliſte n'admet donc les mamelles dans les chevaux que comme une exception qui n'a lieu que pour certains individus. D'après Ariſtote on a dit la même choſe des ſolipèdes mâles en général [b] ; mais de tous les auteurs qui l'ont cité, je n'en connois point qui aient décrit les mamelles des chevaux, qui reſſemblent à leur mère, ou qui aient ſeulement déſigné le lieu où elles ſe trouvoient, ce qui ſemble prouver qu'aucun ne les avoit vûes ; par conſéquent on étoit en droit de croire que les chevaux n'avoient point de mamelles, d'autant plus que l'exception que fait Ariſtote, de ceux qui reſſemblent à leur mère, eſt trop vague, & que cette reſſemblance n'eſt pas aſſez exprimée pour qu'un tel indice pût faire découvrir leurs mamelles ; auſſi n'étoient-elles pas connues lorſque M. de Buffon a dit dans cet ouvrage [c], que l'on ſavoit depuis Ariſtote que le cheval n'avoit point de mamelles ; cela étoit vrai alors, & le ſeroit encore ſi on ne les avoit pas vûes depuis. Il falloit, pour les trouver, être conduit par une analogie auſſi ſûre que celle que l'on obſerve entre certains animaux, qui ſe reſſemblent à tant d'égards que l'on eſt porté à douter des différences qu'on leur attribue juſqu'à ce qu'on en ſoit bien certain ; auſſi lorſque j'ai comparé l'âne au cheval, ces deux animaux m'ont paru avoir tant de reſſemblance l'un à l'autre, que je crus que le cheval devoit avoir des mamelles, parce que j'en avois vû à l'âne, & que je devois les chercher ſur le prépuce du cheval, parce que l'âne a les ſiennes ſur ſon

[a] *Equi mammas non habent, niſi qui matri ſimiles prodiere.* De part. Anim. lib. IV, cap. 9.

[b] *Solidungula maſcula mammas non habent præterea quæ matribus ſimilia ſunt.* Rai ſynop. meth. Anim. quad. &c. pag. 64.

[c] Vol. I, page 38.

prépuce.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 341 sur 615

prépuce. Étant dirigé par la poſition des mamelles de l'âne, je regardai préciſément à l'endroit où étoient celles du cheval, & je les vis à l'inſtant : ſans cette induction je ne les aurois pas vûes, car elles ſont ſi peu apparentes qu'on pourroit ne pas les apercevoir, quoiqu'on jetât les yeux deſſus; c'eſt pourquoi je ſuis entré dans ce détail avant que de faire la deſcription des mamelles du cheval. Le prépuce de cet animal forme une ſorte de bourrelet autour de l'orifice par lequel la verge ſort, c'eſt ſur ce bourrelet, du côté du ſcrotum, que ſont placées les mamelles; il y en a deux *(F F)* l'une à côté de l'autre à environ un demi-pouce de diſtance; on les diſtingue en ce que la peau eſt un peu élevée à l'endroit de chaque mamelle, & qu'au milieu de cette petite élévation, qui eſt circulaire & qui a environ dix lignes de diamètre, on voit un orifice très-petit, mais bien ſenſible lorſqu'on l'a une fois aperçû; & quoique cet orifice, qui eſt celui du mamelon, ne pénètre pas loin dans la peau, ſi on fait une inciſion qui paſſe dans le milieu de ſa cavité, on reconnoît de part & d'autre l'échancrure qui en faiſoit partie: voilà ce que j'ai vû ſur quelques chevaux, mais ce n'a pas été ſur le plus grand nombre, car dans la pluſpart de ceux que j'ai obſervés, je n'ai pû reconnoître aucun veſtige certain des mamelons, quoique les mamelles fuſſent bien reconnoiſſables par leur élévation dans quelques-uns, tel que celui qui a ſervi de ſujet pour la *planche V*; mais dans les autres il n'a paru ni mamelles ni mamelons, il eſt vrai qu'ils étoient vieux & qu'ils avoient le prépuce flétri, ce qui pourroit faire croire que les mamelles étoient affaiſſées &, pour ainſi dire, détruites, & qu'elles ne ſe trouvent que dans les jeunes ſujets, dont toutes les parties ſont ſaines & fraîches. Ce ſeroit là mon opinion, ſi je n'en étois éloigné par l'autorité d'Ariſtote, qui mérite d'autant

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 342 sur 615

plus de confiance ſur ce ſujet, qu'on ne peut pas douter qu'il ne fût bien inſtruit du fait : puiſqu'il ſavoit que certains chevaux n'avoient point de mamelles, & que d'autres en avoient, il pouvoit auſſi avoir des raiſons pour diſtinguer ceux-ci par la reſſemblance qu'il leur attribue par rapport à leur mère; car quoique le produit d'un cheval & d'une jument ne reſſemble pas aſſez à ſa mère pour être femelle comme elle, cependant s'il y a beaucoup de reſſemblance à d'autres égards, pourquoi n'y en auroit-il pas auſſi par rapport aux mamelles, qui ſont bien conſtantes dans la mère & aſſez bien formées pour qu'elle en puiſſe donner au fœtus ? au lieu que ſi ce fœtus reſſemble aſſez au père, non ſeulement pour être mâle comme lui, mais encore s'il lui reſſemble plus qu'à la mère par d'autres parties, il n'eſt pas étonnant que cette reſſemblance s'étende auſſi juſqu'aux mamelles, & que le fœtus n'en reçoive point d'un père qui n'en a point, ou qui en a de ſi petites & ſi peu marquées, qu'il n'en communique rien au fœtus. On pourroit faire encore bien d'autres raiſonnemens ſur cette matière, mais il faudroit auparavant que les faits fuſſent bien conſtatés, & qu'on ſût préciſément ſi les mamelles s'oblitèrent dans certains chevaux ou ſi elles leur manquent en tout temps, & ſi ceux qui en ont reſſemblent plus à leur mère qu'à leur père, &c. c'eſt aux obſervateurs, qui peuvent ſuivre les générations des chevaux dans des haras, à éclaircir ces doutes: quoiqu'il en ſoit de tous ces faits, il eſt dès-à-préſent bien certain, comme l'a dit M. de Buffon [a], que les mamelles ne ſont pas un caractère aſſez conſtant, ni même aſſez évident pour être employé dans des diviſions méthodiques des quadrupèdes, telles que M. Linnæus les a faites [b]; l'exemple

[a] Vol. I, page 34.

[b] *Car. Linnæi ſyſtema naturæ, &c.*

du cheval pourroit en être une preuve ſuffiſante, mais nous en rapporterons encore d'autres dans la ſuite de cet ouvrage.

Le teſticule gauche *(G)* eſt repréſenté à découvert, & le droit eſt cenſé être reſté ſous le ſcrotum; ils ont la figure d'un ovoïde aplati, de trois pouces trois lignes de longueur ſur deux pouces trois lignes à l'endroit le plus large, & un pouce & demi d'épaiſſeur; la ſubſtance intérieure étoit d'une couleur griſe tirant ſur le brun; l'épididyme *(H)* ſort de la partie antérieure & adhère à la membrane vaginale, ſur laquelle il s'étend à quelque diſtance de l'extrémité antérieure du teſticule, en parcourant une ligne à peu près parallèle à cette même extrémité. En ouvrant l'épididyme, on voit très-diſtinctement les vaiſſeaux dont il eſt compoſé, ils ſont jaunâtres & pelotonnés en pluſieurs petits paquets: la largeur de l'épididyme eſt de huit lignes ſur la partie antérieure *(I)* du bord ſupérieur du teſticule, & de cinq lignes ſur la partie poſtérieure *(K)*, l'épaiſſeur eſt de deux à trois lignes ſur ce même bord du teſticule. Lorſque l'épididyme eſt parvenu vis-à-vis le bout poſtérieur du teſticule, il ſe replie ſur lui-même, & forme le canal déférent, qui fait pluſieurs ſinuoſités fort apparentes, & qui ſont raſſemblées en une pelote aſſez groſſe *(L)*; les canaux déférens *(MN)*, avoient deux lignes de diamètre ſur la longueur d'un pied deux pouces; plus loin ils deviennent beaucoup plus gros *(O)*, car ils avoient juſqu'à quinze lignes de circonférence, ſur la longueur d'environ ſept pouces, & le reſte juſqu'à l'urètre étoit long de trois pouces, & n'avoit qu'une ligne de diamètre. La cavité des canaux déférens étoit un peu plus grande dans la portion la plus groſſe que dans les autres, mais non pas à proportion de la groſſeur du canal, parce que les parois ſont beaucoup plus épaiſſes dans cet endroit, & qu'il y a de plus que dans les autres une

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 344 sur 615

ſubſtance compoſée de glandes qui s'ouvrent par pluſieurs petits orifices dans l'intérieur du canal, dont la longueur, depuis les teſticules juſqu'à l'urètre, étoit d'un pied onze pouces.

Il y a deux cordons *(PQ)* qui tiennent, par une de leurs extrémités, aux premières vertèbres de la queue, & qui ſe joignent enſemble au deſſous de l'anus *(R)* après l'avoir entouré; leur diamètre étoit d'environ trois lignes, ils s'étendoient le long de la verge ſur l'urètre *(S)*, & ils aboutiſſoient au prépuce, &c. *(T)*, ces cordons ſe trouvent dans beaucoup d'autres animaux: il ſera queſtion ailleurs de l'uſage de ces parties.

La veſſie *(V)* avoit la figure d'une poire renverſée, dont le pédicule tiendroit au gros bout, & c'eſt à ce gros bout qu'étoit ſon col; elle avoit quatorze pouces de circonférence ſur ſon grand diamètre, dix pouces au gros bout; dans d'autres chevaux la veſſie eſt de figure ovoïde & preſque cylindrique. Le commencement de l'urètre avoit deux pouces & demi de circonférence; la longueur de ce canal étoit d'environ ſept pouces depuis la veſſie juſqu'à la bifurcation du corps caverneux.

Il ſe trouve derrière la veſſie deux groſſes véſicules *(XX)*, une de chaque côté, qui étoient oblongues, & qui avoient un demi-pied de longueur, & environ quatre pouces de circonférence; elles ont chacune un col qui communique à l'urètre par une ouverture aſſez large, qui eſt au côté extérieur de l'orifice des canaux déférens: il y avoit trois lignes d'intervalle entre les ouvertures des véſicules, & elles n'étoient éloignées que d'environ un pouce & demi du col de la veſſie. Il y a ſur chacune des véſicules une glande placée du côté du rectum un peu en dehors, qui avoit un pouce & demi de longueur, dix lignes de largeur, & trois à quatre lignes d'épaiſſeur, & qui s'ouvre dans l'urètre au côté extérieur de l'orifice de chacune des

véſicules; à trois pouces de diſtance de ces glandes on en voit deux autres *(YY)* ſur l'urètre, qui ſont à peu près auſſi groſſes que les précédentes, & qui communiquent dans l'urètre par pluſieurs petits orifices, diſpoſés en deux rangs l'un à côté de l'autre, ſur des lignes qui ſuivent la longueur d'une portion de l'urètre. Voilà de grands réſervoirs dans les parties de la génération du cheval; mais il y a encore d'autres animaux qui en ont de plus vaſtes à proportion de la grandeur de leur corps, par exemple, le cochon d'Inde. Nous ne ferons aucunes réflexions à ce ſujet avant que d'avoir décrit les animaux qui y ont rapport.

Après cet expoſé des parties de la génération du mâle, nous paſſons à celles de la femelle. La jument qui a ſervi de ſujet a été tuée à l'âge de onze ans, au commencement du printemps; ſa longueur, meſurée en ligne droite depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, étoit de ſix pieds trois pouces; la tête avoit un pied ſept pouces & demi depuis le bout des lèvres juſque derrière les oreilles, un pied deux pouces de circonférence priſe ſur les coins de la bouche, & deux pieds quatre pouces derrière les yeux; la longueur du cou étoit d'un pied huit pouces depuis l'omoplate juſqu'à l'oreille, & ſa circonférence d'un pied dix pouces priſe auprès de la tête, & de deux pieds onze pouces auprès des épaules; le corps avoit quatre pieds trois pouces & demi de circonférence derrière les jambes de devant, quatre pieds onze pouces au milieu à l'endroit le plus gros, & quatre pieds un pouce devant les jambes de derrière; la hauteur depuis terre juſqu'au garrot, étoit de quatre pieds trois pouces, & de quatre pieds un pouce & demi depuis terre juſqu'à la crête de l'os des iles.

Il n'y avoit que quinze lignes de diſtance entre l'anus & la

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 346 sur 615

vulve, dont la longueur étoit de quatre pouces; les deux mamelles ſe trouvoient à neuf pouces de diſtance de la vulve, & les deux mamelons n'étoient ſéparés que par un eſpace d'un pouce & demi: l'extrémité inférieure de chaque mamelle, c'eſt-à-dire, la partie la plus prochaine du mamelon, eſt creuſe, & la cavité eſt diviſée par une cloiſon mitoyenne en deux loges, l'une en devant & l'autre en arrière: chaque loge communique au dehors par un tuyau qui paſſe dans le mamelon, & les orifices extérieurs de ces deux tuyaux ſe trouvoient à environ une ligne de diſtance, & placés l'un derrière l'autre; les cavités des mamelles avoient deux pouces de profondeur depuis le mamelon juſqu'à la ſubſtance glanduleuſe qui eſt dans leur fond, ſur laquelle il y a pluſieurs inégalités: les cavités des mamelles ſont les réſervoirs qui retiennent le lait qui ſort des glandes mammaires, & elles ſe dilatent & s'agrandiſſent à proportion de l'abondance de cette ſécrétion. *Voyez la deſcription des mamelles de la Chèvre.*

Le gland du clitoris *(A, pl. IV, fig. 2)* avoit onze lignes de largeur ſur ſix lignes d'épaiſſeur, & ſeulement quatre lignes de hauteur; il eſt logé dans une cavité à la commiſſure inférieure des lèvres de la vulve *(B)*, ſon prépuce eſt fort ample & laiſſe un eſpace *(C)* vuide du côté de la commiſſure des lèvres: on trouve de l'autre côté du clitoris une ouverture *(D)* qui communique à une cavité, dans laquelle on auroit pû loger une fève.

Le vagin avoit un pied de longueur, étant enflé ſa circonférence étoit d'un pied cinq pouces dans la portion *(E)* qui eſt au-delà de l'orifice de l'urètre *(F)*, & ſeulement d'un pied un pouce ſur la portion antérieure *(G)*, qui eſt la plus étroite.

Il y a un repli *(H)* derrière l'orifice de l'urètre, ce repli eſt

formé par une duplicature de la membrane intérieure du vagin, il eſt dirigé en devant : on l'a relevé dans cette figure, pour mettre à découvert l'orifice de l'urètre: il a huit pouces de longueur, & un pouce & demi de largeur dans le milieu.

La veſſie eſt fort petite en comparaiſon de la groſſeur de l'animal, elle étoit preſque ronde, cependant elle avoit un pied & demi de circonférence ſur ſon grand diamètre, & un pied quatre pouces ſur le petit; celle de l'urètre étoit de trois pouces, & il n'avoit que ſeize lignes de longueur.

L'orifice de la matrice *(I)* débordoit d'un demi-pouce dans le vagin, & la largeur du bourrelet que forment ſes bords, étoit de quatre lignes. L'ouverture eſt ronde; la matrice avoit huit pouces & demi de longueur depuis ſon orifice juſqu'à la bifurcation des cornes, l'entrée ou le cou étoit étroite; la portion antérieure avoit neuf pouces de circonférence, la portion poſtérieure ſeulement ſept pouces & demi, les cornes ſept pouces auprès de la bifurcation, & ſeulement quatre pouces & demi à leur extrémité, elles s'étendent en arrière & ſe recourbent en dehors & en deſſous; elles avoient environ ſept pouces de longueur meſurée en ligne droite.

Le teſticule étoit à trois pouces de diſtance de l'extrémité de la corne, la trompe s'étend ſur une ligne courbe qui avoit ſept pouces de longueur, & forme ſur cette ligne quantité de petites ſinuoſités, en ſerpentant; enfin elle aboutit à un pavillon. Le teſticule eſt aſſez reſſemblant à un rein, il avoit un pouce huit lignes de longueur ſur treize lignes dans le milieu à l'endroit le plus large, & environ huit lignes d'épaiſſeur.

Le fœtus du cheval eſt enveloppé d'un amnios, d'un chorion & d'une membrane allantoïde, qui eſt fort différente de celle des ruminans. L'ouraque ſort de l'ombilic *(A, pl. VII)* avec

deux artères & une veine *(B)*; après l'avoir soufflé dans un fœtus avorté, j'ai trouvé qu'il avoit jusqu'à cinq pouces de circonférence à quelque distance de l'ombilic, & qu'en se prolongeant plus loin il se réduisoit à un pouce de tour dans quelques endroits; la longueur de la portion *(C)* du cordon ombilical, qui s'étend depuis l'ombilic jusqu'à l'épanouissement de l'amnios *(D)*, étoit d'un pied & demi; l'ouraque se termine par un orifice *(E)* qui est sur un des côtés du cordon ombilical, à l'endroit où l'amnios s'épanouit & s'étend de toutes parts pour envelopper le fœtus; à ce même endroit le prolongement de l'ouraque forme l'allantoïde qui se replie autour du cordon, & en revêt tout le reste *(F)* qui avoit un pied de longueur & qui étoit tors. Lorsque l'allantoïde est parvenue jusqu'au bout, elle s'étend sur le chorion, le tapisse intérieurement & y adhère, de sorte que ces deux membranes ne font qu'une seule enveloppe, dont les parois intérieures sont formées par l'allantoïde *(G)*, & les extérieures par le chorion que l'on voit à l'endroit *(H)* qui est replié pour le faire paroître dans la figure; la circonférence du cordon étoit de deux pouces auprès du nombril, & de trois pouces auprès du chorion, parce que les vaisseaux devenoient plus gros à mesure qu'ils en approchoient.

L'allantoïde du cheval ne forme pas une bourse entière comme celle des ruminans, mais elle revêt environ la moitié des parois de la cavité qui est entre l'amnios & le chorion. Pour avoir une idée de cette cavité & de l'espace qu'occupe l'allantoïde, représentons-nous d'abord l'amnios comme un sac dans lequel le fœtus est renfermé, & l'allantoïde avec le chorion comme un autre sac qui enveloppe le premier & qui est plus grand, de sorte qu'il reste un intervalle entre deux; la seconde portion du cordon ombilical traverse cet espace en se prolongeant depuis

depuis le premier ſac juſqu'au ſecond, l'allantoïde revêt cette portion du cordon & toutes les parois intérieures du ſecond ſac, dont les parois extérieures ſont formées par le chorion, comme nous l'avons déjà dit : l'orifice de l'ouraque, qui eſt dans le cordon ombilical près de l'amnios, fournit une liqueur épaiſſe & de couleur rouſſe, qui eſt contenue dans la cavité dont nous venons d'indiquer les limites, & qui a une odeur urineuſe, ſur-tout lorſqu'elle eſt échauffée; on y trouve des corps d'une conſiſtance aſſez ſolide, auxquels on a donné le nom d'*hippomanès*.

On croyoit que le poulain apportoit en naiſſant cet hippomanès ſur ſon front; j'ai reconnu que ce fait eſt faux, parce qu'il eſt impoſſible que l'hippomanès, qui eſt renfermé entre l'amnios & l'allantoïde, touche au fœtus ni ſorte au dehors ſans que les membranes qui le contiennent ſoient déchirées; mais lorſque la jument met bas, & que le fœtus rompt ſes enveloppes en venant au jour, alors l'hippomanès tombe avec la liqueur qui s'écoule, car pour l'ordinaire il n'a aucune adhérence avec l'amnios ni avec l'allantoïde, ainſi rien ne le retient. Le fœtus ne peut l'apporter ſur ſon front que dans un ſeul cas, qui doit être fort rare; c'eſt lorſqu'en ſortant de ſes enveloppes il les rompt & qu'il en reſte une partie colée ſur ſa tête : l'hippomanès doit naturellement ſe trouver dans cette partie des enveloppes, parce que ſon poids le fait gliſſer dans l'endroit le plus bas, qui eſt auſſi le plus près de la vulve, au moment où la tête du fœtus y paſſe. Il ſuffiſoit de bien connoître la poſition de l'hippomanès, pour être aſſuré qu'il ne pouvoit pas tenir au front du poulain; mais pour ſavoir quelle étoit ſa nature, il falloit examiner ſa forme, qui varie toûjours dans différens ſujets, & ſouvent dans le même, & enſuite trouver quel rapport

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 350 sur 615

il pouvoit avoir avec les membranes entre leſquelles il eſt renfermé, ou avec la liqueur qui l'environne. Après avoir fait ouvrir pluſieurs jumens pleines, je reconnus que ni la grandeur des hippomanès ni leur nombre n'étoient pas fixes, & que l'on en trouvoit pluſieurs dans le même ſujet; que les uns n'étoient pas plus gros que des pois, & peut-être moins, tandis que les autres peſoient juſqu'à cinq ou ſix onces, & avoient trois ou quatre pouces de longueur, un pouce & demi ou deux pouces de largeur, environ un demi-pouce d'épaiſſeur & plus, tant pour ces dimenſions que pour le poids; que leur ſubſtance étoit de couleur d'olive brune & de conſiſtance viſqueuſe, qu'ils avoient des cavités irrégulières dans leur intérieur, ſans qu'on y pût diſtinguer aucune apparence de vaiſſeaux ni d'aucune organiſation d'un corps vivant. Je remarquai qu'ils étoient compoſés de couches additionnelles & que leurs bords étoient frangés, c'eſt-à-dire, terminés par des filamens qui flottoient dans la liqueur environnante: toutes ces remarques, jointes à celles que je fis ſur la couleur de la liqueur & ſur ſon peu de tranſparence, me firent juger que l'hippomanès étoit un ſédiment de cette liqueur; il étoit aiſé de le prouver, j'en fis évaporer, & je trouvai que la ſubſtance du réſidu reſſembloit ſi parfaitement à celle des hippomanès que l'on s'y ſeroit trompé ſi la forme avoit été la même; mais pour cela il auroit fallu que ce réſidu ſe fût formé de même que l'hippomanès en flottant dans la liqueur, comme cela arrive entre les enveloppes du fœtus, où le ſédiment accroît peu à peu par différentes couches, ſe plie & ſe replie ſur lui-même, de façon qu'il reſte des cavités au dedans, & étant déplacé par le mouvement de la mère ou du fœtus, ſes bords s'éraillent par différens chocs, ou ſeulement par celui de la liqueur, il s'en détache des parcelles qui ne ſont pas

encore bien collées au reſte de l'hippomanès; quelquefois il tient à l'allantoïde, & il attire en dedans une petite partie de cette membrane, de ſorte qu'elle prend la forme d'un filet qui ſemble être le pédicule de l'hippomanès; mais il eſt aiſé de le détacher de ce prétendu pédicule, auquel il n'eſt que collé ſans aucune adhérence : voyez à la *pl. VII* un gros hippomanès *(I)* qui tient à un filet *(K)* formé par l'allantoïde, & deux autres plus petits *(L M)* qui tiennent auſſi à l'allantoïde. On a repréſenté le plus gros *(A, pl. IX, fig. 1.)* de grandeur naturelle avec une portion de l'allantoïde *(B)*; on a ouvert ce même hippomanès *(fig. 2)* pour faire voir l'intérieur, où on ne diſtingue aucune marque d'organiſation; les deux petits *(fig. 3 & fig. 4)* ſont auſſi de grandeur naturelle avec des portions de l'allantoïde en forme de pédicule *(A B)*. Je ne ſuivrai pas plus loin cette diſcuſſion dont j'ai rendu compte à l'Académie Royale des Sciences *, il me ſuffit d'en avoir rappelé ici les principaux faits; d'ailleurs il ſera fait mention dans d'autres endroits de cet ouvrage, de pluſieurs matières analogues à celle de l'hippomanès, car le cheval n'eſt pas le ſeul animal qui en ait, j'en ai trouvé dans tous ceux où j'ai vû une allantoïde.

Le chorion touche à la matrice par ſa face extérieure, celui d'un fœtus avorté quelque temps avant ſon terme avoit deux prolongemens en forme de corne qui correſpondoient à celles de la matrice; ils étoient à ſept ou huit pouces de diſtance l'un de l'autre, & avoient onze à douze pouces de longueur, & trois à quatre pouces de largeur à la baſe, & ils ſe terminoient en pointe à l'extrémité; on voyoit ſur ces prolongemens des rugoſités, ou, pour ainſi dire, des plis ſéparés par des cavités aſſez profondes : ces inégalités donnoient plus d'épaiſſeur au chorion,

* Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, *années 1751 & 1752.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 352 sur 615

la cavité qui reſtoit au dedans de ces prolongemens étoit fort petite & ne s'étendoit pas juſqu'à leur extrémité; il y avoit auſſi des replis ſur la face extérieure du chorion aux environs de la baſe des cornes, & ſur quelques autres endroits; le cordon ombilical tenoit au chorion à l'endroit qui étoit entre les deux prolongemens, il y avoit auſſi de gros vaiſſeaux, ce qui prouve que ces prolongemens ou ces cornes font la fonction de placenta.

Pour faire voir le fœtus du cheval tel qu'il ſe trouve dans la matrice avec toutes ſes enveloppes, on a tué, au milieu du mois de mars, une jument pleine qui étoit loin du temps où elle auroit mis bas, car on croyoit qu'elle n'avoit été faillie que dans le mois de juin précédent: après que la matrice & le vagin furent enlevés, je les fis ouvrir & je diſpoſai le tout comme on le voit dans la *planche VIII*, où on peut reconnoître le clitoris *(A)*, l'anus *(B)*, le rectum *(C)*, la partie poſtérieure *(D)* du vagin, l'orifice *(E)* de l'urètre, la membrane *(F)* qui recouvre cet orifice, le canal de l'urètre *(G)*, la veſſie *(H)*, les uretères *(I I)*, la continuation du vagin *(K)*, l'orifice de la matrice *(L)*, le fœtus *(M)* qui paroît à travers l'amnios *(N)*, la portion *(O)* du cordon ombilical qui s'étend depuis le fœtus juſqu'à l'endroit *(P)* où l'amnios s'épanouit, la portion *(Q)* du cordon ombilical qui ſe prolonge depuis l'amnios juſqu'à l'endroit *(R)* où l'allantoïde ſe joint au chorion, l'allantoïde *(S)*, le chorion *(T)* vû par ſa face extérieure, un hippomanès *(V)* tenant à un pédicule *(X)*, le chorion tenant à la matrice *(Y)* par des rides qui s'y insèrent, l'ovaire gauche *(Z)*, & enfin les vaiſſeaux ſpermatiques *(a)*.

Le fœtus repréſenté dans cette planche étoit femelle, il avoit deux pieds un pouce & demi de longueur meſurée en ligne droite depuis le bout des lèvres juſqu'à l'anus, la circonférence

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 353 sur 615

de ſon corps, priſe derrière les pattes de devant, étoit d'un pied & un demi-pouce, & il avoit un pied quatre pouces & demi de hauteur depuis terre juſqu'au garrot; le poil ne paroiſſoit pas encore, mais les châtaignes étoient bien marquées ſur les pattes de devant. On voit les parties de la génération de ce fœtus à la *planche VII* avec le rectum *(O)*, l'anus *(P)* & la veſſie *(Q)*, elle étoit cylindrique, & reſſembloit mieux à un canal qu'à une veſſie, ſans doute parce que la liqueur qui auroit pû la dilater en y ſéjournant, s'écouloit par l'ouraque; les uretères *(RR)*, le vagin *(S)* & le corps de la matrice ſont ouverts, on y reconnoît l'orifice *(T)* de l'urètre & la naiſſance *(V)* de la membrane qui devoit le recouvrir dans la ſuite, les cornes *(XX)* de la matrice, leurs cavités *(YY)*, les teſticules *(ZZ)*, les trompes de Falloppe *(aa)* & les vaiſſeaux ſpermatiques *(bb)*: les teſticules étoient fort gros, l'un peſoit cinq gros & trente grains, & l'autre vingt-ſix grains de moins; ceux de la mère n'étoient guère plus peſans, car l'un ne peſoit que cinq gros & ſoixante grains, & l'autre un gros de plus. Les teſticules du fœtus étoient ovoïdes, liſſes & unis comme ceux du mâle peuvent l'être dans l'âge adulte; on voit un des teſticules du fœtus de grandeur naturelle *(pl. IX, fig. 5)*, il eſt ouvert dans la *fig. 6*, ſa ſubſtance paroiſſoit glanduleuſe & de couleur brune; les teſticules de la mère étoient oblongs & de figure irrégulière, on en a repréſenté un dans la *figure 7* avec les parties qui l'environnoient, le corps du teſticule dans le pavillon *(A)*, la trompe *(B)*, l'extrémité de la corne de la matrice *(C)*: il y avoit à l'extérieur de ces teſticules pluſieurs inégalités formées par des véſicules lymphatiques fort groſſes, & il s'eſt trouvé ſur l'un un corps glanduleux aſſez étendu; la ſubſtance de l'intérieur étoit vaſculeuſe & blanche, on y voyoit des cavités de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 354 sur 615

différentes grandeurs formées par des véſicules lymphatiques. *Voyez l'un des teſticules ouverts dans la figure 8.*

Je reviens au fœtus mâle avorté, dont j'ai déjà parlé au ſujet de ſes enveloppes & de ſon cordon ; après l'en avoir détaché il peſoit environ trente livres, il avoit deux pieds dix pouces de longueur meſurée en ligne droite depuis l'extrémité du muſeau juſqu'à l'origine de la queue ; la longueur de la tête, depuis le bout des naſeaux juſque derrière les oreilles, étoit de dix pouces & demi ; le muſeau avoit huit pouces trois lignes de circonférence priſe ſur les coins de la bouche, celle de la tête étoit d'un pied deux pouces meſuré à l'endroit le plus gros en paſſant ſur la convexité qui eſt au milieu du ſommet au-delà des yeux, il y avoit huit pouces depuis l'articulation de l'épaule juſquà l'angle de la mâchoire inférieure, la circonférence du cou étoit de neuf pouces & demi dans le milieu de ſa longueur ; le corps avoit un pied & demi de circonférence priſe derrière les jambes de devant, un pied ſept pouces au milieu du corps, & un pied cinq pouces devant les jambes de derrière ; les dernières fauſſes côtes n'étoient éloignées de la crête des os des iles que d'un pouce & demi, la queue avoit ſept pouces depuis ſon origine juſqu'à l'extrémité du tronçon ; la hauteur de ce fœtus étoit de deux pieds depuis terre juſqu'au garrot, le bras avoit ſept pouces de longueur depuis le coude juſqu'au poignet, le canon ſix pouces & demi, & le reſte de la jambe trois pouces & demi ; la longueur de la cuiſſe étoit de neuf pouces depuis le graſſet juſqu'au jarret, le canon avoit huit pouces, & le reſte de la jambe de derrière quatre pouces : on ſentoit les teſticules ſous la peau à l'origine de la verge.

La poſition & la figure des inteſtins & de l'eſtomac étoient les mêmes que dans le cheval qui a été décrit. Les inteſtins

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 355 sur 615

grêles avoient vingt pieds de longueur depuis le pylore juſqu'au cæcum, le colon & le rectum avoient cinq pieds & demi juſqu'à l'anus, ce qui fait en tout vingt-cinq pieds & demi. La longueur du cæcum étoit de ſix pouces & demi; le duodenum avoit deux pouces quatre lignes de circonférence à quelque diſtance du pylore, deux pouces ſeulement dans le reſte de ſa longueur, & un peu moins dans quelques endroits; celle du jejunum étoit de deux pouces & demi, & ſeulement de deux pouces deux lignes dans quelques portions; l'ileum avoit deux pouces trois lignes de tour, & il diminuoit de groſſeur juſqu'à ſon inſertion avec le cæcum, où il n'avoit qu'un pouce ſept lignes; la circonférence du cæcum étoit de trois pouces neuf lignes à ſon commencement, & devenoit plus petite à meſure qu'il approchoit de ſon extremité qui étoit arrondie & n'avoit qu'un pouce neuf lignes de circonférence; la groſſeur du colon auprès de l'inſertion de l'ileum étoit de trois pouces neuf lignes comme celle du cæcum à l'endroit où ces deux inteſtins ſe joignent l'un à l'autre; à un pouce plus loin il y a un étranglement dans le colon qui le réduit à un pouce ſept lignes de tour, au-delà de cet étranglement le colon devenoit plus gros & formoit ſon premier arc compoſé des deux premières poches; cette portion avoit quatorze pouces de longueur, & cinq pouces de circonférence à l'endroit le plus gros, qui ſe trouvoit dans le flanc gauche, enſuite la groſſeur de l'inteſtin diminuoit ſur la longueur de neuf pouces, de façon qu'il n'avoit qu'un pouce & demi de tour à l'endroit le plus étroit; plus loin le colon ſe renfle ſur la longueur d'environ ſept pouces, & forme ſa troiſième poche dont la circonférence étoit de cinq pouces & demi; le reſte de cet inteſtin & le rectum n'avoient que deux pouces trois lignes de tour, excepté auprès de l'anus, où la circonférence

du rectum étoit de trois pouces & demi ; l'eſtomac avoit neuf pouces de circonférence meſurée de droite à gauche, & en la prenant auprès de l'œſophage & ſur le milieu de l'eſtomac elle étoit de cinq pouces & demi.

Le foie & la ratte avoient la même figure & la même ſituation que dans le cheval, la plus grande étendue du foie étoit de neuf pouces de droite à gauche, & ſa plus grande épaiſſeur d'un pouce & demi ; il peſoit une livre trois quarts, ſa couleur étoit rougeâtre à l'extérieur & à l'intérieur ; la ratte avoit cinq pouces & demi de longueur, & deux pouces & demi de largeur à la baſe, ſa plus grande épaiſſeur étoit d'un demi-pouce ; elle peſoit une once ſept gros, ſa couleur étoit rougeâtre.

Les reins reſſembloient à ceux du cheval, mais le rein droit ſe trouvoit plus élevé que le gauche de la moitié de ſa longueur, qui étoit de trois pouces & demi ; ils avoient deux pouces & demi de largeur dans le milieu au deſſus & au deſſous de leur enfoncement, dont la profondeur étoit d'environ un pouce.

Le centre nerveux du diaphragme avoit cinq pouces & demi de largeur, & deux pouces d'étendue depuis la veine-cave juſqu'au bord qui eſt vis-à-vis le ſternum ; la largeur de la partie charnue étoit de deux pouces & demi ſur les côtés, & ſeulement de quinze ligne contre le ſternum.

Les teſticules étoient ovoïdes comme dans le cheval, ils avoient deux pouces de longueur ſur un pouce de largeur, & un demi-pouce d'épaiſſeur, leur ſurface étoit parſemée de vaiſſeaux ſanguins fort apparens ; le corps de la verge avoit cinq pouces de longueur depuis la bifurcation du corps caverneux juſqu'au gland, qui étoit long d'environ un pouce ; le corps de la verge,

ſéparé

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 357 sur 615

ſéparé de la peau, avoit un pouce & demi de circonférence, & le gland deux pouces à l'endroit de la couronne; la longueur des canaux déférens étoit de neuf pouces depuis l'épidydime juſqu'à l'urètre; la figure de la veſſie reſſembloit à celle d'une poire, elle avoit onze pouces de circonférence ſur ſon grand diamètre, & ſept pouces ſur le petit à l'endroit le plus gros; celle de l'ouraque étoit d'un pouce quatre lignes au ſortir de la veſſie, dont le col avoit deux pouces de tour.

Le thymus s'étendoit depuis les premières côtes juſqu'à la baſe du cœur; ce viſcère, les poumons, &c. reſſembloient à ces mêmes parties, vûes dans le cheval: le poumon ayant été mis dans l'eau au ſortir du corps du fœtus, a ſurnagé; mais après avoir été ſoufflé, il eſt tombé au fond.

Le détail des parties molles ſeroit immenſe, même pour les obſervations qui n'ont rapport qu'aux dimenſions & aux proportions de chaque partie, ſi on vouloit le ſuivre dans toute ſon étendue; d'ailleurs la multitude des objets que nous nous ſommes propoſés dans cet ouvrage, nous oblige de nous reſtreindre; c'eſt pourquoi nous allons paſſer au ſquelette du cheval: celui qui a ſervi de ſujet pour cette deſcription a cinq pieds neuf pouces de hauteur depuis terre juſqu'au deſſus de l'apophyſe épineuſe des vertèbres dorſales, qui eſt la plus longue, & qui formoit l'endroit le plus élevé du garrot dans le cheval dont ce ſquelette a été tiré. Nous ne ſuivrons pas le plan d'hippoſtéologie par lequel on diviſe le ſquelette du cheval en trois parties, dont la première comprend les os de l'avant-main, qui ſont ceux de la tête, les vertèbres du cou, les os des épaules & des jambes de devant; les vertèbres dorſales, les lombaires, les côtes & le ſternum compoſent la ſeconde partie ſous le nom d'*os du corps*; les os de l'arrière-main, qui ſont ceux du baſſin,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 358 sur 615

de la queue & des jambes de derrière, ſont la troiſième partie *. Cette méthode peut être convenable à ceux qui traitent uniquement du cheval, mais elle entraîneroit des inconvéniens en Hiſtoire Naturelle, lorſqu'on voudroit comparer tous les animaux les uns aux autres & les rapporter à l'homme; pour faciliter cette comparaiſon, nous appliquerons les dénominations des os du ſquelette humain à ceux du cheval & des autres animaux, & nous ſuivrons l'ordre uſité dans l'anatomie de l'homme en commençant par la tête.

La tête du cheval eſt compoſée à peu près du même nombre d'os que celle de l'homme, ces os ſe correſpondent & ont beaucoup de reſſemblance pour leur figure & leur poſition dans l'un & dans l'autre, cependant il y a de grandes différences dans leurs proportions & dans la figure totale qui réſulte de leur aſſemblage; la plus grande vient de l'étendue des mâchoires & du nez du cheval, & de la petiteſſe du crâne en comparaiſon de ces mêmes parties dans l'homme. Le corps de la mâchoire inférieure du cheval eſt terminé en avant par les dents, de ſorte qu'il n'y a point de menton; la réunion des deux mâchoires forme l'extrémité inférieure *(A, pl. X)* de la face; les branches de la mâchoire du deſſous ſont ſi élevées, qu'elles ſoûtiennent l'os occipital *(B)* auſſi haut que les pariétaux & plus haut que le frontal, au moyen de quoi le front du cheval, au lieu d'être convexe, forme un plan qui eſt dans la même direction que les os propres du nez: ces os ſont fort grands, & s'étendent preſque auſſi loin en avant que les mâchoires.

Ainſi, en ſuppoſant que la tête du ſquelette du cheval ſoit poſée de façon que le corps de la mâchoire inférieure ſerve de baſe *(A C)*, & qu'on la regarde par devant, la face ſupérieure eſt

* École de cavalerie, par M. de Garſault, *page 169*.

inclinée en avant & préſente un ovale, dont l'extrémité antérieure eſt plus alongée & plus baſſe que l'extrémité poſtérieure; cet ovale a deux pieds de longueur dans le ſujet que nous décrivons, & huit pouces quatre lignes dans la plus grande largeur, qui ſe rencontre à l'endroit des bords ſupérieurs des orbites : cette tête, vûe de côté, a la figure d'un triangle irrégulier, dont la baſe *(AC)* eſt d'environ quinze pouces de longueur; l'un des côtés du triangle eſt formé par la longueur de la face ſupérieure *(AB)* de la tête, & l'autre côté par la hauteur de la face *(CB)* que la tête préſente étant vûe par derrière : cette face eſt oblongue, elle a environ un pied de hauteur ſur ſix pouces trois lignes de largeur dans le milieu de la hauteur; l'articulation de la tête avec la première vertèbre du cou ſe trouve dans la partie ſupérieure de cette face. Si on retourne la tête du cheval, & ſi on la poſe ſur ſa face ſupérieure pour la voir par-deſſous, on y trouve une figure ovale, à peu près comme par-deſſus, & on voit en relief l'angle que forme le corps de la mâchoire inférieure, enfin ſi on la regarde par-derrière dans cette poſition, elle ſe trouve terminée par l'os occipital, qui a une forme bizarre que l'on a comparée à celle d'une tête de bœuf.

On concevra aiſément que toutes ces figures, qui nous ont ſervi d'objets de comparaiſon, ne ſont ni régulières dans les contours, ni planes, ni pleines dans leurs aires, elles ne ſont au contraire que les apparences groſſières de différens grouppes qui, quoique très-irréguliers, doivent être comparés à des figures régulières, pour qu'il en réſulte quelque idée préciſe.

En examinant le détail des os qui compoſent la face ſupérieure de la tête du cheval, on eſt étonné de l'étendue des os propres du nez. Quelque énorme que paroiſſe la mâchoire inférieure, elle n'eſt pas, à beaucoup près, auſſi grande, en

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 360 sur 615

comparaiſon de celle de l'homme, que le ſont les os propres du nez, comme on peut le voir par les dimenſions ſuivantes. La mâchoire inférieure du cheval a deux pieds & un demi-pouce de longueur depuis l'extrémité antérieure *(A)* juſqu'à l'apophyſe condyloïde *(D)* en ſuivant la courbure de l'angle *(E)*, tandis que les os propres du nez ont dix pouces de longueur dans ce ſujet; mais il paroît qu'ils en auroient près de onze, s'ils n'avoient pas été briſés à la pointe.

Pour prendre une idée de la forme principale de la tête du cheval, il faut bien connoître la figure & les dimenſions de la mâchoire inférieure; ſa partie antérieure *(A)* eſt terminée par les dents inciſives ſans qu'il y ait de menton, ſa largeur, au-delà des dernières dents inciſives, eſt de deux pouces & demi, & ſeulement d'un pouce huit lignes à l'endroit des barres *(F)*, qui eſt le plus étroit, enſuite elle s'élargit peu à peu juſqu'aux angles *(C)* qui ſont entre le corps & les branches; ainſi la mâchoire du cheval, au lieu de former un arc en avant comme celle de l'homme, fait un angle, dont les côtés ont environ un pied de longueur depuis l'extrémité antérieure juſqu'à l'endroit où les branches ſe recourbent en haut, elles ont dix pouces de hauteur depuis cet endroit juſqu'à l'apophyſe condyloïde, & onze pouces & demi juſqu'à l'apophyſe coronoïde, parce que celle-ci s'étend au deſſus de l'autre : cette mâchoire a cinq pouces de largeur à l'endroit du contour de l'angle *(C)*, & ſeulement deux pouces & demi au deſſous de la grande échancrure *(D)*, qui eſt entre les deux apophyſes; les deux angles ſont diſtans de quatre pouces, meſurés de dehors en dehors, & les apophyſes condyloïdes de huit pouces, pris auſſi de dehors en dehors.

On voit par ces dimenſions que la mâchoire inférieure du

cheval eſt longue & étroite, elle eſt auſſi fort baſſe par-devant & fort élevée par-derrière ; c'eſt pourquoi l'occiput ſe trouve au haut de la face du cheval, & l'ouverture des narines *(G)* preſque tout au bas, parce qu'il n'y a point de menton, & que le milieu de la mâchoire ſupérieure n'a pas plus d'environ deux pouces huit lignes de hauteur, trois pouces une ligne de largeur, & ſeulement deux pouces deux lignes à l'endroit des barres *(H)*, qui eſt le plus étroit ; mais la mâchoire ſupérieure s'élargit beaucoup à meſure qu'elle s'approche des os de la pomette *(I)*, de ſorte qu'elle ſe trouve auſſi avancée de part & d'autre que ces os ; la tête du cheval a dans cet endroit ſept pouces quatre lignes de largeur : les os de la mâchoire ſupérieure ne s'étendent pas juſqu'aux yeux comme dans l'homme, quoiqu'elle ait environ un pied de longueur depuis ſon extrémité antérieure juſqu'à l'endroit où l'os de la pomette & l'os unguis ſe touchent, & il y a ſix pouces cinq lignes de diſtance entre l'ouverture des narines & les orbites : cette ouverture eſt oblongue, elle a environ deux pouces à l'endroit le plus large, & cinq pouces trois lignes de hauteur ; le côté ſupérieur eſt formé par la partie antérieure des os propres du nez, qui avancent ſur l'ouverture des narines de la longueur de trois pouces cinq lignes, & ſe terminent en pointe*.

* Les os du nez & de la mâchoire ſupérieure, &c. fourniſſent par leur étendue un grand eſpace à la membrane pituitaire, qui revêt tous les cornets du nez, & qui s'étend dans les ſinus maxillaires & frontaux, & l'humeur que filtre cette membrane eſt ſujette à ſe vicier dans les chevaux, au point de cauſer une maladie que l'on avoit toûjours regardée juſqu'ici comme mortelle, & que l'on appelle la *morve* : c'eſt, pour ainſi dire, la peſte des chevaux, puiſqu'elle eſt contagieuſe, & qu'elle a fait périr juſqu'à préſent tous ceux qui en ont été attaqués. On ne peut trop s'empreſſer de publier la découverte que M. de la Foſſe, maréchal du Roi, a faite ſur cette maladie, & dont il a rendu compte au public dans une brochure

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 362 sur 615

Les orbites *(K)* ſont ovales, leur grand diamètre eſt tranſverſal, il a deux pouces & demi, & le petit deux pouces quatre lignes : au lieu d'être placés au deſſous de l'os frontal comme dans l'homme, ils ſe trouvent de chaque côté du corps de cet os qui occupe l'eſpace qui eſt entre les deux orbites ; cet eſpace a ſix pouces deux lignes de largeur à l'endroit où la diſtance eſt la plus petite. L'os frontal étant fort étroit, & les os propres du nez fort larges en comparaiſon de ces mêmes parties dans l'homme, les orbites du cheval ſe trouvent placés ſur les côtés de la tête ; l'os du front n'eſt ſi étroit que parce que l'étendue des autres os du crâne eſt fort petite à proportion de la groſſeur de l'animal.

Quelque peu étendu que ſoit le crâne du cheval, il y a cependant un os de plus que dans celui de l'homme ; c'eſt l'os du toupet, qui eſt de figure triangulaire ; ſa baſe touche à la partie antérieure de l'occipital, & le ſommet ſe trouve entre les deux pariétaux.

Nous avons déjà fait remarquer que l'os occipital du cheval eſt fort élevé, &, pour ainſi dire, porté en haut par les branches

qui a pour titre, *Traité ſur le véritable ſiége de la morve des chevaux, & les moyens d'y remédier. Paris, 1749.* En effet M. de la Foſſe a reconnu, après pluſieurs obſervations, que le ſiége de la morve n'eſt dans aucun des viſcères, tels que le poumon, le cœur, le foie, la ratte, les reins, &c. comme on l'avoit toûjours cru, mais dans la membrane pituitaire, & dans les ſinus maxillaires & frontaux, où il a trouvé du pus bien formé & des ulcères qui avoient quelquefois rongé juſqu'à la ſubſtance des os, &c. la morve eſt donc un mal local que l'on peut guérir par des topiques. M. de la Foſſe a imaginé un bon moyen de les faire parvenir directement ſur la partie affligée, & il l'a fait par la voie du trépan, qu'il a appliqué ſur les os qui couvrent le mal ; il a déjà éprouvé que cette opération n'eſt pas dangereuſe, & il y a tout lieu d'eſpérer que les liqueurs qu'on peut injecter pour entraîner le pus & guérir les ulcères, produiront l'effet qu'on en attend, & que l'expérience a déjà rendu très-probable.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 363 sur 615

de la mâchoire inférieure qui ſoûtiennent à une grande hauteur les cavités articulaires & les apophyſes zigomatiques des os temporaux, de ſorte que l'os occipital, au lieu d'être poſé à la partie inférieure du crâne comme dans l'homme, ſe trouve à la partie poſtérieure, & que la face ſupérieure de la tête du cheval eſt terminée en arrière par les lignes tranſverſales de l'occipital, qui ſont fort ſaillantes; en retournant la tête de façon qu'elle poſe ſur ſa face ſupérieure, ſi on la regarde par derrière, les lignes tranſverſales reſſemblent en quelque façon au muſle d'un bœuf; les deux condyles de l'occipital forment la tête; les apophyſes épineuſes ont juſqu'à un pouce onze lignes de longueur, & repréſentent les cornes du bœuf; le grand trou occipital a environ un pouce & demi de diamètre.

Les dents inciſives ni les crochets n'étoient pas aſſez bien conſervés dans le ſujet dont il eſt ici queſtion, je les ai obſervés ſur un autre qui étoit à peu près de même taille, & j'ai trouvé que les ſix dents inciſives de la mâchoire ſupérieure étoient convexes en devant ſur leur longueur; que celles du milieu, vûes par devant, ſortoient de quatorze lignes hors de la mâchoire, & celles des coins ſeulement de onze lignes; qu'elles avoient toutes neuf lignes de largeur à leur extrémité, & cinq lignes d'épaiſſeur; les ſix dents inciſives de la mâchoire inférieure étoient moins convexes que celles de la mâchoire ſupérieure, & par conſéquent peu recourbées en haut, elles avoient auſſi un peu moins de largeur & d'épaiſſeur, mais à peu près la même longueur; les crochets étoient en quelque façon coniques, & beaucoup plus petits & plus courts que les inciſives. Je reviens au ſquelette; il y a quatre crochets, deux dans chaque mâchoire, un de chaque côté, à quinze lignes de diſtance de la première des inciſives, à deux pouces cinq lignes de la première des

mâchelières, & à un pouce huit lignes de diſtance l'un de l'autre dans la mâchoire inférieure; les crochets de la mâchoire ſupérieure ne ſont qu'à cinq lignes de diſtance de la première des inciſives, à trois pouces de la première des mâchelières, & à un pouce huit lignes de diſtance l'un de l'autre.

Le cheval a vingt-quatre dents mâchelières, douze en chaque mâchoire, ſix de chaque côté, qui ſe touchent & qui forment une file d'environ ſept pouces de longueur, il y a de plus dans quelques chevaux, au devant des dents de la mâchoire ſupérieure, deux petites dents qui touchent les premières mâchelières, une de chaque côté, elles n'ont que trois lignes de largeur : les deux premières dents molaires de cette mâchoire ſont les plus larges de toutes, elles ont juſqu'à un pouce & demi de largeur; leur côté antérieur eſt fort mince, de ſorte que la face ſupérieure forme un triangle, dont la baſe a onze lignes & touche la ſeconde dent : la figure des premières dents de la mâchoire inférieure eſt la même, mais elles n'ont que ſeize lignes de largeur, & ſeulement huit lignes d'épaiſſeur du côté de la ſeconde dent : les quatre dents du milieu de chaque côté, dans l'une & l'autre mâchoire, ſont quarrées & à peu près de la même largeur, qui eſt d'environ treize lignes, mais elles n'ont qu'environ neuf lignes d'épaiſſeur dans la mâchoire inférieure; celles de la mâchoire ſupérieure ont juſqu'à quatorze lignes d'épaiſſeur : les dernières dents molaires ſont plus larges que toutes les autres, à l'exception des premières; elles ont ſeize lignes de largeur, mais le côté poſtérieur eſt beaucoup plus mince que l'antérieur, qui eſt auſſi large que le côté de l'avant-dernière dent auquel il touche : toutes ces dents ont environ huit lignes de hauteur au dehors de l'alvéole; celles de la mâchoire ſupérieure diffèrent des autres par leur face extérieure,

extérieure, ſur laquelle il y a deux groſſes ſtries perpendiculaires, l'une ſur le bord antérieur, & l'autre ſur le milieu de cette face; les deux dents antérieures, en ont même trois, mais elles ne ſont pas ſi élevées que celles des autres.

On peut regarder l'os hyoïde comme une dépendance de la tête, parce qu'il eſt attaché aux os des temples; mais c'eſt pluſtôt un compoſé de pluſieurs os qu'un ſeul os, car on y en peut diſtinguer ſept, & peut-être neuf, comme nous allons l'expliquer. Les deux principaux pour la grandeur ſont articulés un de chaque côté, dans une cavité qui ſe trouve entre le conduit auditif oſſeux & l'apophyſe ſtyloïde un peu en arrière, & s'étendent en avant juſqu'à l'endroit qui eſt entre les deux dernières dents mâchelières; ils avoient, dans un cheval de taille médiocre, chacun environ ſix pouces & demi de longueur, & un demi-pouce de largeur de haut en bas dans le milieu; ils ſont fort minces, car leur épaiſſeur n'étoit que d'une demi-ligne, ou une ligne, dans la plus grande partie de leur étendue; l'extrémité antérieure eſt plus mince, & la poſtérieure beaucoup plus large & terminée en haut par un prolongement qui s'articule avec l'os des temples : ces deux parties de l'hyoïde étoient à deux pouces neuf lignes de diſtance l'une de l'autre en arrière, & à un pouce huit lignes en devant; elles ſe joignent chacune par ſon extrémité antérieure à un os oblong qui s'étend en bas, & un peu en dedans & en arrière; à l'endroit de cette jointure il ſe trouve un petit os qui reſſemble à peu près à un pois, ou pluſtôt à un haricot, pour la groſſeur & la figure, & qui eſt placé en avant & un peu en haut, de ſorte que les trois os ſe touchent dans cette articulation; l'os oblong, qui eſt le troiſième dans l'ordre que nous ſuivons, avoit quatorze lignes de longueur & deux lignes de largeur, il eſt un peu aplati ſur les

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 366 sur 615

côtés : ces deux os n'étoient éloignés que d'un pouce à leur extrémité inférieure ; ils s'articulent avec un autre os ſitué entre les ſix os dont nous venons de parler, trois de chaque côté : c'eſt pourquoi on peut l'appeler l'*os du milieu ;* ſa figure peut être comparée à celle d'une fourchette, faite de façon que le manche & les branches auroient chacun deux pouces de longueur, ſeroient un peu aplatis ſur les côtés, & auroient trois à quatre lignes de largeur, & que les deux branches ne ſeroient éloignées que d'un pouce huit lignes par leur extrémité, & formeroient une courbe aſſez régulièrement arrondie à l'endroit de leur bifurcation : ces deux branches ſont dirigées en arrière & embraſſent le larynx par-devant & un peu par les côtés, & le manche s'étend en avant ſous la langue ; les deux os oblongs s'articulent de chaque côté à quelque diſtance de l'endroit de la bifurcation de l'os du milieu, que l'on regarde comme l'os hyoïde proprement dit *, car, ſelon cette opinion, les deux grands os qui tiennent à l'occipital ne ſont que des productions longues de l'hyoïde ; quoi qu'il en ſoit, elles paroiſſent comme deux bras, à l'extrémité deſquels l'os du milieu eſt, pour ainſi dire, ſuſpendu par le moyen des deux os oblongs. Nous avons déjà compté ſept os dans l'hyoïde, y compris celui du milieu ; mais ſi l'on examine ce dernier, on reconnoît aiſément que ſes deux branches ſont ſoudées avec le corps par le moyen d'une ſymphyſe, ce qui fait déjà les neuf os dont nous avons parlé, & peut-être le manche de la fourchette feroit-il auſſi un os ſéparé dans un jeune cheval. Nous reviendrons à ce ſujet à l'occaſion de l'hyoïde du bœuf.

Il y a ſept vertèbres dans le cou ; la face inférieure de la

* La vraie connoiſſance du Cheval, &c. avec l'anatomie du Ruyni, *in-fol. Paris, 1647, tab. 12.*

première *(L)* a vingt-trois lignes de longueur, & la face ſupérieure deux pouces trois lignes, non compris les apophyſes articulaires antérieures : cette longueur, dans la face ſupérieure de la première vertèbre, eſt d'accord avec la poſition de la tête, qui eſt penchée en bas; les parties ſupérieures des apophyſes articulaires ſont inclinées en devant & en bas ſur les parties inférieures, qui ſont auſſi inclinées en devant & en haut ſur les parties ſupérieures, de ſorte qu'il paroît y avoir quatre apophyſes articulaires antérieures, entre leſquelles les apophyſes condyloïdes de l'occipital ſont engrénées, ce qui gêne dans certains cas le mouvement de la tête du cheval, en comparaiſon de celui de la tête de l'homme. Les apophyſes tranſverſes ſont ſi grandes, qu'on les a comparées à des oreilles de chien; il auroit fallu déſigner un chien barbet, mais encore vaut-il mieux dire qu'elles ſont un peu inclinées en bas, qu'elles s'étendent de devant en arrière de la longueur de quatre pouces, & qu'elles ont près de deux pouces de largeur. La vertèbre entière a un demi-pied de longueur d'un côté à l'autre; la face inférieure du corps a une apophyſe en forme de tubercule, que l'on a comparée *à un bout de nez;* le trou de cette vertèbre n'a que dix-ſept lignes de largeur de haut en bas, & un pouce huit lignes de longueur d'un côté à l'autre.

La ſeconde vertèbre *(M)* a ſon pivot odontoïde comme dans l'homme : cette vertèbre & toutes les autres du cou du cheval ſont alongées, mais dans des proportions différentes les unes par rapport aux autres; la ſeconde eſt la plus grande de toutes, car elle a cinq pouces de longueur meſurée en ligne droite, depuis l'extrémité poſtérieure de l'apophyſe de la face inférieure, juſqu'au milieu de l'échancrure qui eſt entre les deux apophyſes articulaires antérieures qui forment la baſe du

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 368 sur 615

pivot, & cinq pouces & demi depuis l'extrémité des apophyſes articulaires poſtérieures juſqu'à l'extrémité des antérieures.

La troiſième & la quatrième vertèbre *(NO)* ſont à peu près d'égale grandeur, il y a trois pouces & demi de longueur depuis l'extrémité poſtérieure de l'apophyſe de la face inférieure, juſqu'à la naiſſance de la convexité de la face antérieure du corps de la vertèbre, & environ cinq pouces & demi de longueur depuis l'extrémité poſtérieure de l'apophyſe articulaire poſtérieure juſqu'à l'extrémité de l'antérieure, dans l'une & dans l'autre de ces deux vertèbres. La première de ces deux dimenſions, priſe ſur la cinquième vertèbre *(P)*, n'eſt que de trois pouces trois lignes, elle eſt de trois pouces ſur la ſixième *(Q)*, & enfin de deux pouces trois lignes ſur la ſeptième *(R)*, qui eſt la plus petite de toutes; la ſeconde dimenſion eſt de cinq pouces & demi ſur la cinquième vertèbre, de cinq pouces ſur la ſixième, & de quatre pouces ſur la ſeptième.

La longueur de l'apophyſe épineuſe de cette vertèbre eſt de dix lignes, mais elle n'eſt pas fourchue comme dans l'homme; l'apophyſe épineuſe de la ſixième vertèbre eſt beaucoup plus courte que celle de la ſeptième; il n'y a ſur la cinquième, la quatrième & la troiſième qu'une légère apparence de ces apophyſes, celle de la ſeconde vertèbre eſt la plus étendue, elle forme une eſpèce de crête, dont la partie antérieure a environ deux pouces de hauteur, & ſes deux branches, au lieu d'être ſaillantes comme dans l'homme, rampent en arrière ſur le corps de la vertèbre; toutes celles du cou ont des apophyſes inférieures ſur le corps de chaque vertèbre, mais cette apophyſe eſt très-peu ſaillante ſur la ſeptième vertèbre, & preſque nulle ſur la ſixième; il y a deux groſſes apophyſes inférieure & poſtérieure *(S)* de chaque côté du corps de cette vertèbre; la face antérieure de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 369 sur 615

toutes ces vertèbres eſt fort convexe, & la poſtérieure fort concave : les apophyſes tranſverſes reſſemblent en grand à celles de l'homme. Le cou du ſquelette avoit environ deux pieds de longueur, ſa circonférence, priſe ſur les parties poſtérieures de la troiſième vertèbre, étoit de quatorze pouces, d'environ ſeize pouces ſur celles de la ſixième, qui eſt la plus groſſe, & de quatorze pouces ſur celles de la ſeptième.

La portion de la colonne vertébrale, qui eſt compoſée par les vertèbres dorſales, a deux pieds huit pouces de longueur ; il y a dix-huit vertèbres & dix-huit côtes, ces vertèbres reſſemblent beaucoup plus à celles de l'homme que les vertèbres cervicales ; la plus grande différence qu'il y ait ſe trouve dans les apophyſes épineuſes, qui ſont à proportion, beaucoup plus longues dans le cheval ; celle de la première vertèbre dorſale *(T)* a deux pouces & demi de longueur, celle de la ſeconde *(V)* a ſix pouces trois lignes, celle de la troiſième *(X)* ſept pouces neuf lignes, celle de la quatrième *(Y)* huit pouces trois lignes, celle de la cinquième *(Z)* eſt de la même longueur, mais elle paroît la plus élevée, parce qu'elle eſt moins inclinée que la précédente ; les ſuivantes diminuent peu à peu juſqu'à la quatorzième *(a)*, qui n'a plus qu'environ trois pouces de hauteur, les autres ſont de la même hauteur : la première apophyſe eſt droite, les dix ſuivantes ſont inclinées en arrière, enſuite il y en a trois qui ſont droites, & les autres ſont inclinées en avant ; la dix-huitième eſt la plus large de toutes, elle a environ deux pouces de largeur. Les corps des vertèbres ſont très-reſſemblans à ceux des vertèbres de l'homme, ils ont environ un pouce huit lignes de longueur.

Il y a huit vraies côtes & dix fauſſes, les premières vraies côtes *(b)*, une de chaque côté, ont dix pouces de longueur, leur courbure n'eſt pas auſſi forte que celle des côtes de l'homme,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 370 sur 615

auxquelles elles correſpondent auſſi ; au lieu de former avec les vertèbres & le ſternum une figure reſſemblante en quelque façon à un cœur, elles forment une ſorte de triangle, dont la vertèbre eſt la baſe, & dont le ſommet eſt formé par la réunion des extrémités inférieures des côtes : cet eſpace a environ trois pouces & demi à la baſe, & environ ſix pouces & demi de hauteur ; les plus longues des côtes ſont la dixième *(c)* & la onzième *(d)*, elles ont deux pieds un pouce ; la dernière *(e)* des fauſſes côtes n'a que quatorze pouces & demi de longueur : au reſte, les côtes du cheval ſont aſſez ſemblables à celles de l'homme, ſi ce n'eſt qu'elles ſont encore, à proportion, plus minces ; les plus étroites ont environ un demi-pouce, & les plus larges un pouce huit lignes ; mais les extrémités inférieures des premières côtes, une de chaque côté, ont un pouce ſept lignes de largeur.

Le ſternum *(fg)* eſt comprimé & aplati ſur les côtés, convexe &, pour ainſi dire, tranchant en devant ſur ſa longueur, qui eſt de ſeize pouces ; il ne paroît compoſé que de cinq os dans le ſquelette dont il eſt queſtion, mais dans un ſujet plus jeune que n'étoit celui dont on a tiré ce ſquelette, on diſtingueroit ſix os. Le premier eſt aplati ſur les côtés, il a un pouce dix lignes de longueur ſur le devant, & ſur le derrière environ un pouce & demi, la largeur eſt de deux pouces huit lignes, l'épaiſſeur de quatorze lignes ſur le derrière, & ſeulement de cinq lignes ſur le devant ; le ſecond os du ſternum a, à peu près, la même forme que le premier, mais il eſt plus petit & plus épais en arrière ; le troiſième eſt par rapport au ſecond, & le quatrième par rapport au troiſième, comme le ſecond par rapport au premier ; enfin le cinquième eſt oblong & préſente en avant une face qui a cinq pouces & demi de

longueur, & deux pouces trois lignes de largeur; les deux premières côtes ſe joignent contre la partie ſupérieure & poſtérieure du premier os, les deux ſecondes aboutiſſent entre le premier & le ſecond os, les deux troiſièmes entre le ſecond & le troiſième os, les deux quatrièmes entre le troiſième & le quatrième os, les deux cinquièmes entre le quatrième & le cinquième os, enfin les ſixièmes, ſeptièmes & huitièmes côtes aboutiſſent ſur les côtés du cinquième os, qui eſt compoſé de deux os réunis par l'âge.

Les vertèbres lombaires ſont au nombre de ſix dans le ſquelette ſur lequel cette deſcription a été faite; mais en le comparant à des ſujets frais, j'ai vû que le nombre des vertèbres lombaires varie dans différens chevaux, & qu'il n'y en a que cinq dans les uns, tandis qu'il s'en trouve ſix dans les autres: celles du ſquelette dont il s'agit ici reſſemblent beaucoup aux dernières des dorſales, ſurtout par les apophyſes épineuſes, qui ont à peu près la même longueur & la même largeur, & qui ſont auſſi inclinées en avant; les corps des vertèbres lombaires ont auſſi à peu près la même longueur, mais les apophyſes acceſſoires ſont fort longues & fort larges, on les prendroit pour de petites côtes; celles de la ſeconde vertèbre lombaire *(h)* ſont les plus longues, elles ont à peu près quatre pouces & demi; celles de la première *(i)* & de la troiſième *(k)* ſont d'égale longueur, mais un peu plus courtes que celles de la ſeconde; celles de la quatrième *(l)* & de la cinquième *(m)* ſont encore plus courtes, mais celles de la ſixième *(n)* n'ont que trois pouces; la largeur de ces apophyſes va juſqu'à deux pouces trois lignes, elle eſt fort irrégulière; les apophyſes des trois dernières vertèbres ſe touchent & ſont adhérentes; les vertèbres lombaires ont juſqu'à deux pouces de longueur.

L'os ſacrum du cheval eſt triangulaire, il avoit, dans pluſieurs

chevaux de taille médiocre, environ ſept pouces de longueur, & ſept pouces de largeur à ſon extrémité antérieure, qui fait un arc de cercle concave en devant; il a quatre trous de chaque côté, & paroît compoſé de cinq fauſſes vertèbres, qui ont chacune leur apophyſe épineuſe; la première eſt mince, étroite & inclinée en arrière, la ſeconde eſt plus haute, elle a deux pouces & demi de longueur, les autres diminuent peu à peu, de ſorte que la dernière n'a qu'un pouce & demi de hauteur; la ſeconde eſt la plus large; elle a un pouce & demi de largeur à ſon extrémité, les autres le ſont moins, ſur-tout la dernière, qui n'a qu'un pouce de largeur dans le milieu de ſa hauteur.

La queue *(o p)* du ſquelette dont il s'agit n'a qu'environ un pied & demi de longueur, elle n'eſt compoſée que de treize fauſſes vertèbres, mais j'en ai compté quinze ſur un ſujet frais, & il y a lieu de croire qu'il y en manquoit quelques-unes, car, ſelon différens auteurs *, il doit y en avoir dix-ſept. Dans le ſquelette que nous décrivons, les deux premières ont des apophyſes épineuſes; toutes les fauſſes vertèbres dont eſt compoſée la queue ont quelques apparences d'apophyſes, elles diminuent peu à peu de longueur & de groſſeur, de ſorte que la dernière n'a qu'un pouce de longueur & trois lignes de diamètre à l'endroit le plus mince.

Le baſſin eſt compoſé des mêmes os que celui de l'homme, mais leurs proportions ſont bien différentes, & leur ſituation correſpond à l'attitude du cheval, de ſorte que les os des iles ou des hanches ſont en avant, les os pubis en deſſous, & les os iſchions en arrière.

* La vraie connoiſſance du Cheval, &c. avec l'anatomie du Ruyni, *table 37 & 58.*

Élémens de cavalerie, &c. par M. de la Guérinière, *page 180.*

Les

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 373 sur 615

Les os des hanches *(q)* ſont triangulaires; le bord ſupérieur, au lieu d'être arrondi en manière d'arcade, forme la baſe du triangle, & la baſe de l'os forme le ſommet du même triangle, qui eſt terminé par la cavité cotyloïde; la baſe du triangle a environ neuf pouces & demi de longueur meſurée en ligne droite, elle eſt un peu courbe & convexe en avant, l'angle interne correſpond au bord poſtérieur de l'os de la hanche de l'homme, & l'angle externe au bord antérieur : cet angle ſemble avoir été tronqué, on y voit des tubercules qui ſe rapportent aux épines du bord antérieur du même os dans l'homme; celui du cheval a cinq pouces & demi de hauteur depuis le centre de la cavité cotyloïde juſqu'à la baſe du triangle; le corps de l'os eſt fort effilé, il n'a pas plus de deux pouces trois lignes de largeur ſur la longueur de trois pouces, enſuite il s'élargit pour former le triangle, dont les deux côtés ſont concaves; la concavité du côté externe fait partie des bords du baſſin, on n'y voit aucune autre échancrure que l'on puiſſe comparer à la grande échancrure ſciatique; la cavité cotyloïde n'a que deux pouces & demi de diamètre.

Les os iſchions ſont grands, ils ſemblent avoir chacun deux branches au lieu d'une que l'on diſtingue dans l'homme; la ſeconde branche de l'os iſchion eſt ce qu'on appelle dans l'homme le *corps de l'os*, il eſt effilé dans le cheval, & il a environ deux pouces neuf lignes de longueur depuis le bord poſtérieur de la cavité cotyloïde juſqu'à l'extrémité poſtérieure du trou ovalaire, ſur environ un pouce de diamètre à l'endroit le plus mince; l'épine de cet os eſt moins ſaillante que dans l'homme, elle forme un tubercule alongé : les vraies branches des os iſchions ſont unies l'une contre l'autre, dans cet état elles n'en forment qu'une, qui a deux pouces une ligne de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 374 sur 615

largeur dans le milieu ; & environ deux pouces & demi de longueur ; les côtés extérieurs de cette branche ſont concaves & font partie du trou ovalaire ; les tubéroſités de ces os ſont auſſi réunies & forment une eſpèce de gouttière, qui a environ cinq pouces de longueur ſur les bords extérieurs au-delà du trou ovalaire, un demi-pied de largeur dans le milieu, & onze lignes de profondeur ; ſon extrémité poſtérieure eſt échancrée de deux pouces & demi, & les deux extrémités de cette échancrure ſont à huit pouces de diſtance, meſurée de dehors en dehors : cette échancrure poſtérieure correſpond à l'angle que forment dans l'homme les deux branches des os iſchions ſous le pubis ; les bords latéraux de la gouttière ſont auſſi concaves, & ils ſont terminés en arrière par de groſſes tubéroſités inégales : cette gouttière ſert d'aſſiète au vagin des jumens & dirige la vulve en arrière, au lieu que dans les femmes cette partie eſt ſituée entre les deux branches de l'iſchion, qui forment un angle ſous le pubis.

Les os pubis *(r)* du cheval ſont aſſez reſſemblans à ceux de l'homme, excepté que les éminences & les tubéroſités ne ſont pas à beaucoup près ſi groſſes ; le trou ovalaire a trois pouces de longueur, & deux pouces trois lignes de largeur ; le baſſin a huit pouces & demi de largeur, & ſept pouces quatre lignes de longueur de haut en bas.

L'omoplate du cheval a une figure triangulaire, mais beaucoup plus alongée que dans l'homme, il n'y a point d'apophyſe acromion ni de clavicule ; la cavité glénoïde a deux pouces ſept lignes de longueur, & deux pouces une ligne de largeur ; l'apophyſe coracoïde, au lieu de former un bec comme dans l'homme ne forme qu'une groſſe tubéroſité *(f)*, qui a cependant deux petites éminences ſur ſa partie antérieure & intérieure ;

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 375 sur 615

la longueur de l'omoplate, depuis le bord antérieur de la cavité glénoïde juſqu'à la baſe (*t*) de l'os, eſt de quatorze pouces & trois lignes; la baſe de l'omoplate a cinq pouces & demi de longueur, l'angle poſtérieur eſt plus mouſſe que l'antérieur; le côté poſtérieur a quatorze pouces deux lignes de longueur depuis l'extrémité de la baſe juſqu'au bord poſtérieur de la cavité glénoïde; le côté antérieur a quinze pouces de longueur depuis l'angle antérieur juſqu'au bout de la tubéroſité; l'omoplate n'a que trois pouces de largeur à quatre pouces trois lignes au deſſus du bord antérieur de la cavité glénoïde : c'eſt à cette hauteur que commence l'épine (*u*) de l'omoplate, cette épine s'élève peu à peu, de ſorte qu'elle a dans le milieu de ſa longueur un pouce & demi de hauteur, enſuite elle s'étend juſqu'à la baſe en s'abaiſſant inſenſiblement preſque juſqu'au niveau de cette baſe; cette épine, ou pluſtôt cette éminence longitudinale, eſt placée de façon qu'il y a près d'un tiers de la face extérieure de l'omoplate du côté antérieur de cette éminence, & deux tiers du côté poſtérieur.

L'humerus (*v*) eſt court en comparaiſon de celui de l'homme, il n'a que douze pouces & demi de longueur, & ſix pouces & demi de circonférence à l'endroit le plus petit; la tête a trois pouces une ligne de longueur, meſurée en ligne droite de devant en arrière, & environ deux pouces neuf lignes de largeur; elle eſt environnée par-devant, un peu ſur les côtés, de cinq apophyſes, une interne, une externe & trois antérieures; entre ces trois dernières il y a deux grandes gouttières, tandis que dans l'homme il n'y a que deux éminences & une gouttière. Dans le cheval, l'éminence antérieure qui eſt voiſine de l'externe, ſe prolonge longitudinalement en bas, ce prolongement forme une tubéroſité au deſſous de l'apophyſe, il s'étend preſque juſqu'à

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 376 sur 615

la partie moyenne de l'os ſur la longueur de trois pouces, & il ſe termine par une groſſe apophyſe. La partie inférieure de l'os eſt aſſez ſemblable à celle de l'humerus de l'homme, excepté que dans l'humerus du cheval la partie poſtérieure qui reçoit l'olecrane eſt plus tournée en dehors, plus profonde, plus longue & plus étroite que dans l'homme, que les bords des poulies ne ſont pas ſi élevés, & que les condyles ſont plus ſaillans ſur les côtés & plus en arrière ; l'extrémité inférieure de l'humerus a trois pouces trois lignes de largeur, & trois pouces dix lignes d'épaiſſeur ſur le côté intérieur.

La grande différence qui ſe trouve entre les os des jambes de devant du cheval & ceux du bras de l'homme, commence à ſe faire remarquer dans les os de l'avant-bras, ſur-tout dans le cubitus ; cet os, qui dans l'homme s'étend juſqu'au poignet, qui eſt bien ſéparé du rayon, & qui a à peu près la même groſſeur juſqu'à ſon extrémité, ſemble être oblitéré dans le cheval pour la plus grande partie, on n'en voit que la partie ſupérieure qui ſoit proportionnée à cette même partie dans l'homme.

La plus grande différence qui ſe trouve entre les articulations des os du cheval & de ceux de l'homme, eſt dans celle du coude ; le cheval n'a aucun mouvement de pronation ni de ſupination, les extrémités des jambes de devant ſont toûjours en état de pronation, dans cet état l'extrémité de l'os du coude ſe trouve dans l'homme au côté intérieur de l'os du rayon : ces deux os ſe croiſent en deſcendant, l'os du coude paſſe par-deſſous l'os du rayon, de ſorte que ſon extrémité inférieure eſt au côté externe de l'os du rayon. Dans le cheval, l'extrémité ſupérieure de l'os du coude ſe trouve derrière l'os du rayon un peu plus en dehors qu'en dedans, l'os du coude s'amincit beaucoup en deſcendant derrière l'os du rayon un peu obliquement de

dedans en dehors, de ſorte que ce n'eſt plus qu'un filet oſſeux lorſqu'il arrive & ſe confond à l'endroit de la face étroite de l'extrémité de l'os du rayon.

L'apophyſe de l'olecrane *(x)* eſt à proportion beaucoup plus grande dans le cheval que dans l'homme, elle s'étend obliquement en arrière & en haut, & lorſque les os de l'avant-bras ſont pliés à angle droit ſur l'humerus, l'olecrane déborde cet os de la longueur d'environ trois pouces : cette apophyſe avoit en toute ſa longueur environ trois pouces & demi, & deux pouces de largeur ſur quinze lignes à l'endroit le plus mince; car ſa figure, au lieu d'être arrondie poſtérieurement comme dans l'homme, eſt fort irrégulière, & on peut dire en général qu'elle eſt aplatie ſur les côtés, concave en dedans & convexe en dehors. Le cubitus du cheval adhère au rayon au deſſous de l'olecrane, enſuite il en eſt ſéparé, car il y a une petite ouverture entre les deux à environ deux pouces au deſſous de l'extrémité de l'os du rayon; dans cet endroit l'os du coude n'a pas plus de ſept lignes de largeur & ſept lignes d'épaiſſeur à l'endroit le plus épais, enſuite il adhère de nouveau à l'os du rayon, & ſe confond, pour ainſi dire, avec cet os ſur le bord extérieur de ſa face poſtérieure.

L'os du rayon *(y)* a quatorze pouces trois lignes de longueur, il eſt un peu courbé, convexe en devant & concave en arrière, à peu près comme dans l'homme, mais ſon extrémité ſupérieure n'eſt pas la plus petite, c'eſt au contraire la plus groſſe, ou au moins la plus large; au lieu de former une tête cylindrique qui déborde d'un quart de ſon diamètre le corps de l'os comme dans l'homme, il s'élargit à ſon extrémité, & il a trois pouces & demi de largeur ſur environ deux pouces d'épaiſſeur du côté intérieur de l'os du coude, & ſeulement un pouce & demi de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 378 sur 615

l'autre côté ; cette extrémité s'articule dans preſque toute ſa largeur avec l'humerus : le corps de l'os, au lieu d'être triangulaire comme dans l'homme, eſt aplati ſur le devant & concave ſur le derrière, il a un pouce neuf lignes de largeur dans le milieu, & ſeize lignes d'épaiſſeur ; l'extrémité inférieure eſt beaucoup reſſemblante à celle du même os dans l'homme, elle s'élargit comme l'extrémité ſupérieure, mais elle n'a que trois pouces cinq lignes à l'endroit le plus large, & deux pouces au plus épais ; il n'y a que deux faces à cette extrémité, car la troiſième face, qui eſt étroite dans l'homme, n'y paroît pas ; la face extérieure eſt convexe comme dans l'homme, & on y voit auſſi des lignes oſſeuſes & des gouttières : il n'y a point dans le cheval d'apophyſe ſtyloïde à l'extrémité du rayon.

Il y a autant de différence de longueur entre le fémur du cheval & celui de l'homme, qu'il y en a entre les humerus ; le fémur *(z)* du cheval n'a que dix-ſept pouces neuf lignes, y compris le grand trochanter ; le cou de la tête n'eſt pas ſi bien marqué que dans l'homme, & la tête eſt à proportion plus petite, car elle n'a que deux pouces huit lignes de diamètre ; le grand trochanter paroît plus étendu de devant en arrière que dans l'homme, & plus aplati ſur les côtés ; le petit trochanter eſt auſſi plus mince au côté oppoſé, & un peu plus bas il y a une apophyſe un peu plus groſſe que le petit trochanter & crochue en devant, elle ne paroît preſque pas dans l'homme ; le corps de l'os n'eſt pas courbé en devant comme dans le fémur humain, on n'y reconnoît pas auſſi-bien les trois faces, il a ſept pouces & demi de circonférence, l'extrémité inférieure eſt reſſemblante à celle du fémur de l'homme, excepté que les condyles y ſont plus ſaillans & les cavités plus étroites, & que le condyle interne eſt plus élevé en devant que l'externe, au

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 379 sur 615

contraire de ce qui eſt dans l'homme : cette extrémité du fémur a quatre pouces cinq lignes de largeur, & cinq pouces deux lignes à l'endroit le plus épais.

La rotule *(1)* du cheval reſſemble en quelque façon à celle de l'homme, mais il y a beaucoup de différence dans les détails ; la partie qui correſpond à la baſe de celle de l'homme eſt fort alongée, les côtés ſont auſſi plus ſaillans, & les faces plus inégales : cet os a trois pouces de longueur & autant de largeur, & un pouce neuf lignes à l'endroit le plus épais ; on l'a nommé l'*os carré*, & il eſt poſé en forme de loſange.

Le tibia *(2)* eſt plus court à proportion que celui de l'homme, il n'a qu'environ quinze pouces de longueur ; ſon extrémité ſupérieure eſt aſſez reſſemblante à celle du tibia humain, excepté que les bords ſont plus ſaillans, & qu'il y a une gouttière ſur le deſſus de l'épine, qui eſt beaucoup plus élevée que dans l'homme ; la tête du tibia du cheval a quatre pouces deux lignes de largeur & quatre pouces trois lignes à l'endroit le plus épais ; le corps de l'os eſt à peu près triangulaire comme celui de l'homme ; mais les arêtes ne ſont pas ſi tranchantes, il a cinq pouces huit lignes de circonférence dans le milieu de ſa longueur un peu au deſſous : l'extrémité inférieure du tibia du cheval eſt différente de celle du tibia de l'homme en ce qu'il y a, pour ainſi dire, deux malléoles ; l'interne n'eſt pas auſſi étendue en bas que celle de l'homme, ni à proportion auſſi groſſe ; l'externe occupe l'enfoncement qui ſe trouve dans l'homme pour recevoir le péroné. La voûte de la cavité eſt diſtinguée en portion droite & en portion gauche, par une éminence qui eſt bien plus élevée à proportion que dans l'homme & qui eſt fort oblique de dedans en dehors : cette extrémité du tibia a trois pouces trois lignes de largeur d'une

malléole à l'autre, & dix pouces d'épaiſſeur au côté intérieur qui eſt le plus épais.

Il y a au côté extérieur de la partie ſupérieure du tibia une épine *(3)* qui paroît repréſenter le péroné, elle s'articule comme cet os avec le tibia par une eſpèce du tubéroſité, qui avoit huit lignes de largeur & un demi-pouce d'épaiſſeur dans un ſujet de taille médiocre, car cette épine n'étoit pas bien conſervée dans le ſquelette que nous décrivons. La tubéroſité eſt, pour ainſi dire, la tête de l'épine qui s'étend en bas de la longueur d'environ ſept pouces, en laiſſant un eſpace aſſez conſidérable entre elle & le tibia; elle eſt fort mince & ſe rapproche du tibia par ſon extrémité inférieure, qui eſt attachée par un ligament.

Le carpe *(4)* du cheval eſt compoſé de ſept os diſpoſés en deux rangs, qui n'ont que vingt-cinq lignes de hauteur dans le milieu de la face antérieure; il y en a quatre dans le premier comme dans l'homme, mais on n'en diſtingue que trois dans le ſecond. Le premier des os du premier rang reſſemble en quelque choſe à l'os ſcaphoïde, le ſecond à l'os lunaire, le troiſième à l'os cunéiforme; mais le quatrième n'a de commun avec le piſiforme que ſa ſituation, car il eſt à proportion beaucoup plus gros. Les os du ſecond rang ſont plus différens de ceux auxquels ils correſpondent dans le carpe de l'homme que ceux du premier rang, ils en diffèrent par leur hauteur, qui eſt à peu près égale dans tous, par leur figure & par leur nombre; cependant, par rapport au nombre, il ſemble que le ſecond os eſt aſſez large pour occuper la place du trapézoïde & du grand os du carpe de l'homme; & ce qui pourroit appuyer cette comparaiſon, c'eſt que le troiſième os du ſecond rang du carpe du cheval eſt aſſez reſſemblant à l'os unciforme de

de l'homme, puiſqu'il a auſſi une petite apophyſe crochue.

Le tarſe *(5)* du cheval eſt compoſé de ſix os; quoiqu'il y en ait ſept dans le tarſe de l'homme, on peut cependant comparer ces deux parties & y retrouver beaucoup de reſſemblance. Le calcaneum *(6)* ne diffère pas beaucoup de celui de l'homme, ſi ce n'eſt que ſa poſition eſt perpendiculaire & un peu oblique de bas en haut & de devant en arrière, au lieu d'être horizontale & un peu oblique de devant en arrière & de haut en bas, & que ſa tubéroſité n'eſt pas à proportion ſi groſſe que dans l'homme, & qu'elle eſt plus mince intérieurement; cet os a quatre pouces ſept lignes de longueur, & ſeulement onze lignes à l'endroit le plus mince.

L'aſtragal *(7)* du cheval reſſemble beaucoup à celui de l'homme, ſur-tout par ſa poſition; ſa figure ne diffère qu'en ce que cet os n'a point d'apophyſe, & que l'enfoncement de la face antérieure, qui correſpond à la face ſupérieure de ce même os dans l'homme, eſt beaucoup plus profond & dirigé de devant en arrière & de dedans en dehors, de même que l'éminence qui eſt ſur la voûte de la cavité de l'extrémité inférieure du tibia; il y a au deſſous de l'aſtragal du cheval un os mince, que l'on peut comparer à l'os ſcaphoïde; l'os cuboïde eſt aſſez reconnoiſſable par ſa poſition deſſous le calcaneum, qui correſpond à la poſition antérieure de cet os dans l'homme, & même par ſa figure. L'os qui eſt dans le cheval au deſſous du ſcaphoïde, occupe la place qui eſt remplie dans l'homme par les deux premiers os cunéiformes, & il eſt facile de retrouver le troiſième dans le cheval par ſa poſition au deſſous de la partie poſtérieure & extérieure du ſcaphoïde: cet os & celui qui tient lieu des deux premiers cunéiformes dans le cheval, n'ont, étant meſurés enſemble, que treize lignes de hauteur.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 382 sur 615

Ce qui reſte des os des quatre jambes du cheval eſt aſſez ſemblable dans chacune, à quelques dimenſions près, c'eſt pourquoi nous rapporterons les os des quatre jambes dans la même deſcription.

Les os des canons *(8)* ſont accompagnés par derrière de deux petits os *(9)* longs & pointus par le bas, auxquels on a donné le nom d'*épines*. Il eſt aiſé de juger, par les articulations des os des canons & de leurs épines avec les os du carpe & avec ceux du tarſe, que les épines intérieures de chaque os du canon correſpondent aux premiers os du métacarpe & du métatarſe de l'homme, & que les épines qui ſont au côté extérieur correſpondent au cinquième os de ces deux parties dans l'homme. Je compte cinq os dans le métacarpe comme dans le métatarſe, conformément à l'uſage des anciens Anatomiſtes; les os des canons ſemblent donc tenir lieu de trois os dans le métacarpe & dans le métatarſe, auſſi ſont-ils beaucoup plus gros que leurs épines, & ils s'articulent avec les os du carpe & du tarſe, de même que le ſecond, le troiſième & le quatrième os du métacarpe & du métatarſe de l'homme, en ſuppoſant, comme nous l'avons déjà fait remarquer, que l'os trapézoïde & le grand os ſoient repréſentés par un ſeul os dans le carpe du cheval, de même que le premier & le ſecond os cunéiformes dans le tarſe.

Les os des canons ſont longs & cylindriques, cependant leurs extrémités ſont plus larges & un peu plus épaiſſes que le corps de l'os; le milieu eſt plus épais que les parties qui ſont voiſines des extrémités, ſur-tout dans la partie inférieure qui a un enfoncement bien marqué dans les os des canons des jambes de devant; en général le corps de ces os a plus de largeur que d'épaiſſeur, ceux des jambes de devant ont neuf pouces de longueur, un pouce & demi de largeur dans le milieu de leur

longueur, & environ deux pouces quatre lignes à chaque extrémité; le milieu du corps de l'os a quatorze lignes d'épaiſſeur, les extrémités un pouce & demi; & la partie voiſine de l'extrémité inférieure n'a qu'un pouce à l'endroit de l'enfoncement.

Les os des canons des jambes de derrière ſont plus longs que ceux des jambes de devant, ils ont dix pouces neuf lignes de longueur, un pouce & demi de largeur dans le milieu de leur longueur, & deux pouces deux lignes à chaque extrémité; le milieu du corps de l'os a ſeize lignes d'épaiſſeur, l'extrémité ſupérieure a un pouce onze lignes, l'inférieure un pouce ſept lignes, & la partie voiſine de l'extrémité inférieure ſeulement quatorze lignes.

Les épines des canons ſont adhérentes à leur face poſtérieure, & s'étendent de haut en bas ſur les bords de cette face, elles ont juſqu'à ſix pouces & demi de longueur dans les jambes de devant, & juſqu'à ſept pouces & demi dans celles de derrière; l'extrémité ſupérieure s'articule avec les os du carpe & du tarſe, comme nous l'avons déjà dit; cette extrémité forme une ſorte de tête qui a environ neuf lignes de diamètre, excepté celle de l'épine extérieure des jambes de derrière, qui eſt un peu plus groſſe dans le ſquelette dont il eſt queſtion. Le corps de chacune de ces épines s'amincit en deſcendant, & n'a qu'environ deux lignes de diamètre près de ſon extrémité, qui eſt terminée par un petit bouton de figure irrégulière.

Les os des canons s'articulent avec ceux des paturons *(10)*, qui ſe rapportent à l'os de la première phalange des doigts; ils ſont beaucoup plus courts que les os des canons & un peu plus minces, excepté à leur extrémité ſupérieure qui eſt un peu plus groſſe que l'extrémité inférieure des os du paturon: cette extrémité ſupérieure des os des premières phalanges a deux

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 384 sur 615

pouces & demi de largeur, mais l'inférieure n'a que deux pouces pouces deux lignes, & le milieu du corps de l'os ſeulement un pouce ſept lignes; ces os ont trois pouces quatre lignes de longueur dans les jambes de devant, & trois pouces cinq lignes dans celles de derrière, ils n'ont que onze lignes d'épaiſſeur au deſſus de leur extrémité inférieure à l'endroit le plus mince.*

Derrière l'articulation des os des paturons avec les os des canons, il y a dans chaque jambe deux os triangulaires *(11)* poſés l'un à côté de l'autre, qui paroiſſent être des os ſéſamoïdes; ils ont quinze lignes de hauteur, quatorze lignes de largeur à la baſe, & environ un pouce d'épaiſſeur ſur le côté

* Je ne conçois pas pourquoi l'auteur du nouveau parfait Maréchal, rapporte les paturons des chevaux au ſecond *article* ou à la ſeconde *jointure* des doigts de la main & du pied de l'homme, *pages 6 & 9*, c'eſt-à-dire, à la ſeconde phalange; car il n'eſt pas douteux que cet auteur n'ait pris les termes d'*article* & de *jointure* pour ſynonymes à celui de phalange, puiſqu'il dit que le paturon eſt une *jointure* qui s'étend depuis le boulet juſqu'au pied. Où ſe trouveroit donc dans le cheval l'os qui correſpondroit à la première phalange des doigts de l'homme, ſi ce n'étoit pas celui du paturon! Pour éclaircir ce paſſage, reprenons de plus loin la comparaiſon du cheval à l'homme d'après le livre dont il eſt queſtion, « Le canon eſt la partie qui va du genou » & celle qui va du jarret au boulet, » cette partie ſe rapporte au deſſus de la » main de l'homme, & au cou de pied » de l'homme pour les jambes de derrière, » *page 5*; cela eſt certain, paſſons au boulet : « c'eſt la partie, ou pluſtôt la jointure qui eſt au bas du canon, cette « partie a rapport à la première jointure « des doigts de la main & du pied, » *pages 6 & 9*. Voici où commence la méprise, car le boulet n'eſt pas une partie ni une jointure, en prenant ce dernier terme dans la ſignification de celui de phalange, mais c'eſt une articulation. En ſuivant juſqu'au bout du pied, on verra que l'auteur ne fait aucune mention de l'os coronaire, & qu'il le confond avec l'os du petit pied; il rapporte la couronne & le ſabot, & tout ce qui eſt au dedans de la couronne & du ſabot, à la jointure des doigts des mains & des pieds de l'homme, où ſont attachés les ongles, *idem*. Il eſt clair que cette prétendue jointure eſt la troiſième phalange des doigts, cependant entre la couronne & le canon, ou pluſtôt entre l'os qui eſt ſous la couronne & celui du canon, il n'y a qu'un ſeul

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 385 sur 615

extérieur; l'intérieur eſt de moitié moins épais, il eſt arrondi: ces deux os forment le boulet.

L'os de la couronne *(12)*, que l'on appelle auſſi l'*os coronaire*, correſpond à la ſeconde phalange du doigt; il eſt beaucoup plus court dans chaque jambe que l'os du paturon, mais il eſt un peu plus large & plus épais; cet os n'a qu'un pouce & demi de longueur dans les jambes de derrière, & ſeulement ſeize lignes dans celles de devant; le corps de l'os n'eſt pas diſtingué par un rétréciſſement, ſa largeur eſt à peu près de vingt-deux lignes, & l'épaiſſeur de dix lignes dans les endroits les plus minces & les plus étroits; l'os de la couronne s'articule avec le petit pied.

Cet os *(13)* eſt la troiſième phalange du doigt, il a la même figure à peu près que celle du ſabot qui l'enveloppe, & il eſt fait par-deſſous en forme de fer-à-cheval; ce qu'il y a de ſingulier, c'eſt que cette même forme de fer-à-cheval ſe trouve auſſi ſur l'os de la troiſième phalange des doigts des pieds & des mains de l'homme*: voilà un indice de plus pour

os, qui eſt l'os du paturon; ſi on le fait correſpondre à la ſeconde phalange des doigts, on ne trouvera plus aucun os que l'on puiſſe rapporter à la première, puiſque l'os du paturon touche à celui du canon, & qu'il n'y a entre-deux qu'une articulation: c'eſt à cette articulation qu'on donne le nom de *boulet*, par conſéquent l'os du paturon correſpond à la première phalange des doigts, & non pas à la ſeconde. J'ai cru ce détail néceſſaire pour lever toute équivoque au ſujet de la définition & des rapports du boulet & du paturon des chevaux.

* Expoſition anatomique de la ſtructure du corps humain, par M. Winſlow, *traité des os, n.° 820.* La tête de la troiſième phalange (du pouce de la main) eſt petite & plate, & aboutit à un rebord demi-circulaire fort raboteux, qui du côté de la face plate repréſente un fer-à-cheval. *n.° 995....* Le fer-à-cheval qui termine le pouce du pied eſt plus inégal (que dans le pouce de la main), & comme une tubéroſité aplatie. *Voyez les n.os 824. & 958 du même ouvrage, ou pluſtôt un ſquelette d'homme.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 386 sur 615

le rapport de l'os du petit pied du cheval avec celui de la troiſième phalange des doigts. L'os du petit pied eſt arrondi par-devant & terminé en arrière par deux pointes; ſa face inférieure eſt un peu concave, & forme par le contour du devant & par celui des côtés, la moitié d'un ovale alongé, dont le grand diamètre ſeroit dirigé de devant en arrière, & qui ſeroit coupé le long de ſon petit diamètre; cet ovale auroit dans les jambes de devant, s'il étoit entier, le grand diamètre de ſept pouces deux lignes de longueur, & le petit d'environ quatre pouces, & dans les jambes de derrière le grand diamètre ne ſeroit que d'environ ſix pouces, & le petit de trois pouces neuf lignes; le bord poſtérieur de la face inférieure eſt échancré de la profondeur de près de deux pouces dans les pieds de devant, & ſeulement d'un pouce & demi dans ceux de derrière : au moyen de cette échancrure & de la portion d'ovale que forme l'os du petit pied par-devant & par les côtés, on conçoit aiſément que la face inférieure étant plate, elle doit avoir la figure d'un fer-à-cheval, elle eſt auſſi un peu concave; la face antérieure & celles des côtés ſont inclinées de bas en haut de dehors en dedans, il a en devant deux pouces & demi de hauteur oblique, la face ſupérieure eſt proportionnée à la face inférieure de l'os de la couronne avec lequel l'os du petit pied s'articule, cette même face ſupérieure eſt inclinée de devant en arrière & de haut en bas, de ſorte que les deux branches que cet os forme en arrière, n'ont qu'environ un pouce cinq lignes de hauteur; l'os du petit pied eſt fort poreux; il n'a dans les jambes de devant qu'un pouce dix lignes de hauteur perpendiculaire à l'endroit le plus élevé, & juſqu'à deux pouces une ligne dans les jambes de derrière.

Il y a derrière l'articulation du petit pied avec l'os de la


Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 387 sur 615



J.B. Oudry pinx. C. Baquoy sculp.

ECOLE SUPERIEURE DE PHARMACIE DE PARIS BIBLIOTHÈQUE






D. S. del.

Montte Sculp.

ECOLE SUPERIEURE DE PHARMACIE





De Seve del. F. Basan Sculp.

ECOLE SUPERIEURE DE PHARMACIE BIBLIOTHEQUE PARIS






fig. 1.






fig. 2.

De Seve del.

Basan sc.









De Seve del. F. Bascan


ECOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE BIBLIOTHÈQUE






De Seve del. F. Basan Sculp.


BIBLIOTECA DEL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES





De Seve del.


BIBLIOTHÈQUE DE PHARMACIE



De Seve del.

Basan sc.


ECOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE DE PARIS BIBLIOTHÈQUE



De Seve del. Basan sc.

ECOLE DE PHARMACIE DE PARIS






D. S. del.

Motte Sculp.

PHARMACIE DE PARIS



couronne, un petit os oblong *(15)*, posé transversalement, que l'on appelle l'*os de la noix* ou le *sous-noyau ;* cet os a deux pouces deux lignes de longueur, dix lignes de largeur dans le milieu, & un demi-pouce d'épaisseur.

Le cheval & tous les solipèdes diffèrent des autres animaux plus par les pieds que par aucune autre partie, & cette différence ne commence à être bien décidée que dans les doigts; car le bras & la cuisse du cheval, qui correspondent à l'avant-bras & à la jambe de l'homme, ont chacun deux os, puisque l'os du coude est presque en entier, & que le péroné est assez marqué pour qu'on puisse le reconnoître. Il n'y a dans le carpe & dans le tarse du cheval qu'un os de moins que dans l'homme, & encore semble-t-il être remplacé par un des os du carpe & du tarse qui est à proportion aussi étendu dans le cheval que les deux os qui y répondent dans le carpe & le tarse de l'homme. Nous avons fait voir que les os des canons & leurs épines sembloient représenter les cinq os du métacarpe & du métatarse de l'homme, mais le cheval & tous les solipèdes sont absolument différens des autres animaux par le nombre des doigts; le cheval n'en a qu'un à chaque pied : ce caractère est constant sans aucune variation, & évident au premier coup d'œil, c'est par conséquent le meilleur que l'on puisse employer dans les divisions méthodiques; aussi n'a-t-il pas échappé à Aristote, qui, quoique très-opposé aux divisions détaillées des animaux en différens genres, n'a pû se refuser de désigner les principaux genres des quadrupèdes, par les caractères de solipèdes, pieds-fourchus & fissipèdes.

DESCRIPTION
DE LA PARTIE DU CABINET
qui a rapport à l'Hiſtoire Naturelle
DU CHEVAL.
N.° CDXIV.

Hippomanès.

IL y en a pluſieurs de différentes grandeurs, qui ſont conſervés dans l'eſprit-de-vin *; les uns flottoient dans l'allantoïde ſans y avoir aucune adhérence, les autres tiennent encore à une

* A propos de ces morceaux d'Hiſtoire Naturelle conſervés dans l'eſprit-de-vin, je dois rendre compte de la façon dont l'amalgame de mercure & de plomb ou d'étain s'eſt maintenu pour empêcher l'évaporation de l'eſprit-de-vin, depuis le temps où j'ai parlé de ce procédé pour fermer les bocaux des cabinets d'Hiſtoire Naturelle dans le troiſième volume de cet ouvrage, *page 193:* je pourrois auſſi faire quelques réflexions ſur une ſorte de critique à ce ſujet, que l'on a fait imprimer dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, *année 1746,* quoiqu'elle n'ait été donnée qu'en *1751;* j'y répondis par écrit dans le même temps, mais je me garderai bien de rapporter le détail de cette diſcuſſion, qui ſeroit trop indifférent pour le public, & qui m'importe fort peu à moi-même : je ne fais mention de cet écrit que parce qu'il ſe trouve dans le recueil de l'Académie des Sciences, & qu'il a pour auteur un de mes confrères dans cette Compagnie; car pour le fond de la choſe, ſon écrit n'influera pas au phyſique ſur la propriété de mon amalgame, & pour le moral, c'eſt-à-dire, le mérite de cette invention, elle ne me flatte pas aſſez pour me faire deſirer d'en introduire l'uſage. Chacun bouchera ſes bocaux ou ſes bouteilles comme il lui plaira, je ne demande aucune préférence pour le procédé que j'ai indiqué; je ne me ſerois pas même aviſé de faire des recherches de cette eſpèce, s'il n'étoit de mon devoir de tenir dans le meilleur état qu'il eſt poſſible, les

portion

portion de cette membrane à laquelle ils ſont colés, & qui ſemble leur ſervir de pédicule.

N.° CDXV.

Portion du corps caverneux de la verge du cheval, deſſéchée.

Cette portion de la verge a quatre pouces trois lignes de longueur, & environ quatre pouces neuf lignes de circonférence: on voit dans cette pièce qu'il n'y a qu'un ſeul tuyau pour le corps caverneux, & qu'il eſt traverſé par des filamens tendineux qui ſuivent différentes directions; la gouttière qui étoit occupée par l'urètre eſt bien marquée ſur la face inférieure de cette portion du corps caverneux.

bocaux du cabinet du Roi, ainſi que tout le reſte de cette grande collection d'Hiſtoire Naturelle. J'ai réuſſi à empêcher l'évaporation de l'eſprit-de-vin en fermant les bocaux avec un amalgame de mercure & de plomb ou d'étain, & j'en ai une preuve réelle: l'on peut voir au cabinet d'Hiſtoire Naturelle pluſieurs bocaux qui ſont bouchés de cette façon, ſur-tout un très-grand qui renferme une rouſſette: c'eſt le premier ſur lequel j'ai éprouvé l'amalgame, il eſt cylindrique, ſa hauteur eſt de dix-ſept pouces, & ſon orifice a trois pouces & demi de diamètre; il y a quatre ans qu'il eſt fermé, & cependant il ne paroît aucune diminution ſenſible dans l'eſprit-de-vin dont il eſt rempli: voilà ce qui me fait croire que les épreuves de mon procédé que l'auteur de l'écrit que j'ai cité plus haut, a répétées ſur deux fioles, auroient pû mieux réuſſir ſi elles avoient été mieux faites, & que malgré le mauvais ſuccès de ſes expériences à ce ſujet, & les raiſonnemens qu'il fait contre l'amalgame, il ne laiſſoit pas d'être bien fondé à conclurre en ces termes: *Il eſt au moins déjà très-certain que ce lut eſt préférable à tous les luts qui ont été employés juſqu'ici pour empêcher l'évaporation.* (Mém. de l'Académie Royale des Sciences, *année 1746, page 535*): il ſe peut bien auſſi qu'il ſoit meilleur que les luts que l'on a faits avec de l'huile, parce que l'huile eſt diſſoluble par l'eſprit-de-vin lorſqu'elle eſt rancie, & qu'en quelque état qu'elle ſoit, il n'eſt pas poſſible qu'elle réſiſte autant que le mercure à l'impreſſion des eſprits

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 410 sur 615

N.° CDXVI.

La membrane albuginée d'un teſticule de cheval, injectée & deſſéchée.

Cette membrane a été priſe ſur le teſticule du côté gauche, la poche qu'elle forme a environ trois pouces & demi de longueur, & deux pouces & demi de largeur, elle tient à une portion aſſez longue de l'artère ſpermatique qui a été injectée, l'injection eſt parvenue juſqu'aux plus petites ramifications de l'artère; on a enlevé une grande portion de la membrane ſur le

ardens. Mais, quoi qu'il en ſoit de l'huile épaiſſie & de tous les luts imaginables, il me ſuffit d'avoir des bocaux pleins d'eſprit-de-vin, & fermés par le moyen de mon amalgame, qui ne ſe ſont pas évaporés depuis quatre ans, pour que je ſois en droit de prétendre que cet amalgame empêche l'évaporation de l'eſprit-de-vin : les expériences faites ſur ces bocaux ſont plus que ſuffiſantes pour ſervir de réponſe à ce qu'on m'a objecté à ce ſujet. Au reſte, ſi on veut employer l'huile pour empêcher l'évaporation de l'eſprit-de-vin, on peut l'appliquer de pluſieurs manières; outre celles qui ſont déjà connues, en voici une nouvelle. Le ſieur Lucas, qui bouche depuis pluſieurs années des bocaux au cabinet du Roi, ne s'en eſt pas tenu à la ſimple manipulation, il a auſſi trouvé une façon de les fermer par le moyen de l'huile : il y applique d'abord des bouchons de liége ou de verre, ces derniers ſont les meilleurs, parce qu'ils ne ſe déjettent pas comme le liége; enſuite il recouvre les bouchons avec une pâte compoſée d'huile deſſicative & d'ardoiſe pulvériſée & tamiſée : cette pâte ſe durcit en peu de temps, & adhère au verre de façon à empêcher au moins pour un temps aſſez long, l'évaporation de l'eſprit-de-vin, il y a beaucoup de bocaux au cabinet du Roi qui ſont fermés de cette manière, parce qu'elle eſt peu coûteuſe & très-commode, & par conſéquent la meilleure pour les bocaux qu'on eſt obligé d'ouvrir de temps en temps afin de blanchir l'eſprit-de-vin. Comme il eſt important d'empêcher ſon évaporation dans les cabinets d'Hiſtoire Naturelle, nous reviendrons à ce ſujet dans la ſuite de cet ouvrage, & nous rendrons compte de tout ce qu'on a trouvé ſur cette matière depuis la publication de notre troiſième volume où nous avons rapporté ce qui étoit connu alors, ou au moins ce qui étoit venu à notre connoiſſance.

côté extérieur du teſticule, pour faire voir les ramifications artérielles à travers le reſte de l'albuginée; on a jugé qu'elle avoit été tirée d'un cheval, après l'avoir comparée aux teſticules de cet animal.

N.° CDXVII.

Teſticule de cheval modelé en cire.

C'eſt le teſticule du côté gauche, il a trois pouces dix lignes de longueur, deux pouces & demi de largeur, & un pouce dix lignes d'épaiſſeur; on voit ſur ce teſticule une portion de l'épidydime.

N.° CDXVIII.

Bézoard de cheval.

Ce bézoard eſt à peu près d'une forme ovoïde, ſon grand diamètre a quatre pouces de longueur, & le petit environ trois pouces, il pèſe une livre cinq onces neuf gros, ſa ſurface eſt hériſſée de petits tubercules de différentes figures irrégulières; la pluſpart de ces tubercules ſe touchent, & il y a peu d'eſpace vuide entre les autres, ils ont preſque tous été émouſſés & polis par le frottement; la couleur de ce bézoard eſt d'un blanc ſale, ſi on l'entame on voit que la ſubſtance des tubercules eſt dure & de couleur cendrée-brune, qu'ils ſont revêtus d'une couche aſſez mince plus tendre & de couleur blanche. Je ne ſais que ce bézoard vient d'un cheval que pour l'avoir ouï dire, il y a plus de onze ans qu'il eſt au cabinet; on m'a dit qu'il avoit été tiré de la veſſie d'un cheval des écuries du Roi à Verſailles.

On a vû pluſieurs chevaux qui rendoient des pierres avec

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 412 sur 615

les excrémens, & on les a désignées par le nom d'*hippolites*; on en a trouvé dans l'estomac & dans les intestins, sur-tout dans la troisième poche du colon, & dans plusieurs autres endroits. *Voyez les Éphémérides des Curieux de la Nature, années 1672, obs. 246, & 1673 & 1674, obs. 167.*

N.° CDXIX.

Le squelette d'un cheval.

Ce squelette est celui qui a servi de sujet pour la description du cheval, ainsi ses dimensions sont données, nous ajoûterons seulement que la circonférence de la tête mesurée sur les angles de la mâchoire inférieure & sur les bords postérieurs des orbites, est de deux pieds onze pouces, & que celle du thorax est d'environ cinq pieds à l'endroit le plus gros; il manque dans ce squelette les deux dents incisives extérieures de chaque côté de la mâchoire supérieure, la première dent incisive du milieu de la mâchoire inférieure du côté gauche, les deux crochets de la mâchoire supérieure, l'os de chacun des carpes qui correspond à l'os pisiforme dans l'homme, les deux os triangulaires dans chaque jambe de derrière, l'os de la noix du pied gauche de devant, celui du pied droit de derrière, & l'extrémité de la deuxième côte du côté gauche.

N.° CDXX.

L'os hyoïde du cheval.

Cette pièce est celle qui est décrite à l'article de l'os hyoïde dans la description du squelette du cheval, elle est composée des sept os qui forment l'hyoïde & ses dépendances, comme il a été expliqué; tous ces os tiennent les uns aux autres par leurs

cartilages deſſéchés, & ſont maintenus en ſituation les uns relativement aux autres.

N.° CDXXI.

Portion de la colonne vertébrale d'un cheval, dans laquelle il ne ſe trouve que cinq vertèbres lombaires.

Cette pièce eſt compoſée de ces vertèbres, de l'os ſacrum, de la dernière vertèbre dorſale & des deux dernières des fauſſes côtes.

N.° CDXXII.

Portion de la colonne vertébrale d'une jument, dans laquelle il y a ſix vertèbres lombaires.

Ces vertèbres ſont jointes, comme dans la pièce précédente, à l'os ſacrum, à la dernière des vertèbres dorſales, & aux deux dernières des fauſſes côtes.

Pendant que l'on imprimoit la deſcription du cheval, j'ai trouvé dans un fœtus mâle ſix vertèbres dans les lombes, & dix-ſept fauſſes vertèbres dans la queue.

N.° CDXXIII.

Ankyloſe des os du carpe de la jambe droite d'un cheval, & des os de l'avant-bras & du canon avec le carpe.

Cette pièce eſt compoſée des os du carpe & d'une portion de ceux de l'avant-bras & du canon : tous les os du carpe, la partie inférieure de ceux de l'avant-bras, & la partie ſupérieure des os du canon, ſont revêtus par une très-groſſe exoſtoſe qui

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 414 sur 615

descend plus bas sur le côté intérieur du canon que sur l'extérieur, & qui forme en arrière une gouttière longitudinale sur le carpe & sur les os voisins, cette exostose est hérissée de petites pointes & d'éminences de figures irrégulières; elle a environ un demi-pied de largeur à sa partie supérieure, un demi-pied de longueur au côté interne, & cinq pouces à l'endroit le plus épais.

N.° CDXXIV.

Exostose sur la partie supérieure du tibia de la jambe gauche d'un cheval.

Il n'y a dans cette pièce que la partie supérieure du tibia, dont le condyle intérieur est environné d'une exostose assez grosse, il s'en trouve aussi de petites sur le condyle externe & sur le devant de la tête de l'os.

N.° CDXXV.

Ankylose du tarse de la jambe droite d'un cheval, & de l'os de la jambe & du canon avec le tarse.

Cette pièce est composée des os du tarse & d'une portion de l'os de la jambe & de celui du canon & de ses deux épines; ces os sont revêtus de cartilages, de ligamens & de membranes, de sorte qu'on ne distingue pas précisément quels sont les os exostosés; le plus grand gonflement est sur le calcaneum, au point que l'articulation a un pied & demi de circonférence à cet endroit.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 415 sur 615

N.° CDXXVI.

Ankyloſe du tarſe de la jambe gauche d'un cheval, & de l'os de la jambe & du canon avec le tarſe.

Cette pièce eſt compoſée des os du tarſe, d'une portion de l'os de la jambe & de l'os du canon avec ſes épines en entier; ces os ſont revêtus comme dans la pièce précédente : il paroît que ces deux pièces ont été tirées d'un même animal, parce que les os des jambes ſont de la même groſſeur dans l'une & dans l'autre; les membranes ſont ouvertes ſur le devant de l'articulation de celle-ci, où l'on aperçoit l'os de l'aſtragal & la matière de l'exoſtoſe qui eſt à l'entour; l'articulation paroît un peu plus fléchie qu'elle ne doit l'être naturellement, mais elle n'eſt pas autant gonflée que dans la pièce rapportée au n.° précédent, car elle n'a qu'un pied quatre pouces & demi de circonférence priſe ſur le calcaneum.

N.° CDXXVII.

Ankyloſe du tarſe de la jambe gauche d'un cheval, & de l'os du canon & de ſon épine extérieure avec le tarſe.

Cette pièce eſt compoſée des os du tarſe, de l'os du canon & de ſon épine intérieure en entier, & de la plus grande partie de l'épine extérieure; on voit à découvert la poulie de l'aſtragal, la face interne du corps du calcaneum & la face ſupérieure; on voit auſſi les os du tarſe qui ſont au deſſus de l'épine intérieure du canon; tout le reſte du tarſe, & le côté externe de la partie ſupérieure de l'os du canon & de ſon

épine du même côté, eſt revêtu par une exoſtoſe qui s'étendoit auſſi ſur le côté externe de l'os de la jambe qui en a été ſéparé : cette exoſtoſe eſt fort groſſe ſur le côté externe de cette articulation, elle a environ deux pouces d'épaiſſeur dans le milieu ſur ſix à ſept pouces de diamètre; l'épine intérieure de l'os du canon y tient par une exoſtoſe qui a deux pouces de longueur, & qui eſt ſituée à la partie moyenne ſupérieure de l'os du canon.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 417 sur 615

L'ASNE.

A CONSIDÉRER cet animal, même avec des yeux attentifs & dans un aſſez grand détail, il paroît n'être qu'un cheval dégénéré, la parfaite ſimilitude de conformation dans le cerveau, les poumons, l'eſtomac, le conduit inteſtinal, le cœur, le foie, les autres viſcères, & la grande reſſemblance du corps, des jambes, des pieds & du ſquelette en entier, ſemblent fonder cette opinion; l'on pourroit attribuer les légères différences qui ſe trouvent entre ces deux animaux, à l'influence très-ancienne du climat, de la nourriture, & à la ſucceſſion fortuite de pluſieurs générations de petits chevaux ſauvages à demi dégénérés, qui peu à peu auroient encore dégénéré davantage, ſe ſeroient enſuite dégradés autant qu'il eſt poſſible, & auroient à la fin produit à nos yeux une eſpèce nouvelle & conſtante, ou pluſtôt une ſucceſſion d'individus ſemblables, tous conſtamment viciés de la même façon, & aſſez différens des chevaux pour pouvoir être regardés comme formant une autre eſpèce. Ce qui paroît favoriſer cette idée, c'eſt que les chevaux varient beaucoup plus que les ânes par la couleur de leur poil, qu'ils ſont par conſéquent plus anciennement domeſtiques, puiſque tous les animaux domeſtiques varient par la couleur beaucoup plus que les animaux ſauvages de la même

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 418 sur 615

eſpèce; que la pluſpart des chevaux ſauvages dont parlent les voyageurs, ſont de petite taille, & ont, comme les ânes, le poil gris, la queue nue, hériſſée à l'extrémité, & qu'il y a des chevaux ſauvages, & même des chevaux domeſtiques qui ont la raie noire ſur le dos, & d'autres caractères qui les rapprochent encore des ânes ſauvages ou domeſtiques. D'autre côté, ſi l'on conſidère les différences du tempérament, du naturel, des mœurs, du réſultat, en un mot, de l'organiſation de ces deux animaux, & ſur-tout l'impoſſibilité de les mêler pour en faire une eſpèce commune, ou même une eſpèce intermédiaire qui puiſſe ſe renouveler, on paroît encore mieux fondé à croire que ces deux animaux ſont chacun d'une eſpèce auſſi ancienne l'une que l'autre, & originairement auſſi eſſentiellement différentes qu'elles le ſont aujourd'hui, d'autant plus que l'âne ne laiſſe pas de différer matériellement du cheval par la petiteſſe de la taille, la groſſeur de la tête, la longueur des oreilles, la dureté de la peau, la nudité de la queue, la forme de la croupe, & auſſi par les dimenſions des parties qui en ſont voiſines, par la voix, l'appétit, la manière de boire, &c. L'âne & le cheval viennent-ils donc originairement de la même ſouche? ſont-ils, comme le diſent les nomenclateurs *, de la même *famille!* ou ne ſont-ils pas, & n'ont-ils pas toûjours été, des animaux différens.

Cette queſtion, dont les phyſiciens ſentiront bien la

* *Equus caudâ undique ſetoſâ*, le cheval. *Equus caudâ extremo ſetoſâ*, l'âne. Linnæi ſyſtema Naturæ. Claſſ. 1, ord. 4.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 419 sur 615

généralité, la difficulté, les conſéquences, & que nous avons cru devoir traiter dans cet article, parce qu'elle ſe préſente pour la première fois, tient à la production des êtres de plus près qu'aucune autre, & demande, pour être éclaircie, que nous conſidérions la Nature ſous un nouveau point de vûe. Si, dans l'immenſe variété que nous préſentent tous les êtres animés qui peuplent l'Univers, nous choiſiſſons un animal, ou même le corps de l'homme pour ſervir de baſe à nos connoiſſances, & y rapporter, par la voie de la comparaiſon, les autres êtres organiſés, nous trouverons que quoique tous ces êtres exiſtent ſolitairement, & que tous varient par des différences graduées à l'infini, il exiſte en même temps un deſſein primitif & général qu'on peut ſuivre très-loin, & dont les dégradations ſont bien plus lentes que celles des figures & des autres rapports apparens; car, ſans parler des organes de la digeſtion, de la circulation & de la génération, qui appartiennent à tous les animaux, & ſans leſquels l'animal ceſſeroit d'être animal & ne pourroit ni ſubſiſter ni ſe reproduire, il y a, dans les parties mêmes qui contribuent le plus à la variété de la forme extérieure, une prodigieuſe reſſemblance qui nous rappelle néceſſairement l'idée d'un premier deſſein, ſur lequel tout ſemble avoir été conçû: le corps du cheval, par exemple, qui du premier coup d'œil paroît ſi différent du corps de l'homme, lorſqu'on vient à le comparer en détail & partie par partie, au lieu de ſurprendre par la différence, n'étonne plus que

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 420 sur 615

par la reſſemblance ſingulière & preſque complette qu'on y trouve : en effet, prenez le ſquelette de l'homme, inclinez les os du baſſin, accourciſſez les os des cuiſſes, des jambes & des bras, alongez ceux des pieds & des mains, ſoudez enſemble les phalanges, alongez les mâchoires en raccourciſſant l'os frontal, & enfin alongez auſſi l'épine du dos, ce ſquelette ceſſera de repréſenter la dépouille d'un homme, & ſera le ſquelette d'un cheval, car on peut aiſément ſuppoſer qu'en alongeant l'épine du dos & les mâchoires, on augmente en même temps le nombre des vertèbres, des côtes & des dents, & ce n'eſt en effet que par le nombre de ces os, qu'on peut regarder comme acceſſoires, & par l'alongement, le raccourciſſement ou la jonction des autres, que la charpente du corps de cet animal diffère de la charpente du corps humain. On vient de voir dans la deſcription du cheval, ces faits trop bien établis pour pouvoir en douter; mais, pour ſuivre ces rapports encore plus loin, que l'on conſidère ſéparément quelques parties eſſentielles à la forme, les côtes, par exemple, on les trouvera dans l'homme, dans tous les quadrupèdes, dans les oiſeaux, dans les poiſſons, & on en ſuivra les veſtiges juſque dans la tortue, où elles paroiſſent encore deſſinées par les ſillons qui ſont ſous ſon écaille; que l'on conſidère, comme l'a remarqué M. Daubenton, que le pied d'un cheval, en apparence ſi différent de la main de l'homme, eſt cependant compoſé des mêmes os, & que nous

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 421 sur 615

avons à l'extrémité de chacun de nos doigts, le même oſſelet en fer-à-cheval qui termine le pied de cet animal; & l'on jugera ſi cette reſſemblance cachée n'eſt pas plus merveilleuſe que les différences apparentes, ſi cette conformité conſtante & ce deſſein ſuivi de l'homme aux quadrupèdes, des quadrupèdes aux cétacés, des cétacés aux oiſeaux, des oiſeaux aux reptiles, des reptiles aux poiſſons, &c. dans leſquels les parties eſſentielles, comme le cœur, les inteſtins, l'épine du dos, les ſens, &c. ſe trouvent toûjours, ne ſemblent pas indiquer qu'en créant les animaux, l'Être ſuprême n'a voulu employer qu'une idée, & la varier en même temps de toutes les manières poſſibles, afin que l'homme pût admirer également, & la magnificence de l'exécution, & la ſimplicité du deſſein.

Dans ce point de vûe, non ſeulement l'âne & le cheval, mais même l'homme, le ſinge, les quadrupèdes & tous les animaux, pourroient être regardés comme ne faiſant que la même *famille*; mais en doit-on conclurre que dans cette grande & nombreuſe *famille*, que Dieu ſeul a conçûe & tirée du néant, il y ait d'autres petites *familles* projetées par la Nature & produites par le temps, dont les unes ne ſeroient compoſées que de deux individus, comme le cheval & l'âne, d'autres de pluſieurs individus, comme celle de la belette, de la martre, du furet, de la fouine, &c. & de même, que dans les végetaux il y ait des *familles* de dix, vingt, trente, &c. plantes! Si ces *familles* exiſtoient

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 422 sur 615

en effet, elles n'auroient pû ſe former que par le mélange, la variation ſucceſſive & la dégénération des eſpèces originaires; & ſi l'on admet une fois qu'il y ait des *familles* dans les plantes & dans les animaux, que l'âne ſoit de la *famille* du cheval, & qu'il n'en diffère que parce qu'il a dégénéré, on pourra dire également que le ſinge eſt de la *famille* de l'homme, que c'eſt un homme dégénéré, que l'homme & le ſinge ont eu une origine commune comme le cheval & l'âne, que chaque *famille*, tant dans les animaux que dans les végétaux, n'a eu qu'une ſeule ſouche, & même que tous les animaux ſont venus d'un ſeul animal, qui, dans la ſucceſſion des temps, a produit en ſe perfectionnant & en dégénérant, toutes les races des autres animaux.

Les Naturaliſtes qui établiſſent ſi légèrement des familles dans les animaux & dans les végétaux, ne paroiſſent pas avoir aſſez ſenti toute l'étendue de ces conſéquences, qui réduiroient le produit immédiat de la création à un nombre d'individus auſſi petit que l'on voudroit: car s'il étoit une fois prouvé qu'on pût établir ces *familles* avec raiſon, s'il étoit acquis que dans les animaux, & même dans les végétaux, il y eût, je ne dis pas pluſieurs eſpèces, mais une ſeule qui eût été produite par la dégénération d'une autre eſpèce; s'il étoit vrai que l'âne ne fût qu'un cheval dégénéré, il n'y auroit plus de bornes à la puiſſance de la Nature, & l'on nauroit pas tort de ſuppoſer que d'un ſeul être elle a ſû tirer avec le temps tous les autres êtres organiſés.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 423 sur 615

Mais non, il eſt certain, par la révélation, que tous les animaux ont également participé à la grace de la création, que les deux premiers de chaque eſpèce & de toutes les eſpèces ſont ſortis tout formés des mains du Créateur, & l'on doit croire qu'ils étoient tels alors, à peu près, qu'ils nous ſont aujourd'hui repréſentés par leurs deſcendans; d'ailleurs, depuis qu'on obſerve la Nature, depuis le temps d'Ariſtote juſqu'au nôtre, l'on n'a pas vû paroître d'eſpèces nouvelles, malgré le mouvement rapide qui entraîne, amoncelle ou diſſipe les parties de la matière, malgré le nombre infini de combinaiſons qui ont dû ſe faire pendant ces vingt ſiècles; malgré les accouplemens fortuits ou forcés des animaux d'eſpèces éloignées ou voiſines, dont il n'a jamais réſulté que des individus viciés & ſtériles, & qui n'ont pû faire ſouche pour de nouvelles générations. La reſſemblance, tant extérieure qu'intérieure fût-elle dans quelques animaux encore plus grande qu'elle ne l'eſt dans le cheval & dans l'âne, ne doit donc pas nous porter à confondre ces animaux dans la même *famille*, non plus qu'à leur donner une commune origine; car s'ils venoient de la même ſouche, s'ils étoient en effet de la même *famille*, on pourroit les rapprocher, les allier de nouveau, & défaire avec le temps ce que le temps auroit fait.

Il faut de plus conſidérer que, quoique la marche de la Nature ſe faſſe par nuances & par degrés, ſouvent imperceptibles, les intervalles de ces degrés ou de ces

nuances ne ſont pas tous égaux à beaucoup près; que plus les eſpèces ſont élevées, moins elles ſont nombreuſes, & plus les intervalles des nuances qui les ſéparent y ſont grands, que les petites eſpèces au contraire ſont très-nombreuſes, & en même temps plus voiſines les unes des autres, en ſorte qu'on eſt d'autant plus tenté de les confondre enſemble dans une même *famille*, qu'elles nous embarraſſent & nous fatiguent davantage par leur multitude & par leurs petites différences, dont nous ſommes obligés de nous charger la mémoire: mais il ne faut pas oublier que ces *familles* ſont notre ouvrage, que nous ne les avons faites que pour le ſoulagement de notre eſprit, que s'il ne peut comprendre la ſuite réelle de tous les êtres, c'eſt notre faute & non pas celle de la Nature, qui ne connoit point ces prétendues *familles*, & ne contient en effet que des individus.

Un individu eſt un être à part, iſolé, détaché, & qui n'a rien de commun avec les autres êtres, ſinon qu'il leur reſſemble ou bien qu'il en diffère : tous les individus ſemblables, qui exiſtent ſur la ſurface de la terre, ſont regardés comme compoſant l'eſpèce de ces individus; cependant ce n'eſt ni le nombre ni la collection des individus ſemblables qui fait l'eſpèce, c'eſt la ſucceſſion conſtante & le renouvellement non interrompu de ces individus qui la conſtituent; car un être qui dureroit toûjours ne ſeroit pas une eſpèce, non plus qu'un million d'êtres ſemblables qui dureroient auſſi toûjours: l'eſpèce eſt donc un mot abſtrait & général,

général, dont la choſe n'exiſte qu'en conſidérant la Nature dans la ſucceſſion des temps, & dans la deſtruction conſtante & le renouvellement tout auſſi conſtant des êtres : c'eſt en comparant la Nature d'aujourd'hui à celle des autres temps, & les individus actuels aux individus paſſés, que nous avons pris une idée nette de ce que l'on appelle eſpèce, & la comparaiſon du nombre ou de la reſſemblance des individus n'eſt qu'une idée acceſſoire & ſouvent indépendante de la première : car l'âne reſſemble au cheval plus que le barbet au levrier, & cependant le barbet & le levrier ne ſont qu'une même eſpèce, puiſqu'ils produiſent enſemble des individus qui peuvent eux-mêmes en produire d'autres, au lieu que le cheval & l'âne ſont certainement de différentes eſpèces, puiſqu'ils ne produiſent enſemble que des individus viciés & inféconds.

C'eſt donc dans la diverſité caractériſtique des eſpèces que les intervalles des nuances de la Nature ſont le plus ſenſibles & le mieux marqués, on pourroit même dire que ces intervalles entre les eſpèces ſont les plus égaux & les moins variables de tous, puiſqu'on peut toûjours tirer une ligne de ſéparation entre deux eſpèces, c'eſt-à-dire, entre deux ſucceſſions d'individus qui ſe reproduiſent & ne peuvent ſe mêler, comme l'on peut auſſi réunir en une ſeule eſpèce deux ſucceſſions d'individus qui ſe reproduiſent en ſe mêlant : ce point eſt le plus fixe que nous ayons en Hiſtoire Naturelle, utes les autres reſſemblances & toutes les autres

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 426 sur 615

différences que l'on pourroit saisir dans la comparaison des êtres, ne seroient, ni si constantes, ni si réelles, ni si certaines; ces intervalles sont aussi les seules lignes de séparation que l'on trouvera dans notre ouvrage, nous ne diviserons pas les êtres autrement qu'ils le sont en effet, chaque espèce, chaque succession d'individus qui se reproduisent & ne peuvent se mêler, sera considérée à part & traitée séparément, & nous ne nous servirons des *familles;* des genres, des ordres & des classes, pas plus que ne s'en sert la Nature.

L'espèce n'étant donc autre chose qu'une succession constante d'individus semblables & qui se reproduisent, il est clair que cette dénomination ne doit s'étendre qu'aux animaux & aux végétaux, & que c'est par un abus des termes ou des idées, que les nomenclateurs l'ont employée pour désigner les différentes sortes de minéraux : on ne doit donc pas regarder le fer comme une espèce, & le plomb comme une autre espèce, mais seulement comme deux métaux différens; & l'on verra dans notre discours sur les minéraux, que les lignes de séparation que nous emploierons dans la division des matières minérales, seront bien différentes de celles que nous employons pour les animaux & pour les végétaux.

Mais pour en revenir à la dégénération des êtres, & particulièrement à celle des animaux, observons & examinons encore de plus près les mouvemens de la Nature dans les variétés qu'elle nous offre; & comme l'espèce

humaine nous eſt la mieux connue, voyons juſqu'où s'étendent ces mouvemens de variation. Les hommes diffèrent du blanc au noir par la couleur, du double au ſimple par la hauteur de la taille, la groſſeur, la légèreté, la force, &c. & du tout au rien pour l'eſprit; mais cette dernière qualité n'appartenant point à la matière, ne doit point être ici conſidérée; les autres ſont les variations ordinaires de la Nature qui viennent de l'influence du climat & de la nourriture; mais ces différences de couleur & de dimenſion dans la taille n'empêchent pas que le Nègre & le Blanc, le Lappon & le Patagon, le géant & le nain, ne produiſent enſemble des individus qui peuvent eux-mêmes ſe reproduire, & que par conſéquent ces hommes, ſi différens en apparence, ne ſoient tous d'une ſeule & même eſpèce, puiſque cette reproduction conſtante eſt ce qui conſtitue l'eſpèce. Après ces variations générales, il y en a d'autres qui ſont plus particulières, & qui ne laiſſent pas de ſe perpétuer, comme les énormes jambes des hommes qu'on appelle *de la race de S.t Thomas* [a] *dans l'iſle de Ceylan*, les yeux rouges & les cheveux blancs des Dariens & des Chacrelas, les ſix doigts [b] aux mains & aux pieds dans certaines familles, &c. ces variétés

[a] Voyez le troiſième volume de cette Hiſtoire Naturelle, article *Variétés dans l'eſpèce humaine.*

[b] Voy. cette obſervation curieuſe dans les lettres de M. de Maupertuis, où vous trouverez auſſi pluſieurs idées philoſophiques très-élevées ſur la génération & ſur différens autres ſujets.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 428 sur 615

ſingulières ſont des défauts ou des excès accidentels qui, s'étant d'abord trouvés dans quelques individus, ſe ſont enſuite propagés de race en race, comme les autres vices & maladies héréditaires; mais ces différences, quoique conſtantes, ne doivent être regardées que comme des variétés individuelles qui ne ſéparent pas ces individus de leur eſpèce, puiſque les races extraordinaires de ces hommes à groſſes jambes ou à ſix doigts peuvent ſe mêler avec la race ordinaire, & produire des individus qui ſe reproduiſent eux-mêmes. On doit dire la même choſe de toutes les autres difformités ou monſtruoſités qui ſe communiquent des pères & mères aux enfans : voilà juſqu'où s'étendent les erreurs de la Nature, voilà les plus grandes limites de ces variétés dans l'homme : & s'il y a des individus qui dégénèrent encore davantage, ces individus ne reproduiſant rien, n'altèrent ni la conſtance ni l'unité de l'eſpèce ; ainſi il n'y a dans l'homme qu'une ſeule & même eſpèce, & quoique cette eſpèce ſoit peut-être la plus nombreuſe & la plus abondante en individus, & en même temps la plus inconſéquente & la plus irrégulière dans toutes ces actions, on ne voit pas que cette prodigieuſe diverſité de mouvemens, de nourriture, de climat, & de tant d'autres combinaiſons, que l'on peut ſuppoſer, ait produit des êtres aſſez différens des autres pour faire de nouvelles ſouches, & en même temps aſſez ſemblables à nous pour ne pouvoir nier de leur avoir appartenu.

Si le Nègre & le Blanc ne pouvoient produire

enſemble, ſi même leur production demeuroit inféconde, ſi le Mulâtre étoit un vrai mulet, il y auroit alors deux eſpèces bien diſtinctes; le Nègre ſeroit à l'homme ce que l'âne eſt au cheval, ou pluſtôt, ſi le Blanc étoit homme, le Nègre ne ſeroit plus un homme, ce ſeroit un animal à part comme le ſinge, & nous ſerions en droit de penſer que le Blanc & le Nègre n'auroient point eu une origine commune; mais cette ſuppoſition même eſt démentie par le fait, & puiſque tous les hommes peuvent communiquer & produire enſemble, tous les hommes viennent de la même ſouche & ſont de la même famille.

Que deux individus ne puiſſent produire enſemble, il ne faut pour cela que quelques légères diſconvenances dans le tempérament, ou quelque défaut accidentel dans les organes de la génération de l'un ou de l'autre de ces deux individus; que deux individus de différentes eſpèces, & que l'on joint enſemble, produiſent d'autres individus qui ne reſſemblant ni à l'un ni à l'autre, ne reſſemblent à rien de fixe, & ne peuvent par conſéquent rien produire de ſemblable à eux, il ne faut pour cela qu'un certain degré de convenance entre la forme du corps & les organes de la génération de ces animaux différens; mais quel nombre immenſe & peut-être infini de combinaiſons ne faudroit-il pas pour pouvoir ſeulement ſuppoſer que deux animaux, mâle & femelle, d'une certaine eſpèce, ont non ſeulement aſſez dégénéré pour n'être plus de cette eſpèce,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 430 sur 615

c'eſt-à-dire, pour ne pouvoir plus produire avec ceux auxquels ils étoient ſemblables, mais encore dégénéré tous deux préciſément au même point, & à ce point néceſſaire pour ne pouvoir produire qu'enſemble ! & enſuite quelle autre prodigieuſe immenſité de combinaiſons ne faudroit-il pas encore pour que cette nouvelle production de ces deux animaux dégénérés ſuivît exactement les mêmes loix qui s'obſervent dans la production des animaux parfaits ! car un animal dégénéré eſt lui-même une production viciée ; & comment ſe pourroit-il qu'une origine viciée, qu'une dépravation, une négation, pût faire ſouche, & non ſeulement produire une ſucceſſion d'êtres conſtans, mais même les produire de la même façon & ſuivant les mêmes loix que ſe reproduiſent en effet les animaux dont l'origine eſt pure !

Quoiqu'on ne puiſſe donc pas démontrer que la production d'une eſpèce par la dégénération, ſoit une choſe impoſſible à la Nature, le nombre des probabilités contraires eſt ſi énorme, que philoſophiquement même on n'en peut guère douter ; car ſi quelque eſpèce a été produite par la dégénération d'une autre, ſi l'eſpèce de l'âne vient de l'eſpèce du cheval, cela n'a pû ſe faire que ſucceſſivement & par nuances, il y auroit eu entre le cheval & l'âne un grand nombre d'animaux intermédiaires, dont les premiers ſe ſeroient peu à peu éloignés de la nature du cheval, & les derniers ſe ſeroient approchés peu à peu de celle de l'âne ; &

pourquoi ne verrions-nous pas aujourd'hui les repréſentans, les deſcendans de ces eſpèces intermédiaires? pourquoi n'en eſt-il demeuré que les deux extrêmes?

L'âne eſt donc un âne, & n'eſt point un cheval dégénéré, un cheval à queue nue; il n'eſt, ni étranger, ni intrus, ni bâtard; il a, comme tous les autres animaux, ſa famille, ſon eſpèce & ſon rang; ſon ſang eſt pur, & quoique ſa nobleſſe ſoit moins illuſtre, elle eſt toute auſſi bonne, toute auſſi ancienne que celle du cheval; pourquoi donc tant de mépris pour cet animal, ſi bon, ſi patient, ſi ſobre, ſi utile! Les hommes mépriſeroient-ils juſque dans les animaux, ceux qui les ſervent trop bien & à trop peu de frais! On donne au cheval de l'éducation, on le ſoigne, on l'inſtruit, on l'exerce, tandis que l'âne, abandonné à la groſſièreté du dernier des valets, ou à la malice des enfans, bien loin d'acquerir ne peut que perdre par ſon éducation; & s'il n'avoit pas un grand fonds de bonnes qualités, il les perdroit en effet par la manière dont on le traite: il eſt le jouet, le plaſtron, le bardeau des ruſtres qui le conduiſent le bâton à la main, qui le frappent, le ſurchargent, l'excèdent, ſans précaution, ſans ménagement; on ne fait pas attention que l'âne ſeroit par lui-même, & pour nous, le premier, le plus beau, le mieux fait, le plus diſtingué des animaux, ſi dans le monde il n'y avoit point de cheval; il eſt le ſecond au lieu d'être le premier, & par cela ſeul il ſemble n'être plus rien: c'eſt la comparaiſon qui le dégrade; on le

regarde, on le juge, non pas en lui-même, mais relativement au cheval; on oublie qu'il eſt âne, qu'il a toutes les qualités de ſa nature, tous les dons attachés à ſon eſpèce, & on ne penſe qu'à la figure & aux qualités du cheval, qui lui manquent, & qu'il ne doit pas avoir.

Il eſt de ſon naturel auſſi humble, auſſi patient, auſſi tranquille que le cheval eſt fier, ardent, impétueux; il ſouffre avec conſtance, & peut-être avec courage, les châtimens & les coups; il eſt ſobre, & ſur la quantité, & ſur la qualité de la nourriture; il ſe contente des herbes les plus dures, les plus deſagréables, que le cheval & les autres animaux lui laiſſent & dédaignent; il eſt fort délicat ſur l'eau, il ne veut boire que de la plus claire & aux ruiſſeaux qui lui ſont connus; il boit auſſi ſobrement qu'il mange, & n'enfonce point du tout ſon nez dans l'eau par la peur que lui fait, dit-on, l'ombre de ſes oreilles *: comme l'on ne prend pas la peine de l'étriller, il ſe roule ſouvent ſur le gazon, ſur les chardons, ſur la fougère, & ſans ſe ſoucier beaucoup de ce qu'on lui fait porter, il ſe couche pour ſe rouler toutes les fois qu'il le peut, & ſemble par-là reprocher à ſon maître le peu de ſoin qu'on prend de lui; car il ne ſe veautre pas comme le cheval dans la fange & dans l'eau, il craint même de ſe mouiller les pieds, & ſe détourne pour éviter la boue; auſſi a-t-il la jambe plus sèche & plus nette

* Voyez Cardan *de ſubtilitate*, lib. x.

que

que le cheval; il eſt ſuſceptible d'éducation, & l'on en a vû d'aſſez bien dreſſés * pour faire curioſité de ſpectacle.

Dans la première jeuneſſe il eſt gai, & même aſſez joli, il a de la légèreté & de la gentilleſſe; mais il la perd bien-tôt, ſoit par l'âge, ſoit par les mauvais traitemens, & il devient lent, indocile & têtu; il n'eſt ardent que pour le plaiſir, ou pluſtôt il en eſt furieux au point que rien ne peut le retenir, & que l'on en a vû s'excéder & mourir quelques inſtans après; & comme il aime avec une eſpèce de fureur, il a auſſi pour ſa progéniture le plus fort attachement. Pline nous aſſure que lorſqu'on ſépare la mère de ſon petit, elle paſſe à travers les flammes pour aller le rejoindre; il s'attache auſſi à ſon maître, quoiqu'il en ſoit ordinairement maltraité, il le ſent de loin, & le diſtingue de tous les autres hommes; il reconnoît auſſi les lieux qu'il a coûtume d'habiter, les chemins qu'il a fréquentés; il a les yeux bons, l'odorat admirable, ſur-tout pour les corpuſcules de l'âneſſe, l'oreille excellente, ce qui a encore contribué à le faire mettre au nombre des animaux timides, qui ont tous, à ce qu'on prétend, l'ouïe très-fine & les oreilles longues: lorſqu'on le ſurcharge, il le marque en inclinant la tête & baiſſant les oreilles; lorſqu'on le tourmente trop, il ouvre la bouche & retire les lèvres d'une manière très-deſagréable, ce qui lui donne l'air moqueur & dériſoire;

* *Vide Aldrovand. de quadrup. ſolidiped.* lib. 1, pag. 308.

ſi on lui couvre les yeux, il reſte immobile; & lorſqu'il eſt couché ſur le côté, ſi on lui place la tête de manière que l'œil ſoit appuyé ſur la terre, & qu'on couvre l'autre œil avec une pierre ou un morceau de bois, il reſtera dans cette ſituation ſans faire aucun mouvement & ſans ſe ſecouer pour ſe relever : il marche, il trotte & il galoppe comme le cheval; mais tous ſes mouvemens ſont petits & beaucoup plus lents; quoiqu'il puiſſe d'abord courir avec aſſez de vîteſſe, il ne peut fournir qu'une petite carrière pendant un petit eſpace de temps; & quelque alure qu'il prenne, ſi on le preſſe, il eſt bien-tôt rendu.

Le cheval hennit, l'âne brait, ce qui ſe fait par un grand cri très-long, très-deſagréable, & diſcordant par diſſonances alternatives de l'aigu au grave & du grave à l'aigu; ordinairement il ne crie que lorſqu'il eſt preſſé d'amour ou d'appétit: l'âneſſe a la voix plus claire & plus perçante; l'âne qu'on a fait hongre ne brait qu'à baſſe voix, & quoiqu'il paroiſſe faire autant d'effort & les mêmes mouvemens de la gorge, ſon cri ne ſe fait pas entendre de loin.

De tous les animaux couverts de poil, l'âne eſt celui qui eſt le moins ſujet à la vermine, jamais il n'a de poux, ce qui vient apparemment de la dureté & de la ſéchereſſe de ſa peau qui eſt en effet plus dure que celle de la pluſpart des autres quadrupèdes; & c'eſt par la même raiſon qu'il eſt bien moins ſenſible que le cheval au fouet & à la piqûre des mouches.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 435 sur 615

A deux ans & demi les premières dents inciſives du milieu tombent, & enſuite les autres inciſives à côté des premières tombent auſſi & ſe renouvellent dans le même temps & dans le même ordre que celles du cheval, l'on connoît auſſi l'âge de l'âne par les dents, les troiſièmes inciſives de chaque côté le marquent comme dans le cheval.

Dès l'âge de deux ans l'âne eſt en état d'engendrer; la femelle eſt encore plus précoce que le mâle, & elle eſt toute auſſi laſcive; c'eſt par cette raiſon qu'elle eſt très-peu féconde, elle rejette au dehors la liqueur qu'elle vient de recevoir dans l'accouplement, à moins qu'on n'ait ſoin de lui ôter promptement la ſenſation du plaiſir, en lui donnant des coups pour calmer la ſuite des convulſions & des mouvemens amoureux, ſans cette précaution elle ne retiendroit que très-rarement : le temps le plus ordinaire de la chaleur eſt le mois de mai & celui de juin; lorſqu'elle eſt pleine, la chaleur ceſſe bien-tôt, & dans le dixième mois le lait paroît dans les mamelles; elle met bas dans le douzième mois, & ſouvent il ſe trouve des morceaux ſolides dans la liqueur de l'amnios, ſemblables à l'hippomanès du poulain; ſept jours après l'accouchement la chaleur ſe renouvelle, & l'âneſſe eſt en état de recevoir le mâle, en ſorte qu'elle peut, pour ainſi dire, continuellement engendrer & nourrir; elle ne produit qu'un petit, & ſi rarement deux, qu'à peine en a-t-on des exemples: au bout de cinq ou ſix mois on peut ſevrer l'ânon, &

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 436 sur 615

cela eſt même néceſſaire ſi la mère eſt pleine, pour qu'elle puiſſe mieux nourrir ſon fœtus. L'âne étalon doit être choiſi parmi les plus grands & les plus forts de ſon eſpèce, il faut qu'il ait au moins trois ans, & qu'il n'en paſſe pas dix, qu'il ait les jambes hautes, le corps étoffé, la tête élevée & légère, les yeux vifs, les naſeaux gros, l'encolure un peu longue, le poitrail large, les reins charnus, la côte large, la croupe platte, la queue courte, le poil luiſant, doux au toucher & d'un gris foncé.

L'âne, qui comme le cheval eſt trois ou quatre ans à croître, vit auſſi comme lui vingt-cinq ou trente ans; on prétend ſeulement que les femelles vivent ordinairement plus long-temps que les mâles, mais cela ne vient peut-être que de ce qu'étant ſouvent pleines, elles ſont un peu plus ménagées, au lieu qu'on excède continuellement les mâles de fatigues & de coups; ils dorment moins que les chevaux, & ne ſe couchent pour dormir que quand ils ſont excédés: l'âne étalon dure auſſi plus long-temps que le cheval étalon, plus il eſt vieux, plus il paroît ardent, & en général la ſanté de cet animal eſt bien plus ferme que celle du cheval; il eſt moins délicat, & il n'eſt pas ſujet, à beaucoup près, à un auſſi grand nombre de maladies: les Anciens mêmes ne lui en connoiſſoient guère d'autres que celle de la morve, à laquelle il eſt, comme nous l'avons dit, encore bien moins ſujet que le cheval.

Il y a parmi les ânes différentes races comme parmi

les chevaux, mais que l'on connoît moins, parce qu'on ne les a ni ſoignés ni ſuivis avec la même attention; ſeulement on ne peut guère douter que tous ne ſoient originaires des climats chauds : Ariſtote[a] aſſure qu'il n'y en avoit point de ſon temps en Scythie, ni dans les autres pays ſeptentrionaux qui avoiſinent la Scythie, ni même dans les Gaules, dont le climat, dit-il, ne laiſſe pas d'être froid; & il ajoûte que le climat froid, ou les empêche de produire, ou les fait dégénérer, & que c'eſt par cette dernière raiſon que dans l'Illyrie, la Thrace & l'Épire ils ſont petits & foibles; ils ſont encore tels en France, quoiqu'ils y ſoient déjà aſſez anciennement naturaliſés, & que le froid du climat ſoit bien diminué depuis deux mille ans par la quantité de forêts abattues & de marais deſſéchés; mais ce qui paroît encore plus certain, c'eſt qu'ils ſont nouveaux[b] pour la Suède & pour les autres pays du nord; ils paroiſſent être venus originairement d'Arabie, & avoir paſſé d'Arabie en Égypte, d'Égypte en Grèce, de Grèce en Italie, d'Italie en France; & enſuite en Allemagne, en Angleterre, & enfin en Suède, &c. car ils ſont en effet d'autant moins forts & d'autant plus petits, que les climats ſont plus froids.

Cette migration paroît aſſez bien prouvée par le rapport des voyageurs : Chardin[c] dit « qu'il y a de deux

[a] *Vide Ariſtot. de generat. animal.* lib. II.

[b] *Vide Linnæi Faunam Suecicam.*

[c] Voy. le voyage de Chardin, *tome II, pages 26 & 27.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 438 sur 615

» ſortes d'ânes en Perſe, les ânes du pays qui ſont lents » & peſans, & dont on ne ſe ſert que pour porter des » fardeaux, & une race d'ânes d'Arabie, qui ſont de fort » jolies bêtes & les premiers ânes du monde; ils ont le » poil poli, la tête haute, les pieds légers, ils les lèvent » avec action, marchant bien, & l'on ne s'en ſert que » pour monture; les ſelles qu'on leur met ſont comme » des bâts ronds & plats par deſſus, elles ſont de drap » ou de tapiſſerie avec les harnois & les étriers, on s'aſſied » deſſus plus vers la croupe que vers le col : il y a de » ces ânes qu'on achette juſqu'à quatre cens livres, & » l'on n'en ſauroit avoir à moins de vingt-cinq piſtoles; » on les panſe comme les chevaux, mais on ne leur » apprend autre choſe qu'à aller l'amble, & l'art de les y » dreſſer eſt de leur attacher les jambes, celles de devant » & celles de derrière du même côté, par deux cordes » de coton, qu'on fait de la meſure du pas de l'âne qui » va l'amble, & qu'on ſuſpend par une autre corde paſſée » dans la ſangle à l'endroit de l'étrier; des eſpèces » d'Écuyers les montent ſoir & matin & les exercent à » cette alure; on leur fend les naſeaux afin de leur donner » plus d'haleine, & ils vont ſi vîte, qu'il faut galoper pour les ſuivre. »

Les Arabes, qui ſont dans l'habitude de conſerver avec tant de ſoin & depuis ſi long-temps les races de leurs chevaux, prendroient-ils la même peine pour les ânes! ou pluſtôt ceci ne ſemble-t-il pas prouver que le climat d'Arabie eſt le premier & le meilleur climat pour

les uns & pour les autres: de-là ils ont passé en Barbarie [a], en Égypte, où ils sont beaux & de grande taille, aussi-bien que dans les climats excessivement chauds, comme aux Indes & en Guinée [b], où ils sont plus grands, plus forts & meilleurs que les chevaux du pays; ils sont même en grand honneur à Maduré [c], où l'une des plus considérables & des plus nobles tribus des Indes les révère particulièrement, parce qu'ils croient que les ames de toute la noblesse passent dans le corps des ânes; enfin l'on trouve les ânes en plus grande quantité que les chevaux dans tous les pays méridionaux, depuis le Sénégal jusqu'à la Chine; on y trouve aussi des ânes sauvages plus communément que des chevaux sauvages: les Latins, d'après les Grecs, ont appelé l'âne sauvage *onager,* onagre, qu'il ne faut pas confondre, comme l'ont fait quelques Naturalistes & plusieurs voyageurs, avec le zèbre, dont nous donnerons l'histoire à part, parce que le zèbre est un animal d'une espèce différente de celle de l'âne. L'onagre ou l'âne sauvage n'est point rayé comme le zèbre, & il n'est pas, à beaucoup près, d'une figure aussi élégante: on trouve des ânes sauvages dans quelques isles de l'Archipel, & particulièrement dans celle de Cérigo [d]; il y en a

[a] Voyez le voyage de Shaw, *tome I, page 308.*

[b] Voy. le voyage de Guinée de Bosman. *Utrecht, 1705, pages 239 & 240.*

[c] Voyez les lettres édifiantes, douzième recueil, *page 96.*

[d] Voyez le recueil de Dapper, *pages 185 & 378.*

beaucoup dans les deſerts de Lybie & de Numidie [a], ils ſont gris & courent ſi vîte, qu'il n'y a que les chevaux barbes qui puiſſent les atteindre à la courſe; lorſqu'ils voient un homme, ils jettent un cri, font une ruade, s'arrêtent, & ne fuient que lorſqu'on les approche; on les prend dans des piéges & dans des lacs de corde, ils vont par troupe pâturer & boire, on en mange la chair. Il y avoit auſſi du temps de Marmol, que je viens de citer, des ânes ſauvages dans l'iſle de Sardaigne, mais plus petits que ceux d'Afrique; & Pietro della Valle dit [b] avoir vû un âne ſauvage à Baſſora; ſa figure n'étoit point différente de celle des ânes domeſtiques, il étoit ſeulement d'une couleur plus claire, & il avoit, depuis la tête juſqu'à la queue, une raie de poil blond, il étoit auſſi beaucoup plus vif & plus léger à la courſe que les ânes ordinaires. Olearius [c] rapporte qu'un jour le roi de Perſe le fit monter avec lui dans un petit bâtiment en forme de théatre, pour faire collation de fruits & de confitures; qu'après le repas on fit entrer trente-deux ânes ſauvages ſur leſquels le Roi tira quelques coups de fuſil & de flêche, & qu'il permit enſuite aux ambaſſadeurs & autres Seigneurs de tirer; que ce n'étoit pas un petit divertiſſement de voir ces ânes, chargés qu'ils étoient

[a] *Vide Leonis afric. de Afric. deſcript.* tome II, page 52; & l'Afrique de Marmol, *tome I, page 53.*

[b] Voy. les voyages de Pietro della Valle, *tome VIII, page 49.*

[c] Voy. le voyage d'Adam Olearius. *Paris, 1656, t. I, p. 511.*

quelquefois

quelquefois de plus de dix flêches, dont ils incommodoient & bleſſoient les autres quand ils ſe mêloient avec eux, de ſorte qu'ils ſe mettoient à ſe mordre & à ruer les uns contre les autres d'une étrange façon, & que quand on les eut tous abattus & couchés de rang devant le Roi, on les envoya à Iſpahan à la cuiſine de la Cour, les Perſans faiſant un ſi grand état de la chair de ces ânes ſauvages, qu'ils en ont fait un proverbe, &c. Mais il n'y a pas apparence que ces trente-deux ânes ſauvages fuſſent tous pris dans les forêts, & c'étoient probablement des ânes qu'on élevoit dans de grands parcs pour avoir le plaiſir de les chaſſer & de les manger.

On n'a point trouvé d'ânes en Amérique, non plus que de chevaux, quoique le climat, ſur-tout celui de l'Amérique méridionale, leur convienne autant qu'aucun autre; ceux que les Eſpagnols y ont tranſportés d'Europe, & qu'ils ont abandonnés dans les grandes iſles & dans le continent, y ont beaucoup multiplié, & l'on y trouve * en pluſieurs endroits des ânes ſauvages qui vont par troupes, & que l'on prend dans des piéges comme les chevaux ſauvages.

L'âne avec la jument produit les grands mulets, le cheval avec l'âneſſe produit les petits mulets, différens des premiers à pluſieurs égards; mais nous nous réſervons de traiter en particulier de la génération des

* Voyez le nouveau voyage aux iſles de l'Amérique. *Paris, 1722, tome II, page 293.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 442 sur 615

mulets, des jumars, &c. & nous terminerons l'hiſtoire de l'âne par celles de ſes propriétés & des uſages auxquels nous pouvons l'employer.

Comme les ânes ſauvages ſont inconnus dans ces climats, nous ne pouvons pas dire ſi leur chair eſt en effet bonne à manger; mais ce qu'il y a de ſûr, c'eſt que celle des ânes domeſtiques eſt très-mauvaiſe, & plus mauvaiſe, plus dure, plus deſagréablement inſipide que celle du cheval; Galien * dit même que c'eſt un aliment pernicieux & qui donne des maladies: le lait d'âneſſe au contraire eſt un remède éprouvé & ſpécifique pour certains maux, & l'uſage de ce remède s'eſt conſervé depuis les Grecs juſqu'à nous; pour l'avoir de bonne qualité, il faut choiſir une âneſſe jeune, ſaine, bien en chair, qui ait mis bas depuis peu de temps, & qui n'ait pas été couverte depuis; il faut lui ôter l'ânon qu'elle alaite, la tenir propre, la bien nourrir de foin, d'avoine, d'orge & d'herbes dont les qualités ſalutaires puiſſent influer ſur la maladie, avoir attention de ne pas laiſſer refroidir le lait, & même ne le pas expoſer à l'air, ce qui le gâteroit en peu de temps.

Les Anciens attribuoient auſſi beaucoup de vertus médicinales au ſang, à l'urine, &c. de l'âne, & beaucoup d'autres qualités ſpécifiques à la cervelle, au cœur, au foie, &c. de cet animal; mais l'expérience a détruit, ou du moins n'a pas confirmé ce qu'ils nous en diſent.

* Vide *Galen. de aliment. facult.* lib. III.

Comme la peau de l'âne eſt très-dure & très-élaſtique, on l'emploie utilement à différens uſages, on en fait des cribles, des tambours & de très-bons ſouliers, on en fait du gros parchemin pour les tablettes de poche, que l'on enduit d'une couche légère de plâtre; c'eſt auſſi avec le cuir de l'âne que les Orientaux font le ſagri *, que nous appelons *chagrin*. Il y a apparence que les os, comme la peau de cet animal, ſont auſſi plus durs que les os des autres animaux, puiſque les Anciens en faiſoient des flûtes, & qu'ils les trouvoient plus ſonnans que tous les autres os.

L'âne eſt peut-être de tous les animaux celui qui, relativement à ſon volume, peut porter les plus grands poids; & comme il ne coûte preſque rien à nourrir, & qu'il ne demande, pour ainſi dire, aucun ſoin, il eſt d'une grande utilité à la campagne, au moulin, &c. il peut auſſi ſervir de monture, toutes ſes alures ſont douces, & il bronche moins que le cheval; on le met ſouvent à la charrue dans les pays où le terrein eſt léger, & ſon fumier eſt un excellent engrais pour les terres fortes & humides.

* Voyez le voyage de Thévenot, *tome II, page 64.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 444 sur 615

DESCRIPTION
DE L'ASNE.

ON diſtingue aiſément au premier coup d'œil l'âne du cheval, on ne confond jamais ces animaux, quand même on en verroit deux qui ſeroient préciſément de la même taille & de la même couleur; cependant, lorſque l'on conſidère en détail les différentes parties extérieures du corps de l'âne, & qu'on les compare à celles du cheval, on trouve, dans la pluſpart de ces parties tant de rapports & une reſſemblance ſi parfaite, qu'on eſt ſurpris que leur enſemble paroiſſe ſenſiblement différent de l'enſemble des parties du cheval : & de même ſi on vient à ouvrir le corps de l'âne, à développer ſes entrailles & à dépouiller ſon ſquelette, on croit reconnoître toutes les parties intérieures du cheval; ſi on ne regarde qu'au dedans de ces deux animaux, plus on les obſerve, plus on les compare l'un à l'autre, plus on eſt tenté de les prendre pour des individus de la même eſpèce, & même les différences que l'on trouve entre quelques-unes des parties de l'extérieur ne prouveroient rien de contraire, car les caractères ſpécifiques que l'on attribue communément à l'âne, & qui conſiſtent en ce qu'il eſt plus petit, qu'il a les oreilles & la queue plus longues, & la crinière plus courte que le cheval, & en ce que ſa queue n'eſt garnie de crins qu'à l'extrémité, ne ſont pas des caractères eſſentiels, puiſque nous trouvons toutes ces différences portées à un plus haut point dans différentes races d'autres animaux.

Il n'y a pas tant d'inégalité entre la taille des plus grands chevaux & celle des plus petits ânes, qu'entre la taille d'un

dogue & celle d'un petit danois ; les oreilles du chien-loup ſont plus courtes, en comparaiſon de celles du chien-baſſet, que les oreilles du cheval ne le ſont en comparaiſon de celles de l'âne ; de plus les oreilles du chien-loup ſont droites, & celles du baſſet ſont pendantes, différence qui ne ſe trouve pas entre le cheval & l'âne : le chien-lion & l'épagneul ont les poils du cou ſi longs, & le levrier & le danois les ont ſi courts, que cette inégalité ſurpaſſe de beaucoup celle qui ſe trouve entre la crinière de l'âne & celle du cheval ; n'y a-t-il pas auſſi plus de différence dans la queue des chiens qu'il ne s'en trouve entre celle du cheval & celle de l'âne, en conſidérant cette partie dans les chiens relativement à ſa direction & à ſa courbure, & par rapport aux poils dont elle eſt garnie ? enfin l'âne ne reſſemble-t-il pas plus au cheval, pour l'extérieur, que le chien-turc ne reſſemble au barbet, ou le baſſet au levrier ?

L'âne s'accouple avec la jument, & le cheval avec l'âneſſe ; il y a tant de rapports entre les parties de la génération de ces animaux qu'il n'eſt pas étonnant que leurs accouplemens ſoient prolifiques, mais c'eſt dans le produit que ſe trouve une différence eſſentielle : les mulets ne reſſemblent parfaitement ni aux chevaux ni aux ânes, puiſqu'ils ne peuvent pas ſe reproduire comme les chiens qui viennent du mélange de différentes races, de quelque façon qu'on les combine, & lors même qu'on rapproche les extrêmes en faiſant accoupler les plus grands avec les plus petits ; il y a par conſéquent une analogie plus parfaite entre les chiens les plus différens en apparence, qu'entre l'âne & le cheval, même les mieux aſſortis pour la taille & pour toutes les parties du corps, quand même on trouveroit un cheval qui auroit, comme l'âne, les oreilles fort longues, la crinière fort courte, & une partie du tronçon de la queue naturellement dégarnie de crins.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 446 sur 615

Les rapports que l'on a obſervés entre l'âne & le cheval, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, doivent nous engager à rechercher les différences qui peuvent ſe trouver entre ces deux animaux; il ne ſuffiroit donc pas de dire en un mot, comme pluſieurs auteurs, que l'âne reſſemble au cheval; ce ſujet mérite d'être diſcuté, il faut néceſſairement rapporter des obſervations détaillées, qui donneront une idée juſte & préciſe des reſſemblances, & qui pourront faire reconnoître des différences que l'on ne peut apercevoir & reconnoître que par la comparaiſon ſuivie & circonſtanciée des principales parties extérieures & intérieures du corps de l'âne avec celles du corps du cheval. Cependant je ne ferai pas une nouvelle expoſition de la figure & de la ſituation des parties qui ſont ſemblables dans l'âne & dans le cheval, il ſuffira de donner leurs dimenſions priſes d'après les ſujets qui ont ſervi à cette deſcription. Les dénominations des parties extérieures du corps du cheval appartiennent de droit à celles de l'âne & des autres ſolipèdes, ainſi je les emploirai conformément à l'explication qui a été donnée dans la deſcription du cheval; tous ces termes ſont appliquables à l'âne, puiſqu'il eſt compoſé des mêmes parties que le cheval, cependant il faut remarquer que l'âne n'a point de châtaignes dans les jambes de derrière, mais il y en a des veſtiges ſur les jambes de devant, qui ſont placés à peu près dans le même endroit que les châtaignes du cheval: ces veſtiges ſont marqués par une peau noire & dégarnie de poil, ſans qu'il paroiſſe aucune matière de corne; on voit auſſi ſur la partie inférieure & poſtérieure des boulets de chaque jambe, un petit diſque de peau noire & ſans corne, qui ſemble repréſenter la trace des ergots du cheval.

On ne peut faire aucun uſage des termes dont les Écuyers

ſe ſervent pour exprimer les couleurs des poils, elles ne ſont pas, à beaucoup près, auſſi variées dans l'âne, par conſéquent les dénominations ordinaires des couleurs ſont plus que ſuffiſantes pour les déſigner. La couleur la plus commune dans les ânes eſt le gris de ſouris, il y en a auſſi de gris luiſans & de gris mêlés de taches obſcures, on en voit de blancs, de roux, de bruns & de noirs; les ânes gris ont le muſeau blanc *(A, pl. XI)* juſqu'à quatre doigts au deſſus des naſeaux, & cette tache blanche eſt le plus ſouvent terminée en haut par une bande teinte de roux, le bout des lèvres eſt noir *(B)*, la même couleur s'étend juſqu'aux naſeaux, mais on ne voit dans quelques individus que deux bandes noires qui ſe prolongent de chaque côté juſqu'à la narine; les oreilles ſont bordées de noir, &, pour ainſi dire, tachées de cette couleur ſur la baſe au dehors *(C)* & à la pointe, le reſte eſt d'un gris mêlé de roux; il y a une longue raie noire qui s'étend depuis le toupet *(D)*, tout le long de la crinière *(E)*, qui paſſe ſur le garrot *(F)*, & qui ſuit la colonne vertébrale dans toute ſa longueur & le tronçon de la queue juſqu'à l'extrémité; une autre bande de la même couleur traverſe la raie ſur le garrot, & deſcend de chaque côté à peu près juſqu'au milieu des épaules *(G)*; la partie antérieure de la raie eſt ſur les crins du milieu du toupet & de la crinière qui ſont noirs, la face intérieure de la queue eſt de cette même couleur. Dans la pluſpart des ânes gris, le genou, le boulet, le paturon & la couronne ſont bruns ou noirs, dans les jambes de devant & dans celles de derrière; il s'en trouve quelques-uns qui ont un demi-cercle noirâtre dans le milieu du bras en devant & ſur le deſſus du canon des jambes de derrière, d'autres ont deux demi-cercles de cette même couleur à un pouce de diſtance l'un de l'autre ſur le

devant du bras *(H)*, mais cela ne ſe trouve que très-rarement, il eſt plus ordinaire de voir le bas des quatre jambes marqué de brun ou de noir en forme d'anneaux dans quelques endroits; le dedans des oreilles, le canal, le goſier, le poitrail, le ventre, les flancs & la face inférieure des bras & des cuiſſes ſont blancs dans preſque tous les ânes, de quelque couleur qu'ils ſoient, ou ſi ces parties ne ſont pas blanches, elles ont au moins une teinte de blanc ſale ou de couleur moins foncée que le reſte du corps; la pluſpart des ânes ont auſſi un cercle blanc ou blancheâtre autour des yeux, & le bord extérieur de ce cercle eſt le plus ſouvent d'une couleur rouſſeâtre qui ſe délaie & s'éteint peu à peu à meſure qu'elle s'éloigne du cercle blanc: les ânes bruns & ceux qui ſont roux ont du noir ſur les oreilles comme les gris, mais le milieu de la face extérieure eſt de couleur moins foncée que le reſte du corps.

Il y a lieu de croire que la couleur la plus naturelle aux ânes eſt le gris ou le gris mêlé de quelques teintes de fauve, & que ſi nous avions des ânes ſauvages, ils ſeroient tels que les ânes gris que je viens de décrire, & que celui qui eſt repréſenté dans la *planche XI*, ils auroient des taches ou des bandes noires ſur un fond gris, & quelques teintes d'orangé: avec ces trois couleurs on pourroit faire, comme pour le cheval, toutes les nuances & toutes les teintes du poil de tous les ânes, même de ceux qui varient le plus pour la couleur. Cette variété ſeroit ſans doute plus grande ſi on prenoit plus de ſoin pour le choix des étalons & pour le mélange des individus, mais ces animaux ſont fort négligés, ſur-tout dans ces pays-ci; pourvû qu'ils marchent bien, qu'ils aient les jambes fermes & aſſurées, & qu'ils ſoient aſſez forts pour porter des fardeaux, on ne recherche

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 449 sur 615

recherche en aucune façon la couleur de leur poil, ni les taches qui ſont ſur la couleur dominante, ni les épis qui ſe trouvent formés par un certain arrangement du poil comme ſur les chevaux, cependant il y a des ânes qui ont des balſanes auſſi-bien que la pelotte ou le chanfrein blanc, mais la bande blanche du chanfrein ſe confond avec le blanc du bout du muſeau; ils ont tous, au moins tous ceux que j'ai vûs, un épi au milieu du chanfrein, & j'ai trouvé auſſi dans la pluſpart deux épis auprès de la crinière, derrière les oreilles, un de chaque côté; en général le poil de l'âne eſt plus dur, plus ferme & plus long que celui du cheval.

On fait peu d'attention aux proportions du corps des ânes, on ne rejette que ceux qui ont des défauts oppoſés à l'uſage auquel ils ſont deſtinés, encore faut-il que ces défauts ſoient très-apparens, tels que ſont ceux des jambes mal ſaines ou arquées, qui rendent l'animal foible ou ſujet à trébucher, & du dos concave ſur ſa longueur, qui par cette conformation de l'épine eſt moins propre à ſupporter des charges que le dos convexe, que l'on appelle *dos de carpe*. Comme ces animaux ne ſervent pas pour l'appareil, & qu'ils ne ſont employés pour l'ordinaire qu'aux travaux les plus durs, on ne s'eſt pas appliqué à perpétuer ceux qui ſont le mieux faits; on n'eſt convenu preſque d'aucune règle pour reconnoître ceux qui ſont le mieux proportionnés dans toutes les parties de leur corps : je ne doute pas que les chevaux ne ſoient la cauſe de cet oubli, & que s'il n'y en avoit point, on n'eût fait autant de recherches pour trouver quelles peuvent être la beauté & l'élégance de la taille de l'âne, qu'il y en a de faites ſur le cheval; car nous aurions été obligés d'employer les ânes à preſque tous les uſages auxquels nous faiſons ſervir les chevaux. Les règles qui ont été données

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 450 sur 615

pour conſtater les belles proportions, ou les difformités & les défauts des différentes parties du corps de ces animaux, ne conviennent pas toutes à l'âne, ſur-tout lorſqu'il eſt queſtion de la tête, du cou, du dos, des hanches, de la croupe, &c. parce qu'il y a trop de différences entre ces mêmes parties conſidérées dans l'âne & dans le cheval; il ſe trouve plus de rapport entre les autres parties du corps de ces deux animaux, principalement pour les jambes de l'un & de l'autre, cependant il ne faudroit pas attribuer ſtrictement à l'âne tout ce qui a été dit des jambes du cheval.

On a vû dans l'hiſtoire précédente de l'âne, que la taille de cet animal varie dans différens climats; j'ai choiſi dans ce pays-ci un individu de taille moyenne, & bien proportionné, & j'en ai fait le ſujet de la *planche XI*; voici les dimenſions des parties extérieures du corps : il avoit quatre pieds & demi de longueur meſurée en ligne droite depuis l'entre-deux des oreilles juſqu'à l'anus, trois pieds quatre pouces & demi de hauteur priſe à l'endroit des jambes de devant, & trois pieds cinq pouces & demi à l'endroit des jambes de derrière; la longueur de la tête étoit d'un pied ſix pouces depuis le bout des lèvres juſqu'à l'occiput : cette meſure jointe à celle qui s'étend tout le long du cou & du corps juſqu'à l'origine de la queue donne ſix pieds de longueur à cet âne depuis le bout du muſeau juſqu'à l'anus, ce qui n'a pû être meſuré qu'à deux fois parce que l'animal étant vivant, il n'étoit pas facile de lui faire lever le muſeau aſſez haut pour effacer autant qu'il eſt poſſible la courbure de l'occiput, & pour prendre cette meſure en ligne droite.

Le bout du muſeau avoit un pied deux pouces de circonférence priſe entre les naſeaux & l'extrémité des lèvres, le

contour de l'ouverture de la bouche étoit de neuf pouces mesurés sur les lèvres depuis l'une des commissures jusqu'à l'autre; les naseaux son un peu plus éloignés l'un de l'autre par le haut que par le bas; il y avoit dix pouces & demi de distance entre l'angle antérieur de l'œil & le bout des lèvres, & quatre pouces & demi entre l'angle postérieur & l'oreille; la longueur de l'œil, depuis l'un de ses angles jusqu'à l'autre, étoit d'un pouce cinq lignes, & l'ouverture de huit lignes, c'est-à-dire que les deux paupières s'écartoient l'une de l'autre jusqu'à cette distance lorsque l'œil étoit ouvert; celle qui se trouvoit entre les angles antérieurs des deux yeux étoit de six pouces & demi en suivant la courbure du chanfrein, & seulement de cinq pouces quatre lignes en supposant cette distance en ligne droite; la tête avoit deux pieds cinq pouces de circonférence prise devant les oreilles en passant en dessous près du gosier; la longueur des oreilles étoit de huit pouces & demi, & leur base avoit cinq pouces neuf lignes de largeur prise sur sa courbure extérieure: les deux oreilles étoient éloignées l'une de l'autre de quatre pouces dans le bas.

Le cou avoit environ un pied de longueur depuis la tête jusqu'aux épaules, un pied onze pouces de circonférence près de la tête, neuf pouces de largeur depuis la crinière jusqu'au gosier, deux pieds trois pouces de circonférence près des épaules, & onze pouces de largeur; le corps avoit trois pieds huit pouces de circonférence prise derrière les jambes de devant, quatre pieds cinq pouces dans le milieu à l'endroit le plus gros, & trois pieds neuf pouces devant les jambes de derrière; le bas du ventre étoit à la hauteur d'un pied onze pouces au dessus de terre; le tronçon de la queue avoit un pied deux pouces de longueur, & un demi-pied de circonférence à son origine.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 452 sur 615

La longueur du bras étoit d'onze pouces & demi depuis le coude juſqu'au genou, il avoit un pied un demi-pouce de circonférence à ſa partie ſupérieure près du coude, & huit pouces dans ſa partie inférieure près du genou ; le renflement que produit cette articulation étoit d'environ trois pouces de longueur & de neuf pouces de circonférence ; le canon avoit un demi-pied de longueur & ſix pouces de circonférence, celle du boulet étoit de ſept pouces & demi ; le paturon avoit environ deux pouces de longueur & près de cinq pouces de circonférence, celle de la couronne étoit de dix pouces ; il y avoit treize pouces & demi de hauteur depuis le bas du pied juſqu'au milieu du genou ; la diſtance du coude au garrot étoit d'un pied quatre pouces & demi, & celle du coude juſqu'au bas du pied, de deux pieds deux pouces ; les deux bras étoient éloignés de quatre pouces dans le haut près du ventre, & les pieds de cinq pouces.

La cuiſſe avoit un pied deux pouces & demi de longueur depuis le graſſet, c'eſt-à-dire, l'endroit de la rotule juſqu'au jarret, & un pied huit pouces de circonférence meſurée près du ventre ; la largeur de la cuiſſe, priſe de devant en arrière au deſſus du jarret, étoit de quatre pouces, & la circonférence de neuf pouces & demi ; le canon avoit onze pouces de longueur depuis le jarret juſqu'au boulet, & ſix pouces & demi de circonférence, celle du boulet étoit de huit pouces ; le paturon avoit deux pouces de longueur & deux pouces de largeur priſe de devant en arrière, la circonférence de la couronne étoit de neuf pouces & demi ; il y avoit un pied quatre pouces de hauteur depuis le bas du pied juſqu'au jarret.

Le ſabot avoit cinq pouces de longueur depuis la pince juſqu'au talon, trois pouces de largeur d'un quartier à l'autre ;

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 453 sur 615

trois pouces trois lignes de hauteur en devant, environ dix pouces de circonférence près de la couronne, & un pied dans le bas.

En comparant l'âne au cheval pour la figure & pour le port, on reconnoît au premier coup d'œil que l'âne a la tête plus groſſe à proportion du corps que le cheval, les oreilles beaucoup plus alongées, le front & les temples garnies d'un poil plus long, les yeux moins ſaillans & la paupière inférieure plus aplatie, la lèvre ſupérieure plus pointue, &, pour ainſi dire, pendante, l'encolure plus épaiſſe, le garrot moins élevé, & le poitrail plus étroit & preſque confondu avec le goſier; le dos eſt convexe, en général l'épine eſt ſaillante dans toute ſon étendue juſqu'à la queue, les hanches ſont plus hautes que le garrot, la croupe eſt plate & avalée, enfin la queue eſt dégarnie de crins depuis ſon origine environ juſqu'aux trois quarts de ſa longueur; au reſte l'âne eſt très-reſſemblant au cheval, ſurtout pour les jambes de devant, car pour celles de derrière, la pluſpart des ânes que j'ai vûs m'ont paru *crochus*, ou *jartés* & *clos du derrière*.

Une groſſe tête, un front & des temples chargées de poils longs & touffus, des yeux éloignés l'un de l'autre & enfoncés, & un muſeau renflé vers ſon extrémité, donnent à l'âne un air de ſtupidité & d'imbécillité, au lieu de l'air de douceur & de docilité qui paroît dans le cheval: la partie inférieure de la tête de l'âne, qui s'étend depuis les yeux juſqu'au bout des lèvres, eſt moins alongée que dans le cheval, en comparaiſon de l'eſpace qui eſt entre les yeux & les oreilles; non ſeulement elle eſt moins alongée, mais elle eſt plus large, plus épaiſſe & plus plate; d'ailleurs les oreilles étant plus longues, plus vacillantes & plus abaiſſées, cet enſemble rend la phyſionomie de l'âne

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 454 sur 615

groſſière, tandis que les différences que nous avons obſervées dans ces mêmes parties ſur le cheval, lui donne un air de fineſſe; la tête de l'âne groſſe & peſante, ſes oreilles longues & vacillantes, ſon encolure large & épaiſſe, ſon poitrail effacé, ſon dos arqué &, pour ainſi dire, tranchant, ſes hanches plus élevées que le garrot, ſa croupe aplatie, ſa queue nue & les jambes de derrière crochues, rendent ſon port ignoble.

Ces défauts influent ſur ſa démarche & ſur toutes ſes alures, principalement lorſqu'on les compare à celles du cheval; cependant, ſans cet objet de comparaiſon qui avilit ſi fort l'âne, il ſeroit préféré à tous nos animaux domeſtiques pour ſervir de monture & pour bien d'autres uſages, & peut-être qu'après l'avoir perfectionné autant qu'il peut l'être, par le choix des étalons dans une longue ſuite de générations, & par les ſoins de l'éducation, il pourroit ſervir aux mêmes uſages que le cheval: on découvriroit de belles proportions dans la taille de l'âne, on vanteroit ſa légèreté & la diverſité de ſes alures, on admireroit les bonnes qualités de ſon inſtinct en comparaiſon de la peſanteur & de la férocité du taureau, de la lenteur & de la ſtupidité du bœuf, qui ſeroient avec l'âne les ſeuls de nos animaux domeſtiques qui puſſent ſervir de monture, s'il n'y avoit point de chevaux; mais en vertu de cette ſuppoſition, je ne prétends pas entreprendre de tirer l'âne du mépris où il eſt, ni le mettre en rivalité avec le cheval, il me ſuffit de faire obſerver qu'aux yeux d'un Naturaliſte, l'âne eſt un animal auſſi conſidérable & auſſi digne de recherches que le cheval; les parties extérieures de ſon corps, priſes ſéparément ou conſidérées relativement à l'enſemble qu'elles forment, ſont auſſi admirables, quoique moins élégantes. Après avoir développé l'intérieur, on eſt étonné de la grande reſſemblance qui ſe trouve entre

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 455 sur 615

l'organiſation & la conſtitution de l'âne & celles du cheval, comme on peut le voir dans la deſcription des parties intérieures.

Cette deſcription a été faite ſur une âneſſe qui avoit cinq pieds trois pouces de longueur meſurée en ligne droite depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue; la longueur de la tête depuis le bout des lèvres juſque derrière les oreilles, étoit d'un pied quatre pouces, & la circonférence, priſe au deſſus des yeux, de deux pieds; le cou avoit un pied trois pouces depuis l'omoplate juſqu'à l'oreille, un pied ſept pouces de circonférence près de la tête, & deux pieds deux pouces & demi auprès des épaules; la hauteur de cette âneſſe étoit de trois pieds un pouce & demi depuis terre juſqu'au garrot, & de trois pieds un demi-pouce depuis le bas du pied juſqu'au deſſus de l'os de la hanche; le corps avoit trois pieds trois pouces & demi de circonférence priſe derrière les jambes de devant, quatre pieds au milieu du corps à l'endroit le plus gros, & trois pieds trois pouces devant les jambes de derrière.

A l'ouverture de l'abdomen on n'a point vû d'épiploon, parce qu'il n'étoit pas plus étendu que celui du cheval: les inteſtins de l'âne n'ont paru différer de ceux du cheval que par la groſſeur; en effet ils forment autant de poches & de rétréciſſemens, & toutes les différentes portions d'inteſtin ſont à peu près proportionnelles à ces mêmes parties dans le cheval pour la longueur & pour la conformation principale, mais non pas pour la groſſeur, car les inteſtins de l'âne ſont, à proportion de leur longueur & du volume du corps entier, beaucoup plus gros que ceux du cheval dans les différentes poches que forment les inteſtins de ces deux animaux. Pour donner des preuves de cette différence, je vais rapporter en détail les

dimenſions des inteſtins de l'âne, relativement à celles que j'ai données pour les inteſtins du cheval dans ſa deſcription, & conformément à l'expoſé qui y a été fait de la poſition & de la figure des inteſtins de cet animal, parce que cette poſition & cette figure ſont ſemblables & ſujettes aux mêmes variations de l'âne comme dans le cheval.

Les inteſtins grêles de l'âneſſe qui nous a ſervi de ſujet, avoient trente-deux pieds de longueur depuis le pylore juſqu'au cæcum; la circonférence du duodenum étoit de ſept pouces & demi auprès du pylore, & de trois pouces neuf lignes dans le reſte; le jejunum avoit quatre pouces quatre lignes de circonférence dans la partie qui eſt du côté du duodenum, & cinq pouces dans celle qui eſt du côté de l'ileum; cet inteſtin avoit ſix pouces à ſix pouces & demi de circonférence dans la plus grande partie de ſon étendue, enſuite il ſe réduiſoit à deux pouces huit lignes de tour ſur la longueur de quatorze pouces; mais en conduiſant de l'air dans cet endroit, on pouvoit le diſtendre & le rendre auſſi gros que la première portion de cet inteſtin; ſa circonférence étoit de quatre pouces huit lignes auprès du cæcum.

Le cæcum avoit un pied ſept pouces de longueur, & deux pieds de circonférence à l'endroit le plus gros, qui ſe trouvoit à peu près dans le milieu de ſa longueur, un pied quatre pouces à ſon origine & à quatre pouces de ſon extrémité. La première partie du colon, qui eſt faite en forme de croſſe, avoit un pied quatre pouces de circonférence, celle de l'étranglement qui la ſépare du cæcum n'étoit que d'un pied deux pouces, elle avoit un pied huit pouces de longueur ſur ſa grande courbure; la circonférence de l'étranglement qui ſépare cette première portion du colon du reſte de l'inteſtin, n'étoit que de

quatre

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 457 sur 615

quatre pouces huit lignes, enſuite le colon devenoit un peu plus gros ſur la longueur de trois pouces, & formoit deux renflemens, dont le plus grand avoit cinq pouces huit lignes de circonférence, ils correſpondoient à la tubéroſité ronde qui ſe trouve dans quelques chevaux à ce même endroit; la circonférence de chacune des deux premières poches du colon étoit d'un pied dix ou onze pouces, & l'étranglement par lequel elles ſe réuniſſent derrière le diaphragme, n'avoit qu'un pied ſept pouces de tour, la longueur de chacune de ces deux premières poches n'étoit que d'environ deux pieds quatre pouces; la partie du colon qui ſe trouve entre la ſeconde & la troiſième poche n'avoit que huit à neuf pouces de circonférence, & deux pieds trois pouces de longueur; la circonférence de la troiſième poche étoit de deux pieds deux pouces à l'endroit le plus gros, & elle avoit deux pieds trois pouces de longueur; la circonférence du colon étoit d'un pied deux pouces au ſortir de la troiſième poche, plus loin elle ſe réduiſoit à ſept pouces, & étoit à peu près la même dans tout le reſte de cet inteſtin & dans le rectum, excepté du côté de l'anus, où il avoit juſqu'à un pied de tour; le colon & le rectum pris enſemble avoient quatorze pieds de longueur, à laquelle il faut ajoûter celle des inteſtins grêles qui étoit de trente-deux pieds, pour avoir la longueur du canal inteſtinal en entier, qui étoit de quarante-ſix pieds.

L'eſtomac de l'âne reſſemble à celui du cheval pour la figure & la poſition, mais il étoit beaucoup plus grand à proportion du corps dans le ſujet que nous décrivons, il avoit trois pieds de circonférence priſe ſur la grande convexité & ſur le vuide qui eſt à l'endroit de l'œſophage; celle du grand cul-de-ſac, meſurée au côté gauche de l'œſophage, étoit d'un pied neuf

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 458 sur 615

pouces; ce cul-de-ſac ne s'étendoit dans le côté gauche que de trois à quatre pouces à ſa partie ſupérieure, mais la partie inférieure ſe prolongeoit plus loin; la partie droite étant meſurée à ſon extrémité près du rétréciſſement du pylore, avoit un pied de circonférence, celle du milieu de l'eſtomac, priſe au côté droit de l'œſophage, étoit d'un pied dix pouces & demi; il ne paroiſſoit aucun enfoncement dans la grande courbure, le pylore avoit cinq pouces de circonférence, le commencement du duodenum à l'endroit le plus gros avoit ſix pouces & demi, & l'œſophage trois pouces près de l'eſtomac; l'enfoncement de la partie ſupérieure de l'eſtomac avoit trois pouces de profondeur au deſſous de la partie droite & de la partie gauche.

L'eſtomac de l'âne n'eſt pas moins reſſemblant à celui du cheval au dedans qu'au dehors, les parois intérieures de la partie ſupérieure ſont revêtues d'une membrane liſſe & de couleur de chair blancheâtre, qui eſt une continuation de la membrane qui tapiſſe l'œſophage intérieurement; les bords de cette membrane ſont dentelés & plus élevés que le velouté qui revêt le reſte de l'eſtomac; la reſſemblance de conformation qui eſt entre l'âne & le cheval s'étend juſqu'aux vers qui ſont dans l'eſtomac de ces deux animaux: j'ai trouvé des vers oblongs & coniques dans l'eſtomac de tous les ânes & de toutes les âneſſes que j'ai fait ouvrir, comme dans celui de tous les chevaux qui ont été ouverts ſous mes yeux; les vers de l'âne ne différoient en rien de ceux du cheval, ils avoient la même groſſeur, la même figure, les mêmes crochets, les mêmes piquans, & en un mot la même conformation, mais ils n'étoient pas en ſi grand nombre: je n'ai pas fait ouvrir, à beaucoup près, autant d'ânes que de chevaux, cependant j'en ai vû aſſez pour me convaincre de tous ces rapports. Plus on obſerve, & plus on en découvre de

nouveaux : lorſque j'ai fait ſur l'eſtomac de l'âne l'expérience que M. Bertin a faite ſur celui du cheval *, elle a réuſſi de la même manière en faiſant ſouffler dans l'eſtomac de l'âne par le pylore, il s'eſt enflé, & l'air n'eſt pas ſorti par l'œſophage, ce qui prouve que la conformation de l'eſtomac de ces deux animaux eſt ſemblable à cet égard, & que l'âne doit avoir autant de difficulté à vomir que le cheval, ſi l'obſtacle eſt formé dans cet animal par la conformation de l'orifice ſupérieur de l'eſtomac, comme il y a lieu de le croire ; mais je n'entrerai ici dans aucune diſcuſſion ſur l'âne, conſidéré ſéparément des autres animaux, ou comparé au cheval, parce que le plan que nous nous ſommes propoſé dans cet ouvrage eſt de commencer par décrire tous les animaux que nous pourrons avoir, avant que de raiſonner ſur les obſervations dont ils auront été les objets.

Le foie de l'âne étoit abſolument reſſemblant à celui du cheval pour la couleur, la poſition, la figure & le nombre des lobes, excepté que dans le lobe moyen la première ſciſſure communiquoit dans quelques individus avec celle du milieu, par une autre ſciſſure qui partage le bord du lobe en deux lames ; ce viſcère avoit un pied trois pouces dans ſa plus grande étendue, celle du lobe droit étoit de neuf pouces & demi de haut en bas ; le lobe gauche avoit huit pouces de longueur, &c. le foie peſoit trois livres deux onces & demi ; il n'y avoit point de véſicule du fiel, mais le canal hépatique étoit fort gros, comme dans le cheval.

J'ai trouvé au mois d'avril, dans le foie d'une âneſſe, des vers plats & fort minces, d'une conſiſtance molle & d'une figure ſingulière, ils étoient au nombre de douze ou quatorze, tous à peu près de la même grandeur, & diſperſés dans différens

* Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, *année 1746, page 36.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 460 sur 615

endroits des canaux biliaires ; lorſqu'ils étoient en repos, ils formoient un ovale qui avoit environ neuf lignes de longueur & ſix lignes de largeur, comme on peut le voir *planche XII*, où un de ces vers eſt repréſenté de grandeur naturelle, vû par deſſus *fig. 2*, & par deſſous *fig. 3* ; le milieu de la face ſupérieure & de l'inférieure eſt uni, mais les bords ſont diſpoſés en ondes, à peu près comme une fraiſe de veau ; la partie antérieure ſemble être échancrée de chaque côté & terminée dans le milieu par une ſorte de tête oblongue (*A*, *fig. 2 & 3*) ; cette tête eſt de la longueur d'une ligne, & paroît percée par un trou à ſon extrémité un peu en deſſous (*B*, *fig. 3*) ; il y a une autre petite ouverture ronde (*C*), dont les bords ſont un peu élevés & placés ſur la face inférieure du vers à l'origine de la tête, cette face eſt blancheâtre dans le milieu, qui eſt environné d'un limbe d'une ligne de largeur, teint de blanc ſale ou de brun clair ; la face ſupérieure (*fig. 2*) eſt ſemblable à l'inférieure pour les couleurs, mais on y voit de plus des ramifications noirâtres qui s'étendoient depuis la tête juſqu'à l'extrémité du vers, ces ramifications ne ſont pas toûjours apparentes ni reſſemblantes pour la diviſion des rameaux ; on diſtingue encore derrière le trou (*C*, *fig. 3*) qui eſt ſur la face inférieure, des ſortes de petits vaiſſeaux blancheâtres & pelotonnés qui paroiſſent auſſi ſur l'autre face (*fig. 2*) au même endroit ; ces vers ne peuvent ſe mouvoir & aller en avant qu'en ſe traînant, ils avancent la partie antérieure de leur corps, & par ce mouvement ils s'alongent au point d'avoir un pouce de longueur, mais en même temps ils ſe rétréciſſent de façon, qu'ils n'ont plus qu'environ trois lignes à l'endroit le plus large (*fig. 4*, où un de ces vers eſt vû par deſſus de grandeur naturelle, & *fig. 5*, où il eſt vû par-deſſous) ; bien-tôt ils retirent en avant la partie poſtérieure

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 461 sur 615

de leur corps, & par ce ſecond mouvement ils parviennent à ſe déplacer entièrement, & ils repréſentent la même forme arrondie qu'ils avoient avant de ſe mouvoir.

Ces vers reſſemblent parfaitement à ceux qui ſe trouvent dans le foie des moutons, & que l'on appelle des *douves*, je n'ai trouvé aucune différence entre les uns & les autres dans la comparaiſon que j'en ai faite. On a rapporté dans le Journal des Savans [a], que les bouchers avoient remarqué que ces vers ne ſe trouvoient dans le foie des moutons que lorſqu'ils étoient malades pour avoir mangé d'une eſpèce de *ſideritis* [b], & que les vers ſont ſemblables à la feuille de cette herbe : on pourroit comparer leur figure à celle des feuilles de bien d'autres plantes; je ne ſais ſi la *ſideritis* cauſe des maladies aux moutons, mais je ſuis ſûr que l'âneſſe dans laquelle j'ai trouvé ces vers, n'avoit aucune apparence de maladie lorſque je la fis tuer, elle étoit jeune & bien conſtituée : la grande reſſemblance que j'ai obſervée entre l'âne & le cheval, même pour les vers coniques que j'ai vûs en grand nombre dans l'eſtomac de ces deux animaux, me fait ſoupçonner qu'il ſe peut trouver auſſi des douves dans le foie du cheval, quoiqu'il paroiſſe que l'on ait voulu l'excepter du nombre des animaux qui avoient de ces ſortes de vers dans le foie, lorſqu'on eut fait à ce ſujet les recherches qui ſe trouvent dans les Éphémérides des Curieux de la Nature [c]; il eſt vrai que je n'ai point vû de ces vers plats dans quelques foies de cheval où je les ai cherchés, mais je ne renonce pas à ſuivre cette obſervation ſur un plus grand nombre.

La rate de l'âne reſſembloit à celle du cheval pour ſa

[a] Année 1668, page 67.
[b] *Sideritis glabra arvenſis.*
[c] *Miſc. acad. nat. cur.* ann. 1675, &c. obſ. 188.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 462 sur 615

couleur, ſa ſituation & ſa figure triangulaire; elle étoit longue de huit pouces, ſa baſe avoit trois pouces & demi de longueur, ſa plus grande épaiſſeur étoit de dix lignes; elle peſoit trois onces ſix gros.

Le pancréas étoit ſitué comme celui du cheval, & avoit la même figure; la plus grande épaiſſeur n'étoit que de quatre lignes.

Les reins reſſembloient à ceux du cheval, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le rein droit étoit auſſi plus avancé que le gauche d'environ un pouce, comme dans le cheval; il avoit cinq pouces de longueur & quatre pouces de largeur au deſſus & au deſſous de l'enfoncement, qui étoit d'un peu plus d'un pouce.

Le centre nerveux du diaphragme avoit environ un pied de largeur, & ſept pouces & demi depuis la veine-cave juſqu'à la partie voiſine du ſternum: la largeur de la partie charnue étoit de cinq pouces & demi ſur les côtés, & ſeulement de deux pouces au deſſus du ſternum; elle avoit juſqu'à deux lignes d'épaiſſeur: au reſte le diaphragme eſt reſſemblant à celui du cheval, de même que les poumons.

Le cœur étoit ſitué comme celui du cheval, & paroiſſoit auſſi gros à proportion du corps, & auſſi pointu; ſa baſe avoit un pied de circonférence; ſa hauteur étoit de quatre pouces dix lignes depuis la pointe juſqu'à la naiſſance de l'artère pulmonaire, & quatre pouces deux lignes depuis la pointe juſqu'au ſac pulmonaire; l'aorte avoit quatoze lignes de diamètre, pris de dehors en dehors au ſortir du cœur, & elle ſe partage en deux branches comme celle du cheval.

La langue reſſembloit à celle du cheval, on y voyoit les mêmes tubercules & les mêmes filets; mais au lieu des deux groſſes glandes qui ſe trouvent ſur la langue du cheval à

l'endroit qui eſt entre les dernières dents mâchelières, il y avoit trois de ces groſſes glandes ſur la langue de l'âne, une dans le milieu & une de chaque côté; celle du milieu n'étoit pas auſſi grande que celles des côtés : j'ai auſſi remarqué ſur les bords de la partie poſtérieure de la langue de l'âne, deux glandes oblongues, qui étoient ſillonnées tranſverſalement.

Le palais étoit traverſé par ſeize ſillons ſemblables à ceux qui ſont ſur le palais du cheval, excepté qu'ils étoient moins larges; leurs bords étoient auſſi moins élevés.

L'épiglotte étoit à peu près conformée comme dans le cheval; les bords de l'entrée du larinx, formés par les catilages aryténoïdes, avoient chacun un pouce de longueur, & trois lignes d'épaiſſeur, comme dans le cheval, mais ils n'étoient éloignés que de ſix lignes à leur extrémité inférieure.

Le cerveau & le cervelet dont on va donner les dimenſions & le poids ont été tirés de l'individu qui a ſervi de ſujet pour la deſcription des parties de la génération du mâle; le cerveau avoit quatre pouces de longueur, trois pouces & demi de largeur, & deux pouces d'épaiſſeur; la longueur du cervelet étoit d'environ deux pouces, ſa plus grande largeur étoit auſſi de deux pouces, & ſa plus grande épaiſſeur d'un pouce deux lignes : le cerveau peſoit dix onces ſix gros, & le cervelet une once quatre gros & quarante-huit grains.

L'âne ſur lequel on a décrit les parties de la génération, peſoit cent quatre-vingt-dix-huit livres; ſa longueur, meſurée en ligne droite depuis le bout du muſeau juſqu'à l'origine de la queue, étoit de cinq pieds deux pouces : la tête avoit un pied quatre pouces depuis le bout des lèvres juſque derrière les oreilles, environ un pied de circonférence priſe ſur les coins de la bouche, & deux pieds derrière les yeux : la longueur du

cou étoit d'un pied deux pouces depuis l'omoplate juſqu'à l'oreille, & ſa circonférence d'un pied ſept pouces, priſe auprès de la tête, & de deux pieds trois pouces auprès des épaules : le corps avoit trois pieds de circonférence derrière les jambes de devant, trois pieds onze pouces au milieu à l'endroit le plus gros, & trois pieds deux pouces devant les jambes de derrière; la hauteur depuis terre juſqu'au garrot étoit de trois pieds, & de deux pieds onze pouces depuis terre juſqu'à la crête de l'os des iles : le ſcrotum étoit à dix pouces de l'anus, il s'étendoit en bas au deſſous du ventre de la longueur de quatre pouces, & il n'y avoit que trois pouces & demi d'intervalle entre le ſcrotum & l'orifice du prépuce; cette partie étoit plus ou moins ſaillante hors du ventre, & formoit une ſorte de cylindre qui avoit quatre pouces & demi de circonférence : les mamelons étoient ſur le prépuce à deux ou trois pouces au deſſus de ſon extrémité, & à un pouce & demi de diſtance l'un de l'autre; chaque mamelon avoit cinq lignes de longueur & environ quatre lignes de diamètre.

La verge avoit treize pouces de longueur depuis l'extrémité du gland juſqu'à la bifurcation du corps caverneux; car il n'y a dans l'âne qu'un corps caverneux, comme dans le cheval : la circonférence du corps caverneux, dépouillé de la peau, étoit de quatre pouces; le gland étoit cylindrique & long de quatre pouces & demi; il avoit trois pouces neuf lignes de circonférence & plus, à ſon extrémité : les teſticules étoient de figure ovoïde aplatie; ils avoient deux pouces huit lignes de longueur ſur un pouce neuf lignes à l'endroit le plus large, & un pouce d'épaiſſeur : les épididymes reſſembloient à ceux du cheval pour la figure & pour la poſition : les canaux déférens avoient deux lignes de diamètre ſur la longueur d'environ dix pouces; plus

loin

loin ils devenoient beaucoup plus gros, car ils avoient juſqu'à deux pouces de circonférence ſur la longueur d'environ quatre pouces, & le reſte juſqu'à l'urètre étoit long d'un pouce & demi & n'avoit qu'une ligne de diamètre ; la longueur totale des canaux déférens étoit d'un pied trois pouces & demi, au reſte ils étoient ſemblables à ceux du cheval.

Il y avoit aux côtés de l'anus & le long de la verge deux cordons, comme dans le cheval, leur diamètre étoit de deux lignes.

La veſſie étoit preſque ronde, elle avoit quatorze pouces de circonférence ſur ſon grand diamètre, & treize ſur le petit ; celle du commencement de l'urètre étoit de deux pouces.

Il ſe trouvoit derrière la veſſie deux groſſes véſicules, une de chaque côté, comme dans le cheval ; elles étoient oblongues & avoient quatre pouces neuf lignes de longueur, & cinq pouces & demi de circonférence à l'endroit le plus gros ; ces véſicules reſſembloient à celles du cheval par la ſituation de leur ouverture dans l'urètre ; il y avoit auſſi dans l'âne, ſur chacune des véſicules, une glande, comme dans le cheval, & deux autres ſur l'urètre, qui ont paru proportionnées & ſemblables à ces mêmes parties vûes dans le cheval.

Je reviens, pour la deſcription des parties de la génération de la femelle, à l'âneſſe qui nous a déjà ſervi de ſujet ; il y avoit environ quinze lignes de diſtance entre l'anus & la vulve, dont la longueur étoit de trois pouces & demi ; les deux mamelles ſe trouvoient à huit pouces de diſtance de la vulve, & les deux mamelons n'étoient ſéparés que par un eſpace d'environ un pouce & demi ; il y avoit deux orifices dans chaque mamelon de l'âneſſe, & chaque mamelle étoit diviſée en deux loges ſituées comme dans la jument : ces parties ont

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 466 sur 615

paru avoir la même conformation dans ces deux animaux; le gland du clitoris avoit neuf lignes de largeur ſur ſept lignes d'épaiſſeur, un demi-pouce de hauteur ſur le côté inférieur, & ſeulement quatre lignes ſur l'autre côté; le prépuce eſt fort ample, comme dans la jument, & on trouve auſſi dans l'âneſſe, ſur le côté ſupérieur du clitoris, deux ouvertures qui communiquent chacune à une cavité qui avoit trois lignes de longueur & autant de largeur; chaque cavité renfermoit une pierre de la forme & de la groſſeur d'une lentille, & pluſieurs petits graviers; nous en avons auſſi trouvé dans d'autres ânesſes: ces deux cavités qui ſont dans l'âneſſe, doivent faire ſoupçonner qu'il y en a auſſi deux dans la jument, quoique nous n'en ayons découvert qu'une; peut-être que l'un des orifices eſt ſujet à ſe fermer.

Le vagin avoit treize pouces de longueur, étant ſoufflé il a paru diſtingué en deux portions par un rétréciſſement tranſverſal; la portion antérieure avoit ſix pouces de longueur, & un pied de circonférence, celle de l'endroit rétréci n'étoit que de huit pouces; la portion poſtérieure avoit environ ſept pouces de longueur ſur quatorze de circonférence à quelque diſtance du rétréciſſement, & ſeize pouces du côté de la matrice: il y avoit derrière l'orifice de l'urètre un repli dirigé en devant, comme dans la jument *(H, pl. IV, fig. 2)*, mais au lieu de former un arc de cercle par ſon bord, il étoit échancré dans le milieu, de façon qu'il formoit deux prolongemens triangulaires, un de chaque côté de l'orifice de l'urètre; chacun de ces prolongemens avoit environ huit lignes de hauteur: cette différence entre l'âneſſe & la jument ne doit pas être regardée comme une variété dans l'individu dont il eſt queſtion, car j'ai vû ces prolongemens dans d'autres ânesſes.

La veſſie avoit la figure d'une poire renverſée, comme celle du cheval, ſa grande circonférence étoit d'un pied cinq pouces, & la petite d'un pied deux pouces à l'endroit le plus gros.

La longueur de la matrice étoit de ſix pouces depuis ſon orifice juſqu'à la bifurcation des cornes; la portion antérieure avoit quatre pouces & demi de circonférence, la portion poſtérieure ſix pouces & demi, les cornes cinq pouces & demi auprès de la bifurcation, & ſeulement quatre pouces auprès de leur extrémité; les teſticules étoient à deux pouces de diſtance de l'extrémité de la corne; le teſticule tient au pavillon, comme dans la jument, il reſſemble à un rein, il avoit un pouce & demi de longueur ſur un pouce de largeur; au reſte ces parties ne paroiſſent pas différentes de celles de la jument.

Le fœtus de l'âne eſt enveloppé d'un amnios, d'un chorion & d'une membrane allantoïde, qui n'ont paru différer en aucune façon des enveloppes du fœtus du cheval; le cordon ombilical & l'ouraque étoient auſſi ſemblables dans ces deux animaux, ainſi la deſcription qui a été faite de toutes ces parties à l'article du cheval, ſuffit pour donner une idée juſte de celles de l'âne, car la reſſemblance eſt ſi grande, que la liqueur contenue entre l'amnios du cheval & l'amnios de l'âne dépoſe un ſédiment & forme un réſidu qui ne diffère de l'hippomanès que par la couleur; cette matière eſt jaunâtre dans l'âne, mais ſa nature & ſon origine ſont les mêmes : il ſeroit ſuperflu de rapporter ici les preuves que j'en ai données à l'Académie Royale des Sciences *.

Paſſons aux obſervations faites ſur un fœtus qui a été tiré du corps d'une ânesſe au milieu du mois d'avril; il étoit femelle, il avoit deux pieds trois pouces de longueur meſurée en ligne droite depuis le bout des lèvres juſqu'à l'anus; la circonférence

* Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, *année 1752.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 468 sur 615

de ſon corps, priſe derrière les pattes de devant, étoit d'un pied deux pouces; il avoit un pied & demi de hauteur depuis le garrot juſqu'à l'extrémité de la corne des pieds des jambes de devant : le poil commençoit à paroître ſur ce fœtus, principalement ſur le ſommet de la tête, ſur le bord & à l'intérieur des oreilles, ſur la crinière, ſur la queue, &c. mais le muſeau, la baſe & la face extérieure des oreilles, le poitrail, le ventre, excepté l'étendue de la ligne blanche, l'intérieur des cuiſſes, les boulets, les paturons, &c. étoient entièrement dégarnis de poil; on commençoit déjà à voir du noir ſur le bout du muſeau, au bout des oreilles, ſur leur bord & ſur quelques endroits de leur face extérieure; le toupet & la crinière étoient noirs, & on voyoit bien diſtinctement la bande qui s'étend tout le long de l'épine & de la queue, & celle qui la traverſe ſur le garrot & qui deſcend de chaque côté ſur les épaules; la corne des pieds étoit molle, ſur-tout à l'extrémité, & de couleur griſe, noirâtre à la partie ſupérieure *(A, pl. XII, fig. 1)*, & blanche à la partie inférieure, qui étoit terminée par une pointe *(B)* crochue & recourbée en arrière : cette partie ſembloit ſortir d'une eſpèce de calice *(CC)* formée par une lame extérieure de la corne, qui ſembloit ſe fendre en deux ou trois parties pour laiſſer ſortir l'extrémité crochue dont nous avons parlé. Il paroît que la lame extérieure doit former le ſabot, car on y voit déjà les talons *(A)* bien marqués, & la ſubſtance du dedans eſt la ſole; l'extrémité crochue s'affaiſſe & ſe déforme lorſque l'ânon commence à marcher : on voyoit que les veſtiges des châtaignes étoient marqués ſur les jambes de devant par une tache noire *(D)* qui étoit exactement ronde & qui avoit huit lignes de diamètre; les ergots étoient auſſi marqués derrière les boulets des quatre jambes par une tache noire *(E)*,

oblongue de haut en bas, qui avoit cinq lignes de longueur, & trois à quatre lignes de largeur.

On a reconnu en dedans de ce fœtus les mêmes choſes qui ont été expoſées dans la deſcription du fœtus du cheval, & repréſentées *planche VII*, ſur-tout par rapport à la figure cylindrique de la veſſie, à la naiſſance de la membrane qui devoit recouvrir l'urètre dans la ſuite, à la groſſeur des teſticules, &c.

Il y a autant de rapports, & même plus, entre les os de l'âne & ceux du cheval, que dans les parties molles de ces deux animaux; on peut s'en aſſurer en comparant le ſquelette d'âne repréſenté *planche XIII*, avec le ſquelette de cheval de la *planche X*: on ne reconnoîtroit peut-être entre ces deux ſquelettes aucune autre différence que celle de la grandeur, ſi on avoit pris le ſujet de la *planche X* dans un cheval qui n'auroit eu que cinq vertèbres lombaires; en effet, il faut comparer en détail les dimenſions & les autres caractères de toutes les parties de ces deux ſquelettes, pour y trouver quelque différence; mais en général il y a tant de reſſemblance entre l'un & l'autre, qu'il ſeroit ſuperflu de rapporter ici la deſcription détaillée de celui de l'âne; je la ſupprime ici d'autant plus volontiers, que dans cet ouvrage, qui s'étend à un ſi grand nombre d'objets, on ne peut trop abréger les détails lorſque les réſultats ſuffiſent pour l'intelligence de la choſe.

La tête du ſquelette de l'âne reſſemble à celle du ſquelette du cheval pour le nombre & la poſition des os, la ſeule différence que j'y aie reconnue conſiſte en ce qu'elle eſt plus groſſe à proportion de la longueur, en voici la preuve: je ſuppoſe, comme je l'ai déja ſuppoſé pour la tête du ſquelette du cheval, que

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 470 sur 615

celle du ſquelette de l'âne ſoit poſée de façon que le corps de la mâchoire inférieure ſerve de baſe, & qu'on la regarde par devant; la face ſupérieure préſente un ovale qui a un pied quatre pouces & demi de longueur dans le ſquelette qui a ſervi de ſujet pour cette deſcription, & qui eſt rapporté ſous le numéro CDXXXXI, & ſix pouces neuf lignes dans la plus grande largeur, qui ſe rencontre à l'endroit des bords ſupérieurs des orbites : ces dimenſions, comparées à celles qui ſont rapportées dans la deſcription du cheval pour les mêmes parties, prouvent que la tête de l'âne eſt plus large à proportion de ſa longueur que celle du cheval.


Les dents de l'âne ſont ſemblables à celles du cheval pour le nombre, la figure & la poſition; l'hyoïde de l'âne eſt compoſé du même nombre d'os que celui du cheval, & je n'ai reconnu aucune différence dans la figure de ces os, dans leur ſituation & dans leurs articulations entre eux ou avec les os des temples, ſoit qu'on les conſidère dans l'âne on dans le cheval.

L'âne a ſept vertèbres cervicales, douze vertèbres lombaires, huit vraies côtes & dix fauſſes; le ſternum ne paroît compoſé que de cinq os, mais dans un ſujet plus jeune on en diſtingueroit ſix : toutes ces pièces reſſemblent à celles qui y ſont relatives dans le ſquelette du cheval, pour la figure, la poſition & les articulations, je ferai ſeulement remarquer que les côtes de l'âne ſemblent être moins courbées & moins convexes en dehors, ſur-tout à la partie ſupérieure, que celles du cheval.

Il n'y a que cinq vertèbres lombaires dans le ſquelette d'âne ſur lequel j'ai fait cette deſcription, & je n'en ai vû que cinq dans pluſieurs ânes & dans pluſieurs âneſſes que j'ai fait diſſéquer, pour ſavoir ſi le nombre de ces vertèbres lombaires varie

de cinq à ſix dans ces animaux, comme dans le cheval; mais il faudroit répéter encore pluſieurs fois cette obſervation, pour s'aſſurer de ce fait; je ſuis d'autant plus porté à le croire douteux, que j'ai trouvé dans une âneſſe la dernière vertèbre dorſale conformée d'une manière fort ſingulière : cette vertèbre *(pl. XII, fig. 6)* reſſembloit à celles des lombes, en ce qu'elle avoit au côté gauche une apophyſe acceſſoire *(A)*, qui tenoit au corps de la vertèbre ſans aucune apparence d'articulation; il y avoit au contraire ſur le côté droit de cette vertèbre une facette qui formoit, comme à l'ordinaire, une articulation *(B)* avec la dernière des fauſſes côtes *(C)*; au reſte cette vertèbre avoit tous les caractères d'une vertèbre dorſale, & c'étoit en effet la douzième; elle s'articuloit avec la dernière fauſſe côte du côté droit, & il ſe trouvoit à gauche, à l'extrémité de l'apophyſe acceſſoire, un os *(D)* oblong & aplati ſur ſa longueur, qui avoit beaucoup de reſſemblance avec la portion inférieure de la dernière fauſſe côte du côté droit : cet os tenoit à l'extrémité de l'apophyſe acceſſoire de la vertèbre par une attache cartilagineuſe, qui formoit une ſorte d'articulation *(E)*, qui pouvoit ſuppléer en quelque manière à celle qui auroit dû ſe trouver auprès du corps de la vertèbre, s'il n'y avoit point eu d'apophyſe acceſſoire, & ſi la fauſſe côte avoit été entière : cette conformation extraordinaire, qui donnoit à la dernière vertèbre dorſale de l'âneſſe dont il s'agit, une apophyſe qui n'appartient qu'aux vertèbres lombaires, fait ſoupçonner qu'il peut ſe trouver des variétés dans le nombre des vertèbres lombaires de l'âne, comme j'en ai remarqué dans le nombre de celles du cheval; il ſuffit que l'on ſoit averti ſur ce fait, pour que l'on puiſſe profiter des occaſions que l'on aura de le décider.

L'os ſacrum de l'âne eſt compoſé de cinq fauſſes vertèbres, & la queue de dix-ſept, comme dans le cheval, cependant j'en ai trouvé dix-huit dans un ânon; au reſte je n'ai remarqué aucune différence ſenſible dans le baſſin de ces deux animaux, ſi ce n'eſt pour la grandeur, qui eſt relative à celle du corps de l'un & de l'autre; il en eſt de même pour les os des quatre jambes: on peut voir à ce ſujet ce que j'ai dit des os des celles du cheval, & l'appliquer à l'âne.




DESCRIPTION




De Seve del. C. Baquoy Sculp.


ECOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE DE PARIS BIBLIOTHÈQUE



D. S. del.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 476 sur 615





D.S. del.

Moitte Sculp.

ECOLE SUPERIEURE DE PHARMACIE DE PARIS BIBLIOTHEQUE

DESCRIPTION

DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport à l'Hiſtoire Naturelle

DE L'ASNE.

N.° CDXXVIII.

Sédiment de la liqueur contenue entre l'allantoïde & l'amnios de l'âne.

CETTE matière eſt conſervée dans l'eſprit-de-vin ; on pourroit lui donner le nom d'*onomanès*, parce qu'elle eſt, relativement à l'âne, de même nature que l'hippomanès par rapport au cheval, comme je l'ai expliqué plus haut ; mais il faut bien ſe garder d'introduire des dénominations dont la ſignification littérale ne pourroit donner qu'une fauſſe idée de la choſe dénommée, il ſeroit même à ſouhaiter, par cette raiſon, que l'on ſupprimât le nom d'*hippomanès* : quoiqu'il ſoit reçû depuis pluſieurs ſiècles, il vaudroit bien mieux y ſubſtituer aujourd'hui celui de ſédiment, puiſque l'on ſait à préſent que l'hippomanès n'eſt que le ſédiment de la liqueur de l'allantoïde du cheval ; mais s'il y a de l'inconvénient à changer les dénominations reçûes, quoique de mauvais ſens, on doit au moins éviter de les étendre à des choſes nouvellement découvertes, quelque rapport qu'elles aient avec celles qui ont de fauſſes dénominations.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 480 sur 615

N.° CDXXIX.

Une jambe de devant & une jambe de derrière d'un fœtus d'âne.

Ces deux pièces ont été conſervées pour faire voir la forme ſingulière de la corne, dont il a été fait mention dans la deſcription de l'âne; on voit auſſi ſur les jambes dont il s'agit, les marques des châtaignes & des ergots.

N.° CDXXX.

Graviers tirés des cavités du clitoris de l'âneſſe.

Ces graviers ſont fort petits; j'ai reconnu qu'ils étoient de ſubſtance pierreuſe, & diſſoluble dans l'eau forte.

N.° CDXXXI.

Colle tirée de la peau de l'âne.

Ce morceau reſſemble à de la colle forte, il eſt formé en lame d'un pouce neuf lignes de largeur, de deux pouces trois lignes de longueur, & de quatre lignes d'épaiſſeur; il eſt noir, luiſant & un peu tranſparent ſur ſes bords, où il paroît jaunâtre; ſon poids eſt d'environ neuf gros : il a été donné au cabinet par M. Sanchez, Docteur en Médecine, ancien premier Médecin des armées Ruſſiennes, que nous avons déjà eu occaſion de citer dans cet ouvrage. M. Sanchez nous a rapporté que cette colle a été faite à la Chine avec de la peau d'ânes qui vivent dans une province où ils boivent des eaux de puits qui ſont aſtringentes, & que cette colle, diſſoute dans de l'eau tiède, étoit un remède dont on ſe ſert dans le pays contre les pertes de ſang.

N.° CDXXXII.

Le ſquelette d'un âne.

La tête a un pied quatre pouces & demi depuis le bout de la mâchoire ſupérieure juſqu'à la ligne tranſverſale de l'occipital, & deux pieds un pouce de circonférence, priſe ſur la partie poſtérieure des orbites des yeux, & ſur les angles de la mâchoire inférieure; le cou a un pied trois pouces & demi de longueur, celle du corps eſt de deux pieds ſept pouces; le coffre a trois pieds cinq pouces de circonférence; le train de devant a trois pieds quatre pouces de hauteur, & celui de derrière trois pieds deux pouces, les corps de la première, de la ſeconde & de la troiſième vertèbre lombaire, ſont réunis par des exoſtoſes; l'os de la noix manque dans les pied gauche de derrière, & les deux os triangulaires dans la jambe droite de devant; l'os de la première phalange & les deux os triangulaires de la jambe gauche de derrière ſont de bois revêtu de cire.

N.° CDXXXIII.

L'os hyoïde d'un âne.

Cet os, ou pluſtôt cet aſſemblage d'os, a été tiré d'un ſujet de la taille ordinaire; il ne diffère de celui du cheval, rapporté ſous le numéro CDXX, que par la grandeur; au reſte, il y reſſemble ſi parfaitement, que ſi ces deux hyoïdes avoient été pris dans deux ſujets de même taille, il ne ſeroit pas poſſible de reconnoître celui du cheval ou celui de l'âne.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 482 sur 615

N.° CDXXXIV.

Vertèbre dorſale d'une âneſſe, qui a un caractère de vertèbre lombaire.

Il a été fait mention de cette vertèbre dans la deſcription du ſquelette de l'âne, à l'article des vertèbres lombaires; ainſi il ſuffira de rappeler ici que la vertèbre dorſale dont il s'agit, a une apophyſe acceſſoire *(A, pl. XII, fig. 6)* du côté gauche.

N.° CDXXXV.

Exoſtoſe ſur une des premières vertèbres d'un âne.

Cette vertèbre eſt couverte d'exoſtoſes ſur toutes ſes parties, excepté les parois du grand trou, le milieu des faces de l'apophyſe épineuſe & la face antérieure du corps de la vertèbre, ſous lequel l'exoſtoſe forme une groſſe tubéroſité.

N.° CDXXXVI.

Ankyloſe de quelques apophyſes épineuſes des dernières vertèbres dorſales d'un âne.

Cette pièce eſt compoſée de trois vertèbres, dont les apophyſes épineuſes ſont ſoudées enſemble par une exoſtoſe qui forme une tubéroſité ſur le côté gauche.

LE BŒUF.

LA ſurface de la terre, parée de ſa verdure, eſt le fonds inépuiſable & commun duquel l'homme & les animaux tirent leur ſubſiſtance; tout ce qui a vie dans la Nature vit ſur ce qui végète, & les végétaux vivent à leur tour des débris de tout ce qui a vécu & végété : pour vivre il faut détruire, & ce n'eſt en effet qu'en détruiſant des êtres que les animaux peuvent ſe nourrir & ſe multiplier. Dieu, en créant les premiers individus de chaque eſpèce d'animal & de végétal, a non ſeulement donné la forme à la pouſſière de la terre, mais il l'a rendu vivante & animée, en renfermant dans chaque individu une quantité plus ou moins grande de principes actifs, de molécules organiques vivantes, indeſtructibles *, & communes à tous les êtres organiſés : ces molécules paſſent de corps en corps, & ſervent également à la vie actuelle & à la continuation de la vie, à la nutrition, à l'accroiſſement de chaque individu; & après la diſſolution du corps, après ſa deſtruction, ſa réduction en cendres, ces molécules organiques, ſur leſquelles la mort ne peut rien, ſurvivent, circulent dans l'Univers, paſſent dans d'autres êtres, & y portent la nourriture & la vie : toute production, tout

* Voyez le chapitre VI & ſuivans du ſecond volume de cette Hiſtoire Naturelle.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 484 sur 615

renouvellement, tout accroiſſement par la génération, par la nutrition, par le développement, ſuppoſent donc une deſtruction précédente, une converſion de ſubſtance, un tranſport de ces molécules organiques qui ne ſe multiplient pas, mais qui, ſubſiſtant toûjours en nombre égal, rendent la Nature toûjours également vivante, la terre également peuplée, & toûjours également reſplendiſſante de la première gloire de celui qui l'a créée.

A prendre les êtres en général, le total de la quantité de vie eſt donc toûjours le même, & la mort qui ſemble tout détruire, ne détruit rien de cette vie primitive & commune à toutes les eſpèces d'êtres organiſés : comme toutes les autres puiſſances ſubordonnées & ſubalternes, la mort n'attaque que les individus, ne frappe que la ſurface, ne détruit que la forme, ne peut rien ſur la matière, & ne fait aucun tort à la Nature qui n'en brille que davantage, qui ne lui permet pas d'anéantir les eſpèces, mais la laiſſe moiſſonner les individus & les détruire avec le temps, pour ſe montrer elle-même indépendante de la mort & du temps, pour exercer à chaque inſtant ſa puiſſance toûjours active, manifeſter ſa plénitude par ſa fécondité, & faire de l'Univers, en reproduiſant, en renouvelant les êtres, un théatre toûjours rempli, un ſpectacle toûjours nouveau.

Pour que les êtres ſe ſuccèdent, il eſt donc néceſſaire qu'ils ſe détruiſent entre eux; pour que les animaux ſe nourriſſent & ſubſiſtent, il faut qu'ils détruiſent des végétaux ou d'autres animaux; & comme avant & après

la deſtruction la quantité de vie reſte toûjours la même, il ſemble qu'il devroit être indifférent à la Nature que telle ou telle eſpèce détruisit plus ou moins; cependant, comme une mère économe, au ſein même de l'abondance, elle a fixé des bornes à la dépenſe & prévenu le dégât apparent, en ne donnant qu'à peu d'eſpèces d'animaux l'inſtinct de ſe nourrir de chair, elle a même réduit à un aſſez petit nombre d'individus ces eſpèces voraces & carnacières, tandis qu'elle a multiplié bien plus abondamment & les eſpèces & les individus de ceux qui ſe nourriſſent de plantes, & que dans les végétaux elle ſemble avoir prodigué les eſpèces, & répandu dans chacune avec profuſion le nombre & la fécondité. L'homme a peut-être beaucoup contribué à ſeconder ces vûes, à maintenir & même à établir cet ordre ſur la terre, car dans la mer on retrouve cette indifférence que nous ſuppoſions, toutes les eſpèces ſont preſque également voraces, elles vivent ſur elles-mêmes ou ſur les autres, & s'entre-dévorent perpétuellement ſans jamais ſe détruire, parce que la fécondité y eſt auſſi grande que la déprédation, & que preſque toute la nourriture, toute la conſommation, tourne au profit de la reproduction.

L'homme ſait uſer en maître de ſa puiſſance ſur les animaux, il a choiſi ceux dont la chair flatte ſon goût, il en a fait des eſclaves domeſtiques, il les a multipliés plus que la Nature ne l'auroit fait, il en a formé des troupeaux nombreux; & par les ſoins qu'il prend de

les faire naître, il ſemble avoir acquis le droit de ſe les immoler : mais il étend ce droit bien au-delà de ſes beſoins ; car indépendamment de ces eſpèces qu'il s'eſt aſſujéties, & dont il diſpoſe à ſon gré, il fait auſſi la guerre aux animaux ſauvages, aux oiſeaux, aux poiſſons, il ne ſe borne pas même à ceux du climat qu'il habite, il va chercher au loin, & juſqu'au milieu des mers, de nouveaux mets, & la Nature entière ſemble ſuffire à peine à ſon intempérance & à l'inconſtante variété de ſes appétits ; l'homme conſomme, engloutit lui ſeul plus de chair que tous les animaux enſemble n'en dévorent ; il eſt donc le plus grand deſtructeur, & c'eſt plus par abus que par néceſſité ; au lieu de jouir modérément des biens qui lui ſont offerts, au lieu de les diſpenſer avec équité, au lieu de réparer à meſure qu'il détruit, de renouveler lorſqu'il anéantit, l'homme riche met toute ſa gloire à conſommer, toute ſa grandeur à perdre en un jour à ſa table plus de biens qu'il n'en faudroit pour faire ſubſiſter pluſieurs familles ; il abuſe également & des animaux & des hommes, dont le reſte demeure affamé, languit dans la misère, & ne travaille que pour ſatisfaire à l'appétit immodéré & à la vanité encore plus inſatiable de cet homme, qui détruiſant les autres par la diſette, ſe détruit lui-même par les excès.

Cependant l'homme pourroit, comme l'animal, vivre de végétaux ; la chair qui paroît être ſi analogue à la chair, n'eſt pas une nourriture meilleure que les graines

ou

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 487 sur 615

ou le pain ; ce qui fait la vraie nourriture, celle qui contribue à la nutrition, au développement, à l'accroiſſement & à l'entretien du corps, n'eſt pas cette matière brute qui compoſe à nos yeux la texture de la chair ou de l'herbe, mais ce ſont les molécules organiques que l'un & l'autre contiennent, puiſque le bœuf, en paiſſant l'herbe, acquiert autant de chair que l'homme ou que les animaux qui ne vivent que de chair & de ſang : la ſeule différence réelle qu'il y ait entre ces alimens, c'eſt qu'à volume égal, la chair, le blé, les graines contiennent beaucoup plus de molécules organiques que l'herbe, les feuilles, les racines & les autres parties des plantes, comme nous nous en ſommes aſſurés en obſervant les infuſions de ces différentes matières ; en ſorte que l'homme & les animaux dont l'eſtomac & les inteſtins n'ont pas aſſez de capacité pour admettre un très-grand volume d'alimens, ne pourroient pas prendre aſſez d'herbe pour en tirer la quantité de molécules organiques néceſſaire à leur nutrition ; & c'eſt par cette raiſon que l'homme & les autres animaux qui n'ont qu'un eſtomac ne peuvent vivre que de chair ou de graines, qui dans un petit volume contiennent une très-grande quantité de ces molécules organiques nutritives, tandis que le bœuf & les autres animaux ruminans qui ont pluſieurs eſtomacs, dont l'un eſt d'une très-grande capacité, & qui par conſéquent peuvent ſe remplir d'un grand volume d'herbe, en tirent aſſez de molécules organiques pour

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 488 sur 615

ſe nourrir, croître & multiplier; la quantité compenſe ici la qualité de la nourriture, mais le fonds en eſt le même, c'eſt la même matière, ce ſont les mêmes molécules organiques qui nourriſſent le bœuf, l'homme & tous les animaux.

On ne manquera pas de m'oppoſer que le cheval n'a qu'un eſtomac, & même aſſez petit; que l'âne, le lièvre & d'autres animaux qui vivent d'herbe n'ont auſſi qu'un eſtomac, & que par conſéquent cette explication, quoique vrai-ſemblable, n'en eſt peut-être ni plus vraie ni mieux fondée; cependant, bien loin que ces exceptions apparentes la détruiſent, elles me paroiſſent au contraire la confirmer, car quoique le cheval & l'âne n'aient qu'un eſtomac, ils ont des poches dans les inteſtins, d'une ſi grande capacité, qu'on peut les comparer à la panſe des animaux ruminans, & les lièvres ont l'inteſtin cæcum d'une ſi grande longueur & d'un tel diamètre, qu'il équivaut au moins à un ſecond eſtomac; ainſi il n'eſt pas étonnant que ces animaux puiſſent ſe nourrir d'herbes, & en général on trouvera toûjours que c'eſt de la capacité totale de l'eſtomac & des inteſtins que dépend dans les animaux la diverſité de leur manière de ſe nourrir; car les ruminans, comme le bœuf, le bélier, le chameau, &c. ont quatre eſtomacs & des inteſtins d'une longueur prodigieuſe; auſſi vivent-ils d'herbe, & l'herbe ſeule leur ſuffit: les chevaux, les ânes, les lièvres, les lapins, les cochons d'inde, &c. n'ont qu'un eſtomac, mais ils ont un cæcum qui

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 489 sur 615

équivaut à un ſecond eſtomac, & ils vivent d'herbe & de graines; les ſangliers, les hériſſons, les écureuils, &c. dont l'eſtomac & les boyaux ſont d'une moindre capacité, ne mangent que peu d'herbe, & vivent de graines, de fruits & de racines, & ceux qui, comme les loups, les renards, les tigres, &c. ont l'eſtomac & les inteſtins d'une plus petite capacité que tous les autres, relativement au volume de leur corps, ſont obligés, pour vivre, de choiſir les nourritures les plus ſucculentes, les plus abondantes en molécules organiques, & de manger de la chair & du ſang, des graines & des fruits.

C'eſt donc ſur ce rapport phyſique & néceſſaire, beaucoup plus que ſur la convenance du goût, qu'eſt fondée la diverſité que nous voyons dans les appétits des animaux; car ſi la néceſſité ne les déterminoit pas plus ſouvent que le goût, comment pourroient-ils dévorer la chair infecte & corrompue avec autant d'avidité que la chair ſucculente & fraîche! pourquoi mangeroient-ils également de toutes ſortes de chair! nous voyons que les chiens domeſtiques qui ont de quoi choiſir, refuſent aſſez conſtamment certaines viandes, comme la bécaſſe, la grive, le cochon, &c. tandis que les chiens ſauvages, les loups, les renards, &c. mangent également, & la chair du cochon, & la bécaſſe, & les oiſeaux de toutes eſpèces, & même les grenouilles, car nous en avons trouvé deux dans l'eſtomac d'un loup; & lorſque la chair ou le poiſſon leur

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 490 sur 615

manquent, ils mangent des fruits, des graines, des raiſins, &c. & ils préfèrent toûjours tout ce qui dans un petit volume, contient une grande quantité de parties nutritives, c'eſt-à-dire, de molécules organiques propres à la nutrition & à l'entretien du corps.

Si ces preuves ne paroiſſent pas ſuffiſantes, que l'on conſidère encore la manière dont on nourrit le bétail que l'on veut engraiſſer; on commence par la caſtration, ce qui ſupprime la voie par laquelle les molécules organiques s'échappent en plus grande abondance; enſuite au lieu de laiſſer le bœuf à ſa pâture ordinaire & à l'herbe pour toute nourriture, on lui donne du ſon, du grain, des navets, des alimens en un mot plus ſubſtantiels que l'herbe, & en très-peu de temps la quantité de la chair de l'animal augmente, les ſucs & la graiſſe abondent, & font d'une chair aſſez dure & aſſez sèche par elle-même, une viande ſucculente & ſi bonne, qu'elle fait la baſe de nos meilleurs repas.

Il réſulte auſſi de ce que nous venons de dire, que l'homme, dont l'eſtomac & les inteſtins ne ſont pas d'une très-grande capacité relativement au volume de ſon corps, ne pourroit pas vivre d'herbe ſeule; cependant il eſt prouvé par les faits qu'il pourroit bien vivre de pain, de légumes & d'autres graines de plantes, puiſqu'on connoît des nations entières & des Ordres d'hommes auxquels la religion défend de manger de rien qui ait eu vie; mais ces exemples, appuyés même de l'autorité de Pythagore & recommandés par quelques

Médecins trop amis de la diète, ne me paroiſſent pas ſuffiſans pour nous convaincre qu'il y eût à gagner pour la ſanté des hommes & pour la multiplication du genre humain à ne vivre que de légumes & de pain, d'autant plus que les gens de la campagne, que le luxe des villes & la ſomptuoſité de nos tables réduiſent à cette façon de vivre, languiſſent & dépériſſent plus tôt que les hommes de l'état mitoyen, auxquels l'inanition & les excès ſont également inconnus.

Après l'homme, les animaux qui ne vivent que de chair ſont les plus grands deſtructeurs, ils ſont en même temps & les ennemis de la Nature & les rivaux de l'homme; ce n'eſt que par une attention toûjours nouvelle & par des ſoins prémédités & ſuivis qu'il peut conſerver ſes troupeaux, ſes volailles, &c. en les mettant à l'abri de la ſerre de l'oiſeau de proie & de la dent carnaciere du loup, du renard, de la fouine, de la belette, &c. ce n'eſt que par une guerre continuelle qu'il peut défendre ſon grain, ſes fruits, toute ſa ſubſtance, & même ſes vêtemens, contre la voracité des rats, des chenilles, des ſcarabées, des mites, &c. car les inſectes ſont auſſi de ces bêtes qui dans le monde ſont plus de mal que de bien; au lieu que le bœuf, le mouton & les autres animaux qui paiſſent l'herbe, non ſeulement ſont les meilleurs, les plus utiles, les plus précieux pour l'homme, puiſqu'ils le nourriſſent, mais ſont encore ceux qui conſomment & dépenſent le moins; le bœuf ſur-tout eſt à cet égard l'animal par

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 492 sur 615

excellence, car il rend à la terre tout autant qu'il en tire, & même il améliore le fonds ſur lequel il vit, il engraiſſe ſon pâturage, au lieu que le cheval & la pluſpart des autres animaux amaigriſſent en peu d'années les meilleures prairies.

Mais ce ne ſont pas là les ſeuls avantages que le bétail procure à l'homme; ſans le bœuf les pauvres & les riches auroient beaucoup de peine à vivre, la terre demeureroit inculte, les champs & même les jardins ſeroient ſecs & ſtériles; c'eſt ſur lui que roulent tous les travaux de la campagne, il eſt le domeſtique le plus utile de la ferme, le ſoûtien du ménage champêtre, il fait toute la force de l'agriculture; autrefois il faiſoit toute la richeſſe des hommes, & aujourd'hui il eſt encore la baſe de l'opulence des États, qui ne peuvent ſe ſoûtenir & fleurir que par la culture des terres & par l'abondance du bétail, puiſque ce ſont les ſeuls biens réels, tous les autres, & même l'or & l'argent, n'étant que des biens arbitraires, des repréſentations, des monnoies de crédit, qui n'ont de valeur qu'autant que le produit de la terre leur en donne.

Le bœuf ne convient pas autant que le cheval, l'âne, le chameau, &c. pour porter des fardeaux, la forme de ſon dos & de ſes reins le démontre; mais la groſſeur de ſon cou & la largeur de ſes épaules indiquent aſſez qu'il eſt propre à tirer & à porter le joug, c'eſt auſſi de cette manière qu'il tire le plus avantageuſement, & il eſt ſingulier que cet uſage ne ſoit pas

général, & que dans des provinces entières on l'oblige à tirer par les cornes; la ſeule raiſon qu'on ait pû m'en donner, c'eſt que quand il eſt attelé par les cornes on le conduit plus aiſément; il a la tête très-forte, & il ne laiſſe pas de tirer aſſez bien de cette façon, mais avec beaucoup moins d'avantage que quand il tire par les épaules; il ſemble avoir été fait exprès pour la charrue, la maſſe de ſon corps, la lenteur de ſes mouvemens, le peu de hauteur de ſes jambes, tout, juſqu'à ſa tranquillité & à ſa patience dans le travail, ſemble concourir à le rendre propre à la culture des champs, & plus capable qu'aucun autre de vaincre la réſiſtance conſtante & toûjours nouvelle que la terre oppoſe à ſes efforts; le cheval, quoique peut-être auſſi fort que le bœuf, eſt moins propre à cet ouvrage, il eſt trop élevé ſur ſes jambes, ſes mouvemens ſont trop grands, trop bruſques, & d'ailleurs il s'impatiente & ſe rebute trop aiſément; on lui ôte même toute la légèreté, toute la ſoupleſſe de ſes mouvemens, toute la grace de ſon attitude & de ſa démarche, lorſqu'on le réduit à ce travail peſant, pour lequel il faut plus de conſtance que d'ardeur, plus de maſſe que de vîteſſe, & plus de poids que de reſſorts.

Dans les eſpèces d'animaux dont l'homme a fait des troupeaux & où la multiplication eſt l'objet principal, la femelle eſt plus néceſſaire, plus utile que le mâle; le produit de la vache eſt un bien qui croît & qui ſe renouvelle à chaque inſtant; la chair du veau

eſt une nourriture auſſi abondante que ſaine & délicate, le lait eſt l'aliment des enfans, le bœurre l'aſſaiſonnement de la pluſpart de nos mets, le fromage la nourriture la plus ordinaire des habitans de la campagne; que de pauvres familles ſont aujourd'hui réduites à vivre de leur vache! ces mêmes hommes qui tous les jours, & du matin au ſoir, gémiſſent dans le travail & ſont courbés ſur la charrue, ne tirent de la terre que du pain noir, & ſont obligés de céder à d'autres la fleur, la ſubſtance de leur grain, c'eſt par eux & ce n'eſt pas pour eux que les moiſſons ſont abondantes; ces mêmes hommes qui élèvent, qui multiplient le bétail, qui le ſoignent & s'en occupent perpétuellement, n'oſent jouir du fruit de leurs travaux, la chair de ce bétail eſt une nourriture dont ils ſont forcés de s'interdire l'uſage, réduits par la néceſſité de leur condition, c'eſt-à-dire, par la dureté des autres hommes, à vivre comme les chevaux, d'orge & d'avoine ou de légumes groſſiers, & de lait aigre.

On peut auſſi faire ſervir la vache à la charrue, & quoiqu'elle ne ſoit pas auſſi forte que le bœuf, elle ne laiſſe pas de le remplacer ſouvent; mais lorſqu'on veut l'employer à cet uſage il faut avoir attention de l'aſſortir, autant qu'on le peut, avec un bœuf de ſa taille & de ſa force, ou avec une autre vache, afin de conſerver l'égalité du trait & de maintenir le ſoc en équilibre entre ces deux puiſſances; moins elles ſont inégales, & plus le labour de la terre eſt facile & régulier;

régulier ; au reſte on emploie ſouvent ſix & juſqu'à huit bœufs dans les terreins fermes, & ſur-tout dans les friches, qui ſe lèvent par groſſes mottes & par quartiers, au lieu que deux vaches ſuffiſent pour labourer les terreins meubles & ſablonneux ; on peut auſſi dans ces terreins légers pouſſer à chaque fois le ſillon beaucoup plus loin que dans les terreins forts : les Anciens avoient borné à une longueur de cent vingt pas la plus grande étendue du ſillon que le bœuf devoit tracer par une continuité non interrompue d'efforts & de mouvemens, après quoi, diſoient-ils, il faut ceſſer de l'exciter & le laiſſer reprendre haleine pendant quelques momens avant de pourſuivre le même ſillon ou d'en commencer un autre ; mais les Anciens faiſoient leurs délices de l'étude de l'agriculture, & mettoient leur gloire à labourer eux-mêmes, ou du moins à favoriſer le laboureur, à épargner la peine du cultivateur & du bœuf ; & parmi nous ceux qui jouiſſent le plus des biens de cette terre, ſont ceux qui ſavent le moins eſtimer, encourager, ſoûtenir l'art de la cultiver.

Le taureau ſert principalement à la propagation de l'eſpèce, & quoiqu'on puiſſe auſſi le ſoûmettre au travail, on eſt moins ſûr de ſon obéiſſance, & il faut être en garde contre l'uſage qu'il peut faire de ſa force ; la Nature a fait cet animal indocile & fier, dans le temps du rut il devient indomptable, & ſouvent furieux ; mais par la caſtration l'on détruit la ſource de ces mouvemens impétueux, & l'on ne retranche rien à ſa force,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 496 sur 615

il n'en eſt que plus gros, plus maſſif, plus peſant & plus propre à l'ouvrage auquel on le deſtine; il devient auſſi plus traitable, plus patient, plus docile & moins incommode aux autres: un troupeau de taureaux ne ſeroit qu'une troupe effrénée que l'homme ne pourroit ni dompter, ni conduire.

La manière dont ſe fait cette opération eſt aſſez connue des gens de la campagne; cependant il y a ſur cela des uſages très-différens, dont on n'a peut-être pas aſſez obſervé les différens effets; en général l'âge le plus convenable à la caſtration eſt l'âge qui précède immédiatement la puberté, pour le bœuf c'eſt dix-huit mois ou deux ans, ceux qu'on y ſoûmet plus tôt périſſent preſque tous; cependant les jeunes veaux auxquels on ôte les teſticules quelque temps après leur naiſſance & qui ſurvivent à cette opération ſi dangereuſe à cet âge, deviennent des bœufs plus grands, plus gros, plus gras que ceux auxquels on ne fait la caſtration qu'à deux, trois ou quatre ans; mais ceux-ci paroiſſent conſerver plus de courage & d'activité, & ceux qui ne la ſubiſſent qu'à l'âge de ſix, ſept ou huit ans ne perdent preſque rien des autres qualités du ſexe maſculin, ils ſont plus impétueux, plus indociles que les autres bœufs, & dans le temps de la chaleur des femelles ils cherchent encore à s'en approcher, mais il faut avoir ſoin de les en écarter; l'accouplement, & même le ſeul attouchement du bœuf, fait naître à la vulve de la vache des eſpèces de carnoſités ou de verrues, qu'il faut

détruire & guérir en y appliquant un fer rouge, ce mal peut provenir de ce que ces bœufs, qu'on n'a que *biſtournés*, c'eſt-à-dire, auxquels on a ſeulement comprimé les teſticules, & ſerré & tordu les vaiſſeaux qui y aboutiſſent, ne laiſſent pas de répandre une liqueur apparemment à demi purulente, & qui peut cauſer des ulcères à la vulve de la vache, leſquels dégénèrent enſuite en carnoſités.

Le printemps eſt la ſaiſon où les vaches ſont le plus communément en chaleur; la pluſpart dans ce pays-ci reçoivent le taureau & deviennent pleines depuis le 15 avril juſqu'au 15 juillet, mais il ne laiſſe pas d'y en avoir beaucoup dont la chaleur eſt plus tardive, & d'autres dont la chaleur eſt plus précoce; elles portent neuf mois, & mettent bas au commencement du dixième; on a donc des veaux en quantité depuis le 15 janvier juſqu'au 15 avril, on en a auſſi pendant tout l'été aſſez abondamment, & l'automne eſt le temps où ils ſont le plus rares. Les ſignes de la chaleur de la vache ne ſont point équivoques, elle mugit alors très-fréquemment & plus violemment que dans les autres temps; elle ſaute ſur les vaches, ſur les bœufs, & même ſur les taureaux, la vulve eſt gonflée & proéminente au dehors; il faut profiter du temps de cette forte chaleur pour lui donner le taureau, ſi on laiſſoit diminuer cette ardeur, la vache ne retiendroit pas auſſi ſûrement.

Le taureau doit être choiſi, comme le cheval étalon,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 498 sur 615

parmi les plus beaux de ſon eſpèce, il doit être gros, bien fait & en bonne chair; il doit avoir l'œil noir, le regard fier, le front ouvert, la tête courte, les cornes groſſes, courtes & noires, les oreilles longues & velues, le muffle grand, le nez court & droit, le cou charnu & gros, les épaules & la poitrine larges, les reins fermes, le dos droit, les jambes groſſes & charnues, la queue longue & bien couverte de poil, l'alure ferme & ſûre, & le poil rouge *. Les vaches retiennent ſouvent dès la première, ſeconde ou troiſième fois, & ſi-tôt qu'elles ſont pleines le taureau refuſe de les couvrir, quoiqu'il y ait encore apparence de chaleur; mais ordinairement la chaleur ceſſe preſque auſſi-tôt qu'elles ont conçû, & elles refuſent auſſi elles-mêmes les approches du taureau.

Les vaches ſont aſſez ſujettes à avorter lorſqu'on ne les ménage pas & qu'on les met à la charrue, au charroi, &c. il faut même les ſoigner davantage & les ſuivre de plus près lorſqu'elles ſont pleines que dans les autres temps, afin de les empêcher de ſauter des haies, des foſſés, &c. il faut auſſi les mettre dans les pâturages les plus gras, & dans un terrein qui, ſans être trop humide & marécageux, ſoit cependant très-abondant en herbe: ſix ſemaines ou deux mois avant qu'elles mettent bas, on les nourrira plus largement qu'à l'ordinaire, en leur donnant à l'étable de l'herbe pendant l'été, & pendant l'hiver du ſon le matin ou de la

* Voyez la nouvelle maiſon ruſtique. *Paris, 1749, t. I, p. 298.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 499 sur 615

luzerne, du ſainfoin, &c. on ceſſera auſſi de les traire dans ce même temps, le lait leur eſt alors plus néceſſaire que jamais pour la nourriture de leur fœtus; auſſi y a-t-il des vaches dont le lait tarit abſolument un mois ou ſix ſemaines avant qu'elles mettent bas, celles qui ont du lait juſqu'aux derniers jours ſont les meilleures mères & les meilleures nourrices; mais ce lait des derniers temps eſt généralement mauvais & peu abondant. Il faut les mêmes attentions pour l'accouchement de la vache que pour celui de la jument, & même il paroît qu'il en faut davantage, car la vache qui met bas paroît être plus épuiſée, plus fatiguée que la jument; on ne peut ſe diſpenſer de la mettre dans une étable ſéparée, où il faut qu'elle ſoit chaudement & commodément ſur de la bonne litière, & de la bien nourrir, en lui donnant pendant dix ou douze jours de la farine de fèves, de blé ou d'avoine, &c. délayée avec de l'eau ſalée, & abondamment de la luzerne, du ſainfoin ou de bonne herbe bien mûre; ce temps ſuffit ordinairement pour la rétablir, après quoi on la remet par degrés à la vie commune & au pâturage, ſeulement il faut encore avoir l'attention de lui laiſſer tout ſon lait pendant les deux premiers mois, le veau profitera davantage, & d'ailleurs le lait de ces premiers temps n'eſt pas de bonne qualité.

On laiſſe le jeune veau auprès de ſa mère pendant les cinq ou ſix premiers jours, afin qu'il ſoit toûjours chaudement, & qu'il puiſſe téter auſſi ſouvent qu'il en

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 500 sur 615

a beſoin ; mais il croît & ſe fortifie aſſez dans ces cinq ou ſix jours, pour qu'on ſoit dès-lors obligé de l'en ſéparer ſi l'on veut la ménager, car il l'épuiſeroit s'il étoit toûjours auprès d'elle ; il ſuffira de le laiſſer teter deux ou trois fois par jour, & ſi l'on veut lui faire une bonne chair & l'engraiſſer promptement, on lui donnera tous les jours des œufs cruds, du lait bouilli, de la mie de pain ; au bout de quatre ou cinq ſemaines ce veau ſera excellent à manger : on pourra donc ne laiſſer teter que trente ou quarante jours les veaux qu'on voudra livrer au boucher, mais il faudra laiſſer au lait pendant deux mois au moins ceux qu'on voudra nourrir, plus on les laiſſera teter, plus ils deviendront gros & forts ; on préférera pour les élever ceux qui ſeront nés aux mois d'avril, mai & juin, les veaux qui naiſſent plus tard ne peuvent acquerir aſſez de force pour réſiſter aux injures de l'hiver ſuivant, ils languiſſent par le froid & périſſent preſque tous. A deux, trois ou quatre mois on ſévrera donc les veaux qu'on veut nourrir, & avant de leur ôter le lait abſolument, on leur donnera un peu de bonne herbe ou de foin fin, pour qu'ils commencent à s'accoûtumer à cette nouvelle nourriture, après quoi on les ſéparera tout-à-fait de leur mère, & on ne les en laiſſera point approcher ni à l'étable ni au pâturage, où cependant on les mènera tous les jours, & où on les laiſſera du matin au ſoir pendant l'été ; mais dès que le froid commencera à ſe faire ſentir en automne, il ne faudra les laiſſer ſortir que tard dans la

matinée & les ramener de bonne heure le ſoir; & pendant l'hiver, comme le grand froid leur eſt extrêmement contraire, on les tiendra chaudement dans une étable bien fermée & bien garnie de litière; on leur donnera, avec l'herbe ordinaire, du ſainfoin, de la luzerne, &c. & on ne les laiſſera ſortir que par les temps doux; il leur faut beaucoup de ſoins pour paſſer ce premier hiver; c'eſt le temps le plus dangereux de leur vie, car ils ſe fortifieront aſſez pendant l'été ſuivant, pour ne plus craindre le froid du ſecond hiver.

La vache eſt à dix-huit mois en pleine puberté, & le taureau à deux ans; mais quoiqu'ils puiſſent déjà engendrer à cet âge, on fera bien d'attendre juſqu'à trois ans avant de leur permettre de s'accoupler; ces animaux ſont dans leur grande force depuis trois ans juſqu'à neuf, après cela les vaches & les taureaux ne ſont plus propres qu'à être engraiſſés & livrés au boucher: comme ils prennent en deux ans la plus grande partie de leur accroiſſement, la durée de leur vie eſt auſſi, comme dans la pluſpart des autres eſpèces d'animaux, à peu près de ſept fois deux ans, & communément ils ne vivent guère que quatorze ou quinze ans.

Dans tous les animaux quadrupèdes la voix du mâle eſt plus forte & plus grave que celle de la femelle, & je ne crois pas qu'il y ait d'exception à cette règle; quoique les Anciens aient écrit que la vache, le bœuf & même le veau avoient la voix plus grave que le

taureau, il eſt très-certain que le taureau a la voix beaucoup plus forte, puiſqu'il ſe fait entendre de bien plus loin que la vache, le bœuf ou le veau; ce qui a fait croire quil avoit la voix moins grave, c'eſt que ſon mugiſſement n'eſt pas un ſon ſimple, mais un ſon compoſé de deux ou trois octaves, dont la plus élevée frappe le plus l'oreille; en y faiſant attention, l'on entend en même temps un ſon grave, & plus grave que celui de la voix de la vache, du bœuf & du veau, dont les mugiſſemens ſont auſſi bien plus courts : le taureau ne mugit que d'amour, la vache mugit plus ſouvent de peur & d'horreur que d'amour, & le veau mugit de douleur, de beſoin de nourriture & de deſir de ſa mère.

Les animaux les plus peſans & les plus pareſſeux ne ſont pas ceux qui dorment le plus profondément ni le plus long temps: le bœuf dort, mais d'un ſommeil court & léger, il ſe réveille au moindre bruit; il ſe couche ordinairement ſur le côté gauche, & le rein ou rognon de ce côté gauche eſt toûjours plus gros & plus chargé de graiſſe que le rognon du côté droit.

Les bœufs, comme les autres animaux domeſtiques, varient pour la couleur; cependant le poil roux paroît être le plus commun, & plus il eſt rouge, plus il eſt eſtimé: on fait cas auſſi du poil noir, & l'on prétend que les bœufs ſous poil bai durent long-temps; que les bruns durent moins & ſe rebutent de bonne heure; que les gris, les pommelés & les blancs ne valent rien

rien pour le travail & ne ſont propres qu'à être engraiſſés : mais de quelque couleur que ſoit le poil du bœuf, il doit être luiſant, épais & doux au toucher, car s'il eſt rude, mal uni ou dégarni, on a raiſon de ſuppoſer que l'animal ſouffre, ou du moins qu'il n'eſt pas d'un fort tempérament : un bon bœuf pour la charrue ne doit être ni trop gras ni trop maigre, il doit avoir la tête courte & ramaſſée, les oreilles grandes, bien velues & bien unies, les cornes fortes, luiſantes & de moyenne grandeur, le front large, les yeux gros & noirs, le muffle gros & camus, les naſeaux bien ouverts, les dents blanches & égales, les lèvres noires, le cou charnu, les épaules groſſes & peſantes, la poitrine large, le *fanon*, c'eſt-à-dire, la peau du devant pendante juſque ſur les genoux, les reins fort larges, le ventre ſpacieux & tombant, les flancs grands, les hanches longues, la croupe épaiſſe, les jambes & les cuiſſes groſſes & nerveuſes, le dos droit & plein, la queue pendante juſqu'à terre, & garnie de poils touffus & fins, les pieds fermes, le cuir groſſier & maniable, les muſcles élevés & l'ongle court & large * ; il faut auſſi qu'il ſoit ſenſible à l'aiguillon, obéiſſant à la voix & bien dreſſé ; mais ce neſt que peu à peu, & en s'y prenant de bonne heure, qu'on peut accoûtumer le bœuf à porter le joug volontiers, & à ſe laiſſer conduire aiſément ; dès l'âge de deux ans & demi ou trois ans au plus tard, il faut commencer à l'apprivoiſer & à le ſubjuguer, ſi l'on

* Voyez la nouvelle maiſon ruſtique, *Tome I, page 279.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 504 sur 615

attend plus tard il devient indocile, & ſouvent indomptable; la patience, la douceur, & même les careſſes, ſont les ſeuls moyens qu'il faut employer, la force & les mauvais traitemens ne ſerviroient qu'à le rebuter pour toûjours; il faut donc lui frotter le corps, le careſſer, lui donner de temps en temps de l'orge bouilli, des fèves concaſſées, & d'autres nourritures de cette eſpèce, dont il eſt le plus friand, & toutes mêlées de ſel qu'il aime beaucoup; en même temps on lui liera ſouvent les cornes, quelques jours après on le mettra au joug, & on lui fera traîner la charrue avec un autre bœuf de même taille, & qui ſera tout dreſſé; on aura ſoin de les attacher enſemble à la mangeoire, de les mener de même au pâturage, afin qu'ils ſe connoiſſent & s'habituent à n'avoir que des mouvemens communs, & l'on n'emploiera jamais l'éguillon dans les commencemens, il ne ſerviroit qu'à le rendre plus intraitable; il faudra auſſi le ménager & ne le faire travailler qu'à petites repriſes, car il ſe fatigue beaucoup tant qu'il n'eſt pas tout-à-fait dreſſé, & par la même raiſon on le nourrira plus largement alors que dans les autres temps.

Le bœuf ne doit ſervir que depuis trois ans juſqu'à dix, on fera bien de le tirer alors de la charrue pour l'engraiſſer & le vendre, la chair en ſera meilleure que ſi l'on attendoit plus long-temps. On connoît l'âge de cet animal par les dents & par les cornes: les premières dents du devant tombent à dix mois, & ſont

remplacées par d'autres qui ne ſont pas ſi blanches & qui ſont plus larges; à ſeize mois les dents voiſines de celles du milieu tombent & ſont auſſi remplacées par d'autres, & à trois ans toutes les dents inciſives ſont renouvelées, elles ſont alors égales, longues & aſſez blanches; à meſure que le bœuf avance en âge elles s'uſent & deviennent inégales & noires: c'eſt la même choſe pour le taureau & pour la vache, ainſi la caſtration ni le ſexe ne changent rien à la crûe & à la chûte des dents; cela ne change rien non plus à la chûte des cornes, car elles tombent également à trois ans au taureau, au bœuf & à la vache, & elles ſont remplacées par d'autres cornes qui, comme les ſecondes dents, ne tombent plus; celles du bœuf & de la vache deviennent ſeulement plus groſſes & plus longues que celles du taureau, l'accroiſſement de ces ſecondes cornes ne ſe fait pas d'une manière uniforme & par un développement égal; la première année, c'eſt-à-dire, la quatrième année de l'âge du bœuf, il lui pouſſe deux petites cornes pointues, nettes, unies & terminées vers la tête par une eſpèce de bourrelet, l'année ſuivante ce bourrelet s'éloigne de la tête, pouſſé par un cylindre de corne qui ſe forme & qui ſe termine auſſi par un autre bourrelet, & ainſi de ſuite, car tant que l'animal vit les cornes croiſſent; ces bourrelets deviennent des nœuds annulaires, qu'il eſt aiſé de diſtinguer dans la corne, & par leſquels l'âge ſe peut aiſément compter, en prenant pour trois ans la pointe de la corne juſqu'au premier

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 506 sur 615

nœud, & pour un an de plus chacun des intervalles entre les autres nœuds.

Le cheval mange nuit & jour, lentement, mais preſque continuellement; le bœuf au contraire mange vîte & prend en aſſez peu de temps toute la nourriture qu'il lui faut, après quoi il ceſſe de manger & ſe couche pour ruminer : cette différence vient de la différente conformation de l'eſtomac de ces animaux; le bœuf, dont les deux premiers eſtomacs ne forment qu'un même ſac d'une très-grande capacité, peut ſans inconvénient prendre à la fois beaucoup d'herbe & le remplir en peu de temps, pour ruminer enſuite & digérer à loiſir; le cheval, qui n'a qu'un petit eſtomac ne peut y recevoir qu'une petite quantité d'herbe & le remplir ſucceſſivement à meſure qu'elle s'affaiſſe & qu'elle paſſe dans les inteſtins, où ſe fait principalement la décompoſition de la nourriture; car ayant obſervé dans le bœuf & dans le cheval le produit ſucceſſif de la digeſtion & ſur-tout la décompoſition du foin, nous avons vû dans le bœuf qu'au ſortir de la partie de la panſe, qui forme le ſecond eſtomac & qu'on appelle le *bonnet*, il eſt réduit en une eſpèce de pâte verte, ſemblable à des épinards hachés & bouillis; que c'eſt ſous cette forme qu'il eſt retenu & contenu dans les plis ou livrets du troiſième eſtomac, qu'on appelle le *feuillet*; que la décompoſition en eſt entière dans le quatrième eſtomac, qu'on appelle la *caillette*; & que ce n'eſt, pour ainſi dire, que le marc qui paſſe dans les inteſtins; au

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 507 sur 615

lieu que dans le cheval le foin ne ſe décompoſe guère ni dans l'eſtomac ni dans les premiers boyaux, où il devient ſeulement plus ſouple & plus flexible, comme ayant été macéré & pénétré de la liqueur active dont il eſt environné; qu'il arrive au cæcum & au colon ſans grande altération; que c'eſt principalement dans ces deux inteſtins, dont l'énorme capacité répond à celle de la panſe des ruminans, que ſe fait dans le cheval la décompoſition de la nourriture; & que cette décompoſition n'eſt jamais auſſi entière que celle qui ſe fait dans le quatrième eſtomac du bœuf.

Par ces mêmes conſidérations & par la ſeule inſpection des parties, il me ſemble qu'il eſt aiſé de concevoir comment ſe fait la rumination, & pourquoi le cheval ne rumine ni ne vomit, au lieu que le bœuf & les autres animaux qui ont pluſieurs eſtomacs, ſemblent ne digérer l'herbe qu'à meſure qu'ils ruminent. La rumination n'eſt qu'un vomiſſement ſans effort, occaſionné par la réaction du premier eſtomac ſur les alimens qu'il contient. Le bœuf remplit ſes deux premiers eſtomacs, c'eſt-à-dire, la panſe & le bonnet, qui n'eſt qu'une portion de la panſe, tout autant qu'ils peuvent l'être; cette membrane tendue réagit donc alors avec force ſur l'herbe qu'elle contient, qui n'eſt que très-peu mâchée, à peine hachée, & dont le volume augmente beaucoup par la fermentation : ſi l'aliment étoit liquide, cette force de contraction le feroit paſſer dans le troiſième eſtomac, qui ne communique à l'autre

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 508 sur 615

que par un conduit étroit, dont même l'orifice eſt ſitué à la partie ſupérieure du premier, & preſque auſſi haut que celui de l'œſophage; ainſi ce conduit ne peut pas admettre cet aliment ſec, ou du moins il n'en admet que la partie la plus coulante; il eſt donc néceſſaire que les parties les plus sèches remontent dans l'œſophage, dont l'orifice eſt plus large que celui du conduit; elles y remontent en effet, l'animal les remâche, les macère, les imbibe de nouveau de ſa ſalive, & rend ainſi peu à peu l'aliment plus coulant, il le réduit en pâte aſſez liquide ponr qu'elle puiſſe couler dans ce conduit qui communique au troiſième eſtomac, où elle ſe macère encore avant de paſſer dans le quatrième; & c'eſt dans ce dernier eſtomac que s'achève la décompoſition du foin qui y eſt réduit en parfait mucilage: ce qui confirme la vérité de cette explication, c'eſt que tant que ces animaux tetent ou ſont nourris de lait & d'autres alimens liquides & coulans, ils ne ruminent pas, & qu'ils ruminent beaucoup plus en hiver & lorſqu'on les nourrit d'alimens ſecs, qu'en été, pendant lequel ils paiſſent l'herbe tendre; dans le cheval au contraire l'eſtomac eſt très-petit, l'orifice de l'œſophage eſt fort étroit, & celui du pylore eſt fort large; cela ſeul ſuffiroit pour rendre impoſſible la rumination, car l'aliment contenu dans ce petit eſtomac, quoique peut-être plus fortement comprimé que dans le grand eſtomac du bœuf, ne doit pas remonter, puiſqu'il peut aiſément deſcendre par le pylore qui eſt fort large; il

n'eſt pas même néceſſaire que le foin ſoit réduit en pâte molle & coulante pour y entrer, la force de contraction de l'eſtomac y pouſſe l'aliment encore preſque ſec, & il ne peut remonter par l'œſophage, parce que ce conduit eſt fort petit en comparaiſon de celui du pylore; c'eſt donc par cette différence générale de conformation que le bœuf rumine, & que le cheval ne peut ruminer; mais il y a encore une différence particulière dans le cheval, qui fait que non ſeulement il ne peut ruminer, c'eſt à-dire, vomir ſans effort, mais même qu'il ne peut abſolument vomir, quelque effort qu'il puiſſe faire, c'eſt que le conduit de l'œſophage arrivant très-obliquement dans l'eſtomac du cheval, dont les membranes forment une épaiſſeur conſidérable, ce conduit fait dans cette épaiſſeur une eſpèce de gouttière ſi oblique, qu'il ne peut que ſe ſerrer davantage, au lieu de s'ouvrir par les convulſions de l'eſtomac *. Quoique cette différence, auſſi-bien que les autres différences de conformation qu'on peut remarquer dans le corps des animaux, dépendent toutes de la Nature lorſqu'elles ſont conſtantes, cependant il y a dans le développement, & ſur-tout dans celui des parties molles, des différences conſtantes en apparence, qui néanmoins pourroient varier, & qui même varient par les circonſtances; la grande capacité de la

* Voyez dans ce volume la deſcription de l'eſtomac du cheval, & le mémoire de M. Bertin dans le volume de l'Académie des Sciences, *année 1746.*

panſe du bœuf, par exemple, n'eſt pas dûe en entier à la Nature, la panſe n'eſt pas telle par ſa conformation primitive, elle ne le devient que ſucceſſivement & par le grand volume des alimens; car dans le veau qui vient de naître, & même dans le veau qui eſt encore au lait & qui n'a pas mangé d'herbe, la panſe, comparée à la caillette, eſt beaucoup plus petite que dans le bœuf: cette grande capacité de la panſe ne vient donc que de l'extenſion qu'occaſionne le grand volume des alimens, j'en ai été convaincu par une expérience qui me paroît déciſive. J'ai fait nourrir deux agneaux du même âge & ſevrés en même temps, l'un de pain, & l'autre d'herbe; les ayant ouverts au bout d'un an, j'ai vû que la panſe de l'agneau qui avoit vécu d'herbe, étoit devenue plus grande de beaucoup que la panſe de celui qui avoit été nourri de pain.

On prétend que les bœufs qui mangent lentement réſiſtent plus long-temps au travail que ceux qui mangent vîte; que les bœufs des pays élevés & ſecs ſont plus vifs, plus vigoureux & plus ſains que ceux des pays bas & humides; que tous deviennent plus forts lorſqu'on les nourrit de foin ſec que quand on ne leur donne que de l'herbe molle; qu'ils s'accoûtument plus difficilement que les chevaux au changement de climat, & que par cette raiſon l'on ne doit jamais acheter que dans ſon voiſinage des bœufs pour le travail.

En hiver, comme les bœufs ne font rien, il ſuffira de les nourrir de paille & d'un peu de foin; mais dans le

le temps des ouvrages on leur donnera beaucoup plus de foin que de paille, & même un peu de ſon ou d'avoine avant de les faire travailler; l'été, ſi le foin manque, on leur donnera de l'herbe fraîchement coupée, ou bien de jeunes pouſſes & des feuilles de frêne, d'orme, de chêne, &c. mais en petite quantité, l'excès de cette nourriture, qu'ils aiment beaucoup, leur cauſant quelquefois un piſſement de ſang; la luzerne, le fain-foin, la veſce, ſoit en vert ou èn ſec, les lupins, les navets, l'orge bouilli, &c. ſont auſſi de très-bons alimens pour les bœufs; il n'eſt pas néceſſaire de régler la quantité de leur nourriture, ils n'en prennent jamais plus qu'il ne leur en faut, & l'on fera bien de leur en donner toûjours aſſez pour qu'ils en laiſſent; on ne les mettra au pâturage que vers le 15 de mai, les premières herbes ſont trop crues, & quoiqu'ils les mangent avec avidité, elles ne laiſſent pas de les incommoder; on les fera pâturer pendant tout l'été, & vers le 15 octobre on les remettra au fourrage, en obſervant de ne les pas faire paſſer bruſquement du vert au ſec & du ſec au vert, mais de les amener par degrés à ce changement de nourriture.

La grande chaleur incommode ces animaux, peut-être plus encore que le grand froid; il faut pendant l'été les mener au travail dès la pointe du jour, les ramener à l'étable ou les laiſſer dans les bois pâturer à l'ombre pendant la grande chaleur, & ne les remettre à l'ouvrage qu'à trois ou quatre heures du ſoir; au

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 512 sur 615

printemps, en hiver & en automne on pourra les faire travailler ſans interruption depuis huit ou neuf heures du matin juſqu'à cinq ou ſix heures du ſoir. Ils ne demandent pas autant de ſoin que les chevaux, cependant ſi l'on veut les entretenir ſains & vigoureux, on ne peut guère ſe diſpenſer de les étriller tous les jours, de les laver, de leur graiſſer la corne des pieds, &c. il faut auſſi les faire boire au moins deux fois par jour, ils aiment l'eau nette & fraîche, au lieu que le cheval l'aime trouble & tiède.

La nourriture & le ſoin ſont à peu près les mêmes & pour la vache & pour le bœuf, cependant la vache à lait exige des attentions particulières, tant pour la bien choiſir que pour la bien conduire : on dit que les vaches noires ſont celles qui donnent le meilleur lait, & que les blanches ſont celles qui en donnent le plus; mais de quelque poil que ſoit la vache à lait, il faut qu'elle ſoit en bonne chair, qu'elle ait l'œil vif, la démarche légère, qu'elle ſoit jeune, & que ſon lait ſoit, s'il ſe peut, abondant & de bonne qualité; on la traira deux fois par jour en été & une fois ſeulement en hiver, & ſi l'on veut augmenter la quantité du lait, il n'y aura qu'à la nourrir avec des alimens plus ſucculens que l'herbe.

Le bon lait n'eſt ni trop épais ni trop clair, ſa conſiſtance doit être telle que lorſqu'on en prend une petite goutte elle conſerve ſa rondeur ſans couler, il doit auſſi être d'un beau blanc, celui qui tire ſur le jaune ou ſur

le bleu ne vaut rien ; ſa ſaveur doit être douce, ſans aucune amertume & ſans âcreté, il faut auſſi qu'il ſoit de bonne odeur ou ſans odeur ; il eſt meilleur au mois de mai & pendant l'été que pendant l'hiver, & il n'eſt parfaitement bon que quand la vache eſt en bon âge & en bonne ſanté ; le lait des jeunes geniſſes eſt trop clair, celui des vieilles vaches eſt trop ſec ; & pendant l'hiver il eſt trop épais : ces différentes qualités du lait ſont relatives à la quantité plus ou moins grande des parties butireuſes, caſéeuſes & ſéreuſes qui le compoſent ; le lait trop clair eſt celui qui abonde trop en parties ſéreuſes, le lait trop épais eſt celui qui en manque, & le lait trop ſec n'a pas aſſez de parties butireuſes & ſéreuſes ; le lait d'une vache en chaleur n'eſt pas bon, non plus que celui d'une vache qui approche de ſon terme ou qui a mis bas depuis peu de temps. On trouve dans le troiſième & dans le quatrième eſtomac du veau qui tète, des grumeaux de lait caillé ; ces grumeaux de lait ſéchés à l'air ſont la préſure dont on ſe ſert pour faire cailler le lait ; plus on garde cette préſure, meilleure elle eſt, & il n'en faut qu'une très-petite quantité pour faire un grand volume de fromage.

Les vaches & les bœufs aiment beaucoup le vin, le vinaigre, le ſel, ils dévorent avec avidité une ſalade aſſaiſonnée : en Eſpagne & dans quelques autres pays, on met auprès du jeune veau à l'étable une de ces pierres qu'on appelle *ſalegres*, & qu'on trouve dans les mines de ſel gemme, il lèche cette pierre ſalée

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 514 sur 615

pendant tout le temps que ſa mère eſt au pâturage ; ce qui excite ſi fort l'appétit ou la ſoif, qu'au moment que la vache arrive le jeune veau ſe jette à la mamelle, en tire avec avidité beaucoup de lait, s'engraiſſe & croît bien plus vîte que ceux auxquels on ne donne point de ſel ; c'eſt par la même raiſon que quand les bœufs ou les vaches ſont dégoûtés, on leur donne de l'herbe trempée dans du vinaigre ou ſaupoudrée d'un peu de ſel ; on peut leur en donner auſſi lorſqu'ils ſe portent bien & que l'on veut exciter leur appétit pour les engraiſſer en peu de temps ; c'eſt ordinairement à l'âge de dix ans qu'on les met à l'engrais, ſi l'on attend plus tard on eſt moins ſûr de réuſſir & leur chair n'eſt pas ſi bonne ; on peut les engraiſſer en toutes ſaiſons, mais l'été eſt celle qu'on préfère, parce que l'engrais ſe fait à moins de frais, & qu'en commençant au mois de mai ou de juin, on eſt preſque ſûr de les voir gras avant la fin d'octobre : dès qu'on voudra les engraiſſer, on ceſſera de les faire travailler, on les fera boire beaucoup plus ſouvent, on leur donnera des nourritures ſucculentes en abondance, quelquefois mêlées d'un peu de ſel, & on les laiſſera ruminer à loiſir & dormir à l'étable pendant les grandes chaleurs ; en moins de quatre ou cinq mois ils deviendront ſi gras, qu'ils auront de la peine à marcher, & qu'on ne pourra les conduire au loin qu'à très-petites journées. Les vaches, & même les taureaux biſtournés, peuvent s'engraiſſer auſſi, mais la chair de la vache eſt plus sèche, & celle du taureau

biſtourné eſt plus rouge & plus dure que la chair du bœuf, & elle a toûjours un goût deſagréable & fort.

Les taureaux, les vaches & les bœufs ſont fort ſujets à ſe lécher, ſur-tout dans le temps qu'ils ſont en plein repos; & comme l'on croit que cela les empêche d'engraiſſer, on a ſoin de frotter de leur fiente tous les endroits de leur corps auxquels ils peuvent atteindre; lorſqu'on ne prend pas cette précaution, ils s'enlèvent le poil avec la langue, qu'ils ont fort rude, & ils avalent ce poil en grande quantité; comme cette ſubſtance ne peut ſe digérer, elle reſte dans leur eſtomac & y forme des pelottes rondes qu'on a appelées *égagropiles*, & qui ſont quelquefois d'une groſſeur ſi conſidérable, qu'elles doivent les incommoder par leur volume, & les empêcher de digérer par leur ſéjour dans l'eſtomac: ces pelottes ſe revêtent avec le temps d'une croûte brune aſſez ſolide, qui n'eſt cependant qu'un mucilage épaiſſi, mais qui par le frottement & la coction devient dur & luiſant*; elles ne ſe trouvent jamais que dans la panſe, & s'il entre du poil dans les autres eſtomacs, il n'y ſéjourne pas, non plus que dans les boyaux, il paſſe apparemment avec le marc des alimens.

Les animaux qui ont des dents inciſives, comme le cheval & l'âne, aux deux mâchoires, broutent plus aiſément l'herbe courte que ceux qui manquent de dents

* Voyez ci-après dans ce volume la deſcription de la partie du cabinet du Roi, qui a rapport à l'Hiſtoire Naturelle du Taureau.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 516 sur 615

incisives à la mâchoire supérieure: & si le mouton & la chèvre la coupent de très-près, c'est parce qu'ils sont petits & que leurs lèvres sont minces; mais le bœuf, dont les lèvres sont épaisses, ne peut brouter que l'herbe longue, & c'est par cette raison qu'il ne fait aucun tort au pâturage sur lequel il vit; comme il ne peut pincer que l'extrémité des jeunes herbes, il n'en ébranle point la racine, & n'en retarde que très-peu l'accroissement; au lieu que le mouton & la chèvre les coupent de si près, qu'ils détruisent la tige & gâtent la racine: d'ailleurs le cheval choisit l'herbe la plus fine, & laisse grainer & se multiplier la grande herbe, dont les tiges sont dures, au lieu que le bœuf coupe ces grosses tiges & détruit peu à peu l'herbe la plus grossière, ce qui fait qu'au bout de quelques années la prairie sur laquelle le cheval a vécu n'est plus qu'un mauvais pré, au lieu que celle que le bœuf a broutée devient un pâturage fin.

L'espèce de nos bœufs, qu'il ne faut pas confondre avec celle de l'aurochs, du buffle & du bison, paroît être originaire de nos climats tempérés, la grande chaleur les incommodant autant que le froid excessif; d'ailleurs cette espèce si abondante en Europe, ne se trouve point dans les pays méridionaux, & ne s'est pas étendue au delà de l'Arménie & de la Perse * en Asie, & au delà de l'Égypte & de la Barbarie en Afrique; car aux Indes, aussi-bien que dans le reste de l'Afrique,

* Voyez le voyage de Chardin, *tome II, page 28.*

& même en Amérique, ce ſont des biſons qui ont une boſſe ſur le dos, ou d'autres animaux auxquels les voyageurs ont donné le nom de *bœuf*, mais qui ſont d'une eſpèce différente de celle de nos bœufs; ceux qu'on trouve au Cap de Bonne-eſpérance & en pluſieurs contrées de l'Amérique, y ont été tranſportés d'Europe par les Hollandois & par les Eſpagnols: en général il paroît que les pays un peu froids conviennent mieux à nos bœufs que les pays chauds, & qu'ils ſont d'autant plus gros & plus grands, que le climat eſt plus humide & plus abondant en pâturages. Les bœufs de Danemarc, de la Podolie, de l'Ukraine, & de la Tartarie qu'habitent les Calmouques*, ſont les plus grands de tous; ceux d'Irlande, d'Angleterre, de Hollande & de Hongrie, ſont auſſi plus grands que ceux de Perſe, de Turquie, de Grèce, d'Italie, de France & d'Eſpagne, & ceux de Barbarie ſont les plus petits de tous; on aſſure même que les Hollandois tirent tous les ans du Danemarc un grand nombre de vaches grandes & maigtes, & que ces vaches donnent en Hollande beaucoup plus de lait que les vaches de France: c'eſt apparemment cette même race de vaches à lait qu'on a tranſportée & multipliée en Poitou, en Aunis & dans les marais de Charente, où on les appelle *vaches flandrines;* ces vaches ſont en effet beaucoup plus grandes & plus maigres que les vaches communes, & elles donnent

* Voy. le voyage de Regnard. *Paris, 1742, tom. I, pag. 217;* & l'hiſtoire générale des voyages, *tome VII, page 13.*

une fois autant de lait & de beurre, elles donnent auſſi des veaux beaucoup plus grands & plus forts, elles ont du lait en tout temps, & on peut les traire toute l'année, à l'exception de quatre ou cinq jours avant qu'elles mettent bas, mais il faut pour ces vaches des pâturages excellens; quoiqu'elles ne mangent guère plus que les vaches communes, comme elles ſont toûjours maigres, toute la ſurabondance de la nourriture ſe tourne en lait, au lieu que les vaches ordinaires deviennent graſſes & ceſſent de donner du lait dès qu'elles ont vécu pendant quelque temps dans des pâturages trop gras. Avec un taureau de cette race & des vaches communes, on fait une autre race qu'on appelle *bâtarde*, & qui eſt plus féconde & plus abondante en lait que la race commune; ces races bâtardes donnent ſouvent deux veaux à la fois, & fourniſſent auſſi du lait pendant toute l'année; ce ſont ces bonnes vaches à lait qui font une partie des richeſſes de la Hollande, d'où il ſort tous les ans pour des ſommes conſidérables de beurre & de fromage; ces vaches qui fourniſſent une ou deux fois autant de lait que les vaches de France, en donnent ſix fois autant que celles de Barbarie *.

En Irlande, en Angleterre, en Hollande, en Suiſſe & dans le Nord on ſale & on fume la chair du bœuf en grande quantité, ſoit pour l'uſage de la marine, ſoit pour l'avantage du commerce; il ſort auſſi de ces pays une grande quantité de cuirs: la peau du bœuf, &

* Voyez le voyage de M. Shaw, *tome I, page 311.*

même

même celle du veau ſervent, comme l'on ſait, à une infinité d'uſages; la graiſſe eſt auſſi une matière utile, on la mêle avec le ſuif du mouton; le fumier du bœuf eſt le meilleur engrais pour les terres sèches & légères; la corne de cet animal eſt le premier vaiſſeau dans lequel on ait bû, le premier inſtrument dans lequel on ait ſoufflé pour augmenter le ſon, la première matière tranſparente que l'on ait employée pour faire des vitres, des lanternes, & que l'on ait ramollie, travaillée, moulée pour faire des boîtes, des peignes, & mille autres ouvrages: mais finiſſons, car l'Hiſtoire Naturelle doit finir où commence l'hiſtoire des arts.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 520 sur 615

DESCRIPTION
DU TAUREAU.

Nous avons obſervé tant de rapports entre le cheval & l'âne, ils ſe reſſemblent à tant d'égards, que la pluſpart des différences qui ſe trouvent dans l'un relativement à l'autre, ſur-tout à l'intérieur, ne pouvoient être découvertes que par une comparaiſon ſuivie de toutes les parties de leur corps; ainſi, en décrivant le cheval, nous avions, pour ainſi dire, décrit l'âne en grande partie; il ne s'agiſſoit donc plus que de faire l'expoſition des reſſemblances, & de donner les preuves des différences que nous avons remarquées entre ces deux animaux. Mais autant la deſcription de l'âne a de relation avec celle du cheval, autant celle du taureau en eſt indépendante, car le taureau ne reſſemble au cheval que par ſa nature de quadrupède.

Tous les animaux de cette claſſe ont des caractères communs, ces caractères ſont tous conſtans, & la pluſpart ſi évidens, qu'on les aperçoit ſans peine, & qu'on les reconnoît ſans équivoque : s'il eſt donc facile de diſtinguer un quadrupède d'un oiſeau, d'un poiſſon, d'un inſecte; lorſqu'on aperçoit des quadrupèdes de pluſieurs eſpèces, il eſt auſſi fort aiſé de voir qu'ils ſe reſſemblent par des rapports généraux; mais il y a ſouvent beaucoup de difficulté à ſaiſir les différences particulières qui déterminent les eſpèces : ces différences influent plus ou moins ſur la conformation de l'animal; les nomenclateurs ont employé celles qui leur ont paru les plus conſidérables pour établir les caractères génériques de leurs méthodes, mais ils n'ont pas toûjours choiſi les plus eſſentielles. Ariſtote eſt,

de tous les Naturaliſtes, celui qui nous a donné le meilleur plan de diviſion pour les quadrupèdes, en les diſtinguant en ſolipèdes, pieds fourchus & fiſſipèdes, comme nous l'avons déjà fait obſerver; il paroît que cette différence, tirée du nombre des doigts, n'a lieu que dans les animaux qui ont encore d'autres différences plus intimes pour leur conformation & leur conſtitution, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur: voilà pourquoi le taureau, qui eſt un animal à pied fourchu, a pluſieurs caractères de conformation différens de ceux du cheval, qui eſt un animal ſolipède; tandis qu'il n'y a au contraire que de légères différences entre l'âne & le cheval, qui n'ont tous les deux qu'un ſeul doigt à chaque pied: mais le taureau eſt à peu près dans le même cas lorſqu'on le compare avec d'autres animaux qui ont deux doigts au lieu d'un; en les décrivant, nous chercherons ſucceſſivement les différences, même les plus légères, que nous pourrons trouver entre ces animaux, comme nous avons fait pour le cheval & l'âne.

A préſent il eſt queſtion d'expoſer la conformation principale de tous les quadrupèdes à pied fourchu, en décrivant le taureau qui ſe préſente le premier; cette deſcription ſervira en grande partie pour le bélier, le bouc, &c. comme la deſcription du cheval a ſervi pour celle de l'âne. Nous décrirons donc le taureau dans un auſſi grand détail que le cheval, tant pour les parties molles que pour le ſquelette; mais cet animal nous ſervira d'objet de comparaiſon, & la deſcription que nous en aurons faite ſuppléera à celle du taureau dans tous les cas où il y aura de la reſſemblance entre ces deux animaux.

Les dénominations des parties extérieures du cheval, dont nous avons donné l'explication dans la deſcription de cet animal, doivent être appliquées pour la pluſpart aux parties du

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 522 sur 615

taureau qui correſpondent à celles du cheval, & qui leur reſſemblent aſſez pour être ſuſceptibles de comparaiſon & porter les mêmes noms ; ainſi nous emploierons ceux qui ſont en uſage, ſans les expliquer de nouveau ; mais il eſt néceſſaire, pour l'intelligence de la deſcription du taureau, de faire ici mention de certaines parties que cet animal a de plus que le cheval, & de celles qui diffèrent aſſez des mêmes parties conſidérées dans le cheval, pour qu'on leur ait donné des noms différens, univerſellement reçûs ; & enfin de rappeler les noms propres de celles qui ne ſont pas déguiſées par des termes d'art, comme dans le cheval.

On appelle *muffle* la partie inférieure *(A, pl. XIV)* de la tête du taureau, qui eſt plus courte & plus large que la même partie de la tête du cheval ou de l'âne, qui a été déſignée dans la deſcription de ces deux animaux par le nom de *muſeau ;* on dit auſſi le muſeau d'un chien, d'un blaireau, &c. le muffle d'un lion, d'un ours.

Lorſqu'il eſt queſtion du taureau, le cou ne porte pas le nom d'encolure, le dos celui de reins, & les reins celui de rognons, comme dans le cheval ; le cou, le dos & les reins, c'eſt-à-dire, les lombes, ſont appelés de leurs vrais noms, comme il faudroit en Hiſtoire Naturelle que chaque choſe portât le ſien propre & unique, ſans aucun déguiſement de nomenclature.

On a donné le nom de *chignon* à la partie antérieure & ſupérieure *(B)* du cou du taureau.

Le fanon eſt la peau *(C)* qui pend ſous la mâchoire inférieure & le long du goſier, & qui deſcend au deſſous du poitrail entre les jambes de devant juſqu'aux genoux : cette ſignification du mot *fanon* appliquée au taureau eſt bien différente de celle qu'on lui donne par rapport au cheval, ſur lequel

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 523 sur 615

ce même mot désigne un *bouquet de poil* qui se trouve derrière le boulet.

La même partie qui porte le nom d'*ergot* dans le cheval doit le conserver dans le taureau, il faut seulement faire attention que cet animal a deux ergots *(D D)* au lieu d'un dans chaque jambe, comme nous le dirons dans la suite.

La couronne de poil *(E E)* qui est au bas du paturon du cheval se trouve aussi dans le même endroit du pied du taureau, ainsi cette dénomination ne doit pas être changée, quoique l'on ne puisse pas donner dans la description du squelette du taureau le nom d'*os coronaire*, ni d'*os du paturon*, aux os qui se trouvent sous la couronne & dans le paturon, comme nous l'expliquerons à l'article du squelette.

Le taureau a la troisième phalange de chaque doigt enveloppée d'une matière de corne *(F F)*, comme le cheval, ainsi il n'est pas douteux que cette corne ne doive porter le nom de *sabot* dans l'un comme dans l'autre de ces animaux; cependant on a donné le nom d'*ongles* aux sabots du taureau, ce nom est fort impropre, puisqu'il ne doit signifier que la corne qui se trouve sur la partie supérieure des doigts, & non pas celle qui l'enveloppe en entier. Les animaux fissipèdes ont des ongles ou des griffes; le chameau a aussi des ongles, puisque la corne ne couvre que la face supérieure de la troisième phalange de ses doigts; mais le taureau, le bélier, le bouc, &c. ont de vrais sabots, qui ne diffèrent de ceux des solipèdes que parce qu'il s'en trouve deux dans chaque pied.

Quoiqu'il y ait bien moins de variété dans les couleurs du taureau que dans celles du cheval, on emploie, pour les désigner, à peu près les mêmes termes d'art, toutes les fois qu'ils sont appliquables; ainsi nous ne rappelerons point les définitions de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 524 sur 615

ces termes, il ſuffira d'ajoûter, par rapport au taureau, que l'on dit communément qu'il eſt ſous tel poil, tandis que les Écuyers diſent qu'un cheval eſt de tel poil ; mais quoi qu'il en ſoit de cette différence d'expreſſion, nous ſubſtituerons ici, comme à l'article du cheval, le mot de *couleur* à celui de *poil*, par la raiſon que nous en avons rapportée dans la deſcription du cheval.

La couleur la plus ordinaire, & par conſéquent la plus naturelle au taureau, eſt le fauve; il y a lieu de croire que ſi nous avions des taureaux ſauvages, ils ſeroient de cette même couleur, mais dans nos taureaux domeſtiques elle ſe trouve ſouvent mêlée avec le noir & le blanc, & on en voit de noirs & de blancs.

Il y a donc des taureaux bais, il y en a de rouges ou roux, de bruns, de gris & de mouchetés, c'eſt-à-dire, pommelés, &c. on peut dire en général qu'ils ont toutes les teintes de fauve, & que cette couleur ſe trouve avec le blanc, le brun & le noir par taches variées, ſans aucune règle conſtante.

Le taureau a un épi au milieu du front, & j'ai obſervé ſur des bœufs que les poils qui couvrent la partie ſupérieure du cou, à l'endroit qui eſt à peu près également éloigné du garrot & de la tête, ſont hériſſés ſur une ligne tranſverſale, parce que les poils qui ſortent de la peau au côté poſtérieur de cette ligne s'étendent en avant, & que ceux qui ſe trouvent au côté poſtérieur ſont dirigés en arrière.

On a cru pouvoir juger des bonnes ou des mauvaiſes qualités des taureaux, des bœufs & des vaches comme de celles des chevaux, par les couleurs du poil ; on a fait des règles pour reconnoître ces indices, que l'on prétend être fondés ſur les humeurs pituiteuſes, flegmatiques, bilieuſes ou mélancoliques, que l'on croit dominer dans le tempérament de ces animaux,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 525 sur 615

& ſe manifeſter au dehors par les couleurs de leur poil ; mais en pareil cas, des obſervations ſuivies ſur les bonnes ou mauvaiſes qualités des animaux, ſeroient préférables à tous les raiſonnemens des humoriſtes, & je ne doute pas qu'on ne parvînt bien-tôt par ce moyen à prouver que les couleurs du poil n'indiquent rien de plus pour les qualités des taureaux, des bœufs & des vaches, que pour celles des chevaux ; on peut voir à ce ſujet ce qui a été rapporté dans la deſcription du cheval.

Il eſt plus probable que le poil épais, luiſant, uni & doux déſigne un bon tempérament, ou au moins la bonne ſanté de l'animal, parce qu'il y a lieu de croire que les ſucs qui ont formé ce poil & qui le nourriſſent, ſont de bonne qualité, & ſortent de viſcères ſains & bien organiſés ; en général le poil des taureaux eſt plus doux & plus ſouple que celui du cheval.

On a expoſé dans l'hiſtoire du bœuf les ſignes de conformation extérieure, par leſquels on peut reconnoître les taureaux les mieux proportionnés dans toutes leurs parties & les plus vigoureux, les bœufs les plus robuſtes & les plus propres au travail, & les vaches qui donnent le meilleur lait. Il ne reſte plus qu'à rapporter les dimenſions des différentes parties du corps du taureau ; je les ai priſes ſur celui que l'on garde dans l'enceinte où on donne en ſpectacle à Paris les combats de différens animaux ; il m'a paru ſi bien proportionné, que j'en ai fait le ſujet de la *planche XIV* ; on eſtime que ce taureau pèſe environ ſept cents livres, il eſt âgé de près de ſept ans ; ſa couleur dominante eſt le fauve, mais il y a de grandes taches brunes, principalement ſur le cou, ſur la tête & ſur les jambes, &c. & d'autres taches blanches ſur différentes parties du corps ; le poil eſt court, excepté entre les cornes, où le toupet *(G)*

a environ deux pouces de longueur, il eſt plus long ſur d'autres taureaux; la queue eſt revêtue, ſur l'étendue de neuf pouces, d'un poil long, qui deſcend juſqu'à un pied au deſſous du tronçon; il y a au bout du prépuce un bouquet de poil *(H)* qui a un pouce & demi de longueur; & celui de la couronne eſt, dans les quatre jambes, ſenſiblement plus long que le poil du reſte du corps.

Ce taureau a environ ſept pieds & demi de longueur meſurée en ligne droite depuis le bout du muffle juſqu'à l'anus; quatre pieds un pouce & demi de hauteur priſe à l'endroit des jambes de devant, & quatre pieds trois pouces à l'endroit des jambes de derrière; la longueur de la tête eſt d'un pied neuf pouces depuis le bout des lèvres juſque derrière les cornes.

Le bout du muffle a un pied neuf pouces de circonférence priſe derrière les naſeaux; le contour de l'ouverture de la bouche eſt d'un pied meſuré ſur les lèvres depuis l'une des commiſſures juſqu'à l'autre; la mâchoire inférieure a environ ſept pouces de largeur à l'endroit de ſes angles, c'eſt-à-dire, à l'endroit où le canal de la ganache eſt le plus large & le plus près du goſier; les naſeaux ſont beaucoup plus éloignés l'un de l'autre par le haut que par le bas, l'eſpace qui les ſépare eſt de deux pouces de largeur en bas, & de quatre pouces quatre lignes en haut; il y a onze pouces de diſtance entre l'angle antérieur de l'œil & le bout des lèvres, & quatre pouces entre l'angle poſtérieur & l'oreille; la longueur de l'œil depuis l'un de ſes angles juſqu'à l'autre eſt d'un pouce neuf lignes, & l'ouverture d'environ quinze lignes, c'eſt-à-dire que les deux paupières s'écartent l'une de l'autre juſqu'à cette diſtance; lorſque l'œil eſt ouvert, il y a auprès de l'angle antérieur un ſillon d'un pouce & demi de longueur, qui s'étend obliquement en avant & en bas au deſſus

deſſus d'un enfoncement aſſez profond; il y en a un autre fort large ſur le front, qui a dix lignes de profondeur dans le milieu; les angles antérieurs des yeux ſont éloignés l'un de l'autre de onze pouces en ſuivant la courbure du chanfrein, & ſeulement de huit pouces en ſuppoſant cette diſtance en ligne droite; la tête a trois pieds & demi de circonférence priſe devant les oreilles & les cornes en paſſant en deſſous près du goſier; la longueur des oreilles eſt de huit pouces, meſurée par-derrière, & leur baſe a auſſi huit pouces de circonférence extérieure; chacune des oreilles eſt placée au deſſous de la corne, s'étend à côté dans une direction horizontale, & eſt éloignée de la corne de la diſtance d'un pouce; il y a huit pouces entre les baſes des deux cornes, la longueur de chacune eſt d'environ onze pouces en ſuivant leur courbure, elles ont neuf pouces de circonférence dans le bas, & leurs extrémités ſont éloignées de dix-huit pouces; la tête s'élève d'un pouce & demi au deſſus du cou à l'endroit du chignon.

Le cou a deux pieds de longueur depuis la tête juſqu'aux épaules, trois pieds & demi de circonférence près de la tête, un pied & demi de hauteur dans le même endroit, ſix pieds un pouce de circonférence près des épaules, & deux pieds & demi de hauteur y compris le fanon, qui deſcend de quatre pouces ſous le ſternum, & qui s'étend juſqu'au genou.

Le corps a ſix pieds trois pouces de circonférence priſe derrière les jambes de devant, ſix pieds huit pouces dans le milieu à l'endroit le plus gros, & ſix pieds devant les jambes de derrière en paſſant devant le ſcrotum & ſur les hanches; le bas du ventre eſt à la hauteur d'un pied huit pouces au deſſus de terre; le dos eſt concave ſur ſa longueur, & l'endroit le plus profond eſt éloigné de deux pouces de la ligne droite

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 528 sur 615

qui auroit paſſé ſur le garrot & ſur la croupe; le tronçon de la queue a trois pieds cinq pouces de longueur, & huit pouces & demi de circonférence à ſon origine.

La longueur du bras eſt d'un pied trois pouces & demi depuis le coude juſqu'au genou, il a un pied quatre pouces de circonférence à l'endroit le plus gros, & celle du genou eſt d'un pied un pouce; le canon a ſept pouces de longueur & ſept pouces de circonférence à l'endroit le plus mince, celle du boulet eſt de dix pouces & demi, le paturon a deux pouces de longueur & neuf pouces & demi de circonférence, celle de la couronne eſt d'un pied; il y a auſſi un pied de hauteur depuis le bas du pied juſqu'au bas du genou; la diſtance du coude au garrot eſt d'un pied neuf pouces & demi, & celle du coude juſqu'au bas du pied, de deux pieds quatre pouces; le fanon occupe l'eſpace qui eſt entre les deux bras.

La cuiſſe a un pied quatre pouces & demi de longueur depuis la rotule juſqu'au jarret, & deux pieds quatre pouces de circonférence meſurée près du ventre; la largeur de la cuiſſe, priſe de devant en arrière près du jarret, eſt d'un demi-pied, & la circonférence d'un pied & demi; le canon a un pied deux pouces de longueur depuis le jarret juſqu'au boulet, & ſept pouces & demi de circonférence à l'endroit le plus mince: les dimenſions du boulet, du canon & de tout le reſte des jambes de derrière, ſont à peu près les mêmes que dans les jambes de devant.

Les ergots ont environ un pouce & demi de longueur, celle du ſabot eſt de ſept pouces depuis la pince juſqu'aux talons; les deux ſabots pris enſemble ont cinq pouces de largeur d'un côté à l'autre, mais ils ſont écartés d'un pouce l'un de l'autre: ils ont quatre pouces & demi de hauteur en devant: la circonférence

des deux ſabots réunis eſt la même que celle de la couronne.

Le taureau n'a preſque aucune expreſſion dans la phyſionomie, lorſqu'on le regarde en face il ne préſente qu'un front vaſte & concave, & un muffle large & épais, les yeux ſont couverts par de groſſes éminences; cet animal n'a aucun trait décidé dans la phyſionomie, & par conſéquent on n'y diſtingue aucune fineſſe d'inſtinct, on n'aperçoit qu'une maſſe preſque informe, qui ne peut annoncer que la ſtupidité. Les oreilles appeſantiſſent encore la tête du taureau par leur poſition baſſe & leur direction horizontale, mais le front eſt relevé par deux cornes, dont les courbures ſont ſymmétriques & régulières: chaque corne, au ſortir de la tête, s'étend à côté, ſe recourbe en haut & en dedans, & enfin ſe prolonge encore en haut & un peu en arrière à ſon extrémité, qui eſt terminée en pointe; l'intervalle qui ſe trouve entre les deux cornes eſt proportionné à la largeur du front, & quoiqu'elles ſemblent être courtes par rapport à la longueur de la tête, elles n'en paroiſſent que plus fermes & plus aſſurées; le bout du muffle eſt auſſi un peu animé par les traits des naſeaux & de la bouche. Lorſque la tête eſt vûe de profil, on ne la trouve pas ſi lourde qu'en face, les yeux qui ſont grands & apparens en ornent le milieu & font diſparoître en partie le grand eſpace qui eſt entre les cornes & le bout du muffle; mais lorſque les yeux s'animent, & ſur-tout lorſque la tête ſe meut, tous les traits ſemblent ſe rapprocher par des mouvemens qui ne laiſſent voir qu'en raccourci les parties les plus brutes de la face: c'eſt ainſi que l'expreſſion de la férocité ſuccède dans le taureau à celle de la ſtupidité; mais, quelque attitude qu'il prenne, ſon port eſt toûjours groſſier & peſant. Voyez cet animal en repos, il paroît appeſanti par le grand volume de la partie antérieure du corps, il porte la tête

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 530 sur 615

baſſe, & ſon cou eſt ſi gros, qu'on le diſtingue à peine des épaules ; le fanon deſcend juſqu'au genou comme une entrave, & ne laiſſe voir diſtinctement que la partie inférieure des jambes de devant, qui paroiſſent ſurchargées par le poids qu'elles ſupportent ; la partie poſtérieure du corps, quoique moins groſſe que l'antérieure, n'en eſt pas plus élégante ; les hanches ſont trop plates, trop larges, & terminées de tous côtés par des éminences trop groſſes, de ſorte qu'il n'y a aucun arrondiſſement dans la croupe, & pour peu que l'animal ſoit amaigri, il ſemble que les os vont ſe faire jour à travers la peau, & s'il marche, l'on croit voir ſon ſquelette en mouvement.

Cependant un taureau, tel que celui qui eſt repréſenté *pl. XIV*, doit paſſer pour un bel animal ; ce n'eſt que par comparaiſon avec d'autres animaux, & peut-être avec notre propre corps, que nous y trouvons des défauts ; mais ces prétendus défauts doivent diſparoître aux yeux du Naturaliſte. Il compare le corps maſſif du taureau à celui de l'éléphant & du rhinocéros, que la Nature refuſe à nos climats ; il admire dans ces grandes maſſes vivantes, la toute-puiſſance du Créateur qui les fait mouvoir, & en les obſervant à l'intérieur, il reconnoît l'Intelligence ſuprême qui a ſu former des organes différens dans diverſes eſpèces d'animaux : nous allons expoſer un bel exemple de cette variété, dans la deſcription des parties intérieures du bœuf, dont les organes de la digeſtion diffèrent beaucoup de ceux qui ſervent à cette même fonction dans le cheval & dans l'âne, qui ont déjà été décrits.

Le bœuf qui a ſervi pour la deſcription des parties intérieures du corps, à l'exception de celles de la génération, avoit ſix pieds neuf pouces de longueur meſurée en ligne droite, depuis le bout du muffle juſqu'à l'origine de la queue ; la longueur de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 531 sur 615

la tête, depuis le bout des lèvres jusque derrière les cornes, étoit d'un pied sept pouces, & la circonférence, prise au dessus des yeux & devant les cornes, de trois pieds deux pouces; le cou avoit un pied & demi depuis l'omoplate jusqu'à l'oreille; la hauteur de ce bœuf étoit de trois pieds dix pouces depuis terre jusqu'au garrot, & de trois pieds onze pouces depuis le bas du pied jusqu'au dessus de la hanche; le corps avoit cinq pieds deux pouces de circonférence derrière les jambes de devant, sept pieds au milieu du corps à l'endroit le plus gros, & six pieds un pouce devant les os des cuisses & des hanches : il pesoit environ six cens livres, selon l'estime du boucher.

A l'ouverture de l'abdomen, on a vû que l'épiploon s'étendoit sur tous les intestins jusqu'à la vessie.

Le taureau diffère beaucoup du cheval & de l'âne, par les parties auxquelles on a donné le nom d'*estomac :* on en distingue quatre dans le taureau; ils sont représentés *pl. XV & XVII, fig. 1,* après avoir été débarrassés de leurs adhérences, & étendus autant qu'il a été possible, sans les séparer les uns des autres; ils sont vûs par-dessous *pl. XV, fig. 1,* & par-dessus *pl. XVII, fig. 1;* le premier estomac *(A, pl. XV & XVII, fig. 1),* c'est-à-dire, celui auquel l'œsophage *(B)* aboutit, est le plus grand de tous, on l'appelle la *panse*, l'*erbier* ou la *double;* on a donné au second *(C)* le nom de *réseau* ou *bonnet :* ce n'est, à dire vrai, qu'une continuation du premier, il est situé au côté droit de sa partie antérieure; le troisième *(D)* est bien distingué des deux premiers, & n'y communique que par un orifice assez étroit; ce troisième estomac est nommé le *feuillet*, le *millet*, *mellier* ou *pseautier*, il est plus grand que le bonnet & plus petit que la caillette *(E)*, qui est le quatrième estomac, auquel on a aussi donné le nom de *franche-mulle.*

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 532 sur 615

La panſe occupoit la plus grande partie de l'abdomen, principalement du côté gauche; le bonnet étoit entre la panſe & le centre nerveux du diaphragme, en partie ſous la portion antérieure de la panſe, & en partie ſur la portion antérieure du feuillet qui ſe trouvoit placé au côté droit de la panſe derrière le foie, en partie ſur la portion droite du bonnet, & en partie ſur la portion antérieure de la caillette; celle-ci étoit ſituée au côté droit de la panſe, & s'étendoit en avant ſous le feuillet par ſa partie antérieure.

Le duodenum s'étendoit en arrière juſque dans le flanc droit; le jejunum & l'ileum faiſoient leurs circonvolutions derrière & au côté droit de la panſe ſous le cæcum, qui s'étendoit tranſverſalement de droite à gauche dans les régions iliaques & hypogaſtrique; le colon occupoit le côté droit & formoit pluſieurs circonvolutions preſque ovales, qui étoient pelotonnées enſemble, enſuite après avoir fait quelques contours aſſez longs, il aboutiſſoit au cæcum.

La panſe du bœuf que nous décrivons ayant été enflée, a préſenté une forme très-irrégulière, elle étoit aplatie en deſſus & en deſſous, & arrondie dans ſa circonférence, excepté à la partie poſtérieure, où il y avoit deux convexités, l'une *(F, pl. XV, fig. 1)* à droite, & l'autre *(G)* à gauche; elles étoient ſéparées par une ſciſſure profonde de ſix pouces, qui ſe prolongeoit à droite & à gauche ſur la baſe de chaque convexité; celle du côté droit étoit la plus groſſe, elle avoit trois pieds neuf pouces de circonférence à la baſe, & l'autre ſeulement deux pieds onze pouces; la circonférence du corps de la panſe étoit de ſix pieds dix pouces, il avoit deux pieds & demi de largeur, un pied & demi de hauteur, & deux pieds & demi de longueur de devant en arrière, depuis le bonnet *(C)* juſqu'au

bout de la convexité *(G)* du côté gauche; la circonférence longitudinale, qui paſſoit en devant auprès de l'inſertion de l'œſophage *(B)*, & en arrière ſur le ſommet de la groſſe convexité *(F)*, étoit de ſept pieds deux pouces; une autre circonférence, parallèle à celle-ci, qui étoit priſe à neuf pouces de diſtance du côté gauche, & qui paſſoit par conſéquent en devant à neuf pouces de diſtance de l'œſophage, & en arrière ſur le milieu de la convexité *(G)* du côté gauche, étoit de ſix pieds un pouce : on diſtinguoit dans la panſe une eſpèce de cou *(H)*, il étoit formé par la partie antérieure du côté droit, qui étoit ſéparé du reſte de la panſe par une ſciſſure *(I)*, dont les côtés étoient rapprochés & maintenus les uns contre les autres par un tiſſu cellulaire; ce tiſſu ayant été déchiré on a reconnu que la ſciſſure avoit dix pouces de profondeur, & qu'elle s'étendoit obliquement de droite à gauche & de devant en arrière; la circonférence du cou de la panſe étoit de trois pieds huit pouces; le bonnet *(C)* avoit un pied & demi de longueur en ligne droite, & deux pieds ſept pouces de circonférence à l'endroit le plus gros; la plus grande circonférence du feuillet *(D)* étoit de trois pieds cinq pouces, & la petite de deux pieds onze pouces; la caillette *(E)* avoit la forme d'une poire, la circonférence longitudinale du corps de la poire étoit de trois pieds neuf pouces, & la circonférence tranſverſale de deux pieds & demi à l'endroit le plus gros; le cou avoit dix pouces de longueur, ſa circonférence auprès du corps de la caillette étoit de neuf pouces & demi; plus loin le cou ſe dilatoit & formoit une poche *(K)* qui avoit un pied deux pouces de circonférence; enfin celle du pylore *(L)* n'étoit que de cinq pouces, & celle de l'œſophage *(B)* de quatre pouces & demi auprès de la panſe.

La panſe ayant été ouverte dans le contour de ſa grande circonférence; on l'a ſéparée en deux pièces, dont l'une *(pl. XVI, figure 1)* repréſente les parois inférieures de la panſe vûe au dedans; & l'autre *(figure 2)* les parois ſupérieures vûes auſſi au dedans : on reconnoît dans ces deux figures l'œſophage *(A, figures 1 & 2)*, la groſſe convexité *(B)* & la petite *(C)*, on y diſtingue aiſément les rebords *(D E F)* qui ſont épais & d'une conſiſtance un peu plus ferme que celles du reſte de la panſe; ils ſont revêtus d'une membrane nue & d'une couleur de blanc ſale & jaunâtre, de même que les endroits *(G H, figure 2)* des parois ſupérieures de la panſe, tandis que les autres endroits *(voyez planche XVI, figures 1 & 2, & la partie A A de la figure 2, planche XVII)*, & principalement ſur les parois ſupérieures, ſont garnis d'un très-grand nombre de papilles oblongues & fort minces, dont les plus alongées ont juſqu'à cinq pouces de longueur, & environ une ligne de largeur; ces papilles ſont poſées fort près les unes des autres, de façon qu'elles cachent entièrement la membrane à laquelle elles tiennent; elles ſont revêtues, de même que cette membrane, par une ſorte de velouté fort mince & fort tendre qui les enveloppe & qui leur ſert de gaine; cette membrane veloutée eſt brune, elle s'enlève aiſément, & lorſqu'on la ſépare de la membrane qui eſt deſſous, on voit les papilles qui tiennent à cette ſeconde membrane ſortir de la membrane veloutée comme d'autant de gaines; ces papilles ſont fort étroites & fort ſouples en ſortant de leurs gaines.

Le bonnet *(C, pl. XV & XVII, fig. 1)* n'eſt diſtingué de la panſe *(A)*, comme nous l'avons déjà dit, que par un rétréciſſement, qui avoit un pied huit pouces de circonférence, & qui eſt ſi peu marqué, qu'on ne ſe ſeroit ſans doute pas aviſé de diſtinguer le

le bonnet de la panſe pour en faire un eſtomac ſéparé, & qu'on ne l'auroit au contraire regardé que comme un prolongement de la panſe, ſi ſes parois intérieures (*I, pl. XVI, fig. 1 & 2; & B, pl. XVII, fig. 2*) n'étoient conformées bien différemment de celle de la panſe; au lieu de papilles on voit ſur les parois intérieures du bonnet, une ſorte de réſeau formé par des cloiſons minces, qui ont juſqu'à quatre lignes de hauteur (*fig. 3*, où l'on a repréſenté une portion des parois intérieures du bonnet plus en grand que dans la *fig. 2*); ces cloiſons ſe croiſent de façon qu'elles forment différentes figures, qui ont quatre, cinq ou ſix faces; il y a, dans les plus grandes de ces figures, juſqu'à un pouce de diſtance entre les deux côtés oppoſés; la pluſpart ſont encore partagées par des cloiſons moins élevées & dirigées en différens ſens.

L'aire de ces figures eſt parſemée de petites papilles, les cloiſons ſont cannelées de haut en bas & hériſſées de papilles, & le bord de la cloiſon eſt dentelé; l'aire de toutes ces figures, les papilles, les cloiſons & les dentelures ſont revêtues, comme les papilles de la panſe, par une membrane brune qui eſt fort mince, & qui s'enlève aiſément. Toute bizarre que paroiſſe cette conformation intérieure du bonnet, ce n'eſt cependant pas ce qu'il y a de plus intéreſſant dans cet eſtomac, la gouttière (*CD, pl. XVII, fig. 2*) qui ſe trouve à ſa partie ſupérieure, & qui s'étend, depuis l'œſophage (*C*) juſqu'à l'orifice (*D*) du troiſième eſtomac, mérite beaucoup plus d'attention; cette gouttière a huit pouces de longueur; ſes bords latéraux ſont formés par une ſorte de bourrelet revêtu de papilles, le demi-canal de la gouttière a trois pouces de largeur, lorſqu'il eſt étendu tranſverſalement, au point de n'avoir plus aucune concavité; il y a quelques petites ſtries qui s'étendent longitudinalement ſur ſes

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 536 sur 615

parois intérieures, qui ſont bordées de papilles; on en voit de groſſes du côté du feuillet, elles ſont blanches, coniques & pointues, & elles ont deux lignes de hauteur & environ une ligne de diamètre à la baſe : on regarde ce demi-canal comme une continuation de l'œſophage, & on croit qu'il peut ſe fermer en ſe contractant, & qu'alors ſes bords étant rapprochés l'un de l'autre dans toute leur longueur, ils forment un canal entier & continu depuis l'œſophage juſqu'au troiſième eſtomac; l'orifice qui communique du ſecond au troiſième & qui termine le demi-canal, a environ deux pouces de diamètre.

L'organiſation du troiſième eſtomac paroît encore plus extraordinaire que celle du ſecond; la partie qui s'étend en ligne droite depuis l'orifice *(A, pl. XVIII,* où l'on a repréſenté le feuillet & la caillette ouverts & vûs dans l'intérieur) qui communique dans le bonnet juſqu'à l'endroit du rétréciſſement *(B B)* qui eſt entre le feuillet & la caillette, n'a pas plus de cinq pouces de longueur.

On y voit intérieurement deux plis *(C)* en forme de ſtries, qui s'étendent d'un bout à l'autre, & ſur leſquels il y a des papilles coniques & pointues, comme celles dont nous avons déjà parlé : ces plis ſont à un pouce de diſtance l'un de l'autre; à côté de chacun on diſtingue de part & d'autre l'origine d'autres plis qui ſont auſſi hériſſés de papilles pointues; ils s'élèvent, & deviennent plus larges à meſure qu'ils ſe prolongent ſur la paroi du troiſième eſtomac; leur plus grande largeur ſe trouve dans le milieu de cet eſtomac, & diminue peu à peu, à meſure qu'ils approchent du quatrième : on a comparé avec raiſon ces plis aux feuillets d'un livre, car c'eſt autant de lames placées à quelque diſtance les unes des autres; elles ſont faites en forme de croiſſant, dont le bord convexe tient aux parois

de l'eſtomac; ces feuillets ſont de différente largeur, il y en a de très-larges, de moyens & de petits; les plus larges *(D)* ont neuf à dix pouces de largeur, celle des moyens *(E)* n'eſt que de quatre à cinq pouces, & enfin la largeur des petits *(F)* eſt ſeulement d'un pouce; de ſorte que ſi l'on ſuppoſe que les deux parties *(GH)* du troiſième eſtomac fuſſent appliquées l'une contre l'autre, comme dans l'état naturel, le petit feuillet *(F)* ſe trouveroit entre les deux feuillets moyens *(EE)*, & ces trois feuillets, c'eſt-à-dire, le petit *(F)* & les deux moyens *(EE)* ſeroient entre les deux grands feuillets *(DD)*, & ainſi de ſuite pour l'arrangement de tous les autres. On ne peut voir dans le reſte de la figure, que la partie intérieure des grands feuillets *(IIII)*, les autres ſont cenſés être poſés en deſſous : nous en avons compté vingt-quatre grands, & entre deux grands il y en a un moyen & deux petits, un de chaque côté du moyen, ce qui fait en tout vingt-quatre moyens & quarante-huit petits, de ſorte que le nombre total eſt de quatre-vingt-ſeize : ce nombre de feuillets s'eſt trouvé le même dans deux individus ſur leſquels je les ai comptés; ils ſont parſemés ſur toute leur face de papilles coniques & pointues de différentes groſſeurs, & revêtus d'une membrane veloutée fort mince & un peu adhérente.

On voit auſſi au dedans du corps de la caillette, des replis *(KKK)* de différente grandeur, qui s'étendent longitudinalement & qui forment des ſinuoſités; les plus grands de ces plis ont juſqu'à trois pouces de largeur, ils ſont de conſiſtance fort molle, & placés beaucoup plus loin les uns des autres que les feuillets du troiſième eſtomac : il n'y a dans la poche *(L)* que forme le cou de la caillette, que des rides diſpoſées en différens ſens; cet eſtomac eſt revêtu en entier par une

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 538 sur 615

membrane molle & veloutée, dont il ſort une liqueur épaiſſe.

J'ai trouvé au mois d'avril dans la panſe & dans le bonnet de tous les bœufs dont j'ai fait ouvrir les eſtomacs, des vers *(fig. 3, pl. XVI)* dont la figure ne différoit pas beaucoup de celle des vers coniques qui ſont dans l'eſtomac du cheval & de l'âne; ceux que j'ai vûs dans la panſe du bœuf avoient une des extrémités du corps fort petite en comparaiſon de l'autre, ils étoient courbés & de couleur rougeâtre; les plus grands avoient quatre à cinq lignes de longueur, deux lignes de diamètre au gros bout, & une ligne au petit; on voyoit un orifice à chaque extrémité de ces vers, celui du gros bout étoit le plus large, & communiquoit dans une cavité où l'on diſtinguoit quelques organes qui ne doivent point être décrits ici, il ſuffit de dire que ces vers étoient liſſes & unis; ils ſe tenoient cantonnés entre les papilles de la panſe & dans les cellules du bonnet, j'en ai compté juſqu'à près de cent dans un ſeul bœuf, la pluſpart étoient dans la partie de la panſe qui eſt la plus prochaine du bonnet.

Les inteſtins grêles avoient cent quatorze pieds de longueur depuis le pylore juſqu'au cæcum; la circonférence du duodenum du côté du pylore étoit de ſept pouces, celle du jejunum d'environ quatre pouces & demi, de même que celle de l'ileum qui alloit cependant juſqu'à cinq pouces dans quelques endroits.

Le cæcum avoit deux pieds & demi de longueur, & un pied deux ou trois pouces de circonférence, ſon extrémité étoit arrondie; le colon étoit auſſi gros que le cæcum à l'endroit où il touche cet inteſtin, mais ſa groſſeur diminuoit peu à peu juſqu'à la diſtance de quatre pieds, où il n'avoit plus que quatre pouces de circonférence; il devenoit plus gros à deux pieds plus loin, & ſa circonférence étoit de ſix pouces; ſa groſſeur

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 539 sur 615

varioit auſſi dans toute ſon étendue, & alloit juſqu'à ſept pouces & demi du côté du rectum; ce dernier inteſtin avoit juſqu'à ſeize pouces de circonférence lorſqu'il étoit bien enflé; la longueur du colon & celle du rectum priſes enſemble étoient de trente-quatre pieds, auxquels il faut ajoûter celle des inteſtins grêles, qui étoit de cent quatorze pieds, pour avoir la longueur du canal inteſtinal en entier, qui étoit de cent quarante-huit pieds, non compris le cæcum.

Le foie eſt placé du côté droit, il eſt diſtingué en trois lobes, deux grands & un petit; les deux grands ſont l'un à côté de l'autre, le petit eſt ſitué ſous la partie poſtérieure du grand lobe droit, touche au bord antérieur du rein, & en porte l'impreſſion de même que le grand lobe droit. Il y a entre les deux grands lobes, au deſſus de la face poſtérieure du foie, une éminence que l'on pourroit prendre pour un quatrième lobe: le foie avoit un pied & demi de largeur de droite à gauche, & dix pouces de hauteur; la plus grande épaiſſeur étoit de deux pouces & demi, & le poids de huit livres; la couleur de ce viſcère eſt noirâtre; la véſicule du fiel s'étendoit de cinq pouces au-delà des bords du foie, & elle formoit une poche qui avoit environ ſept pouces de longueur, quatre pouces de largeur, & un pouce neuf lignes d'épaiſſeur; la liqueur du fiel étoit limpide & de couleur orangée très-foncée, il y en avoit de la peſanteur de près d'une livre trois onces.

J'ai vû dans le foie du bœuf des vers parfaitement reſſemblans à ceux que j'ai trouvés dans le foie de l'âne, & dont il a été fait mention dans la deſcription de cet animal; mais les foies de bœuf ne paroiſſoient pas auſſi ſains que celui de l'âneſſe où il y avoit des vers, ils renfermoient des matières oſſeuſes, &c.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 540 sur 615

La rate eſt ſituée ſur la partie gauche de la panſe, & s'étend obliquement de derrière en devant & de haut en bas; elle avoit un pied huit pouces de longueur, cinq pouces de largeur & un pouce d'épaiſſeur dans le milieu; ſes deux extrémités étoient arrondies & preſque ſemblables; elle peſoit deux livres & une once, elle étoit d'une couleur griſe au dehors & d'un rouge noirâtre au dedans.

Le pancréas avoit la figure d'un loſange dont les angles latéraux ſe prolongeoient & formoient de chaque côté une branche aſſez longue, celle qui étoit à droite aboutiſſoit au duodenum; le pancréas n'avoit que neuf lignes dans ſa plus grande épaiſſeur.

Les reins étoient compoſés de pluſieurs tubercules, & paroiſſoient diviſés en pluſieurs parties; le rein droit étoit plus avancé que le gauche; il avoit environ ſix pouces de longueur, trois pouces de largeur & deux pouces huit lignes d'épaiſſeur à ſa partie poſtérieure; le rein gauche n'étoit pas ſi large à ſa partie antérieure, mais au reſte il reſſembloit au rein droit. *Voyez les reins du veau, pl. XXII, fig. 1 & 2.*

Le centre nerveux du diaphragme avoit un pied ſept pouces de largeur dans le milieu, cinq pouces depuis la veine cave juſqu'à ſon bord vis-à-vis le ſternum, & ſa plus grande longueur de haut en bas & de devant en arrière étoit d'un pied & demi; la partie charnue avoit cinq pouces de largeur du côté gauche, ſept pouces du côté droit, & cinq pouces entre la pointe du centre nerveux & le ſternum.

Le poumon droit étoit diſtingué en quatre lobes, dont trois étoient rangés de file; celui du milieu ſe trouvoit le moins grand, & l'antérieur étoit échancré profondément & preſque diviſé en deux parties; le quatrième lobe étoit le plus petit de

tous, il tenoit au lobe poſtérieur: il n'y avoit dans le poumon gauche que deux lobes, dont l'antérieur étoit preſque ſéparé en deux parties par une échancrure profonde comme celle du lobe antérieur du côté droit.

Le cœur étoit ſitué dans le milieu de la poitrine, à peu près comme celui du cheval, la baſe en haut & la pointe en bas, & un peu en arrière; la baſe avoit un pied ſept pouces de circonférence, la hauteur étoit de ſept pouces depuis la pointe juſqu'à la naiſſance de l'artère pulmonaire, & de cinq pouces & demi depuis la pointe juſqu'au ſac pulmonaire; l'aorte avoit un pouce & demi de circonférence priſe de dehors en dehors au ſortir du cœur, & elle ſe partageoit en deux branches. Il ne ſera fait mention de l'os du cœur de bœuf que dans la deſcription du ſquelette du taureau.

La langue avoit environ un pied trois pouces de longueur, & cinq pouces & demi depuis le filet juſqu'à l'extrémité qui eſt arrondie, aſſez épaiſſe, & large d'environ deux pouces à quelque diſtance du bout; la largeur étoit de deux pouces & demi à l'endroit qui eſt entre les premières dents molaires; il y avoit ſur la ſurface ſupérieure de la partie antérieure de la langue, des filets pointus fort durs & dirigés en arrière; ces filets faiſoient l'effet d'une rape lorſqu'on y paſſoit la main à rebours; la partie moyenne étoit couverte de filets plus aplatis, plus couchés en arrière & moins fermes; on voyoit ſur les parties antérieures & moyennes, quelques petits tubercules ronds, parſemés à quelque diſtance les uns des autres; il y avoit ſur la partie poſtérieure, des papilles coniques plus ou moins larges à la baſe, & plus ou moins pointues par le bout; ſur les côtés & ſur les bords à quelque diſtance de l'extrémité poſtérieure il ſe trouvoit pluſieurs glandes larges, plates & environnées d'un calice.

L'épiglotte ne ſe termine pas en pointe comme celle du cheval, mais elle eſt recourbée & recoquillée en arrière; les bords de l'entrée du larinx, formé par les cartilages ariténoïdes, avoient chacun treize lignes de longueur & quatre lignes de largeur; ils étoient éloignés d'environ ſept lignes à leur extrémité inférieure.

Le cerveau avoit quatre pouces & demi de longueur, quatre pouces de largeur & un pouce neuf lignes d'épaiſſeur; la longueur du cervelet étoit de deux pouces deux lignes, ſa plus grande largeur de deux pouces quatre lignes, & ſa plus grande épaiſſeur de quatorze lignes: le cerveau peſoit treize onces ſix gros, & le cervelet une once quatre gros & demi.

Il y avoit dans le taureau vivant que nous avons décrit, environ deux pieds de diſtance entre l'anus & le ſcrotum *(I, pl. XIV)* qui s'étendoit au deſſous du ventre de la longueur d'un demi-pied; l'intervalle qui ſe trouvoit entre le ſcrotum & l'orifice du prépuce *(H)* étoit d'un pied deux pouces.

Cet animal avoit quatre mamelons bien apparens & ſitués au devant du ſcrotum, deux *(L)* de chaque côté de la verge & à un pouce de diſtance l'un de l'autre: cette poſition des mamelons du taureau correſpond à celle des mamelles de la vache, & eſt à peu près la même que celle des mamelons de l'âne; car ſi le prépuce n'étoit pas plus éloigné du ſcrotum dans le taureau que dans l'âne, les mamelons du taureau ſeroient ſur ſon prépuce comme les mamelons de l'âne ſont ſur le ſien; ou ſi la verge de l'âne n'étoit pas plus groſſe que celle du taureau, les mamelons de l'âne ſeroient placés à côté de la verge comme ceux du taureau; la preuve en eſt évidente dans les ânons, qui n'ayant pas la verge auſſi groſſe qu'elle doit l'être dans la ſuite, ont les mamelons placés à côté de la verge, &

& non pas ſur le prépuce comme les ânes; de même le prépuce des chevaux étant plus ample, & à proportion plus court que celui des ânes, leurs mamelles, lorſqu'elles ſont apparentes, ſe trouvent placées plus en deſſous & plus près du bord du prépuce que dans les ânes.

Le taureau qui a ſervi de ſujet pour les parties intérieures de la génération, avoit quatre pieds deux pouces de hauteur depuis terre juſqu'au garrot; la circonférence du corps, priſe derrière les jambes de devant, étoit de cinq pieds ſix pouces; il peſoit environ cinq cens livres, il avoit cinq ans & demi; les parties de la génération ayant été enlevées en entier, on pouvoit tirer le prépuce en arrière ſur la verge, de la longueur de neuf pouces, de ſorte que dans cet état l'extrémité du prépuce étoit à environ un pied de diſtance de l'extrémité du gland, qui avoit trois pouces trois lignes de longueur; le prépuce *(A, pl. XIX & XX, fig. 1)* étant retiré en avant, s'étendoit au-delà du gland de la longueur de dix à onze pouces; l'extrémité *(B)* du gland n'avoit qu'environ quatre lignes de diamètre, elle étoit recourbée en deſſous & aboutiſſoit à l'orifice de l'urètre, dont le diamètre, pris de dehors en dehors, n'étoit guère que d'une ligne; le gland avoit une figure conique, & étoit un peu aplati ſur ſa longueur en deſſus & en deſſous; ſa baſe *(C, pl. XX, fig. 1)*, c'eſt-à-dire, la partie qui tenoit au corps de la verge, avoit quatorze lignes de grand diamètre & un pouce de petit.

La verge *(D)* avoit deux pieds quatre pouces de longueur depuis la bifurcation du corps caverneux juſqu'à l'inſertion du prépuce, elle étoit aplatie ſur ſa longueur comme le gland, & elle avoit la même largeur & la même épaiſſeur que la baſe *(C)* du gland.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 544 sur 615

Les teſticules étoient ovoïdes, ils avoient quatre pouces & demi de longueur, deux pouces quatre lignes de largeur, & un pouce dix lignes d'épaiſſeur; la ſubſtance intérieure étoit de couleur jaunâtre, il y avoit au dedans une eſpèce de noyau longitudinal de couleur blanche, qui avoit environ deux lignes de largeur & trois pouces de longueur, autant qu'on en a pû juger après avoir ouvert le teſticule, comme on peut le voir ſur la *planche XX, figure 2*, où le teſticule droit eſt repréſenté après avoir été coupé par le milieu ſelon ſa longueur, & *planche XXII, fig. 3*, où l'on voit un teſticule de taureau expoſé dans le même état & plus en grand; dans l'une & dans l'autre de ces figures, le noyau longitudinal du teſticule eſt marqué par la lettre *(A)*; l'épididyme *(E, pl. XX, fig. 1)* deſcend de deux pouces ſur le bord inférieur du teſticule, il remonte ſur le bout antérieur d'où il eſt parti; chaque portion de l'épididyme qui forme ce pli a ſept lignes de largeur & trois lignes d'épaiſſeur; la portion qui ſe prolonge ſur le bord ſupérieur *(F)* du teſticule n'a que deux à trois lignes de largeur; l'extrémité poſtérieure de l'épididyme déborde de neuf lignes au-delà du bout du teſticule, & forme un tubercule *(G)* qui a environ neuf lignes de diamètre.

Les canaux déférens *(HH)* avoient environ deux lignes de diamètre, excepté ſur la longueur de quatre pouces & demi auprès des véſicules ſéminales, leur diamètre étoit d'environ cinq lignes dans cet endroit *(II)*; cependant la cavité intérieure avoit, comme dans le cheval, à peu près le même diamètre dans toute leur étendue, qui étoit de deux pieds quatre ou cinq pouces.

Il y a deux cordons *(L M, pl. XIX, & pl. XX, fig. 1)* qui tiennent par une de leurs extrémités aux premières vertèbres

de la queue, & qui ſe joignent au deſſous de l'anus *(N)* après l'avoir entouré ; ils étoient plats & avoient quatre lignes de largeur & deux lignes d'épaiſſeur, ils s'étendoient le long de la verge juſqu'à l'endroit *(O)* auquel ils adhéroient, & où la verge formoit une double courbure *(O P)* en façon d'S romaine ; la partie de la verge qui étoit entre les deux courbures, depuis *(O)* juſqu'à *(P)*, avoit trois pouces de longueur : celle des cordons étoit de deux pieds depuis la queue juſqu'à l'endroit où ils ſe joignoient à la verge, à un pied de diſtance de la baſe du gland ; ils s'étendoient ſous cette partie de la verge & s'épanouiſſoient ſur les côtés juſqu'au prépuce, qui avoit auſſi deux muſcles *(R S, fig. 1, pl. XX)*, leſquels s'étendoient ſous l'abdomen, & ſe prolongeoient par des parties tendineuſes juſqu'aux environs de l'anus ; ces muſcles paroiſſent ſervir à retirer le prépuce en arrière.

La veſſie *(T)* étoit ovale, elle avoit un pied huit pouces de circonférence ſur ſon petit diamètre, & deux pieds un pouce ſur le grand ; l'urètre avoit neuf lignes de diamètre pris au dedans du canal au ſortir de la veſſie ; il étoit revêtu au dehors d'un muſcle fort & épais, qui formoit un cylindre de ſeize lignes de diamètre pris de dehors en dehors ; la longueur de ce canal étoit de ſix pouces depuis la veſſie juſqu'à la bifurcation du corps caverneux.

Les véſicules ſéminales *(V V)* ſont compoſées de pluſieurs cellules, comme dans l'homme ; chacune des véſicules avoit quatre pouces de longueur, environ huit lignes d'épaiſſeur & quatorze lignes de largeur ; elles communiquoient dans l'urètre à l'endroit *(X)* où on voit l'intérieur de ce canal qui a été ouvert, & où on a repréſenté des ſtilets qui ſortent des orifices des canaux déférens.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 546 sur 615

Les proſtates (Y) avoient quinze lignes de longueur d'un côté à l'autre, & ſix lignes de largeur; il ſe trouvoit auprès des muſcles accélérateurs deux glandes (Z) qui avoient un pouce & demi de longueur ſur ſept lignes de largeur; ces glandes s'ouvrent dans l'urètre & contiennent une liqueur jaunâtre, de même que les proſtates.

Après cet expoſé des parties de la génération du mâle, nous paſſons à celles de la femelle. La vache qui a ſervi de ſujet avoit environ ſix ans; elle a été tuée à la fin de mai; ſa longueur, meſurée en ligne droite depuis le muffle juſqu'à l'origine de la queue, étoit de ſix pieds neuf pouces & demi; la tête avoit un pied & demi depuis le bout des lèvres juſque derrière les cornes, un pied quatre pouces de circonférence priſe ſur les coins de la bouche, & deux pieds huit pouces derrière les yeux; la longueur du cou étoit d'un pied ſept pouces depuis l'omoplate juſqu'à l'oreille, & ſa circonférence de trois pieds quatre lignes priſe auprès de la tête, & de quatre pieds deux pouces & demi auprès des épaules; le corps avoit cinq pieds un pouce de circonférence derrière les jambes de devant, cinq pieds huit pouces au milieu à l'endroit le plus gros, & quatre pieds onze pouces devant les jambes de derrière; la hauteur depuis terre juſqu'au garrot étoit de trois pieds neuf pouces & demi, & de trois pieds onze pouces depuis terre juſqu'à la crête de l'os des iles.

Il y avoit deux pouces de diſtance entre l'anus & la vulve, dont la longueur n'étoit que de trois pouces; les quatre mamelons formoient un carré par leur poſition, les deux poſtérieurs étoient éloignés de la vulve d'un pied onze pouces, & il y avoit trois pouces d'intervalle entre l'un & l'autre de ces mamelons; les deux antérieurs ſe trouvent éloignés de deux pouces

des poſtérieurs, & de quatre pouces & demi l'un de l'autre; ils avoient, tous les quatre, deux pouces de hauteur & environ trois pouces de circonférence à la baſe; l'extrémité étoit arrondie & percée d'un orifice qui eſt la bouche d'un canal, dont le diamètre n'a qu'environ une ligne, mais ce canal s'élargit à meſure qu'il approche de la mamelle, dont la partie inférieure eſt creuſe & ne forme qu'une cavité au deſſus de chaque mamelon; ces cavités n'avoient qu'environ un pouce de profondeur depuis la baſe du mamelon juſqu'à la ſubſtance glanduleuſe qui eſt dans leur fond, ſur laquelle il y a pluſieurs inégalités; elle formoit une maſſe qui avoit dix pouces de longueur, environ huit pouces de largeur & deux pouces & demi d'épaiſſeur; elle étoit diſtinguée en deux parties égales, une à droite & une à gauche, qui étoient réunies par un tiſſu cellulaire; chacune de ces portions forme donc une mamelle qui a deux cavités, l'une en devant & l'autre en arrière, il y a un mamelon pour chaque cavité, & par conſéquent deux mamelons dans chaque mamelle, mais chacun de ces mamelons n'a qu'un ſeul orifice, au contraire de la jument qui n'a qu'un mamelon pour chaque mamelle, mais ce mamelon eſt percé de deux orifices qui communiquent chacun à une cavité. Il y avoit dans la vache dont il s'agit, un cinquième mamelon à un pouce de diſtance du mamelon poſtérieur du côté droit en arrière, il étoit preſque auſſi grand que chacun des autres, mais il n'avoit point d'orifice ni de canal, auſſi ne ſe trouve-t-il aucune cavité dans la ſubſtance de la mamelle qui correſpondoit à ce faux mamelon. J'ai vû ſur des fœtus femelles les apparences de ſix mamelons, trois de chaque côté.

Le gland du clitoris de la vache que nous décrivons étoit peu ſaillant, il formoit une éminence qui avoit cinq à ſix

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 548 sur 615

lignes de longueur, quatre lignes de largeur & deux lignes de hauteur; le prépuce n'étoit pas apparent; il y avoit au côté inférieur du clitoris un petit orifice qui communiquoit dans une cavité assez étendue, & de l'autre côté un enfoncement assez profond.

Le vagin avoit un pied de longueur, étant enflé sa circonférence étoit d'un pied dans la portion qui est au-delà de l'orifice de l'urètre, & seulement de huit pouces sur la portion antérieure, qui est la plus étroite, comme dans la jument; mais il y avoit dans le vagin de la vache plusieurs rides longitudinales.

La vessie étoit presque ronde, cependant elle avoit un pied cinq pouces de circonférence sur son grand diamètre, & un pied trois pouces sur le petit; celle de l'urètre étoit de quatre pouces, & il avoit aussi quatre pouces de longueur.

L'orifice de la matrice étoit enfoncé au milieu d'un double ou triple rang de tubercules assez gros qui l'environnoient de toutes parts; l'ouverture est ronde; le corps de la matrice étoit fort petit, il n'avoit que quatre pouces & demi de circonférence, & environ deux pouces de longueur depuis son orifice jusqu'à la bifurcation des cornes; l'entrée ou le cou étoit moins étroite que dans la jument: les cornes avoient un pied huit pouces de longueur depuis le corps de la matrice jusqu'à leur extrémité; elles étoient adossées l'une contre l'autre, & réunies par des membranes sur la longueur de neuf pouces, le reste se recourboit à côté, & l'extrémité étoit recoquillée; chaque corne n'avoit que trois pouces de circonférence dans la plus grande partie de sa longueur, & seulement un demi-pouce à l'extrémité.

Le testicule étoit à un pouce & demi de distance de l'extrémité de la corne; la trompe s'étend sur une ligne courbe qui avoit quatre pouces de longueur, & forme sur cette ligne de petites

ſinuoſités, enfin elle aboutit à un pavillon : le teſticule eſt de figure ovoïde, dont le grand diamètre étoit de quatorze lignes, & le petit de huit lignes; il y avoit ſur ce teſticule de petites taches rouges & de bleues, les premières marquoient les traces des caroncules, & les autres étoient des véſicules lymphatiques.

Le fœtus du taureau eſt enveloppé d'un amnios & d'un chorion, il y a auſſi une allantoïde, mais il n'en eſt pas environné comme le fœtus du cheval; l'ouraque ſort de l'ombilic avec les vaiſſeaux ſanguins, & ſe prolonge dans le cordon ombilical juſqu'au-delà de l'endroit où l'amnios s'épanouit & s'étend de toutes parts pour envelopper le fœtus; à ce même endroit le prolongement de l'ouraque forme l'allantoïde, qui s'étend à droite & à gauche entre l'amnios & le chorion, & qui forme deux cornes, ou, pour ainſi dire, deux poches alongées, dont le fond termine les deux bouts de l'allantoïde : ces poches ſe réuniſſent à l'endroit de l'ouraque, & reçoivent la liqueur qui en découle. Lorſque le fœtus eſt près du terme, ſon allantoïde eſt fort étendue; il n'eſt pas facile alors de l'enfler en entier ſans la déchirer, mais on y parvient aiſément dans un ſujet moins avancé, & on peut reconnoître par ce moyen la diſpoſition de cette membrane; elle eſt tranſparente au point que j'ai vû à travers le ſédiment de la liqueur qu'elle contient.

Après avoir trouvé dans la liqueur de l'allantoïde de l'âne un ſédiment ſemblable à l'hippomanès, je ſoupçonnai que le même ſédiment pouvoit avoir lieu dans la liqueur de l'allantoïde des ruminans, & je le cherchai dans le plus gros de ces animaux : je fis tuer une vache pleine qui approchoit du terme de ſa portée, je fis ouvrir la matrice & le chorion; dès que l'on eut commencé à ſouffler l'allantoïde, je vis que cette membrane formoit à l'extérieur une concavité en forme d'entonnoir, & en-

regardant à travers j'aperçus une matière jaunâtre *(A, pl. XXI, fig. 2)* qui tenoit à une ſorte de pédicule *(B)*, je ne doutai pas que cette matière ne fût un ſédiment qui s'étoit attaché à l'allantoïde ; alors j'ouvris cette membrane, & j'en détachai aiſément le ſédiment *(A, fig. 3)* qui n'étoit que colé au pédicule *(B)*, comme je l'ai expliqué dans la deſcription de l'âne ; il m'a paru de même nature que les ſédimens de la liqueur de l'allantoïde du cheval & de l'âne ; mais, pour ne laiſſer aucun doute, je fis évaporer une certaine quantité de la liqueur que je tirai de l'allantoïde, & il ſe forma par cette opération un réſidu ſemblable au ſédiment que j'avois trouvé dans l'allantoïde. Je n'inſiſterai pas davantage ſur ce ſujet, que j'ai rapporté en détail à l'Académie des Sciences *.

Le chorion & l'amnios forment, comme l'allantoïde, deux prolongemens qui s'étendent dans les cornes de la matrice, mais ils n'y adhèrent pas, comme dans la jument, par des rugoſités, c'eſt au contraire par de petits *placenta* qui ſont ſéparés les uns des autres, & diſtribués à différentes diſtances, j'en ai compté juſqu'à près de cent pour un ſeul embryon ; on leur a donné le nom de *cotyledon*, ils ſont aplatis, de figure ovale, & formés en partie par la matrice, & en partie par le chorion ; il s'élève ſur les parois intérieures de la matrice, des tubercules ovales, correſpondans à d'autres tubercules de même figure, qui ſe forment ſur la face extérieure du chorion ; ces tubercules ſont appliqués l'un autour de l'autre, & le compoſé d'un tubercule de la matrice environné par un tubercule du chorion, eſt ce qu'on appelle un *cotyledon* ; chaque cotyledon attache le chorion à la matrice lorſque le fœtus a pris un certain accroiſſement ; alors ſi on ſépare le chorion de la matrice, les

* Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, *année 1752.*

cotyledons

cotyledons ſe partagent en deux parties, dans le moment de cette disjonction l'on aperçoit que les tubercules du chorion ſont hériſſés de petits prolongemens, & que ces prolongemens ſortent de pluſieurs cavités qui pénètrent dans les tubercules de la matrice; ces tubercules ſe détachent naturellement l'un de l'autre lorſque la vache met bas, & ceux qui reſtent dans la matrice s'oblitèrent dans la ſuite & s'effacent en entier.

Pour faire voir l'intérieur de la matrice de la vache & les enveloppes du fœtus dans l'état où elles ſe trouvent lorſqu'il eſt près de ſon terme, ces parties ſont repréſentées *pl. XXI, fig. 1*; le vagin & la matrice ſont ouverts, on y peut diſtinguer le vagin *(A)*, les lèvres de la vulve *(B B)*, le clitoris *(C)*, l'orifice de l'urètre *(D)*, la veſſie *(E)*, l'orifice *(F)* de la matrice, le cordon ombilical *(G)*, le commencement *(H)* de l'épanouiſſement de l'allantoïde, une portion *(I)* de l'allantoïde qui a été ſoufflée, le ſédiment *(L)* de la liqueur de l'allantoïde vû à travers cette membrane, les deux cornes *(M M)* de l'allantoïde qui ne ſont pas enflées au-delà des endroits *(N N)*, l'amnios *(O O O O)*, le chorion *(P P P)*, la matrice *(Q Q Q)*, les tubercules de la matrice *(R R R)*, les tubercules du chorion *(S S S)*, les cotyledons à demi ſéparés *(T T)*, un tubercule de la matrice vû en partie *(V)*, un tubercule du chorion vû en partie *(X)*, les cotyledons *(Y Y)* vûs à travers l'amnios, la corne gauche *(Z)* de la matrice, le pavillon *(a)*, la trompe *(b)*, le teſticule *(c)*, & enfin les vaiſſeaux ſpermatiques *(d)*.

J'ai remarqué dans les embryons du taureau, que les endroits où les cornes devoient paroître ſont marqués par une tache rougeâtre & par une ſorte d'empreinte ſur la peau; on voit par deſſous quelques filets qui ſortent du périoſte près du bord poſtérieur de l'os frontal; l'empreinte qui déſigne l'endroit des

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 552 sur 615

cornes eſt placée plus en avant que dans l'adulte, relativement à la poſition des oreilles; la veſſie a une forme cylindrique, comme dans le fœtus du cheval & de l'âne; les quatre eſtomacs ſont fort amples à proportion de la groſſeur du fœtus, & la capacité de la caillette ne m'a pas paru auſſi grande, en comparaiſon de celle de la panſe, que dans le veau dont je vais donner la deſcription; enfin la corne des pieds étoit blanche, bien formée, & cannelée tranſverſalement autour des pieds, où il y a une ſorte de ſillon aſſez profond dans le milieu du ſabot à l'extérieur.

Un veau de cinq ſemaines, qui peſoit environ ſoixante-dix livres, avoit trois pieds trois pouces de longueur meſurée en ligne droite depuis l'extrémité du muffle juſqu'à l'origine de la queue; la longueur de la tête, depuis le bout des naſeaux juſque derrière les oreilles, étoit de dix pouces; le muffle avoit huit pouces & demi de circonférence priſe derrière les naſeaux, celle de la tête étoit d'un pied ſept pouces & demi meſurée à l'endroit le plus gros en paſſant ſur la convexité qui eſt au milieu du ſommet au-delà des yeux; il y avoit huit pouces & demi depuis l'articulation de l'épaule juſqu'à l'angle de la mâchoire inférieure; la circonférence du cou étoit d'un pied trois pouces dans le milieu de ſa longueur; le corps avoit deux pieds quatre pouces de circonférence priſe derrière les jambes de devant, deux pieds ſix pouces au milieu du corps, & deux pieds deux pouces devant les jambes de derrière; les dernières fauſſes côtes n'étoient éloignées de la crête de l'os des iles que de quatre pouces; la queue avoit un pied de longueur depuis ſon origine juſqu'à l'extrémité du tronçon; la hauteur de ce veau étoit de deux pieds quatre pouces depuis terre juſqu'au garrot; le bras avoit huit pouces de longueur depuis le coude juſqu'au genou,

le canon ſix pouces & demi, & le reſte de la jambe quatre pouces; la longueur de la cuiſſe étoit de dix pouces depuis la rotule juſqu'au jarret, le canon avoit neuf pouces, & le reſte de la jambe de derrière quatre pouces.

La poſition & la figure des inteſtins & des eſtomacs étoient à peu près les mêmes que dans le bœuf qui a été décrit, ce qui m'a paru de plus différent, c'eſt que la caillette dans ce veau étoit à proportion beaucoup plus grande que celle du bœuf, relativement à la grandeur de la panſe, comme on le verra par les dimenſions que je vais rapporter. Le corps de la panſe *(A, pl. XV, fig. 2)* avoit deux pieds quatre pouces de circonférence tranſverſale, & dix pouces de largeur, ſix pouces de hauteur, & dix pouces de longueur de devant en arrière depuis la jonction *(B)* du bonnet *(C)* avec la panſe, juſqu'à l'extrémité poſtérieure de ce premier eſtomac; cette extrémité formoit deux convexités, l'une à droite *(E)*, l'autre à gauche *(F)*, par une ſciſſure de deux pouces & demi de profondeur, qui ſe continuoit à droite & à gauche autour de la baſe des convexités; celle du côté droit étoit la plus groſſe, elle avoit quatorze pouces de circonférence à ſa baſe, & la convexité du côté gauche ſeulement huit pouces, celle-ci étoit la moins élevée & la plus petite; la ſciſſure tournoit autour de la baſe de cette convexité, & en formoit du côté gauche une troiſième *(H)* fort grande, peu ſaillante, & diſpoſée en forme de cul-de-ſac; le corps *(A)* de la panſe & le cou *(I)* étoient rapprochés, comme dans le bœuf, & tenoient l'un à l'autre par un tiſſu cellulaire; ce tiſſu ayant été coupé, la ſciſſure s'eſt trouvée de trois pouces & demi de profondeur, elle s'étendoit obliquement de droite à gauche; le col de la panſe avoit quinze pouces de circonférence, le bonnet *(C)* en avoit dix dans le milieu, celle du

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 554 sur 615

feuillet *(K)* étoit de dix pouces & demi d'un bout à l'autre ; & ſeulement de neuf pouces en travers, la caillette *(L)* avoit un pied & demi de circonférence priſe dans le même ſens à l'endroit le plus gros, & ſa circonférence longitudinale étoit d'un pied dix pouces priſe ſeulement juſqu'au col *(M)*, qui avoit encore quatre ou cinq pouces de longueur ſur quatre ou cinq pouces de circonférence.

Les papilles de la panſe étoient fort petites, les plus grandes ſe trouvoient ſur la face ſupérieure du col auprès du bonnet, & anticipoient ſur le bonnet un peu au-delà du bord qui ſemble ſéparer ces deux eſtomacs ; dans le reſte de la panſe les papilles ne paroiſſoient que comme des filets d'environ un tiers de ligne de hauteur, terminés la pluſpart par une pointe noire ; dans d'autres endroits on ne voyoit que des grains très-menus au lieu de papilles ou de filets pointus ; après avoir enlevé la membrane veloutée, on retrouvoit ſur la membrane que recouvroit ce velouté les mêmes éminences, beaucoup plus petites à proportion, mais on n'y voyoit aucune marque noire à la pointe ; les cloiſons qui formoient le réſeau du bonnet n'avoient qu'une ligne au plus de hauteur, & la plus grande diſtance qu'il y eût entre les deux cloiſons oppoſées n'étoit que de cinq lignes ; les plus grands feuillets du troiſième eſtomac n'avoient qu'une ligne & demie de largeur, & les plus grands replis de la caillette un pouce.

La longueur des inteſtins grêles étoit de cinquante-ſix pieds depuis le pylore juſqu'au cæcum, le colon & le rectum avoient neuf pieds & demi juſqu'à l'anus, ce qui fait en tout ſoixante-cinq pieds & demi ; la longueur du cæcum étoit de neuf pouces & demi ; le duodenum avoit un pouce & demi de circonférence dans des endroits, & deux pouces dans d'autres ; celle du jejunum

étoit d'environ deux pouces; l'ileum n'avoit auſſi que deux pouces de tour du côté du jejunum, mais il étoit plus gros auprès du cæcum, où il avoit juſqu'à trois pouces de circonférence; le cæcum avoit cinq pouces de tour, ſon extrémité étoit arrondie & plus groſſe que le reſte de l'inteſtin, elle avoit ſix pouces & demi de circonférence; le colon étoit auſſi gros que le cæcum auprès de cet inteſtin, mais à un pied & demi de diſtance il n'avoit plus qu'un pouce dix lignes de circonférence, plus loin il devenoit plus gros; le rectum groſſiſſoit auſſi dans la même proportion, & enfin il avoit deux pouces neuf lignes de circonférence à quelque diſtance de ſon extrémité.

Le foie & la rate avoient à peu près la même figure & la même ſituation que dans le bœuf; la longueur du foie priſe de droite à gauche étoit de neuf pouces, & la hauteur de cinq pouces; il avoit un pouce & demi dans la plus grande épaiſſeur, il peſoit une livre cinq onces & demie, & il étoit de couleur rougeâtre : la véſicule du fiel formoit au deſſous du bord du foie une poche dont la longueur étoit de deux pouces & demi, la largeur de ſeize lignes, & l'épaiſſeur de huit lignes; la rate avoit onze pouces de longueur, deux pouces & demi de largeur, & un demi-pouce d'épaiſſeur dans le milieu; elle peſoit quatre onces, ſa couleur étoit griſe.

Les reins étoient compoſés, comme ceux du bœuf, de pluſieurs portions en partie ſéparées les unes des autres, & arrondies; le rein droit *(pl. XXII, fig. 1)* étoit plus avancé que le gauche *(fig. 2)*; chaque rein avoit trois pouces de longueur, un pouce & demi de largeur; l'uretère *(A, fig. 1 & 2)* ſort d'un baſſinet *(B, fig. 2)* qui eſt le réſervoir commun auquel aboutiſſent tous les canaux particuliers, dont chacun correſpond à un des tubercules

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 556 sur 615

du rein & embraſſe un mamelon : on voit auſſi ſur ces figures l'artère *(C, fig. 1 & 2)*, & la veine émulgente *(D)*.

Le centre nerveux du diaphragme avoit ſix pouces de largeur dans le milieu, & trois pouces de longueur depuis la veine-cave juſqu'à la partie voiſine du ſternum ; la largeur de la partie charnue étoit la même ſur les côtés & au deſſus du ſternum.

Les teſticules étoient ovoïdes comme dans le bœuf, ils avoient quatorze lignes de longueur & quatre lignes de diamètre ; leur ſurface étoit parſemée de vaiſſeaux ſanguins auſſi apparens que dans le poulain ; la verge avoit un pied trois pouces de longueur depuis la bifurcation du corps caverneux juſqu'à l'extrémité du gland ; le corps de la verge, ſéparé de la peau, avoit quatre lignes de diamètre ; la veſſie étoit oblongue, elle avoit quatorze pouces de circonférence ſur ſon grand diamètre, & huit pouces & demi ſur le petit.

Le thymus étoit auſſi étendu que dans le poulain : le cœur, les poumons, &c. reſſembloient à ces mêmes parties vûes dans le bœuf.

La tête du taureau n'eſt pas ſi alongée que celle du cheval, parce que ſes mâchoires ne ſont pas ſi longues ; les branches de la mâchoire inférieure ne s'élèvent pas aſſez pour ſoûtenir l'occipital & les pariétaux au haut de la face ſupérieure de la tête, comme dans le cheval ; l'os occipital ſe trouve dans la face poſtérieure, & les pariétaux, qui ſont très-petits, ſemblent être cachés au deſſous des cornes ; c'eſt l'os frontal qui termine la face du taureau par un bord tranſverſal qui s'étend d'une corne à l'autre, qui ſe prolonge de chaque côté & entre dans les cornes : l'os frontal forme la moitié ſupérieure de la face, & c'eſt dans cet os que réſide la principale différence qui ſe

trouve entre la tête du cheval & celle du taureau ; la face de cet animal a un pied cinq pouces de longueur d'un bout à l'autre, trois pouces de largeur dans le bas, & ſix pouces huit lignes à l'endroit des bords ſupérieurs des orbites.

La tête vûe de côté a, comme celle du cheval, la figure d'un triangle dont la baſe *(AB, pl. XXIII)* formée par le corps de la mâchoire inférieure, eſt convexe ; cette baſe a treize pouces de longueur, meſurée en droite ligne depuis le contour *(B)* de la mâchoire juſqu'à l'extrémité *(A)* des dents inciſives, & quatorze pouces ſi on ſuit la courbure de la convexité ; l'un des côtés du triangle eſt formé par la longueur de la face ſupérieure *(AC)* de la tête, & l'autre côté par la hauteur de la face *(BC)* que la tête préſente étant vûe par-derrière ; cette face eſt oblongue & renflée ſur les côtés, elle a environ dix pouces & demi de hauteur ſur cinq pouces trois lignes dans le bas entre les angles de la mâchoire, ſept pouces & demi un peu au-delà de la moitié de la hauteur, & ſeulement quatre pouces & demi dans le haut entre les cornes : l'articulation de la tête avec la première des vertèbres, ſe trouve un peu au deſſus de la moitié de la hauteur de cette face.

Si on retourne la tête & ſi on la poſe ſur la face ſupérieure pour la voir par-deſſous, elle préſente une figure à peu près reſſemblante à celle de la face ſupérieure, & on voit en relief l'angle que forme le corps de la mâchoire inférieure : enfin ſi on regarde la tête du taureau par-derrière & dans cette même poſition, l'on y diſtingue une partie de la figure de tête de bœuf que l'on a remarquée dans le cheval.

Les mâchoires ne ſont pas ſi alongées & les os du nez ne ſont pas ſi longs ni ſi larges à proportion que dans le cheval, mais l'os frontal du taureau eſt bien plus étendu ; la partie

antérieure *(A)* de la mâchoire inférieure eſt terminée par les dents inciſives, ſans qu'il y ait de menton; ſa largeur au-delà des dernières dents inciſives eſt de deux pouces, & ſeulement d'un pouce huit lignes à l'endroit des barres *(D)* qui eſt le plus étroit, enſuite elle s'élargit peu à peu juſqu'au contour *(B)* qui eſt entre le corps & les branches; ainſi cette mâchoire forme un angle en avant, dont les côtés ont environ un pied de longueur depuis l'extrémité antérieure de l'os juſqu'au deſſous du contour des branches; il n'eſt pas ſi arrondi que dans le cheval: les branches ont environ cinq pouces & demi de hauteur depuis le bas du contour juſqu'à l'apophyſe condyloïde *(E)*, & environ ſept pouces & demi juſqu'à l'apophyſe coronoïde; la mâchoire a trois pouces & demi de largeur à l'endroit du contour des branches, & ſeulement deux pouces au deſſous de la grande échancrure qui eſt entre les deux apophyſes; les deux contours des branches ſont diſtants de cinq pouces, meſurés de dehors en dehors; & les apophyſes condyloïdes, de cinq pouces neuf lignes.

L'ouverture des narines eſt placée beaucoup plus bas que dans le cheval, parce que l'os de la mâchoire ſupérieure n'a dans ſa partie antérieure *(F)* que quatre à cinq lignes d'épaiſſeur; ſa largeur eſt de trois pouces, & ſeulement de deux pouces dix lignes à l'endroit des barres, qui eſt le plus étroit: la mâchoire s'élargit beaucoup en approchant des os de la pomette, de ſorte qu'elle eſt auſſi avancée de part & d'autre que ces os: la tête a dans cet endroit *(G)* cinq pouces de largeur; la mâchoire ne s'étend pas juſqu'aux yeux, quoiqu'elle ait ſept pouces & demi dans ſa plus grande longueur; il y a quatre pouces & demi de diſtance entre les orbites *(H)* & l'ouverture des narines *(I)*; cette ouverture eſt oblongue de haut en bas, elle a deux

deux pouces trois lignes à l'endroit le plus large, & environ quatre pouces & demi à l'endroit le plus long; le côté supérieur est formé par la partie antérieure des os propres du nez, qui avancent sur l'ouverture de la longueur d'environ deux pouces : ces os *(L)* ne forment pas une pointe par leur réunion, comme dans le cheval, mais ils sont échancrés chacun par leur extrémité inférieure; ils ont huit lignes de largeur au-dessus de cette échancrure, leur longueur totale est d'un demi-pied, ils s'élargissent un peu à mesure qu'ils approchent de l'os frontal, à l'endroit où ils commencent à y toucher ils ont chacun un pouce de largeur; plus haut chaque os est terminé par une pointe triangulaire, ces deux pointes se touchent par les côtés intérieurs, & forment dans l'os frontal une échancrure angulaire dont les côtés ont environ un pouce huit lignes de longueur; cependant l'os frontal rentre de quelques lignes entre les os propres du nez à l'angle de son échancrure.

Les orbites des yeux ont environ deux pouces trois lignes de largeur & deux pouces deux lignes de hauteur; ils sont placés, comme dans le cheval, à côté de l'os frontal & au-dessous de ses apophyses.

Les cornes ont environ sept pouces de longueur & sept pouces & demi de circonférence à la base; la surface extérieure est hérissée de lames annulaires sur la longueur de deux ou trois pouces, il y a une bande circulaire de couleur blanchêâtre à deux pouces au-dessous de la pointe; au reste, la corne est de couleur livide ou noirâtre : chaque corne est creuse, & la cavité se trouve remplie par un os de figure conique qui a quatre pouces & demi de longueur & six pouces de circonférence auprès de l'os frontal; celui de la corne est creux, sa cavité

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 560 sur 615

s'étend loin dans l'os frontal, & communique par conſéquent avec les ſinus frontaux.

Le taureau n'a de dents inciſives qu'à la mâchoire inférieure, où il en a huit; les plus grandes, qui ſont celles du milieu, ont ſix à ſept lignes de largeur en devant, elles ſont minces & tranchantes; il n'y a point de dents canines, mais il ſe trouve vingt-quatre dents mâchelières, douze dans chaque mâchoire, ſix de chaque côté; les premières ſont éloignées d'environ trois pouces & demi des dernières dents inciſives, de ſorte que la partie de la mâchoire ſupérieure où il n'y a point de dents inciſives, a quatre pouces neuf lignes d'étendue au devant des premières dents molaires; ces premières dents ſont les plus petites, ſur-tout celles de la mâchoire inférieure, qui n'ont qu'un demi-pouce de largeur; les autres ſont plus groſſes à meſure qu'elles ſe trouvent placées plus en arrière, de façon que les deux dernières de la mâchoire inférieure ont juſqu'à ſeize lignes de largeur; celles qui leur correſpondent dans la mâchoire du deſſus, n'ont que treize lignes; celles du milieu de cette mâchoire ſont les plus épaiſſes, elles ont environ huit lignes, tandis que celles du milieu de la mâchoire du deſſous n'ont qu'un demi-pouce; les plus longues de ces dents ſont élevées d'environ un pouce au dehors des alvéoles, mais celles des extrémités ne le ſont que d'un demi-pouce; la face extérieure des dents molaires de la mâchoire ſupérieure a quelques ſtries perpendiculaires aſſez étroites, mais les dents de la mâchoire inférieure en ont qui ſont arrondies, & ſi groſſes qu'elles ſe touchent, quoiqu'il n'y en ait que deux ou trois au plus ſur la même dent : la face ſupérieure de toutes ces dents eſt traverſée par un ſillon d'environ deux lignes de profondeur qui forme deux arêtes, ou par une ſeule arête auſſi de deux lignes de

hauteur ; les arêtes des dents du deſſus entrent dans les ſillons de celles de deſſous, & ainſi réciproquement.

L'os hyoïde du bœuf reſſemble beaucoup en général à celui du cheval, mais ſi on l'examine en détail, on y trouve des différences bien marquées; celui dont il eſt ici queſtion a été tiré d'un bœuf de grandeur médiocre; on y diſtingue neuf os, bien ſéparés par des cartilages; les deux principaux pour l'étendue, ont cinq pouces un quart de longueur, & cinq lignes de largeur dans les endroits les plus étroits ; ils ſont plus épais que ceux du cheval, & il y a ſur le bord ſupérieur, à peu près dans le milieu de leur longueur, une ſorte d'apophyſe ou de tubercule ; l'extrémité antérieure de ces os eſt plus large que dans le cheval, & la poſtérieure eſt terminée par deux prolongemens, dont l'un s'étend en bas & l'autre en haut, celui-ci s'articuloit avec l'os des temples, les os oblongs ſont, à très-peu près, ſemblables à ceux du cheval, mais les os qui correſpondent à ceux que nous avons comparés dans cet animal à des haricots pour la figure & pour la groſſeur, ſont beaucoup plus grands dans le bœuf, car ils ont dix lignes de longueur, quatre ou cinq lignes de largeur, & environ trois lignes d'épaiſſeur ; la fourchette eſt beaucoup plus petite que dans le cheval, & n'a preſque point de manche ; elle eſt compoſée de trois os bien diſtincts, dont deux forment les branches ; chacune eſt preſque cylindrique, & a un pouce de longueur ſur deux lignes de largeur dans le milieu, l'extrémité poſtérieure eſt un peu plus groſſe que le milieu, mais l'extrémité antérieure a juſqu'à cinq lignes de largeur ; les deux branches de la fourchette ſont éloignées l'une de l'autre de quinze lignes à leur extrémité poſtérieure ; enfin l'os du milieu n'a que dix lignes de longueur, & neuf lignes à l'endroit le plus large,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 562 sur 615

il forme trois tubercules, dont deux s'articulent chacun avec l'une des branches de la fourchette, le troiſième, qui eſt le plus gros, correſpond au manche de la fourchette du cheval; peut-être que dans de vieux taureaux ou dans de vieux bœufs les trois os de la fourchette ſeroient réunis & ſoudés, comme dans l'hyoïde du cheval qui a été décrit.

La plus grande différence qui ſoit entre les vertèbres du taureau & celles du cheval eſt dans les ſix dernières vertèbres du cou; le taureau en a ſept, comme le cheval, mais les cinq dernières ſont moins longues, plus hautes & plus larges, c'eſt ce qui fait que le cou du taureau n'a que quinze pouces de longueur: la première vertèbre *(M)* eſt fort reſſemblante à celle du cheval; les parties ſupérieures des apophyſes articulaires ſont inclinées ſur les parties inférieures, & alongées en avant d'environ cinq lignes, l'articulation de cette apophyſe avec la tête eſt à peu près la même que celle du cheval; le trou de la première vertèbre a dix lignes de largeur de haut en bas, & un pouce huit lignes de longueur d'un côté à l'autre. Les apophyſes tranſverſes s'étendent de devant en arrière de la longueur de trois pouces quatre lignes, elles débordent en arrière de la longueur d'environ neuf lignes au-delà du corps de la vértèbre, & elles ont dans cet endroit environ deux pouces de largeur; leur partie antérieure eſt beaucoup plus étroite, de ſorte que la vertèbre entière n'a au plus que quatre pouces & demi de largeur à ſa partie antérieure, tandis qu'elle a juſqu'à cinq pouces & demi à ſa partie poſtérieure; la face ſupérieure de la vertèbre a deux pouces de longueur, & l'inférieure ſeulement quinze lignes; l'apophyſe de cette face reſſemble, comme dans le cheval, à un bout de nez.

La ſeconde vertèbre *(N)* a ſon pivot otondoïde, comme

dans le cheval, cette vertèbre eſt beaucoup plus alongée que les cinq ſuivantes, elle a trois pouces de longueur meſurée en ligne droite depuis l'extrémité poſtérieure de l'apophyſe de la face inférieure juſqu'au milieu de la baſe du pivot, qui eſt formée par les apophyſes articulaires antérieures, mais qui n'a point d'échancrure comme dans le cheval, trois pouces & demi depuis l'extrémité des apophyſes articulaires poſtérieures juſqu'à l'extrémité antérieure de l'apophyſe épineuſe, & quatre pouces meſurée en ligne oblique depuis l'extrémité des apophyſes articulaires poſtérieures juſqu'au bord inférieur de la baſe du pivot.

Les cinq autres vertèbres ſont beaucoup moins longues que la première & la ſeconde; la cinquième *(Q)*, la ſixième *(R)* & la ſeptième *(S)* n'ont qu'environ un pouce & demi depuis l'extrémité poſtérieure de la face inférieure du corps de la vertèbre juſqu'à l'origine de la convexité de la face antérieure, & deux pouces & demi depuis l'extrémité de l'apophyſe articulaire poſtérieure juſqu'à celle de l'antérieure; cette dernière meſure eſt la même dans la quatrième vertèbre *(R)*; mais elle eſt de près de trois pouces dans la troiſième *(O)*, qui a deux pouces de longueur ſur la face inférieure du corps, de même que la quatrième.

La plus longue apophyſe épineuſe eſt, comme dans le cheval, ſur la ſeptième vertèbre; elle a dans le taureau trois pouces deux ou trois lignes de hauteur, treize lignes de largeur, ſur environ quatre lignes à l'endroit le plus épais; les apophyſes épineuſes des autres vertèbres du cou ſont beaucoup plus courtes, ſur-tout celle de la troiſième, qui n'a qu'un pouce; elles ſont auſſi beaucoup moins large, mais plus épaiſſes & preſque cylindriques : l'apophyſe épineuſe de la ſeconde vertèbre eſt plus

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 564 sur 615

élevée que dans le cheval, elle eſt faite en forme de crête, elle a environ quinze lignes de hauteur dans ſa partie poſtérieure, & ſeulement la moitié de cette hauteur ſur le devant; les apophyſes tranſverſes ſont beaucoup plus groſſes que dans le cheval, elles s'étendent en arrière & en avant dans la troiſième & dans la quatrième vertèbre, dans la cinquième la branche ſupérieure de l'apophyſe tranſverſe eſt un peu en arrière, & l'inférieure un peu en avant; celles de la ſixième s'étendent en haut & en bas; l'apophyſe de la ſeptième n'a qu'une ſeule branche. Il y a des apophyſes inférieures comme dans le cheval, excepté dans la ſeptième vertèbre, où il n'y en a point du tout, & celle de la ſixième eſt très-petite; cette vertèbre n'a point d'apophyſe poſtérieure inférieure diſtinguée de la brancche inférieure de l'apophyſe tranſverſe, comme dans le cheval: le cou du ſquelette du taureau a quatre pouces & demi de circonférence priſe ſur la cinquième vertèbre, qui eſt l'endroit le plus gros, car il n'a qu'environ un pied à l'endroit de la ſeconde. Il paroît par la grandeur des apophyſes des vertèbres du cou, qu'il doit être beaucoup plus fort que celui du cheval.

La portion de la colonne vertébrale, qui eſt compoſée des vertèbres dorſales, a deux pieds un pouce de longueur; il y a treize vertèbres & treize côtes; ces vertèbres reſſemblent à celles du cheval, cependant la première apophyſe épineuſe *(T)* eſt à proportion beaucoup plus longue que dans le cheval, elle a un demi-pied de hauteur; la ſeconde *(V)* & la troiſième *(X)* ont ſix pouces & demi, la quatrième *(Y)* & la cinquième *(Z)* n'ont que ſix pouces trois lignes, les autres diminuent peu à peu juſqu'à la dernière *(a)*, qui n'a que deux pouces; la première a juſqu'à ſeize lignes de largeur, les autres ſont moins larges, ſur-tout les dernières, de ſorte que la onzième *(b)*, qui

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 565 sur 615

eſt la plus étroite de toutes, n'a qu'un demi-pouce de largeur à ſa partie ſupérieure; mais la dernière, qui eſt la plus courte, a dix lignes de largeur à l'endroit le plus étroit: toutes ces apophyſes ſont plus ou moins inclinées en arrière, excepté les deux dernières qui ſont preſque perpendiculaires; le corps des premières vertèbres a environ un pouce & demi de longueur, les autres ſont plus longues, de ſorte que les dernières ont juſqu'à un pouce neuf lignes; la face antérieure eſt convexe, & la poſtérieure concave.

Il y a huit vraies côtes & cinq fauſſes; les premières *(c)* des vraies côtes ont huit pouces de longueur, elles n'ont que peu de courbure; la baſe du triangle qu'elles forment n'a que trois pouces trois lignes de longueur, & la hauteur du triangle eſt d'un demi-pied depuis l'extrémité inférieure des côtes juſqu'au corps de la première vertèbre; les plus longues des côtes ſont la huitième *(d)*, la neuvième & la dixième, elles ont environ un pied & demi; les plus larges ont juſqu'à un pouce huit lignes dans leurs parties moyenne & inférieure; les autres ſont beaucoup plus étroites, elles n'ont qu'environ neuf lignes dans quelques endroits; la partie inférieure des deux premières, une de chaque côté, a juſqu'à un pouce neuf lignes de largeur: toutes les côtes ſont minces.

Le ſternum *(e)* du taureau eſt moins aplati ſur les côtés par le haut, plus large par le bas, & moins convexe en devant ſur ſa longueur que celui du cheval; il eſt compoſé de ſept os, & il a quatorze pouces & demi de longueur: le premier os eſt aplati ſur les côtés, il a deux pouces trois lignes de longueur, environ un pouce dix lignes de largeur de devant en arrière, & ſix lignes d'épaiſſeur dans le milieu; le ſecond os eſt plus court, à peu près auſſi large, mais plus épais que le premier,

ſur-tout à ſa partie poſtérieure ; le troiſième eſt preſque auſſi long que le premier, mais un peu moins épais & beaucoup plus large, ſur-tout à la partie poſtérieure, qui eſt plus large que l'antérieure & qui a environ deux pouces huit lignes : le quatrième eſt à peu près de la même figure que le troiſième, mais il eſt plus mince & plus large à ſa partie poſtérieure, le cinquième reſſemble au quatrième, mais il eſt plus large & plus mince; ſa partie poſtérieure a trois pouces quatre lignes; cet os n'a que neuf lignes d'épaiſſeur dans le milieu : celle du ſixième n'eſt que de huit lignes; ſa figure eſt à peu près reſſemblante à celle du cinquième en poſition contraire, car ſa partie antérieure a trois pouces neuf lignes de largeur, & la poſtérieure eſt un peu moins large : le ſeptième os n'a que cinq lignes d'épaiſſeur, mais il a deux pouces quatre lignes de longueur, deux pouces de largeur en avant, & ſeulement un pouce trois lignes en arrière : le cartilage xiphoïde *(f)* eſt oſſifié, il a un demi-pied de longueur, & il eſt terminé en avant par deux branches qui tiennent au dernier os du ſternum, & qui ont chacune près de deux pouces de longueur.

Les deux premières côtes s'articulent avec la partie antérieure du premier os du ſternum, les deux ſecondes entre le premier & le ſecond os, les troiſièmes entre le ſecond & le troiſième os, & ainſi de ſuite juſqu'au ſeptième os; les ſeptièmes côtes s'articulent entre cet os & le cinquième, & les huitièmes côtes avec le ſixième os.

Les vertèbres lombaires ſont au nombre de ſix *(g, h, i, l, m, n)*; elles reſſemblent à la dernière des dorſales pour le corps & pour les apophyſes épineuſes : celles des deux premières vertèbres lombaires ont environ deux pouces de hauteur, les autres ſont plus courtes, la dernière n'a qu'un pouce & demi, mais elles ſont

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 567 sur 615

ſont toutes fort larges, ſur-tout celles de la ſeconde & de la troiſième vertèbre, qui ont juſqu'à deux pouces de largeur à l'extrémité; la dernière eſt la plus étroite, elle n'a qu'environ un pouce. La longueur des apophyſes acceſſoires eſt de quatre pouces dans la troiſième & la quatrième vertèbre, ces apophyſes ont juſqu'à un pouce ſept lignes dans les endroits les plus larges; celles des autres vertèbres ſont moins longues, ſur-tout dans la première & dans la dernière; le corps de toutes ces vertèbres a environ un pouce neuf lignes de longueur.

L'os ſacrum reſſemble beaucoup à celui du cheval, il ne paroît que comme une continuation de la colonne vertébrale; cet os a huit pouces & demi de longueur, & ſix pouces trois lignes à ſon extrémité antérieure, mais cette extrémité ne fait pas un arc concave en devant, comme dans le cheval, au contraire le corps de la première vertèbre déborde en avant, de même que les apophyſes articulaires antérieures; il a quatre trous de chaque côté, & il paroît compoſé de cinq fauſſes vertèbres qui ont chacune leur apophyſe épineuſe; mais les quatre premières *(o)* ſont preſque entièrement ſoudées les unes avec les autres, elles ont environ un pouce & demi de hauteur; la dernière *(p)* eſt bien ſéparée & n'a que neuf lignes de longueur & un pouce trois lignes de largeur à ſon extrémité; toutes ces apophyſes ſont inclinées en arrière; l'extrémité de l'os ſacrum n'a que deux pouces neuf lignes de largeur.

Il n'y a que treize fauſſes vertèbres dans la queue *(q r)* du ſquelette que nous décrivons, mais j'en ai compté dix-huit dans des embryons; les ſept premières du ſquelette dont il s'agit ont une apophyſe épineuſe, deux apophyſes de chaque côté & deux en deſſous; ces fauſſes vertèbres diminuent peu à peu de groſſeur; la dernière n'a que quatorze lignes de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 568 sur 615

longueur & trois lignes de diamètre à l'endroit le plus mince.

La croupe des taureaux eſt bien différente de celle des chevaux, auſſi les parties poſtérieures du baſſin diffèrent pour la figure & la poſition dans ces deux animaux ; cependant les os des hanches *(ſ)* ſont à peu près ſemblables dans l'un & dans l'autre, chacun de ces os forme dans le taureau une ſorte de triangle, dont la baſe eſt en haut ; elle a environ ſix pouces huit lignes de longueur, elle eſt convexe en avant & échancrée dans le milieu ; l'angle externe *(t)*, au lieu d'être tronqué, comme dans le cheval, préſente une groſſe tubéroſité qui eſt fort apparente dans les vaches maigres ; l'os a huit pouces de hauteur depuis le milieu de la cavité cotyloïde juſqu'au milieu de l'échancrure de la baſe, & neuf pouces ſi on va juſqu'à l'extrémité de l'angle externe ; l'interne eſt d'un pouce moins éloigné de la cavité cotyloïde : dans le cheval on ne trouve pas cette différence. Le corps de l'os de la hanche du taureau eſt effilé, il n'a pas plus d'un pouce & demi de largeur à deux pouces huit lignes au deſſus de la cavité cotyloïde, il s'élargit en deſſus & en deſſous ; l'élargiſſement du deſſous eſt à proportion plus étendu que dans le cheval, ce qui fait que la figure de cet os eſt plus irrégulière ; la cavité cotyloïde a près de deux pouces de diamètre.

Les os iſchions *(u)* ſont encore plus gros dans le taureau que dans le cheval, la branche qui repréſente le corps de l'os, au lieu d'être cylindrique, comme dans le cheval, a environ deux pouces de largeur de haut en bas, & ſeulement huit lignes à l'endroit le plus épais, & trois pouces trois lignes de longueur depuis le bord poſtérieur de la cavité cotyloïde juſqu'à l'extrémité poſtérieure du trou ovalaire, l'épine eſt plus arrondie que dans le cheval ; les vraies branches des os iſchions ſont unies,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 569 sur 615

& n'en forment qu'une qui a un pouce & demi de largeur dans le milieu ; les côtés extérieurs ſont partie du trou ovalaire ; les tubéroſités des os ſont auſſi réunies & forment une eſpèce de gouttière qui a environ quatre pouces & demi de longueur depuis l'extrémité poſtérieure du trou ovalaire juſqu'à l'extrémité de cette gouttière, qui eſt ſurmontée de chaque côté par une groſſe tubéroſité placée au deſſus de l'épine; la gouttière a quatre pouces deux lignes de largeur dans le milieu, & environ deux pouces neuf lignes de profondeur ; l'extrémité poſtérieure eſt échancrée de deux pouces quatre lignes de profondeur, & les deux extrémités de l'échancrure ſont à quatre pouces & demi de diſtance meſurée de dehors en dehors ; les bords extérieurs, ou pluſtôt ſupérieures *(x)* de la gouttière, ſont beaucoup plus concaves que dans le cheval.

Les os pubis *(y)* ſont à peu près comme dans le cheval : les trous ovalaires ont trois pouces trois lignes de devant en arrière, & deux pouces une ligne de largeur dans le milieu ; le baſſin *(z)* a cinq pouces de largeur & auſſi cinq pouces de hauteur.

L'omoplate *(1)* du taureau a une figure triangulaire, comme celle du cheval, mais le triangle qu'elle forme eſt plus régulier, parce que les côtés ſont moins concaves, & que l'apophyſe coracoïde eſt moins ſaillante ; on n'y diſtingue pas deux éminences, comme dans le cheval ; la cavité glénoïde a environ deux pouces de diamètre ; la longueur de l'omoplate depuis le bord antérieur de la cavité glénoïde juſqu'à la baſe de l'os eſt de douze pouces & demi ; la baſe de l'omoplate a ſix pouces & demi ; l'angle antérieur eſt plus mouſſe que l'extérieur, au contraire de ce qui ſe trouve dans le cheval ; le côté poſtérieur a onze pouces & demi de longueur depuis l'extrémité de la baſe juſqu'au bord poſtérieur de la cavité glénoïde ; le côté

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 570 sur 615

antérieur a onze pouces & demi depuis l'angle antérieur juſqu'au bout de la tubéroſité: l'omoplate n'a que deux pouces de largeur à deux pouces au-deſſus du bord antérieur de la cavité glénoïde; c'eſt à cette hauteur que commence l'épine de l'omoplate, c'eſt auſſi à ce commencement qu'elle eſt le plus élevée, elle a un pouce & demi de hauteur, enſuite elle s'étend juſqu'à la baſe en s'abaiſſant inſenſiblement juſqu'au niveau de cette baſe; l'épine ne laiſſe qu'environ un quart de l'étendue de l'omoplate à ſon côté intérieur, & trois quarts à l'extérieur.

L'humerus *(2)* du taureau a dix pouces & demi de longueur, & cinq pouces de circonférence à l'endroit le plus petit; la tête a environ deux pouces & demi de diamètre, meſuré en ligne droite; elle eſt environnée en devant & un peu ſur les côtés de trois apophyſes, dont deux ſont placées en dedans & la troiſième en dehors; celle-ci eſt auſſi groſſe que les deux autres priſes enſemble, il n'y a qu'une grande gouttière qui ſe trouve entre les deux apophyſes internes; on voit une tubéroſité au-deſſous de l'apophyſe du milieu, & une autre tubéroſité un peu plus bas & au côté extérieur de la première; la ſeconde correſpond à celle qui ſe trouve au même endroit de l'humerus du cheval; la partie ſupérieure de l'os a quatre pouces trois lignes d'épaiſſeur & trois pouces dix lignes de largeur, le milieu du corps de l'os a cinq pouces & demi de circonférence; la partie inférieure reſſemble aſſez à celle de l'humerus du cheval, ſi ce n'eſt que la cavité qui reçoit l'olécrane eſt moins tournée en dehors & moins étroite, & que les bords des poulies ſont plus élevés que dans le cheval; cette extrémité a trois pouces de largeur, & deux pouces neuf lignes d'épaiſſeur ſur le côté inférieur.

L'os du coude *(4)* eſt ſoudé derrière l'os du rayon, il

s'amincit en descendant derrière cet os jusqu'aux os du carpe : l'apophyse de l'olécrane a trois pouces & demi de hauteur, deux pouces quatre lignes de largeur à l'extrémité, & seulement un demi-pouce d'épaisseur à l'endroit le plus mince ; elle n'est pas aussi concave en dedans, ni aussi convexe en dehors que dans le cheval : l'os du coude ne touche l'os du rayon qu'aux deux extrémités, l'intervalle qui les sépare est plus large à environ un pouce & demi au-dessous de l'extrémité supérieure de l'os du rayon, ce qui correspond au trou qui est au même endroit dans le cheval : l'os du coude du taureau a environ neuf lignes de largeur, & quatre lignes à l'endroit le plus épais.

L'os du rayon *(5)* a dix pouces de longueur, mesuré sur le côté intérieur qui est le plus long, parce que la partie inférieure de l'os est plus alongée de ce côté que du côté extérieur; il est concave sur la longueur de sa face postérieure, mais l'antérieure n'est pas convexe, si ce n'est un peu dans le bas; l'extrémité supérieure de l'os du rayon est aussi large à proportion que dans le cheval; elle a trois pouces de largeur, un pouce & demi d'épaisseur du côté intérieur, & seulement un pouce sur le côté extérieur; cet os est plus large qu'épais, sa face postérieure est plus plate sur sa largeur, & l'antérieure est un peu convexe, il a un pouce & demi de largeur dans le milieu & onze lignes d'épaisseur; l'extrémité inférieure est terminée de chaque côté par une apophyse styloïde; cette extrémité a trois pouces de largeur & un pouce cinq lignes à l'endroit le plus épais, qui est le milieu.

Le fémur *(6)* a treize pouces de longueur, y compris le grand trochanter, le cou de la tête n'est pas mieux marqué que dans le cheval, la tête a un pouce huit lignes de diamètre; le grand trochanter paroît plus gros, moins élevé & plus épais.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 572 sur 615

que dans le cheval; le petit trochanter eſt auſſi moins ſaillant, il n'y a point d'apophyſe au côté oppoſé; cet os n'eſt pas courbe, on n'y reconnoît pas mieux les trois faces que dans le cheval, il a cinq pouces de diamètre dans le milieu; l'extrémité inférieure reſſemble à celle du cheval, elle a trois pouces trois lignes de largeur, & cinq pouces à l'endroit le plus épais.

Les rotules *(7)* ſont terminées en pointe par le bas, elles ont deux pouces & demi de longueur, deux pouces moins une ligne de largeur, & quatorze lignes à l'endroit le plus épais; la face antérieure eſt fort inégale, le côté intérieur ne forme point d'angle comme l'extérieur.

Le tibia *(8)* du taureau eſt aſſez reſſemblant à celui du cheval, il a treize pouces de longueur, l'extrémité ſupérieure a les bords plus ſaillans, l'épine eſt plus élevée, mais il n'y a point de gouttière; la tête du tibia a trois pouces neuf lignes de largeur, & environ trois pouces deux lignes à l'endroit le plus épais, le corps de l'os eſt triangulaire, comme celui du cheval; il a quatre pouces quatre lignes de circonférence à ſa partie moyenne inférieure; l'extrémité inférieure eſt à peu près ſemblable à celle de l'os du cheval, quoique les malléoles ſoient moins élevées, elle a deux pouces cinq lignes d'une malléole à l'autre, & un pouce neuf lignes d'épaiſſeur au côté intérieur qui eſt le plus épais. Je n'ai point vû de péroné ni aucune épine que l'on pût rapporter au péroné, comme dans le cheval.

Le carpe *(9)* du taureau n'eſt compoſé que de ſix os diſpoſés en deux rangs; il y en a quatre dans le premier, comme dans le cheval, & ſeulement deux dans le ſecond : nous ſommes encore obligés de comparer les os du carpe & du tarſe du taureau à ceux de l'homme, comme nous l'avons déjà fait pour

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 573 sur 615

le carpe & le tarſe du cheval, parce que ces os ſont mieux connus dans l'homme que dans aucun des animaux. On pourroit trouver entre les os du premier rang du carpe du taureau & ceux de l'homme, à peu près les mêmes rapports de figure & de ſituation qui ont été obſervés dans la deſcription du carpe du cheval, ſur-tout pour la poſition de l'os du taureau, qui correſpond à l'os piſiforme; mais ceux du ſecond rang ne reſſemblent pas même à ceux du cheval, ils ſont larges & plats, & l'interne eſt plus grand que l'externe.

Il y a ſix os dans le tarſe *(10)* du taureau, comme dans celui du cheval, mais ils ne ſont pas diſpoſés de la même façon dans l'un & dans l'autre de ces animaux; des ſix os du tarſe du taureau il n'y en a que cinq qui correſpondent à ceux du tarſe du cheval, le ſixième eſt placé au deſſous de la partie extérieure & inférieure du tibia à côté de l'aſtragal, & ſur la partie inférieure du calcaneum, à peu près comme l'extrémité inférieure du péroné, que l'on appelle dans l'homme la *malléole externe;* le calcaneum du taureau & l'aſtragal reſſemblent beaucoup à ces mêmes os vûs dans le cheval; mais l'os auquel on pourroit donner le nom de *ſcaphoïde* dans le taureau, parce qu'il eſt placé ſous l'aſtragal, s'étend auſſi ſous le calcaneum, & tient par conſéquent la place du ſcaphoïde & du cuboïde relativement à l'homme: reſtent deux os dans le taureau, qui ſont preſque ſemblables à ceux du tarſe du cheval que nous avons comparés aux os cunéiformes du tarſe de l'homme.

Le calcaneum a quatre pouces neuf lignes de longueur, quinze lignes de largeur, & ſeulement neuf lignes à l'endroit le plus mince; l'os cunéiforme & le ſcaphoïde pris enſemble, ont treize lignes de hauteur.

Les os des canons ſont ſillonnés ſur leur longueur dans la face

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 574 sur 615

de devant par une gouttière, qui eſt plus profonde ſur les canons des jambes de derrière que ſur ceux des jambes de devant.

Les canons *(11)* des jambes de devant ont ſept pouces deux lignes de longueur, ſeize lignes de largeur dans le milieu, & environ deux pouces quatre lignes à chaque extrémité, cependant l'inférieure étoit un peu plus large que la ſupérieure; le milieu du corps de l'os a onze lignes d'épaiſſeur, & les extrémités quatorze lignes aux endroits les plus épais; la partie voiſine de l'extrémité inférieure n'a que onze lignes.

Les canons *(12)* des jambes de derrière ont huit pouces de longueur, un pouce de largeur dans le milieu de l'os, un pouce neuf lignes à l'extrémité ſupérieure, & deux pouces deux lignes à l'inférieure; le milieu du corps de l'os a quatorze lignes d'épaiſſeur priſe ſur le bord intérieur de la gouttière qui eſt le plus élevé; l'extrémité ſupérieure a un pouce ſept lignes d'épaiſſeur, & l'inférieure ſeulement quatorze lignes; la partie voiſine de cette extrémité n'a qu'un pouce.

Il y a dans le taureau, derrière chacun des os des canons, au côté ſupérieur & extérieur dans les jambes de devant, & au côté ſupérieur & intérieur dans celles de derrière, un petit os qui n'avoit que neuf lignes de longueur dans les jambes de derrière, & un pouce dans celles de devant, ſelon les obſervations que j'ai faites ſur deux ſujets frais, car ces petits os manquent dans le ſquelette dont il s'agit ici; ils ne s'articulent pas avec les os du carpe ni avec ceux du tarſe, cependant on peut juger par leur ſituation & par leur figure, qu'ils correſpondent aux épines des os des canons du cheval; mais on ne trouve pas dans les os des canons du taureau les mêmes rapports que dans ceux du cheval, relativement aux os du métacarpe & du métatarſe des animaux à cinq doigts.

Les

Les os des premières phalanges (13) de tous les pieds, ont un pouce onze lignes de longueur, leur extrémité ſupérieure a quinze lignes de largeur dans les pieds de derrière, & ſeulement quatorze dans les pieds de devant; l'extrémité inférieure a quatorze lignes de largeur dans les os intérieurs des jambes de derrière, & ſeulement un pouce dans les os extérieurs : cette largeur eſt auſſi d'un pouce dans tous les os des premières phalanges des pieds de devant, & celle du corps de l'os de dix lignes; les os extérieurs des jambes de derrière ont la même largeur, mais les intérieurs ont un pouce de large; tous ces os ont neuf lignes d'épaiſſeur au-deſſus de leur extrémité inférieure, à l'endroit le plus mince.

Il ſe trouve derrière l'articulation de chacun des os des premières phalanges avec l'os du canon, deux os ſéſamoïdes, de figure fort irrégulière; ainſi il y a quatre os ſéſamoïdes dans chaque pied du taureau, deux à chaque doigt.

Derrière chaque paire d'os ſéſamoïdes ſont placés deux autres oſſelets, dont l'un eſt très-petit, le plus gros touche aux parois intérieures de l'ergot; le tendon du muſcle fléchiſſeur du doigt paſſe entre les os ſéſamoïdes & les oſſelets de l'ergot.

Les os des ſecondes phalanges (14) ont environ quatorze lignes de longueur dans tous les pieds, leur largeur eſt de dix lignes, & l'épaiſſeur de onze lignes dans les endroits les plus minces & les plus étroits.

La dernière phalange, qui eſt renfermée dans le ſabot (15), a un pouce dix lignes de longueur, dix lignes à l'endroit le plus large, & un pouce neuf lignes à l'endroit le plus épais.

Il y a derrière l'articulation de l'os de la troiſième phalange de chaque doigt avec l'os de la ſeconde phalange, un os de

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 576 sur 615

forme irrégulière, qui correſpond à l'os de la noix du cheval, quoiqu'il en diffère pour la figure.

On trouve dans le cœur du bœuf, au-deſſous de la valvule ſigmoïde qui eſt derrière l'oreillette droite, un os oblong qui ſuit la courbure de l'entrée du ventricule gauche, & un autre os plus petit, mais à peu près de même figure que le premier, à l'entrée du même ventricule au-deſſous de la valvule ſigmoïde qui eſt derrière l'oreillette gauche; le grand os du cœur, pris dans un ſujet de grandeur médiocre, avoit deux pouces trois lignes de longueur meſurée ſur la grande courbure de l'os, environ quatre lignes de hauteur, & une ligne d'épaiſſeur ſur la plus grande partie de ſa longueur; le petit os n'avoit qu'environ un demi-pouce de longueur.

Comme les animaux à pied fourchu ſont plus nombreux que les ſolipèdes, & que nous en avons encore pluſieurs à décrire, nous ne plaçons pas à la ſuite de la deſcription du taureau les réflexions que nous avons à faire ſur le caractère de pied fourchu, quoique nous ayons fait mention du caractère de ſolipède immédiatement après avoir décrit le cheval : ce ne ſera donc qu'après avoir donné la deſcription de pluſieurs animaux à pied fourchu, que nous examinerons en quoi conſiſte ce caractère, quelle eſt ſa valeur, & quel rapport il a avec le caractère de ſolipède & avec celui de fiſſipède.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 577 sur 615



De Seve delin. C. Baquoy

ECOLE SUPÉRIEURE DE PHARMACIE DE PARIS BIBLIOTHÈQUE



Fig. 2.





Fig. 1.



De Seve del.

Basan sc.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 580 sur 615




Fig. 1.





Fig. 3.




Fig. 2.



D. S. del.

C. Baquoy

BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUT DE FRANCE PARIS




D.S.

C. Baquoy. Scalp.

ÉCOLE DE PHARMACIE






D. S. del. Motte Sculp.

BIBLIOTHÈQUE DE PHARMACIE DE PARIS





D. S. del.

Moitte Sculp.


BIBLIOTHÈQUE DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE PARIS





Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 590 sur 615





BIBLIOTHÈQUE DE PHARMACIE




Fig. 1.




Fig. 2.





Fig. 3.





E P

De Seve del.


Basan sc.

BIBLIOTHÈQUE DE PHARMACIE





D. S. del. Moitte Sculp.



DESCRIPTION

DE LA PARTIE DU CABINET

qui a rapport à l'Hiſtoire Naturelle

DU TAUREAU.

N.° CDXXXVII.

Sédiment de la liqueur de l'allantoïde de taureau.

CETTE pièce eſt conſervée dans l'eſprit-de-vin.

N.° CDXXXVIII.

Fœtus de taureau.

Le corps eſt courbé, de ſorte que l'épine eſt convexe ſur ſa longueur; cet embryon a deux pouces de longueur meſurée ſelon la courbure depuis le ſommet de la tête juſqu'à l'anus; la tête a quatre lignes de longueur meſurée en ligne droite depuis le bout du muffle juſqu'au milieu du ſommet, & un pouce de circonférence priſe à l'endroit le plus gros; la longueur de la queue eſt de quatre lignes; les jambes de devant ont quatre lignes de longueur depuis le coude juſqu'à l'extrémité, & celles de derrière ont la même longueur depuis la rotule juſqu'au bout du pied; le ventre eſt fort gros, la bouche, les yeux, le pied fourchu & la queue ſont bien formés, &c. ce fœtus eſt conſervé dans l'eſprit-de-vin.

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 598 sur 615

N.° CDXXXIX.

Autre fœtus beaucoup plus grand que le précédent.

On reconnoît ſur ce fœtus les marques qui déſignent les endroits où les cornes devoient ſe former dans la ſuite; on voit les mamelons au devant du ſcrotum, le ſillon tranſverſal qui eſt autour des ſabots, &c. ce fœtus eſt conſervé dans l'eſprit-de-vin, comme le précédent.

N.° CDXL.

Les quatre eſtomacs d'un fœtus de taureau.

Ces quatre eſtomacs ont été remplis d'eſprit-de-vin, & ils reſtent plongés dans cette liqueur; ils ſont dans leur ſituation naturelle les uns relativement aux autres.

N.° CDXLI.

Les principaux vaiſſeaux ſanguins d'un veau injectés.

Cette pièce a été tirée d'un veau tout nouveau né ou très-près du terme, on y voit la plus grande partie de la trachée-artère, deſſéchée, avec les principales ramifications des bronches; le cœur a la pointe en haut, il eſt injecté, & il a environ neuf pouces & demi de circonférence à ſa baſe, ſa pointe eſt mouſſe, on y voit les artères coronaires injectées & colorées en rouge, comme toutes les autres artères de cette pièce, & les oreillettes injectées & colorées en bleu, comme toutes les veines; on reconnoît bien diſtinctement l'aorte & l'artère pulmonaire, la veine-cave & les veines pulmonaires, avec l'origine de leurs principales ramifications; on voit l'aorte deſcendante, & la

bifurcation des iliaques qui ſont tronquées à quelque diſtance de leur origine, de même que les autres artères qui ſortent de l'aorte ; les artères ombilicales s'étendent de chaque côté de la veſſie juſqu'à l'ombilic, on les a conſervées au dehors pour faire voir une portion des vaiſſeaux du cordon ombilical ; l'ouraque eſt injecté & coloré en blanc, de même que l'ombilic & la veſſie ; la veine du cordon ombilical paſſe dans l'ombilic avec les artères ombilicales & l'ouraque ; la veine ombilicale eſt prolongée juſque dans la veine-porte, dont on a exprimé un grand nombre de ramifications, de même que celles des veines hépatiques ; on voit auſſi la veine-cave deſcendante, & la bifurcation des veines iliaques.

Cette pièce eſt attachée ſur une grille de bois & montée ſur des fils de fer ; il y a ſur la même grille deux autres pièces, une de chaque côté de celle qui vient d'être décrite, elles ſont de même nature, mais elles ont été tirées de fœtus beaucoup plus jeunes ; dans celle qui eſt à droite la baſe du cœur a environ cinq pouces neuf lignes de circonférence, & dans celle qui eſt à gauche ſeulement quatre pouces.

N.° CDXLII.

Rate de veau injectée & conſervée dans l'eſprit-de-vin.

Cette rate a été, pour ainſi dire, décharnée par la macération, & ſes vaiſſeaux ſont injectés juſque dans les petites ramifications.

N.° CDXLIII.

Rate de veau injectée & deſſéchée.

L'artère a été injectée de façon que l'on voit ſes petites

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 600 sur 615

ramifications ; cet assemblage de vaisseaux est étendu sur une portion de l'enveloppe de la rate.

N.° CDXLIV.

Parties disséquées sur une vache monstrueuse.

Cette vache a été vue en 1745 à Paris, où elle mourut l'année suivante; elle fut disséquée par M. Suë, Démonstrateur en Anatomie à l'Académie Royale de Peinture; le monstre dont il s'agit avoit les quatre jambes à l'ordinaire, & une cinquième placée à la partie supérieure du dos entre les omoplates, & attachée par des ligamens aux vertèbres antérieures du dos & aux vertèbres postérieures du cou; cette jambe se recourboit en avant, & portoit près de son extrémité postérieure une tumeur de la grosseur de la tête d'un homme, recouverte d'un poil très-court & très-blanc; cette tumeur étoit la partie du monstre qui paroissoit la plus merveilleuse, parce qu'on avoit trouvé moyen de lui donner quelque ressemblance avec une face humaine en rasant le poil sur un espace ovale & proportionné à l'étendue du visage d'un homme, & en formant dans quelques endroits de cet espace des éminences & des enfoncemens pour marquer des apparences du nez, des yeux, de la bouche, &c. quelque grossier que fût cet artifice, il suffisoit pour attirer le peuple toujours avide du merveilleux : la vache étant morte, M. Suë l'ouvrit & ne découvrit rien de singulier dans le ventre ni dans la poitrine, si ce n'est une pierre dans la véscule du fiel; cette pierre étoit grosse comme le poing & d'une très-belle couleur jaune; après avoir enlevé la peau qui recouvroit la tumeur, que l'on avoit voulu faire passer pour une tête, il se trouva des pelotons graisseux dans

l'épaiſſeur d'un kiſte rempli d'une matière qui reſſembloit en partie à du ſuif, & en partie à de la lie de vin.

On conſerve au Cabinet les os de la cinquième jambe, attachés par leurs propres ligamens, & quelques portions des vertèbres auxquelles cette jambe tient : on garde auſſi les os de la jambe droite de devant, pour faire voir que la cinquième étoit plus courte que les quatre autres, la jambe droite a deux pieds dix pouces de longueur depuis l'extrémité ſupérieure de l'humerus juſqu'au bas du ſabot, & la cinquième jambe n'a que deux pieds & demi de longueur meſurée ſur ſa courbure, car cette jambe étoit convexe en deſſus & concave en deſſous; dans la poſition où elle ſe trouvoit ſur le cou de la vache, la face poſtérieure étoit en deſſous & l'antérieure en deſſus; il paroît que c'eſt une jambe gauche de devant, cependant il n'y a que des doigts & l'os du métacarpe qui ſoient bien formés : on ne peut pas diſtinguer les os du carpe, parce qu'ils ſont recouverts par des cartilages & des ligamens; les os de l'avant-bras ſont très-difformes, ſur-tout celui du coude, qui eſt preſque auſſi gros que l'os du rayon & qui n'a point d'olécrane; l'os qui eſt au-deſſus de ceux de l'avant-bras ne reſſemble en rien à un humerus, ſi ce n'eſt par la longueur & par la groſſeur : la loupe dont il a déjà été fait mention eſt attachée par un fort ligament à la face inférieure de cet os, conſidéré dans l'état où il ſe trouvoit ſur le cou de la vache; la tumeur eſt poſée du côté droit, ſa figure eſt ovale, elle a environ un pied quatre pouces & demi de circonférence ſur ſon grand diamètre, & quatorze pouces ſur le petit; la membrane qui la forme eſt tranſparente, on y voit les impreſſions auxquelles on attribuoit la reſſemblance d'une face humaine, & il paroît qu'elle avoit auſſi été reſſerrée dans la partie antérieure, pour former par cet étranglement un cou

& un menton; au reſte, il n'y auroit rien d'étonnant quand les impreſſions & l'étranglement ſeroient naturels, & il n'y auroit pour cela aucun rapport entre cette tumeur & la tête d'un homme.

N.° CDXLV.

Os de cœur de bœuf.

Il y en a deux, un grand & un petit, dont il a été fait mention dans la deſcription du taureau.

N.° CDXLVI.

Pierres de la véſicule du fiel d'un bœuf.

Ces pierres ont été diviſées en pluſieurs fragmens, & il y en a de deux ſortes, les uns ſont d'une ſubſtance denſe & liſſe, ils ont des faces concaves, qui ſemblent avoir été formées par la rencontre d'autres pierres rondes; la ſubſtance des autres fragmens eſt groſſière & inégale, mais tous ſont très-friables, fort légers, de couleur brune, & compoſés de couches concentriques: cette matière eſt un peu amère & paroît n'être que du fiel épaiſſi.

N.° CDXLVII.

Bézoard du rein d'un bœuf.

Ce bézoard eſt d'une forme à peu près ovoïde, ſon grand diamètre eſt d'un pouce, & le petit d'environ dix lignes; d'un des bouts de l'ovoïde eſt liſſe & de couleur blanchâtre; le reſte de ce bézoard eſt hériſſé de pointes & de tubercules de différentes figures, & de couleur rouſſâtre: la ſubſtance de cette pierre

pierre eſt dure, & blanche lorſqu'elle eſt entamée; elle pèſe deux gros & ſoixante-dix grains.

N.° CDXLVIII.

Égagropile de taureau.

Elle eſt preſque ronde, elle a environ deux pouces & demi de diamètre, elle eſt encroûtée & liſſe; ſon écorce a été enlevée dans un endroit où on voit le poil dont elle eſt compoſée intérieurement : ſon poids eſt de deux onces trois gros.

N.° CDXLIX.

Égagropile de bœuf.

Cette égagropile eſt d'une figure irrégulière, mais arrondie, qui a deux pouces ou deux pouces cinq lignes de diamètre; elle eſt ſans croûte & de couleur griſe : elle pèſe une once trois gros & vingt-quatre grains.

N.° CDL.

Égagropile ſans croûte, dans laquelle il y a du foin.

Elle eſt à peu près de figure ovoïde, dont le grand diamètre a deux pouces trois lignes, & le petit un pouce cinq à ſept lignes; ſon poids eſt de quatre gros & onze grains; elle eſt compoſée d'une ſorte de feutre très-ſerré, de couleur cendrée : on voit quantité de brins de foin qui paroiſſent au dehors à découvert.

N.° CDLI.

Égagropile ſans croûte & d'un tiſſu lâche.

Ces égagropiles ſont compoſées de poils roux peu ſerrés les

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 604 sur 615

uns contre les autres, de ſorte qu'on fait céder la maſſe qu'ils compoſent en la preſſant avec la main; la pluſpart de ces égagropiles ſont rondes ou arrondies, il y en a d'autres qui ſont aplaties; les poils qui forment les contours ſont en partie détachés, de ſorte qu'on les arrache aiſément; elles ſont fort légères: pour juger de leur poids par rapport à leur volume, il ſuffit de rapporter que l'une, dont le diamètre eſt d'un pouce & demi, ne pèſe que deux gros.

N.° CDLII.

Égagropiles ſans croûte & d'un tiſſu ſerré.

Elles ſont d'une couleur griſe plus ou moins foncée; il y en a quelques-unes de jaunâtres; les poils qui les compoſent ſont ſi bien appliqués les uns contre les autres, qu'on ne peut pas les faire céder en les preſſant avec la main; ils ſont collés juſqu'à leur extrémité, & dirigés en différens ſens: ces égagropiles ſont plus peſantes que les précédentes; l'une, dont le diamètre eſt d'environ deux pouces, pèſe une once un gros & demi.

N.° CDLIII.

Deux égagropiles ſans croûte & d'un tiſſu ferme.

Ces égagropiles ſont auſſi fermes que celles qui ſont encroûtées; leur tiſſu eſt ſi fin, que ce n'eſt qu'en les entamant qu'on peut reconnoître qu'elles ſont compoſées de poils; leur couleur eſt jaunâtre; elles ſont rondes, & d'environ quinze lignes de diamètre: il n'y en a qu'une qui ſoit entière, elle pèſe deux gros.

N.° CDLIV.

Égagropile dont l'écorce eſt inégale.

L'écorce de ces égagropiles eſt grenue, tuberculeuſe, pliſſée

& inégale, ce qui les rend de figure plus ou moins irrégulière; cependant la pluſpart ſont rondes ou arrondies; la couleur eſt brune dans les unes & rouſſeâtre dans les autres.

N.° CDLV.

Égagropiles dont l'écorce paroît double dans quelques endroits.

La ſurface de ces égagropiles eſt fort inégale; l'écorce eſt plus élevée dans certains endroits que dans d'autres, & forme des rebords qui feroient croire que ce ſeroit une ſeconde écorce appliquée ſur celle que l'on voit au-deſſous de ces rebords, mais en les enlevant on reconnoît que l'inégalité de l'écorce eſt cauſée par l'inégalité de la ſubſtance intérieure: les égagropiles dont il s'agit ici ſont différentes les unes des autres, pour la groſſeur, la figure & la couleur; il y en a de rondes, de plates & de figure irrégulière; les unes ſont brunes, & les autres ſont griſes.

N.° CDLVI.

Égagropiles dont l'écorce eſt unie.

Elles ſont d'un brun noirâtre ou rouſſeâtre; les plus petites n'ont qu'environ ſeize lignes de diamètre, & ne pèſent que quatre gros.

N.° CDLVII.

Très-groſſe égagropile.

Cette égagropile eſt ronde & un peu aplatie; ſon diamètre le plus grand eſt de quatre pouces & demi, & le petit de trois pouces dix lignes; elle eſt revêtue d'une écorce liſſe & jaunâtre,

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 606 sur 615

à travers laquelle il paſſe quelques poils : elle pèſe neuf onces un gros & quarante-deux grains.

N.° CDLVIII.

Le ſquelette d'un taureau.

Ce ſquelette a été tiré d'un jeune ſujet : on y voit les joints des épiphyſes; c'eſt celui qui a ſervi pour la deſcription du taureau. La tête a deux pieds quatre pouces de circonférence, priſe au devant des cornes & ſur les angles des mâchoires; la circonférence du coffre eſt de cinq pieds; le train de devant a quatre pieds trois pouces de hauteur depuis terre juſqu'à l'apophyſe épineuſe la plus élevée de toutes celles des vertèbres; le train de derrière a quatre pieds depuis terre juſqu'à l'angle extérieur de l'os de la hanche.

N.° CDLIX.

Tête de vache décharnée.

N.° CDLX.

Tête de bœuf décharnée.

N.° CDLXI.

Très-grande corne de bœuf.

Cette corne vient du côté gauche, elle eſt courbée en dehors, & ſon extrémité eſt recourbée en avant; ſa longueur meſurée ſur le côté convexe eſt de trois pieds ſix pouces & demi, & ſeulement de deux pieds deux pouces ſix lignes ſur le côté concave; le diamètre de la baſe eſt d'environ ſept pouces; la groſſeur diminue uniformément juſqu'à l'extrémité qui a été

tronquée, à l'endroit où la corne a quatorze lignes de diamètre; les bords de la baſe ont auſſi été limés, par conſéquent cette corne a été raccourcie, mais de peu par la baſe, car les bords n'ont qu'environ une ligne d'épaiſſeur; elle eſt creuſe dans toute ſon étendue, les parois de l'extrémité ont trois lignes d'épaiſſeur à l'endroit où elle a été tronquée; on voit le jour à travers les parois dans toute l'étendue de la cavité, que la courbure permet de voir en regardant par l'ouverture de la baſe; il ne paroît pas que cette corne ait été apprêtée, cependant il y a un anneau de même matière qui eſt à ſeize lignes au-deſſous de l'extrémité tronquée & qui a ſept lignes de largeur, & environ deux lignes d'épaiſſeur dans le milieu; cet anneau n'a pas été ajoûté, car on n'en voit pas le joint, il faudroit donc qu'on l'eût formé en enlevant de la ſubſtance de la corne au-deſſus & au-deſſous, mais dans ce cas cette partie auroit été bien plus groſſe avant que d'être travaillée, & la corne bien plus longue; la couleur eſt la même que celle des cornes de taureau & de bœuf: cette pièce pèſe ſept livres moins un quart.

N.° CDLXII.

L'os hyoïde du bœuf.

Cette pièce eſt celle dont il a été fait mention dans la deſcription du taureau; tous les os qui la compoſent tiennent les uns aux autres par leurs cartilages.

N.° CDLXIII.

Le ſquelette d'un veau monſtrueux.

Toute la partie poſtérieure de ce ſquelette eſt double depuis

Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet ... - page 608 sur 615

la ſixième vertèbre dorſale, de ſorte que dans toute cette étendue la colonne vertébrale forme deux branches, dont chacune eſt terminée par une queue & porte un baſſin & deux jambes de derrière : la partie antérieure du ſquelette eſt ſimple, c'eſt-à-dire qu'il n'y a que ſix vertèbres dorſales, deux omoplates, deux jambes de devant, ſept vertèbres cervicales, & la tête : pluſieurs des côtes ſont unies les unes aux autres en tout ou en partie de leur longueur ; les ſix premières vertèbres dorſales portent ſix côtes de chaque côté, qui aboutiſſent en bas à un ſternum, comme à l'ordinaire; les ſept autres vertèbres dorſales de chacune des branches de la colonne vertébrale, dont il a déjà été fait mention, ſoûtiennent ſept côtes de chaque côté de chacune des branches, celles des côtés antérieurs aboutiſſent au même ſternum que les côtes des ſix premières vertèbres dorſales, les ſept côtes des côtés poſtérieurs de chacune des branches de la colonne vertébrale ſont dirigées en arrière, & aboutiſſent à quelques fragmens d'un ſecond ſternum fort irrégulier : la tête de ce ſquelette a ſix pouces & demi de longueur meſurée en ligne droite, & un pied de circonférence priſe ſur les angles de la mâchoire inférieure & ſur les bords poſtérieurs des orbites; le train de devant a un pied trois pouces de hauteur depuis terre juſqu'au deſſus des apophyſes épineuſes les plus élevées de toutes celles des vertèbres dorſales; les quatre jambes de derrière ont chacune environ un pied quatre pouces & demi de hauteur depuis terre juſqu'à l'angle extérieur de l'os des hanches : l'épine de ce ſquelette monſtrueux eſt contournée, de ſorte qu'il n'eſt pas aiſé d'en donner les dimenſions.

N.° CDLXIV.

Le ſquelette d'un autre veau monſtrueux.

Ce ſquelette eſt double dans toutes ſes parties, excepté la tête qui eſt unique, mais l'os occipital a deux trous auxquels aboutiſſent les deux colonnes vertébrales; les vertèbres cervicales ſont ſituées de façon que les apophyſes épineuſes ſont dirigées en dehors, & que la face inférieure des corps des vertèbres de l'une des colonnes eſt tournée en dedans, & oppoſée à la face inférieure du corps des vertèbres de l'autre colonne; les vertèbres dorſales ſont à peu près dans la même ſituation, de ſorte que les côtes des côtés ſupérieurs de chacune des colonnes vertébrales aboutiſſent à un ſternum qui eſt poſé en haut, & les côtes des côtés inférieurs des mêmes colonnes aboutiſſent en bas à un autre ſternum qui eſt oppoſé au premier; il y a environ trois pouces de diſtance entre les deux: les portions des colonnes vertébrales compoſées par les vertèbres dorſales, forment une convexité au dehors de chaque côté, & ſont éloignées l'une de l'autre d'environ quatre pouces à cet endroit: dans cette poſition des deux thorax réunis en un ſeul, il ſe trouve en haut deux omoplates & deux jambes de devant, & en bas deux autres omoplates & deux autres jambes de devant; les dernières vertèbres dorſales de la colonne gauche ſont poſées dans leur ſituation naturelle, de même que le baſſin & les deux jambes de derrière; mais toute la colonne vertébrale du côté droit & le baſſin ſont inclinés de façon que la jambe de derrière du côté gauche eſt en haut, & que celle du côté droit eſt en bas; l'extrémité de la mâchoire ſupérieure ſemble n'avoir pas été formée, de ſorte que la mâchoire inférieure déborde de beaucoup en avant: on ne peut guère juger de l'âge du

ſujet dont ce ſquelette a été tiré, que par la longueur des jambes; celle du train de devant eſt de dix pouces depuis l'extrémité de la corne juſqu'au deſſus des apophyſes épineuſes des premières vertèbres dorſales; les trains de derrière ont dix pouces & demi de longueur depuis l'extrémité des ſabots juſqu'à l'angle extérieur des os des hanches.

N.° CDLXV.

Tête du ſquelette d'un veau monſtrueux.

Elle n'a que dix pouces & demi de circonférence priſe au deſſus des yeux; la fontanelle eſt fort ouverte; la tête, poſée ſur la mâchoire inférieure, a quatre pouces & demi de hauteur; le corps de la mâchoire inférieure eſt fort convexe en deſſous ſur ſa longueur, & beaucoup plus à proportion qu'il ne l'eſt dans l'adulte; la mâchoire ſupérieure eſt enfoncée à l'endroit qui ſe trouve au deſſous des os propres du nez, elle eſt comprimée par les côtés au devant de cet enfoncement, & tournée à droite dans toute ſa longueur juſqu'à l'extrémité, qui n'eſt pas, à beaucoup près, auſſi avancée que la mâchoire inférieure, dont l'extrémité antérieure eſt dirigée en haut, & dont les dents ſont rangées les unes devant les autres.

Fin du quatrième volume.



