

Bibliothèque numérique

medic @

**Dictionnaire des spécialités
pharmaceutiques ; Vidal. Le
dictionnaire ; Dictionnaire de
spécialités pharmaceutiques**


*Paris : Office de vulgarisation pharmaceutique, 1914.
Cote : P 11247*

1914

3 fr.

=====
=====
D I C T I O N N A I R E
D E S S P É C I A L I T É S
P H A R M A C E U T I Q U E S
(Fiches Pharmacologiques)

VIDAL et GEORGE



P11247-1914

1914

3 fr.

Don 2010


==== Dictionnaire ====
DES SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES


(Fiches Pharmacologiques)

Encha de fait

VIDAL et GEORGE

==== 123, Rue Lafayette ====
==== PARIS =====





LETTRE PRÉFACE

MONSIEUR LE DOCTEUR,

L'accueil fait par le corps médical aux Fiches pharmacologiques a été trop bienveillant, trop flatteur aussi, pour que nous ne recherchions pas, dans le domaine qui est le nôtre, tous les moyens de reconnaître cette faveur et de la mériter mieux encore.

Un regret nous avait été fréquemment exprimé par les nombreux médecins qui ont bien voulu, dans leurs lettres ou dans les conversations que nous avons eues avec eux, nous donner leur avis sur la façon dont nous avons mis à exécution l'idée de M. le Docteur Perrin (de Nancy) :

« Votre fichier, nous a-t-on dit, rend de grands services pour la prescription des spécialités, mais c'est seulement chez lui que le praticien peut l'utiliser. »

C'est pour répondre à cette remarque et correspondre au désir qu'elle semblait contenir, que nous avons créé le présent Dictionnaire.

Il reproduit, sous une forme portative, les Fiches pharmacologiques et nous nous sommes attachés à le rendre aussi pratique et aussi complet dans son genre que l'ont été ses devancières.

Nous osons croire qu'il recueillera, comme elles, votre entière approbation, si, tel que nous vous le présentons, notre Dictionnaire vous rend quelques services, notre but sera atteint et rien ne nous sera plus agréable.

L. VIDAL & H. GEORGE.

LETTERS PRÉFACE

Monsieur le Docteur,

L'honneur m'est parvenu de votre lettre du 15 courant, par laquelle vous m'informez que vous avez l'honneur de m'adresser un exemplaire de votre ouvrage intitulé "Recherches sur les propriétés thérapeutiques de l'arsenic". J'ai l'honneur de vous en remercier et de vous adresser ci-joint un exemplaire de ce livre. Je suis persuadé que votre ouvrage sera très utile à nos confrères et que vous aurez obtenu le succès que vous méritez. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Docteur, l'assurance de ma haute estime et de ma haute considération.

Le Directeur
M. VIDAL & H. GEORGE

A

ACIDE ACÉTOSALICYLIQUE HEYDEN

(COMPRIMÉS)

Dérivé de l'acide salicylique

Comprimés dosés à 0,50 cgr. par unité

Doses et mode d'emploi. — Adultes :
dose unique : 1 à 2 comprimés.
Dose journalière : jusqu'à 10 comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes celles de l'acide salicylique sans ses effets secondaires : antirhumatismal et antinévralgique.

Indications. — Rhumatismes musculaires et articulaires, Pleurésie rhumatismale, Névralgies, Maux de tête.

1 fr. 25 le tube de 20 comprimés

Produits HEYDEN

29 et 31, Rue Philippe-de-Girard
PARIS (X^e)

A

ADRENALINE BYLA

(Syn : adrénamine)

Délivrée : *Basique* en tubes de 0,50 cgr.

Solution à 1 pour 1000 (flacons de 30 et 15 gr.).

On emploie la solution à 1/1000 dans le badigeonnage des muqueuses et les instillations oculaires; mais on a également recours à des solutions plus étendues, telles que 1/3000, 1/5000 et 1/10000 (Laryngites, Coryza, etc.). La solution hypodermique s'utilise à la dose de 1 à 2 cm³.

La solution-mère à 1/1000 s'administre encore par voie stomacale sous forme de vin ou de sirop à la dose de 5 à 30 gouttes. On peut aussi présenter l'Adrénaline à l'état de pastilles, tablettes ou granules dosés à 1 mgr.

Propriétés thérapeutiques. — Le plus puissant des hémostatiques connus, énergiquement vaso-constrictive, décongestionnante.

Indications. — Affections de muqueuses, nez, gorge, oreilles, oculaires, cœur; Hémorragies diverses, Dermatoses et en chirurgie opératoire ou dentaire.

1 fr. 50 le flacon de 15 gr.

3 francs le flacon de 30 gr.

3 fr. 50 le tube de 5 cm³

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

ADRÉNALINE CLIN

Principe actif vasoconstricteur
des glandes surrénales

- Formes.** — 1° *Solution d'Adrénaline Clin* au 1000^e, flacons de 5 et 30 cm³. Prix : 1 fr. 50 et 3 fr.
- 2° *Collyre d'Adrénaline Clin* au 1/5000^e et au 1/1000^e, en ampoules compte-gouttes de 10 cm³. Prix : 3 fr. (1/5000^e), et 3 fr. 50 (1/1000^e) l'ampoule compte-gouttes. Associations : Collyres Clin, *Adrénaline-Cocaine*, *Adrénaline-Esérine* en ampoules compte-gouttes de 10 cm³.
- 3° *Granules d'Adrénaline Clin*, dosés à 1/4 de mgr. Prix : 4 fr. le flacon de 50 granules.
- 4° *Suppositoires d'Adrénaline Clin* à 1/2 mgr. Prix : 3 fr. 50 la boîte de 10 suppositoires.
- 5° *Tubes stérilisés d'Adrénaline Clin*, en solution titrée à 1/2 mgr. par cm³, en boîte de 10 tubes, et en solution titrée à 1/10^e de mgr. en boîte de 6 tubes. Prix : 6 fr. la boîte de 10 tubes (1/2 mgr.); 1 fr. 75 la boîte de 6 tubes (1/10^e de mgr.) Associations : Tubes stérilisés Clin à l'*Adrénaline Cocaine*, *Adrénaline-Stovaine*, en boîte de 6 et de 12 ampoules.

Doses. — Localement selon les nécessités. Voies stomacale ou rectale : 5 à 10 gouttes par dose (solution à 1/1000^e), 30 gouttes en 24 heures. Voie hypodermique : 1 mgr. d'Adrénaline par jour en 2 fois.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

A

ÆTHONE $C_7H_{10}O_3$

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche et de la Toux.

Posologie. — *Enfants*, administrer à chaque fois : 6 mois à 1 an : 8 à 10 gouttes ; 1 an à 2 ans : 10 à 15 gouttes ; au-dessus de 2 ans : 15 à 30 gouttes et plus selon l'âge et le cas. Répéter les doses ci-dessus cinq à six fois et plus, par 24 heures selon les besoins.

Adultes, 30 à 50 gouttes par dose : administrer 5 à 6 doses et plus par 24 heures, 1/2 heure avant ou 2 heures après le repas.

Avis très important : Il y a intérêt à donner des doses suffisantes ; les succès de l'*Æthone* sont dûs aux doses trop faibles. L'*Æthone* n'étant pas toxique, la dose peut être portée jusqu'à somnolence.

Mode d'administration. — L'*Æthone*, très volatil, doit être mélangé au moment du besoin à un peu d'eau, soit sucrée, soit mieux édulcorée de sirop de tolu à la température de la chambre. Il ne doit pas être mis en potion.

P.-S. — En cas de difficulté pour les enfants, l'*Æthone* pourra être administré dans un petit lavement tiède.

Dépôt général : **FALCOZ & C^e**
18, rue Vavin, PARIS

AGARYL FOURNIER

Agar-Agar pur, granulé sans adjonction
d'aucun laxatif.

Dose et mode d'emploi. — Prendre
2 à 3 cuillerées à potage par jour
aux repas délayé dans laitage,
purée de légumes, entremets (dose
correspondante à 6 ou 9 gr. d'agar-
agar pur).

Indications. — Traitement diététique
de la constipation chronique à
continuer au moins 3 semaines.

Prix : 3 fr. 50

Laboratoires FOURNIER Frères

26, boul. de l'Hôpital, PARIS

A

AIROL " ROCHE "

Combinaison basique de bismuth oxyiodée donnant au contact des plaies de l'iode à l'état naissant

- Airol.** 1° *En poudre* (1 tube, Prix : 1 fr.).
2° *Emulsion d'Airol Roche* à 10 % de glycérine, pour injections uréthrales.
3° *Gaze à l'Airol Roche* à 10 et 20 %.
4° *Pommade à l'Airol Roche* 5 et 10 %.
5° *Pâte à l'Airol Roche* à 20 et 30 %.
6° *ollodion à l'Airol Roche* à 5 et 10 %.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique puissant, désinfectant, cicatrisant, kératoplastique, sans odeur, inaltérable à la lumière, toxicité moindre que celle de l'iodoforme (dont l'Airol est le seul succédané pratique).

Indications. — Toutes celles de l'iodoforme.

F. HOFFMANN LA ROCHE & C^{ie}
21, place des Vosges, PARIS (IV^e)

ALCARHÈNE

Solution ammoniacale arrhénique
en ampoules
à prendre par voie buccale

Propriétés thérapeutiques. — Antibacillaire puissant, cicatrisant, calmant, reconstituant. Supprime les crachats.

Indications. — Tuberculose, pré-tuberculose, bronchites chroniques, affections des bronches, rhumes.

Dose. — Une ampoule par jour, à midi, par voie buccale.

G. MONNIER, Pharmacien de 1^{re} classe
10, rue de la Pépinière, PARIS
Téléphone 520-65

A

ALDOGENE

Désinfection des Appartements

dégage des vapeurs sèches
d'aldéhyde formique
procédé *sans appareil et sans feu*

Indications. — Suivant la loi sanitaire de 1902 après maladies contagieuses, après décès, avant d'habiter un nouvel appartement.

Approuvé par le *Conseil supérieur d'Hygiène publique de France*.

Autorisé par le *Ministre de l'Intérieur* (Décision du 14 Décembre 1908).

Procédé thermo-chimique par simple mélange en présence d'eau.

Aldogène A

pour désinfecter 20 mc.

3 fr.

Aldogène B

pour désinfecter 15 mc.

2 fr. 50

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'ANTISEPSIE

15, rue d'Argenteuil, PARIS

ALGARINE NYRDAHL

Composition. — Saccharure iodotannique phosphaté d'un goût très agréable. Chaque cuillerée à café renferme 1 cgr. d'iode combiné.

Dose thérapeutique. — Une cuillerée à soupe après chaque repas chez les adultes. Une demi ou une cuillerée à café chez les enfants. Prendre en nature comme du sucre en poudre.

Indications. — Remplace l'huile de foie de morue. — Anémie, Lymphatisme, Chlorose, Débilité, Engorgement des glandes et des ganglions, Adénite, Rachitisme, Scrofule, Affections des os et de la peau, Rhumatisme articulaire, Artério-Sclérose, Goitre, et toutes indications de l'iode et de l'huile de foie de morue.

Prix : le flacon, 2 fr. 50

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

*Et de tous autres Hypophosphites.
4-02-50 la boîte de dix suppositoires
(Prix réglementé)*

PHARMACIE SYANN

12, rue Castiglione, PARIS

A

AMANDOL

Composition. — Amandes fraîches broyées, sucre cristallisé.

Action. — L'huile des amandes agit comme saturant des acides de l'estomac.

Indications. — Permet de prescrire aux hyperchlorhydriques sous une forme agréable le régime des corps gras.

Forme pharmaceutique. — Bonbons carrés avec addition de sucre chocolaté : 1 à 10 carrés à la fin de chaque repas.

Laboratoire DURET et RABY

MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise)

AMPOULES CHURCHILL

INDOLORES

à base d'Hypophosphites

Agents les plus actifs de la médication reconstituante par le Phosphore

Ampoules indolores de Poliol Churchill : 0,10 d'Hypophosphites composées dans la proportion des bases minérales de l'organisme, avec addition de Méthylarsinate de Strychnine : 1 mgr. — *Indiquées* dans la Neurasthénie et dans tous les cas exigeant un reconstituant énergique.

Ampoules indolores d'Irol Churchill, à base d'Hypophosphite de fer : 0,02 dans 1 cm³. — *Indiquées* dans Anémie, Chlorose, Aménorrhée, Dysménorrhée, Ictère hémolyptique.

Ampoules indolores de Limol Churchill, à base d'Hypophosphite de chaux : 0,10 dans 1 cm³. — *Indiquées* dans Phosphaturie, Tuberculose, Asthénie, Diabète, Rachitisme, Dentition, Bronchites.

Ampoules indolores de Sorol Churchill, à base d'Hypophosphite de soude : 0,10 dans 1 cm³. — *Mêmes indications* mais en cas d'Hypertension artérielle et d'âge avancé.

Et de tous autres Hypophosphites.

4 fr. 50 la boîte de dix ampoules
(Prix réglementé)

PHARMACIE SWANN

12, rue Castiglione, PARIS

A

AMPOULES DE DIGALÈNE

(Digitale injectable)

Seul vrai principe actif de la macération de feuilles fraîches de digitale isolé et étudié par le Prof. CLOETTA (de Zurich)

1 cm³ = 0 gr. 003 D. S. Cloetta = 0,15 cgr. de poudre de feuilles fraîches de digitale.

Dose moyenne. — 1 à 4 ampoules et plus par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Solubilité parfaite, dosage rigoureux. Action très rapide, tolérance parfaite, effets constants aux mêmes doses, pas d'accumulation.

(Voir Digalène)

Injections. — Hypodermiques, intraveineuses, intra-musculaires (indolores).

Prix réglementé :

3 fr. la boîte de 6 ampoules

F. HOFFMANN LA ROCHE & C^o

21, Place des Vosges, PARIS

AMPOULES DE PANTOPON " ROCHE "

(opium total injectable)

1 amp. d'1 cm³ d'une solut. stéril.
à 2 % non irritante = 0,02 cgr.
de PANTOPON " ROCHE "

Doses et mode d'emploi :

Adultes : 1 à 3 amp. par 24 heures et plus.

Enfants : 1/4 à 1/2 amp. par année d'âge
et par 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Toutes
celles de l'opium, de la morphine et de
ses dérivés.

Le **Pantopon " Roche "** représente tous
les alcaloïdes de l'opium, précipités sous
forme de chlorhydrates solubles et
injectables.

0 gr. 01 cgr. de PANTOPON " ROCHE "
= 0 gr. 50 cgr. de teinture d'opium.

0 gr. 01 cgr. de PANTOPON " ROCHE "
= 9 gr. 025 mgr. d'extrait d'opium.

0 gr. 01 cgr. de PANTOPON " ROCHE "
= 0 gr. 005 mgr. de morphine.

Prix réglementé :

5 fr. la boîte de 12 ampoules.

3 fr. la boîte de 6 ampoules.

F. HOFFMANN LA ROCHE & C^o

21, place des Vosges, PARIS (IV^e)

A

ANIODOL

Combinaison de Triméthanal avec un dérivé allylique dans une glycérine spécialement distillée

Formes. — Solution d'Aniodol à 1 %, le flacon : 3 fr. 25; Poudre d'Aniodol, le flacon : 5 fr.; Aniodol interne (avec compte-gouttes), le flacon : 3 fr. 25; Savon à l'Aniodol à 2 %, la boîte de 3 pains : 3 fr.

Mode d'emploi et dose. — Usage externe : Injections, Lavages, etc., 1 à 2 cuillerées à bouche de solution d'Aniodol 1 % par litre d'eau. La poudre *insoluble*, s'emploie aux lieu et place de l'Iodoforme, seule ou incorporée à une pommade appropriée.

Usage interne. — 10 à 50 gouttes, 3 à 4 fois par jour dans eau ou lait.

Propriétés. — Antiseptique externe et interne, anticoagulant, Bactéricide, Désodorisant.

Indications. — Accouchements, Gynécologie, Dermatologie, Ophthalmologie, Maladies des enfants, Tuberculose, Chirurgie, Laryngologie, Otologie.

Voir détails dans le " *Memento Posologique* " adressé gratis et franco sur demande.

Société de l'ANIODOL

32, rue des Mathurins, PARIS

ANTACIDOL

A

Composition. — Carbonate de bismuth chimiquement pur et lait desséché.

Action. — Agit comme saturant des acides de l'estomac et en revêtant la muqueuse d'une fine couche de bismuth.

Indications. — Calme les douleurs des hyperchlorhydriques : est spécialement indiqué dans les cas d'Ulcère de l'estomac et les Gastrorrhagies.

Forme pharmaceutique. — Tablettes comprimées.

Dose. — Un comprimé toutes les 5 minutes jusqu'à soulagement. (Ces comprimés, même à doses élevées, ne constipent pas).

Laboratoire DURET & RABY
MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise)

PHARMACIE DE LA PLACE ROYALE
à Paris
A. FAGARD, Pharm. prépar.
22, Av. de la Notre-Dame, PARIS
(Tél. 200-91) et Princip. Pharm.

A

ANTIALGOS CHRISTIAENS

Solution d'iodo-salicylate de colchicine en solution salicylée donnant à l'analyse élémentaire :

Acide salicylique	3 gr. 50
Colchicine	0 gr. 005
Iode (ce qui peut se combiner)	1 gr. environ
Excipient Q s. p ^r 100 cm ³ .	

Dose et mode d'emploi. — *Accès* : Trois mesures pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique* : Une à trois demi-mesures suivant les cas.

Indications thérapeutiques. — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc.

(Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action sur le cœur, les reins et l'estomac).

Prix réglementé : 10 francs le flacon
6 francs le 1/2 flacon

PHARMACIE DE LA PLACE ROYALE
à REIMS

SECRÉTARIAT DE L'ANTIDOTE
22, rue des Mathurins, PARIS

ANTIASTHME BENGALAIS

Poudre fumigatoire à base de
Solanées nitrées et Menthol

Propriétés. — Les principes volatils qui se dégagent de la combustion de l'Antiasthme Bengalais (vapeurs alcaloïdiques, oxygénées et mentholées), exercent un triple effet *antispasmodique, décongestionnant et vaso-constricteur*. Le menthol a, en outre, la propriété de rendre agréable la combustion des solanées et de s'opposer à tout réflexe nauséux, ce qui fait que l'Antiasthme Bengalais est toujours bien accepté et toléré des malades.

Mode d'emploi. — En disposer sur une assiette un demi-dé à coudre en tas, mettre le feu à une extrémité et, fermant les yeux, respirer la fumée par les narines.

Indications. — *Dyspnée asthmatique, Emphysème, Coryza, Asthme des foins, Bronchites, etc.*

*Prix de la boîte (contenance 80 gr. environ)
2 fr. 50. - Spéc. réglementée*

A. FAGARD, Pharm. prépar.,
23, Av. de la Motte-Piquet, PARIS
(Tél. 700-91) et Princip. Pharm.

A

ANTIGRIPPINE MIDY

(Acéto-Phényl-Salétidine, poudre de Gelsemium et poudre de Dower)

Ni Quinine — Ni Antipyrine

Cachets dosés à 0,75 cgr.

Dose et mode d'emploi. — 1 cach. à distance des repas, dans un grog chaud; renouveler au besoin une heure après.

Propriétés thérapeutiques. — Antithermique, Analgésique, Bactéricide.

Indications. — Grippe, Influenza, Rhume, Coryza, Maux de tête, Courbature, Névralgies.

Prix : 3 fr. la boîte de 12 cachets

PHARMACIE MIDY

140, Faubourg Saint-Honoré

PARIS (VIII^e)

ANTODYNE

(Phenoxypropanediol)

Analgésique sédatif. Sans action antithermique

Emploi comme *analgésique* dans :

Névralgies, migraines, céphalées, douleurs rhumatismales, manifestations douloureuses des fièvres infectieuses, etc.

Emploi comme *sédatif* dans :

Chorée, asthme, coqueluche, etc.

Se prescrit en cachets de 0 gr. 50 au nombre de 1 à 6 par jour (prescription magistrale) ou sous forme de Cachets d'*Antodyne Billon* à 0 gr. 50.

Dépôt général, Renseignements et Echantillons :

Etablissements POULENC Frères

92, rue Vieille-du-Temple

PARIS

A

ARSENOBENZOL BILLON

Dichlorhydrate
de dioxydiamidoarsenobenzol
Adopté par les hôpitaux de Paris

L'**Arsenobenzol Billon** est mis en
vente sous deux formes :

- a) **En boîtes-nécessaires**, pour la
préparation extemporanée de
l'émulsion neutre, pour injection
intra-musculaire, ou de la solu-
tion alcaline, pour injection
intra-veineuse, sans réactif ni
appareil spéciaux. Consulter,
pour l'emploi de ces nécessaires,
la notice spéciale.
- b) **En tubes**, privés d'air, remplis
d'azote et fermés à la lampe. On
suivra, pour utiliser ces tubes, la
technique d'Ehrlich ou une des
nombreuses modifications qui
ont été proposées pour la sim-
plifier.

Dépôt général, Renseignements
et Echantillons :

Etablissements POULENC Frères
92, rue Vicille-du-Temple, PARIS

ASPIRINE VICARIO

Acide acétylsalicylique

Granulée dosée à 0,50 cgr., par cuillerée à café.

Comprimés Vicario dosés à 0,50 cgr. par comprimé.

Dose. — 1 à 4 gr. par jour et plus. Eviter l'administration simultanée des alcalins.

Propriétés thérapeutiques. — Action calmante, Innocuité absolue, Analgésique des douleurs rhumatismales et arthritiques sous toutes les formes, Antithermique chez les tuberculeux et surtout chez les rhumatisants aigus.

Indications. — Toutes les affections rhumatismales : Rhumatisme aigu, Grippe, Goutte, Sciatique, Lumbago.

Prix réglementé :

Granulé, 3 fr. 50 le flacon

Comprimés, 1 fr. 50 le tube

Pour éviter toute substitution :

Exiger la Marque "VICARIO"

Laboratoire VICARIO

17, Boulevard Haussmann, PARIS

A

ATURAL

Suppression de l'intolérance pour le lait
Produit physiologique antiprésurant

Adjuvant indispensable de tout régime
lacté — Maternise le lait

Propriétés. — Empêche la formation du caillot de caséine, évite la fatigue due au travail mécanique de l'estomac, active la digestion intestinale de la caséine et du beurre, permet une assimilation rapide et intégrale de tous les éléments du lait, supprime les fermentations intestinales.

Indications. — *Adultes* : dans tous les cas où le régime lacté est de rigueur : fièvre typhoïde, gastro-entérites, dysenteries, cardiopathies, brightisme, grossesses avec albuminurie, maladies du foie, etc.

Nourrissons. — Pendant toute la période de l'allaitement artificiel et « *a fortiori* » dans : athrepsies, gastro-entérites, diarrhées, vomissements, fétidité des selles, croissance insuffisante, etc.

Dose. — Une mesure pour 100 gr. (une tasse) de lait froid ou légèrement tiède. Ne communique aucun goût au lait.

Dépôt général, Renseignements
et Echantillons :

Etablissements POULENC Frères
92, rue Vieille-du-Temple, PARIS

AZOTYL

Synthèse, en solution huileuse, des médicaments suivants :

1°) Lipoides spléniques et biliaires renforcés par de la cholestérine; 2°) Gomménol; 3°) Camphre.

Formes. — a) Ampoules injectables de 1 cm³; b) Pilules Kératinisées.

Modes d'emploi. — a) Injections sous-cutanées et intra-musculaires. Injecter quotidiennement le contenu d'une ampoule pendant 20 jours consécutifs et s'arrêter 10 jours, puis reprendre les piqûres en séries, avec le même repos entre chaque série.

b) Prendre 6 pilules par jour, aux repas de préférence et dans les intervalles des piqûres.

Propriétés. — Exerce une action opothérapique utile en suppléant à l'hypo-fonctionnement des organes atteints et en excitant leur action physiologique.

Remédie à la déminéralisation des tuberculeux et par suite à l'asthénie et à la déchéance fonctionnelle généralisée consécutive.

Favorise, par les essences, la diapédèse des leucocytes et surtout des leucocytes polynucléaires.

Laboratoire de Thérapie-Bio-Chimique
50, Rue Rennequin, PARIS

B

BAUME DELACOUR

ou

COSMÉTIQUE DELACOUR

Benzo-Tannique

Solution antiseptique en applications locales avec le pinceau.

Indications. — Gerçures des Seins, Crevasses et Gerçures en général.

On lit dans le *Traité des Accouchements* de Cazeaux, revu par Tarnier, chirurgien en chef de la Maternité, à l'article : **Traitement des Gerçures, Fissures, Crevasses du Mamelon :**

« Dans ma pratique, j'ai employé
« souvent avec grand avantage une
« solution qu'on appelle **BAUME**
« **DELACOUR.** »

3 francs le flacon, avec pinceau et deux bouts de sein

HENRY ROGIER

Pharmacien de 1^{re} Classe

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris

3 et 5, Boulevard de Courcelles

PARIS (VIII^e). — Téléphone 533-70

BAUME DURET

Dermatothérapie. — (Traitement externe). 1^{er} *Baume Duret*.

Formule. — Soufre dissous, goudron, huile de cade vraie, résorcine, gaiacol, menthol en *combinaison* avec le *camphre* et en *dissolution* dans l'*acétone*.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique et réducteur, Antiprurigineux puissant, ni toxique, ni irritant (même chez les enfants).

Indications. — *Eczémas secs* ou *suintants*, avec ou sans lésions cutanées, *Acné*, *Séborrhéides*, *Impétigo*, *Sycosis*, *Gale*, etc.

Mode d'emploi. — En application avec un tampon d'ouate hydrophile dans le cas de lésions, autrement en frictions avec le doigt deux à trois fois par jour, recouvrir de « *Bande Duret* » tissu pelucheux, n'absorbant pas les corps gras.

Le flacon : 3 fr. 50

La bande Duret : 2 francs

EMPLATRE DURET

à base de Baume Duret et d'oxyde de zinc
Dermatoses localisées; mêmes propriétés que ses composants.

La pochette : 3 francs

Laboratoire de Dermatologie :

PARIS, 10, Rue du Regard

E. VENDEL, Pharmacien de 1^{re} Classe

B**BETUL-OL MIDY**

(Méthyl oléo salicylate comp.)

Liniment pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

Composition : Menthol et chloral en solution dans de l'essence de Bétula-Lenta obtenue par fermentation et distillation (salicylate de méthyle naturel).

Mode d'emploi. — Imprégner largement un morceau de flanelle, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé. Renouveler l'application plusieurs fois par jour.

L'absorption du *Betul-Ol* se fait si rapidement par la peau, que dix minutes après on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

Propriétés thérapeutiques. — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

Indications. — Lumbago, sciatiques, douleurs des articulations, névralgies.

Prix réglementé : 5 fr. le flacon

PHARMACIE MIDY

140, faubourg Saint-Honoré
PARIS (VIII^e)

BIBROMURE VICARIO

Bibromomercureate de sodium soluble
injectable

Ampoules stérilisées dosées à 0 g. 01 Hg.
métallique par cm³.

La boîte de 12 : 5 fr.

Doses et mode d'emploi. — En injections intra-musculaires pratiquées au lieu d'élection dans la fesse.

Traitement d'entretien. — 1 cm³. par jour pendant 12 jours.

Traitement intensif. — 2 à 3 cm³. par jour soit 0,02 à 0,03 cgr. de Hg. métallique en surveillant d'une manière toute spéciale les points d'alarme de l'hydrargyrisme : dents, reins, intestin.

Traitement réduit. — 3/4, 1/2, 1/4 de cm³ par jour, avec beaucoup de prudence, chez les idio-syncrasiques et les porteurs de lésions dentaires, rénales ou hépatiques.

Propriétés thérapeutiques. — *Le minimum de douleur. Le maximum d'activité.* Stable à chaud et à froid, neutre. Ne précipite pas l'albumine. Indolore en injections intra-musculaires. Ne détermine pas de nodosités.

Pour éviter toute confusion :

Prescrire Bibromure "VICARIO"

LABORATOIRE VICARIO

17, boulevard Haussmann, PARIS

BILEYL FOURNIER

Sels biliaires
(extraits de la bile de bœuf)

Forme. — Globules kératinisés
(digestion intestinale).

Dose. — 6 à 8 globules par jour, à
prendre vers la fin du repas, par
2 ou 3.

Indications. — 1° Les causes d'arrêt
d'excrétion : lithiase, compres-
sions, ictères subaigus et chroni-
ques par rétention.

2° Les cas d'insuffisance biliaire :
cholémie familiale, entérocolite
muco-membraneuse.

Le flacon de 60 globules : 4 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères
26, boulevard de l'Hôpital PARIS

BI-IODURE SOUFFRON

Iodure de potassium et Bi-Iodure de mercure $KI + Hg. I^2$. — Chimiquement purs. — Titrés. — Inaltérables.

Pas d'iodisme

Solution (Iodure de potassium, 1 gr. + Bi-iodure de mercure 0,01) par cuillerée à potage.

Dragées (Iodure de potassium 0 gr. 25 + Bi-iodure de mercure 0,0025) chaque.

Gouttes bi-iodurées (simples), une goutte contient 1 mgr. $Hg. I^2$.

Ampoules bi-iodurées aqueuses ou huileuses, 0,004 mgr., 0,01^e et 0,02 $Hg. I^2$.

Ampoules rigoureusement titrées et stérilisées.

Indications thérapeutiques. — Maladies de la peau, Syphilis.

Laboratoire L. SOUFFRON
26, rue de Turin — PARIS

B

BIOLACTYL FOURNIER

Symbiose de 2 ferments lactiques
orientaux sélectionnés

2 formes. — 1^o Culture en bouillon,
liquide livré en boîtes de 10 flac.
de 60 gr. Prendre de préférence
avec de l'eau sucrée, 1 flacon par
jour, 1/2 flacon à chaque repas.

La boîte : 10 fr.

2^o Culture sèche comprimée : boîte
de 60 comprimés. Prendre sans les
croquer 4 à 6 comprimés par jour
avant les repas, sans essayer de les
faire fondre.

Le flacon de 60 comprimés : 5 fr.

Indications. — Traitement spécifique
des putréfactions intestinales et
de l'auto-intoxication digestive.

Laboratoires FOURNIER Frères

26, boul. de l'Hôpital, PARIS

BIOCALCOSE CHEVRETIN

Liquide et granulé organo-calcique

La Biocalcose, outre une grande quantité de chaux (0 gr. 25 par cuillerée à café) contient encore du phosphore, de la potasse, de la soude, de la magnésie, du manganèse, etc., dans les proportions où ces minéraux se trouvent dans l'organisme sain.

Propriétés thérapeutiques.—Recalcification de l'organisme.

Indications. — Tuberculose, croissance, rachitisme, neurasthénie, dentition, diabète, grossesse.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café jusqu'à 8 ans, 3 à 4 au-dessus de cet âge et chez les adultes. La Biocalcose sera prise dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas.

Prix réglementé :
4 fr. le flacon ou la boîte

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE
24, rue Caumartin, PARIS

B

BI-IODURE DE MERCURE MIDY

INDOLORE

Selon la formule présentée à la *Société de Thérapeutique*, le 8 Novembre 1905.

Ampoules de 2 cm³ de solution aqueuse de Hg I² à 1 % ; chaque cm³ = 0,01 cgr. de Hg I².

Composition :

Hg I ²	0,01
Na I.....	0,01
Subcutine.....	0,005
Eau stérilisée.....	1 cm ³

Cette solution ne précipite pas le sérum, ne coagule pas les albuminoïdes, est anesthésique, supprime les indurations.

Doses. — Chez l'adulte, série de 10 à 20 injections de 1 ou 2 cgr ; chez l'enfant, 1 ou 2 mgr. par année d'âge (série de 5).

Mode d'emploi. — Injections profondément intra-musculaires dans le tiers supérieur de la fesse, le malade étant étendu.

5 francs la boîte de 10 ampoules

PHARMACIE MIDY

140, faubourg St-Honoré, PARIS (VIII^e)

BROMIASE COUTURIEUX

(Bromuro Enzymes)

Capsules dont chacune renferme :
0 gr. 50 de bromures (dont 30 KBr et
20 AmBr).
0,10 d'enzymes.

Propriétés thérapeutiques. — Identiques
à celles des bromures, sans bromisme.

Indications et doses :

Epilepsie : ADULTES : 8 à 16 capsules
par jour en 3 fois, au début des re-
pas ; le traitement doit être continué
longtemps et sans interruption. EN-
FANTS : 4 à 8 capsules par jour selon
l'âge.

Hystérie : 4 à 10 capsules par jour en
3 fois.

Chorée : 1 à 8 capsules par jour selon
l'âge du malade.

*Vomissements de la grossesse et
Eclampsie* : 4 à 12 capsules par jour.

Mal de mer : 4 à 10 capsules par jour.

Asthme nerveux. — *Coqueluche* : 2 à 8
capsules par jour.

Insomnies : 2 à 8 capsules par jour.

Névroses diverses : 2 à 10 capsules par
jour.

Les doses indiquées ne sont pas fixes
et peuvent varier selon la gravité
des cas.

5 fr. le flacon de 50 capsules

C. COUTURIEUX, ex-interne
et chef de Laboratoire des Hôpit. de Paris
57, Avenue d'Antin, Paris

B

BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale
(Voir l'étude sur l'Iodogénol)

Gouttes titrées : 20 gouttes contiennent
0.04 cgr. de Brome.

Dose et mode d'emploi. — 20 gouttes
de *Bromogénol Pépin* = 0 gr. 50 de
Bromures métalliques, à prendre
dans un peu d'eau ou d'infusion
aromatique. Renouveler plusieurs
fois.

Propriétés thérapeutiques. — Mé-
dication bromurée très énergique
avec un faible poids de brome.
Goût agréable. Tolérance parfaite.
Préférable aux sirops bromurés et
polybromurés.

Indications. — Toutes celles des
Bromures métalliques : affections
du système nerveux, insomnie,
hystérie, convulsions, épilepsie,
névralgies, etc.

Prix réglementé : 4 fr. 50 le flacon

PÉPIN et LÉBOUCQ,
à COURBEVOIE (Seine)

BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycéro-Phosphatée

Granulé à base de Kola, Glycérophosphate de chaux, Quinquina et Cacao vanillé.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Propriétés thérapeutiques. — *Tonique du système nerveux, facilite l'effort musculaire.*

Indications. — Surmenage, Vertiges, Anémie cérébrale, Névralgies rebelles, Névroses.

3 fr. 50 le flacon

A. GIRARD, 48, Rue d'Alésia, PARIS

B**BORICINE MEISSONNIER**

Antiseptique de la Peau et des Muqueuses
Désinfectante, microbicide, cicatrisante.
Ni toxique, ni caustique, ni irritante.

Composition. — Combinaison à base d'acide borique, de réaction neutre, soluble à 15% dans l'eau à la température ordinaire. Est isotonique au milieu oculaire à la dose de 2,5% (une cuillerée à soupe par litre d'eau bouillie).

Indications et doses. — Pour les *plaies, brûlures et blessures*, en poudre (succédané de l'iodoforme) ou en pansements humides, suivant les cas. En solution d'après le tableau ci-dessous pour :

Maladies du Nez et des Voies respiratoires : irrigations, 1 à 2 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie.

Maladies des Yeux, lotions, et de la Bouche : gargarismes, 2 à 4 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie.

Maladies des Oreilles : instillations.
Gynécologie et Voies urinaires : irrigations, 3 à 4 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie.

La cuillère à soupe contient 25 gr. de Boricine.

Prix : 4 fr. la boîte.

Dépôt : 17, rue Cadet, PARIS

BROMURES SOUFFRON

Bromure de Potassium (KBr) — Bromure de Sodium (NaBr)
Chimiquement purs — Titrés
Inaltérables

Pas de Bromisme

Solution à 2/15^{es}. Une cuillerée à potage contient 2 grammes KBr ou NaBr.

Sirop à 2/20^{es}. Une cuillerée à potage contient 2 grammes KBr ou NaBr.

Dose et mode d'emploi. — De 0 gr. 25 cgr. à 4 gr. par jour et plus.

Propriétés thérapeutiques. — Antinerveux.

Indications. — Affections nerveuses, insomnie, chorée, épilepsie, hystérie, névrose.

Laboratoire L. SOUFFRON

26, rue de Turin, PARIS

B

BRULEUR GUASCO

Le meilleur appareil, le plus pratique pour désinfecter et désodoriser par l'aldéhyde formique.

Le Brûleur Guasco agit non seulement comme préventif, mais aussi comme curatif. De nombreux docteurs l'emploient avec succès contre la coqueluche, qu'ils guérissent ainsi, en quelques jours, sans médicament. Il rend de très sérieux services dans le traitement de toutes les maladies contagieuses, détruit immédiatement toutes les mauvaises odeurs.

Admis dans les Hôpitaux — Notice et renseignements gratuits sur demande. — Conditions spéciales à MM. les Docteurs.

Société des BRULEURS GUASCO

20, rue Rambuteau, PARIS

BROMONE ROBIN**Bromo-Peptone ou Peptonate de Brome**

Composition. — Combinaison physiologique brome et peptone contenant 16,40 % de Brome pur.

Forme. — Gouttes dosées à un demi-centigramme de Brome pur. 40 gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gramme de Bromure de K.

Propriétés thérapeutiques. — Agent sédatif et calmant. Diminue l'excitabilité nerveuse. Tolérance parfaite, ne provoque jamais d'accident de bromisme.

Indications. — Toutes celles du Bromure de K. — Maladies nerveuses, irritabilité nerveuse des femmes, des jeunes filles, troubles névropathiques chez les enfants. Insomnie des vieillards, hystérie, épilepsie.

Dose. — 10 à 50 gouttes 2 fois par jour au moment des principaux repas.

Prix : 4 fr. 50

Maurice ROBIN

13, rue de Poissy, PARIS

B

BROMURE DE CAMPHRE CLIN

Camphre monobromé

Composition. — Camphre monobromé $C^{10}H^{17}Br$. Contient 38,40 % de brome à l'état dissimulé. On doit au Dr Clin un procédé de fabrication industrielle donnant un produit pur et bien cristallisé. (Académie des Sciences, août 1875).

Formes. — 1^o *Capsules du Dr Clin au bromure de camphre*, enrobées au gluten, à 0 gr. 20 par capsule. Prix : 5 fr. le flacon de 50 capsules.

2^o *Dragées du Dr Clin au bromure de camphre* à 0 gr. 10 par dragée. Prix : 5 fr. le flacon de 60 dragées.

3^o *Tubes stérilisés Clin au bromure de camphre*, dosés à 0 gr. 05 et 0 gr. 10 par cm^3 . Prix : à 0 gr. 05, 1 fr. 50 la boîte de 6 ampoules, de 12 ampoules 2 fr. 75 ; à 0 gr. 10, 2 fr. la boîte de 6 ampoules, de 12 ampoules 3 fr. 50.

Doses. — Commencer par 2 capsules ou 4 dragées par jour en augmentant progressivement jusqu'à 5 capsules ou 10 dragées. Diminuer ensuite jusqu'à la dose initiale. Interruption de 8 jours et reprise du même traitement. On peut donner le bromure de camphre jusqu'à 4 gr. par jour chez l'adulte. Par voie hypodermique : 5 à 10 mgr. par jour.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

CAPSULES DE MORRHUINE PUY

à l'Extrait complet
d'huile de foie de morue superiodée
dosé à 2 mgr. d'Iode combiné,
assimilable par capsule

*Absorption et digestion faciles. --
Jamais de nausées ni de phénomènes
d'Iodisme.*

Doses. --- De 8 à 12 ans : 2 à 4 capsules par jour; de 13 à 19 ans : 4 à 6 capsules par jour; *Adultes* : 6 à 8 capsules par jour, à prendre en deux fois aux repas.

Indications. -- Toutes celles de l'huile de foie de morue et en particulier : Lymphatisme, Ralentissement des fonctions lymphoïdes, Engorgements ganglionnaires, Scléroses et Cachexie.

Prix : le flacon de 60 capsules, 4 francs franco au public

Laboratoire J. PUY, à Grenoble

Laboratoire E. DUPUTEL
à Crest (Oise)

CARABAÑA

Eau minérale naturelle

Dose purgative. — 1 verre à Bordeaux à jeun, suivi immédiatement du petit déjeuner du matin.

Dose laxative. — 1 verre à Madère dans les mêmes conditions.

Propriétés thérapeutiques. — Purgative par son sulfate de soude, dépurative par son chlorure de calcium, antiseptique par son sulfure de sodium.

Indications. — Engorgement du tube digestif, Embarras gastrique et intestinaux, Constipations habituelles, Congestions diverses, Affections biliaires et hépatiques.

C^{ie} de POUQUES et CARABAÑA

15 et 17, rue Auber, PARIS

Laboratoire G. L. N.

21, rue des Poitevins, St-Jacques, PARIS

CACHET CÉPÉ

C

Pyramidon Creil..... 0.30 cgr.
Caféine..... 0.05 cgr.

Dose. — 1 cachet Cépé à la fois, 3 par jour à intervalle de 3 à 4 heures entre chaque dose (chaque cachet est logé dans une boîte d'origine en fer-blanc avec bande de garantie).

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les qualités du Pyramidon "Creil", mais relève la tension artérielle chez ceux qui ont l'appareil cardio-vasculaire sensible au pyramidon.

Indications. — Médication de choix des Migraines, des Névralgies et des Fièvres de toute nature.

Produits Pharmaceutiques spéciaux "CREIL" de la Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline.

9, rue du Faubourg Poissonnière,
PARIS (IX^e)

Pharmacien :

Laboratoire E. DUPUTEL
à Creil (Oise)

CAPSULES DARTOIS

Composées de créosote de hêtre véritable, titrée en Gaiacol, à la dose de 0,05 cgr. dissoute dans 0,20 cgr. d'huile de foie de morue garantie d'origine.

Dose. — Commencer par une ou deux capsules pour arriver progressivement à la dose moyenne et généralement suffisante de 3 à 4 à chaque repas ou matin et soir dans une tasse de lait ou de tisane.

Propriétés. — Se dissolvant lentement dans l'intestin, répandent le produit actif sur une grande surface, divisent la créosote à l'infini et multiplient son action antiseptique sans jamais amener de troubles digestifs.

Indications. — Toux, Catarrhes, Bronchites chroniques, Tuberculose, etc.

Prix réglementé : 3 francs

Laboratoire FREYSSINGE
6, rue Abel, PARIS

CÉRÉBRINE BYLA

Substance cérébrale

Capsules opothérapiques à enrobage
néo-résineux solubles seulement
dans le suc intestinal (à 0,10 cgr.).

Dose moyenne. — 5 capsules dans
les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Mi-
graines, sous toutes ses formes,
Névralgies, etc.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50


Les Etablissements BYLA

à Gentilly (Seine)

C

CETRAROSE

du DOCTEUR GIGON



Acide Protocétrarique soluble

Forme. — Solution alcoolique d'acide protocétrarique.

Propriétés. — Excitant des mouvements péristaltiques stomacaux et intestinaux. Action élective sur la tonicité et l'excitabilité musculaire de l'estomac. Anti-émétique; Antidyspeptique; Analgésique gastrique.

Indications. — Vomissements en général et états nauséux, Vomissements de la grossesse, Mal de mer, Pyrosis, Spasmes du Pylore, Atonie gastrique, Hypo et Hyperchlorhydrie, États neurasthéniques liés à des troubles gastro-intestinaux.

Dose et mode d'emploi. — 20 à 30 gouttes en une seule fois, sur un morceau de sucre ou dans un peu d'eau. Cette dose peut être répétée d'heure en heure jusqu'à 150 à 200 gouttes par 24 heures.

A. GIGON & Dr André GIGON, pharm.

7, rue Coq-Héron, PARIS

CASCARA MIDY

à base de Cascara Sagrada naturel, complet et épuré, mais non dénaturé par des manipulations chimiques.

Pilules dosées à :

1^o 0,12 cgr. d'extrait hydro-alcoolique de Cascara Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.

2^o 0,10 cgr. de poudre sélectionnée de *Rhamnus purshianus*.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 pilules le soir en se couchant, après 15 jours espacer les doses.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif doux et à effet constant, ni irritant, ni drastique.

Indications. — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices.

Prix réglementé : le flacon, 2 fr. 50

Pharmacie MIDY

140, faubourg St-Honoré
PARIS (VIII^e)

CÉRÉBRINE

(Coca théine analgésique Pausodun)

Liqueur agréable
de composition bien définie

Doses. — Une cuillerée à soupe dans une ou deux cuillerées d'eau à prendre en deux fois à 5 minutes d'intervalle à distance des repas (1 heure avant ou 2 heures après). Renouveler au besoin jusqu'à 3 cuillerées par 24 heures.

Enfants au-dessus de 6 ans : 1 à 3 cuillerées à café selon l'âge.

Indications thérapeutiques des principales variétés de Cérébrine :

Cérébrine simple : Migraines, Névralgies en général ;

Cérébrine bromée : Migraines, Névralgies tenaces, Règles douloureuses ;

Cérébrine bromo-iodée : Névralgies rebelles à tous traitements antérieurs, sciatiques ;

Cérébrine quiniée : Courbature, début et fin de grippe.

Sur demande seulement :
sans analgésine, sans éther ou sans sucre.

Prix réglementé : le flac., 5 francs

E. FOURNIER & C^{ie}, pharmaciens
· 147, B^d Montparnasse, PARIS

CHOLERGINE

Extrait hépatique injectable (2 cm³)
synthétisant tous les éléments
glandulaires du foie de taureau
(bile et parenchyme)

Mode d'emploi. — Injection profonde
ou intra-musculaire (indolore) tous
les jours ou tous les deux jours.
Un repos de dix jours entre chaque
série de 10 injections. Léger mas-
sage après piqûre.

Propriétés. — Antitoxique, antiba-
ctérienne et dynamogénique. — Tu-
berculose, Insuffisance hépatique.

Préparation sans similaires ni équi-
valents, employée journellement
dans les hôpitaux.

Prix réglementé :
la boîte de 10 amp. de 2 cm³, 8 francs

Laboratoires de Biologie

A. DANIEL-BRUNET

5, rue du Docteur-Blanche, PARIS

C

CIGARETTES AMÉRICAINES

LEROY

Composition. — Piper Cubebis et Grindelia Robusta.

Emploi thérapeutique. — 3 à 6 cigarettes par jour préventivement et au moment des crises. Faire pénétrer la fumée dans l'arrière-gorge et la rejeter par le nez.

Indications. — Asthme, Coryza, Laryngite, Affections catarrhales, Bronchite chronique, Emphysème et Dilatation bronchique.

Prix : la boîte, 2 francs

Pharmacie MORIDE

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

CHOLÉINE CAMUS

à l'extrait décoloré et inaltérable
de Fiel de Bœuf

Capsules glutinisées, dosées à 0,20 de
principe actif.

Dose moyenne. — 4 à 6 pilules par
jour.

Indications. — Lithiase biliaire,
Coliques hépatiques, Ictères, Acho-
lie, Cholémie, Constipation, Fer-
mentations intestinales, Entérites
muco-membraneuses, Auto-intoxi-
cations, Arthritisme, Insuffisance
biliaire et hépatique.

Prix : le flacon, 4 fr. 50
(Produit réglementé)

A. CAMUS, pharmacien
à Moulins (Allier)

C

CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf
et de kinase

Dragées ovoïdes kératinisées dosées
à 0 gr. 25 d'extrait

Doses et mode d'emploi. — 6 à
12 ovoïdes par jour en 3 doses
égales : à la fin du déjeuner, à la
fin du dîner, le soir en se couchant.
Ces doses peuvent même être
doublées au début du traitement.

Propriétés thérapeutiques. — Ac-
tive les sécrétions biliaire et pan-
créatique, améliore la digestion
duodénale.

Indications. — Spécifique de l'enté-
rocolite muco-membraneuse.

Prix : le flacon de 100 dragées, 5 fr.

Laboratoire DURET et RABY

Marly-le-Roi (S.-et-O.)

COLCHIQUE BYLA

(ÉNERGÉTÈNE DE)

Suc pur inaltérable de la plante
fraîche

36 gouttes = 1 gr. de plante fraîche
ou 1/10^e de mgr. de colchicine
cristallisée.

Dose et mode d'emploi. — 10 à 15
gouttes par jour qu'on augmentera
progressivement jusqu'aux pre-
miers phénomènes de diarrhée
signalant l'action de la colchicine
sur l'intestin. A prendre dans un
peu d'eau sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-
goutteux.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

COLCHI-SAL MIDY

(Colchicine — Méthyle Salicylate)

Capsules dont chacune contient :

1/4 de mgr. colchicine pure dissoute dans
0,20 mgr. Salicylate de Méthyle naturel obtenu
par fermentation et distillation et équivalant
à 0,25 mgr. Salicylate de Soude.

Dose. — 4 à 16 capsules par jour par
prises fractionnées.**Propriétés thérapeutiques :****du Salicylate de Méthyle**

- 1° Augmente l'élimination de l'acide urique
et des autres éléments solides de l'urine;
- 2° Calme la douleur;
- 3° Liquéfie et augmente la sécrétion biliaire
- 4° Légèrement diurétique;
- 5° Diaphorétique;
- 6° Diminue la fièvre;
- 7° Combat la congestion et facilite la résolu-
tion des inflammations (G. Sée);
- 8° Action antiseptique sur le sang.

de la Colchicine

- 1° Diminue la production d'acide urique;
- 2° Augmente rapidement l'élimination de
tous les produits brûlés et pousse à
l'oxydation;
- 3° Soulage la douleur;
- 4° Augmente la sécrétion biliaire;
- 5° Légèrement diurétique;
- 6° Diaphorétique;
- 7° Purgatif.

Prix réglementé : le flacon, 5 francs**Pharmacie MIDY**140, faub. St-Honoré, PARIS (VIII^e)

CITROSODINE GRÉMY

Citrate trisodique chimiquement pur

*Comprimés.***Dose et mode d'emploi :**

Adultes : 5 à 10 comprimés, et plus au besoin, dissous dans un demi-verre d'eau, deux ou trois fois par jour, au moment des repas.

Enfants : 4 à 6 comprimés, et plus au besoin, dissous dans un demi-verre d'eau, deux ou trois fois par jour au moment des repas.

Nourrissons : 1 comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, le faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon dans le cas contraire.

Propriétés thérapeutiques. — Neutralisant de l'hyperchlorhydrie, eupeptique, sédatif, anti-émétique. Tous les avantages du bicarbonate de soude sans aucun de ses inconvénients.

Indications. — Dyspepsie hypersthénique, Fermentations gastriques, Dyspepsie hyposthénique ou nervomotrice, Dilatation d'estomac, Dyspepsie des nouveau-nés et des enfants du premier âge, gastrites aiguës ou chroniques, Gastroxynsis, Gastralgie, Crampes, Ulcère de l'estomac, Vomissements des nourrissons, Lithiase rénale, Gravelle urique, Goutte, Diabète et Obésité.

P. LONGUET

50, rue des Lombards, PARIS

C

COCAINE MIDY

Chloroborâtées

Chaque *Pastille* contient :

0,002 mgr. de Chlorhydrate de Cocaine.
0,05 cgr. de Chlorate de Potasse.
0,05 cgr. de Biborate de Soude.

Dose et mode d'emploi. — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésique local, antiseptique modificateur, spécifique des maladies de la muqueuse et des voies respiratoires supérieures.

Indications. — Affections de la bouche, gorge, larynx; Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge.

Prix réglementé :
le flacon avec "boîte de poche", 3 fr.

Pharmacie MIDY

140, faub. St-Honoré, PARIS (VIII^e)

COMPRIMÉS de THIOCOL ROCHE

1 comprimé de Thiocol Roche
= 0,50 cgr. de Thiocol Roche.

1 gr. de Thiocol Roche = 0,52 cgr.
de Gaïacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* :
2 à 10 par jour; *Enfants* : 1 à 4 par
jour, et plus selon indications.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-
septique, Phagocytogène, Eupep-
tique, Orexique.

Indications. — Toutes les affec-
tions Broncho-pulmonaires, Tubercu-
lose, Bronchites aiguës et
chroniques, Grippe, Pneumonie,
Coqueluche, Scrofule, Anémie,
Rachitisme, Dyspepsie, Entérite,
Diarrhées, etc.

Avis très important. — Pour éviter
toute substitution inactive et même
toxique, il importe de bien spéci-
fier toujours : *Comprimés de Thiocol
Roche.*

Prix réglementé :

le tube de 20 comprimés, 2 francs

F. Hoffmann La Roche & Co
21, place des Vosges — PARIS

CRÉOSOTAL HEYDEN

Dérivé de la créosote, ni toxique
ni caustique
contenant 94 % de créosote

*Liquide dosé à 4 gr. par cuillerée à
café. (Prescrire 1 flacon "Créosotal
Heyden").*

Doses et mode d'emploi. — *En une
fois : Enfants : 0 gr. 20 à 1 gr. (6 à
30 gouttes). Adultes : 1 gr. à 4 gr.
Dose journalière : Jusqu'à 4 fois la
dose unique.*

Propriétés thérapeutiques. — Anti-
phtisique, Antiscrofuleux.

Indications. — Phtisie, Pneumonie
de toute espèce, Catarrhes aigus
des voies respiratoires, Complica-
tions pulmonaires dans la Rou-
geole, Pseudo-croup, Diphtérie,
Scrofule, Typhus (désinfection de
l'intestin).

Prix : le flacon, 3 fr. 50

Produits HEYDEN

29 et 31, rue Philippe-de-Girard
PARIS (Xe)

COLLARGOL HEYDEN

Doses et mode d'emploi. — Pour injections intra-veineuses : 5 à 15 cm³ d'une solution à 2 %.

Pour lavements : 50 à 100 cm³ de la solution à 1 à 5 %.

Per os : 0 gr. 03 à 0 gr. 05 par jour.

En frictions : 1 à 3 gr. d'Onguent Créde par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique ni toxique, ni irritant, pour injections locales et générales.

Indications. — Infections locales (Plaies, Abscesses, Suppurations, Maladies infectieuses oculaires, Blennorrhagie, Cystite, Pyélite).

Infections générales (Pyémie, Septicémie, Phlegmons, Rhumatismes articulaires, Pneumonie, Typhus, Charbon, Méningite).

Prescrire. — *Collargol Heyden; Onguent Créde.*

Prix : le tube de 50 comprimés de 0,05 cgr., 2 fr. 50

Onguent Créde : le pot, 5 francs

Produits HEYDEN

29 et 31, rue Philippe-de-Girard
PARIS (X^e)

C

COMPRIMÉS de CHATELGUYON

Créés par Miraton en 1902

*(Ne pas confondre avec
le Laxatif Miraton)*

Aux sels naturels de la source Châtelguyon-Miraton, les comprimés "Châtelguyon-Miraton" sont très solubles même dans l'eau froide qu'ils gazéifient.

Leur composition. — Sels naturels 15 cgr.; Bicarbonate de soude, 25 cgr.; Acide tartrique, 10 cgr., assurent une solution fortement gazeuse, d'une saveur acidulée agréable, jouissant de toutes les qualités de l'eau de Châtelguyon.

Dose. — 4 ou 5 comprimés par verre d'eau.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique-laxatif à effet lent et doux.

Indications. — En remplacement des Eaux de Châtelguyon dans les cas de Constipations, Dyspepsie, Entérite, Lavages intestinaux, etc.

Prescrire la marque Miraton

Prix réglementé : le flacon, 2 francs

Etablissements Châtelguyon-Miraton
Autorisation de l'Etat

CURGOL VICARIO

Glycocholate de Mercure

Comprimés dosés à 0,01 cgr. d'Hg.
Facilement désagrégables.

Dose et mode d'emploi. — 3 à 6 comprimés par jour après les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Le Curgol est un Glycocholate de Mercure facilement assimilable, ne provoquant aucune irritation intestinale et dont l'activité est comparable à celle des frictions et des injections. Il peut être employé avec succès dans tous les cas de syphilis qui n'exigent pas une intervention énergique immédiate.

Indications. — Syphilis à toutes ses périodes.

Prix réglementé :
le tube de 20 comprimés, 2 fr. 50

Laboratoire VICARIO
17, boulevard Haussmann, PARIS

DIABÉTIFUGE

Synthèse des agents médicamenteux les plus efficaces pour accroître l'énergie glycolytique (bioxyde de manganèse, bicarbonate de soude, chlorhydrométhylarsinate de lithine) d'une part, et pour modérer la glycogénie (antipyrine, nitrate d'urane et santonine) d'autre part.

Forme. — Cachets de 1 gr.

Indications. — Diabète sous toutes ses formes.

Mode d'emploi. — Prendre dans la matinée et dans l'après-midi, un cachet avec un demi-verre d'Eau de Pougues. Continuer pendant 10 jours, faire une analyse des urines et si le chiffre du sucre éliminé est en décroissance suffisante, réduire à un cachet pendant 10 jours. Cesser toute cure au bout de 20 jours de traitement avec les cachets. Repos de 20 jours et reprendre.

Prix de la boîte de 30 cachets :
5 francs (en France)

Laboratoire des Produits SCIENTIA
42, rue Blanche — PARIS

DIGALÈNE

(Digitale injectable)

Seul vrai principe actif de la macération de feuilles fraîches de digitale, isolé et étudié par le professeur Clætta (de Zurich).

1 cm³ = 0 gr. 0003 D. S. Clætta = 0 gr. 15 de poudre feuilles fraîches de digitale.

Posologie et mode d'emploi. — *Voies gastrique et rectale.* — Un flacon de 15 cm³ de Digalène.

Prix : 4 francs
(2 à 3 cm³ par jour)

Voies hypodermique, intraveineuse, intramusculaire (indolore). — Six ampoules de Digalène.

Prix : 3 francs
(1, 2, 3 ampoules selon les cas d'urgence)

Propriétés thérapeutiques. — Solubilité parfaite, dosage rigoureux, action très rapide, tolérance parfaite, effets constants aux mêmes doses, pas d'accumulation.

Indications. — Chaque fois que le cœur faiblit.

F. HOFFMANN LA ROCHE & C^o
21, place des Vosges — PARIS

D**DIGIFOLINE CIBA**

Préparation renfermant la totalité des glucosides cardio-actifs (digitoline chloroformique et digitaléine) de la digitale; sans digitonine (saponine à action irritante).

Formes. — 1° Comprimés équivalant à 0 gr. 10 de feuilles de digitale titrées physiologiquement; 2° Ampoules à 1 cm³ possédant la même valeur physiologique que 0 gr. 10 de feuilles de digitale titrées physiologiquement; 3° Saccharure à 1/100, 0 gr. 10 équivalant à 0 gr. 10 de feuilles de digitale titrées physiologiquement.

1° Comprimés pour l'usage interne :

Tubes de 25 comprimés de 0,10 3 »
— 12 — — 1 50

2° Ampoules pour l'usage hypodermique et intraveineux :

Boîte de 5 ampoules..... 3 »
— 2 — 1 75

3° Saccharure à 1/100 pour l'usage magistral :

Flacons d'origine de 10 et de 50 gr.

SOCIÉTÉ pour l'INDUSTRIE CHIMIQUE

à SAINT-FONS (Rhône)

DIGITALE BYLA (ÉNERGÈTÈNE DE)

Suc pur inaltérable de la plante
fraîche

Trente-six gouttes = 1 gr. de la plante
fraîche ou 3/10^e 1/2 de digitaline

**Doses, mode d'emploi et indications
thérapeutiques :**

Hyposystolie. — 10 à 15 gouttes
pendant 4 à 5 jours. Interrompre 8 à
15 jours, puis reprendre.

Rétrécissement mitral contre la
dyspnée. — 10 à 20 gouttes 3 à 4 jours
de suite tous les 15 jours.

Endocardite et Péricardite. — 10 à
15 gouttes pendant 2 à 5 jours.

Palpitations et Tachycardie. — 5 à
6 gouttes pendant 8 jours.

Asthme cardiaque, Dyspnée, liés
aux cardiopathies organiques. —
15 à 20 gouttes pendant 2 à 5 jours.

*Artério-sclérose avec Néphro-sclé-
rose* et bruit de galop. Comme toni-
que et diurétique. — 5 à 10 gouttes
pendant 8 jours.

*Grippe, Pneumonie, Pleurésie, Rhu-
matisme articulaire.* Comme toni-
myocardique et surtout comme
diurétique. — 5 à 15 gouttes pendant
4 à 5 jours.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

DIGITALE (INTRAIT DE)

Propriétés thérapeutiques. — L'Intrait de Digitale a une action en tout comparable qualitativement à celle de la Digitale en nature. Action moins brutale, mais plus soutenue, plus durable et moins passagère que celle de la Digitaline.

Particularité. — L'Intrait de Digitale peut être employé en *injections hypodermiques*, indolores et bien tolérées.

Indications. — Les mêmes que celles de la Digitale.

Doses et mode d'emploi. — Formes habituelles d'administration des préparations de Digitale, et en injection hypodermique.

A. *Par voie gastrique.* — 1° Comme *dose cardio-tonique*, 10 à 15 mgr. d'Intrait de Digitale par jour et pendant une quinzaine; 2° Comme *dose sédative*, 25 à 30 mgr. d'Intrait de Digitale pendant 3 à 4 jours consécutifs, avec intervalles de 10 à 12 jours; 3° Comme *dose massive asystolique*, 10 à 12 cgr. en une seule dose.

B. *Par voie hypodermique.* — 1° Comme *dose sédative*, 0 gr. 01 à 0 gr. 025 pendant 3 ou 4 jours consécutifs; 2° Comme *dose massive de Huchard*, 0 gr. 10 en une seule dose.

Laboratoire Pharmaceutique **DAUSSE Aîné**
4, rue Aubriot — PARIS

DIGITALINE CRISTALLISÉE NATIVELLE

(Prix Orfila de 6.000 francs décerné par l'Académie de Médecine de Paris)

Formes. — *Granules Nativelle* au 1/4 de mgr. (granules blancs); *Granules Nativelle* au 1/10^e de mgr. (granules roses), entièrement solubles, rigoureusement dosés; *Solution Nativelle* au millième (50 gouttes correspondent à 1 mgr.); *Ampoules Nativelle* (Digitaline injectable) de 1 cm³ renfermant 1/4 de mgr. de Digitaline cristallisée.

Prix réglementés :

Granules et solution....	3 50
Ampoules.....	4 50

Sur demande envoi de la notice :
" Les Trois doses de Digitaline "
(Baillière 1911). Posologie et formes pharmaceutiques de la Digitaline Nativelle.

Avis important. — La Digitaline Nativelle ne se délivre qu'en flacons. Spécifier sur les ordonnances : *Granules, Solution, Ampoules de Digitaline Nativelle.*

La *Digitaline Nativelle* agit plus sûrement que les autres préparations de digitale.

Laboratoire NATIVELLE
49, Boulevard Port-Royal, PARIS

D

DIONINE-MERCK

Chlorhydrate d'éthylmorphine

Caractères. — Poudre cristalline blanche, sans odeur, de saveur légèrement amère, très soluble dans l'eau (solution neutre).

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif remarquable de la toux et de la douleur, plus actif que les opiacés et tous leurs dérivés, même synthétiques, préférable à la morphine chez les enfants, anesthésique et lymphagogue (ophtalmologie).

Indications. — Toux de toute origine, douleur de toute nature, cure du morphinisme.

Dose et mode d'emploi. — Par jour : 0 gr. 05 à 0 gr. 10 en sirop, potion, injections sous-cutanées, suppositoires, etc.

Sirop, Pâte, Tablettes et Ampoules du Docteur Bousquet (voir fiche spéciale)

Dionine-Merck, en flacons d'origine de 1, 5 et 10 gr.

Pharmacie du Docteur BOUSQUET

Licencié-ès-Sciences

140, faubourg Saint-Honoré

PARIS

DIONNE-MERCK

(Produits du Docteur BOUSQUET à la)

SIROP du Docteur BOUSQUET

Le flacon : 3 francs

Une cuillerée à bouche renferme : 0 gr. 01 de Dionine, 6 gouttes d'alcoolature de racine d'aconit titrée et 2 gouttes de bromoforme chimiquement pur.

Dose quotidienne moyenne. — 4 à 8 cuillerées à bouche (adultes); 2 à 4 cuillerées à potage (enfants au-dessus de 10 ans); 3 à 6 cuillerées à café (enfants au-dessous de 10 ans).

TABLETTES du Docteur BOUSQUET

La boîte : 4 francs

Chaque tablette, soluble, renferme 0 gr. 02 de Dionine

Dose quotidienne moyenne. — 3 à 4 tablettes (adultes).

AMPOULES du Docteur BOUSQUET

Chaque ampoule, de 1 cm³ renferme :

Soit 0 gr. 02 de Dionine, la boîte 4 »

— 0 gr. 05 — — 5 »

Convient pour la prophylaxie et la cure du morphinisme

PATE du Docteur BOUSQUET

La boîte : 1 fr. 50

Adjuvant du traitement par le sirop; goût agréable. Le contenu d'une boîte renferme environ 0 gr. 07 de Dionine.

Dose quotidienne. — Une vingtaine de bonbons.

Pharmacie du Docteur BOUSQUET

Licencié-ès-Sciences

140, faubourg Saint-Honoré — PARIS

D

DIURÈNE

(Suc total d'adonis vernalis)

Propriétés thérapeutiques.

— Tonique cardiaque et diurétique azoturique. Succédané inoffensif de la digitale, agit rapidement sans accumulation et sans augmenter la tension artérielle.

Indications. — Indiqué dans tous les cas d'arythmie, d'asystolie, d'œdème, dans toutes les affections du foie, néphrites, artério-sclérose.

Posologie. — 2 à 6 cuillerées à café par 24 heures.

Le flacon : 4 francs

M. CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS

DRAGÉES DE F. GILLE

à base de protoiodure de fer
Chaque dragée = 0 gr. 05 d'iodure
de fer

Dose. — 2 à 8 par jour, au milieu
ou à la fin des repas.

Propriétés pharmacodynamiques.
— Représentent comme la synthèse
du fer et de l'iode et se caractéri-
sent par la pureté, la solubilité et
l'inaltérabilité du sel de fer.

Propriétés thérapeutiques. — Régé-
nérateur du sang, stimulant des
organes hématopoïétiques et lym-
phoïdes, phagocytogène, antidia-
thésique.

Indications. — Chlorose, Anémies,
Prétuberculose et Tuberculose,
Lymphatisme, Scrofule, Rachi-
tisme, Neurasthénie, Syphilis,
Saturnisme, Diabète, Maladies des
femmes, etc.

Le flacon 3 francs
Produit réglementé

Entrepôt général
73, rue Sainte-Anne — PARIS

D

DRAGÉES NYRDAHL

à l'ibogaïne

Composition. — A base de chlorhydrate d'ibogaïne. Chaque dragée renferme 0 gr. 005 de chlorhydrate. (Voir fiche *Ibogaïne*).

Dose. — 3 à 6 dragées par jour (et plus) après ou entre les repas; avaler sans croquer.

Propriétés thérapeutiques. — Névrossthéniques, toni-cardiaques, excitantes de la nutrition.

Indications. — Neurasthénie, Surmenage, Epuisement, Dépressions nerveuses, Atonies musculaires, Grippe, Convalescences, Impuissance provenant de ces maladies.

Prix : 5 francs le flacon

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld
PARIS

EAUX-BONNES

(Basses-Pyrénées, par Pau, à 40 kil.)

Eaux chloro-sulfurées sodiques
tièdes (33°). *Source Vielle*

Cure saisonnière (15 juin-30 septem-
bre). Surveillance médicale recom-
mandée.

Cure à domicile (la plus exportée des
eaux sulfureuses).

Indications. — Maladies chroniques
des voies respiratoires : Naso-
pharynx, larynx, bronches, pou-
mons.

Bacillose pulmonaire ; pré tuber-
culose, tuberculose fibreuse à
évolution torpide, et cavitaire
stationnaire.

Enfants : Scrofulose, Chloro-Anémie,
Adénopathie trachéo-bronchique.

Dr Ch. SEMPÉ ☉, Médecin consultant
l'hiver à Paris (n'ex. pas)

E

ÉLATINE BOUIN

Extrait du sapin de Norwège
(Gemme et Goudron)

Liquide limpide et de conservation indéfinie.

Doses et mode d'emploi. — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuillerées à soupe par tasse, plusieurs fois par jour — 1 à 2 cuillerées à café pour les Enfants.

A *Titre Préventif*, en temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'**Élatine** peut être prise additionnée à la boisson habituelle aux repas, à raison d'une cuillerée à dessert par verre de liquide.

Ces doses peuvent être augmentées sans aucun inconvénient.

S'emploie en outre en *fumigations, pulvérisations, gargarismes*, etc., etc.

Indications thérapeutiques. — Affections des bronches, vessie et reins.

2 fr. 50 le flacon

A. FAGARD, Pharmacien

23, avenue de la Motte-Piquet, PARIS

ELBON CIBA

Composition. — Combinaison d'acide cinnamique et d'oxyphénylurée, agissant comme antipyrétique doux et modificateur des sécrétions bronchiques.

Indications. — Fièvre tuberculeuse, Catarrhes infectieux des voies respiratoires.

Forme. — Comprimés à 1 gramme.

Dose. — De 4 à 2 comprimés par jour, pour un traitement de longue durée.

Flacons d'origine de 20 comprimés
4 fr. 50

Flacons d'origine de 10 comprimés
2 fr. 50

Société pour l'Industrie Chimique
à SAINT-FONS (Rhône)

ELECTRARGOL

(Argent colloïdal électrique à petits grains, stable)

Formes. — Ampoules de 5 cm³.

Prix : 6 fr. la boîte de 6 ampoules

Ampoules de 10 cm³.

Prix : 6 fr. la boîte de 3 ampoules

Flacons stérilisés de 50 et 100 cm³.
(Fermeture spéciale).

Prix : 6 fr. et 10 fr.

Ampoules compte-gouttes de 10 cm³
pour collyres.

Prix : 2 fr. 50 l'ampoule compte-gouttes

Doses et mode d'emploi

Injection intramusculaire : 10 à 20 cc. et plus.

— intraveineuse : 5 à 15 cc. —

— intrarachidienne : 5 à 10 cc. —

— intrapleurale : 20 à 50 cc. —

— loco dolenti ad libitum

chez l'enfant en bas-âge : 3 à 5 cc.

Remarque. — D'une manière générale on se rend compte facilement que la dose administrée est suffisante lorsque l'injection provoque un abaissement de la température précédé ou non d'une réaction thermique avec frissons; cette réaction peut être assez violente, mais elle est de courte durée et ne doit pas alarmer. Poursuivre le traitement au delà de l'apyrexie désirée afin d'éviter une reprise de la température.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

ELECTROCUPROL

Composition. — Oxyde de cuivre colloïdal à petits grains, obtenu par pulvérisation électrique. L'*Electrocuprol* se présente sous l'aspect d'un liquide brun clair, dichroïque, possédant toutes les propriétés générales des métaux colloïdaux, savoir : pouvoir fermentaire, catalytique et bactéricide.

Formes. — Ampoules de 5 et 10 cm³.
La boîte de 6 et 3 ampoules 6 fr.
L'ampoule compte-gouttes collyre de 10 cm³. Prix : 2 fr. 50.

Applications thérapeutiques. —
L'*Electrocuprol* est employé dans le cancer, en tuberculose, dans les maladies infectieuses.

Doses et mode d'administration. —
L'*Electrocuprol* est délivré en ampoules de 5 cm³ et de 10 cm³. L'isotonie de la solution est assurée au moment même de l'usage. On l'injecte dans les muscles, à la dose de 5 ou 10 cm³ tous les jours ou tous les deux jours, dans les veines à la dose quotidienne de 5 à 20 cm³ selon l'urgence, la gravité de l'affection et la résistance du malade.

COMAR et C^{ie}

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

ELECTROMARTIOL

Composition. — Fer colloïdal à grains très fins et uniformes obtenu par voie électrique. Se présente sous l'aspect d'un liquide brun ambré, légèrement dichroïque, titrant 1 gr. de fer pour 1000.

Formes. — Boîtes de 12 ampoules de 2 cm³. — Prix : 5 fr. ; Boîtes de 6 ampoules de 5 cm³. — Prix : 5 fr.

Applications thérapeutiques et posologie. — Permet de réaliser une médication ferrugineuse hypodermique ou intra-veineuse modèle. Unit aux propriétés spécifiques du fer les propriétés générales des métaux colloïdaux. Injection complètement indolore et ne déterminant jamais de nodosité. Relève rapidement le chiffre des globules rouges et la valeur globulaire; améliore la nutrition générale. Formellement indiqué dans tous les cas de syndrome anémique : anémie essentielle, chlorose (injection quotidienne de 2 cm³), anémies post-hémorragiques, anémies toxiques et anémies infectieuses (5 à 10 cm³ en injection intra-veineuse tous les jours ou tous les deux jours.

COMAR et Cie
20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

ÉLECTROSÉLÉNIUM

Composition. - Sélénium colloïdal à grains ultra-microscopiques extrêmement fins et uniformes, obtenu par la voie électrique. Se présente sous l'aspect d'un liquide rouge corail, transparent, fortement trouble par réflexion.

Formes. — Ampoules de 5 cm³. Prix : 6 fr. la boîte de 3 ampoules.

Applications thérapeutiques. - Affections cancéreuses. L'*Electrosélénium* a été substitué au sélénium simple à cause de sa très faible toxicité, liée à une activité remarquable. Les travaux de Cade et Girard, Girard, Bougeant et Galliot, Blumenthal, Trinkler, Szecsi, etc., ont montré que, sous l'action des injections d'*Electrosélénium* chez les cancéreux, on observait régulièrement la diminution, puis la disparition des douleurs, le relèvement du poids, l'amélioration de l'état général, le ramollissement des tumeurs ganglionnaires, la régression des lésions néoplasiques, et parfois leur cicatrisation, ou tout au moins la suppression des sécrétions fétides et des hémorragies.

Posologie et mode d'administration. — L'*Electrosélénium* s'administre à la dose moyenne de 5 cm³ à la fois, tous les deux jours ou tous les jours, suivant les cas. On peut doubler cette dose. Pour retirer du traitement tout le bénéfice possible il faut administrer le sélénium, de préférence par voie intra-veineuse.

COMAR et C^{ie}

20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

ELIXIR DÉRET

Iodure double de Tanin et de Mercure
Solution vineuse titrée d'Iodure de Tanin et
de Mercure en combinaison stable. Teneur
en Iode 0 gr. 035 et en mercure 0 gr. 005 par
cuillère à soupe. Dépourvu d'arrière-goût
métallique.

Propriétés thérapeutiques.— Anti-
sypilitique.

1° Absence d'accidents d'hydrar-
gyrisme, grâce à l'action spéciale
du tanin.

2° Innocuité sur les voies digesti-
ves (jamais de diarrhée). Des faits
cliniques montrent l'Elixir Déret
souvent toléré par des malades
qui ne pouvaient antérieurement
supporter un autre traitement
mercuriel.

Doses.— *Adultes* : 1 cuillère à soupe;
Enfants : 1/2 à 1 cuillère à café ; à
prendre 2 fois par jour dans un
verre gradué pour éviter le contact
du médicament avec le métal de la
cuillère. Ces doses peuvent être
doublées.

Nota. — Aucune indication de la nature mer-
curielle de la préparation n'est faite sur l'éti-
quette ni sur l'enveloppe. L'Elixir Déret peut
donc être pris aussi discrètement qu'on le
désire.

Prix : 4 fr. 50 le flacon

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

ELIXIR DE PAPAINÉ BYLA

à base de ferment végétal extrait
du carica papaya

*1 verre à liqueur = 0,50 cgr.
de papaine pure*

Existe également sous forme Sirop

Dose et mode d'emploi. — Un verre
à liqueur après chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Di-
gestif puissant, analeptique, eupep-
tique.

Indications. — Affections de l'esto-
mac : dyspepsies, flatulences, dila-
tation, etc.

Prix réglementé : 4 fr. le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

(Seine) GENTILLY (Seine)

E**ELIXIR DE PEPSINE BYLA**

Dosé à 0,50 cgr. de Pepsine dialysée
Byla, titre 100, par verre
à liqueur ou cuillerée à bouche

Dose et mode d'emploi. — Un verre
à liqueur ou une cuillerée à bouche
après chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Di-
gestif naturel.

Indications. — Dyspepsies et gas-
trites. Provoque le relèvement de
l'appétit et des forces dans tous
les cas où l'alimentation paraît
insuffisante.

Prix réglementé : 4 fr. le flacon

— 2 fr. le 1/2 —

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

**ELIXIR DE PROPEPTONEFER
BYLA**

Peptonate de fer préparé au sang
de bœuf privé de sérum

*Existe également sous forme de gouttes
concentrées*

Dose et mode d'emploi. — 1/2 ou
1 verre à liqueur à la fin des repas.

Propriétés thérapeutiques. — Fer
assimilable ne constipant pas et
ne noircissant pas les dents. Re-
constituant et digestif.

Indications. — Anémie, Chlorose,
débilité générale.

Prix réglementé : 4 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

E**ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL**

Hamamelis Virginica et Capsicum
Brasiliense

Contient les principes actifs des
feuilles et de l'écorce de ces plantes

Forme. — Liqueur d'un goût déli-
cieux. Efficacité remarquable.

Dose. — Un verre à liqueur après
chaque repas. Cure de trois semai-
nes et repos d'une semaine.

Propriétés thérapeutiques. — Vaso-
Constricteur énergique. Régulateur
de la Circulation veineuse.

Indications. — Affections du système
veineux. Varices, Varicocèles,
Phlébite et Œdème consécutif,
Ulcères variqueux, Hémorroïdes,
Accidents de la Puberté et de la
Ménopause, Epistaxis, Hémorra-
gies, Dysménorrhée, Congestions,
etc., etc.

Le flacon : 4 fr. 50

Prescrire. — Elixir de Virginie Nyr-
dahl ou Elixir Nyrdahl, pour éviter
les contrefaçons.

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

XU EMULSION MARCHAIS

Phospho-Créosotée

Contenant par cuillerée à café

Créosote de hêtre 0,10 cgr.

Baume de tolu 0,20 »

Glycérophosphate de chaux 0,20 »

Dose. — 3 à 6 cuillerées à café,
dans un peu de lait ou de tisane
tièdes et sucrés.**Indications.** — Toutes celles de
l'Huile de Foie de Morue qu'elle
remplace avantageusement.

Prix : 3 fr. le flacon

Laboratoire de A. MARCHAIS, Ph^{ieu}
à LA ROCHELLE

Laboratoires CLIN

21, rue des Portes-Saint-Jacques, PARIS

E

**ENERGÉTÈNES VÉGÉTAUX
BYLA**

Sucs inaltérables de plantes fraîches
chimiquement dosés
et physiologiquement éprouvés

VALÉRIANE

MUGUET

GENËT

GUI

DIGITALE

SAUGE

COLCHIQUE

CASSIS

MARRONS D'INDE

Voir à

chacun de ces

Produits

**Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)**

Prescrire : Elixir de Virginie Nyrdahl ou Elixir Nyrdahl, pour éviter les contrefaçons.

Produits NYRDAHL

25, rue de La Rochebeaucourt, PARIS

ENÉSOL

Composition. — Salicylarsinate de mercure, à arsenic et mercure dissimulés. Renferme 38,46 % de Hg. métal, et 14,4 % de As sous forme dissimulée. Les solutions sont incolores et ne coagulent pas l'albumine.

Forme. — Ampoules de 2 cm³ et de 5 cm³ contenant 0 gr. 03 de salicylarsinate de mercure par cm³ correspondant à 0,0115 de Hg. métal et à 0,0043 de As métalloïde par cm³.

Prix : 4 fr. la b^{te} de 10 ampoules de 2 cc.
— 5 fr. — 6 — 5 —

Propriétés thérapeutiques. — Agent antisyphilitique (agissant à la fois par son arsenic et par son mercure). Action analeptique par l'arsenic.

Doses et mode d'emploi. — Dose moyenne : Injection *intra-musculaire* d'une ampoule (2 cm³) par jour. Dose massive : Injection *intra-musculaire* ou *intra-veineuse* de 4 à 8 cm³ tous les 2 ou 3 jours.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

ENGELUROL

Spécifique des Engelures

Sirop spécialement polyminéralisé à base de Ca, Ph, I, Fe, Br, Mg, Cl, K

Propriétés. — En reminéralisant l'organisme, fait disparaître la prédisposition aux engelures toujours liée à un taux de minéralisation inférieur à la normale (croissance, lymphatisme, débilité).

Indications. — Les engelures même les plus graves guérissent en moins d'une semaine. Résultat constant.

Aucune contre-indication, si ce n'est l'Artério-Sclérose et l'Athérome à cause de la richesse en chaux de la préparation.

Doses (à prendre dans l'eau ou dans la boisson habituelle) :

Adultes : 2 cuillerées à café au milieu du déjeuner et 2 au milieu du dîner. Si dès le 5^e jour, l'amélioration n'est pas obtenue, faire prendre 2 cuillerées à café au petit déjeuner du matin, puis augmenter d'une cuillerée tous les 2 jours jusqu'à dose nécessaire et suffisante. Dose maxima par jour, 12 cuillerées à café.

Enfants : Dose maxima : une cuillerée à café par jour et par année d'âge, à donner en 3 fois, matin, midi et soir.

Spécialité réglementée, prix : 3 fr. le flac.

Dépôt général : **Pharmacie LACHARTRE**
41, rue de Rome, PARIS

ENTEROKINASE BYLA

Muqueuse intestinale

Capsules opothérapeutiques à enrobage
néo-résineux, solubles seulement
dans le suc intestinal (à 0,10 egr.).

Dose moyenne. — 5 capsules dans
les 24 heures.

Indications thérapeutiques.— Consti-
pation, Entérite muco-membra-
neuse, etc.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

Laboratoire de Thérapeutique
appliquée

Jean CLÉMENT, directeur

25, rue Priant, PARIS

E

ERGOT DE SEIGLE

(Extrait fluide Dausse)

Extrait fluide à poids égal d'Ergot
(Codex 1908) pour injections
hypodermiques

Propriétés thérapeutiques. — Vaso-
constricteur et excitant des fibres
musculaires lisses, hémostatique.

Indications. — Hémorragies internes,
métrorragies, hémorragies post
partum par inertie utérine (si
l'utérus est vide toutefois), hémor-
ragies de la ménopause. Déconges-
tif, congestion pulmonaire, conges-
tion médullaire et cérébrale, etc.

Posologie. — 1 à 2 cm³ en injection
hypodermique.

Laboratoire Pharmaceutique

DAUSSE Aîné

4, rue Aubriot, PARIS

EUKÉNOL

Seul produit à base exclusive
de Sels biliaires purs

Dragées dosées à 0,15 cgr. de sels biliaires.

Granulé dosé à 0,20 cgr. par cuill. à café.

Suppositoires : Adultes à 0,10 cgr. de sels.

— Enfants à 0,05 cgr. de sels.

Les sels biliaires représentent 2 fois leur poids d'extrait de bile officinal et 20 fois leur poids de bile fraîche.

Doses moyennes. — 2 à 10 dragées.

1 à 6 cuillerées à café de granulé.

Enfants : Une demi-cuillerée à café de granulé par année d'âge.

Propriétés physiologiques. — Le plus actif des cholagogues. Agent parfait d'opothérapie biliaire.

Indications. — *Foie* : Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Ictère, Cholémie, Cirrhoses.

Intestins : Entérite muco-membraneuse, Constipation atonique, Gastro-Entérite infantile.

Cœur : Tachycardie paroxystique, Hyposystolie rythmée, Tuberculose avec syndrome cardio-entéro-hépatique.

**Laboratoire de Thérapeutique
appliquée**

Jean CLÉMENT, directeur

25, rue Friant, PARIS

E

EULACTINE MILLET

Culture pure sur milieu végétal du plus puissant ferment lactique connu (Bacille de Cohendy)

EULACTINE

Cultures liquides : Bouillon, 4 flacons d'une dose journalière. Prix : 6 fr.

Cultures sèches : La boîte de 8 tubes d'une dose journalière. Prix : 6 fr.

La boîte de 5 tubes. Prix : 4 fr.

La boîte de 5 tubes de 10 comprimés. Prix : 4 fr.

Propriétés thérapeutiques. — Bactériothérapie intestinale.

Indications. — Infection intestinale, entérite muco-membraneuse, gastro-entérite des enfants et des nourrissons, constipation atonique, grippe intestinale, appendicite chronique, etc.

Laboratoires SAUTER

49, rue de Paradis, PARIS

GENÈVE, Bellegarde (Ain)

EXO-GASTRINE BYLA

Suc normal concentré et inaltérable
de l'estomac de porc

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuillères à café par jour à prendre après les repas dans un peu d'eau gazeuse.

Propriétés thérapeutiques :

Exerce une action opothérapique propre sur les fonctions physiologiques des organes digestifs, notamment sur l'estomac dont elle est le *tonique par excellence*.

Indications. — Dans toutes les affections où il y a insuffisance fonctionnelle relative ou absolue : Dyspepsie, Hypersthénie, Convalescence et Anorexie des maladies aiguës, Amaigrissement et Suralimentation des Cachectiques et des Tuberculeux, Gastrites chroniques, Embarras et Fièvres gastriques.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

E**EXO-HÉPATINE BYLA**

Suc naturel inaltérable de la glande
hépatique du porc

1 cuillerée à café = 5 gr. de l'organe frais

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuil-
lerées à café par jour à prendre
entre les repas dans un peu d'eau
gazeuse.

Indications thérapeutiques :

Exerce une action opothérapique
propre dans toutes les insuffi-
sances hépatiques : Cirrhoses, Hy-
pertrophie, Ascite, Diabète et
Lésions de la rate.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

EXO-HYPOPHYSINE BYLA E

Suc naturel inaltérable de la glande hypophysaire du bœuf

75 gouttes = 1 glande hypophysaire fraîche

Dose et mode d'emploi. — 75 gouttes deux fois par jour à prendre matin et soir dans un peu d'eau gazeuse.

Indications thérapeutiques :
Exerce une action opothérapique propre dans tous les cas de myxœdème et d'infantilisme.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

B

EXO-ORCHITINE BYLA

Suc naturel inaltérable de la glande orchitique du taureau

1 cuillerée à café = 5 gr. de l'organe frais

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour à prendre entre les repas dans un peu d'eau gazeuse.

Indications thérapeutiques :

Exerce une action opothérapique propre dans les déchéances physiologiques ou toxiques, la Débilité sénile, les Névroses, l'impuissance et le simple surmenage.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

EXO-OVARINE BYLA

Suc inaltérable de la glande
ovarique de la brebis

1 cuillerée à café = 5 gr. de l'organe frais

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuil-
lerées à café par jour à prendre
entre les repas dans un peu d'eau
gazeuse.

Indications thérapeutiques :
Exerce une action opothérapique
propre dans tous les cas de trou-
bles fonctionnels.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

E

EXO-PANCRÉATINE BYLA

Suc normal inaltérable
du Pancréas du Porc

Renferme à l'état naissant les trois
ferments de la glande pancréati-
que : *Amyloprine, Trypsine, Lipase.*

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuil-
lerées à café par jour à prendre
après les repas dans un peu d'eau
gazeuse.

Indications thérapeutiques :

Exerce une action opothérapique
propre sur les fonctions physiolo-
giques des organes digestifs, no-
tamment sur l'intestin dont elle
est le tonique par excellence.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

EXO-PULMINE BYLA

Suc inaltérable du poumon de chèvre

Dose et mode d'emploi. — 3 à 4 cuillères à café par jour dans un peu d'eau gazeuse.

Indications thérapeutiques :

Exerce une action opothérapique propre dans tous les cas d'affections pulmonaires : Pneumonies, Bronchites, Tuberculose, etc.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

E

**EXO-RÉNINE ou EXO-NÉPHRINE
BYLA**

Suc naturel inaltérable du
rein du porc

*1 cuillerée à café = 5 gr. de l'organe
frais avec l'intégralité de ses zy-
mases à l'état naissant.*

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuil-
lerées à café par jour à prendre
entre les repas dans un peu d'eau
gazeuse.

Indications thérapeutiques :
Exerce une action opothérapique
propre dans les néphrites aiguës
ou chroniques, les accidents de
l'urémie et de l'albuminurie.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

EXO-THYROIDINE BYLA

Suc naturel inaltérable du corps
thyroïde du mouton

30 gouttes = 1 lobe thyroïdien frais

Dose et mode d'emploi. — 30 gouttes deux fois par jour à prendre matin et soir dans un peu d'eau gazeuse.

Indications thérapeutiques :

Exerce une action opothérapique propre dans tous les cas de myxœdème et d'infantilisme.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

Laboratoire Albert BUISSON
21, boulevard Montparnasse, PARIS

E

EXTRAIT BILIAIRE BYLA

Capsules opothérapeutiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (à 0,10 cgr.).

Dose moyenne. — 5 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Coliques hépatiques, Lithiase biliaire, Ictère par rétention, Colite muco-membraneuse, Constipation, etc.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

FEROXAL BUISSON

Granulé de protoxalate de fer
(0 gr. 10 par cuillerée à café)
combiné aux phosphates alcalins
du sérum sanguin

Propriétés thérapeutiques. — Hyperglobulise et minéralise. Tolérance absolue par le tube digestif. Action rapide et non constipante.

Indications. — Celles des ferrugineux et des phosphates : Anémies diverses, Prétuberculose, Grossesse, Allaitement, Convalescence.

Dose. — Une à deux cuillerées à café à chaque repas.

Le flacon : 3 fr. 50

Laboratoires Albert BUISSON

20, boulevard du Montparnasse, PARIS

FER RABUTEAU

(Protochlorure de fer cristallisé)

Formes. — 1° *Dragées de Fer du Dr Rabuteau* à 0 gr. 025 de Fe Cl³.

Prix : 3 fr. le flacon de 100 dragées

2° *Elixir du Dr Rabuteau* à 0 gr. 10 de Fe Cl³ par cuillerée à café.

Prix : 5 fr. le flacon de 300 cm³

3° *Sirop du Dr Rabuteau* à 0 gr. 05 par cuillerée à dessert.

Prix : 3 fr. le flacon de 200 cm³

Propriétés thérapeutiques. — Le plus assimilable des ferrugineux. Elève à la fois le nombre des globules rouges et leur teneur en hémoglobine.

Dose. — 4 à 8 dragées par jour; 1 à 2 cuillerées à café d'Elixir.

Nota. — L'altérabilité naturelle du protochlorure de fer est évitée par les formules du Dr Rabuteau.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

FIXINE GRÉMY

Lactate d'alumine

Granulé dosé à 1 gr. de lactate d'alumine par cuillerée à café.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café après chacun des trois principaux repas. — *Enfants* : 1/2 dose. Avaler les grains de Fixine dans une gorgée d'eau sans les croquer, ou les mélanger à une confiture.

Propriétés thérapeutiques. — Antitoxique intestinal.

Indications. — Auto-intoxication intestinale et ses conséquences.

Contre-indication. — Diarrhée acide.

P. LONGUET

50, rue des Lombards, PARIS

F

FLAVÉINE BYLA

Principe actif du corps jaune
de l'ovaire

*Capsules opothérapeutiques à enrobage
néo-résineux, solubles seulement
dans le suc intestinal (à 0,05 mgr.).*

Dose moyenne. — 5 capsules dans
les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Amé-
norrhée, Dysménorrhée doulou-
reuse, Dysovarie, Psychoses de la
puberté, tous les troubles dus à
un fonctionnement insuffisant des
corps jaunes, etc.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

*Note. — L'altérabilité naturelle du
protoclorure de fer est évitée par
les formules du Dr. Rabatzen.*

Laboratoires CLIN

20, rue des Poissés St-Jacques, PARIS

FORMOLATEURS HÉLIOS ^F

(Méthode officiellement reconnue
et autorisée
par Décisions Ministérielles)

Formolateur A. — Thérapeutique et
hygiène des voies respiratoires.
Désodorisation, assainissement des
chambres de malades. Désinfection
et stérilisation de petits volumes
(étuves, placards, malles, etc.).

Prix du Formolateur A, complet : 6 fr.

Formolateur B. simple. — Désinfection
radicale des locaux (100 mètres
cubes en une seule séance).
Convient aux familles.

Prix avec 500 Pastilles Formaline :
21 francs

Les *Formolateurs* emploient les *Pas-
tilles de Formaline Hélios* dont la
gazéification agit radicalement.

N. B. — Nos prix s'entendent avec
20 % de réduction à MM. les
Médecins.

27, rue des Petits-Hôtels — PARIS

F

FORTOSSAN CIBA

Sel de soude de l'acide phytinique,
associé à la lactose

Forme spéciale du principe phospho-
organique des graines végétales
réservée aux enfants de moins
de 2 ans.

Poudre : La boîte de 80 gr. : 2 fr.

Doses et mode d'emploi :

Enfants de moins de 2 mois :
2 mesures 2 fois par jour.

Enfants de 2 à 6 mois : 2 mesures
4 fois par jour.

Enfants de 6 à 12 mois : 3 mesures
4 fois par jour.

Enfants de 1 à 2 ans : 4 mesures
4 fois par jour,

dans du lait ou de la bouillie.
Le lait peut être stérilisé après
solution.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-
rachitique.

Société pour l'Industrie Chimique
à SAINT-FONS (Rhône)

GAIARSOL BOUTY

Méthylarsinate de Gaïacol

Ampoules dosées à 0,05 cgr. de Gaïarsol par unité.

Gouttes dont 20 = 0,05 cgr. de Gaïarsol.

Dose et mode d'emploi. — 20 à 50 gouttes ou une ampoule par 24 heures.

Indications thérapeutiques.—Médicament type dans la Tuberculose et les affections des voies respiratoires.

Prix réglementé : 4 francs la boîte
(Aux Médecins, net 2 fr.)

Laboratoires BOUTY

3^{bis}, rue de Dunkerque, PARIS

Dr FRÉMONT, Ancien Interne Lauréat
des Hôpitaux de Paris
Chevalier de la Légion d'Honneur
Médecin de l'Hôpital Thermal
de VICHY (Allier)

G

GASTÉRASE BYLA

(Muqueuse stomacale)

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (à 0 gr. 15).

Dose moyenne. — 5 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques :
Hypopepsie.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

GASTÉRINÉ FRÉMONT

Suc gastrique naturel secrété par
l'estomac entier du chien vivant
isolé d'après la méthode
du Dr Frémont (15^e année)

Liquide incolore.

Doses et mode d'emploi. — 1 à
3 cuillerées à soupe, dans du bouil-
lon ou de la bière pendant chaque
repas; 1/2 dose pour les enfants.

Propriétés thérapeutiques. — Col-
loïde régénérateur de l'estomac.

Indications. — Embarras gastrique
aigu ou chronique, Dyspepsie,
Gastrite, Anorexie des Neurasthé-
niques ou des Tuberculeux, Gas-
tro-entérite, Convalescence. *Cent
fois plus active et deux fois moins
chère que toutes ses imitations.*

5 fr. le flacon; 2 fr. 75 le 1/2 flacon

Dr FRÉMONT, Ancien Interne-Lauréat
des Hôpitaux de Paris
Chevalier de la Légion d'Honneur

**Médecin de l'Hôpital Thermal
de VICHY (Allier)**

G

GASTROSAN HEYDEN

Salicylate double de Bismuth

Trochisques dosés à 0,75 cgr. par unité.

Doses. — *Enfants* : 1 à 2 gr. par jour ; *Adultes* ; 4 à 6 gr. par jour. A prendre en 4 fois.

Propriétés thérapeutiques. — Action antiaacide, antifermentative, antiseptique intestinal.

Indications. — Troubles hyperchlorhydriques, Pyrosis, Fermentations stomacales et intestinales, Augmentation de la putréfaction intestinale avec diarrhée opiniâtre, Vomissements chez les enfants par suite de décomposition du contenu stomacal.

2 fr. la boîte de 20 *Trochisques*

Produits HEYDEN

29 et 31, rue Philippe-de-Girard

PARIS (Xe)

GASTROZYMASE BOUTY

Suc gastrique naturel concentré

Comprimés solubles.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés à prendre au milieu de chaque repas, dissous dans 3 à 4 cuillerées à bouche d'eau froide.

Propriétés thérapeutiques :
Digestif immédiat, antiseptique, excito-secrétoire.

Indications. — Embarras gastrique, Dilatation, Indigestion, Dyspepsie atonique, Neurasthénie, Anémie, Débilisation générale, etc.

Contre indications. — Hyperpepsie, Hypérioracidité.

Prix réglementé :
4 fr. la boîte de 45 comprimés
Aux médecins : Escompte : 50 %

Labcratoires BOUTY

3^{bis}, rue de Dunkerque, PARIS

G

GENÊT BYLA (Energêtène de)

Suc pur inaltérable de plante fraîche

36 gouttes = 1 gr. de plante fraîche
ou 0,022 mgr. de spartéine.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 gr.
par jour en 2 ou 4 fois à prendre
dans un peu d'eau sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Toni-
cardiaque, nervin, diurétique.

Indications. — Hyposystolie, Insuffi-
sance mitrale, Cardiopathie arté-
rielle, Artériosclérose, Néphrites,
Œdèmes.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

GLOBULES TÆNIAFUGES**DE SecrÉTAN**

Composition. — Extrait éthéré des rhizomes frais de fougère mâle des Vosges, sans chloroforme ni calomel.

Indications. — Tœnifuge et anthelmintique contre le *botriocéphale*, les deux *ténias* (*armé* et *inermé*), l'*ankylostome* et le *cysticerque*.

Mode d'emploi. — Prendre les globules le matin à jeun, de 5 en 5 minutes dans un peu d'eau.

Prix du flacon : 10 fr.

Dépôt : 17, rue Cadet, PARIS

E. MEISSONNIER

118, rue Lafayette, PARIS (Xe)

G

GLUTOL

Poudre de gélatine agglutinant l'aldéhyde formique.

Dose et mode d'emploi. — Saupoudrer abondamment.

Propriétés thérapeutiques. — Au contact des tissus, le Glutol rend libre l'aldéhyde formique, microbicide puissant et antiputrescible hors ligne.

Indications. — Brûlures, Plaies, Suppurations.

Prix : 10 gr., 0 fr. 80

PHARMACIE RATIONNELLE

4, faubourg Poissonnière

GLYCÉROPHOSPHATE

ROBIN

Composition et forme. — Granulé de Phospho-Glycérate de Chaux et de Soude purs.

Action physio-thérapeutique. — Le glycérophosphate étant l'élément constitutif de la substance nerveuse, a une action réparatrice très nette dans tous les cas d'affaiblissement des cellules nerveuses par défaut de nutrition. Excite l'appétit et relève les forces. Entretien du système nerveux et de la charpente osseuse.

Indications. — Rachitisme, Vice de développement du système osseux chez l'enfant, Neurasthénie, Phosphaturie, Déminéralisation de l'organisme.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 mesures par repas dans un peu d'eau ou de lait. 2 mesures correspondent à 30 cgr. de glycérophosphates.

Pour les enfants une mesure par repas.

Prix : le petit flacon, 4 fr. 50
— le grand, de 500 gr. 7 fr. 50

Maurice ROBIN

13, rue de Poissy, PARIS

GLYCOGÈNE CLIN

Composition. — Hydrate de carbone voisin de l'amidon ($C^6 H^{10} O^5$)_n. Poudre blanche, insipide, soluble dans l'eau en donnant un liquide opalescent que l'acide acétique éclaircit.

Formes. — 1^o *Capsules de Glycogène Clin* glutinisées à 0 gr. 20 par cm³.

Prix : 6 fr. le flacon de 40 capsules

2^o *Granulé de Glycogène Clin* à 0 gr. 20 par cuillerée à café.

Prix : 6 fr. le flacon de 110 gr.

3^o *Tubes stérilisés de Glycogène Clin* de 2 cm³ à 0 gr. 05 par cm³.

Prix : 6 fr. la boîte de 20 tubes de 2 cm³.

Dose. — *Voie buccale* : 60 cgr. à 1 gr. par jour (3 à 5 capsules ou cuillerées à café de granulé).

Nota. — Le granulé à base de sucre ne sera pas prescrit dans le diabète.

Voie hypodermique : 1 tube par jour (inj. intramusculaire).

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

GOUTTES " NICAN "

Composition et forme. — Solution de bromoforme pur (entièrement dissous), Aconit, Belladone, Codéine, Drosera, Grindélia. Absence complète de sucre.

(4 gouttes renferment 1 goutte de bromoforme)

Caractéristiques. — Stabilité parfaite. Dosage très rigoureux des composants dont la valeur thérapeutique est connue. Activité optimale sous un volume minimum. Emploi progressif ou massif, *ad libitum*, du bromoforme.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique puissant, sédatif très énergique de la toux en général. Effet rapide et persistant.

Indications. — Toux de la Coqueluche et de la Grippe, Toux spasmodique et coqueluchoïde, Toux émétisante des Tuberculeux, Laryngite, Bronchite, Adénopathie trachéo-bronchique, Asthme, etc.

Pas de contre-indications. Aucun accident à redouter.

Posologie et doses moyennes.

Par prise avant 1 an :	5 à 8 Gouttes
— de 1 à 2 —	8 à 12 —
— de 2 à 5 —	12 à 15 —
— de 5 à 10 —	15 à 25 —
— de 10 à 15 —	25 à 35 —
— de 15 à 25 —	35 à 45 —
— Adultes	45 —

Administration

Progressive	Massive
2 prises le 1 ^{er} et 2 ^e jour	4 prises dès le 1 ^{er} jour
3 — le 3 ^e et 4 ^e	Par Dose moyenne. 4 prises
4 — dès le 5 ^e —	24 h. Dose maxima. 6 prises

A absorber, loin des repas, dans de l'eau ou du grog à peine tièdes qu'on agitera en y ajoutant les gouttes.

Suivant les cas, l'administration doit être massive ou progressive, procédé de choix dans la coqueluche.

Laboratoire CANTIN

à PALAISEAU (Seine-et-Oise)

G

GOUTTES

DE PROPEPTONEFER BYLA

Peptonate de fer préparé au sang
de bœuf privé de sérum

Existe également sous forme d'élixir

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :*
30 à 40 gouttes deux fois par jour
aux repas, dans le liquide préféré.
Enfants : 1 goutte par année d'âge
deux fois par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Fer
assimilable ne constipant pas et ne
noircissant pas les dents. Reconsti-
tuant et digestif.

Indications. — Anémie, Chlorose,
Débilité générale.

Prix réglementé : 4 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

GUI BYLA
(ENERGÉTÈNE)

Suc pur inaltérable de la
plante fraîche

36 gouttes = 1 gr. de plante fraîche.

Dose et mode d'emploi. — 20
50 gouttes par jour, à prendre en
4 fois dans un peu d'eau pure ou
sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Hy-
potensives et diurétiques.

Indications. — Artériosclérose, Car-
diopathies artérielles, Hyperten-
sion, Albuminurie, Néphrite, Né-
phrosclérose, Eclampsie, Hémop-
tysies, Hémorragies, Ménorragies,
Épistaxis.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

H**HAMAMELINE ROYA**

Préparation d'Hamamelis obtenue directement de la plante fraîche, contient à l'état concentré (0 gr. 20 par cuillerée à soupe), le principe actif, aromatique de la plante, " l'Essence ", à l'exclusion de la matière extractive, inerte au point de vue vasculaire. (Les *Gouttes, Extraits, Teintures, Pilules, Elixirs*, etc. d'Hamamelis, venant de la plante sèche ne renferment, eux, que la matière extractive et pas un atome du principe actif " l'Essence ").

Propriétés. — Vaso-constricteur énergique et durable. Tonique des fibres lisses, Sédatif vasculaire puissant, Anticongestif.

Indications. — Toutes Dilatations, Congestions et Inflammations veineuses, Varices, Varicocèles, Hémorroïdes, Phlébites. Congestions, Fibromes, Métrorragies, Hémoptysies, Hématémèses, Hématuries, Accidents congestifs de la Ménopause.

Dose. — 2 à 4 cuillerées à soupe par jour, demi-heure à une heure avant de manger.

Spécialité réglementée

Prix : le flacon 5 francs

Pharmacie LACHARTRE

41, rue de Rome — PARIS

HAMAMELIS

Les principes actifs des feuilles et de l'écorce de cette plante associés à ceux du capsicum brésilien ont servi à la préparation de l'*Elixir de Virginie Nyrdahl*.

(Voir fiche particulière)

D'innombrables contrefaçons et imitations de ce produit ont été faites

Les mots *Elixir de Virginie* ainsi que le mot *Nyrdahl* sont déposés

Prescrire : *Elixir de Virginie Nyrdahl*
ou *Elixir Nyrdahl*

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld

PARIS

HAMAMELIS
(EXTRAIT FLUIDE DAUSSE)

Extrait fluide à poids égal de feuilles
(Codex 1908)

Propriétés thérapeutiques. — Vasoconstricteur utilisé contre les hémorragies internes.

Indications. — Hémorragies diverses, Hémoptysies, Métorrhagies, Affections du système veineux, Varices, Hémorroïdes (action incertaine).

Posologie. — *Adultes* : en une fois 2 gr. ; par jour, 6 gr. — *Enfants* : de 1 à 3 ans, 10 à 30 gouttes par jour ; jusqu'à 5 ans, 1 à 2 gr. ; jusqu'à 10 ans, 2 à 4 gr., en potion, sirop, élixir.

Elixir :

Extrait fluide d'Hamamelis Dausse	15 gr.
Sirop de framboises.....	200 —
Elixir de Garus	}
Eau distillée... { àà.....	

(2 à 3 verres à liqueur par jour)

Potion :

Extrait fluide d'Hamamelis Dausse	5 gr.
Sirop d'écorces d'oranges amères	100 —
Teinture de vanille.....	10 —

(par cuillerée à café)

Laboratoire Pharmaceutique

DAUSSE Aîné

4, rue Aubriot — PARIS

HÉMATOL

Extrait sanguin à base de sérum
hémopoïétique

Granulé agréable au goût

Dose et mode d'emploi. — 4 cuil-
lerées à café de granulé par jour
(2 cuillerées un quart d'heure avant
les repas).

Propriétés thérapeutiques.
— Excitant spécifique de la réno-
vation sanguine, excitant de l'Hé-
mopoïèse.

Indications. — Anémies : essentielles,
symptomatiques, toxiques, Chlo-
rose, Convalescence, Déchéances
organiques.

Prix réglementé :

Le flacon 7 francs

Laboratoire de l'Hématol

Pharmacien de 1^{re} Classe

18, rue Guillou - PARIS

H

HÉMOGLOBINE BYLA

Principe ferrugineux du sang

Capsules opothérapiques à enrobage
néo-résineux solubles seulement
dans le suc intestinal (à 0,05 cgr).

Dose moyenne. — 5 capsules dans
les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Ané-
mie, Chlorose, Débilité, Faiblesse
générale, Maladies nerveuses, Con-
valescences des maladies graves,
Fièvres des pays chauds, Neuras-
thénie, etc.

Prix réglementé :

Le flacon 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

Laboratoire Pharmaceutique

BAUSSE Aîné

4, rue Aubriot — PARIS

HEMOSTYL
DU DOCTEUR ROUSSEL

Sérum hémopoïétique de cheval

Présentations. — Ampoules de 10 cm³ (boîtes de 6 ampoules) : boire le contenu d'une ampoule le matin à jeun, dans un quart de verre d'eau.

Comprimés (boîtes de 45) : 6 à 8 par jour, 2 avant chacun des principaux repas.

Indications. — Toutes les Anémies, Convalescences, Tuberculose, Hémorragies (Métrorragies, Hémoptysies, etc.) : injecter 20 cm³ dans les cas graves; ingestion ou lavements dans les cas subaigus.

Toutes les applications du sérum de cheval

L. PREUD'HOMME

Pharmacien de 1^{re} Classe

15, rue Gaillon — PARIS

Secrétaire de Biologie

A. DANIEL BRUNET

1, rue du Docteur-Blanche — PARIS

H

HÉPATINE BYLA

Glande hépatique

Capsules opothérapiques à enrobage
néo-résineux, solubles seulement
dans le suc intestinal (à 0,15 egr.).

Dose moyenne. — 5 à 10 capsules
dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Dans
toutes les insuffisances hépatiques :
Cirrhoses, Hypertrophie, Ascite,
Diabète et lésions de la rate.

Prix réglementé :

Le flacon 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

L. PÉREUD'HOMME
Pharmacien de 1^{re} Classe
16, rue Gallien — PARIS

HÉPATO-BYL

Opothérapies entérique, hépatique
et biliaire en ovoïdes glutinisés

Dose. — 4 à 8 ovoïdes par jour, en
trois fois, dix minutes avant les
repas (avec un demi-verre d'eau
destiné à faire pression sur le
pylore et à entraîner le tout dans
l'intestin) ou le soir, la dose com-
plète en une seule fois avant de se
coucher.

Propriétés. — *L'extrait biliaire seul
est thérapeutiquement insuffisant.
Aussi le Corps Medical prescrit de
préférence l'extrait total de la
glande hépatique (bile et foie) addi-
tionné d'extrait intestinal dans
la Constipation, l'Entéocolite et
toutes les Affections du foie.*

Prix réglementé :

Le flacon 5 fr. 75

Médication sans similaires
ni équivalents

Laboratoires de Biologie

A. DANIEL-BRUNET

5, rue du Docteur-Blanche — PARIS

HÉROÏNE VICARIO

Chlorhydrate de l'éther diacétique
de la morphine

Comprimés solubles dosés à 0,005 mgr.

Comprimés solubles dosés à 0,0025 mgr.
(colorés au cacao).

Comprimés solubles dosés à 0,010 mgr.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* :
1 à 8 comprimés de 0,005 par jour. —
Enfants : 1 à 4 comprimés de 0,005
par jour.

Les comprimés Vicario diffèrent consi-
dérablement des comprimés similaires
par leur désagrégation rapide et com-
plète, leur assimilation certaine et leur
dosage rigoureux.

Dose maxima en 24 heures : 5 mgr.

Propriétés thérapeutiques. — Eupnéi-
que, antidyspnéique, calme remar-
quablement la Toux.

Indications. — Toutes les Affections des
voies respiratoires.

Prix réglementé :

3 francs le flacon de 60 comprimés

Pour éviter toute substitution, prescrire
Héroïne Vicario

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS

HIPPOPLASINE GRAN

Plasma musculaire manganique intégral, concentré, aseptique et inaltérable.

Une cuillerée à bouche = 0,01 cgr. de manganèse colloïdal

Dose et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 à 6 cuillerées à bouche par jour.
— *Enfants* : 2 à 3 cuillerées à bouche par jour.

Verser la dose d'Hippoplasine en premier dans un verre, y ajouter ensuite en agitant doucement un peu d'eau froide, simple ou gazeuse.

Propriétés thérapeutiques. — Néozomothérapie.

Indications. — Tuberculose, Prétuberculose, états anémiques, troubles de la nutrition, Psychoses, Neurasthénie, etc.

Prix réglementés :

Le demi-flacon..... 4 francs

Le flacon..... 7 fr. 50

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

HORDÉNINE-LAUTH

Composition. — Sulfate d'Hordénine ($C^{10}H^{15}NO$). Nouvel alcaloïde extrait des touraillons d'orge.

Formes pharmaceutiques. — *Voie stomacale* : Bulles dosées à 0,10 cgr. de sel. En flacons de 50 bulles, 6 francs ou demi-flacons de 20 bulles, 2 fr. 50. Prescrire un flacon ou demi-flacon bulles d'Hordénine-Lauth.

Voie hypodermique : Ampoules dosées à 0,25 cgr. de sel par cm^3 . En boîtes de 10 ampoules, 7 fr. 50, ou demi-boîtes de 5 ampoules, 4 francs. Prescrire une boîte ou demi-boîte, ampoules d'Hordénine-Lauth.

Lavements : Tourol, poudre-mère d'Hordénine-Lauth. En boîtes de 150 gr., environ, 2 francs.

Indications. — Spécifique des Diarrhées et Dysenteries en général. Diarrhées de toute nature, Gastro-entérites infantiles, Entérites, Entéro-colites, Dysenteries des pays chauds, ambiennes ou bacillaires, etc.

Posologie. — *Adultes* : 10 à 15 bulles par jour, ou une ou deux ampoules. — *Enfants et nouveau-nés* : Injecter un quart à une ampoule, ou bien donner de une à six bulles telles que, ou dissoutes dans de l'eau ou du lait.

Le Tourol sera employé pour des lavages d'intestin en décoction, à raison de 50 gr. pour 1000 d'eau bouillie.

G. PÉPIN, Docteur en Pharmacie
9, rue du Quatre-Septembre — PARIS

HUILE GRISE STÉRILISÉE DE VIGIER

à 40 gr. de mercure pour 100 cm³ d'huile
(Codex 1908)

Un centimètre cube de cette huile correspond à 0,40 cgr. de Hg et une division de la seringue de Pravaz à 0,02 cgr.

Mode d'emploi. — Pour pratiquer les injections intra-musculaires d'*Huile grise Vigier*, il est préférable de se servir de la *seringue spéciale du Docteur Barthélemy, nouveau modèle stérilisable Vigier* à 15 divisions, dont chacune correspond exactement à un centimètre cube de Hg.

Doses à injecter. — Elles sont forcément variables selon les cas, le sujet, le poids, les périodes et la nature des accidents. Pratiquement, elles doivent être faites par séries de 6, espacées de 8 jours. Après 6 semaines de traitement, on accordera 4 semaines environ de repos au malade.

Doses moyennes de chaque injection. — Pour l'adulte, tous les jours, 8 cgr. de Hg ou 8 divisions de la seringue du Docteur Barthélemy. — Pour la femme, 6 à 7 cgr. — Pour l'enfant, au-dessus de 3 ans, 1 cgr.

Pendant la 1^{re} année, on traitera 8 mois sur 12
— 2^e — — 6 — —
— les 3^e et 4^e — — 4 — —

Pendant les années suivantes, en moyenne, une année sur quatre.

Prix du flacon stérilisé, environ 2 cm³.
pour 3 à 4 injections..... 2 25
Prix du double flacon stérilisé, pour
6 à 8 injections..... 4 25

Pharmacie VIGIER et HUERRE
12, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

12, rue Castiglione — PARIS

HYDRASTIS

(Extrait fluide Dausse)

Extrait fluide à poids égal de rhizome
(Codex 1908)**Propriétés thérapeutiques.**
— Hémostatique interne, vaso-
constricteur.**Indications.** — Métrorragies, Ménor-
ragies, Hémoptysies, Hémorragies
viscérales, pulmonaires.**Posologie.** — *Dose maxima* en une
fois : 1 gr. ; par jour : 5 gr. A pren-
dre par 20 ou 30 gouttes à la fois,
dans de l'eau sucrée ou une potion.*Potion :*Extrait fluide d'Hydrastis
Dausse..... }
Malaga blanc } àà PE
Sirop d'angélique..... }**Laboratoire pharmaceutique**
DAUSSE Aîné

4, rue Aubriot — PARIS

HYPOPHOSPHITES**CHURCHILL**

Sels de phosphore complètement assimilables, parce que non oxydés

Sirops et Ampoules (Voir la fiche Ampoules Churchill)

Sirop d'Hypophosphite de chaux Churchill : 0 gr. 20 par dose, dans Phosphaturie, Tuberculose, Asthénie, Diabète, Rachitisme, Dentition, Bronchites.

Sirop d'Hypophosphite de soude Churchill : 0 gr. 20 par dose, mêmes indications mais en cas d'hypertension artérielle et d'âge avancé.

Sirop d'Hypophosphite de fer Churchill : 0 gr. 10 par dose, dans Anémie, Chlorose, Aménorrhée, Dysménorrhée. *Et tous autres sels : manganèse, potasse, magnésie, ammoniacque, etc.*

Sirop d'Hypophosphite composé Churchill dans la proportion des bases minérales de l'organisme avec méthylarsinate de strychnine : 1 mgr. par dose, Neurasthénie et dans tous les cas exigeant un reconstituant énergique.

Dose pour adultes. — Une à deux cuillères à soupe dans un peu d'eau après les deux principaux repas.

Le flacon..... 4 francs

(Prix réglementé)

Exiger la signature Churchill et la marque de fabrique de la **Pharmacie SWANN**

12, rue Castiglione — PARIS

H**HYPOPHYSINE BYLA**

Glande hypophysaire

Capsules opothérapeutiques à enrobage
néo-résineux, solubles seulement
dans le suc intestinal, à 0,05 cgr.

Dose moyenne. — 2 à 4 capsules
dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Dans
tous les cas de myxœdème et d'in-
fantilisme.

Prix réglementé :

Le flacon..... 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

IBOGAINE

L'Iboga est une plante de l'Afrique Occidentale et plus particulièrement du Congo, dont les nègres mâchent la racine pour se donner des forces nouvelles ou fournir un surcroît de travail.

Dans un mémoire présenté à l'Académie des Sciences, MM. Dybowski et Landrin ont montré que ses propriétés excitantes étaient dues à un nouvel alcaloïde auquel ils ont donné le nom d'Ibogaïne.

Étudiée par les professeurs Pouchet et Huchard, et les docteurs Chevalier, Landrin et De Clomesnil, l'Ibogaïne s'est révélée comme un médicament "névros-thénique, toni-cardiaque et excitant de la nutrition" (Société de thérapeutique).

L'expérimentation clinique est venue confirmer les données physiologiques. Le chlorhydrate d'Ibogaïne a été employé dans les Hôpitaux de Paris, avec succès, dans la neurasthénie, la grippe, la convalescence des maladies infectieuses, et dans un certain nombre d'asthénies et dilatations cardiaques.

Indications. — Les Dragées Nyrdahl à l'Ibogaïne seront prescrites dans les maladies suivantes : Neurasthénie, faiblesse, surmenage, dépression nerveuse, atonie musculaire, grippe, convalescence, anémie cérébrale, impuissance.

Dose. — 2 à 6 par jour (avalé sans croquer).

Prix : 5 fr. le flacon

Pharmacie MORIDE
20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

INTRAITS DAUSSE

Extraits physiologiques de végétaux stabilisés

Propriétés pharmacologiques. — Les intraits ou extraits physiologiques de végétaux stabilisés sont des produits préparés avec des plantes stabilisées, d'après le procédé *Perrol-Goris*, et débarrassés par des traitements successifs, à l'aide de dissolvants neutres, de toutes les matières étrangères et indifférentes qui accompagnent les principes actifs dans la plante, telles que chlorophylle, matières grasses, cireuses et résineuses.

Les intraits sont des préparations galéniques d'un nouveau genre, se recommandant par leurs propriétés spéciales, qui les rendent susceptibles d'applications nombreuses.

En raison de la facilité de leur titrage chimique et de leur évaluation physiologique, on peut être certain d'avoir toujours à sa disposition, non seulement un médicament de *titre uniforme et toujours semblable*, mais surtout aussi un médicament qui conserve *l'intégralité d'action de la plante*.

Caractères. — Les intraits sont des produits pulvérulents, très avides d'eau en général, et par conséquent très facilement solubles.

Intrraits divers. — On prépare actuellement les intrraits de Digitale, de Muguet, de Marron d'Inde, de Kola, de Valériane, etc. (Voir ces mots).

Laboratoire Pharm^{ie} DAUSSE Aîné
4, rue Aubriot, PARIS

IODE

Produits Moride

Vin de Moride } iodo-tannique.
Sirop de Moride }

Produits Nyrdahl

Algarine Nyrdahl (Saccharure iodo-tannique phosphaté).

Voir les fiches particulières à ces différentes spécialités

Pharmacie MORIDE

20, rue de La Rochefoucauld
PARIS

IODÉYL FOURNIER

Combinaison iodo-organique
d'iode et peptone pure

Formes. — *Globules* : 0,01 cgr. iode métalloïdique combiné par globule.

Dose. — 3 à 6 globules par jour, à prendre aux repas.

Indications. — Celles de l'iode et de l'iodure : Adénopathies chroniques, Emphysème, Asthme, Artério-Sclérose, Syphilis.

Flacon de 60 globules : 4 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères

26, boulevard de l'Hôpital

PARIS

... non seule-
ment un médicament, mais surtout
un médicament qui conserve
l'efficacité d'action de la plante.
Caractères. — Les extraits sont des pro-
duits pulvérisés, très actifs d'un
côté, et par conséquent très
facilement absorbés.
Extraits divers. — On prépare actuelle-
ment les extraits de Digitalis, de Muscarine,
de Matico d'iode, de Noli, de Yucca
filifera, etc. (Voir ces mots).
Laboratoire Pharm. BAUSSE Aîné
1, rue Anbricq, PARIS

IODOGÉNOL PÉPIN

I

Peptone iodée spéciale

Gouttes titrées : 20 gouttes contiennent 0 gr. 01 d'iode.

Supérieur à tous les produits similaires, aux iodures métalliques et aux vins et sirops iodés.

S'en différencie par : 1° L'absence d'acide iodhydrique libre; 2° La grande stabilité des iodures organiques et la nature de leurs bases; 3° La très grande proportion d'iode substitué (25 % de l'iode total au lieu de 0 à 8 %); 4° La très grande activité pharmacodynamique de l'iode sous cette forme.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

Les études clinique et physico-chimique montrent que c'est la meilleure forme d'administration de l'iode et des iodures.

Posologie. — Enfants : 10 à 20 gouttes par jour; adultes : 40 gouttes par jour, dans un peu d'eau, aux repas, en 2 fois. Syphilis : 100 à 120 gouttes par jour.

4 fr. 50 le flacon. — Prix réglementé

PÉPIN et LÉBOUCQ
à COURBEVOIE (Seine)

IODONE ROBIN

Iode-Peptide au Peptide d'Iode

Composition. — La seule combinaison physiologique. Iode et peptide tryptique, contenant 16,48 0/0 d'iode.

Formes. — Gouttes : 20 gouttes correspondent, comme effet thérapeutique, à 1 gr. d'iodure de K.
Injectable : Ampoule à 1 cm³

Indications. — Toutes celles de l'iode et de l'iodure de K : Artério-sclérose, Asthme, Syphilis, Rhumatismes, Goutte, Affections cardiaques, Obésité.

Tertiarisme : en injections, assimilation et tolérance parfaites.

Suppression absolue de tous les accidents d'iodisme.

Dose. — 10 à 50 gouttes 2 fois par jour au moment des principaux repas.

1 à 2 ampoules par 24 heures.

Prix } Le flacon : 4 fr. 50.
 } Ampoules : 5 fr.

Maurice ROBIN

13, rue de Poissy, PARIS

I IODOSTARINE ROCHE

Acide Diiodo 6-7 élaïdique ou taririque diiodé du professeur ARNAUD (du Museum) et du docteur POSTERNAK (communication à l'Académie des Sciences, Paris, CXLIX, page 220). 47,56 % d'iode organique complètement assimilé, sans aucune saveur. Absorbé seulement dans l'intestin.

Indications. — Remplace KI aux mêmes doses.

Posologie et mode d'emploi :

1° *Iodostarine ROCHE* *Cachets*, dosés à 0,25 cgr.

Adultes : 1 à 4 par jour, selon les cas

Prix { La boîte de 20 cachets, 2 fr. 50
 { La boîte de 40 cachets, 4 fr.

2° *Iodostarine ROCHE* *Comprimés*, dosés à 0,125 mgr. :

Adultes : 2 à 8 par jour, selon les cas.

Enfants : 1 à 4 par jour, selon l'âge.

Les comprimés peuvent être absorbés très facilement avec un peu de liquide (eau, vin, thé ou café), au choix du malade.

Prix { Le flacon de 40 comprimés, 2 fr. 50.
 { Le flacon de 80 comprimés, 4 fr.

3° *Iodostarine ROCHE* *Granulé*, dosé à 0,25 cgr. par mesure (intérieur de la capsule en aluminium).

Adultes : 1 à 4 mesures par jour, selon les cas.

Enfants : 1/2 à 2 mesures par jour, selon l'âge.

Prix. — Le flacon de granulé, 4 fr.

Toutes ces préparations sont d'une blancheur immaculée

N.-B. — On prend l'*Iodostarine ROCHE* de préférence à la fin des repas.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co
21, place des Vosges, PARIS

IODURASE COUTURIEUX

(Ioduro-Enzymes)

Capsules dont chacune renferme :
0,50 cgr. d'iodure de potassium;
0,10 cgr. d'enzymes.

Propriétés thérapeutiques. — Identiques à celles des iodures sans iodisme.

Indications et doses. — *Affections du cœur* : 1 à 3 caps.; *Arterio-sclérose* : 1 à 6 caps.; *Arthritisme et Goutte* : 1 à 4 caps.; *Asthme* : 1 à 3 caps.; *Goître* : 4 à 8 caps.; *Obésité* : 2 à 4 caps.; *Saturnisme* : 2 à 6 caps.; *Syphilis* : 2 à 12 caps.; à prendre aux repas de préférence, pendant 15 jours, avec repos de 15 jours.

Le flacon : 5 fr.

C. COUTURIEUX

*Ex-Interne et Chef de Laboratoire
des Hôpitaux de Paris*

57, Avenue d'Antin, PARIS

IODURES SOUFFRON

Iodure de Potassium (KI). Iodure de Sodium (NaI)

Chimiquement purs

Titrés — Inaltérables

Pas d'Iodisme

Solution à 1/15^e. Une cuillerée à potage contient 1 gr. KI ou NaI.

Sirop à 1/20. Une cuillerée à potage contient 1 gr. KI ou NaI.

Dragées à 0 gr. 25 chaque KI ou NaI. Kératinisées ou non.

Gouttes à 1/5^e. Une goutte contient 0,01 cgr. KI ou NaI.

Dose et mode d'emploi. — De 0,15 à 1 gr. par jour et plus.

Propriétés thérapeutiques. — Altérant-fondant, dépuratif.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections de l'appareil respiratoire, Affections du cœur, Rhumatisme, Goître, Syphilis.

Laboratoire L. SOUFFRON

26, rue de Turin, PARIS

JÉCOL**Médicament Hépatique complet**

Composition. — Combinaison de différentes substances végétales, Evonyme, Boldo, Combretum ayant chacune une action spéciale sur le Foie.

Forme pharmaceutique. — Cachets très petits, dosés à 0,24 cgr.

Propriétés thérapeutiques. — L'Evonyme est un *Cholagogue*. — Le Boldo est un *Tonique hépatique*. — Le Combretum est à la fois le plus actif des *Cholagogues* (suivant le Prof. Albert Robin), un *Tonique* et un *Diurétique*. — Le Combretum enfin, développe à un degré très élevé le *pouvoir antitoxique* du Foie.

Indications thérapeutiques. — Cholémies, Ictère, Cirrhose biliaire, Lithiase biliaire, Congestion hépatique, Diabète.

Affections intestinales par insuffisance hépatique.

Tous les cas d'intoxication, d'empoisonnement, d'infection rendant nécessaire l'intervention énergique de la *défense hépatique*.

Dose et mode d'emploi. — 1 cachet après chacun des deux principaux repas (de préférence avec de l'eau alcaline), pour l'obtention d'une *action cholagogue prolongée*.

Pour obtenir un *effet cholagogue plus intense*, on pourra atteindre la dose de 4 cachets par jour, 1 après le petit déjeuner, 2 après le déjeuner et 1 après le diner.

La boîte de 30 cachets : 4 fr. (réglementé)

LABORATOIRE DU JÉCOL

7, rue de la Force, Ste-MENEHOULD

KINEURINE MONCOUR

Glycéro-phosphate
de Quinine basique cristallisé

Sphérulines dosées à 0 gr. 10 cgr.
par unité.

Doses, mode d'emploi et indications.

— 1^o Comme *Fébrifuge* : 6 à 12
sphérulines, le plus loin possi-
ble de l'accès. Pour les enfants
de 5 à 10 ans, la dose est réduite
de 2 à 4 sphérulines.

2^o Comme *antinévralgique* : De 3 à
6 sphérulines par jour, prises
2 heures avant l'accès.

3^o Comme *tonique* : De 2 à 4 sphé-
rulines par jour, soit 1 ou 2 im-
médiatement avant les princi-
paux repas.

(Communications à la Société de
Pharmacie de Paris 2 février et
2 mars 1898).

Prix réglementé : 3 fr. la boîte

A. de MONTCOURT

49, Avenue Victor-Hugo, à Boulogne
(Seine)

KOLA MIDY

(à base de kolium ou extrait complet de noix de kola fraîches)

Vin de Kola Midy, 2 à 3 verres à madère par jour et plus pour adultes. 1 à 4 cuillerées à soupe pour enfants.

Prix : 4 fr. 50

Kola granulée Midy, 4 à 6 cuillerées à café pour adultes et 1 à 2 cuillerées à café pour enfants.

Prix : 4 fr. 50

Kolium Midy (Extrait complet fluide), 2 à 5 cuillerées à café par jour dans un liquide sucré de préférence pour adultes. 1 cuillerée à café pour enfants.

Prix : 4 fr. 50

Chocolat Midy au Kolium, 3 à 5 tablettes pour adultes, 1 à 2 pour enfants.

Prix : 3 fr. 50

Propriétés thérapeutiques. — Tonique du cœur, aliment d'épargne.

Indications. — Neurasthénie, Surmenage, Fatigue physique et intellectuelle, Convalescences.

Produits réglementés

Pharmacie MIDY

140, faubourg Saint-Honoré
PARIS (VIII^e)

KOLAYO

Combinaison de Kola et de Coca
(connue autrefois
sous le nom de *Kola-Coca Sauter*)

Forme. — Tablettes comprimées dragéifiées au chocolat, très agréables.

Dose. — *A sec* : 1 ou 2 pastilles par heure jusqu'à concurrence de 6 ou 8 pastilles par jour. On peut aller jusqu'à 15 à 20 pastilles en 24 heures dans les cas de grande fatigue.

En tisane : 2 tablettes dans une tasse d'eau bouillante sucrée ou non 2 à 3 fois par jour.

Dans du vin : Ecraser le contenu d'une boîte dans une bouteille de bon vin et laisser infuser 48 heures. A prendre 3 ou 4 fois par jour la valeur d'un verre à madère soit aux repas, soit entre eux.

Propriétés. — Le rouge de la Kola nourrit la fibre musculaire, tandis que la feuille de Coca agit sur les organes sécréteurs et en assure le bon fonctionnement. Régénérateur et Régulateur.

Indications. — Anémie, Chlorose, Débilité générale, Diabète, Neurasthénie, longues Convalescences. Tonique et stimulant pour cyclistes, touristes, chasseurs, etc.

Prix : 1 fr. 75 la boîte de 40 pastilles

Laboratoires SAUTER

49, rue de Paradis, 49 - PARIS
GENÈVE, Bellegarde (Ain)

LACTOBACILLINE

Ferments lactiques purs et sélectionnés, c'est-à-dire sous la forme la plus active, de la Société "Le Ferment", seul Fournisseur du Professeur Metchnikoff.

Comprimés : En boîtes de 8 tubes de chacun 6 comprimés.

Poudre : En boîtes de 10 tubes et 5 tubes contenant chacun la dose nécessaire pour ensemen-
cer 1 litre de lait.

Bouillon : Extrait concentré de malt ensemen-
cé avec des bacilles lactiques, en boîtes
de 4 flacons de 60 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — Transforma-
tion de la flore intestinale nocive en flore
bienfaisante.

Doses et mode d'emploi. — *Comprimés* : 3 à 9
par jour ; *Poudre* : 1/2 à 1 tube par jour ;
Bouillon : 1 flacon par jour.

A prendre après les repas dans un liquide ou
avec des aliments sucrés.

Prix réglementés :

Le flacon de comprimés, 4 francs.

La boîte de 10 tubes Poudre, 8 francs.

— 5 — — 5 —

— de bouillon, 4 francs.

Comprimés de Lactobacilline glycogène :
Ferments lactiques et amylolytique asso-
ciés.

Propriétés thérapeutiques. — Celles des
ferments lactiques dont l'action est renforcée
par leur association avec le bacille glyco-
bacter qui transforme en sucre les subs-
tances amylacées. La Lactobacilline glyco-
gène est particulièrement indiquée dans les
cas de digestion incomplète des amylacés.

Dose et mode d'emploi. — 3 à 9 par jour, une
demi-heure avant ou immédiatement après
chaque repas.

Prix réglementé : la boîte, 5 francs

Société "LE FERMENT", 13, rue Pavée PARIS

LACTOCHOL

Ferment lactique pur (Bacille Persan) et extraits biliaires dépigmentés.

Forme. — Comprimés.

Doses et mode d'emploi. — 1° *Adultes* : 4 à 12 comprimés par jour 1/4 d'heure avant le repas dans l'eau sucrée, miel, confiture, sirop (avaler sans mâcher); 2° *Enfants* : 2 à 6 comprimés par jour dans les mêmes véhicules; 3° *Nourrissons* : Un 1/2 comprimé délayé dans un peu de lait avant une tétée ou un biberon le matin ou le soir.

Propriétés thérapeutiques. — 1° Sur le tube digestif : Action eupeptique des plus remarquables. — 2° Sur l'intestin : Intervient comme régulateur de la fonction biliaire, puis agit rapidement sur la flore microbienne intestinale qu'il modifie.

Indications. — Entérite de l'adulte et du nourrisson, entérite muco-membraneuse, appendicite chronique, dysenterie. *Constipation* : Rééducateur type de l'intestin, insuffisance biliaire, anorexie, dermatoses, furonculose, états toxiques et infectieux.

Laboratoire de Thérapie-Bio-Chimique
50, rue Rennequin, PARIS

LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, naphtholphtaléine.

Forme. — Comprimés.

Propriétés physiologiques et thérapeutiques. — Supprime immédiatement la constipation chronique ou accidentelle, les intoxications gastro-intestinales, fermentations putrides, Perturbations hépatiques et biliaires. Rétablit la sensibilité de la muqueuse, provoque la péristalse sans la moindre irritation intestinale. Augmente considérablement l'action modificatrice des ferments lactiques non associés en remédiant à leur insuffisance.

Mode d'emploi et doses. — Le soir au coucher un ou deux comprimés dans un peu d'eau sucrée. Augmenter les doses, si besoin est, pour obtenir un bon effet laxatif au réveil. Pour les enfants, un comprimé suffit.

La boîte de 6 tubes de 6 comprimés
2 fr. 50 (en France)

Laboratoires Biologiques André PARIS
1, rue de Châteaudun, PARIS

LACTOZYMASE B

Ferment lactique Bulgare

Comprimés de 0,50 cgr., préparés de telle façon que la conservation du ferment dans toute son activité est assurée pour au moins 18 mois.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptic gastro-intestinale.

Indications. — Gastro-entérites, entérites mucomembraneuses, fièvre typhoïde, appendicite, grippe, constipation, diarrhées, dermatoses (furunculose, urticaire, acné, eczéma, etc.), migraines, rhumatismes, artério-sclérose, etc.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 comprimés après chaque repas avec dessert sucré (compotes, confitures, infusion, etc.). — *Enfants* : 1 comprimé pris de la même façon. Le traitement devra être suivi pendant 4 à 6 semaines.

Prix réglementé :
la boîte de 30 comprimés, 3 fr. 50

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE
24, rue Caumartin, PARIS

L

LAXATIF MIRATON

ou Pastilles laxatives de Châtelguyon
créé en 1902, par Miraton

Nous recommandons à Messieurs les Docteurs de prescrire ce Laxatif — à base d'encélatine et de sels naturels de Châtelguyon — en insistant sur le nom de leur créateur, MIRATON.

Composition du Laxatif Miraton. —

Encélatine (C²⁰H¹⁴O³) 0,08; sels naturels de la source Châtel-Guyon obtenus par évaporation dans le vide 0,05; sels recueillis par dépôt direct (oxyde de fer), magnésium, calcium, silicium 0,05; produits excipients: Sucre vanillé du Codex; gomme adragante Q. S.

Doses et mode d'emploi. — Adultes: 1 à 3 pastilles à sucer; Enfants: 1/3 ou 1/2 pastille à sucer de préférence le soir au coucher.

Propriétés thérapeutiques. — Laxative ou purgative suivant la dose.

Indications. — Constipation, migraines, dyspepsies, flatulences, entérites, appendicites, hémorroïdes, affections du foie et de l'intestin.

Prix réglementé : la boîte, 2 francs

Etablissement MIRATON
de CHATELGUYON

LAXATOL

à base de Phtaléine du Phénol

Forme. — Pastille d'un goût très agréable.

Doses et mode d'emploi. — A. *Comme purgatif* : 1° Enfants de 1 à 4 ans, 1/2 pastille le matin à jeun; 2° Enfants de 4 à 10 ans, 1/2 à 1 pastille le matin à jeun; 3° Enfants de 10 à 16 ans, 1 à 2 pastilles le matin à jeun; 4° A partir de 16 ans et pour adultes, 2 à 3 pastilles le matin à jeun ou le soir avant le coucher. — B. *Comme laxatif* : Le tiers ou la moitié des doses sus-indiquées.

Ne jamais avaler ces pastilles tout entières ou les croquer. Il faut les laisser fondre dans la bouche ou les dissoudre dans un peu d'eau.

Le soir, il faut toujours laisser écouler 2 heures après le dernier repas, et à jeun ou avant un repas de la journée, laisser au moins une demi-heure d'intervalle.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif, purgatif et désinfectant. Combat la fermentation putride de la stase fécale.

Indications. — Toutes celles de la Constipation.

Prix : la boîte de 30 comprimés, 1 fr. 50

Laboratoires SAUTER

49, rue de Paradis, PARIS — GENÈVE, Bellegarde (Ain)

LÉCITHINE CLIN

Extraite de l'œuf

Composition. — Les lécithines du commerce renferment souvent une forte proportion de matières grasses de l'œuf qui en diminuent le titre en phosphore et, par suite, l'activité thérapeutique ; elles peuvent également, lorsqu'elles sont mal préparées, être en partie décomposées et contenir des bases choliniques libres dont l'ingestion peut provoquer des accidents. *La Lécithine Clin est de pureté garantie.*

Formes. — *Pilules de Lécithine Clin* à 0,05 par pilule.

Prix : le flacon de 50 pilules, 5 francs

Granulé de Lécithine Clin à 0 gr. 10 par cuillerée à café.

Prix : le flacon de 110 gr., 5 francs

Tubes stérilisés de 1 cm³ de Lécithine Clin à 0 gr. 05 par tube.

Prix : la boîte de 10 tubes, 5 francs

Tubes stérilisés de Lécithine Clin en association avec le fer, le gaiacol, la strychnine aux dosages usuels.

Doses. — Voie buccale : 20 à 30 egr. par jour. Voie hypodermique : 5 à 10 egr. (1 ou 2 tubes) par jour, *en injection intramusculaire.*

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés Saint-Jacques, PARIS

LEVURINE EXTRACTIVE COUTURIEUX

Principes solubles de la Levure de bière, correspond à 35 fois son poids de Levure fraîche et à 6 fois son poids de Levure sèche.

Comprimés, dosés à 0,20 de principe actif.

Ampoules injectables, de 3 cm³.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 9 comprimés par jour ou 1 à 2 ampoules. Avaler les comprimés à la façon de pilules. — *Enfants* : 1/2 comprimé 2 à 3 fois par jour ou une 1/2 ampoule. Faire dissoudre le comprimé dans un peu d'eau sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Agit en modifiant le terrain, en le rendant impropre au développement microbien et comme anti-toxique.

Indications. — Furonculose, affections staphylococciques, entérites, dermatoses.

la boîte de 50 comprimés, 5 fr.
La boîte de 4 amp. injectables, 5 fr.

C. COUTURIEUX

Ex-Interne et Chef de Laboratoire des Hôpitaux de Paris
57, avenue d'Antin, PARIS

I.

LIPOCHOL BYLA

Cholestérine pure libre et combinée.
Substitutif de l'huile de foie de morue.

Emulsion dont 1 cuillerée à bouche = 0,30 cgr. de cholestérine pure.

Pilules dont 1 = 0,20 cgr. de cholestérine pure.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées d'émulsion ou 5 à 10 pilules par jour et plus, 1/2 dose pour les enfants. On peut prendre ce médicament à n'importe quel moment de la journée.

Propriétés thérapeutiques. — Phagocyto-gène, antitoxique, antihémolytique.

Indications. — Tuberculose, lymphatisme et scrofule, anémie, chlorose, déglobulisation, entérite, scorbut, purpura, ictères, intoxication, anémie des obèses. D'une manière générale chez tous les enfants auxquels on prescrit actuellement l'huile de foie de morue.

Prix réglementé :

Emulsion ou Pilules, le flacon, 6 fr.

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

LIPIODINE CIBA

Composition. — Ether éthylique de l'acide diiodobrassicique, contenant 41 % d'iode. Cristaux blancs, inodores, insipides, fondant à 37°. Insoluble dans l'eau, difficilement soluble dans l'alcool, très soluble dans l'éther et les huiles grasses.

Indications. — Celles de la médication iodurée.

Forme. — Comprimés à 0 gr. 30 de lipoiodine pure.

Dose. — De 1 à 6 comprimés par jour, après les repas principaux. Avoir soin de bien mâcher les comprimés.

Tube de 20 comprimés, 3 francs
— 10 — 1 fr. 50

Société pour l'Industrie Chimique
à SAINT-FONS (Rhône)

À base de huiles d'alkérange et de alcalate de soude, les Pilules Laitille sont prises dans les périodes intercalaires des accès, à la dose de 4 à 10 pilules par jour.

Prix : le flacon de 100 pilules, 10 fr.

Laboratoires CLIM

23, rue des Coëtes Saint-Jacques, PARIS

L

**LIQUEUR
ANTIARTHRITIQUE**

à la Résine de Gayac

Chaque cuillerée à bouche contient :
Résine de Gayac, 0,40 cgr. ; Cocaïne,
0,005 mgr.

Indications. — Goutte, Rhumatismes,
et en général toutes les manifesta-
tions de l'Arthritisme.

Dose. — 3 à 4 cuillerées à soupe par
jour.

Prix : le flacon, 4 francs

Pharmacie L. MULLER

40, rue de la Bienfaisance, PARIS

Prix réglementé :

Région de Paris, le flacon, 4 fr.

Les Emballages S. L. A.

4 GENTILLY (Seine)

LIQUEUR LAVILLE

Composition. — Quino-colocynthine et principes actifs de convallaria maialis, gentiane, scille, hermodactyle et fraxinus excelsior.

Propriétés thérapeutiques. — *Spécifique de l'accès de goutte*; exerce une action sédative sur la douleur; augmente l'élimination de l'acide urique.

Forme. — Vin médicamenteux.

Prix : le flacon, 10 francs

Dose et mode d'emploi. — Cas aigus graves : une cuillère à café dans une tasse de thé 2 heures avant ou 4 heures après le repas. Recommencer quelques heures après s'il est nécessaire. En cas de douleurs modérées, une cuillère à café le matin à jeun pendant 3 jours.

PILULES LAVILLE

A base de baies d'alkékenge et de silicate de soude, les Pilules Laville sont prises dans les périodes intercalaires des accès, à la dose de 4 à 10 pilules par jour.

Prix : le flacon de 100 pilules, 10 fr.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés Saint-Jacques, PARIS

LUSOFORME

(Formol saponiné)

1 cuillère à café ou 5 gr. = 1 gr. de Formol à 40 %.

Lusoforme médical. — Antiseptique général de 1,2 à 1 0,0.

Non toxique, non caustique, sans odeur, ne coagule pas les albuminoïdes, n'attaque pas les instruments de gomme ou métal.

Lusoforme brut. — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 0,0.

Pour parquets, ustensiles des malades, linge sale (ne le tache pas), crachoirs, toute grosse désinfection. — 2 francs le kilo.

Indications. — Chirurgie courante, Accidents, Voies urinaires, Gynécologie, Accouchements, Stérilisation des mains et des instruments, Furoncles, Hyperhydroses, etc.*Le Lusoforme est un savon alcalin liquide contenant 20 0/0 de formol et stérilisé à l'autoclave.***Société Parisienne d'Antiseptie**
15, rue d'Argenteuil, PARIS

LYCÉTOL VICARIO

Tartrate de diméthylpipérazine

Granulé effervescent : 1 mesure = 0,25 cgr. de Lycétol pur.

Dose et mode d'emploi. — De 2 à 6 mesures par jour dans un verre d'eau, de préférence à jeun ou entre les repas.

Propriétés thérapeutiques. — *Le plus puissant dissolvant de l'acide urique.* Vingt fois plus actif que les sels de Lithine. Innocuité absolue. Assimilation facile sans aucun trouble digestif.

Indications. — Diathèse urique, Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques, Arthritisme, Diabète, Rhumatismes, Dermatoses.

Prix réglementé : le flacon, 5 francs

Pour éviter toute substitution, prescrire Lycétol "VICARIO".

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann, PARIS

Société de LYCÉOL
18, rue Naxos, 2 CLICHY (Seine)

L

LYMPHATINE BYLA

Ganglions lymphatiques

Capsules opothérapeutiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (à 0,10 cgr.).

Dose moyenne. — 5 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Adénite, Engorgement ganglionnaire et Scrofule.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

Société Parisienne d'Antiseptiques
15, rue d'Argenteuil, PARIS

LYSOL

Liquide brun, de consistance huileuse qui s'obtient en traitant le crésyloï impur de houille par la potasse en présence d'un corps gras ou résineux.

Dose et mode d'emploi. — 10 à 30 grammes en solution dans l'eau bouillie, suivant les cas.

Propriétés thérapeutiques. — Désinfectant, antiseptique non toxique le plus sûr, le plus puissant, le moins cher.

Indications. — Lavages des plaies de toute nature. Employé à la dose de 10 à 15 gr. par litre, il préserve la peau de toutes les *Rougeurs, Gerçures, Crevasses, Engelures, Dartres, Boulons, etc.* Il prévient, par son usage quotidien, l'*Influenza, les Fièvres contagieuses et les Maladies infectieuses.*

En flacons de 125 gr. : 1.25

250 gr. : 2 fr. - 500 gr. : 3 fr.

Le kilo : 5 fr.

Société du LYSOL

12, rue Martre, à CLICHY (Seine)



M

MARRON D'INDE (INTRAIT DE)

Extrait physiologique
de Marron d'Inde stabilisé

Propriétés thérapeutiques. — L'Intrait de Marron d'Inde, contrôlé physiologiquement, a une action médicamenteuse constante et uniforme. Son action est certaine et supérieure à l'alcoolature de plante non stabilisée. *Antihémorroïdaire* (Artault de Vevey).

Indications. — Hémorroïdes, varices, sédatif des douleurs hémorroïdales.

Posologie. — Dose moyenne : 1 cgr. par 24 heures.

Préparations d'Intrait de Marron d'Inde : *Pilules à 2 mgr.*

Solution d'Intrait de Marron d'Inde à 5 %. — Jusqu'à 30 gouttes par jour.

**Laboratoire pharmaceutique
DAUSSE Aîné, 4, rue Aubriot, PARIS**



MÉDICATION ARRHÉNIQUE COMPOSÉE

1° Arsenic et Fer

Marsyle Clin (Cacodylate de protoxyde de fer) : Renferme dans des proportions thérapeutiques l'arsenic et le fer au minimum d'oxydation.

Gouttes Clin à 0,025 par 5 gouttes.

Prix : le flacon de 25 cm³, 5 fr.

Globules Clin à 0,025 par globule.

Prix : le flacon de 60 globules, 5 fr.

Tubes Stérilisés Clin à 0,05 par cm³
(injection intramusculaire).

Prix : la boîte de 14 tubes de 1 cm³, 6 fr.

Dose. — De 5 à 10 egr. par jour.

Métharsinate de Fer Clin (Méthylarsinate de Fer).

Gouttes Clin à 0 gr. 01 par 5 gouttes.

Prix : le flacon de 25 cm³, 4 fr.

Globules Clin à 0 gr. 01 par globule.

Prix : le flacon de 60 globules, 4 fr.

Tubes Stérilisés Clin à 0 gr. 05 par cm³
(injection intramusculaire).

Prix : la boîte de 14 tubes de 1 cm³, 5 fr.

Dose. — 3 à 10 egr. par jour.

Laboratoire CLIN,

20, rue des Fossés Saint-Jacques, PARIS

MÉDICATION ARRHÉNIQUE SIMPLE

Cacodylate de soude Clin, Métharsinate Clin
Médication arsenicale organique non toxique

I. — *Cacodylate de Soude Clin* :

Gouttes Clin 0 gr. 01 par 5 gouttes.

Prix : le flacon de 25 cm³, 3 fr. 50

Globules Clin 0 gr. 01 par globule, enrobés
au gluten.

Prix : le flacon de 60 globules, 3 fr. 50

Tubes Stérilisés Clin. — Prix :

1 ^o à 0,05 par cm ³ , 5 fr. la b. de 20 amp. de 1 cm ³	—	2 50 1/2 b.	10	—	—
2 ^o à 0,01	—	3 fr. la b.	20	—	—
à 0,02	—	3 50 la b.	20	—	—
à 0,03	—	4 fr. la b.	20	—	—
3 ^o à 0,10	—	5 fr. la b.	14	—	—

Dose. — La dose moyenne est de 0,05 par
jour, que l'on peut porter à 0 gr. 10 et à
0 gr. 15.

II. — *Métharsinate Clin.* (Méthylarsinate diso- dique chimiquement pur) :

Gouttes Clin, à 0 gr. 01 par 5 gouttes.

Prix : le flacon de 25 cm³, 4 fr.

Globules Clin, à 0 gr. 01 par globule, enrobés
au gluten.

Prix : le flacon de 60 globules, 4 fr.

Tubes Stérilisés Clin, à 0 gr. 05 par cm³

Prix : la boîte de 14 tubes de 1 cm³, 5 fr.

Dose. — En moyenne 0 gr. 05 par jour.

Le traitement comprend généralement des
périodes de huit jours environ alternant avec
des périodes de repos d'égale durée.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés Saint-Jacques, PARIS

MÉLUBRINE

Phényldiméthylpyrazolonaminométhylène-sulfite de soude. Dérivé formaldéhydique de l'aminopyrine.

Cachets de 1 gr. ; comprimés de 0,50 cgr.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, antipyrétique, analgésique et antinevralgique, la *Mélubrine* est caractérisée par une innocuité absolue. Elle est, en effet, dépourvue de toute toxicité. Elle ne produit aucun phénomène secondaire nocif à la dose de 1 gr. par kilogr. de lapin (l'antipyrine est mortelle à la dose de 0,75 cgr. par kilogr. d'animal).

Indications. — Toutes celles de l'antipyrine, de l'acide salicylique et des dérivés. Action élective particulière sur le rhumatisme articulaire aigu et chronique. Est le véritable agent spécifique de la polyarthrite rhumatismale en agissant directement sur l'élément pathogène causal.

Doses. — La *Mélubrine* s'emploie à la dose de 1 et même 2 gr. à la fois. Ces doses peuvent être renouvelées sans inconvénient jusqu'à 2, 3 et 4 fois par jour. Les malades chroniques peuvent en absorber en tout jusqu'à 150 et 200 gr.

Produits Pharmaceutiques spéciaux CREIL
de la Compagnie Parisienne de Couleurs d'aniline

Laboratoire E. DUPUTEL
à CREIL (Oise)

MÉTHARFER BOUTY

Méthylarsinate de fer

Ampoules dosées à 0,05 cgr. par unité.*Gouttes* dont 20 = 0,02 cgr. de métharfer.*Pilules* dosées à 0,02 cgr. par unité.**Doses et mode d'emploi.** — Par 24 heures : 3 à 5 pilules ou 20 à 50 gouttes ou une ampoule.**Propriétés thérapeutiques.** — L'action cytogénique du Méthylarsinate unie au pouvoir hémoglobique du Fer fait du *Métharfer* le médicament le plus actif comme reconstituant général de l'organisme. Il est très facilement assimilable et les injections ne sont pas douloureuses.

Prix réglementé : la boîte, 4 fr.

Aux Médecins, escompte 50 %

Laboratoires BOUTY3^{bis}, rue de Dunkerque, PARIS

MÉTHARSOL BOUTY

(Méthylarsinate de soude)

Ampoules dosées à 0,05 cgr. par unité.
Gouttes dont 20 = 0,02 cgr. de Métharsol.

Pilules dosées à 0,02 cgr. par unité.

Doses et mode d'emploi. — Par 24 heures : 3 à 5 pilules ou 20 à 50 gouttes ou une ampoule.

Propriétés thérapeutiques. — Excitateur de la nutrition et de l'assimilation, stimulant.

Indications. — Anémie, Chlorose, Cachexie, Syphilis, Fièvres paludéennes.

Prix réglementé : la boîte, 4 fr.

Aux Médecins, escompte 50 %

Laboratoires BOUTY

3bis, rue de Dunkerque, PARIS

MÉTHYLARSINATE VICARIO

Méthylarsinate de soude chimiquement pur en petits comprimés présentant les avantages d'une désagrégation rapide et complète, d'une assimilation certaine et d'une posométrie absolument rigoureuse.

Méthylarsinate Vicario en comprimés dosés à 0 gr. 01 cgr.

Dose et mode d'emploi. — De 1 à 5 comprimés au commencement des principaux repas.

Dose maxima : 20 comprimés par jour

Propriétés thérapeutiques. — Neurotonique, phagocytogène.

Indications. — Débilité, lymphatisme, arthritisme, neurasthénie, tuberculose et toutes les affections chroniques des voies respiratoires.

Pour éviter toute confusion, prescrire Méthylarsinate "VICARIO".

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann, PARIS

MORIDE

Produits Moride. — Vin et Sirop de Moride (iodo-tannique) : Répondant à toutes les indications de l'iode et de l'huile de foie de morue. (Voir fiche spéciale).

Pilules Ferro-miellitiques de Moride : 2 à 3 à chaque repas. — Anémie, Chlorose. — Le flacon : 2 francs.

Vin de Gourou (Kola, Coca, Quinquina), 1 verre à madère à chaque repas. — Le flacon : 2 francs.

Vin Kalders (Kola, Coca, Caféine, Quinquina), 1/2 verre à madère à chaque repas. — Le flacon, 3 francs.

Dragées de Ruizia (Boldo, Eucalyptus et Créosote), 3 à 6 par jour. — Le flacon : 3 francs.

Produits Nyr Dahl. — (Voir fiches spéciales Nyr Dahl, Elixir de Virginie, Algarine, Dragées d'Ibogaïne), Argent Colloidal, Choline, Fluène, Pelliséol.

Produits Leroy. — Cigarettes et Poudres américaines (anti-asthmatiques).

Pharmacie MORIDE

dépositaire des Produits Moride, Nyr Dahl, Leroy
20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

MORRHUETINE JUNGKEN

Forme et composition. — Liqueur non alcoolique à base de glycérine pure contenant : Iode métallique 0,015 mgr. Hypophosphites composés (NaO, CaO, Manganèse, Quinine) en tout 0,15 cgr. Phosphate de soude : 0,15 cgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable; pas d'irritation des muqueuses; pas de troubles des fonctions gastriques.

Propriétés. — Dépurateur. Tonique. Reconstituant.

Indications.— Anémie, lymphatisme, tuberculose, convalescences, etc.— Se prend en toutes saisons.

Doses et mode d'emploi. — Enfants au-dessous de 8 ans : 1 à 2 cuillères à café suivant l'âge. Enfants de 8 à 12 ans : 1 cuillerée à entremets. Adultes : 1 cuillerée à soupe après chaque principal repas.

Se prend pure ou avec un peu d'eau ordinaire ou gazeuse.

Prix réglementé :

Le flacon de 600 gr., 3 fr. 60

Laboratoire DUHÈME

à COURBEVOIE-Paris

MUGUET BYLA
(ÉNERGÉTÈNE DE)

Suc pur et inaltérable
de la plante fraîche

36 gouttes = 1 gr. de la plante
fraîche ou 0,002 mgr. de convalla-
marine.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 gr.
par jour à prendre en deux ou
trois fois dans un peu d'eau sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Toni-
cardiaque succédané de la digitale,
hydragogue, pas d'intolérance ni
d'accumulation.

Indications. — Hyposystolie, palpi-
tations, tachycardie, asystolie, ré-
trécissement mitral, asthme car-
diaque, dyspnée, œdèmes, endo-
cardites.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

21, rue des Lombards, PARIS

MUSCULOSINE BYLA

Plasma au suc musculaire total de viande de bœuf associé aux diastases oxydantes du sang.

Elixir agréable au goût.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuillères à soupe par jour et plus suivant les cas.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reconstituant, phagocyto-gène, orexique.

Indications. — Tuberculose, anémie et chlorose, atrophie infantile, diarrhée chronique, convalescences, surmenage, états consumptifs ou cachectiques, débilité sénile.

Prix réglementé :

Le 1/2 flacon, 4 fr. 50; le flacon, 8 fr.

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

Prix réglementé :

Le flacon de 500 gr., 3 fr. 75

Laboratoire DUNEM
à COGNAC-Paris

NARCYL GRÉMY

Chlorhydrate d'éthyl narcéine
synthétique

Sirop dosé à 0,03 de Narcyl par cuil-
lerée à soupe.

Granules dosées à 0,02 par unité.

Doses. — *Adultes* : 3 à 6 cuillerées
à soupe ou 5 à 8 granules par jour.

Enfants : 2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à
café par jour; 4 à 7 ans, 4 à 5 cuil-
lerées à café par jour; 7 à 15 ans,
1 à 3 cuillerées à soupe ou 2 à
5 granules par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Modé-
rateur du pneumogastrique et du
splanchnique. Antispasmodique.

Indications. — Affections spasmo-
diques des Voies respiratoires,
Toux des Laryngites, Bronchites
de la Coqueluche, et en particulier
Toux de la Tuberculose, Gas-
tralgie, Nervosisme, Insomnie.

P. LONGUET

50, rue des Lombards, PARIS

NÉOBIONE SAUTER

Albumino-Phosphatide naturel

Réunion collective et assimilable de phosphore en combinaisons organiques (lécithine, jécoringe, céphaline, chlorophylle, etc.).

Forme. — Poudre sèche et jaunâtre en cachets.

Dose. — 1 cachet 3 fois par jour, 1/2 heure ou 1 heure avant le repas.

Propriétés physiologiques. — Les Phosphatides sont des éléments importants de la formation de la cellule et de son noyau, ainsi que de la production de la viscosité nécessaire aux cellules. Ils forment un stimulant continu. Ils augmentent les globules rouges du sang et l'énergie physique et psychique ainsi que la force de résistance du malade.

Indications. — Toutes les maladies non fébriles nécessitant des fortifiants : Tuberculose, Rachitisme, Neurasthénie, Chlorose, Diabète, Débilité, etc.

Prix : 3 fr. 50 la boîte de 20 cachets

Laboratoires SAUTER

49, rue de Paradis, PARIS

GENÈVE, Bellegarde (Ain)

NEOL

Constitution. — Préparation peroxy sulfatée, d'origine électrolytique, constituant une solution auto-génératrice d'Oxygène et d'Ozone naissant.

Aspect. — Liquide incolore, saveur acidulée, odeur légèrement aromatique.

Propriétés — Aucune toxicité, épidermisant, cicatrisant, kératoplastique.

Indications. — Brûlures, Ulcérations cutanées et muqueuses, Plaies phagédéniques, Métrites, Angines.

Mode d'emploi. — L'eau néolée (Néol 1 partie, eau 4 parties) remplace avantageusement l'eau oxygénée dans toutes ses indications.

Allouchements, Badigeonnages (Angines, Stomatites, Laryngites) Néol pur.

Pansements (Brûlures, Plaies diverses) Néol au 1/5 (Néol 1 partie, eau 4 parties).

Gargarismes : Deux cuillerées à soupe par verre d'eau (légèrement tiède).

Injections, grands lavages : Quatre cuillerées à soupe par litre d'eau, que l'on aura fait précéder d'une injection d'eau bouillie très chaude.

PRÉSENTATION

Le gr. flac. de 380 gr. prix au public : 3,25

Le pet. flac. de 125 gr. prix au public : 1,75

Laboratoire du NÉOL

9, rue Dupuytren, PARIS

NÉOQUININE FALIÈRES

(Glycérophosphate de quinine pur)

Propriétés. — Rapidement absorbée, se montre à doses égales, plus active que les sels ordinaires de quinine. — Action tonique, à petites doses, par ses deux éléments.

Formes. — 1° *Cachets de Néoquinine Falières*, 0 gr. 25 par cachet.

Prix : 1 fr. 50 la boîte de 8 cachets

2° *Suppositoires de Néoquinine Falières* à 0 gr. 15 par suppositoire (chaque suppositoire ne pèse que 2 gr.).

Prix : 1 fr. 50 la boîte

Enfants : 1 suppositoire; Adultes : 2; après avoir assuré la vacuité du rectum.

3° *Pilules de Néoquinine Falières*, 0 gr. 10 par pilule.

Prix : 1 fr. 50 le flacon de 20 pilules

4° *Tubes stérilisés de Néoquinine Falières*, 0 gr. 50 par cm³.

Prix : 5 fr. la boîte de 6 tubes de 1 cm³.

Néoquinine arsinée Falières

(Glycérophosphate et méthylarsinate de quinine)

Formes. — 1° *Cachets de Néoquinine arsinée Falières*, 0 gr. 25 par cachet.

Prix : 1 fr. 50 la boîte de 8 cachets

2° *Capsules de Néoquinine arsinée Falières* à 0 gr. 10 par capsule.

Prix : 1 fr. 50 le flacon de 20 capsules

3° *Tubes stérilisés de Néoquinine arsinée Falières*, 0 gr. 50 par cm³.

Prix : 5 fr. la boîte de 6 tubes de 1 cm³.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

NÉOSALVARSAN

Produit arsénical n° 914 : obtenu par réaction du formaldéhydesulfoxylate de soude sur le dioxydiamidoarsénobenzol (006).

Propriétés physico-chimiques. — Poudre jaune d'odeur particulière. Solubilité parfaite dans l'eau. Solution neutre.

Avantages sur le Salvarsan. — Se dissout instantanément dans l'eau. Donne une solution neutre, on évite ainsi l'acnéisation du Salvarsan et les inconvénients pouvant résulter de l'hyper ou de l'hypoalcalinité des solutions. Est mieux toléré parce qu'il ne coagule pas les albuminoïdes et ne modifie pas la composition chimique du sang. Action thérapeutique équivalente, supérieure dans la Syphilis nerveuse.

Doses à employer. — Pour hommes : 0,60, 0,75, 0,90 cgr. de Néosalvarsan ; pour femmes : 0,45, 0,60, 0,75 cgr. ; pour enfants : 0,15 à 0,30 cgr. suivant âge ; pour nourrissons, 0,05 cgr.

Doses maxima. — Pour les hommes, 0 gr. 90 à la fois. Pour les femmes, 0 gr. 75 à la fois. Toutefois le traitement ne doit jamais commencer par des doses aussi élevées.

Contre-indications. — Dans la Syphilis récente ou à la période secondaire aiguë, en présence de symptômes de syphilis cérébrale et principalement de méningite précoce, être très circonspect quant aux doses. Initier le traitement avec 0,15 ou 0,30 cgr. de Néosalvarsan.

Voir mode d'emploi page suivante

NÉOSALVARSAN

Mode d'emploi et préparation de la solution. — Voie intra-veineuse ou intra-musculaire. Jamais sous-cutanée. Pour injections intra-veineuses, qui est la méthode de choix, employer des solutions contenant 0,15 cgr. de Néosalvarsan dans 25 cm³ d'eau distillée fraîchement. Pour injections intra-musculaires, employer soit une solution aqueuse à 5 % environ car 1 gr. de Néosalvarsan dans 22 cm³ d'eau donne une solution isotonique, soit une suspension huileuse; cette dernière est parfaitement indolore. — En aucun cas, les solutions de Néosalvarsan ne doivent être employées après avoir été conservées. Il faut toujours employer une solution préparée extemporanément et sans attendre car sa stabilité est moindre encore que celle du Salvarsan. — Ne jamais chauffer une solution de Néosalvarsan.

Le Néosalvarsan est livré dans les dosages suivants : I) 0 gr. 15. — II) 0 gr. 30. — III) 0 gr. 45. — IV) 0 gr. 60. — V) 0 gr. 75. — VI) 0 gr. 90. — X) 1 gr. 50. — XX) 3 gr. — XXX) 4 gr. 50, correspondant respectivement à 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 1 gr., 2 gr. et 3 gr. de Salvarsan.

Pour les applications locales est livré également à la dose de 0 gr. 045 mgr.

Produits pharmaceutiques spéciaux CREIL
de la Compagnie parisienne de Couleurs d'aniline

Laboratoire E. DUPUTEL
CREIL (Oise)

NÉPHRINE BOUTY

Dragées dosées à 0,15 cgr. de Tissu desséché correspondant à 0,90 cgr. de Tissu frais.

Ampoules de 1 cm³ et de 3 cm³.

Doses et mode d'emploi. — 3 dragées dans les 24 heures, à prendre une 1/2 heure avant les repas ou une injection d'un cm³ par jour.

Indications thérapeutiques. — Traitement de la Néphrite.

Prix réglementé :

La boîte de 50 dragées, 10 francs
La boîte de 6 ampoules 1 cm³, 6 fr.

Aux Médecins, escompte 50 %

Laboratoires BOUTY

3^{bis}, rue de Dunkerque, PARIS

NEURÈNE

Bornéol soluble dans l'eau

$C^{10} H^{18} O$

Principe actif de la Valériane
Sans odeur

Solution contenant 0 gr. 10 de Bornéol par cuillerée à café. Une cuillerée à café de Neurène contient la partie active de 150 grammes de racine sèche de Valériane.

Doses. — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à café par jour. — *Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour, selon l'âge.

Mode d'emploi. — Chaque cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau sucrée et aromatisée à la fleur d'oranger.

Propriétés thérapeutiques. — *Tonique des centres nerveux.*

Indications. — Toutes les Affections nerveuses, Neurasthénie, Hystérie, Chorée, Spasmes, Insomnies nerveuses, Epilepsie.

Prix : le flacon, 5 francs

Laboratoire BRISSONNET

141, rue de la Tour, PARIS

Laboratoire E. SUPUTEL
GREIL (Oise)

NÉVRALTÉINE ROGIER

Ethoxyphényle-Aminométhane
sulfinat de sodium
Comprimés dosés à 0 gr. 50 cgr.

Doses. — 4 à 8 comprimés par jour, pour combattre l'élévation de température (anti-thermique), 2 comprimés à la fois ou à 1/2 heure d'intervalle pour combattre migraines et névralgies (soulagement immédiat). Pour les enfants, voir prospectus.

Propriétés. — Anti-thermique, analgésique.

Aucune action sur le cœur dont elle est un tonique.

Spécialité réglementée. — Prix :
La boîte de 3 tubes (42 comp.), 4 fr. 50
Le tube, 1 fr. 65

Henry ROGIER, Pharm. de 1^{re} Classe
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris
3 et 5, boulev. de Courcelles, PARIS
Téléphone 533-70

NÉVROSTHÉNINE**FREYSSINGE**

A base de Glycérophosphates de soude, de potasse et de magnésic. Ne contient ni chaux, ni sucre, ni alcool.

Forme. — Gouttes concentrées, 20 gouttes contiennent 0,40 cgr. de glycérophosphate composé à base de soude, de potasse et de magnésic.

Dose. — ~~10 à 20~~ 20 gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson.

Propriétés. — Reconstituant rationnel par suite de sa composition qui est celle des éléments mêmes de l'organisme : Soude = Plasma sanguin; Potasse = Tissus nerveux; Magnésic = Substance grise.

Indications. — Neurasthénie, Paralysie générale, Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage, Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc...

Aucune contre-indication
Prix réglementé : ~~3~~ francs

Laboratoire FREYSSINGE
6, rue Abel, PARIS

NOVARGAN HEYDEN

Protéinate d'argent à 10 % d'Ag.

Solutions de 10 à 15 % pour le traitement abortif de la blennorrhagie; dans les autres cas, solutions de 0,2 à 2 %.

Pommade à 10 % pour emploi oculaire.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-blennorrhagique non irritant.

Indications. — Blennorrhagie aiguë, maladies infectieuses oculaires.

Produits HEYDEN

29 et 31, rue Philippe-de-Girard, PARIS (X^e)

NOVARINE VICARIO

Nouvel extrait actif du corps jaune de l'ovaire obtenu à l'aide de corps jaunes de brebis, de truies et de génisses.

Comprimés de Novarine Vicario
Le flacon, 5 francs

Dose et mode d'emploi. — De 2 à 6 comprimés aux repas et plus suivant les cas, jusqu'à disparition ou amendement notable des symptômes morbides.

Indications thérapeutiques. — Toutes les Affections, Etats morbides ou Irrégularités fonctionnelles provenant d'une insuffisance ovarienne. Disménorrhée, Aménorrhée, Ménopause et leur cortège : Leucorrhée, Hystérialgie cataméniale, Névralgie lombo-abdominale, Neurasthénie utérine, Céphalées rebelles; Insomnies, Sueurs, Bouffées de chaleur, Troubles digestifs et nerveux, Obésité, Arthritisme, Dermatoses, etc...

Prescrire Novarine " VICARIO "

Laboratoire VICARIO
17, boulevard Haussmann, PARIS

5, rue Abel, PARIS

NOVOCAINE CREIL

Chlorhydrate de p.
amidobenzoyldiéthylaminoéthanol

Spécialités. — Comprimés et solutions stérilisées pour anesthésies locale, régionale et lombaire; solution huileuse pour urologie, solution à 10 % pour laryngologie.

Doses et mode d'emploi. — *Anesthésie locale* : Solution à 0,5 % contenant 25 gouttes de solution de suprarénine au 1/1000^e par 100 cm³ de solution de Novocaïne stérilisée (professeur Reclus). — *Anesthésie régionale* : Solution à 2 %. — *Anesthésie lombaire* : Solution à 4 % (Docteur Chaput). — Pour badigeonnage : Solution à 10 %.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésique aussi puissant que la cocaïne, sans action irritante, même à haute concentration, ni vaso-constricteur, ni vaso-dilatateur. La cocaïne étant vaso-constrictive, il est indispensable d'associer à la Novocaïne une petite quantité d'un vaso-constricteur, de préférence la supranénine-synthétique " Creil " pour localiser son action et augmenter la durée de l'action. Les solutions de Novocaïne sont stérilisables.

Indications. — Dans les anesthésies locale, régionale et lombaire.

Produits pharmaceutiques spéciaux " CREIL "
de la Compagnie parisienne de Couleurs d'aniline
9, rue du faubourg Poissonnière
à PARIS (IX^e)

Pharmacien : Laboratoire E. DUPUTEN
à CREIL (Oise)

N

NUCLÉO-FER-GIRARD

à base de Nucléinate de fer pur

Pilules contenant chacune 0,10 de Nucléinate de fer.

Mode d'emploi. — 4 à 6 pilules par jour avant le repas.

Propriétés thérapeutiques. — *Augmente en quelques jours de 30 à 90 0/0 la teneur des globules en hémoglobine.*

Indications. — Anémie et plus spécialement l'Anémie nerveuse.

Prix : le flacon, 4 francs

A. GIRARD

48, rue d'Alésia, PARIS

NYRDAHL

Produits NYRDAHL : Elixir de Virginie (Hamamelis et Capsicum); Algarine (Saccharure iodo-tannique phosphaté); Dragées d'Ibogaïne (Chlorhydrate d'Ibogaïne). (Voir Fiches).

Autres Produits NYRDAHL : Argent Nyrdahl, pommade à 15 % d'argent colloïdal soluble, le tube, 3 francs; Choline Nyrdahl, principe actif des lécithines (Maladies de la nutrition et Manifestations arthritiques), le flacon, 5 francs; Fluène, nouveau diurétique soluble dérivé de la théobromine, le flacon, 5 fr.; Pelliséol, pommade antidermatique à base de corps dérivés du tannin, la boîte, 1 fr. 50.

Produits NYRDAHL

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

OPOTHÉRAPIE BOUTY

DRAGÉES

THYROIDINE BOUTY

Deux dragées le matin à jeun
Obésité, Myxœdème, Goitre, Psoriasis, Fibromes
Par dragée : 0,10 cgr. de glande desséchée
correspondant à 70 cgr. de glandes fraîches.

OVIGÉNINE BOUTY

Une dragée avant chaque repas
Ménopause naturelle et artificielle
et ses conséquences
Par dragée : 0,12 cgr. d'ovaire de génisse desséchée
correspondant à 0,80 cgr. d'ovaires frais.

THYMUSINE BOUTY

Trois dragées dans les 24 heures. *Chloro-Anémie*
Par dragée : 0,20 cgr. de thymus de veau
correspondant à 1 gr. 50 de thymus frais

SURRÉNALINE BOUTY

Deux dragées dans les 24 heures, avant le repas
Maladies de Basedow et d'Addison
Par dragée : 0,10 cgr. de capsule surrénale
desséchée correspondant à 0,80 cgr. de capsules
surrénales fraîches.

NÉPHRINE BOUTY

Trois dragées dans les 24 heures, avant les repas
Traitement de la Néphrite
Chaque dragée renferme 0,15 cgr. de tissu
desséché correspondant à 90 cgr. de tissus frais.

HÉPATINE BOUTY

Deux dragées par 24 heures
Traitement du Diabète sucré. -- Hémoptysie

SÉQUARDINE BOUTY

Trois dragées par 24 heures
Faiblesse constitutionnelle
Et tous autres produits d'après la même méthode

Laboratoires BOUTY

3^{me}, rue de Dunkerque — PARIS

OPOTHÉRAPIE BOUTY

Ampoules de 1 cm³ et 3 cm³
(6 ampoules par boîte)

Testiculaire, Cérébrine, Pancréas, Foie,
Médullaire, Glandes surrénales, Pulmo-
naire, etc.

*Pour éviter l'emploi, sur les étiquettes, d'une
expression qui pourrait, auprès des malades,
avoir des inconvénients, nous faisons suivre
la dénomination : Liquide organique d'une
lettre qui indique quel genre de liquide renfer-
ment nos ampoules. Ainsi : Liquide organique
T ou Séquardine Bouty T se rapporte au
liquide testiculaire; C à cérébrine, ainsi
de suite :*

Liquide organique **T** indique Testiculaire.
— **C** — Cérébrine.
— **P** — Pancréas.
— **SG** — Substance grise.
— **O** — Os.
— **TH** — Thyroïdien.
— **M** — Muscle.
Etc., etc.

Prix réglementés :

Ampoules de 1 cm³; la boîte de
6 ampoules : 6 francs

Ampoules de 3 cm³; la boîte de
6 ampoules : 12 francs

Aux médecins, escompte 50 %

Laboratoires BOUTY

3^{bis}, rue de Dunkerque — PARIS

OPOTHÉRAPIE BYLA

1^o *Sucs naturels inaltérables :*

**Exo-Gastrine. — Exo-Hépatine. —
Exo-Orchitine. — Exo-Ovarine. —
Exo-Rénine. — Exo-Thyroïdine. —
Exo-Hypophysine. — Exo-Pulmine.
— Exo-Pancréatine.**

2^o *Capsules opothérapiques à enrobage
néo-résineux soluble seulement dans
le suc intestinal.*

**Gastérase. — Orchitine. — Splé-
nine. — Placentine. — Rénine.
— Cérébrine. — Lymphatine. —
Thyroïdine. — Hémoglobine. —
Entérokinase. — Prostatine. —
Hépatine. — Extrait biliaire. —
Surrénine. — Hypophysine. —
Ovarine. — Flavéine.**

Voir la page
de chacun de ces produits

OPOTHÉRAPIE FOURNIER

Extraits totaux
préparés à froid dans le vide

Endocrisines. — Tous organes : Thyroïde, ovaire, hypophyse, glande mammaire, surrénale, foie, rein.

Forme. — Cachets à toutes doses (sur demande médicale).

Doses usuelles toutes préparées. — Thyroïdine, 0,025 mgr., 0,10 egr.; ovarine, 0,10 egr.; orchitine, 0,20 egr.; surrénale, 0,10 egr.; hypophyse, 0,10 egr.; foie, 0,50 egr.; rein, 0,25 egr.

Prix : 5 francs la boîte

Laboratoires FOURNIER Frères
26, boulevard de l'Hôpital — PARIS

Capsules de prothine. — Dosage 0,20 egr.
Capsules de roïne. — Dosage 0,20 egr.
Capsules sépioliques. — Dosage 0,30 egr.
Ces Capsules s'ordonnent à la dose de 2 à 5 par jour, au moment des repas

Pharmacie VIGIER
12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

0

OPOTHÉRAPIE MONCOUR

(Voir page de chaque produit :
" Sphérulines ")

Extrait gastrique Moncour. — Extrait hépatique Moncour. — Extrait pancréatique Moncour. — Extrait entéropancréatique Moncour. — Extrait intestinal Moncour. — Extrait de bile Moncour. — Extrait rénal Moncour. — Corps thyroïde Moncour. — Poudre ovarienne Moncour.

Autres préparations Moncour. — Extrait de muscle lisse, extrait de muscle trié, moelle osseuse, myocardine, poudre surrénale, thymus, etc., etc.

A. de MONTCOURT

49, avenue Victor-Hugo, 49
à BOULOGNE (Seine)

de chacun de ces produits

OPOTHÉRAPIE VIGIER

Préparations renfermant les organes en nature, sans qu'ils aient subi aucune modification chimique ou thermique susceptible de détruire tout ou partie de la substance active.

Capsules ovariennes. — Dosage 0,20 cgr. de substance ovarienne pure.

Capsules orchitiques. - Dosage 0,20 cgr.

Capsules de corps thyroïde. — Dosage 0,10 cgr.

Capsules surrénales. - Dosage 0,25 cgr.

Capsules de thymus. - Dosage 0,30 cgr.

Capsules pancréatiques. — Dosage 0,50 cgr.

Capsules prostatiques. — Dosage 0,20 cgr.

Capsules hépatiques. - Dosage 0,30 cgr.

Capsules galactogènes. — Dosage 0,30 cgr. de placenta.

Capsules eupeptiques. - Dosage 0,30 cgr. de substance intestinale.

Capsules de parotide. - Dosage 0,20 cgr.

Capsules de rétine. — Dosage 0,20 cgr.

Capsules spléniques. -- Dosage 0,30 cgr.

Ces Capsules s'ordonnent à la dose de 2 à 6 par jour, au moment des repas

Pharmacie VIGIER

12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

0

ORCHITINE BYLA

(Glande interstitielle)

*Capsules opothérapeutiques à enrobage
néo-résineux, solubles seulement
dans le suc intestinal (à 0,15 cgr.).*

Dose moyenne. — 5 à 10 capsules
dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Dans
les Déchéances physiologiques ou
toxiques, la Débilité senile, les
Névroses, l'Impuissance et le sim-
ple Surmenage.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

OSTÉOHÉPATINE

Opothérapie osseuse additionnée de 10 % d'extrait hépatique (moelle et os frais de veau)

Dose. — Tablettes friables. — *Adultes* : 3 à 5 tablettes par jour. — *Enfants* : 1 à 3 tablettes par jour, entières ou pulvérisées.

Propriétés. — Reminéralisant, récalcifiant, organique toujours actif et puissamment actif. Se différencie des sels minéraux par une activité indiscutable, cliniquement établie. *(La reminéralisation doit être faite à l'aide de l'opothérapie osseuse en soutenant l'activité hépatique). Travaux des professeurs A. Robin et Teissier (de Lyon).*

Indications. — Tuberculose, Maladies osseuses et nerveuses, Grossesse, Allaitement, Croissance, Dentition, Rachitisme, etc.

Prix réglementé : le flacon 8 francs
Un flacon représente un mois environ de traitement, soit une dépense d'environ 0 fr. 20 par jour.

Préparation sans similaires
ni équivalents

**Laboratoires de Biologie
A. DANIEL-BRUNET**

5, rue du Docteur-Blanche, PARIS

OUATAPLASME**DU DOCTEUR LANGLEBERT**

Pansement complet, émoullit
aseptique, instantané, stérilisé à 130°
Se prépare instantanément à chaud
ou à froid, avec ou sans addition
de solutions médicamenteuses.

Propriétés thérapeutiques. — Emol-
lient, sédatif, résolutif.

Indications. — Dermatoses aiguës et
chroniques (Eczéma, Impétigo).
Phlegmasies diverses (Anthrax,
Absès, Phlegmons, Gerçures du
sein, Phlébites, Erysipèles, Brûlu-
res, Entorses, Plaies contuses),
Affections oculaires : Conjonctivi-
tes, Kératites.

Le paquet..... 2 »
Le demi-paquet 1 25
Le quart de paquet... 0 70

SABATIER, Pharmacien

10, rue Pierre-Ducreux, PARIS (XVI)

OVARINE BYLA

(Glande ovarienne)

Capsules opothérapiques à enrobage
néo-résineux, solubles seulement
dans le suc intestinal (à 0,10 cgr.).

Dose moyenne. — 5 capsules dans
les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Dans
tous les troubles dus à une insuf-
fissance ovarienne : Aménorrhée,
Dysménorrhée, Ménopause, Neu-
rasthénie féminine, etc.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

Etablissements POULENC Frères
29, rue Vieille-du-Temple, PARIS

0

OVIGÉNINE BOUTY

Ovarine

Dragées dosées à 0,12 cgr. d'Ovaire de Génisse desséché correspondant à 0,80 cgr. d'Ovaires frais.

Ampoules de 1 cm³ et de 3 cm³

Doses et mode d'emploi. — 1 dragée avant chacun des deux principaux repas ou une injection d'un cm³ par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Supplée à l'insuffisance ovarienne quelle qu'en soit la cause.

Indications. — Ménopause naturelle et artificielle et ses conséquences : Aménorrhée, Dysménorrhée, Dystrophie ovarienne, etc.

Prix réglementé :

La boîte de 50 dragées, 10 francs

La boîte de 6 ampoules 1 cm³, 6 fr.

Aux Médecins, escompte 50 %

laboratoires BOUTY

de Dunkerque, PARIS

OVO-LÉCITHINE BILLON

Propriétés thérapeutiques. — Stimule la nutrition générale, provoque une hyperleucocytose durable, augmente le nombre des globules rouges, permet une parfaite utilisation des matériaux nutritifs azotés, accroît la teneur du sang en hémoglobine, empêche la déminéralisation phosphorée, relève l'énergie contractile du cœur et des muscles lisses et striés en général.

Formes et doses. — *Dragées* à 0 gr. 05, 4 à 6 par jour (enfants 2 à 3); *Granulés* à 0 gr. 10 par cuillerée à café, 2 à 3 par jour (enfants 1 à 2); *Injections intramusculaires*, 1 par jour.

Indications. — Neurasthénie, Dépression nerveuse, Chlorose et Anémies de toutes natures, Lymphatisme et Rachitisme, Troubles de croissance, Cachexie sénile, Période de convalescence des états infectieux.

*Dépôt Général, Renseignements
et Echantillons :*

Etablissements POULENC Frères
92, rue Vieille-du-Temple, PARIS

OVULES ROCHE

au Thigénol à 30 %
(Voir également page "Thigénol")

Propriétés thérapeutiques. — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnantes, et puissamment résolutive. On constate au bout de quelques jours du traitement par les ovules au Thigénol, la sédation complète des douleurs, et après quelque temps, l'arrêt complet des pertes. De même, les ulcérations rétrocedent rapidement et le volume des organes hypertrophiés diminue dans des proportions notables, ce qui permet de retarder, sinon d'éviter une opération chirurgicale.

Indications. — Vaginites, Vulvovaginites, Métrites, Paramétrites, Gonorrhée, Leucorrhée, Métrorrhée, etc.

Prix réglementé :
4 fr. la boîte de 6 ovules

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co
21, place des Vosges, PARIS

OXYDOTHYRINE PÂRIS

Substance renfermant tous les principes actifs de la glande thyroïde privée de toxine par un procédé spécial; est sans action sur le cœur.

Indications. — Embonpoint. Obésité et tous les états dûs à l'insuffisance thyroïdienne.

Forme. — Dragées renfermant 0 gr. 10 de substance active.

Posologie. Une à deux dragées par 24 heures, prises de préférence le matin à jeun.

Prix au public :
8 francs le flacon de 50 dragées

**Laboratoires biologiques
André PÂRIS**

1, rue de Châteaudun — PARIS

O

OXYDOVARINE PÂRIS

Composition. — Tous les principes actifs de l'ovaire : corps jaune et cellules interstitielles.

Formes. — Dragées, dosées à 0,10 cgr. de substance ovarique totale.

Propriétés thérapeutiques. — Remédie efficacement à toutes les affections provoquées par l'insuffisance ovarienne congénitale ou acquise (post-opératoire).

Indications. — Troubles de la menstruation, irrégularités, insuffisance, douleurs, retentissements pathologiques de l'ovariotomie, accidents de la ménopause, etc.

Dose. — 2 à 6 dragées par jour au moment des repas.

Prix : Le flacon de 60 dragées 6 francs

Laboratoires biologiques

André PÂRIS

1, rue de Châteaudun, PARIS

1, rue de Châteaudun, PARIS

21, place des Vosges, PARIS

PANCRÉATINE BYLA

Pilules dosées à 0,20 cgr. de Pancréatine absolue pure.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 5 pilules à la fin de chacun des deux principaux repas.

Propriétés thérapeutiques. — Digestif puissant, orexique.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Nausées, Digestions difficiles ou incomplètes, Renvois, Vomissements, Diabète maigre.

Prix réglementé :
3 fr. le flacon de 50 pilules

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

PANTOPON " ROCHE "

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium précipités sous forme de chlorhydrates solubles et injectables

0 gr. 01 cgr. de PANTOPON " ROCHE " =
 0 gr. 50 cgr. de teinture d'opium.
 0 gr. 025 mgr. d'extrait d'opium.
 0 gr. 005 mgr. de morphine.

Posologie et mode d'emploi.**Voie Buccale.**

Adultes. — 0 gr. 02 cgr. à 0 gr. 06 cgr. en pilules, sirops, cachets, pilules, etc., par 24 heures.

Enfants. — 0 gr. 005 mgr. à 0 gr. 01 cgr. par année d'âge et par 24 heures.

COMPRIMÉS DE PANTOPON " ROCHE "

1 comprimé = 0 gr. 01 cgr. de Pantopon

Adultes. — 2 à 6 par 24 heures et plus.

Enfants. — 1/2 à 1 par année d'âge et par 24 h.

Le flacon de 20 comprimés, Prix : 1 fr. 50

Voie Hypodermique.**AMPOULES DE PANTOPON " ROCHE "**

Solution stérilisée à 2 pour 100 non irritante

1 ampoule = 1 cm³ = 0 gr. 02 cgr.
 de Pantopon " Roche "

Adultes. — 1 à 3 par 24 heures et plus.

Enfants. — 1/4 à 1/2 ampoule par année d'âge et par 24 heures.

La bⁿ de 6, Prix : 3 fr. — La bⁿ de 12, Prix : 5 fr.

Indications thérapeutiques. Toutes celles — de l'opium, de la morphine et dérivés.

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o
 21, place des Vosges, PARIS

PANUTRINE

Obtenu par des procédés et des machines spéciales

Poudre d'huile de foie de morue, contenant tous les principes actifs de l'huile de foie de morue, associés aux phosphates organiques.

(Glycéro-phosphate de chaux, Lécithine)

Forme. — Poudre d'ingestion et de digestion très faciles. Tolérance parfaite.

Dose. — 1 à 2 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou de lait. La cure peut être poursuivie, même pendant la saison chaude.

Propriétés. — Bénéficie de toutes les propriétés curatives, fortifiantes et reconstituantes de l'huile de foie de morue sous la forme la plus agréable. Régénérateur par excellence.

Indications. — Toutes celles de l'huile de foie de morue : Scrofule, Rachitisme, Tuberculose, Maladies de la peau, Débilité, Syphilis, Maladies de la gorge, Phtisie pulmonaire, etc.

Prix : la boîte, 3 fr. 75

Laboratoires SAUTER

49, rue de Paradis, PARIS

GENÈVE, Bellegarde (Ain)

25, rue des Petits-Hôtels, PARIS

P

PARALACTINE

Gros bacille bulgare sélectionné

Formes. — *Comprimés.* — *Bouillon végétal peptoné.*

Dose et mode d'emploi. — 1 ou 2 comprimés délayés dans un peu d'eau sucrée froide ou tiède, 3 fois par jour.

Indications thérapeutiques. — Traitement rationnel de l'Entérite et de toutes les Affections gastro-intestinales.

Prix réglementé :

Le flacon de 60 comprimés ou le flacon de bouillon, 3 fr. 50.

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

PASTILLES DE FORMALINE HELIOS

Les Pastilles de *Formaline*, pesant chacune 1 gramme, sont composées d'Aldéhyde Formique polymérisé, d'une pureté parfaite, sans addition d'aucune substance étrangère.

Elles portent, comme garantie de provenance et de composition, la marque "*Formaline*".

Seules les pastilles portant cette inscription sont reconnues aptes à donner, par gazéification dans les *Formolateurs*, le dégagement d'Aldéhyde Formique, prescrit par le Comité d'Hygiène. Par l'emploi d'autres produits, l'effet désinfectant peut être considérablement amoindri.

Chaque pastille fournit, par la gazéification, 1 gramme de gaz à 100 % d'Aldéhyde Formique (ce qui correspond à 2,66 grammes de *Formaline* liquide).

Par l'emploi de ces pastilles, le dosage du désinfectant est donc excessivement précis autant que simple. En outre, comme elles sont entièrement neutres et non toxiques, leur maniement est absolument sans danger.

Voir page : *Formolateurs Hélios*

Prix : le kilo ou 1000 pastilles, 14 francs

Même remise que sur *Formolateurs*

27, rue des Petits-Hôtels, PARIS

P

PASTILLES DE MACKENSIE

à la Résine de Gayac

Résine de Gayac : 0,20 cgr.

Cocaïne : 0,001 mgr.

Indications. — Maux de gorge, Angine, etc. Spécifique des Amygdalites aiguës.

Dose. — Une pastille toutes les heures.

Prix : la boîte, 2 francs

Pharmacie L. MULLER

40, rue de la Bienfaisance, PARIS

PASTILLES MIRATON

ou Pastilles laxatives
de Châtelguyon
créées en 1902, par Miraton

Composition. — Encélatine (C²⁰H¹⁴O⁴) 0,08; Sels naturels de la source Châtelguyon obtenus par évaporation dans le vide 0,05; Sels recueillis par dépôt direct (oxyde de fer), magnésium, calcium, silicium 0,05; Produits excipients; Sucre vanillé du Codex; Gomme adragante Q. S.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 1 à 3 pastilles à *sucer*; Enfants : 1/3 ou 1/2 pastille à *sucer* de préférence le soir au coucher.

Propriétés thérapeutiques. — Laxative ou purgative suivant la dose.

Indications. — Constipation, Migraines, Dyspepsies, Flatulences, Entérite, Appendicite, Hémorroïdes, Affections du foie et de l'intestin.

Prix réglementé : la boîte, 2 francs

Etablissement MIRATON
de CHATELGUYON

P**PENGHAWAR " VICARIO "**

Hémostatique végétal, stérilisé, constitué par les poils jaunâtres et soyeux de certaines fougères arborescentes croissant à Java, Sumatra, Bornéo, dans la Haute-Asie, en Cochinchine et au Tonkin. Après triage, ces fibres sont stérilisées à l'autoclave à 120°.

Penghawar Vicario :

La boîte, 0 fr. 60; l'étui, 2 francs
Chaque prise de Penghawar dans l'étui est séparée par une rondelle de coton entourée de gaze.

Mode d'emploi. — En petits tampons qu'on applique sur les points hémorragiques.

Indications thérapeutiques. — Dans les Epistaxis spontanées ou à répétitions (en remplacement de l'amadou, de l'antipyrine ou du perchlorure de fer). Dans les Plaies opératoires des fosses nasales, pour éviter une perte de sang inutile et dégager ensuite le champ opératoire. Comme préventif d'une Epistaxis secondaire après l'emploi de l'Adrénaline.

Pour éviter toute confusion prescrire Penghawar " VICARIO "

Laboratoire VICARIO
17, boulevard Haussmann, PARIS

PEPSORTHINE

Combinaison des Stomachiques (Pepsine, Papaïne, Pancréatine) avec le Peroxyde de Manganèse et le Bicarbonate de Soude) préparée sous le contrôle scientifique du Dr P. RODARI, spécialiste des maladies gastro-intestinales.

Forme. Boîte de 120 pastilles comprimées.

Dose. — 3 à 6 tablettes avec un peu d'eau, de suite après chaque repas.

Propriétés. — Stomachique de grande valeur. Facilite et aide la digestion. Aux effets digestifs des stomachiques, la *Pepsorthine* ajoute une action antiseptique efficace par la production d'oxygène naissant (MgO^2) dans le milieu stomacal, tandis que le Bicarbonate de soude neutralise l'excès d'acidité et favorise l'évacuation des gaz.

Indications. — Gastrite aiguë, Catarrhes chroniques de l'estomac avec sécrétion ralentie du suc gastrique.

La boîte de 120 tablettes : 4 francs

Laboratoires SAUTER

49, rue de Paradis, PARIS
GENÈVE, Bellegarde (Ain)

P

PEPTO-FER DU D^r JAILLET

à base de Chloropectonate de Fer
Elixir aromatisé
très agréable à prendre

Propriétés. — Tonique, digestif, reconstituant, ne constipe pas, ne noircit pas les dents.

Indications. — Traitement des Anémies, de la Chlorose.

Dose et mode d'emploi. — Un petit verre à liqueur immédiatement après les deux principaux repas.

Société des Produits SCHAFFNER
2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux
PARIS

PEPTONATE DE FER ROBIN

Véritable ferrugineux assimilable

Forme pharmaceutique. — Gouttes concentrées de Peptonate de Fer. — Vin Robin au Peptonate de Fer. — Elixir Robin au Peptonate de Fer.

Composition. — Véritable combinaison de Peptone de fer.

Propriétés pharmaceutiques. — Rend le fer parfaitement assimilable, n'a ni la saveur styptique, ni la réaction des autres ferrugineux. C'est un sel défini parfaitement stable qui ne se décompose pas par son contact des aliments. Ne produit ni constipation ni diarrhée, ne nécessite aucun travail digestif et ne provoque jamais la pesanteur d'estomac.

Propriétés physiologiques et thérapeutiques. — Augmente la capacité respiratoire du sang, multiplie la richesse des hématies en hémoglobine et active les échanges.

Indications. — Toutes les Anémies, la Chlorose, la Débilité.

Doses et mode d'emploi. — Gouttes : *Adultes*, 10 gouttes 2 fois par jour aux principaux repas dans liquide ou aliment quelconque. Augmenter progressivement de 2 gouttes à chaque repas jusqu'à la dose normale de 20 à 25 gouttes à chaque repas. On peut atteindre 30 à 40 gouttes 2 fois par jour. *Enfants*, 1 goutte environ par année d'âge. — Vin : *Adultes*, 1 verre à liqueur avant ou après chaque repas. *Enfants*, 1 cuillerée à bouche ou à café suivant l'âge. — Elixir : 1 cuillerée à bouche après chaque repas.

Prix : Gouttes, 4 fr. 50 ; Vin, 4 fr. 50 ; Elixir, 4 fr. 50

Maurice ROBIN

13, rue de Poissy, PARIS

P

PEPTONE BYLA

Poudre blanche soluble, entièrement désodorisée, agréable au goût. Valeur nutritive représentée par 10 fois son poids de viande fraîche. Contient 14 % d'azote total.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à bouche par jour aux repas dans un liquide chaud ou froid (bouillon de préférence).

Propriétés thérapeutiques. — Digestif puissant, reconstituant, analeptique.

Indications. — Traitement de la Dénutrition et des Affections des voies digestives, Anémie, Cachexies, etc.

Prix réglementé : le flacon, 4 francs

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

PERHYDROL-MERCK

Eau oxygénée chimiquement pure
et rigoureusement neutre à 100 volumes

Caractères. — Liquide limpide, se conservant indéfiniment à son état de concentration dans les flacons d'origine, paraffinés intérieurement et munis d'un bouchage perfectionné, *absolument dépourvu de toxicité et d'action irritante*. Permet la préparation extemporanée d'eau oxygénée chimiquement pure et neutre à toutes concentrations.

Tableau pour la dilution du Perhydrol

Concentration cherchée de l'eau oxygénée,
3 vol., 10 vol., 16 vol., 33 vol.

Perhydrol, 1 partie, 1 partie, 1 partie,
1 partie.

Eau distillée, 29 parties, 9 parties, 5 parties,
2 parties.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique puissant, désodorisant, antiputride, hémostatique, épilatoire.

Indications. — Toutes les indications de l'eau oxygénée en général; en outre, emploi spécial des fortes concentrations.

Formes. — Perhydrol-Merck en flacons d'origine de : 10 gr., le flacon, 2 francs; 50 gr., le flacon, 4 francs; 200 gr., le flacon, 15 francs.

Pharmacie du Dr BOUSQUET

Licencié ès-Sciences

140, faubourg Saint-Honoré, PARIS

PÉRICOLS

Pansement péri-utérin
plus actif que les ovules

Forme Discoïde pouvant s'appliquer
dans les culs de sacs utérins autour
du col.

Composition. — A base de glycérine
médicamenteuse.

1° Péricols bellado-iodurés;

2° Péricols à l'Ichtyol ou au Thi-
génol;

3° Péricols canadiens (extrait d'ha-
mamelis et d'hydrastis, etc.).

Indications thérapeutiques. — 1°
Obstétrique : Dilatation lente du
col, après l'accouchement ou l'a-
vortement quand le col est lent à
revenir sur lui-même; 2° *Gynéco-
logie* : Métrites de toute nature,
Salpyngites, etc.

Prix réglementé :

La boîte de 6, 3 fr. 75

Docteur LEGROS & C^o

1, place de la République, PARIS

PÉRISTALTINE CIBA

Nouveau glucoside soluble extrait
de l'écorce de *Rhamnus Purshiana*
(*Cascara Sagrada*)

Propriétés. — Possède l'action laxative douce des préparations de *Cascara Sagrada* sans les effets secondaires fâcheux (Coliques, Nausées, Selles sanguinolentes, etc.).

Agit également par la voie hypodermique.

Formes. — Voie buccale : comprimés à 0,05 cgr. en tubes de 20 comprimés, 1 fr. 50 le tube; Voie hypodermique : ampoules stérilisées injectables à 0,30 cgr. en boîtes de 5 ampoules, 2 fr. 50 la boîte.

Doses et mode d'emploi. — Par voie buccale : *Adultes*, 0,15 à 0,30 cgr. (3-6 comprimés); *Enfants*, 0,05 à 0,15 cgr. (1-3 comprimés). — Par voie hypodermique : 0,30 à 0,60 cgr. (1-2 ampoules).

Nota. — L'effet se produisant au bout de 10 à 12 heures, quel que soit le mode d'administration, il est recommandé d'administrer la Péristaltine dans la soirée.

**Société pour l'Industrie chimique
à SAINT-FONS (Rhône)**

ABO PEROXYDINE 39

Forme et propriétés. — Solution hydro-alcoolique (45° d'alcool) d'Ozone stable à la température ordinaire (1/10 en volume) à réaction très acide. Couleur ambrée, saveur agréable.

L'Ozone se dégage lentement et progressivement à la température du corps en oxygène actif à l'état naissant. Double action : d'une part antiseptique, antithermique ; d'autre part, régénération des globules du sang.

Indications comme antiseptique. — Tous les états infectieux fébriles.

Antisepsie des Voies digestives : Arrêt des Fermentations putrides et microbiennes, Diarrhées, Entérites, Entérocolites, etc.

Antisepsie des Voies respiratoires : Grippe, Bronchite, Pneumonie, Catarrhe, Emphysème, etc.

Indications comme reconstituant. — Régénération des globules sanguins, Excitation de la vitalité, Augmentation des échanges, Anémie, Chlorose, Pré-tuberculose, Convalescence, etc.

Posologie et doses. — *Adultes*, 4 à 6 cuillerées à café prises 2 par 2 dans un 1/2 verre d'eau sucrée, à température ordinaire, une 1/2 heure avant les repas. — *Enfants* : 1 à 3 cuillerées, suivant l'âge, dans les mêmes conditions.

Prix réglementé : le flacon, 5 francs

Laboratoire de la PEROXYDINE

135, rue de Rome, PARIS

PHENOL BOBŒUF

Combinaison chimique alcaline parfaitement définie d'acide phénique et de tous autres produits pyrogénés du goudron (crésol, crésylol, naphtol, gaïacol, etc.).

Teneur en phénol alcalin 15 %

Forme et propriétés. — Solution concentrée, soluble dans l'eau en toutes proportions. (Antiseptique très actif et parfaitement inoffensif).

Indications et mode d'emploi. — Pansement des Plaies et Brûlures profondes, 3 à 6 fois son volume d'eau.

Métrites, Salpingites, Leucorrhée, Prurit vulvaire en injections et lotions 1 à 2 cuillères à soupe par litre d'eau.

Prix : le flacon, 1 fr. 50

Pharmacie LACHARTRE

41, rue de Rome, PARIS

Amphétex : Une injection intra-musculaire tous les deux jours.

Laboratoires CLIN

24, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

PHOSFÉRYL FOURNIER

Combinaison organique phospho-
martiale, extraite du jaune de
l'œuf.

Forme. -- Globules kératinisés dosés
à 0,10 cgr. de Phosféryl.

Dose. -- 4 à 6 globules par jour, à
prendre aux repas.

Indications. -- Celles du phosphore
et du fer : Anémie, Chlorose, Pré-
tuberculose, Débilité sénile et in-
fantile, Neurasthénie.

Le flacon de 60 globules, 4 fr. 50

Laboratoires FOURNIER Frères

26, boulevard de l'Hôpital, PARIS

PHOSPHOTAL CLIN

(Ether phosphoreux de la créosote)

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire et réminéralisateur, à minimum de toxicité. Traitement des maladies des voies respiratoires et particulièrement des formes secrétantes : Tuberculose pulmonaire, Bronchites chroniques, fétides, Gripes, etc.

Formes. — *Capsules* titrées à 0,20 cgr.

Prix : le flacon de 96 capsules, 5 fr.

Emulsion titrée à 0,50 cgr. par cuillerée à café.

Prix : le flacon de 200 cm³, 5 francs.

Ampoules à 0 gr. 10 par cm³ (amp. de 3 cm³).

Prix : la boîte de 10 tubes, 5 francs

Doses et mode d'emploi. — *Capsules* : 4 à 6 par jour.

Emulsion : De préférence en lavement, 1 à 2 cuillerées à café d'émulsion mélangée à 1/2 verre de lait tiède.

Ampoules : Une injection intramusculaire tous les deux jours.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

P

PHYTINATE DE QUININE CIBA

Sel de quinine de l'acide phytinique

Combinaison définie du principe phospho-organique des graines végétales avec l'alkaloïde principal du quinquina. Contient 57 % de quinine et 43 % d'acide phytinique.

Comprimés argentés à 0 gr. 10; le flacon de 50 comprimés, 3 francs.

Doses et mode d'emploi. — Variables suivant l'indication. 1 gr. de Phytinate correspond à 0 gr. 75 de chlorhydrate ou 0 gr. 70 de sulfate de quinine.

Propriétés thérapeutiques. — Antinévralgique, tonique, fébrifuge, stimulant des contractions utérines.

Indication spéciale. — Paludisme chronique, Cachexie paludéenne.

Société pour l'Industrie Chimique
à SAINT-FONS (Rhône)

PHYTINE CIBA

Sel acide de chaux et de magnésie
de l'acide phytinique
Principe phospho-organique
des graines végétales

Cachets à 0 gr. 50 : la boîte de 20 cachets, 4 francs.

Granulé à 10 % : le flacon de 100 gr., 4 francs.

Gélules à 0 gr. 25 : la boîte de 40 gélules : 4 francs.

Doses et mode d'emploi. — 1-2 gr. par jour pour adultes, en prises de 0 gr. 50; 0 gr. 25 à 1 gr. par jour pour enfants, en prises de 0 gr. 25.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reconstituant, apéritif.

Société pour l'Industrie Chimique
à SAINT-FONS (Rhône)

P

PILULES ANTI-HÉPATIQUES

DU D^r DEBOUZY

Opothérapie biliaire

Chaque pilule du D^r Debouzy contient 0,30 cgr. d'extrait total de bile sélectionnée et stérilisée.

Indications. — Toutes les Affections hépatiques : Lithiase biliaire, Insuffisance hépatique, Entéro-colite.

Doses et mode d'emploi. — **Lithiase biliaire** avant la colique hépatique, 6 pilules par jour; pendant la colique hépatique, 1 pilule toutes les heures, puis toutes les deux heures jusqu'à effet; après la colique hépatique, 6 pilules par jour en moyenne, pendant 20 jours par mois. La dose utile peut varier suivant les malades de 2 à 12 pilules par jour. — **Affections hépatiques** (insuffisance biliaire), *Maladies des pays chauds*, 6 pilules par jour, en moyenne; à titre préventif, 4 pilules par jour pendant 10 à 15 jours par mois. — **Entéro-colite muco-membraneuse**, 6 pilules par jour, continuer pendant quelques mois pour rendre la guérison définitive.

Les Pilules du D^r Debouzy doivent être prises au début ou au milieu des repas, en 2 ou 3 fois par jour.

P. LONGUET

50, rue des Lombards, PARIS

PILULES DE MOUSSETTE

à l'Aconitine cristallisée

Propriétés thérapeutiques. — Action sédative et analgésique surtout remarquable dans la zone du trijumeau.

Forme. — Pilules dosées à 1/5^e de mgr. d'aconitine cristallisée et 5 mgr. de quinium par pilule. — Prix : le flacon de 20 pilules, 3 fr.

Doses. — Deux pilules le premier jour, une le matin et une le soir ; on prendra trois pilules le second jour, en trois prises espacées, si aucun soulagement ne s'est produit. On n'atteindra la dose de quatre pilules qu'exceptionnellement en surveillant la tolérance du malade (la sensation de fourmillement dans la langue, les lèvres et la face est un signe prémonitoire d'intolérance). Après chaque ingestion de *Pilules de Moussette* prendre une infusion chaude. L'administration simultanée d'un purgatif énergique est conseillée par le Dr Fuchs.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

148, boulevard Saint-Honoré
PARIS (VIII^e)

P

PILULES DE QUASSINE FRÉMINT

0,02 cgr. de Quassine amorphe titrée
en Quassine cristallisée et 0,08 cgr.
extraits amers par pilule.

Dose. — 1 à 2 pilules dans une cuil-
lerée d'eau, 10 minutes avant les
repas de midi et du soir.

Propriétés. — Excitent l'appétit,
facilitent la digestion et l'assimila-
tion, accélèrent les sécrétions et
tonifient l'ensemble de l'appareil
digestif.

Indications. — Anorexie, Dyspepsie,
Hypothonie gastro-intestinale,
Coliques hépatiques et néphré-
tiques.

Prix réglementé : 3 francs

Laboratoire FREYSSINGE
6, rue Abel, PARIS

PIPÉRAZINE MIDY

Diéthylène Diamine, $\text{NH} \begin{matrix} \text{CH}_2 \\ \text{CH}_2 \end{matrix} \text{NH}$,
alcalin organique du groupe des
Pyridines. (Inscrit au Codex Fran-
çais 1908).

Granulé effervescent, dosé à 0,20 cgr.
Pipérazine pure par mesure ou
cuiller à café.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 3 me-
sures par jour comme préventif;
4 à 6 mesures par jour, crises aiguës,
dissoutes dans un verre d'eau à
distance des repas.

Propriétés thérapeutiques. — Dis-
sout 92 % des composés de l'acide
urique; réduit les déchets uratiques
en stimulant l'activité hépatique.

Indications. — Le plus actif de; re-
mèdes à prescrire dans les manifes-
tations de l'Arthritisme et de l'Uri-
cémie, Goutte, Rhumatisme, Gra-
velle, Calculs, Coliques hépatiques
et néphrétiques, Sciatique, Artério-
sclérose, Eczéma, Diabète.

*Aucune contre-indication, innocuité
absolue sur cœur, estomac, vaisseaux.*

Prix réglementé : le flacon, 5 francs

Pharmacie MIDY

140, faubourg Saint-Honoré
PARIS (VIII^e)

P

PIL PLACENTINE BYLA

(Tissu placentaire)

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (0 gr. 15).

Dose moyenne. — 5 à 10 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Galactogène.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

Pharmacie MIDY

140, boulevard Saint-Henri

PARIS (VII^e)

POUDRE AMÉRICAINE LEROY

Composition. — Piper cubebis et Grindelia Robusta.

Mode d'emploi. — Mettre dans une soucoupe une cuillerée à café de poudre environ, et en former un petit tas conique dont on allumera le sommet.

Indications. — Asthme, Coryza, Bronchite chronique, Emphysème et dilatation bronchique.

Prix : la boîte, 1 fr. 50

Pharmacie MORIDE

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

POUDRE GÉNIA

A base de carbonate de chaux précipité, phosphate de chaux bicalcique, lactate de chaux, citrate de soude, bi-carbonate de soude, magnésie hydratée, stovaine.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes*, 1 à 2 cuillerées à café, à hauteur du bord, au début, au milieu de chaque repas. 2 à 4 cuillerées à café, à hauteur du bord, dans hyperchlorhydrie. — *Enfants*, 1/2 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge.

Propriétés thérapeutiques. — Absorbante, digestive, laxative, reconstituante, analgésique.

Indications. — Dyspepsie et Entérites communes et tuberculeuses, Gastralgies et Fermentations, Constipation, Hémorroïdes, Cirrhoses, Diabète, Goutte, Obésité, Gastroentérites infantiles.

Prix réglementé : le flacon, 4 fr. 50

Laboratoire Thérapeutique
136, rue du Chemin Vert, PARIS

G. POUTEAU
Pharmacien de 1^{re} Classe, Directeur

POUGUES

	Source St-Léger	Source Alice
Acide carbonique libre.....	2.1178	2.0000
Bicarbonate de soude.....	1.0302	0.1860
— — potasse.....	0.0699	0.0260
— de chaux.....	1.8934	2.1040
— de magnésie.....	0.4554	0.3040
— de fer.....	0.0600	0.0260
Sulfate de soude.....	0.1768	0.2300
Chlorure de sodium.....	0.1417	0.2120
Chlorure de lithium.....	0.0468	0.0060
Silice.....	0.0340	0.0290
Total.....	6.0260	5.1230

Indications thérapeutiques :

Pougues Saint-Léger. — Maladies de l'estomac et des intestins. — Neurasthénie. — Anémie. — Chlorose. — Convalescences. — Diabète. — Goutte. — Rhumatisme.

Pougues Alice. — Allaitement maternel. — Arrêt des Vomissements de la grossesse. — Formation du système osseux. Croissance. — Dentition. — Guérison des Diarrhées infantiles.

Cie de POUQUES

15 et 17, rue Auber — PARIS

**PRODUITS MIDY
AU COLLARGOL**

Pommade Midy au Collargol à 15 %
en capsules de 4 gr.

Solution Midy au Collargol à 10 %
en ampoules de 2, 5, et 10 cm³

Dose et mode d'emploi. — *Pommade* : en frictions quotidiennes sur aine ou aisselle après avoir nettoyé l'endroit à l'eau tiède et au savon puis à l'alcool-éther. Recouvrir d'un linge et taffetas gommé. — *Solution* pour injections intra-veineuses, dans une veine du pli du coude ou au dos de la main.

Propriétés thérapeutiques. — Arrête les proliférations microbiennes sans altérer les éléments histologiques. Procure un abaissement de température rapide et constant. Amène une leucolyse suivie d'une leucocytose intense, dénotant l'intensité du processus de phagocytose.

Indications. — Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Grippe, Méningite, Diph-térie maligne, Scarlatine grave, Endocardite infectieuse, Péricardite, Pyohémie, Fièvre typhoïde, Fièvre puerpérale, Appendicite, Phlegmons, Ostéo myélite, Adénites, Suppurations locales diverses, Blennorrhagies, Ophthal-mologie, etc.

Prix :

5 francs la boîte de 5 capsules
5 francs la boîte de 6 ampoules de 2 cm³
(Boîtes d'ampoules de 5 et de 10 cm³)

Pharmacie MIDY

140, faubourg Saint-Honoré, PARIS (VIII^e)

PROSTATINE BYLA

(à gr. 15)

Capsules opothérapeutiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal.

Dose moyenne. — 5 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Hypertrophie de la Prostate et sénilité virile.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

5, rue du Faubourg Poissonnière
à PARIS (IX^e)

Remise : Laboratoire E. DUPUYEL
à CREIL (Oise)

P

PROTÉINATE D'ARGENT AU HEYDEN

En prescrivant *Protéinate d'argent Heyden*, l'exécution de l'ordonnance sera moins onéreuse pour le malade, qu'avec une autre prescription.

Solutions de 0,25 à 1 ‰
dans la blennorrhagie chronique

Solutions de 2,5 à 5 ‰
pour le traitement abortif

Pommade de 0,3 à 1 ‰ pour plaies
aux jambes

Propriétés thérapeutiques.

— Action anti-blennorrhagique éprouvée.

Indications. — Blennorrhagie, Ulcus cruris.

Produits HEYDEN

29 et 31, rue Philippe-de-Girard
PARIS (X^e)

PYRAMIDON CREIL

Diméthylaminoantipyrine

Cachet Cépé : Pyramidon Creil
0,30 cgr. ; Caféine 0,05 cgr.*Comprimés* dosés à 0,30 et à 0,05 cgr.
de Pyramidon Creil. — Vendus en
boîte d'origine.**Doses.** — *Adultes* : 0,30 cgr. à la fois,
1 gr. par jour. — *Enfants* : autant
de cgr. que d'années d'âge; 3 à
4 heures d'intervalle entre chaque
dose.**Propriétés thérapeutiques.** — Anal-
gésique et antithermique, 4 fois plus
actif que l'antipyrine du Docteur
Knorr, ne fatigue pas l'estomac.**Indications.** — Fièvre chronique des
tuberculeux, Fièvre typhoïde, Ery-
sipèle, Pneumonie, Rhumatisme
articulaire, Influenza, Grippe,
Migraines, Névralgies, Céphalal-
gies, Névrites, Douleurs ataxiques,
Menstruation, Asthme, Gastralgie,
Odontalgie.Produits Pharmaceutiques spéciaux CREIL
de la Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline9, rue du faubourg Poissonnière
à PARIS (IX^e)Pharmacien : **Laboratoire E. DUPUTEL**
à CREIL (Oise)

QUINA LAROCHE

(Extrait complet des 3 Quinquinas)

Composition. — Extrait complet des 3 sortes de quinquinas : quinquina gris Loxa vrai, quinquina jaune royal, quinquina rouge. Préparé en épuisant le mélange des quinquinas par dialyse, il concentre sous un petit volume tous les éléments actifs, amers, astringents et aromatiques contenus dans les écorces. Principaux éléments : quinine, cinchonine, acide quino-tannique, acide quinine, etc.

Propriétés. — Tonique et eupeptique.

Formes. — Quina Laroche simple, phosphaté, ferrugineux.

Prix : 5 fr. le flacon ; 3 fr. le 1/2 flacon

Doses. — *Adultes* : un verre-mesure après chaque repas ; *Enfants* : le tiers ou la moitié de cette dose étendue d'eau selon l'âge.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Esculine adrénalinée et d'Ortho-cocaine livrée en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdique parfait.

Propriétés thérapeutiques. — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice. Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

Technique de l'emploi. — Remplacer le bouchon du tube en métal par la canule; introduire doucement cette canule dans l'anus, en ayant soin de presser légèrement sur l'extrémité opposée du tube, de façon à obtenir l'expulsion d'une petite quantité de pommade; incliner le tube dans tous les sens pour que le pansement soit bien appliqué sur la paroi ano-rectale; puis retirer le tube très lentement. Dévisser alors la canule, la laver soigneusement à l'eau bouillante et la remettre dans son tube en verre.

Prix réglementé :

La boîte complète avec canule, 4 fr.

164, rue Saint-Honoré, PARIS

R

**RÉGÉNÉRATEUR
PULMONAIRE
DU D^r O. BOUYER**

à base de Phénol synthétique
chimiquement pur

Liquide dosé à raison de 0 gr. 05 cgr.
par cuillerée à bouche, sans caus-
ticité et parfaitement toléré par
les estomacs les plus susceptibles.

Doses. — 4 cuill. à bouche pour les
grandes personnes; 4 cuill. à des-
sert pour les enfants de 7 à 14 ans;
4 cuill. à café pour les enfants de
2 à 7 ans.

Indications. — *Toutes les affections
chroniques et secrétantes des voies
respiratoires.*

6 fr. le litre et 3 fr. 50 le 1/2 litre
avec ticket de 25 0/0
pour les Pharmaciens

BARTHÉLEMY & C^{ie}

5, rue Dugommier, à NANTES

RÉNINE BYLA

Glande rénale

Capsules opothérapiques à enrobage
néo-résineux solubles seulement
dans le suc intestinal (à 0,10 cgr.).

Dose moyenne. — 4 capsules dans
les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Dans
tous les cas d'insuffisance rénale,
néphrites aiguës ou chroniques,
accidents de l'urémie et de l'albu-
minurie.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

R

RHÉSAL VICARIO

Nouvelle préparation salicylique

Absorbable par la peau

Sans mauvaise odeur

Puissamment active

Prix : 2 fr. 50

Mode d'emploi. — Après nettoyage préalable à l'alcool ou à l'éther, étendre sur la peau une mince couche de Rhésal. Masser légèrement pendant 5 à 10 minutes, recouvrir d'ouate, de gaze ou de taffetas.

Dose. — 2 ou 3 frictions en 24 heures.

Indications thérapeutiques :

Affections rhumatismales : Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, sciatique, lumbago, rhumatisme musculaire, etc.

Affections non rhumatismales, mais douloureuses : Arthrites, névralgies intercostales, pleurite, etc.

Prescrire " RHÉSAL VICARIO "

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann, PARIS

RIBES NIGRUM BYLA
(ÉNERGÉTÈNE DE)

Suc pur inaltérable de la plante
fraîche (cassis)

36 gouttes = 1 gramme
de la plante fraîche

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3
cuillerées à café par jour à prendre
dans un peu d'eau chaude avant
les repas.

Propriétés thérapeutiques. -- Puis-
sant modificateur de la nutrition.
Diarétique actif. Stimulant des
fonctions hépatiques et gastro-
intestinales. Antiarthritique.

Indications. — Rhumatisme chroni-
que, arthritisme, gravelle, obésité,
eczéma, urticaire.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

S**SAINT-GALMIER (Loire)****SOURCE BADOIT : Eau de table type***Minéralisation totale : 2 gr. 4049**Acide carbonique : 3 gr. 774*

- | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 1° Dyspepsie | } | Hypochlorhydrie. |
| 2° Anorexie. | | Hypoepsie. |
| | | Hyposthénie. |
| 3° Lithiase urinaire. | } | Urique. |
| | | Phosphatique. |
| 4° Lithiase biliaire : | | adjuvant de Vichy. |
| 5° Réminéralisation
de l'organisme | } | Tuberculose (méthode Ferrier). |
| | | Diabète. |

SOURCE ROMAINE : Eau de table très gazeuse*Minéralisation totale : 3 gr. 015**Acide carbonique : 4 gr. 764*

- | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| 1° Dilatation gastrique. | | |
| 2° Arthritisme (lithine et iode). | | |
| 3° Réminéralisation
de l'organisme | } | |
| | | Tuberculose (Ferrier). |
| | | Diabète. |

SOURCE NOEL :**Eau de table légère, faiblement minéralisée***Minéralisation totale : 1 gr. 650**Acide carbonique : 1 gr. 9326*

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1° Catarrhes vésicaux. | | |
| 2° Albuminuries..... | } | |
| | | Digestives. |
| | | Hépatiques. |
| | | Lithiasiques. |
| 3° Hypertension par auto-intoxication. | | |
| 4° Dyspnée des Hypertendus (associée au lactose). | | |
| 5° Entérite, gastro-entérite. | | |

SALÈNE CIBA

Ether éthyl-méthylglycolique
de l'acide salicylique

*Traitement externe des affections
rhumatismales et des accès de
goutte aiguë.*

Applications, badigeonnages, massa-
ges, frictions avec le produit pur
ou dissous dans l'alcool, l'huile de
ricin, l'huile chloroformée, etc.

SALÉNAL

Onguent à 33 1/3 % de Salène pur
Néuralgies, Lumbago, Rhumatismes
Tube de 30 gr. : 1 fr. 50

Société pour l'Industrie Chimique
à SAINT-FONS (Rhône)

Pharmacie Chimique de Saint-Fons
18, Avenue de France à Saint-Fons
Laboratoire S. DUPUTEL
SAINT-FONS

S

SALIT HEYDEN

Ether bornylique de l'acide
salicylique

Liquide huileux

Dose et mode d'emploi. -- 2 fois
par jour une friction avec une
demi-cuillerée ou une cuillerée à
café de Salit Heyden pur ou mé-
langé à l'huile d'olive.

Propriétés thérapeutiques. -- Anti-
rhumatismal.

Indications. -- Rhumatismes muscu-
laires, Névralgies, Rhumatismes
articulaires bénins, Synovite ten-
dineuse, Pleurésie rhumatismale,
Douleurs dans la lithiase biliaire.

2 fr. le flacon

Produits HEYDEN

29 et 31, rue Philippe-de-Girard

PARIS (X^e)

SALVARSAN

Produit arsénical N° 606 d'Ehrlich

Avis important. — Le produit livré au commerce sous la marque de *Salvarsan* est reconnu de qualité irréprochable par le Prof. Ehrlich, qui analyse chaque opération au point de vue biologique et chimique, ce produit porte le fac-similé de la signature du Prof. Ehrlich.

Doses. — 0 gr. 01 par kilo, soit 0 gr. 60 en injection intra-veineuse.

Pour atténuer les réactions spécifiques, commencer le traitement par 0 gr. 20 à 0 gr. 30 de *Salvarsan* et n'atteindre la dose normale stérilisante qu'à la 4^e injection.

Une seule injection est rarement suffisante pour guérir la syphilis, et le procédé de choix consiste à faire des séries de 4 injections à 8 jours d'intervalle :

0 gr. 30, 0 gr. 40, 0 gr. 50, 0 gr. 60 de *Salvarsan*.

Renouveler éventuellement ces cures de 4 injections jusqu'à disparition des séro-réactions.

Indications. — Spécifique de la Syphilis, des Trypanosomiasés, Spirochètoses, Spirilloses, Maladies à protozoaires : Malaria, Fièvre récurrente, Framboésia, Angine de Vincent, Ulcérations fuso-spirillaires buccales, Ulcérations non spécifiques telles qu'Ulcérations variqueuses, scrofuleuses, Chancres mou. Dans ces dernières affections locales, traitement local avec de la poudre, des pommades ou des collyres à 10 %.

Produits Pharmaceutiques spéciaux CREIL,

de la Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Laboratoire E. DUPUTEL

CREIL (Oise)

S**SANTHÉOSE**

A base d'une *Diméthylxanthine* irréprochablement pure, associée selon les cas au phosphate de soude, à la caféine ou au benzoate de lithine.

Formes. — Se présente en *cachets en forme de cœur* (dosés à 0,50 de principe actif) et existe sous 4 variétés :

1° *Santhéose pure* : Affections cardio-rénales, albuminurie ; 2° *Santhéose phosphatée* : Scléroses, convalescences ; 3° *Santhéose caféinée* : Asthénie, asystolie, infections ; 4° *Santhéose lithinée* : Artério-sclérose, rhumatisme, goutte.

Dose. — 1 à 4 cachets par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique, hypotenseur, toni-cardiaque, antitoxique.

Indications. — Toutes les affections justiciables d'un diurétique rénal direct.

5 fr. la boîte

DÉPOT GÉNÉRAL :

4, rue Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e)

SATUROL

Composition. — Bicarbonate, phosphate et sulfate de soude chimiquement purs (conditions essentielles d'efficacité). (Formule du professeur Bourget, de Lausanne).

Action. — Sature les acides de l'estomac; permet de ramener rapidement, à toutes les périodes de la digestion, l'acidité des hyperchlorhydriques au tarif normal de 0,2%.

Indications. — Pyrosis (brûlures, acidité, aigreurs, pesanteurs, fermentations, spasmes pyloriques).

Forme pharmaceutique. — Granulé soluble.

Dose. — Une mesure dissoute dans un verre à bordeaux d'eau pure. Répéter aussi souvent que cela est nécessaire.

Laboratoires DURET & RABY

MARLY-LE-ROI (Seine - et - Oise)

S

SAUGE BYLA (ÉNERGÈTE DE)

Suc pur
inaltérable de la plante fraîche
36 gouttes = 1 gr. de plante fraîche

Dose et mode d'emploi. — 20 à
50 gouttes à prendre avant chacun
des 3 principaux repas dans un
peu d'eau sucrée.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-
sudoral non toxique.

Indications. — Sueurs profuses,
Dyspepsies, Entérites.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

LABORATOIRES BYLA
à GENTILLY (Seine)

5 fr. la boîte

DÉPOT GÉNÉRAL :

4, rue Roi-de-Sicile, PARIS

SAVONS ANTISEPTIQUES F. VIGIER

Hygiéniques et médicamenteux, préparés avec des pâtes strictement neutres, entièrement saturées. Soins hygiéniques du corps; traitement des affections de la peau.

Savon doux ou pur, savon hygiénique, savon sulfureux surgras au beurre de cacao, savon à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou) savon panama, savon panama et goudron, savon naphitol, savon naphitol soufré, savon goudron et naphitol (pour les soins de la chevelure, barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées), savon sublimé, savon eucalyptol, savon phéniqué, savon boriqué, savon créoline, savon eucalyptus, savon à la formaldéhyde, savon au solvéol, savon résorcine, savon salicylé, savon salol, savon au thymol (accouchements, Rougeole, Scarlatine, Variole, Anthrax, etc.), savon intime (à base de sublimé), savon à l'ichtyol (Acné, Rougeurs), savon panama et ichtyol, savon sulfureux, savon à l'huile de cade, savon goudron, savon boraté, savon pétrole, savon goudron boriqué, savon iodé à 5 % d'iode, savon mercuriel 33 % de Hg.), savon au tannoforme (contre les sueurs), savon au baume du Pérou et pétrole (contre la Gale, les Parasites, savon à l'oxyde de zinc (Eczémas), savon à l'huile de Chaulmoogra (Lèpre, Psoriasis).

Savon dentifrice Vigier prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques

VIGIER & HUERRE

12, boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

SCOROGÈNE

Régulateur des fonctions intestinales formé d'un mélange d'algues de la famille des floridées et de mucilages d'althéa additionnés d'une petite quantité d'un glucoside du boldo, réunissant ainsi les actions gonflantes, émoullientes et cholagogues à l'exclusion de toute action directement laxative.

Forme. — Granulé (sans sucre). Prix : 3 francs la boîte de 125 gr.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 à 6 cuillerées à café par jour, en deux ou trois fois, au milieu des repas. — *Enfants* : 2 à 4 cuillerées à café. Prendre de préférence « à sec » ce granulé en le portant directement sur la langue et en s'aidant d'une gorgée d'un liquide quelconque pour l'avalier.

SCOROGÈNE-LAXATIF

Les *Cachets de Scorogène-Laxatif* réunissent les éléments gonflants et mucilagineux du Scorogène et les principes laxatifs des rhamnées.

Dose et mode d'emploi. — De 1 à 3 cachets par jour au moment des repas.

La boîte de 20 cachets : 2 fr. 50

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

SÉDOL

Association Scopolamine-Morphine

Mode d'emploi et dose. — Injection hypodermique : 1 à 3 ampoules par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, hypnotique, sédatif du système nerveux.

Indications. — Toutes celles de la Morphine. Ses propriétés antispasmodiques agissent d'une façon remarquable contre la chorée, les tics douloureux, l'Eclampsie puerpérale, etc.

Prix : La boîte de 12 ampoules 4 fr.

L. LECOQ, Pharmacien de 1^{re} classe
Ancien Interne

Médaille d'or des Hôpitaux de Paris
15, aven. Perrichont, PARIS (XVI^e)

Boîte de 12 ampoules : 4 fr. 00

Prix. — Le tube : 2 francs

Le demi-tube : 1 fr. 25

Henri FOUCHER & Pharmacie

Le Cabinet Médical des Hôpitaux de Paris

112, rue d'Alsace — PARIS

S**SEKTAL GREMY**

Ether camphorique du Santalol
Composé synthétique défini dont les
éléments constitutifs possèdent une
action élective sur les muqueuses
vésicale et uréthrale.

Pilules dosées à 0,30 de Sektal
par unité

Dose. — 8 à 10 pilules par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Séda-
tif, anticatarrhal, bactéricide trois
fois plus actif que le santalol ou
l'essence de santalol. Tolérance
parfaite.

Indications. — Uréthrites blennor-
rhagiques aiguës ou chroniques.
Uréthrites non gonococciennes,
Cystites, Catarrhe de la vessie.

P. LONGUET

50, rue des Lombards — PARIS

*Boîte de 20 sachets. — 10
sachets par jour au moment des
repas.*

La boîte de 20 sachets : 2 fr. 50

Laboratoires CLIN

24, rue des Poissés-Saint-Jacques — PARIS

SÉNOPHILE

Composition et forme. — Cérat astringent, non irritant, non caustique, en tubes compressibles hermétiques, ce qui assure au contenu une asepsie rigoureuse.


Indications. — Erythèmes fessiers des nouveau-nés, Gergures, Fissures, Crevasses des seins; innocuité absolue.

Mode d'emploi. — Le Sénophile a deux actions différentes : lorsque le mamelon est simplement douloureux, une application matin et soir suffit à faire disparaître la plus légère trace d'inflammation. Lorsque la crevasse ou la gergure est apparente, c'est après chaque tétée que l'application doit se faire pour produire son maximum d'effet. Avant l'application, laver le mamelon avec de l'eau bouillie tiède et l'essuyer doucement. Le sein sera également essuyé avant chaque tétée.

Références. — Adopté dans les maternités des hôpitaux (Beaujon, Port-Royal, etc.).

Prix. — Le tube : 2 francs

Le demi-tube : 1 fr. 25

Henri FOUCHER , Pharmacien
Ex-Interne médaillé des Hôpitaux de Paris
172, rue d'Alésia — PARIS

S

SÉQUARDINE BOUTY

Dragées dosées à 1 gr. d'extrait testiculaire

Ampoules de 1 cm³ et de 3 cm³.

Dose et mode d'emploi. — Une dragée avant chacun des deux principaux repas ou une injection d'un cm³ par jour.

Indications thérapeutiques. — Faiblesse constitutionnelle.

Prix réglementé :

10 francs la boîte de 50 dragées

6 francs la boîte de 6 ampoules d'un cm³.

Aux médecins, escompte 50 %

Laboratoires BOUTY

3 bis, rue de Dunkerque — PARIS

SINAPISME RIGOLLOT

Moutarde en feuilles

Propriétés. — Révulsif, décongestionnant.

Indications. — Congestions cérébrales, Attaque d'apoplexie, Congestion pulmonaire, Bronchite, Fluxion de poitrine, Grippe, Influenza, Névralgies, Choléra, etc...

Mode d'emploi. — Humecter pendant une 1/2 minute dans l'eau froide ou modérément chaude au moment de l'application. On modère l'effet du sinapisme chez les enfants et les personnes sensibles, en interposant une feuille de papier de soie entre la peau et le sinapisme.

Prix : 1 fr. la boîte de 10 feuilles

L. DARRASSE et C^{ie}

13, rue Pavée — PARIS

S**SIROP D'AUBERGIER**

à base de lactucarium d'Auvergne
(Inscrit au Codex
Communication à l'Académie de Médecine)

Propriétés thérapeutiques. — Action *sédative et calmante*, sans phase d'excitation, ni aucun des inconvénients de l'opium. — *Eupnéique*, indiqué dans toutes les affections des voies respiratoires. Egalement employé dans l'Insomnie, et tous les cas de Surexcitations du système nerveux.
Convient particulièrement dans la *médecine infantile*.

Forme. — Sirop dosé à 0 gr. 10 de lactucarium et 0 gr. 0012 d'alcaloïde thébaïque par cuillerée à soupe.

Prix : 3 fr. le flacon de 250 cm³.

Doses. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

PATE D'AUBERGIER

Adjuvant du traitement par le Sirop. --
10 à 12 morceaux par jour.

Prix : la boîte, 1 fr. 50

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

SIROP DE F. GILLE

à base de Protoiodure de Fer
Chaque cuillerée à bouche = 0 gr. 10 cgr.
d'Iodure de Fer

Dose. — 1 à 2 cuillerées par jour,
à la fin des repas.

Propriétés pharmacodynamiques.
— Représente comme la synthèse
du fer et de l'iode, et se caractérise
par la pureté, la solubilité et l'inal-
térabilité du sel de fer.

Propriétés thérapeutiques. — Régé-
nérateur du sang, stimulant des
organes hématopoïétiques et lym-
phoïdes, phagocytogène, antidia-
thésique.

Indications. — Chlorose, Anémies,
Prétuberculose et Tuberculose,
Lymphatisme, Scrofule, Rachi-
tisme, Neurasthénie, Syphilis, Sa-
turnisme, Diabète, Maladies des
femmes, etc.

Prix réglementé : le flacon, 5 francs

Entrepôt Général :

73, rue Saint-Anne, PARIS

à Pont-Saint-Espirit (Gard)

Maison HENRY MURE

**SIROP D'HÉMOGLOBINE
BYLA**

à l'oxyhémoglobine naissante
cristallisée

1 cuillerée à bouche = 1 gr.
d'oxyhémoglobine Byla vraie

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuil-
lerées à bouche un peu avant
chaque repas dans 1/4 de verre
d'eau froide gazeuse de préférence.

Propriétés thérapeutiques. — Le
plus puissant, le plus assimilable
et le plus agréable des ferrugineux
naturels.

Indications. — Dans tous les cas
d'infections aiguës ou chroniques,
dans les états morbides les plus
divers chez les anémiés, conva-
lescents et neurasthéniques.

Prix réglementé : le flacon, 4 francs

Les Etablissements BYLA

à Gentilly (Seine)

SIROPS HENRY MURE

- 1^o Au bromure de potassium ;
- 2^o Au bromure de sodium ;
- 3^o Polybromuré (potassium, sodium, ammonium).
- 4^o Au bromure de strontium (exempt de baryte).

Rigoureusement dosés à 2 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 0,50 cgr. par cuillerée à café de sirop d'écorces d'oranges amères irréprochable. Se prend pur ou dans 1/4 de verre d'eau, dans une tasse de tilleul ou thé diurétique de France, tiède non sucré.

Propriétés thérapeutiques. — Antinerveux.

Indications. — Epilepsie, Hystérie, Névrose, Danse de Saint-Guy, Affections de la moelle épinière, Convulsions, Crises, Vertiges, Eblouissements, Fatigue cérébrale, Migraine, Insomnie, Spermatorrhée, etc.

Prix : le flacon, 5 francs

A. GAZAGNE, Pharm. de 1^{re} Classe
à Pont-Saint-Esprit (Gard)

Maison HENRY MURE

S

SIROP DE PAPAINÉ BYLA

à base de ferment végétal extrait du
caricaya papaya

1 cuillerée à bouche = 0,50 cgr. de
papaine pure

Existe également sous forme d'Elixir

Dose et mode d'emploi. — 1 cuillerée à bouche après chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Analeptique, eupeptique, digestif puissant.

Indications. — Affections de l'estomac : Dyspepsies, Flatulences, Dilatation, etc.

Prix réglementé : le flacon, 4 francs

Les Etablissements BYLA

à Gentilly (Seine)

SIROP " ROCHE "
AU THIOCOL

1 cuill. à soupe de Sirop Roche = 1 gr.
de Thiocol Roche
1 gr. de Thiocol Roche = 0.52 cgr.
de gâfacol cristallisé

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* :
1 à 6 cuillerées à soupe par jour.
Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à soupe
par jour.
et plus selon indications.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-
septique, phagocytogène, eupep-
tique, orexique.

Indications. — Toutes les Affections
broncho-pulmonaires, Tubercu-
lose, Bronchites aiguës et chro-
niques, Grippe, Pneumonie, Coque-
luche, Scrofule, Anémie, Rachi-
tisme, Dyspepsie, Entérites,
Diarrhées, etc.

Prix réglementé : le flacon, 4 francs

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co
21, Place des Vosges, PARIS

à ce point de vue, une révolution
n'est connue.

Laboratoires GLIN
20, rue des Poissés-Saint-Jacques
PARIS

S

SOLUROL

(Acide thyminique pur)

Propriétés thérapeutiques. — Éliminateur physiologique de l'acide urique. Traitement de la diathèse urique sous toutes ses formes.

Forme. — Comprimés dosés à 0 gr. 25.
Prix : le flac. de 25 comprimés, 3 fr. 50

Doses et mode d'emploi. — Crises aiguës : 5 à 7 comprimés par jour.
Cures périodiques : 3 à 4 comprimés par jour. Ecraser les comprimés pour les avaler.

Remarque. — Le Solurol doit faire l'objet de cures périodiques chez tous les malades qui ont à redouter le retour d'accidents uriques. Ces cures devront de préférence avoir lieu au printemps et à l'automne surtout chez les goutteux. Elles dureront chaque fois 3 à 4 semaines, au minimum.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-St-Jacques, PARIS

SOLUTIONS DU D^r CLIN

- 1^o *Au Salicylate de Soude*
- 2^o *Au Salicylate de Lithine*
- 3^o *A l'Antipyrine*

Avantages. — Pureté et tolérance garanties.

Formes et doses. — 1^o Solution du D^r Clin au Salicylate de Soude dosée à 2 gr. par cuillerée à soupe.

Prix : le flacon de 300 cm³, 6 fr.

2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

2^o Solution du D^r Clin au Salicylate de lithine, dosée à 1 gr. par cuillerée à soupe.

Prix : le flacon de 300 cm³, 6 fr.

1 à 4 cuillerées à soupe par jour.

3^o Solution d'Antipyrine du D^r Clin, dosée à 1 gr. par cuillerée à soupe.

Prix : le flacon de 250 cm³, 6 fr. ;
le flacon de 150 cm³, 3 fr. 50.

1 à 3 cuillerées par jour.

Remarque. — Grâce à leur véhicule spécial, les solutions du D^r Clin assurent la tolérance et la diffusion du médicament et se sont acquises à ce point de vue, une réputation bien connue.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-Saint-Jacques
PARIS

S

SOLUTIONS HENRY MURE

Phosphatées calciques

1^o Au Bi-phosphate arsénié.

2^o Au Chlorhydro-phosphate arsénié.

Prix : le litre, 4 fr. ; le 1/2 litre, 2 fr. 50

3^o Au Chlorhydro-phosphate arsénié et créosoté.

Prix : le litre, 5 fr. ; le 1/2 litre, 3 fr.

Dosées à 1 gr. de phosphate calcaire et 0,001 mgr. arséniate de soude par cuillerée à bouche, à prendre dans un peu d'eau sucrée.

Indications thérapeutiques. — Toutes les Affections broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites, Grippe, Pneumonie, Scrofule, Anémie, Chlorose, Rachitisme, Carie des os, etc.

A. GAZAGNE, Pharm. de 1^{re} Classe
à Pont-Saint-Esprit (Gard)

Maison HENRY MURE

Laboratoires CLIN
31, rue des Fossés-Saint-Jacques
PARIS

SPARABLANC SAUTER

Emplâtre adhésif au caoutchouc
renfermant 40 % d'oxyde de zinc

Contrairement à tous les Sparadraps qui contiennent des substances résineuses telles que Colophane, Galipot, Poix de Bourgogne, etc., plus ou moins riches en acides, et qui peuvent être irritantes pour la peau et les plaies, le *Sparablanc Sauter* n'en renferme plus à l'état libre.

Ce résultat est obtenu par un procédé de digestion des substances résineuses employées avant l'adjonction du caoutchouc à la masse emplastique.

Le *Sparablanc* constitue une pommade agglutinative d'oxyde de zinc et peut être appliqué sur les plaies directement sans crainte d'irritation.

Se fait sur cretonne ou toile à voile en toutes largeurs de 1 à 20 centimètres et longueurs de 1 à 5 mètres. Sur demande, dimensions spéciales.

Prix suivant grandeur et dimensions.

Laboratoires SAUTER

49, rue de Paradis, PARIS
GENÈVE, Bellegarde (Ain)

SPHÉRULINES
CHOLAGOGUES MONCOUR

(Opothérapie)

Sphérulines dosées à 0,10 cgr. d'Extrait de bile par unité.

Doses et mode d'emploi. Indications. — 1^o *Chez les lithiasiques ou chez les malades prédisposés à la lithiase biliaire* : 2 Sphérulines par jour, 1 à chacun des 2 principaux repas. Cette médication doit être prolongée.

2^o *Contre le retour des coliques hépatiques* : 2 Sphérulines par jour, comme ci-dessus, continuer plusieurs mois de suite et reprendre par cures intermittentes de quelques semaines.

3^o *Dans les cas d'ictère par rétention* : 5 à 6 Sphérulines par jour.

Prix réglementé : le flacon, 4 fr.

A. de MONTCOURT

49, avenue Victor-Hugo, 49
à BOULOGNE (Seine)

**SPHÉRULINES
ENTÉRIQUES MONCOUR**

(Opothérapie)

Sphérulines dosées à 0,30 cgr. d'Ex-
trait par unité.**Dose.** — 2 à 6 Sphérulines par jour
à la fin des repas.**Propriétés thérapeutiques.** — Fa-
vorise la sécrétion du pancréas,
augmente la puissance digestive et
la quantité du suc pancréatique.**SPHÉRULINES ENTÉRO-PANCRÉATIQUES
MONCOUR**Sucs pancréatique et intestinal
associés*Sphérulines* dosées à 0,25 cgr. d'Ex-
trait par unité.**Dose.** — 1 à 4 Sphérulines au début
de chaque grand repas.

Prix réglementé : le flacon, 6 francs

A. de MONTCOURT49. avenue Victor-Hugo, 49
à BOULOGNE (Seine)

S

**SPHÉRULINES GASTRIQUES
MONCOUR**

(Opothérapie)

1 gr. d'Extrait = 50 cm³ de suc
gastrique normal de l'homme

Sphérulines dosées à 0 gr.125 d'Extrait
par unité.

Dose et mode d'emploi. — De 4 à
16 Sphérulines par jour à prendre
au milieu des repas.

Indications thérapeutiques. — Tous
les cas d'hypoepsie, qu'il y ait
hyperchlorhydrie, *chlorhydrie nor-
male ou hypochlorhydrie*. Dans ce
dernier cas, on administre simul-
tanément l'Extrait gastrique et un
médicament acide.

Prix réglementé : le flacon, 4 francs

A. de MONTCOURT

49, avenue Victor-Hugo, 49
à BOULOGNE (Seine)

**SPHÉRULINES
HÉPATIQUES MONCOUR**

(Opothérapie)

Sphérulines dosées à 0,30 cgr. par unité.*Extrait* en doses massives de 12 gr.*Suppositoires* dosés à 3 gr. par unité.

Doses et mode d'emploi. — 4 à 16 Sphérulines avant les repas. Dans les cas graves, doses massives de 12 grammes d'extrait par jour, en une seule fois, délayées dans du lait ou du bouillon (*Gilbert*). En cas d'intolérance de l'estomac on recourra aux suppositoires : 1 à 4 par jour à prendre une heure avant les repas, en demeurant allongé jusqu'au repas.

Indications thérapeutiques. — Tous les cas d'insuffisance hépatique : Cirrhoses, Hémorragies et Hémoptysies des tuberculeux, Tuberculose au début, Ictère grave, Diabète, Héméralopie.

Prix réglementés :

6 fr. le flacon de Sphérulines.
18 fr. la boîte de 12 doses d'Extrait.
10 fr. la 1/2 boîte 6 — —
8 fr. la boîte de Suppositoires.

A. de MONTCOURT

49, avenue Victor-Hugo, 49
à BOULOGNE (Seine)

**SPHÉRULINES
OVARIENNES MONCOUR**

(Opothérapie)

Sphérulines dosées à 0,20 cgr. de poudre ovarienne par unité.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 Sphérulines par jour; débiter par 1 par jour à prendre avant le repas de midi.

Indications thérapeutiques. — Ménopause, Castration à la suite d'opérations chirurgicales, Arrêt de développement et insuffisance des ovaires, Chlorose, Neurasthénie féminine. La médication ovarienne doit être suivie longtemps; elle est facilement supportée et n'amène pas d'intolérance. Il est bon, pour éviter l'accoutumance, d'observer des périodes de repos pendant la durée du traitement et de faire varier les doses.

Contre-indication. — Grossesse.

Prix réglementé : le flacon, 6 francs

A. de MONTCOURT

49, avenue Victor-Hugo, 49
à BOULOGNE (Seine)

**SPHÉRULINES
PANCRÉATIQUES MONCOUR**

(Opothérapie)

Sphérulines dosées à 0,20 cgr. d'Extrait par unité.*Suppositoires* dosés à 1 gramme d'Extrait par unité.**Dose et mode d'emploi.** — 3 à 6 Sphérulines par jour à la fin des repas; 1 à 2 suppositoires par jour.**Propriétés thérapeutiques.** — Augmente l'activité du pancréas et lutte contre l'insuffisance fonctionnelle de cet organe.**Indications.** — Toutes les fois que le Pancréas fonctionne insuffisamment ou s'il faut agir sur le foie en hyperfonction, ainsi que le recommande le professeur Gilbert, dans le cas de Diabète par hyperhépatie.

Prix réglementé : le flacon, 4 francs

A. de MONTCOURT49, avenue Victor-Hugo, 49
à BOULOGNE (Seine)

S

SPHÉRULINES RÉNALES MONCOUR

(Opothérapie)

Sphérulines dosées à 0,15 cgr. d'Extrait par unité.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 16 Sphérulines par jour avant les repas. En cas de traitement prolongé observer un repos de 4 ou 5 jours tous les 10 jours.

Propriétés thérapeutiques. — L'extrait rénal augmente la sécrétion de l'urine, l'excrétion des sels urinaires, des produits de désassimilation et des toxines.

Indications. — Néphrites interstitielles parenchymateuses, diffuses; albuminurie; urémie par imperméabilité rénale.

Prix réglementé : le flacon, 6 francs

A. de MONTCOURT

49, avenue Victor-Hugo, 49

à BOULOGNE (Seine)

STÉRILISÉS
SPHERULINES**THYROIDIENNES MONCOUR**

Poudre spéciale de corps thyroïde

Sphérulines dosées à 0,35 cgr. de corps frais par unité.

Bonbons dosés à 0,05 cgr. de corps frais par unité.

Doses et mode d'emploi. — 1^o *Adultes*, débiter par 1 Sphéruline par jour et augmenter progressivement sans dépasser 6; 2^o *Enfants*, débiter par 1 Bonbon pour arriver à 4 après 5 à 6 jours. Continuer le traitement pendant 2 à 3 semaines, le suspendre 15 jours et le reprendre ensuite.

Indications. — Myxœdème opératoire, idiotie myxœdémateuse et crétinisme, nanisme, infantilisme, enfants arriérés, obésité, tétanie, sclérodémie, goître exophtalmique, chlorose, psoriasis.

Prix réglementés :

Le flacon de Sphérulines, 6 francs
-- de Bonbons 4 --

A. de MONTCOURT

49, avenue Victor-Hugo, 49
à BOULOGNE (Seine)

S

SPLÉNINE BYLA

(Glande splénique)

Capsules opothérapiques à enrobage néo-résineux, solubles seulement dans le suc intestinal (à 0,15 cgr.).

Dose moyenne. — 5 à 10 capsules dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — Impaludisme, Anémie toxique et Rachitisme.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

A. de MONTGOURT

49, avenue Victor-Hugo, 49

à BOULOGNE (Seine)

STÉRILISATEURS HÉLIOS

Application de la Méthode des Formolateurs Hélios à la stérilisation des Instruments et Objets de Pansement et de Chirurgie.

Examinés et admis après expériences et avis conforme du Comité d'Hygiène publique. Certificats 49, 63 à 65.

Aucun danger d'incendie ni d'explosion. Pas de détériorations, l'aldéhyde formique n'attaquant pas les métaux et ne durcissant pas les caoutchoucs ni ses dérivés.

Prix : depuis 37 francs

27, rue des Petits-Hôtels, PARIS

STOVAINE(Chlorhydrate
de Diméthylaminobenzoylpentanol)Le moins toxique des Anesthésiques locaux
à pouvoir anesthésique égal.*Quelques formules d'emploi de la Stovaine :***CACHETS***Contre les douleurs de l'ulcère gastrique*

Stovaine	0 gr. 02
Sous nitrate de bismuth.....	0 gr. 50
Carbonate de chaux.....	0 gr. 15

(Pour 4 cachet), 4 le matin et 2 le soir avant dîner. (CANEPART).

GARGARISME

Stovaine.....	1 gr.
Chlorate de potasse.....	5 gr.
Sirap de mûres.....	50 gr.
Eau bouillie.....	200 gr.

POMMADE*Contre les Hémorroïdes, les Fissures anales*

Stovaine.....	0 gr. 25
Adrénaline 1 0.00.....	III gouttes
Lanoline-Vaseline.....	aa 5 gr.

(HUCHARD).

PAQUETS*contre la Gastralgie*

Stovaine.....	0 gr. 02
Magnésie hydratée.....	0 gr. 60
Craie préparée.....	0 gr. 40
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 40

(Pour 4 paquet). En prendre 1 après chaque repas. (HUCHARD).

BAUME*Pour les Gergures du Sein*

Stovaine.....	0 gr. 40
Acide borique.....	0 gr. 20
Sous-gallate de bismuth.....	3 gr.
Baume du Pérou.....	II gouttes
Lanoline-Vaseline.....	aa 10 gr.

SUPPOSITOIRES*Contre les Hémorroïdes*

Stovaine.....	0 gr. 02
Extrait de Belladone.....	0 gr. 63
Beurre de cacao.....	Q. S.

*Pour un suppositoire***Les Etablissements POULENC Frères**

92, rue Vieille-du-Temple, PARIS

STRONAL

Lactate de Strontiane chimiquement pur et arrhénil

Indications. — Albuminurie (sans régime). Toutes maladies ayant pour cause le ralentissement de la nutrition : Diabète, Dilatation d'estomac, Entérites chroniques, Dysenterie, Anémie, Dysménorrhée anémique.

Dose (Comprimés). — Albuminurie, trois par jour. Augmenter de un tous les trois jours jusqu'à six. Pour les autres affections, trois à quatre par jour pendant 15 jours.

G. MONNIER

Pharmacien de 1^{re} Classe

10, rue de la Pépinière, PARIS

STYPTICINE-MERCK

Chlorhydrate de Cotarnine, dérivé de la Narcotine, de composition très voisine de celle de l'Hydrastinine.

Caractères. — Poudre amorphe, jaunâtre, facilement soluble dans l'eau (solutions stérilisables).

Propriétés thérapeutiques. — Hémostatique général et local, sédatif utérin, antiseptique, antiphlogistique. *Toxicité absolument nulle.*

Indications. — Toutes les Hémorragies de l'appareil utéro-ovarien, Symptômes douloureux des affections utéro-ovariennes, Hémorragies locales (rhino-laryngologie, odontologie, etc.), Hémophilie, Hémoptysies.

Dose et mode d'emploi. — Par jour, 0 gr. 25 à 0 gr. 40 et plus, à l'intérieur, de préférence en tablettes (commencer par 0 gr. 15 à 0 gr. 20 quelques jours avant les époques menstruelles).

Tablettes de Stypticine-Merck, dosées à 0 gr. 05. — Prix : 2 fr. 50

Stypticine-Merck, en flacons d'origine de 1,5 et 10 gr.

Pharmacie du Dr BOUSQUET

Licencié ès-sciences
140, faubourg Saint-Honoré, PARIS

SUBLAMINE SCHERING

(Nouveau composé de mercure)

Disques de 1 gr. teintés en rouge.

Propriétés thérapeutiques. — Remplace le sublimé corrosif dans tous ses emplois. Ni corrosive, ni irritante.

Indications. — En *Gynécologie*, pour les lavages du Vagin;
En *Urologie*, pour les lavages de la Vessie et de l'Urètre;
En *Ophthalmologie*;
En *Odontologie*;
En *Otologie*;
Pour le traitement de la *Syphilis*, en injections intra-musculaires;
Pour la *Stérilisation* des fils à sutures;
Comme moyen de *fixation* de préparations histologiques.

Pharmacie RATIONNELLE

4, faubourg Poissonnière, PARIS

S

SULFOLÉINE ROZET

Extrait du Sulfolitholate
d'ammonium
 $C^{50}H^{36}S^6 (AzH^4)^4 O^{12}$

Dose et mode d'emploi. — Jusqu'à 3 mois, 2 cuillerées à café par jour; de 3 mois à 3 ans, 2 à 4 cuillerées à café par jour; de 3 à 15 ans, 2 à 4 cuillerées à dessert; de 15 ans et au-dessus, 2 à 3 cuillerées à soupe, de préférence avant les repas, après une quinte, pure ou dans tel liquide qui plaira au malade : lait, tisane, etc., etc...

Propriétés. — Spécifique de la Coqueluche. (La *Sulfoléine Rozet* est la seule préparation préconisée contre la Coqueluche qui soit annoncée exclusivement aux médecins).

Prix réglementé : le flacon, 4 fr. 50
Pour MM. les Médecins : 3 fr. 50 franco

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel, PARIS

Flacon 10 gr. — Prix 4 fr. 50

Stypticine-Marché, en flacons
de 1,5 et 10 gr.

Pharmacie du Dr BOUSQUET

Laboratoire de chimie

100, Boulevard Sébastien, PARIS

SULFOQUINOLINE SAUTER

Tablettes d'Orthooxyquinolinsulfate

Desinfectant remplaçant le sublimé, l'oxycyanure de mercure, l'acide phénique, l'iodoforme, etc...

Non toxique, innocuité parfaite. Action microbicide supérieure à celle de l'acide phénique et à celle du sublimé.

Mode d'emploi. — En solution, 1 pastille par litre d'eau pour lavages des plaies, ulcérations, gargarismes, collutoires, dentifrices, etc... Les lavages à la Sulfoquinoline guérissent et empêchent l'excoriation des petits enfants, la croûte de lait, etc...

S'emploie à l'intérieur sous forme de pilules kératinisées contre les maladies infectieuses des intestins.

Prix suivant dose : 1 fr., 1 fr. 50, 2 fr.

Laboratoires SAUTER

49, rue de Paradis, PARIS

GENÈVE, Bellegarde (Ain)

S

SUPPOSITOIRES D'EUPROCTOL

Antihémorroïdaux Sauter

Aux iodo-résorcinosulfonate de bismuth (Euproctol), Oxyde de zinc, Baume du Pérou, Beurre de Cacao.

Mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir avant de se coucher. Au besoin on peut également en employer un le matin mais en restant couché au moins une demi-heure après l'application. Si le pourtour de l'anus est affecté, enduire cette partie avec un morceau de suppositoire écrasé entre les doigts.

Propriétés thérapeutiques. — Désinfectants et émoullients. Guérissent rapidement les irritations et inflammations des muqueuses de l'intestin tout en agissant comme astringents sur les dilatations de celui-ci qu'ils ramènent à l'état normal. Facilitent les selles.

Indications. — Toutes Hémorroïdes tant fluentes que sèches et suppurantes.

Prix : la boîte de 12, 3 francs

Laboratoires SAUTER
49, rue de Paradis, PARIS
GENÈVE, Bellegarde (Ain)

SUPPOSITOIRES MIDY

(Adrénostyptiques)

Adrénaline 1/4 mgr.
Anesthésine-stovainée 0,06 mgr.
Excipient antihémorroïdaire Q. S.
(Tannin, Hamamelis, Opium).
pour un suppositoire

Dose et mode d'emploi. — Introduire un ou deux suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin une heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes, soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnants, astringents, anesthésiques, calmants, antiseptiques.

Indications. — Traitement rationnel des Hémorroïdes.

La même formule existe sous forme de

POMMADE ADRENO-STYPTIQUE MIDY
contenue dans un tube d'étain, sur lequel s'adapte une petite canule en ébonite.

Prix réglementé : la boîte, 4 francs

Pharmacie MIDY

140, faubourg Saint-Honoré, PARIS (VIII^e)

SUPRARÉNINE
SYNTHÉTIQUE " CREIL "

Ortho dioxyphényléthanolméthylamine
gauche

Adrénaline chimiquement pure
obtenue par synthèse chimique

Comprimés dosés à 1 milligramme.

Solutions aqueuse et huileuse au 1/1000
en ampoules et en flacons.

Solutions et Comprimés de Novocaïne-
Suprarénine " Creil " pour Anesthésies
locales, régionales et lombaires.

Solutions aqueuse et huileuse de Novo-
caïne-Suprarénine " Creil " très effi-
caces surtout dans le Rhume des foins
et le Coryza.

Propriétés thérapeutiques. — Vaso-con-
stricteur, ischémique, hémostatique,
toni-cardiaque, renforçant la systole du
cœur.

Indications. -- Anémie des champs opé-
ratoires, pour renforcer et localiser
l'action des anesthésiques, pour amé-
ner, par badigeonnage, un afflux réac-
tionnel de sang dans les régions mala-
des. Le plus puissant des hémostatiques
externes par badigeonnage, et internes
par ingestions et injections sous-cuta-
nées, intra-veineuses et intra-arté-
rielles.

Produits pharmaceutiques spéciaux
" CREIL " de la Compagnie Parisienne
de Couleurs d'Aniline.

9, rue du Faubourg Poissonnière
PARIS (IX^e)

Pharmacien : Laboratoire E. DUPUTEL
à CREIL (Oise)

SURRÉNALINE BOUTY

Dragées dosées à 0,10 cgr. de Capsule surrénale desséchée correspondant à 0,80 cgr. de Capsules surrénales.

Ampoules de 1 cm³ et de 3 cm³.

Dose et mode d'emploi. — 1 dragée avant chacun des deux principaux repas ou une injection d'un cm³ par jour.

Indications thérapeutiques. — Maladies de Basedow et d'Addison.

Prix réglementé :

10 fr. la boîte de 50 dragées

6 fr. la boîte de 6 ampoules 1 cm³

Aux Médecins, escompte 50 %

Laboratoires BOUTY

3^{bis}, rue de Dunkerque, PARIS

Pharmacie PERRAUDIN

30, rue Legendre, PARIS (XVII^e)

S

SURRÉNINE BYLA

Glande surrénale

Capsules opothérapiques à enrobage
néo-résineux soluble seulement
dans le suc intestinal (à 0,10 cgr.).

Dose moyenne. — 9 capsules dans
les 24 heures.

Indications thérapeutiques. — In-
suffisance rénale, Néphrites aiguës
ou chroniques, Accidents de l'uré-
mie et de l'albuminurie.

Prix réglementé : 3 fr. 50 le flacon

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

**TABLETTES OXYMENTHOL
PERRAUDIN**

A base d'oxygène naissant, menthol,
coca-stovaine, benzoate de soude,
etc...

Tablettes de goût agréable.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes*,
10 à 15 par jour à sucer ; *Enfants*,
6 à 10 par jour à sucer.

Propriétés thérapeutiques. — Anes-
thésiques, antiseptiques, pecto-
rales.

Indications. — Affections des voies
respiratoires et de la gorge, Toux,
Gripes, Pharyngites, Laryngites,
Bronchites, Asthme, Emphysème,
Tuberculose, hygiène de la bouche
et des dents.

Prix réglementé : 1 fr. 75 la boîte

Pharmacie PERRAUDIN

70, rue Legendre, PARIS (XVII^e)

JOHN TÆNIFUGE KIRN TABLET
en capsules

Tænifuge le plus actif, ne présentant pas les dangereux inconvénients des *tænicides*, comme la pelletièreine. A base de filicine, principe actif récemment isolé de la fougère mâle, dissous dans son huile grasse. (Travaux et thèse de Kirn et Schmidt).

Capsules Kirn. — Capsules à l'extrait vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la filicine, est toujours stable et uniforme; sans calomel.

Mode d'emploi. — 1° Avant-veille, purgation; 2° La veille, diète presque absolue (lait); 3° Le matin à jeun l'absorption de 5 en 5 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement suivies).

Enfants. — Capsulines Kirn, spécialement dosées.

Médication

sans similaires ni équivalents

Capsules Kirn, prix: 10 fr., réglementé

Capsulines Kirn

Prix: 6 francs, réglementé

Laboratoires de Biologie, A. DANIEL-BRUNET
5, rue du Docteur-Blanche, PARIS

ANTÆNIFUGE RADICAL

A l'extrait étheré de fougère mâle fraîchement préparé par des moyens spéciaux et au trichlorméthane térébéné.

Forme. — Flacon de 24 capsules renfermant chacune 25 cgr. d'extrait étheré de fougère mâle et 25 cgr. de trichlorméthane térébéné.

Dose. — 8 à 12 ans : 4 capsules, 2 le matin et 2 le soir; 12 à 16 ans : 6 capsules en 2 fois; pour grandes personnes bien portantes : 16 à 20 capsules en 2 fois; dans des cas exceptionnels : 24 capsules en 2 fois, toujours suivant avis du médecin. Avant l'ingestion, manger très peu pendant 24 heures et de préférence des aliments acides.

Prix : le flacon de 24 capsules, 4 fr.

Laboratoires SAUTER

49, rue de Paradis, PARIS

GENÈVE, Bellegarde (Ain)

qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine.

Prix réglementé :

4 fr. la boîte de 24 Capsules " Rocks "

F. SOFFMANN-LA ROCHE & C^e

21, place des Vosges, 21 - PARIS

T**TAMAR INDIEN GRILLON**

Bonbon chocolaté, très agréable
à prendre

Propriétés. — Laxatif entièrement
végétal, n'irrite jamais l'intestin et
l'emploi journalier n'en diminue
pas l'efficacité.

Indications. — Constipation, Embar-
ras gastrique et intestinal.

Dose et mode d'emploi. — Un bonbon
ou un demi-bonbon suivant le tem-
pérament; se prend sans rien
changer à ses habitudes.

TAMAR INDIEN GRILLON

13, rue Pavée, 13 — PARIS

Médication

sans similaires ni équivalents

Capsules Eira, prix 10 fr., réglementé

Capsules Eira

Prix 4 fr. 50, réglementé

Léonard & Régis A. DANIEL-SQUAYE

13, rue du Docteur-Blanche, PARIS

TAMPOL " ROCHE "

Pansement gynécologique idéal

Le TAMPOL " ROCHE " est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique non absorbante, contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet.

Mode d'emploi. — Plonger pendant six secondes environ le TAMPOL " ROCHE " dans l'eau bouillie à peine tiède, puis la malade ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement, jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal est parfait.*

N.-B. — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du TAMPOL " ROCHE " d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine.

Prix réglementé :

6 fr. la boîte de 6 Tampol " Roche "

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o
21, place des Vosges, 21 — PARIS

T

TANNISMUT HEYDEN

Bitannate de bismuth

Comprimés dosés à 0,50 cgr.
et poudre

Doses et mode d'emploi. -- En une fois. -- *Enfants* : 0 gr. 1 à 0 gr. 3. -- *Adultes* : 0 gr. 3 à 0 gr. 6. Dose journalière, jusqu'au sextuple de la dose unique.

Propriétés thérapeutiques. -- Astringent intestinal.

Indications. -- Diarrhées aiguës et chroniques chez les enfants et les adultes.

1 flacon *Tannismut Heyden* : 1 franc

1 tube 20 comprimés

Tannismut Heyden : 1 fr. 25

Produits HEYDEN

29 et 31, rue Philippe-de-Girard
PARIS (X^e)

TANNOFORME-MERCK

Produit de condensation
du gallotannin et de la formaldéhyde

Caractères. — Poudre légère, blanc rougeâtre, presque insipide, inodore, insoluble dans l'eau froide, soluble dans l'alcool ou un mélange d'alcool et d'éther (jusqu'à 10 %).

Propriétés thérapeutiques. — Astringent, antidiarrhéique (ne se dédouble que dans l'intestin), antiseptique, cicatrisant, anhydrotique.

Indications. — A l'intérieur : Entérites aiguës et chroniques; à l'extérieur : Plaies simples ou suppurées, Intertrigo, Hyperidrose.

Doses et mode d'emploi. — Par jour, 3 ou 4 paquets de 0 gr. 15 à 0 gr. 75 (enfants, suivant l'âge); de 1 gr. à 1 gr. 50 (adultes); en poudre, pur ou mêlé à du talc (1 pour 5 ou 10), pour saupoudrer; en pommades à 10 %. — Mêmes emplois, à doses appropriées, en médecine vétérinaire (voir notice spéciale).

Tannoforme-Merck

en boîtes d'origine de 25 et de 100 gr.

Pharmacie du Docteur BOUSQUET

Licencié ès-Sciences

140, faubourg Saint-Honoré, PARIS

T

THAOLAXINE

(Laxatif-régime)

Combinaison d'agar-agar et d'extrait de rhamnées. Paillettes, cachets, comprimés, granulé.

Doses et mode d'emploi. — Paillettes, 1 à 4 cuillerées à café à chaque repas; cachets, 1 à 4 cachets à chaque repas; comprimés, 2 à 8 comprimés à chaque repas; granulé, 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas. (Spécialement préparé pour les enfants).

Propriétés thérapeutiques. — Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

Indications. — Spécifique de la constipation habituelle.

Prix : 3 fr. 50 la boîte, sous n'importe quelle forme

Laboratoire DURET & RABY
MARLY-LE-ROI (Seine-et-Oise)

THIGÉNOI " ROCHE "

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, analgésique, kératoplastique, décongestionnant et puissamment résolutif.

Indications. — Dermatologie, Otorhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc., etc...

ThigénoI " Roche " pur ou en solution glycéricée (10 à 75 %) en applications externes :

Savon " Roche " au ThigénoI, le meilleur savon antiseptique

Toutes les affections gynécologiques :

ThigénoI " Roche " pur ou en solution glycéricée (10 à 75 %)

Ovules " Roche " au ThigénoI à 3 % (voir fiche spéciale)

Tampol " Roche " pansement gynécologique idéal (voir fiche spéciale)

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co

21, place des Vosges, PARIS

THIOL " ROCHE "

Dérivé du Gaïacol, inodore, ni toxique
ni caustique, soluble dans l'eau
1 gr. de THIOL " ROCHE " = 0 gr. 52
de Gaïacol cristallisé

Doses et mode d'emploi. — *Enfants*,
0 gr. 50 à 2 gr. selon l'âge; *Adultes*,
jusqu'à 6 gr. par jour.

Propriétés thérapeutiques. — An-
tiseptique, Phagocytogène, Eupep-
tique, Orexique.

Indications thérapeutiques. — Tou-
tes les Affections Broncho-pulmo-
naires, Tuberculose, Bronchites
aiguës et chroniques, Grippe,
Pneumonie, Coqueluche, Scrofule,
Anémie, Rachitisme, Dyspepsies,
Entérites, Diarrhées, etc...

Sirop " Roche " au Thiol, 2 à 4 cuil-
lerées par jour et plus. Prix : 4 fr.
1 cuillerée à soupe de Sirop " Roche "
= 1 gr. de Thiol " Roche ".

Comprimés de Thiol " Roche ", 2 à
8 par jour et plus. Prix : 2 francs.
1 comprimé de Thiol " Roche "
= 0 gr. 50 de Thiol " Roche ".

F. HOFFMANN-LA ROCHE & C^o
21, place des Vosges, PARIS (IV^e)

THYRATOXINE BYLA

Thyroïdine non toxique sans action
sur le cœur

Comprimés dosés à 0.025 de substance
active.

1 comprimé = 12 cgr. 5 de glande fraîche.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* :
Commencer par une pastille par jour,
augmenter d'une unité au bout de
4 jours, et ainsi de suite pour arriver
à 4 pastilles par jour le treizième jour;
continuer cette dose jusqu'au vingtième
ou trentième jour.

Enfants : 1/2 pastille ou une entière
par jour pendant 15 jours, on peut
augmenter ensuite d'une unité. Surveil-
ler et continuer le traitement pendant
fort longtemps.

Propriétés thérapeutiques. — Prépara-
tion thyroïdienne la plus riche en iode
qui existe, la plus pauvre en toxines :
choline, méthylamines, alcaloïdes toxi-
ques, leucomaines, etc. Sans para-
thyroïdes externes.

Indications. — Traitement rationnel et
inoffensif de l'obésité et de tous les
états thyroïdiens.

Prix réglementé :

Le flacon de 80 pastilles, 8 francs

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

T

THYROIDINE BOUTY

Glandothyridine

Dragées dosées à 0,10 cgr. de glande desséchée correspondant à 0,70 cgr. de glandes fraîches.

Ampoules de 1 cm³ et de 3 cm³.

Doses et mode d'emploi. — 2 dragées le matin à jeun ou une injection d'un cm³ par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Modifie profondément les échanges nutritifs. Accroît l'élimination de l'azote et de l'urée par les urines.

Indications. — Obésité, Myxœdème, Goître, Psoriasis, Fibromes, etc.

Prix réglementé :

La boîte de 50 dragées, 10 francs

La boîte de 6 ampoules 1 cm³, 6 fr.

Escompte aux médecins : 50 %

Laboratoires BOUTY

3^{bis}, rue de Dunkerque, PARIS

THYROIDINE BYLA

Glande thyroïde

Capsules opothérapeutiques à enrobage
néo-résineux, solubles seulement
dans le suc intestinal (à 0,05 cgr.).

Dose moyenne. — 2 à 4 capsules
dans les 24 heures.

Indications thérapeutiques. —
Myxœdème et infantilisme, Obésité,
Arrêt de croissance, Fibromes.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA
à GENTILLY (Seine)

Laboratoires CHEVRETTIN-LEMAITRE
21, rue Lemaître, PARIS

T

TONIKÉINE CHEVRETIN

Sérum neuro-tonique

Ampoules contenant chacune : Eau de mer isotonique 5 cm³; Caco-dylate de soude 0,05 cgr.; Glycérophosphate de soude 0,20 cgr.; Sulfate de strychnine 1 mgr.

Propriétés thérapeutiques. -- Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer auxquelles s'ajoute l'action des 3 médicaments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

Indications. -- Tuberculose, Neurasthénie, Entérites. Les *déprimés* par surmenage intellectuel, les convalescents de maladies infectieuses (Grippe, Paludisme) sont justiciables de ce neuro-tonique.

Prix réglementé :

La boîte de 12 ampoules, 9 francs
6 ampoules, 5 francs

Laboratoires CHEVRETIN-LEMATTE
24, rue Caumartin, PARIS

TONI-LÉCITHINE ROGIER

Composition. — Lécithine pure, Extraits de quinquina (Succirubra et Calisaya), Oxalate ferreux, Quassine, etc...

Forme. — Dragées dosées à 0,05 cgr. de Lécithine pure.

Propriétés. — Stimulant, tonique, apéritif, reconstituant.

Indications. — Anémie, Chlorose, Surmenage intellectuel, Neurasthénie, Rachitisme, états consomptifs, etc...

Dose. — 2 à 6 dragées par jour.

Le flacon de 60 dragées, 5 francs (réglementé)

Henry ROGIER, Pharm. de 1^{re} Classe
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris
19, avenue de Villiers, PARIS

T**TRIBROMURE DE A. GIGON**

Sel contenant les bromures de potassium sodium et ammonium

Forme. — Poudre inaltérable, soluble instantanément, exempte de toute impureté et de bromates. Peut être ordonné à doses massives sans crainte de bromisme, d'accidents cutanés ou de troubles gastriques.

Propriétés. — Sédatif nervin puissant, antispasmodique, hypnotique. Effets thérapeutiques supérieurs à ceux des combinaisons organiques de brome dont les préparations sont instables et non définies.

Indications. — Remède spécifique de l'Épilepsie, Chorée, Eclampsie, Migraines, Spasmes de la glotte, Quintes de la Coqueluche, Asthme nerveux, Diabète, Insomnie, Vertiges, Palpitations, Nervosisme, Impressionnabilité, Douleurs des Coliques néphrétiques et hépatiques.

Dose et mode d'emploi. — Chaque flacon est accompagné d'une cuillère-mesure dosant 1 gr. de tribromure. Faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque, 2 à 4 gr. par jour comme sédatif et antispasmodique. Dans l'épilepsie, 4 à 8 gr. et plus, suivant l'avis du médecin.

A. GIGON et Dr André GIGON, pharm.
7, rue Coq-Héron, PARIS

TRICALCINE

à base de sels calciques rendus
assimilables

Doses et mode d'emploi. — *Une mesure à chacun des trois repas.* — Ajouter le contenu de la cuillère-mesure aux aliments, dans le cours du repas. Observer exactement cette dose pour les adultes. Pour les enfants au-dessous de 10 ans, 1/2 dose.

Propriétés thérapeutiques. — Recalcification de l'organisme.

Indications. — Tuberculose, Lymphatisme, Scrofulose, Rachitisme, Anémie, Dyspepsie nerveuse, Diabète, etc...

Le flacon, 4 fr. 50
(30 jours de traitement)
(Prix réglementé. — Ticket-prime de
0 fr. 90).

Laboratoire des Produits Scientia
42, rue Blanche, PARIS (IX^e)

T

TRIGÉMINE " CREIL "

Combinaison de Pyramidon et d'Hydrate de Butylchloral
Spécifique de la douleur

Capsules dosées à 0,25 cgr. (boîtes de 5 et 10 capsules).

Dose et mode d'emploi. — Névralgies légères, 0,25 cgr. ; aiguës, 0,50 cgr. ; faciales, sciatiques, etc., 0,75 cgr., tabétiques et chroniques, jusqu'à 1 gr. 50 dans un peu d'eau.

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique et sédative, pas d'accumulation ni d'accoutumance. — Somnifère.

Indications. — Toutes les Névralgies des nerfs crâniens surtout, Maux de dents, Névralgies intercostales, sciatiques, rhumatismales, pleurétiques, dysménorrhétiques et menstruelles, Douleurs post-opératoires.

Produits pharmaceutiques spéciaux
" CREIL " de la Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline.

9, rue du Faubourg Poissonnière
PARIS (IX^e)

Pharmacien : **Laboratoire E. DUPUTEL**
à CREIL (Oise)

TRINITRINE "VICARIO"

En petits comprimés d'une désagrégation rapide et complète, d'une assimilation certaine contenant 1, 2 et 3 gouttes de la solution alcoolique au centième.

Trinitrine Vicario. — N° 1 (à une goutte), le flacon, 3 francs; N° 2 (à deux gouttes), le flacon, 3 fr. 50; N° 3 (à trois gouttes), le flacon, 4 francs.

Dose. — De 2 à 6 gouttes par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament vaso-dilatateur et hypotenseur. Exerce sur le système nerveux une action analogue à celle du nitrite d'amyle, moins violente et plus durable.

Indications. — Aortite, Angine de poitrine, Presclérose, Artério-sclérose, Anémie cérébrale, Céphalalgies, Asthme, Maladie de Stokes-Adams, etc...

Pour éviter toute confusion, prescrire *Trinitrine "VICARIO"*.

Laboratoire VICARIO
17, boulevard Haussmann, PARIS

T

TRIXYL FRAUDIN

1 comprimé = 0,55 cgr.
Arshémonucléatine triphosphatée

Doses et mode d'emploi. — *Enfants*, 1/2 à 1 comprimé avant chaque repas. — *Adultes*, 2 à 3 comprimés avant chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Neurotrophique, hématogène. Reminéralisateur *immédiatement actif*.

Indications thérapeutiques. — Dans tous les cas où l'organisme est en état d'infériorité : Anémies et Asthénies de toute nature, Chlorose, Prétuberculose, Tuberculose, Rachitisme, Convalescence de maladies infectieuses, Surmenage, Neurasthénie, Déchéances organiques, etc., etc...

Trixyl Fraudin, la boîte 60 comprimés, 4 fr. (spécialité réglementée)

Laboratoire du CHARBON FRAUDIN
BOULOGNE (près Paris)

TUBERCULINE " BÉRAECK "

pour le traitement de la
Tuberculose

Flacons de 10 cm³
Ampoules dosées pour une injection
Seringue spéciale permettant d'in-
jecter exactement 1/20^e de cm³.

L. LECOQ, Pharmacien de 1^{re} Classe
ancien Interne
Médaille d'or des Hôpitaux de Paris
15, avenue Perrichont, PARIS (XVI^e)

TUBERCULINE C. L.

pour le traitement de la Tuberculose

La *Tuberculine C. L.* est présentée en solutions dans l'eau physiologique stérilisée. Ces solutions sont distribuées en ampoules réparties de la façon suivante :

Boîte O. — Ampoules contenant par cm^3 de 1 cent-millième à 7 dix-millièmes et demi de milligramme.

Boîte A. — Ampoules contenant par cm^3 de 1 millième à 8 dixièmes de milligramme.

Boîte B. — Ampoules contenant par cm^3 1 milligramme.

Dose. — Habituellement, une injection tous les 12 jours.

Les injections ne produisent aucune douleur ni aucune gêne et le malade peut vaquer aux occupations permises par son médecin.

Dépôt général

Renseignements et Echantillons :

Etablissements POULENC Frères
92, rue Vieille-du-Temple, PARIS

ULMARÈNE

U

Mélange d'éther salicylique d'alcools à poids moléculaires élevés contenant 75 % d'acide salicylique.

Forme. — Liquide lourd, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, le chloroforme et les huiles en toutes proportions. Produit français, d'odeur faible, non désagréable, non toxique et non irritant. En flacons de 30, 60 et 125 gr.

Autres formes. — Baume du Dr Gigon à l'*Ulmarene*; Liniment *Ulmamol* du Dr Gigon.

Indications. — Traitement local du Rhumatisme sous toutes ses formes. Rhumatisme articulaire aigu, subaigu, chronique, déformant; Arthrite sèche, Névralgies, Torticolis, Lumbago, Zona, Migraines.

Dose et mode d'emploi. — S'emploie en badigeonnages à la dose de 3 à 20 gr. par jour. Recouvrir de ouate et de taffetas gommé. Peut être associé à une pommade, à un liniment, etc...

A. GIGON & Dr André GIGON

Pharmaciens

7, rue Coq-Héron, PARIS

U**URASEPTINE ROGIER**

A base de Pipérazine, d'Urotropine, d'Helmitol, de Benzoates de soude et de Lithine.

Granulé soluble dosé à 0 gr. 60 de substance active par cuillerée à café.

Dose. — 3 à 6 cuillerées à café par jour, deux heures au moins avant ou après les repas.

Propriétés. — Antiseptique urinaire par excellence. Diathèse urique. Arthritisme.

Le flacon, 5 francs

Henry ROGIER, Pharm. de 1^{re} Classe
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris
3 et 5, boul. de Courcelles,
PARIS (VIII^e)

Téléphone 533.70

URISANINE

Solution de Benzoate d'hexaméthylène-tétramine en excipient à base végétale

Sel de constitution définie. Combinaison d'une molécule d'acide benzoïque pur du benjoin avec deux molécules d'hexaméthylène-tétramine (urotropine). L'excipient renferme en grande quantité le principe de plantes balsamiques, auquel a été incorporé l'extrait pur de stigmates de maïs. Une cuillerée à soupe d'Urisanine renferme 1 gramme de Benzoate d'urotropine et 0,20 egr. d'extrait de stigmates de maïs, dissous dans 14 grammes d'excipient végétal.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique complet des voies urinaires, balsamique et diurétique, dissolvant urique et phosphatique.

Indications. — Toutes les Affections des voies urinaires et rénales, Incontinence essentielle Diathèse urique, Maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe, etc.), Fermentations et putréfactions intestinales.

Doses et mode d'emploi. — Se prend pure ou diluée dans l'eau ordinaire ou gazeuse. *Adultes*, 2 à 4 cuillerées à soupe par jour; *Enfants*, par cuillerée à café ou à dessert, selon l'âge.

Prix réglementé : le flacon, 4 fr. 50

G. COUSSINET, Pharmacien
20, rue des Martyrs, PARIS

U**UROTROPINE SCHERING**

(Nom déposé)

Comprimés et Cachets dosés à 0 gr. 50 par unité.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 gr. par jour en plusieurs prises.

Propriétés thérapeutiques. — Le plus puissant antiseptique des voies urinaires. Diurétique.

Indications. — Phosphaturie, Fermentations ammoniacales, Dépôts uriques, Coliques néphrétiques, Bactériurie, Pyélite, Cystite aiguë et chronique, Voies biliaires.

Le flacon de 25 comprimés, 1 fr. 75
La boîte de 20 cachets, 3 francs

Pharmacie RATIONNELLE

4, faubourg Poissonnière, PARIS

VALÉRAL PUY

V

Bromovalérianate sodique, alcalin

Succédané plus actif des valériانات et des bromures. Tolérance absolue. Odeur et saveur agréables. Action fidèle et soutenue. Pas d'accoutumance.

1^o *Solution* concentrée non sucrée, dosée à 0 gr. 50 de Bromo-Valérianate sodique alcalin (Valéral) par cuillerée à café à prendre délayée dans un peu d'eau sucrée ou non.

2^o *Capsules* à enveloppe soluble de gluten, dosées à 0 gr. 25 de Valéral.

Doses et indications. — Névroses convulsives, spasmodiques, douloureuses, Insomnies, Crampes, Cauchemars : 1 à 2 cuillerées à café en se couchant; Spasmes, Douleurs, Coliques hépatiques ou néphrétiques : 1 à 2 cuillerées à café pendant l'accès; Névroses chroniques, Chorée : 3 cuillerées à café entre les repas.

Laboratoire J. PUY
à GRENOBLE

V

VALÉRIANE BYLA

(ÉNERGÉTÈNE DE)

36 gouttes = 1 gramme de la plante
fraîche

Suc pur inaltérable
de la plante fraîche

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 cuil-
lerées à café dans la soirée à pren-
dre dans un peu d'eau sucrée. Ré-
péter l'administration au moment
des crises.

Propriétés thérapeutiques. — Sé-
datif régulateur du système ner-
veux, non toxique, facile à admi-
nistrer, d'odeur agréable.

Indications. — Névroses, Hystérie,
Epilepsie, Insomnies nerveuses,
Névralgies, Neurasthénie, Mi-
graines, Troubles de la Méno-
pause, Convulsions des enfants,
Tics, Chorée, Palpitations, Tachy-
cardie, Diabète.

Prix réglementé : le flacon, 3 fr. 50

Les Etablissements BYLA

à GENTILLY (Seine)

VALÉRIANE

(Extrait fluide Dausse)

Extrait fluide à poids égal
de Valériane fraîche stabilisée

Propriétés pharmacologiques. — En raison de la stabilisation de la plante fraîche, l'extrait fluide préparé suivant ces conditions conserve l'activité médicamenteuse de la plante sans altération. Constance et égalité d'effet médicamenteux. Non toxique, sans odeur. Antispasmodique, sédatif du système nerveux.

Indications. — Excitation nerveuse, Insomnies nerveuses, Chorée, Névroses, Neurasthénie, Migraines, Névralgies, Dysménorrhée, Douleurs cataméniales, Troubles de la Ménopause, Palpitations, etc.

Posologie. — Dose moyenne, 2 à 3 cuillerées à café par jour. Dose maxima, 5 cuillerées à café par jour.

**Laboratoire pharmaceutique
DAUSSE Aîné**

4, rue Aubriot, PARIS

VALÉRIANE (Intrait de)

Extrait physiologique de Valériane
stabilisée

Propriétés thérapeutiques. — L'Intrait de Valériane, par suite de la stabilisation de la plante fraîche, conserve intacts les complexes existant dans la plante naturelle. L'Intrait de Valériane diffère de toutes les autres préparations de Valériane par ses effets constants et sûrs. De toxicité nulle, il est *dépourvu de toute odeur*. Antispasmodique, sédatif du système nerveux.

Indications. — Excitations nerveuses, Insomnies nerveuses, Chorée, Névroses, Neurasthénie, Migraines, Névralgies, Dysménorrhée, Douleurs cataméniales, Troubles de la Ménopause, Palpitations, etc...

Posologie. — Dose moyenne : 0 gr. 20 à 0 gr. 30 par jour. Dose maxima : 0 gr. 50 par jour.

Préparations d'Intrait de Valériane. — Pilules à 0 gr. 05, 4 à 6 pilules par jour. Dose maxima : 12 pilules.

Solution d'Intrait de Valériane. — Une cuillerée à café renferme 0 gr. 10 d'Intrait. Dose moyenne : 2 ou 3 cuillerées à café. Dose maxima : 6 cuillerées à café par jour.

**Laboratoire pharmaceutique
DAUSSE Aîné**

4, rue Aubriot, PARIS

GRAN VALÉRIANOSE JAV
DU Docteur GIGON

Capsules glutinisées contenant chacune 0,25 cgr. d'extrait de *Valériane fraîche stérilisée* et 0,05 cgr. de pepsine extractive. Cet extrait représente la *totalité* des principes actifs, *non modifiés* contenus dans la plante fraîche et doit être substitué aux Valérianates inactifs et d'odeur repoussante.

Propriétés. — Antispasmodique, analgésique, hypnotique, antinévralgique. Diminue l'excitabilité des centres nerveux et l'excitabilité médullaire.

Indications. — Névroses, Neurasthénie, Palpitations, Phobies, Flatulence, Polyurie nerveuse, Diabète, Enervement.

Dose. — 2 à 10 capsules par 24 heures.

Pepto-Valériane. — Extrait de Valériane fraîche stérilisée liquide, contenant 0,50 cgr. d'extrait de Valériane par cuillerée à café et 0,05 cgr. de pepsine extractive.

A. GIGON & Docteur André GIGON

Pharmaciens

7, rue Coq-Héron, PARIS

V**VALÉROBROMINE LEGRAND**

Liquide : Dosé à 0,50 cgr. de bromovalérianate de soude par cuillerée à café.

Capsules enrobées de gluten : Dosées à 0,25 cgr. de bromovalérianate de magnésie par capsule.

Propriétés. — Sédatif anti-nerveux. Exerce une action énergique sur les centres nerveux. Diminue et abolit leur excitabilité réflexe.

Indications. — Toutes les indications du brome avec plus d'activité et sans avoir les inconvénients.

Doses. — *Liquide* : 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau sucrée. *Capsules* : 4 à 12 capsules par jour.

DARRASSE Frères

13, rue Pavée, PARIS

VALS**Eaux Minérales Naturelles
de la Société
des Grandes Sources de Vals**

Le Groupe des " *Grandes Sources de Vals* " comporte 13 sources graduées, bicarbonatées sodiques, ferromagnésiennes, lithinées, très gazeuses.

Permettent la Cure à la station ou à domicile.

Les principales de ces sources sont les suivantes :

Croix-Rouge, Croix-Bleue, Saint-Jacques, Normale, Gallia, Mady, Sapho, Union

Les 2 premières sont vendues exclusivement par les pharmaciens.


Indications générales. - Maladies des enfants. Diarrhée infantile, Estomac, Gastralgie, Dyspepsie, Intestins, Vessie, Foie, Diabète, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Albuminurie, etc...

**Société des Grandes Sources
de VALS**

à VALS-LES-BAINS (Ardèche)

VALYL MIDY

A base de "Valyl Creil" ou Valériamide Diéthylé chimiquement pur.



Capsules dont chacune renferme 0,05 cgr. de Valyl.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 6 à 12 capsules par jour.

Enfants : 3 à 9 capsules par jour et plus dans les états nerveux graves. — Les prendre de préférence aux trois principaux repas.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique.

Indications. — Toutes celles des préparations de Valériane.

Prix réglementé : le flacon, 5 francs

Pharmacie MIDY

140, faubourg Saint-Honoré, PARIS

VARICURE MARCK
POMMADE VARICURE MARCK

Composition. — Purpuro-érythrate alcalin associé aux tannoïdes naturels (acide kramérique, etc.).

Formes. — Comprimés. — Pommade N° 1, Pommade N° 2 pour applications. Suppositoires.

Indications thérapeutiques. — Varices, Phlébites, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Varicocèles, Maladies des os, Troubles de la ménopause, Acné, Taches et dépôts sanguins sous-cutanés, Eczémas etc.

Mode d'emploi. — Comprimés : Croquer 6 comprimés par jour en trois fois avant les repas et prendre un demi-verre d'eau ou de tilleul ; suivre le traitement pendant trois jours, cesser 8 jours et reprendre. — Pommade N° 1. Varices, Phlébites, Taches. Pommade N° 2, Plaies et Ulcères variqueux, Affections de la peau. Suppositoires, Hémorroïdes.

Les pommades 1 ou 2 (suivant indications) et les suppositoires sont l'adjuvant indispensable du traitement interne par le décocté de *Varicure Marck*.

L'emploi de la pommade et des suppositoires doit être journalier.

G. MONNIER
Pharmacien de 1^{re} Classe
10, rue de la Pépinière, PARIS

VARILAXINE

Groupe cinq laxatifs différents mais
d'action équivalente

Chaque boîte renferme 5 Tubes,
numérotés de 1 à 5.

Le Tube n° 1 contient : 10 Comprimés
dosés à 0,40 de Rhubarbe active.

Le Tube n° 2 contient : 10 Comprimés
dosés à 0,40 de Cascara évacuant.

Le Tube n° 3 contient : 10 Comprimés
dosés à 0,03 de Podophyllin.

Le Tube n° 4 contient : 10 Comprimés
dosés à 0,28 d'Extrait sec de Rhamnus.

Le Tube n° 5 contient : 10 Comprimés
dosés à 0,33 d'Extrait de Tamarin.

L'Agar-Agar forme l'excipient de tous
les comprimés

Dose et Mode d'emploi. — Avaler, sans
les croquer, un ou deux Comprimés
avant le repas du soir en alternant du
n° 1 au n° 5, pour reprendre au n° 1 le
6^e jour, et continuer la variation.

Propriétés thérapeutiques. — Action
laxative toujours identique — Jamais
d'accoutumance ni d'irritation intesti-
nale — Tolérance parfaite — Innocuité
absolue. — Pas de constipation consé-
cutive.

Prix réglementé :

La boîte de 50 Comprimés, 4 francs

Laboratoire de la VARILAXINE

164, rue Saint-Honoré, PARIS

V
**VÉRITABLES GRAINS
DE SANTÉ DU D^r FRANCK**

Aloès et Gomme Gutte

Codex : Edit. 1866; Formule n° 603

Contre la Constipation, le Manque d'appétit, la Migraine, les Embarras gastriques, la Dyspepsie, les Vertiges, etc. -- Ils sont le préservatif des Attaques d'apoplexie.

Dose et mode d'emploi. -- Comme apéritifs et stomachiques : en prendre un au commencement du repas pendant plusieurs jours; comme dépuratifs, purgatifs et antiseptiques : suivant le tempérament en prendre 1, 2, 3 ou 4 à jeun ou *immédiatement avant de manger*, dans un peu d'eau ou dans la première cuillerée de potage.

Prix : la boîte, 3 fr. ; la 1/2 boîte, 1 fr. 50

T. LEROY

96, rue d'Amsterdam, PARIS (VIII^e)

Pharmacie de Véroval, rue de Véroval, Paris (VIII^e)
(Indépendamment de sonde)
même dosage
Pharmacie de Véroval, rue de Véroval, Paris (VIII^e)
Licence en Sciences
140, Faubourg Saint-Honoré, PARIS

VÉRONAL

Acide diéthylbarbiturique

Caractères. — Cristaux incolores, peu solubles dans l'eau froide, plus solubles à chaud.

Propriétés thérapeutiques. — Hypnotique parfait (sommeil et réveil normaux). Antispasmodique.

Indications. — Insomnie dans les maladies aiguës et chroniques, Vomissements incoercibles, Mal de mer, Affections mentales.

Dose et mode d'emploi. — Par jour : 0 gr. 25 à 1 gr. et plus en cachets ou, mieux, en tablettes, dans une boisson chaude.

Tablettes Merck de Véronal, dosées à 0 gr. 50 et divisibles par moitié

Prix : 3 fr. 50

Véronal, en boîtes d'origine Merck de 10 et de 25 gr.

Forme très soluble du Véronal (action plus rapide) :

Tablettes Merck de Véronal sodique (Diéthylbarbiturate de soude) même dosage.

Pharmacie du Dr BOUSQUET

Licencié ès-Sciences

140, faubourg Saint-Honoré, PARIS

VÉRONIDIA BUISSON

Solution de diéthylmalonylurée, dans un véhicule synergique et agréable au goût. Chaque cuillerée à soupe renferme 0 gr. 25 de principe actif.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif idéal de l'hyperexcitabilité nerveuse dans toutes ses manifestations : Névroses diverses, Palpitations, Phobies, Insomnies, etc.

Dose. — 2 cuillerées à café comme antispasmodique dans le courant de la journée. — 1 à 2 cuillerées à soupe comme hypnotique, le soir au coucher.

Prix : le flacon, 4 francs

Le 1/2 flacon, 2 fr. 25

Laboratoires Albert BUISSON

20, boulevard du Montparnasse,
PARIS

VIN GIRARD**de la Croix de Genève**Iodo-tannique phosphaté, succédané
de l'Huile de Foie de MorueLe *Vin Girard* renferme par verre à
madère :

Iode bi-sublimé.....	0,075
Tannin pur.....	0,50
Phosphate de chaux...	0,75

Doses et mode d'emploi. — 1 ou 2
verres à madère par jour pour une
grande personne, 1/2 dose pour
enfant.**Propriétés thérapeutiques.** — *Toni-
que et reconstituant, augmente la
phagocytose.***Indications.** — Lymphatisme, Scro-
fule, Tuberculose au 1^{er} degré,
Engorgements ganglionnaires, Con-
valescences.**SIROP GIRARD****Même composition.** — S'ordonne
plus spécialement aux très jeunes
enfants.**Mode d'emploi.** — 1 ou 2 cuillerées
à dessert ou à bouche par jour.

Prix : le flacon, 4 fr. (voir au sirop)

A. GIRARD

48, rue d'Alésia, PARIS

VIN ET SIROP DE MORIDE

Composition et Forme. — Vin de Muscat ou Sirop composé, iodo-tannique, contenant 1 gr. d'iode organique combiné par litre. Goût exquis, assimilation rapide, tolérance parfaite.

Dose thérapeutique. — *Vin* : 1 verre à Madère pour les adultes après chaque repas; 1 verre à liqueur pour les enfants. — *Sirop* : 1 cuillerée à bouche après chaque repas chez les adultes; 1 cuillerée à café chez les enfants.

Indications. — Remplacent l'huile de foie de morue. Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Débilité, Scrofule, Engorgement des glandes et ganglions, Adénite, Rachitisme, Affections des os et de la peau, Artériosclérose, Rhumatisme articulaire, Goître, etc., et toutes indications de l'iode et de l'huile de foie de morue.

Prix : Vin de Moride, 4 francs;
Sirop de Moride, 3 fr. 50

Pharmacie MORIDE

20, rue de La Rochefoucauld, PARIS

VIN ET SIROP NOURRY

Iode et tannin en combinaison stable

Applications thérapeutiques. — 1° *Lymphatisme* dans toutes ses manifestations osseuses, ganglionnaires, oculaires, etc.

2° *Voies respiratoires* : Asthme, Emphyseme, Bronchites chroniques.

3° *Gynécologie* : Formation des jeunes filles, Ménopause, Aménorrhée, Dysménorrhée.

4° *Convalescences* : Intoxications chroniques, Anorexies.

5° *Artériosclérose* : Athiromes, Anévrisme de l'aorte, Angine de poitrine.

6° *Affections thyroïdiennes.*

7° *Syphilis tertiaire.*

Formes. — Vin et sirop dosés à 0 gr. 05 d'iode et 0 gr. 10 de tannin par cuillerée à soupe de 15 gr. (0 gr. 015 par cuillère à café).

Prix : le flacon de 300 cm³, 3 fr. 50

Doses. — La dose moyenne à prescrire est : *Adultes*, une cuillerée à soupe; *Adolescents*, une cuillerée à dessert; *Enfants*, une cuillerée à café. Au moment des principaux repas.

Nota. — En raison de la réaction que le Vin Nourry peut avoir sur le métal de certaines cuillères, il est bon d'employer un verre à liqueur ordinaire préalablement gradué, une fois pour toutes avec des cuillerées d'eau.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

VIOFORME CIBA

Iodochloroxyquinoléine
contenant 41% d'Iode

Antiseptique, Cicatrisant, Désodorisant, dépourvu d'odeur et d'action irritante. — Stérilisable.

Formes spéciales :

Gaze au Vioforme à 5 et 10%.

Compressees au Vioforme.

Crayons urétraux à 5%.

Ovules vaginaux.

Applications en poudre, sous forme de pommade, de pâte, d'émulsion, de gaze à 5 et 10%, de crayons urétraux, d'ovules vaginaux, etc.

Tous ces Produits sont entièrement inodores

Société pour l'Industrie Chimique
à Saint-Fons (Rhône)

XÉROFORME HEYDEN

Tribromophénate de bismuth

Usage interne : En poudre; en pommade à 5 à 20 %; en suspension à 10 à 20 % dans l'huile d'olive (traitement de la cystite); en pâte à 50 %.

Usage externe. — Dose unique : *Enfants*, 0 gr. 1 à 0 gr. 3; *Adultes*, 0 gr. 3 à 0 gr. 5; Dose journalière : jusqu'au sextuple de la dose unique.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes celles de l'iodoforme. Inodore. Non toxique.

Indications. — Plaies de toutes natures, Brûlures, Eczéma humide, Intertrigo, Affections oculaires à fortes sécrétions, Cystite, Gastro-entérite, Ulcère stomacal, Typhus.

Le flacon poudrier, 1 franc

Produits HEYDEN

29 et 31, rue Philippe-de-Girard
PARIS (X^e)

**ANALGÉSIIQUES EXTERNES
ANESTHÉSIIQUES**

Adrénaline Byla.
Adrénaline Clin.
Baume Delacour.
Bétul-Ol Midy.
Cocaïne Midy.
Novocaïne Creil.
Rhésal Vicario.
Salène Ciba.
Salit Heyden.
Sinapisme Rigollot.
Stovaïne.
Suprarénine synthétique Creil.
Stypticine-Merck.
Ulmarène du D^r Gigon.
Ulmarène du D^r Gigon
(Produits à l').



**ANALGÉSIIQUES INTERNES
CALMANTS
ANTINÉVRALGIQUES**

Acide Acétosalicylique Heyden.
Ampoules de Pantopon Roche.
Antialgos Christiaens.
Antigrippine Midy.
Antodyne.
Aspirine Vicario.
Bibromure Vicario.
Bromiase Couturieux.
Bromogénol Pépin.
Bromure de Camphre Clin.
Bromures Souffron.
Cachets Cépé.
Cérébrine.
Cérébrine Byla.
Cétrarose du D^r Gigon.
Dionine Merck.
Dionine-Merck (Sirop et Tablettes du D^r Bousquet).
Heroïne Vicario.
Mélubrine.
Narcyl Grémy.
Neurenc.
Névraltène Rogier.
Pantopon Roche.
Pilules de Moussette.
Pyramidon Creil.
Sirops Henry Mure.
Solutions du D^r Clin.
Solutions Henry Mure.
Suppositoires Adréno-styptiques Midy.
Tribromure de A. Gigon.
Trigémine Creil.
Valéral Puy.
Valériane Byla.
Valériane (Extrait fluide Dausse).
Valériane (Intrait Dausse).
Valérianose du D^r Gigon.
Valérobromine Legrand.
Valyl-Midy.
Veronal.

ANÉMIE
**(SCROFULES-LYMPHATISME-
RACHITISME)**

Algarine Nyrthal.	Iodures Souffron.
Ampoules Churchill	Kineurine Moncour.
Indolores.	Lécithine Clin.
Bi-Iodures Souffron.	Lipochol Byla.
Biophorine Girard.	Lymphatine Byla.
Capsules de Morrhuine Puy.	Métharfer Bouty.
Comprimés de Thiocol Roche.	Métharsol Bouty.
Dragées de F. Gille.	Méthylarsinate Vicario.
Electromartiol	Morhuétine Juncken.
Elixir de Propeptonefer Byla.	Musculosine Byla.
Engeluröl.	Neobione Sauter.
Fer Rabuteau.	Nucléofer Girard.
Feroxal.	Panitrine Sauter.
Fortossan Ciba.	Pepto-Fer du D ^r Jaillot.
Glycérophosphate Robin.	Peptonate de Fer Robin.
Gouttes de Propeptonefer Byla.	Peptone Byla.
Hématol.	Phosferyl Fournier.
Hémoglobine Byla.	Phytine Ciba.
Hémostyl.	Sirop de F. Gille.
Hippoplasine Gran.	Sirop d'Hémoglobine Byla.
Hypophosphites Churchill.	Sirop Roche au Thiocol.
Iode (Moride Nyrthal).	Toni-Lécithine Rogier.
Iodéyl Fournier.	Tricalcine.
Iodogénol Pépin.	Vin Girard.
Iodurase Couturieux.	Vin et Sirop de Moride.
	Vin et Sirop Nourry.

ANTIPYRÉTIQUES

Acide Acétosalicylique Heyden.
Antigrippine Midy.
Aspirine Vicario,
Cachets Cépé.
Kineurine Moncour.
Néoquinine Falières.
Névraltène Rogier.
Pantopon Roche.
Phytinate de Quinine Ciba.
Pyramidon Creil.
Salit Heyden.

ANTISEPTIQUES EXTERNES DÉSINFECTANTS

Airol Roche.
Aldogène.
Aniodol.
Boricine Meissonnier.
Brûleur Guasco.
Formolateurs Hélios.
Glutol.
Lusoforme.
Lysol.
Néol.
Novargan Heyden.
Pastilles de Formaline Hélios.
Perhydrol-Merck.
Phénol Bobœuf.
Protéinate d'argent Heyden.
Savons antiseptiques de F. Vigier.
Stérilisateurs Hélios.
Sublamine Schering.
Sulfoquinoline Sauter.
Tannoforme-Merck.
Thigénol Roche.
Vioforme Ciba.
Xéroforme Heyden.

**ANTISEPTIQUES
INTERNES-ANTITOXIQUES**

Aniodol.
Collargol Heyden.
Electrargol.
Electrocuprol.
Electrosélénium.
Glycogène Clin.
Lycétol Vicario.
Peroxydine.
Pipérazine Midy.
Produits Midy au Collargol.
Tannismut Heyden.
Tannoforme-Merck.
Urseptine Rogier.
Urisanine.
Urotropine Schering.

ARTÉRIO-SCLÉROSE

Algarine Nyrdaahl.
Bi-Iodure Souffron.
Digitaline Cristallisée Nativelle.
Gui Byla.
Iode (Nyrdaahl, Moride).
Iodéyl Fournier.
Iodogénol Pépin.
Iodone Robin.
Iodostarine Roche.
Iodurase Couturieux.
Iodures Souffron.
Lipoiodine Ciba.
Santhéose.
Trinitrine Vicario.
Vin Girard.
Vin et Sirop de Moride.
Vin et Sirop Nourry.

**ARTHRITISME, GOUTTE
RHUMATISME, DIABÈTE, etc...**

Acide Acétosalicylique Heyden.
Antialgos Christiaens.
Aspirine Vicario.
Berul-Ol Midy.
Colchi-Sal Midy.
Colchique Byla.
Diabétifuge.
Exo-Hypophysine Byla.
Exo-Thyroidine Byla.
Glycogène Clin.
Hypophysine Byla.
Liquueur Anti-Arthritique.
Liquueur Laville.
Lycétol Vicario.
Mélubrine.
Oxydothyryne Paris.
Pipérazine Midy.
Pyramidon Creil.
Rhésal Vicario.
Ribes Nigrum Byla.
Saint-Galmier.
Salène Ciba.
Salit Heyden.
Santhéose.
Solurof.
Solutions du D' Clin.
Sphérulines Thyroïdiennes Moncour.
Stronal.
Surrénaline Bouty.
Surrénine Byla.
Thyratoxine Byla.
Thyroidine Bouty.
Thyroidine Byla.
Ulmarène du D' Gigon.
Ulmarène du D' Gigon (Produits à l').
Urseptine Rogier.
Vals

BRONCHES ET POUMONS

Æthone.
Alcarhène.
Antiasthme Bengalais.
Antigrippine Midy.
Aspirine Vicario.
Capsules Dartois.
Cigarettes Américaines Leroy.
Comprimés de Thiocol Roche.
Créosotal Heyden.
Dionine-Merck.
Dionine-Merck (Sirop et Tablettes du
D^r Bousquet).
Eaux-bonnes.
Elatine Bouin.
Elbon Ciba.
Emulsion Marchais.
Exo-Pulmine Byla.
Gaïarsol Bouty.
Gouttes Nican.
Héroïne Vicario.
Narcyl Grémy.
Pantopon Roche.
Pastilles de Mackensie.
Phosphotal Clin.
Poudre Américaine Leroy.
Régénérateur Bouyer.
Salit Heyden.
Sirop Roche au Thiocol.
Sulfoléine Rozet.
Thiocol Roche.
Trinitrine Vicario.

CŒUR

Ampoules de Digalène.
Digalène.
Digifoline Ciba.
Digitale Byla.
Digitale (Intrait Dausse).
Digitaline Cristallisée Nativelle.
Diurène.
Dragées Nyrdahl à l'Ibogaïne.
Genêt Byla.
Ibogaïne.
Kola Midy.
Muguet Byla.
Santhéose.
Trinitrine Vicario.

*(Voir aussi **Analgésiques Internes**
et Hypnotiques selon les cas).*

ESTOMAC

Amandol.
Antacidol.
Atural.
Cétrarose du D^r Gigon.
Citrosodine Grémy.
Elixir de Papaïne Byla.
Elixir de Pepsine Byla.
Exo-Gastrine Byla.
Gastérase Byla.
Gastérine Frémont.
Gastrosan Heyden.
Gastrozymase Bouty.
Pepsorthine.
Peptone Byla.
Pilules de Quassine Frémint.
Poudre Génia.
Pougues Saint-Léger.
Quina-Laroche.
Saint-Galmier.
Saturol.
Sauge Byla.
Sirop de Papaïne Byla.
Spéruines Gastriques Moncour.
Stronal.
Vals.

FOIE, PANCRÉAS, RATE

Biléyl Fournier.
Choléine Camus.
Cholèokinase.
Cholergine.
Citrosodine Grémy.
Eukénol.
Exo-Hépatine Byla.
Exo-Pancréatine Byla.
Extrait Biliaire Byla.
Glycogène Clin.
Hépatine Byla.
Hépatobyl.
Jécol.
Pancréatine Byla.
Pilules Anti-Hépatiques du D^r Debouzy.
Pilules de Quassine Frémint.
Sphérulines Cholagogues Moncour.
Sphérulines Hépatiques Moncour.
Sphérulines Pancréatiques Moncour.
Splénine Byla.

GYNÉCOLOGIE

Airol Roche.
Aniodol.
Cérébrine.
Elixir de Virginie Nyrdahl.
Exo-Ovarine Byla.
Flavéine Byla.
Novarine Vicario.
Ovarine Byla.
Ovigénine Bouty.
Ovules Roche au thigénol.
Oxydovarine Pâris.
Péricols.
Placentine Byla.
Sphérulines Ovariennes Moncour.
Stypticine Merck.
Tampol Roche.
Thigénol Roche.

HÉMOSTATIQUES

Adrénaline Byla.
Adrénaline Clin.
Elixir de Virginie Nyrdaahl.
Ergot de Seigle.
Gui Byla.
Hamameline Roya.
Hamamelis (Extrait fluide Dausse).
Hamamelis (Nyrdaahl).
Hydrastis.
Pengahawar Vicario.
Suprarénine Synthétique Creil.
Stypticine-Merck.

HYPNOTIQUES

Ampoules de Pantopon Roche.
Bibromure Vicario.
Bromiase Couturieux.
Bromogénol Pépin.
Bromure de Camphre Clin.
Bromures Souffron.
Cachet Cépé.
Dionine-Merck.
Héroïne Vicario.
Narcyl Grémy.
Neurène.
Pantopon Roche.
Sédol.
Sirop d'Aubergier.
Sirops Henry Mure.
Solutions Henry Mure.
Tribromure de A. Gigon.
Valéral Puy .
Valériane Byla.
Valériane (Extrait fluide Dausse).
Valériane (Intrait Dausse).
Valérianose du D^r Gigon.
Valérobromine Legrand.
Valyl Midy.
Véronal.

INTESTINS

Agaryl Fournier.
Biolactyl.
Carabaña.
Cascara Midy.
Comprimés de Châtel-Guyon-Miraton.
Enterokinase Byla.
Eulactine Millet.
Exo-Pancréatine Byla.
Fixine Grémy.
Globules Tœniafuges de Secrétan.
Hordénine Lauth.
Lactobacilline.
Lactochol.
Lactolaxine Fydau.
Lactozimase B.
Laxatol.
Marron d'Inde (Intrait Dausse).
Paralactine Byla.
Pastilles Miraton-Châtel-Guyon.
Péristaltine Ciba.
Rectoline.
Scorogène.
Sphérulines entériques Moncour.
Suppositoires Adréno-Styptiques Midy.
Suppositoires d'Euproctol.
Tœnifuge Kirn.
Tœnifuge radical.
Tamar Indien Grillon.
Tannismut Heyden.
Tannoforme-Merck.
Thaolaxine.
Thigénol Roche.
Vals.
Varilaxine.
Véritables Grains de Santé du D^r Franck.

NERFS

(HYSTÉRIE, ÉPILEPSIE, etc...)

Acide Acétosalicylique Heyden.
Ampoules de Pantopon Roche.
Antialgos Christiaens.
Aspirine Vicario.
Bibromure Vicario.
Bromiase Couturieux.
Bromogénol Pépin..
Bromone Robin.
Bromure de Camphre Clin.
Bromures Souffron.
Cérébrine.
Cérébrine Byla.
Dionine-Merck.
Héroïne Vicario.
Neurène.
Pantopon Roche.
Pyramidon Creil.
Sédol.
Sirop d'aubergier.
Sirops Henry Mure.
Solutions Henry Mure.
Tribromure de A. Gigon.
Trigémine Creil.
Valéral Puy.
Valériane Byla.
Valériane (extrait fluide Dausse).
Valériane (Intrait Dausse).
Valérianose du D^r Gigon.
Valérobromine Legrand.
Valyl Midy.
Véronal.
Véronidia Buisson.

**OPHTALMOLOGIE
OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
STOMATOLOGIE**

Adrénaline Byla.
Adrénaline Clin.
Aniodol.
Antiasthme Bengalais.
Aspirine Vicario.
Cigarettes Américaines Leroy.
Cocaïne Midy.
Dionine-Merck.
Néol.
Novargan Heyden.
Novocaïne Creil.
Pengahwar Vicario.
Poudre Américaine Leroy.
Suprarénine Synthétique Creil.
Tablettes d'Oxymenthol Perraudin.
Thigénol Roche.

OPOTHÉRAPIE

Choléine Camus.
Choléokinase.
Opothérapie Bouty.
Opothérapie Byla.
Opothérapie Fournier Frères.
Opothérapie Moncour.
Opothérapie Vigier.
Oxydothyridine Pâris.
Oxydovarine Pâris.
Pilules Anti-Hépatiques du D^r De-
bouzy.

PEAU, CUIR CHEVELU

Algarine Nyrdhal.
Baume Delacour.
Baume Duret.
Bi-Iodure Souffron.
Engelurool.
Iode (Moride, Nyrdahl).
Iodéyl Fournier.
Iodogénol Pépin.
Iodone Robin.
Iodostarine Roche.
Iodurase Couturieux.
Iodures Souffron.
Levurine Couturieux.
Lipoiodine Ciba.
Métharsol Bouty.
Méthylarsinate Vicario.
Ouataplasme Langlebert.
Sénophile.
Sparablanc Sauter.
Thigénol Roche.
Vin et Sirop de Moride.

RECONSTITUANTS STIMULANTS, TONIQUES

Algarine Nyrdaahl.
Ampoules Churchill
indolores.
Biocalcose Chevretin.
Biophorine Girard.
Capsules de Mor-
rhaine Puy.
Dragées de F. Gille.
Dragées Nyrdaahl à
l'Ibogaine.
Electromartiol.
Elixir de Propeptone-
fer Byla.
Exo-Orchitine Byla.
Feroxal.
Fer Rabuteau.
Fortossan Ciba.
Glycérophosphate Robin.
Gouttes de Propepto-
nefer Byla.
Hématol.
Hémoglobine Byla.
Hémostyl.
Hippoplasine Gran.
Hypophosphites Churchill.
Ibogaine.
Kineurine Moncour.
Kola Midy.
Kolayo.
Lécithine Clin.
Lipochol Byla.
Lymphatine Byla.
Médication Arrhéni-
que composée.
Médication Arrhéni-
que simple.
Métharfer Bouty.
Métharsol Bouty.
Méthylarsinate Vicario.
Morrhuetine Juncken.
Musculosine Byla.
Néobione Sauter.
Névroséthine Freyssinge.
Nucléarsitol Robin.
Nucléatol Robin.
Nucléofer Girard.
Orchitine Byla.
Ostéohepatine.
Ovo-Lécithine Billon.
Panutrine Sauter.
Pepto-Fer Jaillot.
Peptone Byla.
Peroxydine.
Phosféryl Fournier.
Phytine Ciba.
Pougues.
Quina-Laroche.
Séguardine Bouty.
Sirop de F. Gille.
Sirop d'Hémoglobine
Byla.
Toni-Lécithine Rogier.
Tonikéine Chevretin.
Tricalcine.
Trixyl Fraudin.
Vin Girard.
Vin et Sirop de Moride.
Vin et Sirop Nourry

SYPHILIS

Algarine Nyrdahl.
Arsénobenzol Billon.
Bi-iodure de Mercure Midy.
Bi-iodure Souffron.
Curgol Vicario.
Elixir Déret.
Enésol.
Huile grise stérilisée F. Vigier.
Iode (Moride, Nyrdahl).
Iodéyl Fournier.
Iodogénol Pépin.
Iodone Robin.
Iodostarine Roche.
Iodurase Couturieux.
Iodures Souffron.
Lipoiodine Ciba.
Néosalvarsan.
Nucléarsitol Robin.
Salvarsan.
Vin et Sirop de Moride.
Vin et Sirop Nourry.

SYSTÈME VEINEUX

Elixir de Virginie Nyrdaahl.

Hamameline Royà.

Hamamelis (Extrait fluide Dausse).

Hamamelis (Nyrdaahl).

Varicure Marck.

