Bibliothèque numérique
medic@

Dictionnaire des spécialites pharmaceutiques ; Vidal. Le dictionnaire ; Dictionnaire de spécialités pharmaceutiques

Paris : Office de vulgarisation pharmaceutique, 1928.
Cote : P 11247

Licence ouverte. - Exemplaire numérisé: BIU Santé (Paris)
Adresse permanente : http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/medica/cote?pharma_p11247x1928


L. VIDAL & M. DAREAU
DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES
1928
OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE
107, Rue Lafayette, PARIS (10e)





L. VIDAL & M. DAREAU

DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

1928

OFFICE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE

107, Rue Lafayette, PARIS (X^e^)

1re Partie

TABLE
par Indications Thérapeutiques des Spécialités figurant dans cet ouvrage

Table par indications thérapeutiques des Spécialités figurant dans cet ouvrage

I. Alimentation — Régimes.
II. Antiseptiques — Désinfectants.
III. Appareil circulatoire.
IV. Appareil digestif et ses annexes.
V. Appareil génito-urinaire.
VI. Appareil respiratoire.
VII. Arthritisme — Goutte — Rhumatismes — Algies. diverses.
VIII. Dermatoses — Plaies.
IX. Gynécologie — Obstétrique.
X. Hémostatiques.
XI. Maladies infectieuses et parasitaires.
XII. Ophtalmologie.
XIII. Opothérapie — Vaccinothérapie — Produits divers.
XIV. Oto-rhino-laryngologie.
XV. Reconstituants — Recalcifiants — Toniques.
XVI. Stomatologie.
XVII. Syphilis.
XVIII. Système nerveux.
XIX. Tuberculose.
XX. Tumeurs — Cancer.

I. — ALIMENTATION - RÉGIMES

Aliment Tinardon.
Amino sel Byla.
Blédine Jacquemaire.
Céréales Bébé Favrichon.
Céréalose.
Decorpa.
Diases Progil.
Dryco (Lait sec).
Embryonine du Dr Barré.
Extrait de malt français Déjardin.
Farine de malt Heudebert.
Farine lactée diastasée Salvy.
Farines maltées Jammet.
Forcival.
Gloma.
Jus de raisin Pampryl.
Kina Elzévir.
Lait glaxo.
Lévuluse Rogier.
Maltea-Moser cristallisée
Maltosan.
Malt pailleté Progil.
Malt Wander.
Neura-moka.
Nutrobiase.
Nutromalt.
Oléo-mel laxatif.
Ovomaltine.
Pain essentiel Heudebert.
Pains spéciaux Heudebert.
Panlax Gmet.
Peptone Vassal.
Phosphatine Fallières.
Phosphogène Favrichon.
Pilules lithuranées du Dr Boviel.
Produits Bénédictus.
Quotidien (Le).
Yogourth (extrait de).

II. — ANTISEPTIQUES - DÉSINFECTANTS

A. D. Grosjean.
Airol Roche.
Anaquintine Lescène.
Anexol.
Aniodol.
Antiphlogistine.
Berkendyl.
Boricine Meisonnier.
Bulgarine Thépénier.
Chlocci.
Chloral-géranié.
Clonazone Daufresne.
Comprimés Aqua Pura.
Comprimés d'Alibour.
Comprimés Guillaumin.
Créoline Pearson.
Créosoforme Lambiotte.
Crésyl Jeyes.
Ektogan Bocquillon.
Eranol.
Evine.
Formadermine.
Formyl.
Goménol.
Hypochlorine.
Hypochloryl.
Iodex.
Ixogynes.
Kerlactine.
Kydalose.
Laurénol médicinal.
Lusoforme.
Néo-collargol.
Néol.
Oxydrol.
Plagéine Soulas.
Produits Permès.
Pulvéol.
Salubrine Phénix.
Sanoformine.
Savon Pérusol.
Stéramine.
Synthol.
Thigénol Roche.
Thymol Doré.
Tulle gras Lumière.
Ulcéobande.
Ulcéoplaque.
Végétol externe.
Vitargyl.

III. — APPAREIL CIRCULATOIRE

Acécoline.
Acésine Guillaumin.
A. D. Grosjean.
Adoverne Roche.
Adrénine.
Adrénaline « Usines du Rhône ».
Adrépatine.
Adrianine.
Aérophagyl.
Afatyl.
Algatan.
Allisatine Sandoz.
Aloysine.
Ampoules Boissy.
Ampoules Churchill.
Ampoules de Digalène Roche.
Ampoules de Sécacornine Roche.
Ampoules de spasmalgine Roche.
Ampoules de Théobryl Roche.
Antirrhoïde.
Antonal.
Anusol.
Aphloine Trouette-Perret.
Artérion Vincardi.
Artério-veinine.
Asclérosol.
Astasol Douetteau.
Bain Carré.
Banikol.
Baume Suelta.
Benzoflorine Julien.
Benzylol.
Bi-Citrol Marinier.
Bouchon Bouteille Emania.
Caféine Invar.
Camphodausse.
Camphostyl.
Carboiodine.
Cardibaine.
Cardiosthénine.
Catemenyl.
Citrofluyl.
Citropaïne.
Citrosodine Gremy.
Coramine Ciba.
Cratægine.
Crème résolutive du Dr Rap.
Cupressus Dausse.
Dépuratif Kromelinck.
Dépuriode du Dr R. Weber.
Diascléral.
Dicaliode.
Digalène Roche.
Digibaïne.
Digifoline Ciba.
Digimialbaïne.
Digitaline cristallisée Mialhe-Petit.
Digitaline Invar.
Digitaline Nativelle.
Dioséine Prunier.
Diurédausse.
Diurène.
Diurocalcine Gros.
Dragées toni-cardiaques Le Brun.
Éniode Lefebvre.
Eranol.
Ergotine Lamante.
Esculéol.
Eugynol Grandval.
Eutensyl Grémy.
Extrait Hamid.
Génostrychnine.
Globules Fumouze.
Glycocarpine.
Gouttes antispasmodiques Dausse.
Gouttes de Séru.
Gouttes Fluxine.
Granulé dépuratif végétal du Dr A. Kienckel.
Gui Byla.
Guipsine.
Guitose.
Hamaméline Roya.
Hamaméliode.
Hamamélis Grandval.
Hémodrome.
Hémoductyl.
Hémogénol Dausse.
Hémoluol.
Hémopausine.
Hémostyl du Dr Roussel.
Hypophosphites Churchill pluriglandulaire.
Indhaméline Lejeune simple.
Intrait de digitale Dausse.
Intrait de gui Dausse.

Intrait de marron d'Inde Dausse.
Intrait de strophantus Dausse.
Ioda.
Iodalose Galbrun.
Iodamélis Logeais.
Iode organique Boissy.
Iodex.
Indhaméline Lejeune simple.
Iodogénol Pépin.
Iodo-Maïsine.
Iodone Robin.
Iodonucléol.
Iodostarine Roche.
Iodoveine.
Iodurase.
Iodures Pachaut.
Iodure Philippe.
Kluchol Remeaud.
Kola granulée Astier.
Lipoiodine Ciba.
Ménovarine.
Mésothorium Buisson.
Mialbaïne.
Micelliode.
Mictasol.
Natibaïne.
Néoriodine.
Oléthyle Benzyle.
Oliolase Corbière.
Opochol.
Opotonine.
Ouabaïne Arnaud.
Passiflorine.
Pépiodon Henry.
Péraziodol.
Pilules Philippe.
Pituilobine Byla.
Pneumogéne Renard.
Polyveine.
Pommade Logeais.
Pommade Midy.
Poudre Escouflaire.
Proveinase Midy.
Pulmocardine.
Quinicardine.
Rectoline.
Rhodazil.
Riodine.
Rythmosystol.
Salvénase Legoux.
Santhéose.
Scillarène Sandoz.
Scléramine Dausse.
Scléroveine Hardy.
Sclérosérum.
Scurénaline.
Sécacornine Roche.
Sédatuline.
Sel hépatique U.-N. Arquevaux.
Sérum hypotensif Fraisse.
Silguine.
Silicyl.
Silisode.
Sirop Guilliermond.
Solubaïne.
Solucamphre Delalande.
Sornyal.
Spasmalgine Roche.
Spasmosédine.
Spécific Brachat.
Spectrol.
Strictoforme Dausse.
Strophantine Catillon.
Strophantus Catillon.
Suppositoires à l'esculéol.
Suppositoires Logeais.
Suppositoires Midy.
Synthol.
Tablettes Zéva.
Tétranitrol Roussel.
Théisine Dubat.
Théobromine Invar.
Théobromose Dumesnil.
Théobryl Roche.
Théosalvose.
Tiodine Cognet.
Théoxantine.
Tonyol « F. ».
Tot'Hamelis.
Trinitrine caféinée Dubois.
Trinitrine Roussel.
Trisodyl Rozet.
Uracétose.
Varisclérine.
Vascurol.
Veinicura.
Veinofluine.
Veinosérum.
Veinosine.
Velledol Adrian.
Venecine.
Verticurine.
Viscosérum.
Viscum Zyma.

IV. — APPAREIL DIGESTIF ET SES ANNEXES

Absuric.
Acide oléique Paul Thibault.
Acidural.
Acolitol.
A. D. Grosjean.
Adrénaline Invar.
Adrépatine.
Aérophagyl.
Agarase.
Agocholine.
Allisatine Sandoz.
Aloine Houdé.
Aloysine.
Alucol Wander.
Alunozal.
Amibiasine.
Amidal.
Ampoules de Spasmalgine Roche.
Amylodiastase Thépénier.
Anapeptone Vassal.
Anéol Robert.
Aniodol.
Antacidyl.
Atural.
Banikol.
Belladone Dausse.
Benzolactine.
Benzolactol.
Benzophosphine Christiaens.
Benzylol.
Bi-Citrol Marinier.
Bileyl Fournier.
Biliase Raby.
Bilifluine.
Bilirhéine.
Biogastrine.
Biolactyl Fournier.
Bis-Ka-Ma.
Bismuth Desleaux.
Bismuth Tulasne.
Blédine Jacquemaire.
Boldine Houdé.
Boldoine Eparvier.
Boldolactol.
Boldorhéine.
Boldo Verne.
Boléase Monal.
Borotropine Sévin.
Brides-les-Bains.
Bulgarine Thépenier.
Calcozymase.
Capsules Bardet.
Capsules d'Hojasol.
Capsules Taetz.
Carbatropine.
Carbocitrol.
Carbolactyl billé.
Carbolactyl simple.
Carbonal magnésien.
Carbonal princeps.
Carbonal rhéo-rhamnique.
Carbonate de bismuth.
Carbosanis.
Cascara Midy.
Cascarine Leprince.
Céphœmétine.
Cétrarose Gigon.
Charbon Tissot.
Chenanthol.
Chloramine Freyssinge.
Chloridia.
Chlorobyl.
Cholécystine.
Choléoboldine Thévenot.
Choléo-combrétol boldiniso.
Choléokinase.
Choléolactol Daguin.
Cholergine.
Chophytol.
Citrocarbine.
Citrofluyl.
Citropaïne.
Citrosodine.
Colitique.
Colloïxols du Dr Riquoir.
Comprimés Adrian.
Comprimés Chéralys.
Comprimés de Pantolaxine du Dr Boveil.
Coréine.
Cristolax.
Cryptargol Lumière.
Curatoxine Vendel.
Decorpa.
Dépuratif Kromelinck.
Diabétifuge.
Diases Progil.
Doloma.

Dragées Elkin.
Dryco (Lait sec).
Dyspeptine Hepp.
Elixir Bonjean.
Élixir du Dr Mialhe.
Elixir Dussaud.
Élixir eupeptique Tisy.
Élixir Grez.
Élixir Spark.
Endopancrine.
Entéro-antigènes.
Entérozone.
Entéroseptyl Clérambourg.
Entéro-vaccin Lumière.
Erbamil.
Evolaxine.
Euonymine Paul Thibault.
Facmine Longuet.
Farine de Malt Heudebert.
Félamine Sandoz.
Formocarbine.
Formine Adrian.
Fucobiline.
Fucosine.
Galabactéine.
Gambéol.
Gastricine du Dr Duhourcau.
Gastrocalcine.
Gastrocaol.
Gastrosodine.
Gastrothérib.
Gastrozymase Bouty.
Gélagar.
Gélobarine.
Gélogastrine.
Gélotanin.
Gélor.
Génatropine.
Génésérine.
Génhyoscyamine.
Glyco-lactimase.
Gouttes antispasmodiques Dausse.
Grain de Vals.
Hépacoline.
Hépatobyl.
Hépatosodine.
Hexotal.
Hipposarcine Roy.
Hopogan Bocquillon.
Hormolaxine.
Hormobiline.
Huile Crolas.
Hypochlorine.
Hypodermozone.
Hoglandol Roche.
Insuline buccale Fornet.
Insuline Byla.
Insuline Rogier.
Insulyl du Dr Roussel.
Iodone Robin.
Iodo-Thyroïdine Catillon.
Iodurase.
Iodure Philippe.
Isacène Roche.
Isotonyl Bouret.
Jécol.
Juglane.
Jus de raisin Pampryl.
Kaobrol.
Kaolinase.
Kerlactine.
Kymosine Rogier.
Lab-lacto-Ferment Mialhe.
Lactimase.
Lactobyl.
Lactolaxine Fydau.
Lactochol
Lacto Mannitase.
Lait de magnésie Phillips.
Lansoyl.
Laxamalt.
Laxatifs Miraton Châtelguyon.
Laxamer.
Laxia Dannec'h.
Laxopeptine Girard.
Lenicure Vichy.
Lévulose Rogier.
Levure B 17.
Levure fraîche Mycéta.
Lipoiodine Ciba.
Listose Vicario.
Lobuline.
Magnésie Erba.
Magnésie lourde de Durel.
Maltase Fanta.
Malt Barley.
Maltosan.
Malt pailleté Progil.
Manganine.
Manganésia.
Marrubiase.
Mucinum.
Myrtilline Demasles.
Néo-Collargol.
Néo-laxatif-Chapotot.
Néoriodine.

Nigérine Vincent.
Normacol.
Novolactol Daguin.
Nujol.
Nutrobiase.
Nutromalt.
Oléo-mel laxatif.
Oléthyle Benzyle.
Opochol.
Opopeptol.
Orthogastrine.
Oxydothyrine.
Oxygénase.
Panbiline.
Pancréanne.
Pancrépatine Laleuf.
Pangastrol.
Pangestyl Narty.
Panlacto Midy.
Panlax Allard.
Papaïne de Trouette-Perret.
Paralactine Byla.
Pepiodon Henry.
Peptalmine.
Pepsodia.
Peptalmine magnésiée.
Peptodiase.
Pepto-kola-Robin.
Peptozym.
Péristaltine Ciba.
Persodine Lumière.
Philogastrine.
Phylactone Byla.
Physioscyamine.
Pilules du Dr Debouzy.
Pilules du Dr Séjournet.
Pilules Éparvier.
Pilules Philippe.
Pilules Lithuranées du Dr Boveil.
Pilules purgatives du Dr Dehaut.
Pipérazine Midy.
Polyferments Laleuf.
Poudre Génia.
Poudre laxative de Vichy.
Poudre Paterson.
Poudre de Lausanne.
Protaminol Byla.
Protiodyne.
Proxytol.
Purganol Daguin.
Quassine Houdé.
Quotidien (Le).
Radiopaque Heudebert.
Réalphène.
Recto-Panbiline.
Régyl.
Rhizotanin Chapotot.
Rhodazil.
Riceyl Billault.
Ricigel.
Riodine.
Royérine Dupuy.
Salicaire Dausse.
Salsanos.
Scuroforme.
Sédatine Christiaens.
Sédatuline.
Sédogastrine.
Sel de Hunt.
Sel digestif Bé-Mé-Cé.
Sel hépatique U.-N. Arquevaux.
Sinahin.
Sirop de la Maternité
Sirop laxatif Gobey.
Sirop Teyssèdre.
Sodolactine.
Sodothiol.
Somalgine.
Sornyal.
Spasmalgine Roche.
Staphylase.
Stomal.
Stomarine Billault.
Stomaxines Roxelane.
Stomobrol.
Stomoxygène.
Stupho.
Sulfobyl.
Suppositoires Pépet.
Tablettes Perroud.
Tapo.
Taxol.
Thaolaxine.
Thoroxyl.
Topique stomacal Dausse.
Triase.
Tridigestine Dalloz.
Uracétose.
Uraseptine Rogier.
Urilysone.
Urisanine.
Uroformine Gobey.
Uroiodine.
Urométine Lambiotte.
Uromil.
Valérium Paul Thibault

Vanadine Chevrier.
Varilaxine.
Vasolaxine.
Vigardyne.
Vin de Chassaing.
Vitamine Rogier.
Vulcase.
Yaourtine.
Zymatine Lescène.

V. — APPAREIL GÉNITO-URINAIRE

Absuric.
A. D. Grosjean.
Adrépatine.
Airoglyce.
Ampoules de spasmalgine Roche.
Ampoules de Théobryl Roche.
Anexol.
Aniodol.
Anurol.
Anusol.
Argycuprol.
Arhéol.
Belladone Dausse.
Benzophosphine Christiaens.
Benzylol.
Blennosine.
Boricine Meissonnier.
Borotropine Sévin.
Butelline.
Capsules Bardet.
Chlocci.
Citrosodine Grémy.
Clonazone Daufresne.
Comprimés Guillaumin.
Curatoxine Vendel.
Cytrotropines.
Dialyl.
Diasclérol.
Diurédausse.
Diurène.
Diurocalcine Gros.
Elatine Bouin.
Elgine Julien.
Ennego.
Eranol.
Ergotine Lamante.
Eumictine.
Eutensyl Grémy.
Félargent.
Formocarbine.
Formine Adrian.
Gelotube 29.
Globules Romon.
Goménol.
Gonacrine.
Gui Byla.
Hexotal.
Hypochloryl.
Ixium.
Kerlactine.
Mictasol.
Nitium Buisson.
Nutrobiase.
Oléthyle Benzyle.
Physiosthénine.
Pipérazine Midy.
Pneumogéine Renard.
Préventyl.
Quotidien (Le).
Réargon.
Rectagine.
Réthargine.
Rhéantine Lumière.
Salsanos.
Salvatyl.
Santal Midy.
Santal Monal.
Santhéose.
Sel hépatique U.-N. Arquevaux.
Scillarène Sandoz.
Solvuric.
Sornyal.
Spasmalgine Roche.
Spyrolides.
Synthol.
Técarine.
Théisine Dubat.
Théobromine Invar.
Théobromose Dumesnil.
Théobryl Roche.
Théosalvose.
Théoxanthine.
Uracétose.
Uraséol.
Uraseptine Rogier.
Urifluine.
Urilysone.
Urisanine.

Uroformine Gobey.
Uromil.
Uroiodine.
Urol.
Urométine Lambiotte.
Urosan Dufayard.
Végétol externe.
Vitargyl.

VI. — APPAREIL RESPIRATOIRE

Acodros.
A. D. Grosjean.
Adrénaline Invar.
Æthone.
Algatan.
Algarol Beaucourt.
Aloysine.
Ampoules Boissy.
Ampoules Churchill.
Ampoules de Sécacornine Roche.
Anapeptone Vassal.
Anaquintine Lescène.
Antiasthme Bengalais.
Anti - asthmatiques du Dr Cléry.
Anti-asthmine Dehaussy.
Antiphlogistine.
Aquintol.
Arséniode Buriat.
Asthmylose.
Azufrol.
Balsamol Lescène.
Baume Aroma.
Belladone Dausse.
Benzylol.
Béxinine.
Bronchoseptol Lauriat.
Cachets Kapytan.
Cachets Roche de Thiocol.
Calcozymase.
Capsules Dartois.
Capsules d'Hojasol.
Capsules Nogués.
Carbiodine.
Citrase.
Citrosodine Gremy.
Codocol.
Codoforme.
Colliobiase de soufre.
Comprimés Maver.
Comprimés Roche de Thiocol.
Créosal Dubois.
Cytobiase.
Dépuriode du Dr R. Weber
Désensibilysine.
Diases Progil.
Dicaliode.
Diénol.
Dragées pulmonaires Giry
Edistol.
Elatine Bouin.
Elbon Ciba.
Élixir Duchamps.
Élixir Thiogaïacolé Arquevaux.
Emulsion Marchais.
Éniode Lefèbvre.
Entéro-antigènes.
Entérozone.
Eranol.
Ercérhinol.
Ergotine Lamante.
Eucalinhal.
Eucalyptine Le Brun.
Euphon.
Eupnogénol.
Fondant iodotannique Dausse.
Freinix.
Germose.
Glottyl.
Goménol.
Goudrinhal.
Gouttes antispasmodiques Dausse.
Gouttes livoniennes de Trouette-Perret.
Gouttes Nican.
Gouttes païdophiles.
Gouttes Pilka.
Gouttes scandinaves.
Granules mineral sulfureux Crosnier.
Granulé pulmonaire Giry.
Hélénine de Korab.
Hergénol.
Hypophosphites Churchill.
Inhalateur Excelsior.
Inhalol.
Inhaloxyl.
Ioda.
Iodarsenic Guiraud.

Iodéine Montagu.
Iode organique Boissy.
Iodex.
Iodogénol Pépin.
Iodo-Maisine.
Iodométine.
Iodone Robin.
Iodonucléol.
Iodostarine Roche.
Iodurase.
Iodure Philippe.
Iodures Pachaut.
Kipsol.
Kluchol Remeaud.
Kydalose.
Lipoféine.
Lipoïodine Ciba.
Morrhuol.
Morrhuxine.
Mycolysine.
Narcyl.
Néopancarpine.
Néoriodine.
Oléthyle Benzyle.
Oliolase Corbière.
Opotonine.
Oxymenthol Perraudin (tablettes).
Papier Fayard et Blayn.
Paroxyl.
Pépiodon Henry.
Peptalmine.
Péraziodol.
Perles taphosote Lambiotte.
Pérubore.
Phagolysine.
Phosote Lambiotte.
Phosphogaïacol Mary.
Pilules Philippe.
Pneumocratol.
Pneumogéine Renard.
Pneumostyl Daguin.
Poudre Escouflaire.
Prézymase.
Pulmocardine.
Pulmogyl.
Pulvéol.
Pyratone.
Révulsif Milko.
Rézyl.
Rhodazil.
Riodine.
Salyptol Narty.
Sanex-Inhalant.
Sauge Guet.
Scléramine Dausse.
Sérum anti-asthmatique de Heckel.
Sinaplasme.
Sirop aux hypophosphites de Fellows.
Sirop Brahma.
Sirop de Sirtal.
Sirop Dr J.-O. Lambert.
Sirop Famel.
Sirop Gribell.
Sirop Guilliermond.
Sirop Lanchat.
Sirop Maver.
Sirop Nogués.
Sirop phénique Vial.
Sirop Préga.
Sirop minéral sulfureux Crosnier.
Sirop Roche au Thiocol.
Soderséine.
Sodothiol.
Solution Pautauberge.
Somalgine.
Sornyal.
Staphylase.
Sthénoléine.
Sulfarsinol.
Sulfarsiode.
Sulfinhal.
Sulfoïdol Robin.
Sulfoléine Rozet.
Sulfureux Pouillet.
Sulfuryl Monal.
Terkal Monal.
Thiocol Roche.
Tiodine Cognet.
Trinitrine caféinée Dubois.
Tubérol.
Urisanine.
Uroformine Gobey.
Uroïodine.
Vaccin anti-asthmatique du professeur Minet.
Vaccin anti-pneumonique du professeur Minet.
Vaccin de Weill et Dufourt.
Vaclydun.
Zaryl.
Zimbyl.

VII. — ARTHRITISME - GOUTTE RHUMATISME - ALGIES DIVERSES

Absuric.
A. D. Grosjean.
Adrialgine.
Afatyl.
Algatan.
Algocratine.
Ampoules Reipar.
Anapeptone Vassal.
Anégrine.
Antalgol Dalloz.
Antialgos Christiaens.
Antiphlogistine.
Antiphlogosine.
Antipur.
Anurol.
Arrhénal Adrian.
Arthritose.
Arséniode Buriat.
Asciatine.
Ascéine.
Aspiphan Bœglin.
Atophan Cruet.
Atoquinol Ciba.
Azufrol.
Bain Carré.
Baume Aroma.
Baume Bengué.
Baume Rhodia.
Bétul-Ol-Midy.
Bi-Citrol Marinier.
Bouchon Bouteille Emania.
Boues radioactives Emania.
Brides -les-Bains.
Bulgarine Thepenier.
Cachets du Dr Boveil.
Calcozymase.
Capsules Bardet.
Carboiodine.
Carbonal.
Cérébrine Fournier.
Cervol.
Chloréthyle Bengué.
Chéloïdine.
Cibalgine.
Citrase.
Citraspirine.
Citrofluyl.
Colchi-Sal-Midy.
Collobiase de soufre.
Collobiase de sulphydrargyre.
Colloïxols du Dr Riquoir.
Crésopirine.
Cryogénine Lumière.
Curatine Brunet.
Curatoxine Wendel.
Dépuriode du Dr R. Weber.
Dialacétine Ciba.
Dialyl.
Diasclérol.
Diases Progil.
Dicaliode.
Dolysine.
Elgine Julien.
Emerson's Bromo-Seltzer.
Eniode Lefebvre.
Entéro-Antigènes.
Eranol.
Fondant iodotannique Dausse.
Fosfoxyl Carron.
Grains céphalgifuges.
Guipsine.
Hopogan Bocquillon.
Ioda.
Iodalose Galbrun.
Iodaseptine Cortial.
Iode organique Boissy.
Iodex.
Iodhema.
Iodogénol Pépin.
Iodo-Maïsine.
Iodométine.
Iodone Robin.
Iodonucléol.
Iodostarine Roche.
Iodurase.
Iodure Philippe.
Iodures Pachaut.
Ixium.
Jus de raisin Pampryl.
Levure fraîche Myceta.
Lipoïodine Ciba.
Mésothorium Buisson.
Micelliode.
Mitigans Roxclane.
Naïodine Logeais.
Néoriodine.
Névoral Rafey.

Névralgol Brossard.
Névrosol.
Nisaméline Trouette-Perret.
Nitroyl Leysin injectable.
Nopirine Vicario.
Nutrobiase.
Oliolase Corbière.
Opotonine.
Oxygénase.
Panbiline.
Papier Fayard et Blayn.
Pavéron Dausse.
Pépiodon Henry.
Peptonal.
Péraziodol.
Pharmetan.
Phosoforme.
Phylactone Byla.
Pilules Philippe.
Pipérazine Midy.
Poudre Génia.
Prézymase.
Pyréthane.
Quinsal.
Rectopanbiline.
Rhésal Vicario.
Rhoféine.
Riodine.
Salène Ciba.
Salsanos.
Salysérum.
Sambul.
Santhéose.
Scléramine Dausse.
Sédatine Christiaens.
Sel hépatique U.-N. Arquevaux.
Seti.
Sinaplasme.
Sodothiol.
Soluprotine Roche.
Solvuric.
Spécifique Bejean.
Stovaïne.
Sulfarsinol.
Sulfarsiode.
Sulfobyl.
Sulfoïdol Robin.
Sulfureux Pouillet.
Sulfurine du Dr Langlebert.
Sulfurion.
Sulfuryl Monal.
Synthol.
Théosalvose.
Thigénol Roche.
Thiosyl.
Tiodine Cognet.
Ulmarène Gigon.
Uracétose.
Uraséol.
Uraseptine Rogier.
Urazine.
Urifluine.
Urilysone.
Urisanine.
Uroformine Gobey.
Uroïodine.
Urométine Lambiotte.
Uromil.
Urosan Dufayard.
Valérianose Gigon.
Vénécine.
Véralgine.

VIII. — DERMATOSES - PLAIES

Acésine Guillaumin.
Albuplast Vigier.
Alibourine.
Alysine.
Anapeptone Vassal.
Anexol.
Aniodol.
Anthraxone.
Antiphlogistine.
Antiphlogosine.
Arrhénal Adrian.
Arsylène Roche.
Atemnol.
Atoquinol Ciba.
Azufrol.
Bardane stabilisée Dausse.
Baume Delacour.
Baume de la Maternité.
Baume du Dr Baissade.
Baume Sélénia.
Belhémine.
Borostyrol Schlatter.
Boues Radioactives Emania.

Bulgarine Thépénier.
Calcozymase.
Capillairal.
Carboiodine.
Carbolactyl simple.
Céthocal.
Chlorobyl.
Chlorosulfol.
Clonazone Daufresne.
Collobiase de soufre.
Colloïdes Amicros.
Comprimés d'Alibour.
Comprimés Guillaumin.
Créosoforme Lambiotte.
Curatoxine Vendel.
Dépuriode du Dr R. Weber.
Dermo-plastol Dumesnil.
Diadermine.
Dialyl.
Dicaliode.
Dragées Elkin.
Eczéda.
Ektogan Bocquillon.
Emplâtres R. Cavaillès.
Entéro-Antigènes.
Entéroseptyl Clérambourg.
Euphoryl.
Facmine Longuet.
Fondant iodotannique Dausse.
Formadermine.
Furonculase.
Galabactéine.
Gaze néolée.
Géloïde Stalys du Dr Wagon.
Gélo-pansement Byla.
Glycojasol.
Gouttes païdophiles.
Granulé dépuratif végétal du Dr A. Kunckel.
Granulés minéral sulfureux Crosnier.
Hypochlorine.
Inotyol du Dr Debat.
Insulanol.
Ioda.
Iodarsenic Guiraud.
Iodex.
Iodine Médol.
Iodo-Maïsine (pommade).
Iodo-thyroïdine Catillon.
Kerlactine.
Kerlol.
Laccodermes.
Lactochol.
Levure B 17.
Levure fraîche Myceta.
Levurine extractive.
Lipogazes dermatologiques.
Nécessaire inhalateur hojasol.
Néo-collargol.
Néopancarpine.
Néol.
Nisaméline Trouette-Perret.
Nitium Buisson.
Nutrobiase.
Oléojasol.
Ouataplasme.
Oxygénase.
Paralactine Byla.
Pépiodon Henry.
Pellicules radifères du Dr Vallet.
Peptalmine.
Peptonal.
Phylactone Byla.
Pipérazine Midy.
Plagéine Soulas.
Pommade Fornet à l'insuline Fornet.
Pommade Kléos.
Pommade Lenoir.
Poudre et pommade d'insuline Phyloze.
Pommade Radine (pour brûlures).
Poudre Satine.
Poudre Stéar.
Prézymase.
Protiodyne.
Pulvéol.
Pyroléol Edet.
Rhagadine Bacquemond.
Rozoderme.
Sanoram.
Sapolan.
Savon A. Mollard.
Savon Pérusol.
Scuroforme.
Sirop Guilliermond.
Sirop minéral sulfureux. Crosnier.
Sodothiol.
Soluprotine Roche.
Stalysine.

Stanion.
Stanno-Bardane Henry.
Stannoxyl.
Staphylase.
Staphylocide Audras.
Staphylo-coccine Fraquet
Staphylothanol.
Stéramine.
Sulfarsinol.
Sulfarsiode.
Sulfobore.
Sulfobyl.
Sulfureux Pouillet.
Sulfurine du Dr Langlebert.
Sulfurion.
Sulfuryl Monal.
Tégéol.
Thigénol Roche.
Thymol Doré.
Tiodine Cognet.
Trophène.
Tulle gras Lumière.
Ulcéobande.
Ulcéoplaque.
Ulcérophile Nosan.
Végétol externe.
Vénécine.
Verrulyse.
Vulcase.
Vulnérine du Dr Bergon.

IX. — GYNÉCOLOGIE - OBSTÉTRIQUE

Agomensine Ciba.
Algocratine.
Ampoules de Sécacornine Roche.
Ampoules de Spasmalgine Roche.
Androstine Ciba.
Anexol.
Aniodol.
Apioline Chapoteaut.
Aseptone.
Baume Delacour.
Baume de la Maternité.
Belhémine.
Benzylol.
Boricine Meissonnier.
Boues radio-actives Emania.
Cachets du Dr Boveil.
Capsovules Diplos.
Capsules Joret et Homolle.
Chlocci.
Clisémine Longuet.
Clonazone Daufresne.
Colloïxols du Dr Riquoir.
Comprimés d'Alibour.
Comprimés Guillaumin.
Créosoforme Lambiotte.
Cupressus Dausse.
Dioséine Prunier.
Ektogan Bocquillon.
Entéro-antigènes.
Eranol.
Ergotine Lamante.
Eugynol.
Evine.
Extrait Hamid.
Félargent.
Férarsényl Gautier.
Fer Bravais.
Férovarine Vitalis.
Floréase.
Formyl.
Galabactéine.
Galactogil.
Gobérol.
Glycocarpine.
Gouttes antispasmodiques Dausse.
Gouttes de Séru.
Gouttes Fluxines.
Grassyl.
Gynergène Sandoz.
Gynopausine.
Gynocalcion.
Hamamelis Grandval.
Hémagène Tailleur.
Hémodrome.
Hémoluol.
Hémopausine.
Hémypnal.
Holovarine.
Hormovarine Byla.
Hydralin.
Hypochlorine.
Hypochlosyl.
Indhaméline Lejeune simple.
Indhaméline Lejeune pluriglandulaire.
Iodoveine.
Ixogyne

Kerlactine.
Lachésine.
Lactophorine Vigier.
Laurénol médicinal.
Leucagine.
Malt pailleté Progil.
Ménosedine.
Ménovarine.
Mésoforme.
Métritols.
Mictasol.
Natrosyl.
Néo-collargol.
Néol.
Néothorium Millot.
Neurovarol Doucteau.
Oléo-mel laxatif.
Oléthyle Benzyle.
Ovules Ivula Pearson.
Ovules Roche.
Oxydothyrine Pâris.
Oxydovarine Pâris.
Panbiline.
Panlax Gmet.
Pilules de Blancard.
Pilules héléniennes Naud.
Pituilobine Byla.
Poudre Gynule.
Rectagine.
Réthargine.
Rhodazil.
Salubrine Phénix.
Sanoformine.
Sanoram.
Savon Pérusol.
Sécacornine Roche.
Sédol.
Sirop de Blancard.
Sistomensine Ciba.
Sornyal.
Spasmalgine Roche.
Spyrolides.
Sulfo-bore.
Suppo-Gynals.
Synthol.
Tablettes Zéva.
Tampol Roche.
Thigénol Roche.
Thymol Doré.
Tot'Hamelis.
Utéramine.
Végétol externe.
Veinofluine.
Veinosine.
Vitargyl.

X. — HÉMOSTATIQUES

Acésine Guillaumin.
Ampoules de Sécacornine Roche.
Anthéma.
Arhémapectine Gallier.
Belhémine.
Boricine Meissonnier.
Calcional.
Calcium Sandoz.
Chloral Géranié.
Chloro-Calcion.
Citrase.
Clisémine Longuet.
Colloïxols.
Cupressus Dausse.
Ergotine Lamante.
Gouttes fluxines.
Gynergène Sandoz.
Hémogénol Dausse.
Hémoluol.
Hémopectal.
Hémostyl du Dr Roussel.
Kerlol.
Sécacornine Roche.
Séroma.
Séro-Sérum Rivier.
Sirop phéniqué Vial.
Spectrol.
Utéramine.

XI. — MALADIES INFECTIEUSES ET PARASITAIRES

A. D. Grosjean.
Adrialgine.
Agamentol.
Aniodol.

Antalgol Dalloz.
Antigrippine Midy.
Antiphlogistine.
Arsylène Roche.
Banikol.
Bismuth Desleaux.
Bonbons Lucas vermifuges.
Borotropine Sévin.
Cachets du Dr Boveil.
Cachets Kapytan.
Caféine Invar.
Calmosuppos antithermiques.
Capillairal.
Carboïodine.
Carbonate de bismuth.
Céphæmétine.
Cervol.
Chénanthol.
Chloramine Freyssinge.
Collobiase d'or.
Colloïdes Amicros.
Colloïxols du Dr Riquoir.
Cryogénine Lumière.
Curatine Brunet.
Curatoxine Vendel.
Curoxyure.
Diénol.
Di-uroïodine.
Elgine Julien.
Elixir Ducro.
Entéroseptyl Clérambourg.
Entérozone.
Eranol.
Eucalyptine Le Brun.
Fer Bravais.
Ferricodile.
Ferrocodile.
Gambéol.
Glutéokina.
Grippol.
Huiles cholestérinées Dausse.
Hypodermozone.
Iodaseptine Cortial.
Iode organique Boissy.
Iodo-Maisine.
Iodométine.
Kerlactine.
Kola granulée Astier.
Lantol.
Laxia Dannec'h.
Libérine.
Lipodéterpenol.
Malarsan.
Mésothorium Buisson.
Micelliode.
Mycolysine.
Néo-arsycodyle.
Néo-collargol.
Névoral Rafey.
Névralgol Brossard.
Névrosol.
Nopirine Vicario.
Nucléatol Robin.
Orargol Amicros.
Panbiline.
Panfébrine.
Pérasiodol.
Pharmetan.
Phosote Lambiotte.
Physiosthénine.
Phytinate de quinine Ciba
Poudre Paterson.
Protiodyne.
Pyoformine.
Quinarsol fébrifuge.
Quinéase.
Quinéine.
Quinium Roy.
Quinoforme Lacroix.
Quinoïdine Duriez.
Rhoféine.
Septicémine Cortial.
Soluprotine Roche.
Solution Bardet.
Staphylase.
Staphylo-coccine Fraquet.
Sthénoléine.
Stovarsol.
Strychnal Longuet.
Sulfuryl Monal.
Suppositoires Corbière.
Tablettes Perroud.
Tænifuge Bardet.
Tænifuge français du Dr Duhourcau.
Tænifuge Kirn.
Théisine Dubat.
Themsaline.
Théosalvose.
Thiosyl.
Tiodine Cognet.
Tréparsol.
Tri-iodo-Ercé.
Urisanine.
Uroformine Gobey.
Urol.

Urométine Lambiotte.
Urosan Dufayard.
Vaccin anti-grippal du professeur Minet.
Véralgine.

XII. — OPHTALMOLOGIE

Aniodol.
Boricine Meissonnier.
Buttelline.
Collobiase de soufre.
Comprimés d'Alibour.
Conjonctol.
Félargent.
Génostrychnine.
Glycocarpine.
Ophtalmine.
Scurocaïne.
Silicyl.
Thigénol Roche.
Tiodine Cognet.
Tubes du Dr Guiraud.
Tubes Dulcis.
Tubes ophtalmologique Ferlux.
Végétol externe.
Vitargyl.

XIII. — OPOTHÉRAPIE - VACCINOTHÉRAPIE - PRODUITS DIVERS

A. D. Grosjean.
Afatyl.
Alysine.
Ampho-vaccins de Ronchèse.
Anthraxone.
Antivirus.
Arsenicaux Bouty.
Bilivaccin.
Billault (produits).
Blennosine.
Boléase Monal.
Calcional.
Calcozymase.
Cholergine.
Colitique.
Colloïdine Laleuf.
Complexes colloïdaux du Dr Riquoir.
Complextraits.
Energétènes Byla.
Entéro-vaccin Lumière.
Euphoryl.
Eutensyl Grémy.
Formo-vaccins (vaccins Lucinia).
Galactogil.
Gastricine du Dr Duhourcau.
Globules Romon.
Gmet (produits).
Granions de Fouard.
Grippol.
Hépato Byl.
Hojasol (produits à l').
Holovarine.
Hormobiline.
Hormolaxine.
Immunizols Grémy.
Immuno-antivirus.
Immuno-vaccins.
Iodothyroïdine Catillon.
Kerlactine.
Lipoïdes Iscovesco.
Lipo-vaccins.
Néoplalysines du Dr Riquoir.
Néo-Sphérulines Moncour.
Oponuclyl.
Oposynergines.
Opothérapie associée, Dr Fraysse.
Opothérapie Bouty.
Opothérapie Byla.
Opothérapie Choay.
Opothérapie Fournier.
Opothérapie Moncour.
Opothérapie U. T. A.
Opothérapiques Meurice.
Opothérapiques Pélissier.
Opozones Lumière.
Osmo-vaccins P. L.

Ostéo-Hepatine.
Oxydothyrine Pâris.
Oxydovarine Pâris.
Pancrépatine Laleuf.
Panfébrine.
Panglandine.
Phylactone Byla.
Prézymase.
Propidon.
Proxytases.
Rhéantine Lumière.
Salvénase du Dr Duhourcau.
Sphérulines synergétiques Moncour.
Taburol Monal.
Tébéphaguine Fornet.
Tisanes Dausse.
Vaccin anti-asthmatique du professeur Minet.
Vaccin anti-grippal du professeur Minet.
Vaccin anti-pneumonique du professeur Minet.
Vaccin de Weill et Dufourt.
Vaccinothérapie atoxique Cépède.
Vaccins atoxiques stabilisés.
Vaccins bactériens I. O. D.
Vaccins de Ronchèse (ampho-vaccins).
Vaccins Bruschettini.
Vaccins « Sténé ».
Vaclydun.

XIV. — OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE

Acodros.
A. D. Grosjean.
Adrénoléine inhalant.
Ampoules de spasmalgine Roche.
Anexol.
Aniodol.
Avanazol Couturieux.
Argybil.
Arhine Lambiotte.
Balmiga.
Boules Quies.
Boricine Meissonnier.
Bulgarine Thepenier.
Butelline.
Chlorinal inhalant.
Cibalgine.
Clonazone Daufresne.
Cocaïne Midy.
Collobiase de soufre.
Colluborine Dupuy.
Dragées Bengué au menthol.
Edistol.
Ercérhinol.
Eucalinhal.
Euphon.
Formyl.
Freinix.
Galform Lambiotte.
Glottyl.
Glycocarpine.
Glycojasol.
Goménol.
Gosiérine Dalloz.
Goudrinhal.
Granulé minéral-sulfureux Crosnier.
Hojasol.
Hydrastol.
Hypochlorine.
Inhalol.
Inhalo-bol.
Inhalone.
Inhalo-sel.
Inhaloxyl.
Inhalateur Excelsior.
Inhalation Lancosme.
Inolène.
Iodo-Maïsine (pommade).
Kidoline.
Kinectine.
Kipsol.
Kydalose.
Mésoforme.
Mucosodine.
Nazophyl Darva.
Nécessaire inhalateur Hojasol.
Néo-collargol.
Néol.
Néopancarpine.
Oléojasol.
Orargol Amicros

Oxymenthol Perraudin (tablettes).
Pérubore.
Pulvéol.
Sanex inhalant.
Scurocaïne.
Scuroforme.
Septicémine Cortial.
Séro-comprimés Mérieux.
Silicyl.
Sirop Guilliermond.
Sirop minéral sulfureux Crosnier.
Spasmalgine Roche.
Staphylococcine Fraquet
Sulfinhal.
Sulfo-bore.
Sulfoïdol Robin.
Sulfoléine Rozet.
Sulfureux Pouillet.
Sulfuryl Monal.
Suppositoires Corbière.
Thigénol Roche.
Tiodine Cognet.
Vaccin antigrippal du professeur Minet.
Végétol externe.
Verticurine.
Vitargyl.
Vocaldop.
Zaryl.

XV. — RECONSTITUANTS - RECALCIFIANTS - TONIQUES

Adral.
Adrénaline Invar.
Adrénocalcine.
Alexime.
Aliment Tinardon.
Ampoule Churchill.
Ampoules névrosthé - niques Dausse.
Amylodiastase Thépénier.
Antasthène.
Antiphi.
Arrhénal Adrian.
Arrhénuclène Bergevin.
Arsenicaux Bouty.
Arséniode Buriat.
Arsi-strychnal Longuet.
Arsycodyle.
Arsylène Roche.
Ascoléine Rivier.
Bain Carre.
Beef Lavoix.
Belhémine.
Biocalcose Chevretin.
Biodynamine.
Biogénol Demasles.
Bionergyl.
Bio-plastine Sérono.
Biophytol.
Biotrigon.
Biozol.
Blédine Jacquemaire.
Bouchon Bouteille Emania.
Boues radioactives Emania.
Cachets Roche de Thiocol.
Cacodylo-phosphate vital de Jacquemaire.
Calcium Sandoz.
Capsules de Morrhuine Puy.
Capsules Taetz à l'ext. de foie de morue lécithiné.
Céréalose.
Céréossine Dehaussy.
Cérinil.
Cériomine.
Chloro-calcion.
Cholergine.
Citrase.
Clupeyl.
Colloïdes Amicros.
Colloïdogénine du Dr Bayle.
Comprimés Roche de Thiocol.
Créosal Dubois.
Cytobiase.
Cyto-manganol Corbière.
Cytosérum Corbière.
Dialyl.
Diases Progil.
Diastogène Dehaussy.
Doloma injectable.
Dragées Hecquet.

Dragées névrosthéniques Yse.
Élixir Duchamp.
Élixir Ducro.
Elixir Dussaud.
Embryonine du Dr Barré.
Emulsion Marchais.
Endocalcase.
Entérozone.
Extrait de céréales Adrian.
Eucalcium.
Eucytol.
Eudynol.
Eusthénol Roze.
Extrait de malt français Déjardin.
Fer Bravais.
Fer Larcade.
Féroxal Buisson.
Ferricodile.
Ferrocodile.
Ferrophytine Ciba.
Fludiose.
Fluodyl.
Fondant iodotannique Dausse.
Fondant de cola Dausse.
Fondant mangano-ferreux Dausse.
Fortossan Ciba.
Fosfoxyl Carron.
Fosyls Carron.
Gaduamine.
Gaduase.
Gaurol.
Gélocalcine.
Globugénol Chanal.
Gloma.
Glycérophosphate Dalloz.
Glycérophosphate Jacquemaire.
Glycérophosphate Robin.
Glyctone phosphatée Charrière.
Glyphospher.
Gouttes arséno-sthéniques Dausse.
Gouttes païdophiles.
Gouttes phosphosthéniques Dausse.
Granulés Caresmel.
Granules de Pantofort du Dr Boveil.
Granulé minéral sulfureux Crosnier.
Glyctone phosphatée Charrière.
Hélital.
Hémagénine Giraud.
Hémoantitoxine Sofos.
Hémo-Cyto-Sérum Corbière.
Hémofixine Branchu.
Hémogénol Dausse.
Hémoglobine Deschiens.
Hémophagosthyl.
Hémostyl du Dr Roussel
Héracléol.
Hipposarcine Roy.
Histogénol.
Holos.
Huiles cholestérinées Dausse.
Hypodermozone.
Iodalose Galbrun.
Iodarsenic Guiraud.
Irrastérine.
Ixium.
Jémalt Wander.
Jus de raison Pampryl.
Kina Elzévir.
Kola granulé Astier.
Kolarsine.
Lactophorine Vigier.
Lécithosine Robin.
Limol Churchill.
Lipocalcine.
Liposplénine du Dr Groc.
Magol Churchill.
Maltase Fanta.
Malt pailleté Progil.
Malt Wander.
Mangaïne.
Mangano-phosphal Julien.
Marinol.
Maté Douglas.
Mésothorium Buisson.
Métharfer Bouty.
Métharsol Bouty.
Micelliode.
Morrhualène Gautier.
Morrhuétine Jungken.
Morrhuol.
Morrhuxine.
Morubiase.
Moruxase.
Musculosine Byla.
Néo-Arsycodile.
Néo-Calciline.

Néo-Rhomnol.
Nergine Heudebert.
Nervocithine Tissot.
Neuro-Pax.
Neuroplasma Fort.
Neuroplasma Massif.
Neuroplasmine Fort.
Neurosine Prunier.
Neurotrol.
Neurotrophol Byla.
Névrosthénine Freyssinge.
Nuscléarrol Gabriel.
Nucléarsitol Robin.
Nucléatol Robin.
Nuclhémose.
Nutrobiase.
Œnophos.
Opocalcium.
Opocalcium irradié.
Oponuclyl.
Oposynergines.
Opotonine.
Orexyl.
Oriphol.
Ostéo-Hépatine.
Ostéline.
Ovo-Lécithine Billon.
Ovomaltine.
Ozobiase.
Pangaduine.
Panglandine.
Panhémol.
Parathyrocalcine Moncour.
Pépiodon Henry.
Pepto-Fer du Dr Jaillet.
Peptokola Robin.
Peptonate de fer Robin.
Peptone Vassal.
Persodine Lumière.
Phagolysine.
Phagosthyl.
Phiamine.
Phosoforme.
Phosol Quinet.
Phospharsol.
Phospharsyl.
Phosphate Pinard.
Phosphate Vital de Jacquemaire.
Phosphatine Falières.
Phospho-Fluor Beynet.
Phosphogaïacol Mary.
Phosphogénase.
Phosphopinal Juin
Phostaniol.
Phostyl.
Phyllossan.
Phytine Ciba.
Phytogénine Byla.
Pilules de Blancard.
Pilules Gyp.
Plurion Couturieux.
Poliol Churchill.
Polyminéral Fort.
Produits Pennès.
Prosthénase Galbrun.
Quassia-Kina Rabot.
Quassine Houdé.
Quina Baron.
Quinarsol antianémique.
Quinéine.
Quinium Roy.
Quinoïdine Duriez.
Quotidien (Le).
Réalphène.
Reconstituant Mary.
Réparateur Thuau.
Rhomnol.
Salins-du-Jura.
Sanas.
Sanguil.
Santhéose.
Sérodausse antitoxisényl.
Séroma.
Séro-sérum Rivier.
Sérosthényl Bouty.
Sérum ferrugineux Fraisse.
Sérum névrosthénique Fraisse.
Sidérarsan.
Sirop aux Hypophosphites Fellows.
Sirop de Blancard.
Sirop d'hémoglobine méthylarsiné Henry.
Sirop Famel.
Sirop Guilliermond.
Sirop minéral sulfureux Crosnier.
Sirop Reinvillier.
Sirop Roche au Thiocol.
Sirop Tinardon.
Somalgine.
Solution Bardet.
Spectrol.
Sténergine.
Stérogyl.
Sthénoléine.
Strychnal Longuet.

Sulfarsiode.
Sulfurine du Dr Langlebert.
Sylcase Grysa.
Synergyl Vadam.
Synthol.
Taburol Monal.
Thiocol Roche.
Tonikéine Chevretin.
Tonudol.
Total Tonic.
Tricalcine.
Triféryl.
Triganol Vigier.
Uvé.
Uvéstérol.
Vanadarsine Guillaumin.
Vanadine Chevrier.
Vanucléol.
Végéphos.
Vénécine.
Vin de Baudon.
Vin de Bugeaud.
Vin de Lavoix (voir Beef Lavoix).
Vin Girard.
Viosten.
Vioxyl.
Vitagéine.
Vital-extrait.
Vitamina.
Vitamine Rogier.
Vivoléol.
Zimbyl.
Zohol.
Zomo-Musculosine Byla.

XVI. — STOMATOLOGIE

Boricine Meissonnier.
Butelline.
Chloral Géranié.
Cachets du Dr Boveil.
Carbonal magnésien.
Gosiérine Dalloz.
Hypochloryl.
Inoléne.
Mésoforme.
Névoral Rafey.
Névrosol.
Parathyrocalcine Moncour.
Poudre Paterson.
Pulvéol.
Sanogyl.
Sanoram.
Scurocaïne.
Sirop Teyssèdre.
Scuroforme.
Stovarsol.
Synthol.
Tablette oxymenthol Perraudin.
Tiodine Cognet.

XVII. — SYPHILIS

Acétylarsan.
Algatan.
Arquéritol Lesure.
Banikol.
Benzo Bismuth Millot.
Biotermyl Monal.
Bismhydral.
Bismuthés Meurice.
Bismuthion Couturieux.
Bismuthoïdol Robin.
Bivatol.
Carbiodine.
Collobiase de sulfhydrargyre.
Comprimés Roy.
Curaluès.
Curiode.
Cynahermine.
Élixir Déret.
Élixir Spes.
Enésol.
Éranol.
Érythroluès.
Galyl.
Gambéol.
Globules Fumouze.
Granulés minéral sulfureux Crosnier.
Hectargyre.
Hectine.
Huile grise Ercé.
Ioda.
Iodalose Galbrun.
Iode organique Boissy.

Iodo bismuthate de quinine Fraisse.
Iodo-bismuth Ercé.
Iodogénol Pépin.
Iodo-Maïsine.
Iodone Robin.
Iodurase.
Iodure Philippe.
Kolarsine.
Lipogyre Ciba.
Lipoiodine Ciba.
Ludin.
Métarsenobenzol Saca.
Musculargyre.
Muthanol.
Néoby-Hg Trouette-Perret.
Néoïacol.
Néo Mésarca Roche.
Néo-Riodine.
Néo-Tréparsénan.
Novargyre.
Novarsénobenzol.
Oliolase Corbière.
Oxymuth Saca.
Pépiodon Henry.
Pilules de Blancard.
Pilules d'Hermal Bretonneau.
Pilules Lémary.
Pilules Philippe.
Préventyl.
Quinby.
Quinby soluble.
Quinimuthol Saca.
Riodine.
Rob Oberlin.
Salvatyl.
Scléramine Dausse.
Sirop de Blancard.
Sirop minéral sulfureux Crosnier.
Stovarsol.
Sulfarsiode.
Sulfoïdol Robin.
Sulfo Mésarca Roche.
Sulfo-Tréparsénan.
Sulfuryl Monal.
Suppargyres du Dr Faucher.
Suppositoires Corbière.
Tiodine Cognet.
Tréparsénans.
Tréparsol.
Trépol.
Trépoquinol.
Uroïodine.
Veinargyre.

XVIII. — SYSTÈME NERVEUX

A. D. Grosjean.
Alepsal Génévrier.
Alexime.
Algocratine.
Allocaïne Lumière.
Allonal Roche.
Ampoules Boissy.
Ampoules Churchill.
Ampoules de Pantopon Roche.
Ampoules de Spasmalgine Roche.
Ampoules névrosthéniques Dausse.
Anestile Bengué.
Antasthène.
Anti-épileptique de Liège.
Arrhénuclène Bergevin
Arsylène Roche.
Azygol.
Azotyl.
Bain Carré.
Ballotyl.
Balsoforme.
Béatol.
Belladénal Sandoz.
Belladone Dausse.
Bellafoline Sandoz.
Benzoflorine Julien.
Biocalcose Chevretin.
Biodynamine.
Biogénol Demasles.
Bionergyl.
Biophorine Girard.
Biophytol.
Borocalcyl Thévenot.
Borosodine Lumière.
Boues radio-actives Emania.
Bouchon Bouteille Emania.
Broméine Montagu.
Bromiase.
Bromogénol Pépin.
Bromo-Maïsine.

Bromone Robin.
Bromovose.
Cachets du Dr Boveil.
Calmossuppos sédatifs.
Cérébroïl Leysin.
Chloral bromuré Dubois.
Chloroforme anesthésique Lambiotte.
Colarsé.
Comitiol.
Comprimés Kléos.
Cytosérum Corbière.
Déclonal.
Dialacétine Ciba.
Dial Ciba.
Didial Ciba.
Doloma injectable.
Dragées du Dr Gélineau.
Dragées Hecquet.
Dragées névrosthéniques Yse.
Élixir Duchamp.
Erbamil.
Eudynol.
Euphytose.
Euronal.
Eusomnine Bélières.
Extrait de céréales Adrian.
Fer ovarine Vitalis.
Fluodyle.
Fondant de cola Dausse.
Fosfoxyl Carron.
Fosyls Carron.
Freinix.
Fusthénol Roze.
Gardenal.
Gelsémium Dausse.
Généserine.
Genhyoscyamine.
Génoscopolamine.
Génostrychnine.
Glycérophosphate Dalloz.
Glycérophosphates Jacquemaire.
Glycocarpine.
Glykolaine Robin.
Glyphospher.
Gouttes arsénosthéniques Dausse.
Gouttes phosphosthéniques Dausse.
Granulé Caresmel.
Granules de Pantofort du Dr Boveil.
Grassyl.
Hélital.
Hémofixine Branchu.
Hémoluol.
Hémypnal.
Histogénol.
Hyosciamine Houdé.
Intrait de Valériane Dausse.
Iodaselle Delamarre.
Ixium.
Lécithosine Robin.
Libérine.
Limol Churchill.
Lipocérébrine Chevretin.
Mayol Churchill.
Mangano-Phosphal Julien.
Marinol.
Mitigans Roxelane.
Musculosine Byla.
Kola granulée Astier.
Kolarsine.
Maté Douglas.
Narcotile Bengué.
Néo Rhomnol.
Nervocithine.
Neurène.
Neuréol.
Neurinase.
Neurobore.
Neuro-Pax.
Neuroplasma Fort.
Neuroplasmine Fort
Neurosine Prunier.
Neurotrol.
Neurotrophol Byla.
Névralgol Brossard.
Névrosthénine Freyssinge.
Nopirine Vicario.
Novobrol.
Nucléarrol Gabriel.
Nyctal.
Œnophos.
Opochol.
Oponuclyl.
Oriphal.
Ovolécithine Billon.
Panglandine.
Pantopon Roche.
Passiflorine.
Pavéron Dausse.
Pepto-Kola Robin.
Phosoforme.
Phosol Quinet.
Phosphate vital de Jacquemaire.

Phosphobrom.
Phospho-fluor Becquet.
Phosphogénase.
Phosphopinal Juin.
Phosthénine.
Phostyl.
Phylossan.
Physiosyamine.
Phytine Ciba.
Poliol Churchill.
Pyréthane.
Réparateur Thuau.
Rhoféine.
Rhomnol.
Rutonal.
Scurocaïne.
Sédatose.
Sédobrol Roche.
Sédol.
Sédoneurol Dehaussy.
Sédosine.
Sérum névrosthénique Fraisse.
Sidérarsan.
Sirop aux Hypophosphites Fellows.
Sirop du Dr Gélineau.
Sirop Reinvillier.
Solution Laroyenne.
Somnifène Roche.
Somnothyril.
Sonéryl.
Soporalose.
Spasmalgine Roche.
Spasmine Jolly.
Sténergine.
Stovaïne.
Strychnal Longuet.
Strychnarsitol Robin.
Sulfoïdol Robin.
Syncaïne.
Synthol.
Tablettes Hova (Hovalettes).
Taburol Monal.
Tartrate Borico-potassique Pachaut.
Tiodine Cognet.
Tonikéine Chevretin.
Total Tonic.
Tribromure Gigon.
Triféryl.
Valbornine Rogier.
Valéral Puy.
Valériane Byla.
Valérianate Gabail désodorisé.
Valérianate Grignon.
Valérianate Pierlot.
Valériane Pachaut.
Valérianose Gigon.
Valérium Paul Thibault.
Valérobromine Legrand.
Valéro-menthol.
Valéronal.
Vanadarsine Guillaumin.
Vanadine Chevrier
Végéphos.
Vériane Buriat.
Véronidia Buisson.
Vioxyl.
Viscosérum.
Viscum Zyma.
Vitagéine.
Vitamina.
Zohol.
Zomo-musculosine Byla.

XIX. — TUBERCULOSE

Adral.
A. D. Grosjean.
Algatan.
Aloysine.
Ampoules Churchill.
Ampoules de Spasmalgine Roche.
Amylodiastase Thépenier.
Angiolymphe du Dr Rous
Aniodol.
Antiphi.
Antiphymique Vadam.
Arsénicaux Bouty.
Arrhénal Adrian.
Arséniode Buriat.
Arsylène Roche.
Ascoléine Rivier.
Azotyl.
Bakolyse.
Balsamol Lescène.
Banikol.
Beef Lavoix.
Biocalcose Chevretin.
Bionergyl.

Biophytol.
Biotrigon.
Cachets du Dr Boviel.
Cachets Roche de Thiocol.
Calcium Sandoz.
Capsules Dartois.
Capsules de Morrhuine Puy.
Carboïodine.
Céréossine Dehaussy.
Cérinil.
Cériomine.
Chloro-calcion.
Cholergine.
Cineyl Grysa.
Clisémine Longuet.
Clupeyl.
Codoforme.
Colloïdogénine du Dr Bayl.
Colloïxols du Dr Riquoir.
Comprimés Roche de Thiocol.
Créosal Dubois.
Crysiodal du Dr E. Maigre.
Cupressus Dausse.
Curiode.
Cytoblase.
Cyto-Sérum Corbière.
Diases Progil.
Dicaliode.
Dioradin.
Doloma injectable.
Dragées pulmonaires Giry.
Elbon-Ciba.
Élixir Duchamp.
Elixir Dussaud.
Élixir thiogaïacolé Arquevaux.
Embryonine du Dr Barré.
Endocalcase.
Eniode Lefèvre.
Eranol.
Eucalcium.
Eucalyptine Le Brun.
Eucytol.
Féroxal Buisson.
Ferrophytine Ciba.
Fludiose.
Fluodyle.
Fortossan Ciba.
Fosfoxyl Carron.
Fusthénol Roze.
Gaduamine.
Gélocalcine.
Génatropine.
Globugénol Chanal.
Gloma.
Glyctone phosphatée Charrière.
Goménol.
Gouttes cholestérinées Dausse.
Gouttes livoniennes de Trouette-Perret.
Gouttes Nican.
Gouttes paldophiles.
Gouttes phospho-calciques.
Gouttes scandinaves.
Granulé Caresmel.
Granulé pulmonaire Giry.
Hélital.
Hémoantitoxine Sofos.
Hémofixine Branchu.
Hémoglobine Deschiens.
Hémostyl du Dr Roussel.
Héracléol.
Hipposarcine Roy.
Histogénol.
Huiles cholestérinées Dausse.
Huile Gallina.
Holos.
Ioda.
Iodarsenic Guiraud.
Iodaseptine Cortial.
Iodenterol.
Iodo-Maïsine.
Iodonucléol.
Ipeca-Digitale Dausse.
Lécithosine Robin.
Lipocalcine.
Lipospléninе du Dr Groc.
Malt Wander.
Marinol.
Micelliode.
Moréthyl Dausse.
Morrhualène Gautier.
Morrhuétine Jungken.
Morrhuol.
Morrhuxine.
Musculosine Byla.
Narcyl Grémy.
Néocalciline.
Neuroplasma Fort.
Neuroplasma Massif.
Neuroplasmine Fort.
Nucléarrol Gabriel.
Nucléarsitol Robin.
Nuclhématose.

Oliolase Corbière.
Opocalcium.
Opocalcium irradié.
Orexyl.
Ozobiase.
Panbiase antiphymique.
Panbiline.
Pangaduine.
Panhémol.
Parathyrocalcine Moncour.
Paratoxine.
Pélospanines.
Pépiodon Henry.
Pepto-Fer du Dr Jaillet.
Péraziodol.
Perles taphosote Lambiotte.
Persodine Lumière.
Phagolysine.
Phagosthyl.
Phiamine.
Phospharsyl.
Phosphate Pinard.
Phosphate vital de Jacquemaire.
Phospho-fluor Beynet.
Phospho-galacol Mary.
Phosphogénase.
Phosphopinal Juin.
Phosol Quinet.
Phosote Lambiotte.
Phostaniol.
Phytine Ciba.
Phytogénine Byla.
Pneumocratol.
Pneumostyl Daguin.
Polyminéral Fort.
Poudre Paterson.
Quina Baron.
Rézyl.
Rhizotanin Chapotot.
Sanas.
Scléramine Dausse.
Séruma.
Sérum végétal du Dr Cuguillière.
Sérum ferrugineux de Fraisse.
Sidérarsan.
Sirop Brahma.
Sirop d'hémoglobine méthylarsiné Henry.
Sirop Famel.
Sirop Guilliermond.
Sirop Lanchat.
Sirop phéniqué Vial.
Sirop Reinvillier.
Sirop Roche au Thiocol.
Solution Pautauberge.
Soluprotine Roche.
Somalgine.
Spasmalgine Roche.
Spectrol.
Sthénoléine.
Strychnal Longuet.
Sulfoléine Rozet.
Sylcase Grypsa.
Tablettes oxymenthol Perraudin.
Tébéphaguine Fornet.
Thalassotonine Vadam
Thiocol Roche.
Tiodine Cognet.
Tonikéine Chevretin.
Total Tonic.
Tricalcine.
Tridynol.
Triganol Vigier.
Triradol.
Tubérol.
Uroïodine.
Uvé.
Uvéstérol.
Vanadarsine Guillaumin
Vanadine Chevrier.
Vanucléol.
Végéphos.
Vin de Baudon.
Vin de Lavoix (voir beef Lavoix).
Viosten.
Vioxyl.
Zimbyl.
Zomo-musculosine Byla.

XX. — TUMEURS - CANCER

Algocratine.
Aniodol.
Backérine.
C. 40.
Cachets du Dr Boviel.
Carbonal princeps.

Chéloïdine.
Clisémine Longuet.
Diachusine.
Doloma.
Doloma injectable.
Ixium.
Mésothorium Buisson
Néolyses.
Néoplalysines du Dr Riquoir.
Œnophos.
Patholysine.
Pellicules radifères du Dr Vallet.
Plurion Couturieux.
Pyréthane.
Radiolysine.
Sédol.
Séléniol.
Verrulyse.





2e Partie

DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES



ABSURIC

Le meilleur solvant de l'acide urique
Le plus puissant antiseptique urinaire

Composition. — Citro-lactate de lithine, Pipérazine, urotropine, sulfosalicylate de quinoléine.

Indications. — Affections des reins et de la vessie (néphrites, pyélo-néphrites, cystites, urétrites, etc.), Gouttes, arthritisme, gravelle, rhumatismes, artériosclérose, dysenterie amibienne.

Posologie. — 4 à 6 cuillerées à café par jour dans un demi verre d'eau sucrée.

Laboratoire BÉLIÈRES
19, Rue Drouot PARIS (IXe)

ACÉCOLINE

Chlor. d'acetylcholine stabilisé
Contrôlé par essais physiologiques.

Propriétés thérapeutiques :
Hormone dilatatrice des artères. Stimulant du pneumogastrique. Antgaoniste de l'adrénaline.

Indications :
Affections vasculaires périphériques et *Accidents de l'Hypertension artérielle* (Spasmes des artères, Syndrome de Raynaud, Sclérodermie, Vertiges, Doigt mort, Mouches volantes, etc.).

Hypovagotonies :
(Déséquilibre neuro-végétatif, Atonie des fibres lisses, Tachycardie paroxyst., Iléus, Sueurs des tuberculeux, etc.

Présentation et mode d'emploi :
Ampoules contenant chacune 2,5 ou 10 centigr. de chlor. d'Acétylcholine stabilisé.
S'administre exclusivement par voie sous-cutanée. Pas de douleur, pas d'intolérance.
La dose active doit être appropriée aux réactions propres de chaque sujet.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT
Docteur en Pharmacie, 52, rue La Bruyère— PARIS

ACÉSINE GUILLAUMIN

Composition. — L'Acésine est une pommade à base d'extrait de capsules surrénales de chlorétone et de stovaïne.

Propriétés. — Agent analgésique et vasoconstricteur dont les propriétés peuvent être utilement mises à profit, en particulier, dans le cas d'hémorroïdes externes ou internes.

Indications. — Hémorroïdes, fissures et prurit de l'anus, démangeaisons de la même région, engelures, gerçures.

Mode d'emploi. — L'Acésine se présente en tubes d'étain. On applique gros comme un pois de la pommade sur les hémorroïdes externes ; quand les hémorroïdes sont internes, visser sur le tube, la canule qui l'accompagne et introduire la pommade dans le rectum. Renouveler les applications trois ou quatre fois par jour.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN
13, rue du Cherche-Midi — PARIS

ACÉTYLARSAN

(Oxyacétylaminophénylarsinate de diéthylamine).

Traitement intensif de la Syphilis par voies sous-cutanée ou intra-musculaire

Activité thérapeutique sensiblement égale à celle des arsénobenzènes.
Injections véritablement indolores.
Extrême facilité d'emploi.
Très faible toxicité.

ACÉTYLARSAN POUR ADULTES
Solution à 23,6 %. — 1 cc. = 5 cgr. d'Arsenic.
Ampoules de 3 cc.

ACÉTYLARSAN INFANTILE
Solution à 9,4 %. — 1 cc. = 2 cgr. d'Arsenic.
Ampoules de 2 cc.

Boîtes de 10 ampoules.

Labor. des Produits "USINES DU RHONE"
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII[e])

ACODROS

Composition. — Préparation à base d'aconitine stabilisée, XX gouttes contiennent 1/10e de milligramme d'Alcaloïde.

Action thérapeutique. — Décongestif, sédatif, analgésique, diaphoritique.

Indications. — Grippe, coryza, inflammations et infections de l'appareil respiratoire.

Mode d'emploi. — *Adultes* : XV à XX gouttes 2 à 3 fois par jour dans un liquide quelconque.

Enfants (au-dessous de 5 ans) : 2 gouttes par année d'âge.

Laboratoires BOUVELOT
62, rue d'Antibes, Cannes (A.-M.).

ACOLITOL

Topique intestinal.

Composition. — Charbon organique pur à pouvoir d'adsorption élevé. Carbonate de calcium pur amorphe, salicylate de Bismuth, Phosphate tribasique de Calcium pur, Peroxyde de magnésium, Belladone pulvérisée titrée.

Forme. — Poudre très fine, de goût agréable.

Propriétés. — Topique intestinal de choix, neutralisant et sédatif. Régularise les réactions chimiques du milieu intestinal, entrave les fermentations anormales et les putréfactions, modifie la flore microbienne, adsorbe les toxines.

Indications. — Colites, entéro-colites, typho-colites, stases colitiques, fermentations acides, dysenteries, entérites des tuberculeux.

Doses. — 1 cuillère à dessert délayée le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau tiède, et 1 cuillerée à café délayée dans 1/2 verre d'eau 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.

LANCOSME
71, avenue Victor-Emmanuel-III, PARIS (VIIIe).

A.-D. GROSJEAN

Composition. — Solution isotonique renfermant les principes actifs des bulbes frais de chevaux. Produit extractif obtenu en milieu réducteur camphré.

Forme. — Délivré en boîtes de 12 ampoules 3 cm³ avec petit dispositif permettant les instillations nasales.

Indications. — Affections cytotoxiques ou spasmodiques du rhino-pharynx et des organes respiratoires: coryzas, rhumes de cerveau, rhumes des foins, coqueluche, mal de mer, asthme, rhinites, sinusites, laryngites, grippes, trachéites et bronchites.

Posologie. — Une à dix ou douze ampoules par jour.

Laboratoires GROSJEAN
8, rue Lafayette, PARIS (9e).

ADOVERNE " ROCHE "

Glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*

Action thérapeutique. — Cardiotonique, diurétique, eupnéique, neuro-sédative. Complète, remplace ou continue l'action de la digitale.

Indications thérapeutiques. — Toutes les insuffisances cardiaques et rénales. — Asthénies cardiaques, dyspnée, arythmies, œdème pulmonaire, œdèmes périphériques, hydropisies etc.

Avantages. — Étalonnage physiologique. — Activité optima toujours identique. — Toute l'action utile de la plante elle-même. — Pas d'accumulation. — Pas d'accoutumance. — Pas de toxicité aux doses thérapeutiques. — Emploi facile. — Tolérance remarquable.

Posologie. — XXX gouttes ou 4 granules = 1 c. c. d'une solution à 5 ‰ des glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

Modes d'emploi. — Par voie buccale = XV à XXX gouttes ou 2 à 4 granules 1 à 2 fois par jour et plus dans un peu de tisane ou de liquide.

Adoverne " Roche "

Gouttes (flacon de 15 c. c.).
Granules (flacon de 60).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
21, place des Vosges, Paris (IIIe).

ADRAL

Constitution. — Poudre d'Algues sélectionnées, stabilisées, et privées de leurs sels minéraux.

Principes actifs. — 1° *Iode combiné organique :* modificateur le plus puissant de l'assimilation générale.

2° *Éléments organiques de choix :* Protéines, Graisses. Hydrates de Carbone.

Indications. — *Suraliment spécifique* pour bacillaires, convalescents et amaigris.

Avantages. — *Augmentation* rapide du poids des malades.

Formes. — *Cachets pour Adultes :* 2 à 5 par jour.

Granulé pour Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, Rue de Bourgogne — PARIS

ADRÉNALINE

" Usines du Rhône "

Scurénaline

Adrénaline synthétique lévogyre Codex chimiquement pure "Usines du Rhône" en solution stable au millième.

Flacons de 10 et 30 cc.
Boîtes de 5 ampoules de 1 cc.

Laboratoire des Produits
" USINES DU RHONE "
21, Rue Jean-Goujon
PARIS (VIII[e])

ADRÉNALINE INVAR

Produit soumis au contrôle physiologique le plus rigoureux, donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Vaso-constrictive, hémostatique stimulant circulatoire, coexcitant du sympathique, fixation du calcium.

Indications. — Rachitisme, coqueluche, tuberculose, dyspepsies atoniques, hyposthénies, asthme, hémoptysie, etc.

Formes. — Ampoules 1 c. c. boîtes de 6 et 12 au 1/4 de millig. au 1/2 millig., au millig. Solution au millig., flacons 5, 10, 30 gr

Pharmacie Centrale des Pharmaciens de France
21, rue des Nonnains-d'Hyères. — PARIS (IVe).

ADRENINE

Action. — L'**ADRENINE** possède une action :
1° Sur la pression sanguine ;
2° Sur le cœur ;
3° Sur les fibres musculaires lisses et plus électivement sur celles des petits vaisseaux ;
4° Sur la nutrition.

Posologie :
Per os **C** gouttes à dose fractionnées (toutes les heures, par exemple).
Injections sous-cutanées, 1 à 10 mmgr. par séries d'injections dans les 24 heures.

Pharmacie du Dr MIALHE
8, rue Favart — PARIS

ADRÉNOCALCINE

Recalcifiant par excellence.

Formes :

Poudres. — Cachets. — Granulés.

Composition :

Association de glycérophosphates, hypophosphites, phosphates, fluorure de chaux et magnésie.

Posologie :

3 doses par jour.

Laboratoire ADAM

Docteur en pharmacie,
à Granville (MANCHE)

ADRÉNOLÉINE

INHALANT

Forme pharmaceutique et composition. — *Huile adrénalinée* au millième, avec addition de chlorétone, orthoforme et essences antiseptiques.

Propriétés. — Produit employé en otho-rhino-laryngologie : vaso-constricteur, sédatif, antiseptique.

Avantages. — Tandis que l'adrénaline en solution aqueuse a une action *passagère*, l'adrénaline en solution *huileuse* étant absorbée plus lentement, sa *durée* d'action est considérablement *augmentée*, le pouvoir vaso-constricteur étant aussi élevé.

Indications thérapeutiques. — Sinusite, hémorragie nasale, coryza spasmodique, rhume des foins, catarrhe nasal. Troubles respiratoires et coryza de l'enfance adénoïdites aiguës.

L'adrénoléine ne presente aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — En instillations (III à V gouttes dans chaque narine) 2 à 3 fois par jour, et en pulvérisations nasales avec un appareil à huile non métallique *avant* les inhalations.

Prescription. — Un flacon *Adrénoléine* Falvy.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès-sciences
Ex-interne, Lauréat des hôpitaux de Paris.
40, rue des Acacias, Paris (XVII[e])

ADRÉPATINE

POMMADE — SUPPOSITOIRES

Association puriglandulaire

Composition. — *Extraits d'Organes* : Foie. Surrénale, Thyroïde. Hypophyse, Prostate.
Extraits Végétaux : Marron d'Inde frais stabilisé. Cupressus, Hamamélis.
Excipient Antiseptique et Calmant

Propriétés et Indications thérap. — *L'Adrépatine* est une préparation pharmaceutique qui :

1° Par les extraits polyglandulaires englobés ;
2° Par les propriétés hypertensives de certains de ses composants ;
3° Par son action vaso-constrictive locale :
4° Par son excipient à la fois anesthésique et antiseptique est destinée à combattre non seulement l'expression anatomique et les complications de l'affection primitive. mais encore à remédier aux troubles organiques et fonctionnels qui président à la formation des hémorroïdes. Son emploi est tout spécialement indiqué dans le traitement des *Hémorroïdes internes et externes, des Rectites et Prostatites, du Prurit anal, des Fistules.*

Mode d'emploi. — De 1 à 3 suppositoires (ou applications de pommade) par 24 heures. Le tube de Pommade est muni d'une canule rectale.

Laboratoires LALEUF
20, rue du Laos — PARIS (XV°)

ADRIALGINE

Composition. — Dragées à base de triméthylxanthine et d'acide acétyl salicylique purs.

Action. — Antithermique, analgésique.

Indications. — Migraines, névralgies, douleurs intercostales, névrites, fièvre, grippe, rhumatisme, etc.

Mode d'emploi. — 1 à 2 dragées au moment des crises violentes.

ADRIAN et C^ie^
9 et 11, rue de la Perle — PARIS

ADRIANINE

Composition. — Chlorhydrate d'adrénaline naturelle, retirée des glandes surrénales.

Avantages. — Action plus puissante et plus constante que celle de l'adrénaline synthétique.

Action. — Vaso-constricteur, décongestionnant, hypertenseur.

Indications. — Toutes celles de l'adrénaline.

Formes. — *Granules* dosés à 1/4, 1/2 et 1 milligramme

Ampoules dosées à 1/2 et 1 milligramme.

Solution. — Demi-flacon, grand flacon à prendre par gouttes.

ADRIAN & Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS

AÉROPHAGYL

Boîte de 5 comprimés.

Indications. — Spécifique de l'*Aérophagie* et de ses conséquences : insomnies, troubles cardiaques, nerveux et pulmonaires.

Posologie. — 1 comprimé délayé dans un demi-verre d'eau, au milieu des repas. En cas de crise 2 comprimés à la fois. Enfants 1/2 doses.

Composition. — Combinaison complexe constituée par l'association à une faible dose d'uroformine du citrate de sodium et des ions Br. et Ca.

Échantillons;

Pharmacie RATIONNELLE

20, faubourg Poissonnière, Paris.

ÆTHONE

Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche et de la Toux.

Doses. — Pour les enfants, administrer :

5 à 6 fois par jour :
- de 1 mois à 1 an : Une goutte par mois d'âge.
- de 1 à 2 ans : 12 à 20 gouttes.
- de 2 à 5 ans : 20 à 25 gouttes.
- de 5 à 10 ans : 25 à 30 gouttes.
- de 10 à 15 ans : 30 à 35 gouttes.

et plus s'il est nécessaire.

2° Pour les adultes, administrer : 5 à 6 fois par jour : 50 à 60 gouttes dans une quantité suffisante d'eau sucrée ou de sirop de tolu additionné d'eau. La dose totale pour les adultes peut être portée à 400 gouttes par 24 heures, s'il est nécessaire. L'Æthone doit être administré 1/2 heure avant, ou 2 heures après le repas.

FALCOZ et Cie,

9, rue Boissonade — PARIS

AGAMÉTOL

Traitement rationnel du paludisme.

Solution aqueuse à base de formiate de quinine dont la teneur en quinine (87,56 %) en fait le plus actif de tous les sels de cet alcaloïde.

L'*Agamétol* étant une solution rigoureusement neutre et stérile, *ne précipite pas* en présence du sérum sanguin. De ce fait, il est totalement indolore et ne provoque jamais ni réactions inflammatoires ni abcès.

Deux modèles :

Boîte de 12 ampoules 0,25, 2 c. c.
Boîte de 12 ampoules 0,50, 2 c. c.

Échantillon gratuit et notice au Corps Médical sur demande.

Laboratoires des Établissements H. SALLE

4, rue Elzévir — PARIS (IIIe).

AGARASE

Composition :

Comprimés à base d'agar-agar, de ferments lactiques et d'extraits végétaux.

Action :

Réveille la tonicité de l'intestin, lubrifie la muqueuse, dissocie le bol fécal, supprime les fermentations.

Avantages :

Petits comprimés très faciles à avaler ; enrobage soluble dans l'intestin évitant les réactions gastriques ; répartition de la dose active en plusieurs comprimés, ce qui évite une action brutale sur un segment isolé du tube digestif.
Pas d'accoutumance, pas de coliques.

Indications :

La constipation sous toutes ses formes, colites, entéro-colites, entérite muco-membraneuse, appendicite chronique.
Céphalées, obésité, artériosclérose, affections du foie.
Dermatoses.

Mode d'emploi :

Trois comprimés à chacun des trois principaux repas à prendre avec une gorgée d'eau sans croquer.
Pour les enfants, deux comprimés à chacun des trois repas.

Laboratoire REAUBOURG
1, rué Raynouard — PARIS

AGOCHOLINE

Stimulant hépato-biliaire.

Forme.

Granulé soluble agréablement aromatisé.

Composition.

Sulfate de magnésie desséché,
Peptone sèche purifiée.

Propriétés thérapeutiques.

Excite la sécrétion et l'excrétion biliaires.
Réalise le drainage des voies biliaires *per os*, et le rend facile en clientèle.

Indications.

Congestion du foie et de la vésicule biliaire,
Lithiase biliaire,
Ictère et Cholémie.
Cholécystites chroniques,

Certains troubles digestifs : Gastropathies réflexes, Inappétence, Nausées, Constipation.

Certains troubles généraux : Céphalée, Migraines, Asthénie, Vertiges, Urticaire et Prurit, Certaines dermatoses.

d'origine hépato-biliaire.

Contre-Indications. (Temporaires.)

Cholécystites aiguës
Diarrhées aiguës.

Posologie.

Une à trois cuillerées à café dans un demi verre d'eau chaude le matin à jeun, une demi heure avant le petit déjeuner. Faire coucher ensuite le malade un quart d'heure sur le côté droit.

Commencer par les doses faibles surtout chez les malades présentant une grande sensibilité vésiculaire, les hépatiques diarrhéiques, les lithiasiques ; et augmenter graduellement jusqu'à trois cuillerées à café.

Ce traitement devra être répété dix à quinze jours par mois.

Laboratoire P. ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie.
Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux
Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux

24 et 26, Rue de Fécamp — PARIS (XII[e])

AGOMENSINE CIBA

Substance protéidique extraite de l'ovaire, soluble dans l'eau.

Action Physiologique. — Favorise le flux menstruel, accélère le développement des organes et l'apparition des caractères sexuels secondaires.

Indications :

I. — Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles trop espacées.

II. — Maladies qui précèdent ou qui accompagnent l'installation de la menstruation.

III. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale.

IV. — Douleurs viscérales et malaises généraux liés à un flux peu abondant.

Comprimés — Ampoules

Doses. — 3 à 9 comprimés par 24 heures, 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Le flacon de 20 comprimés : 13 francs.
La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

(Voir Sistomensine)

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, place Morand — LYON

AIROGLYCE

Composition. — Préparation bismuthée (oxyiodogallate de bismuth spécialement porphyrisée) de consistance sirupeuse, de couleur café au lait.

Mode d'action. — Réalise le pansement et l'antisepsie de la muqueuse urétrale.

Indications. — Blennorragie aiguë (à la période du déclin). Blennorragie chronique, en association à la médication locale (dilatation, massages, etc.).

Mode d'emploi. — Après avoir uriné et agité le flacon, injecter, à l'aide d'une seringue urétrale, 5 cc. de liquide, conserver l'injection 2 minutes, puis prolonger progressivement jusqu'à 5 minutes. Eviter d'uriner autant que possible après l'injection.

Laboratoires PIALOUX
55, rue de Chabrol — PARIS (X^{e}).

AIROL " ROCHE "

Combinaison basique de bismuth oxyiodé donnant, au contact des plaies, de l'*iode à l'état naissant*.

AIROL " Roche ", en poudre.

Prop. thér. — Antiseptique puissant, désinfectant, cicatrisant, kératoplastique, sans odeur, inaltérable à la lumière ; toxicité moindre que celle de l'iodoforme (dont l'*Airol " Roche "* est le seul succédané pratique).

Indic. thér. — Toutes celles de l'iodoforme. Bien spécifier la marque " Roche ".

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie

21, Place des Vosges — PARIS

ALBUPLAST VIGIER

Composition.

Sparadrap adhésif caoutchouté à l'oxyde de zinc.

Avantages.

Suppression des bandes de pansement. — Préparé avec des substances adhésives de première qualité. — Ne se décolle jamais. — Supporté par des épidermes des plus délicats. — Se conserve très longtemps.

Indications.

Contention des pansements. — Traitement des dermatoses (urticaire, érythème polymorphe, ichtyose, furonculose).

Laboratoires VIGIER

9, rue de la Gare, Levallois-Perret.

ALEPSAL GENEVRIER

Calmant non déprimant.

Spécifique de l'Epilepsie, des Insomnies, des Convulsions. On l'emploie également avec succès, comme Hypnotique et Antispasmodique dans : Angines de Poitrine, Asthme, Spasmes du Larynx, cardiaques, vasculaires, etc.

Chaque comprimé renferme 0,10 de Phényléthylmalonylurée très pure associée à la Belladone stabilisée et à la Triméthylxanthine.

Posologie. — 2 comprimés par jour, matin et soir absorbés purs ou dans une boisson chaude. AUCUN RÉGIME SPÉCIAL.

« Avec l'ALEPSAL, les convulsions disparaissent sans observer de troubles psychiques ; l'intelligence de l'ÉPILEPTIQUE s'éveille et son activité s'accroît normalement. » (Dr Ducoste, médecin chef des Asiles de la Seine).

Contre-indications. — Néant.

Prix : Le tube : 9 francs.

Laboratoire GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY-PARIS

ALEXIME

Anciennement " ALEXINE "

Composition. — Préparé par le procédé de Joulie est de l'acide phosphorique solidifié, assimilable, hyperactif.

Les résultats de l'ALEXIME sont remarquables et constants dans tous les états de déchéance organique.

Indications. — Anémies, Phosphaturie, Déminéralisation, Prétuberculose, Neurasthénie, Fatigue, Faiblesse, Impuissance.

Posologie. — 4 cuillerées à café par jour.

Échantillons et Littérature aux Laboratoires de l'ALEXIME

49, rue de Bitche, à COURBEVOIE (Seine)

ALGAROL BEAUCOURT

Composition. — Benzoiodhydrate de caféine, hyosciamus et lobelia inflata.

Forme. — Globules glutinisés, d'ingestion facile sans influence sur la paroi stomacale.

Indications. — Emphysème pulmonaire ; asthme catarrhal ; sclérose pulmonaire.

Posologie. — 3 globules matin et soir (6 par jour).

Produits BEAUCOURT
71, rue du Commerce, Paris (XVe).

ALGATAN

Composition. — Hyposulfi-iodotannate de soude en milieu sulfocalcique fluoré. (Iode entièrement assimilable sans iodisme.)

Formes. — Cachets dosés à 1 gr.,
Comprimés dosés à 0 gr. 50

Indications thérapeutiques. — *Tuberculose pulmonaire, intestinale et osseuse. Artério-sclérose. Emphysème. Asthme. Catharre bronchique. Affections cardio-vasculaires, Rachitisme, Tertiarisme. Déchéance physique.*

Dose et mode d'emploi.

Adultes : 2 à 6 cachets ou 4 à 12 comprimés par jour.
Enfants de 3 à 5 ans : 1/2 cachet ou 1 comprimé par jour.
Enfants de 5 à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés par jour.
Enfants de 10 à 15 ans : 2 cachets ou 4 comprimés par jour (au moment des principaux repas).

Laboratoires de L'ANIODOL
40, rue Condorcet — PARIS

ALGOCRATINE

(Citrate de Phénylamidoxanthine)

Forme. — Cachets de 0 gr. 75.

Indic. thér. — Migraines, névralgies, sciatiques. En général toute douleur d'origine nerveuse. Recommandée particulièrement dans les cas de *règles douloureuses*.

Posologie. — Un cachet dès les premiers symptômes de douleurs, un autre une heure après si nécessaire.
Trois cachets par 24 heures.

Littérature, Échantillons :

LANCOSME
71, Av. Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII[e])

ALIBOURINE

Formes :

1° **Pommade** en tube de 50 grammes environ.

Composition :

Sulfates de zinc et de cuivre chimiquement purs, Camphre, Oxyde de zinc, Essence de Niaouli, Extrait d'Hamamélis et de Millepertuis, Lanovaseline.

Indications :

Eczémas suintants, Impétigo Teigne, Plaies, Ulcères variqueux, Érysipèle.

2° **Solution concentrée :** Flacon de 60 cc.

Composition :

A base de sulfates de cuivre et de zinc purs, donne diluée dans un litre d'eau, une solution se rapprochant d'une Eau d'Alibour un tiers et chimiquement pure. Ces deux préparations n'irritent jamais.

Laboratoires B. E. A.
Ch. BEHA, Pharmacien de 1[er] Classe **BELFORT**

ALIMENT TINARDON

Nutrition — Recalcification — Reminéralisation

Forme. — Poudre dosée pour la préparation, soit au lait, soit à l'eau, d'un entremets agréable,

Composition :

Carbonate de chaux.	0 30	Lactose.....	2 30
Phosphate de chaux.	0 20	Caséine purifiée....	0 50
Glycéroph. de chaux.	0 05	Arrow Root.....	4 »
Magnésie calcinée....	0 05	Sucre.....	12 »
Eléments céréalo-légumineux.....	5	Cacao vanillé.....	8 50

pour 2 mesures

Posologie. — *Enfants :* 1 à 2 mesures par jour.
Adultes : 2, 3 ou 4 — —

Indications. — Dégénérescence infantile, Scrofule. Convalescence chez l'enfant et l'adulte.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1re Classe, de l'École Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS

ALLISATINE " SANDOZ "

Tous les principes de l'Allium Sativum fixés sur du charbon activé et présentés en dragées, inodores, insipides.

Tolérance parfaite. Stimulant des fonctions gastriques, puissant anti diarrhéique. Hypotenseur.

Dose. — 2 dragées Allisatine, trois fois par jour à la fin des repas.

Produits SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (Xe)

M. CARILLON, pharmacien de 1re classe.

Dépôt général et vente :

Usine des Pharmaciens de France,
125, rue de Turenne — PARIS (IIIe)

ALLOCAÏNE LUMIÈRE

Constitution.

L'*Allocaïne Lumière* est un corps synthétique qui répond à la formule :

$$C^6 H^4 < \begin{matrix} Az\ H^2 \\ CO^2\ C^3\ H^4\ Az\ (C^2 H^6)^2\ Hcl \end{matrix}$$

Propriétés.

1° L'Allocaïne Lumière est sept fois moins toxique que la Cocaïne
2° Son pouvoir anesthésique est égal à celui de la Cocaïne ;
3° Mêmes emplois que la Cocaïne.

Formes.

Solution A à 1/2 % pour anesthésie locale....	1 a.	25 cc.
Solution AA à 1 % pour anesthésie locale....	3 a.	10 cc.
Solution B à 2 % pour anesthésie régionale..	6 a.	2 cc.
Solution B à 2 % pour anesthésie régionale..	50 a.	2 cc.
Solution BB à 2 % pour art dentaire.....	100 a.	1 cc.
Solution C à 5 % pour rachianesthésie.....	6 a.	3 cc.
Solution J à 10 % pour badigeonnage usage externe et divers.....	5 a.	2 cc.

PRODUITS SPÉCIAUX
des LABORATOIRES A. LUMIÈRE
M. SESTIER, Pharmacien
9, Cours de la Liberté, Lyon.

ALLONAL " ROCHE "

ANALGÉSIQUE RENFORCÉ

Action thérapeutique. — L'**Allonal Roche** est l'isopropylallylbarbiturate de diméthylamido-antipyrine, il représente les propriétés calmantes bien connues de la diméthylamido-antipyrine augmentées des propriétés sédatives et hypnogènes de l'acide isopropylallylbarbiturique (C^{10} H^{14} O^3 Az^2).

Indications thérapeutiques. — Douleurs, abcès, névralgies empêchant le sommeil ; **insomnies légères** ou **tenaces** associées à des phénomènes douloureux ou infectieux ou causées par le **surmenage, la fatigue, la neurasthénie**, agitation, excitation, délires, etc.

Avantages. — L'**Allonal Roche** ne contient ni opium, ni morphine, ni scopolamine, ni hyoscine, ni aucune substance du tableau B. Il peut être utilisé avec succès dans un grand nombre de cas où l'opium et la morphine sont indiqués. Il n'est pas toxique aux doses thérapeutiques qui peuvent être d'ailleurs largement dépassées ; il ne donne pas lieu à des phénomènes d'accoutumance et il est toujours bien supporté ; il calme la douleur, apaise l'excitation, donne un sommeil calme, physiologique, suivi d'un réveil normal ; il n'a **aucune action nocive** ni sur le cœur, ni sur les reins, ni sur les poumons.

Comprimés.

Chaque flacon contient 12 comprimés. Chaque compr. = 0, 16 isopropylallylbarbiturate de diméthylamido-antipyrine.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 compr. p. 24 h. et plus selon les cas. Avaler les comprimés sans les croquer, av. un peu d'eau ou de tisane 1/2 h. av. ou 2 h. après les prises d'aliments.

Produits

F. HOFFMANN - LA ROCHE & Cie

21, Place des Vosges — PARIS (IIIe)

ALOÏNE HOUDÉ

Granules titrés à 2 centigrammes.

Doses et mode d'emploi :

Comme laxatif :

1 à 2 granules le soir en mangeant.

Comme purgatif :

3 à 4 granules le soir en se couchant.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS

ALOYSINE

Pilules à base de suc d'ail

Sans saveur, sans odeur, ne communiquant à l'haleine aucune odeur alliacée.

Indications. — Entérites. Hypertension artérielle, Tuberculose, Bronchites chroniques, Catarrhes, Gangrène pulmonaire. Urticaire.

Posologie. — 6 à 8 pilules par jour (dans le traitement de l'hypertension interrompre 48 heures tous les 2 jours).

Pommade Aloysine. — Tuberculoses externes. Plaies suppurées, Dermatoses, etc.

Laboratoire GOUZÈNE à PANTIN (Seine)

Dépôt général et vente en gros :

Pharmacie Centrale des Pharmaciens de France, 21, rue des Nonnains d'Hyères — PARIS (IVe)

ALUCOL WANDER

(Hydrate d'alumine colloïdal)

Réducteur d'HCl.
Traitement sédatif et curatif de l'hyperchlorhydrie et de l'auto-intoxication intestinale.
1° Protection de la muqueuse stomacale par le mucilage colloïdal que forme l'ALUCOL au contact du suc gastrique hyperacide.
2° Fixation par cette masse mucilagineuse des principes fermentescibles et entéro-toxines.

Formes. — Cachets, comprimés et paquets.

Les paquets (dose spéciale 3 gr., pour pansement gastrique et traitement des états aigus.

Doses. — Un à deux cachets ou comprimés une heure avant et une ou deux heures après chacun des principaux repas. Le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau sucrée, le matin à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner et environ deux heures après le repas, midi et soir.
Le traitement peut être renforcé sans inconvénient suivant l'avis du médecin

Établissements WANDER
58, rue de Charonne — PARIS (XI°)

ALUNOZAL

(Salicylate basique d'Alumine U. R.)

L'ALUNOZAL libère, dans l'intestin seulement, l'alumine dont l'état gélatineux intensifie le pouvoir d'absorber les toxines et les propriétés astringentes. Ces effets sont heureusement complétés par l'action analgésique du salicylate alcalin formé.

ANTIDIARRHÉIQUE PUISSANT

(Diarrhées aiguës et chroniques. Diarrhées des tuberculeux. Diarrhées des nourrissons).

Tolérance stomacale parfaite. Toxicité nulle.

Présentation et mode d'emploi.

1° Comprimés à 0 gr. 50 (tubes de 20), 2 à 10 *pro die.*
2° Granulés à 25 %. Une faible cuillerée à café correspond à 1 comprimé.

Labor. des Produits "USINES DU RHONE"
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII°)

AMIBIASINE

(Extrait de garcinia composé).
(*Accepté par le Service de Santé*).
Non toxique — Sans contre-indications.

Solution brune stabilisée, de saveur amère.

Action. — Antiparasitaire et bactéricide puissant. Calmant des douleurs abdominales, du ténesme. Antihémorragique et antidiarrheique énergique. Agit sur l'amibe et ses kystes.

Indications. — Diarrhées de toutes natures et origines. — Dysentérie amibienne, bacillaire. — Entérites chroniques, muco-membraneuse, tuberculeuse. — Diarrhée infantile, cholériforme.

Dose :

Formes aiguës :	6 à 12 cuill. à café « pro die »			pendant	1 à 2 jours
Formes chroniques :	3 à 6	—	—	—	4 à 5 jours

Diarrhée infantile. Formuler : Amibiasine B. B. ou

Manne en larmes	5 gr.
Eau bouillie.....	10 gr.
Amibiasine.....	15 gr. (3 cuill. à café).

(Dose à donner dans la journée et répéter pend. 3 à 4 jours)
Remplacer le lait par l'eau bouillie ou eau de riz sucrée

Littérature et échantillons

Laboratoires AMIBIASINE
58, rue de Miromesnil — PARIS

AMIDAL

Amidon paraffiné — Ferments lactiques.

Forme. — Poudre, comprimés, cachets.

Indications. — Fermentations intestinales, constipation, entérite muco-membraneuse, selles fétides, diarrhées, dysenterie, entérites symptomatiques des maladies aiguës, choléra infantile, entérite tuberculeuse, putréfactions intestinales, source d'artério-sclérose, appendicite chronique.

Mode d'emploi. — Deux à trois cuillerées à soupe ou six à huit comprimés ou cachets par jour.

Laboratoire AMIDO
A. BEAUGONIN, pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV^{e})

AMINO-SEL BYLA

(en flacons-salières)

Composition. — Renferme des corps chimiquement définis, *extraits des féculents et des fruits* : glutamates et tartrates alcalins.

Propriétés. — *Condiment hautement sapide*, absolument inoffensif, de conservation indéfinie. Communique aux aliments *la véritable saveur* du SEL, en même temps que l'arôme de la viande.

Indications. — Tous régimes achlorurés et déchlorurés, albuminurie, affections circulatoires, hépatiques, néphrites aiguës, scarlatine, etc.

Mode d'emploi. — Saupoudrer les aliments avant de les consommer, au goût de chaque malade.

Les établissements BYLA
26, avenue de l'Observatoire, Paris.
R. C. Seine 71895.

AMPHO-VACCINS DE RONCHÈSE

Composition générale :

Sont constitués par un lysat de germes ayant en suspension une faible proportion de germes entiers bromés.

Avantages. — De par leur composition, ils allient les avantages des lysats (action immédiate, absence de réaction) et ceux des émulsions microbiennes de faible concentration (très léger phénomène de réaction non perceptible par le malade, mais favorable aux réactions de défense).

Le brome assure une stérilisation parfaite des germes et atténue considérablement les toxines tout en respectant leur pouvoir antigène. Pas d'intolérance.

Ampho-vaccins injectables :

Par centimètre cube : lysat de 2 milliards de germes totaux et 200 millions de germes bromés totaux.

Pulmonaire. — Pneumocoques, pneumobacilles, streptocoques, staphylocoques, entérocoques, micrococcus catarrhalis, cocco-bacilles de Pfeiffer.

Antistaphylococcique. — Staphylocoques.

Intestinal. — Colibacilles, entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, bacilles pyocyaniques.

Urinaire. — Colibacilles, entérocoques staphylocoques.

Anti-infectieux. — Staphylocoques, streptocoques, colibacilles, entérocoques, bacilles pyocyaniques.

Ampho-Vaccins à ingérer :

En ampoules de 5 c. c. Par centimètre cube : lysat de 1 milliard de germes totaux et 1 milliard de germes totaux bromés.

Intestinal. — Colibacilles, entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, bacilles pyocyaniques.

Ampho-Vaccins-pansement :

Filtrat de cultures, additionné de microbes bromés, et rendu impropre à la culture *in loco* des germes secondaires.

Pour plaies et furoncles. — Staphylocoques, streptocoques, colibacilles, entérocoques, bacilles pyocyaniques.

Pour le rhino-pharynx. — Pneumocoques, pneumobacilles, streptocoques, micrococcus catarrhalis, cocco-bacilles de Pfeiffer, entérocoques, staphylocoques.

Échantilons sur demande.

Laboratoire des Ampho-Vaccins
7, place Cassini, NICE
A.-D. RONCHÈSE, docteur en pharmacie.

AMPOULES BOISSY

pour INHALATIONS

AMPOULES BOISSY de NITRITE d'AMYLE

Indications. — *Angines de poitrine, Hémoptysies*, Syncopes, Crises gastriques du Tabes, Mal de mer, Migraines, etc.

AMPOULES BOISSY d'IODURE d'ÉTHYLE

Indications. — *Asthme*, Emphysème, Coqueluche, Dyspnées de toute nature.

Mode d'emploi. — Chaque ampoule est renfermée dans un étui en papier absorbant, qu'il ne faut pas retirer. Briser les deux pointes de l'ampoule en pliant l'étui vers les deux bouts, et respirer le liquide qui s'évapore, en plaçant l'étui dans le creux de la main.

Laboratoire BOISSY

49, rue Roche, COURBEVOIE, près Paris

AMPOULES DE DIGALÈNE "ROCHE"

(Digitale injectable)

Tous les principes actifs de la macération de feuilles fraîches de digitale solubilisés et injectables.

1 cc. = 0,15 ctg. poudre de feuilles fraîches de digitale.

Dose moyenne. — 1 à 4 ampoules et plus par 24 heures.

Prop. thér. — Solubilité parfaite, dosage rigoureux. — Action très rapide, tolérance absolue, effets constants aux mêmes doses, pas d'accumulation (Voir Digalène "Roche").

Injections. — Hypodermiques, *intra-veineuses*, intra-musculaires (indolores).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie

21, Place des Vosges — PARIS

AMPOULES NÉVROSTHENIQUES DAUSSE

Administration indolore de la Strychnine par voie sous cutanée, en association avec divers recorporatifs et toni-nervins.

Indications. — Asthénie, neurasthénie, surmenage physique et intellectuel, dépression nerveuse, adynamie.

I. — Névrosthéniques simples.

La dose de strychnine est constante : 1, 2, 3, ou 4 milligr. par ampoule selon la demande. Le type en est la série suivante :

Série A { Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc. / Strychnine (Sulfate) 1, 2, 3 ou 4, milligr. suivant la demande.

II. — Névrosthéniques progressives.

Administration de la strychnine à doses progressivement croissantes. Chaque série comprend 24 ampoules et renferme 16 dosages de strychnine allant de 1 à 10 mill. Le type en est la formule suivante :

Série A { Cacodylate de soude 0 gr. 05 par cc. / Sulfate de strychnine.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Abriot. Paris (IVe).

AMPOULES DE PANTOPON "ROCHE"

(opium total injectable)

1 amp. de 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon "Roche"

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 1 à 3 amp. par 24 heures et plus. Enfants 1/4 à 1/2 amp. par année d'âge et par 24 heures.

Indic. thér. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Le PANTOPON "ROCHE" représente tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0,01 ctg. de Pantopon "Roche",
= 0,50 ctg. de teinture d'opium,
= 0,025 mgr. d'extrait d'opium,
= 0,005 mgr. de morphine.

Boîtes de 3, 6, et 12 Ampoules.

Produits F. OFFMANN-LA ROCHE & Cie
lace des Vosges — PARIS

AMPOULES REIPAR

Composition. — Acide salicylique d'origine végétale et stabilisé par des procédés spéciaux.

Indications. — Tous les rhumatismes vrais, toutes les algies rhumatismales. Sciatiques.

Action. — Curative certaine, sédative très rapide.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, suivant les indications de la notice.

Echantillon gratuit à réception d'une simple carte de visite adressée au

Laboratoire du REIPAR
LUCQUY — (Ardennes)

AMPOULES DE SÉCACORNINE " ROCHE "

(Tous les principes actifs de l'ergot de seigle) (Voir page spéciale Sécacornine " Roche "),

Indic. thér. — Hémorragies de toute nature, myocardites, congestion des poumons et de l'encéphale, atonie utérine avant, pendant et après les accouchements.

Doses et mode d'emploi. — 1 ampoule de 1 cc. de Sécacornine " Roche " agit comme 4 grammes de seigle ergoté.

Doses moyennes : 1/2 à 1 ampoule par jour.

Dose d'urgence : 2 ampoules et plus par 24 h. (Voie hypodermique ou intramusculaire).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
21, Place des Vosges — PARIS (IIIe)

AMPOULES DE SPASMALGINE "ROCHE"

(Antispasmodique vrai)

Composition. — Chaque ampoule contient:
Un centigramme Pantopon "Roche".
Deux centigrammes Papavérine "Roche".
Un milligramme Atrinal "Roche".
(Voir page spéciale Spasmalgine "Roche".

Indications thérapeutiques. — *Tous les états spasmodiques* et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'estomac, de l'intestin, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, hoquet épidémique, excitation ante et post-opératoire, accouchements difficiles, tous états d'hyperexcitabilité, etc.

Doses et mode d'emploi. — Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour (par voie hypodermique et intramusculaire).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
21, place des Vosges — PARIS

AMPOULES DE THÉOBRYL "ROCHE"

Indications — Toutes les fois que la Théobromine n'a rien donné, qu'il y a intolérance gastrique ou susceptibilité des malades ou chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.

Doses et mode d'emploi. — Chaque ampoule = 2 cc.

Dose moyenne utile : Adultes, 1/2 ampoule 2 à 4 fois par jour.
Enfants, 1/4 ou 1/2 dose.

Dose d'urgence... Adultes, 3 à 4 amp. par j. en 1 ou 2 fois.
Enfants, 1 à 2 amp. par j. en 1 ou 2 fois.

(Par voie endoveineuse ou intramusculaire)

Nota. — Les injections intramusculaires sont *indolores*; il faut les faire à la face externe de la partie fessière de la cuisse — (Voir thèse du Dr Jouisse, Paris, 1920 et les travaux des Prof. Pouchet, Rémond, Duhot, des Drs Richard St-Yves, Vigouroux, Ségard, Bénech, etc.)

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
21, place des Vosges — PARIS (IIIe)

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

Phosphates, Diastases et vitamines de croissance des Céréales germées

Formes. — Comprimés et Sirop.

Indic. thér. — Entérite et Dyspepsie (salivaire et pancréatique), Tuberculose, Rachitisme. Palpitations (d'origine digestive). Maladies par carence, digestion des féculents.

Mode d'emploi. — Deux comprimés ou deux cuill. à café de sirop 3 fois par jour après les repas. Préparation des bouillies : Délayer un ou deux comprimés écrasés d'amylodiastase ou une cuillerée à café de sirop dans une bouillie ne dépassant pas 60°.

Laboratoire des Ferments du Docteur A. THÉPÉNIER
10 et 12, Rue Clapeyron — PARIS

ANAPEPTONE VASSAL

Forme. — Comprimés de Peptone, remplaçant les cachets (conservation parfaite).

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique par excellence. Traitement rationnel des migraines, asthme, urticaires, troubles intestinaux.

La boîte : 12 francs (4 tubes).

Echantillon gratuit sur demande.

Établissements Léon DANJOU
LILLE

2

ANAQUINTINE LESCÈNE

Composition. — Aldéhydes benzylocinnamiques, thymol, eucalyptol.

Forme. — Liquide légèrement rosé, entièrement miscible à l'eau.

Propriétés. — Puissant antiseptique diffusible. En applications sur la gorge et la poitrine, elle agit comme antispasmodique et réalise l'antisepsie des voies respiratoires.

Indications. — Traitement externe de la *Coqueluche*, des toux spasmodiques, asthme, laryngites, coryza, toux laryngées.

Associée au *Balsamol*, elle constitue le traitement conjugué des toux spasmodiques donnant des résultats remarquables particulièrement dans la *Coqueluche*.

Prophylaxie des maladies contagieuses en aspersion sur les vêtements, linge, draps, etc. et en inhalations froides.

Mode d'emploi. — La diluer de 4 à 5 parties d'eau chaude pour compresses sur la gorge et la poitrine, recouvrir de taffetas gommé et d'une bonne couche d'ouate, laisser en place toute la nuit.

En inhalations froides et en aspersions, l'employer pure.

Laboratoires LESCÈNE

LIVAROT (Calvados) - PARIS, 58, rue de Vouillé

Téléph. : Vaug. 08-19

ANDROSTINE CIBA

Hormone issue de la lignée spermatogénétique de la glande génitale mâle.

Action physiologique. — *Chez la femme :* Equilibrante de la sécrétion ovarienne et du système nerveux. Peut se formuler en association avec Agomensine ou Sistomensine suivant le cas. *Chez l'homme :* Activatrice de la Spermatogénèse. *Dans les deux sexes :* Active le métabolisme basal, la combustion des graisses et des sucres.

Indications. — *Chez la femme :* Ménopause chirurgicale. Hypersthénie génitale, érotomanie, onanisme, troubles liés à la continence. Aménorrhée rebelle. *Chez l'homme :* Infantilisme, impuissance. *Dans les deux sexes :* Obésité, diabète.

Comprimés, ampoules.

Doses. — 2 à 6 comprimés par jour, 1 ampoule par jour ou tous les 2 jours.

Le flacon de 40 comprimés : 15 francs.

La boîte de 4 ampoules : 20 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

ANÉGRINE

Composition :

Composé de la série quinoléique, associé à l'Arbutine

Action :

Elimination rapide de l'acide urique. — Augmentation du pouvoir de sécrétion et d'excrétion du rein. — Excitation de la fonction cholagogue du foie,

Indications :

Goutte. — Rhumatisme articulaire aigu et chronique. — Sciatique. — Lumbago, etc...

Mode d'emploi :

Cas aigus — 6 à 10 comprimés par jour, en deux ou trois fois, dans un peu d'eau, pendant 3 ou 4 jours, diminuer progressivement les doses jusqu'à 4 comprimés par jour. Cas chroniques : 3 à 4 comprimés par jour, pendant 8 à 15 jours. Cesser 8 jours et reprendre.

Laboratoires RIVIER

26 et 28, Rue Saint-Claude Paris.

ANÉOL ROBERT

Composition. — Association de silicate d'alumine, charbon végétal, magnésie calcinée, urotropine, menthol.

Action. — Sédatif, absorbant, anti-fermenticide.

Indications. — Troubles gastro-intestinaux, dyspepsies, gastrites ulcères, entérites, entérocolites, fermentations intestinales, etc.

Mode d'emploi. — 6 à 8 comprimés par jour, avant ou après les repas.

Laboratoires Saint-Vincent-de-Paul

A. Corhumel, 25, rue des Petits-Hôtels
PARIS (X^e^)

ANEXOL

Antiseptique chloré, parfumé, non irritant.

Formes. — Double boîte de 80 comprimés.
Boîte de 40 —

Principe actif. — Sel sod. acid. sulfam. Toluène monoch. (chloramine T.)

Doses. — Pour 1 litre d'eau chaude :

Gargarismes..... ½ à 2 comprimés.
Urologie et gynécologie.. 2 à 4 —
Pansements des plaies .... 4 à 6 —

La dissolution des comprimés d'Anexol se fait immédiatement, même à froid.

LABORATOIRES DROUET ET PLET
Rueil, Malmaison (S.-et-O.).

ANGIOLYMPHE DU Dr ROUS

Prétuberculose — Tuberculose

Dans toutes ses manifestations : Pulmonaire, Ganglionnaire. Osseuse, Péritonéale, Rénale, Intestinale.

Indications :

Dans les formes pulmonaires.

DIMINUTION et DISPARITION de la Dyspnée, de la Toux, de l'Expectoration, des Sueurs, de la Fièvre et de tous les Symptômes.
AUGMENTATION de l'appétit, du poids, des forces, du sommeil, amélioration rapide de l'état général.
DIMINUTION, DÉGÉNÉRESCENCE et DISPARITION des BACILLES DE KOCH et autres microorganismes pathogènes.

Dans les formes ganglionnaires, osseuses, rénales, etc.

Amélioration rapide de tous les symptômes. Une boîte suffit d'ordinaire pour donner un commencement d'amélioration sensible.

Posologie. — De 2 à 5 c. en une injection dans la fesse, faite quotidiennement, par série de 8 à 12, et reprise après 10 à 12 jours d'interruption.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE
4 *bis*, rue Hébert — COURBEVOIE

ANIODOL

Le plus puissant antiseptique intense et externe diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

Combinaison de triformal glycérine et d'oxyméthylène sulfocarbimide.

ANIODOL INTERNE

Forme. — Gouttes.

Indications. — Fermentations gastro-intestinales, diarrhée verte des nourrissons, entérites, dysenterie amibienne, grippes, catarrhe des voies aériennes, tuberculose, fièvres infectieuses, fièvre typhoïde.

Mode d'emploi et doses :

Nourrissons : III à V gouttes à chaque tétée.
Enfants : XX à L gouttes.
Adultes : XXX à CC gouttes.
Par jour dans un peu de lait ou de tisane, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas.

ANIODOL EXTERNE

Formes. — Solution normale ; solution concentrée ; comprimés ; poudre ; savons ; ovules ; vaseline.

Indications. — Obstétrique, gynécologie, chirurgie générale, maladies vénériennes et des voies urinaires, dermatoses, cancer, ophtalmologie, rhinologie.

Mode d'emploi et doses. — Normale : 1 cuillerée à bouche pour 1 litre d'eau. Concentrée : 30 gouttes ou 1 division pour 1 litre. Comprimés : (injections vaginales) 1/2 comprimé pour 1 litre d'eau. Poudre : (remplace les poudres dérivées de l'iode et du phénol). Savon : asepsie et désinfection des mains et pes plaies. Ovules : (gynécologie) un ovule le soir. Vaseline : plaies, accouchements, rhinologie.

Laboratoires de l'ANIODOL
40, rue Condorcet — PARIS
Envoi échantillons gratuits à MM. les Docteurs.

ANTACIDYL

Composition. — Carbonate de bismuth.

Action. — Combat la suracidité gastrique. Aucune toxicité, ne constipe pas.

Indications. — Traitement de l'hyperchlorhydrie, ulcère de l'estomac.

Forme pharmaceutique. — Comprimés.

Dose. — 1 comprimé toutes les 5 minutes contre les douleurs de l'hyperchlorhydrie.
Dans l'ulcère, 1 ou 2 comprimés avant chaque dose de lait.

Laboratoires DURET & RÉMY
ASNIÈRES (Seine.)

ANTALGOL DALLOZ

Composition. — Quino-Salicylate de pyramidon.

Forme. — Granulé.

Propriétés. — Analgésique par le pyramidon. Antiseptique par l'acide salicylique. Dissolvant de l'acide urique par l'acide quinique.

Indications. — Rhumatisme aigu ou chronique. Goutte. Lumbago. Sciatique. Migraines. Névralgies. Grippe. Contre l'élément Douleur en général.

Dose. — 2 à 4 cuill. à café par jour, à croquer ou à faire dissoudre dans de l'eau.

Laboratoire DALLOZ
13, Boulevard de la Chapelle — PARIS (X^e^)

ANTASTHENE

Composition. — Reconstituant du système nerveux, à base de glycérophosphates associés à un extrait cérébral et spinal.
Forme. — Comprimés - Ampoules de 2 cc.
Indications. — Reconstituant du système nerveux ; particulièrement indiqué dans l'asthénie et tous les états dépressifs quelle qu'en soit l'origine.

MODE D'EMPLOI.

Enfants : 1 injection tous les deux jours.
2 comprimés par jour aux repas.
Adultes : 1 injection par jour.
4 comprimés par jour aux repas.

Laboratoire de Biologie Appliquée
H. CARRION & Cie
54, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIIIe)

ANTHÉMA

Sérum sérique antihémorragique
des Docteurs Dufour et Le Hello

Médication antihémorragique basée sur un principe entièrement nouveau. Les propriétés coagulantes de ce sérum proviennent de réactions anaphylactiques provoquées à dessein chez l'animal qui le fournit. L'anaphylaxie passive ainsi réalisée est sans inconvénient pour le malade.
Principales indications. — Etats hémorragiques, hémophilie, *toutes les hémorragies inaccessibles à l'action chirurgicale ou rebelles aux moyens hémostatiques habituels* : Epistaxis, Hémoptysies, Hémorragies intestinales, etc. Préventif antihémorragique avant l'intervention chirurgicale.
Mode d'emploi. — Injection sous-cutanée ou intra-musculaire à la dose de 10 cc. (une ampoule). On peut, en cas de besoin, répéter les injections au bout de quelques heures ou les jours suivants.
Pas de contre-indication.

Littérature sur demande

Les Établissements POULENC Frères
86 et 92, rue Vieille-du-Temple — PARIS IIe)
R. C. Paris 5336

ANTHRAXONE-FORNET

Vaccin buccal contre la Furonculose

Principe actif. — Staphylocoques de différentes souches, spécialement préparés.

Indications. — Remplace avantageusement tout autre traitement de la Furonculose.

Forme. — Flacon de 30 pilules.

Dose. — 1 à 3 pilules, trois fois par jour, une demi-heure avant les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Fait disparaître les Furoncles naissants, fait mûrir les autres.

Echantillon sur demande.

INSTITUT de MICROBIOLOGIE-SARREBRUCK

ANTIALGOS CHRISTIAENS

Solution diiodo-salicylate de colchicine en solution salicylée donnant à l'analyse élémentaire :

Acide salicylique	3 gr. 50
Colchicine	0 gr. 005
Iode (ce qui peut se combiner)	1 gr. environ
Excipient, Q. s. p^{r} 100 cm^{3}	

Dose et mode d'emploi. — *Accès :* Par 24 heures, 6 cuil. à soupe pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique :* Une à trois cuill. à soupe, suivant les cas.

Indic. thér. — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc. (Expérimenté à l'institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action secondaire sur le cœur, les reins, le foie et l'estomac). *Calme l'accès en 24 heures.*

LABORATOIRES DE LA PHARMACIE DE LA PLACE ROYALE

2, rue du Champs-de-Mars, Reims

Compte Postal Paris 234-33 R. C. Reims 4478

ANTI-ASTHMATIQUES
du Docteur CLÉRY

Formes. — Poudres et Cigarettes.

Composition. — Solanées sélect. nitrées.

Indicat. thérap. — Médicat. classique anti-dyspnéique. Sédation immédiate et traitement des crises d'Asthme et d'Oppression.

Mode d'emploi. — Allumer un petit cône de *poudre* sur une assiette et respirer doucement la fumée qui s'élève.

Cigarettes : 1 à 6 par jour ; avaler la fumée au moment de la dyspnée.
Très efficaces, d'un usage pratique, sont comparativement très agréables.

Laboratoire du Dr CLÉRY
53, Boulevard Saint-Martin — PARIS

ANTIASTHME BENGALAIS

Poudre fumigatoire à base de Solanées nitrées et Menthol

Mode d'emploi. — En faire brûler une petite pincée sur une soucoupe et, fermant les yeux, respirer doucement la fumée par les narines.

Indications. — Remède d'urgence dans les accès d'*Asthme*, *Emphysème*, Coryza, Asthme des foins, Bronchites chroniques, etc.

CIGARETTES SCHULZÉ-BENGALAIS
aux mêmes principes

Echantillons gratuits au Corps Médical et aux Malades sur recommandation du médecin traitant.

Laboratoires FAGARD
44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-sur-SEINE
Tél. : Molitor 07-05.

DERNEVILLE
7, rue Joncker — **BRUXELLES** — Téléph. 111-7

ANTI-ASTHMINE DEHAUSSY

Composition et propriétés. — A *tout asthme*, quelle que soit sa forme, il faut une *même médication de fond*, visant le déséquilibre vago-sympathique commun à tous ces malades (Lobélie, belladone, adrénaline, calmants anti-asthmatiques divers).

A chaque forme d'asthme, il faut, en outre, *sa médication complémentaire spéciale*. C'est pourquoi à la médication de fond ci-dessus, on a ajouté, selon la forme d'asthme à traiter, des agents complémentaires différents (iodure, expectorants, balsamiques, eupnéiques....). — L'Anti-asthmine se présente donc sous les trois formes suivantes :

Anti-Asthmine A (pure). — *Asthme pur*, sans expectoration ou avec expectoration difficile.

Anti-Asthmine B (balsamique). — *Asthme vieilli* avec bronchite chronique et emphysème.

Anti-Asthmine C (toni-cardiaque). — *Asthme vieilli* avec tendance à l'insuffisance cardiaque.

Les états asthmatiformes des vieux tousseurs, avec dyspnée survenant par paroxysmes sont de même justiciables de l'Antiasthmine.

Doses et mode d'emploi. — Sirop Adultes, 2 à 3 cuillerées à soupe par jour. A dix ans, 2 à 3 cuillerées à café par jour. — **Pilules :** Adultes, 4 à 6 par jour ; dix ans, 2 à 3 par jour.

Laboratoires Ed. DEHAUSSY
66, rue Nationale — LILLE

ANTIGRIPPINE MIDY

(Acéto-Phényl-Salétidine, poudre de Gelsemium et poudre de Dower)
Ni Quinine — Ni Antipyrine
Cachets dosés à 0,65 cgr.

Dose et mode d'emploi. — 1 cachet à distance des repas, de préférence le soir au coucher, dans un grog chaud; renouveler au besoin une heure après.

Prop. thérapeutiques. — Antithermique, Analgésique, Bactéricide.

Indications. — Grippe, Influenza, Rhume, Coryza, Maux de tête, Courbatures, Névralgies.

Laboratoires MIDY
4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII[e])

ANTIPHI

Le plus rapide reconstituant.
Médication Arsénio-phosphorée.

Formes. — Solution. Elixir.

Indications. — Etats prétuberculeux. Tuberculoses apyrétiques. Surmenages. Anémies. Convalescences. Neurasthénies. Enfants chétifs.

Posologie. — Deux cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires de l'ANTIPHI.
JEAN CAPIN, Pharmacien
à Roquefort (Landes).

ANTIPHLOGISTINE

Glycéroplasme minéral aseptique à chaleur durable et constante.

Composition. — Glycérine, kaolin, petite proportion d'iode, d'acides borique et salicylique, huiles essentielles (menthe, gaultéria, eucalyptus)

Propriétés. — Chaleur constante pendant 12 à 24 heures. Cataplasme idéal. Action osmotique et exosmotique de la glycérine agissant à travers la peau sur les liquides organiques chargés de microorganismes qu'il attire et engloutit.

Indications. — Toutes affections nécessitant l'action d'une chaleur constante ou une lutte contre l'infection interne ou externe : Pneumonies, Pleurésies, Bronchites, Rhumatismes, Gouttes, Phlegmons, Furoncles, Orchites, Mastites. Conjonctivites, Plaies infectées, Gynécologie, etc.

Particularités. — Pâte molle, se délivre en boîtes fer blanc emboutie de 150 gr., 300 gr., 500 gr., 1 kil., 2 kil. 500. Se chauffe au bain-marie, s'étend directement sur la peau ; on recouvre d'ouate. Action manifeste et soins rendus faciles.

Laboratoires de l'Antiphlogistine
B. TILLIER, Pharmacien 11, rue du Petit Parc.
Saint-Maur, près Paris. *R. C. Seine 56.956*

ANTIPHLOGOSINE

Préparation stérile, réfrigérante et adhésive à base d'éther et d'alcool pour les traitements de toute réaction inflammatoire.

Propriétés. — Calme la douleur, abaisse la température locale, diminue le volume de la tuméfaction, isole du contact de l'air, atténue rapidement la rougeur inflammatoire.

Indications. — Lymphangites, fluxion dentaire, tuméfaction douloureuse, contusions, engorgement et abcès du sein, érysipèle, réactions péritonéales, salpingite, infection puerpérale.

S'emploie en badigeonnages.

Pharmacie V. HOUSSAYE
126, rue de la Pompe, Paris (XVI^{e}).

ANTIPHYMIQUE VADAM

A base de Cholestérine iodo-balsamique gaïacolée et Cinnamate de benzyle.

Indications.

Traitement de toutes les affections inflammatoires pulmonaires (bacillaires ou parabacillaires).

Résultats immédiats chez les malades curables (Antisepsie, cicatrisation et histogénèse).

Dose.

Une ampoule tous les deux jours

(Voir « *Thalassotonine Vadam* »)

Demander renseignements et Littérature aux

Laboratoires VADAM

5 Rue Bréa — PARIS (VI^e^)

Toutes analyses médicales.

ANTIPUR

Composition. — Salicylate de soude entièrement dissimulé, iodures alcalins, teinture de colchique.

Indications. — Rhumatisme articulaire, aigu et chronique.

Forme. — Liqueur.

Doses. — *Crises aiguës :* 6 cuillerées à soupe par jour *au milieu* de chaque repas, diminuer la dose progressivement.

LABORATOIRES J. KRIEGER

121, avenue de Saint-Ouen,
PARIS (XVII^e^)

ANTIRRHOIDE

Huile indienne : Balaninum, Lentiscum, Myagrium, Laurium, Spirea, etc.

Indications. — Traitement des hémorroïdes.

Mode d'emploi. — On nettoie à l'eau tiède les parties à soigner et on sèche avec du coton hydrophile ou un linge fin, puis on imbibe largement avec l'huile ANTIRRHOIDE la pulpe de l'index et l'on promène ce doigt ainsi mouillé sur les ampoules et bourrelets extérieurs, d'abord, puis à l'intérieur du rectum, en exerçant un léger massage, lentement. L'opération doit durer de cinq à six minutes.

Les applications doivent être faites sans oubli, avant et après chaque garde-robe.

Pour les hémorroïdes internes, employer les SUPPOSI-CONES ANTIRRHOIDES qui, plongés dans l'huile antirrhoïde doivent être introduits lentement, le malade couché sur le côté et les jambes repliées.

Laboratoires BELIÈRES
19, rue Drouot — PARIS (IXe)

ANTIVIRUS

Bouillons-Vaccins filtrés, pour pansements. Spécifiques microbiens.

1° **Antivirus Staphylococcique.**
2° **Antivirus Streptococcique.**
3° **Antivirus mixte** (Strepto-Staphylococcique).
4° **Antivirus Coli-bacillaire.**
5° **Antivirus puerpéral** (Streptococcique).

Atoxicité absolue
Conservation indéfinie en ampoules scellées.

"LA BIOTHÉRAPIE"
3, Rue Maublanc PARIS (XVe)
Téléphone : Ségur 05-01

ANTONAL

Traitement rationnel et polyvalent de l'hypertension vasculaire. — Spécifique des scléroses artérielles et viscérales. A base de principes dynamogénétiques du gui. — Diméthylquinoxanthine. — Extrait total hépatique.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament d'une grande efficacité par son action à la fois diurétique, antitoxique et hypotensive, d'où son indication dans l'hypertension vasculaire et les maladies qu'elle accompagne : artériosclérose, cardiopathies artérielles, angine de poitrine, ménopause, congestions, hémorragipares, néphrites, etc.

Se présente sous forme de cachets et se prend à la dose de 1 à 3 par jour.

Prix : 10 fr. la boite (sans impôt)

Littérature et échantillons :

Laboratoires CARESMEL
2, Quai Paul-Bert — TOURS.
Téléphone : 19-42.

ANUROL

Composition. — Association des meilleurs dissolvants de l'acide urique, pipérazine, helmitol, urotropine, à l'acide benzoïque et au benzoate de lithine.

Action. — Antiseptique urinaire, dissolvant de l'acide urique.

ndications. — Fermentations urinaires, blennorragie, cystites, pyélites, gravelle, coliques hépatiques et néphrétiques, rhumatisme, goutte, arthritisme.

Mode d'emploi. — Deux à six cuillerées à café par jour, dans un peu d'eau de Vittel ou de Bussang. Demi-dose pour les enfants.

Laboratoires Saint-Vincent-de-Paul
A. Corhumel, 25, rue des Petits-Hôtels,
PARIS

ANUSOL MIALHE

Iodo résorcino sulfite de bismuth.

Forme :

Suppositoires ; pommade.

Indications :

Hémorroïdes.

Agit également bien contre la constipation, prostatites, etc.

Dose :

Un suppositoire matin et soir.

Pharmacie du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS

APHLOÏNE TROUETTE-PERRET

Elixir contenant en totalité les principes extractifs des plantes tropicales : Aphloïa, Piscidia, Hamamelis, Hydrastis Viburnum.

Indications. — Spécifique des troubles de la Ménopause, de la Puberté et du Système veineux (varices et hémorroïdes).
Sédatif utéro-ovarien.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café par jour aux principaux repas.

Laboratoires TROUETTE-PERRET

15, Rue des Immeubles-Industriels
PARIS (XIe)

APIOLINE CHAPOTEAUT

Composition. — Principes actifs de l'apium petroselinum.

Indications. — Troubles de la menstruation, Douleurs cataméniales, Ménorragies, Aménorrhée.

Action. — L'**APIOLINE** régularise les règles et calme les douleurs qu'elles provoquent. Son action est supérieure à celle des autres emménagogues. Complètement inoffensive, reste sans action sur la grossesse.

Mode d'emploi. — 4 à 5 jours avant l'apparition des règles et pendant toute leur durée, prendre 2 à 3 capsules par jour au moment des repas.

LABORATOIRE
DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
Dr PH. CHAPELLE, 8, rue Vivienne, PARIS

AQUINTOL PETIT-MIALHE

COQUELUCHE

Chloro. — Bromo. — Fluor.

Modifie, dès les premiers jours, la toux. Le malade n'éprouve plus de suffocation ni de vomissements, il retrouve l'appétit et le sommeil.

Dose :

Au-dessous de 6 mois :	2 à 4	cuillerées à	café
Moins de 5 ans :	3 à 8	—	à café
Moins de 5 et 15 ans :	4 à 8	—	à dessert
Adultes :	5 à 8	—	à soupe

Deux flacons sont en général nécessaires pour éviter la rechute.

Pharmacie du Docteur MIALHE
8, rue Favart — PARIS

ARGYBIL

Composition. — Complexe de Vitellinate d'argent (Argyrol de BARNES) et de bile.

Forme. — Liquide.

Indications. — Traitement de l'ozène, infections aiguës ou chroniques du nez et de l'arrière-nez. Donne d'exellents résultats en association avec le vaccin local.

Mode d'emploi. — Par le médecin traitant : Badigeonnages. Pour le malade : prescrire en pulvérisations : 2 à 3 coups de poire dans chaque narine, 2 ou 3 fois par jour.

Littérature échantillon
LANCOSME
71, Avenue Victor-Emmanuel III PARIS (8e)

ARGYCUPROL

Traitement intégral et polyvalent de la BLENNORRAGIE.

Injection urétrale non caustique, absolument indolore et ne provoquant jamais de rétrécissement.

Composition. — Argent colloïdal (10 %), détruit le gonocoque Cuivre colloïdal (1 %), attaque les microbes associés.

Forme. — Boîte de 6 ampoules-injections.

Indications. — Activité remarquable et tolérance parfaite aussi bien dans les urétrites les plus aiguës que dans les urétrites chroniques.

S'emploie en injections urétrales dans les cas aigus, en grands lavages dans les cas chroniques; en compresses sur les bourses dans les orchites blennorragiques, en instillations dans les conjonctivités blennorragiques.

Chez la femme, la blennorragie, les métrites, les vulvites et vulvo-vaginites sont justiciables du traitement par l'Argycuprol.

Laboratoire de l'ARGYCUPROL
4 *bis*, rue Hébert, COURBEVOIE (Seine).
MORO, ph. de 1re cl., 15, av. de la Défense, Puteaux.

ARHÉMAPECTINE GALLIER

Antihémorragique

Admis dans les Hôpitaux de Paris.
Adopté par les Services de Santé de la guerre et de la marine.
Solution isotonique, stérile, non toxique, non anaphylactisante de *Pectine*, associée à son coferment minéral (Calcium).

La **Pectine,** agent hémostatique vrai, augmente le pouvoir coagulant du sang, sans provoquer de modification de la tension, sans action sur les fibres musculaires (H. Violle et L. de Saint-Rat, C. R. Ac. Médec., 4 nov. 1924).

Formes pharmaceutiques :
Boîte de 4 ampoules de 20 cc.
Boîte de 2 ampoules de 20 cc.
Ovules, la boîte de 6.

Indications et Posologie. — *A titre thérapeutique :* Toutes Hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Métrorragies, etc., Hémorragies post-opératoires, etc.

Faire boire, dans un peu d'eau sucrée, 1 à 4 ampoules, en 2 heures, selon la gravité de l'hémorragie.

A titre préventif : Chirurgie générale et spéciale, oto-rhino-laryngologie, odontologie obstétrique, etc.
Une à quatre ampoules durant les dix heures qui précèdent l'opération. Dans les cas d'urgence l'*arhémapectine* peut être employé en injection *sous-cutanée* à raison de 10 cc.
Ne présente aucune contre-indication.

Laboratoire R. GALLIER
Pharm., Ex-interne des Hôpitaux de Paris
38, bd du Montparnasse — PARIS (XV^e^)
Téléph. : Littré 98-89

ARHÉOL

Formule. — C^{15} H^{24} O.

Composition. — Principe actif de l'essence de santal.

Forme. — Fl. de 40 capsules contenant chacune 0 gr. 20 environ de produit.

Prop. thér. — Antiseptique et analgésique puissant dans toutes les affections des voies urinaires. Produit chimiquement pur n'occasionnant aucune des douleurs provoquées par l'essence de Santal, supérieure elle-même aux essences de Cèdre.

Indications. — Blennorragie et blennorrée, cystites, urétrites, pyélites, pyélo-néphrites.

Dose. — 10, 12 capsules par jour, en 3 fois : le matin, à midi et le soir avant les repas.

Prix : 15 fr.

Laboratoires P. ASTIER

41 et 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e)

ARHINE
LAMBIOTTE FRÈRES

Composé formaldéhydo-gaiacolo-tannique chimiquement défini, ni toxique, ni caustique.

Propr. thér. — Puissant antiseptique, modificateur et désodorisant.

Indications. — Réalise la véritable thérapeutique causale de l'*Ozène*, en fait disparaître la fétidité et les croûtes, tonifie la muqueuse. Excellent agent curatif du *coryza*, des *rhinites* et *rhinopharyngites*.

Mode d'emploi. — On l'utilise soit en *insufflations*, soit en prises : matin et soir dans l'ozène, après lavage à l'eau bouillie ou boriquée tiède ; 2 ou 3 fois par jour et le soir au coucher dans les *coryzas*, *rhinites*, *maux de gorge*.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

3, Rue d'Edimbourg — PARIS (VIII^e)

124, Avenue Rogier — BRUXELLES

ARQUÉRITOL LESURE

Huile injectable d'amalgame d'argent à 40 % de mercure.

Mode d'emploi. — Identique à celui de l'huile grise : une injection intramusculaire par semaine, correspondant à 8 ou 9 centigrammes Hg.

Indications. — Toutes manifestations syphilitiques.

Avantages. — Injection non douloureuse, absence de nodosités, tolérance parfaite grâce à l'action propre de l'argent, et à son effet favorable sur l'assimilation du mercure.

Flacon de 5 gr. : 18 fr.

Pharmacie VIGIER-LESURE

70, rue du Bac — PARIS

ARRHENAL ADRIAN

Composition !

Méthylarsinate de soude chimiquement pur.

Action :

Réalise le traitement arsenical par voie buccale avec tolérance parfaite même chez les personnes les plus délicates. Remplace avantageusement le cacodylate de soude.

Indications :

Dermatoses, tuberculoses pulmonaire et viscérale, broncho-pneumonie, grippe, lymphatisme, scrofule, états de débilité, vomissements de la grossesse, arthritisme, asthme, intoxication palustre.

Formes et mode d'emploi :

Gouttes : 10 à 20 gouttes par jour, dosées à 2 milligr. en 2 fois. Ampoules : à 50 milligr. et à 100 milligr. ; 1 à 2 par jour. Granulés à 1 et 2 cgr. : 2 à 6 par jour. Comprimés à 0,025 : 1 à 3 par jour.

ADRIAN & Cie

9 et 11, rue de la Perle. — PARIS.

ARRHÉNUCLÈNE BERGEVIN

Compos. — Complexe de Ferro-manganèse codiastasique, Arrhénal, Sulfate de Strychnine et Fluorure de Calcium.

Propriétés. — Hématopoïétiqnes, phagocytogène et névrosthénique.

Indications. — Toutes les **anémies** et les **asthénies** et plus particulièrement la **chloro-anémie des adolescents.**

Mode d'emploi. De 7 à 11 ans, 1 pilule midi et soir ; 12 à 18 ans, 1 pilule matin, midi et soir ; à partir de 18 ans, 2 pilules midi et soir avant les repas.

Après 8 ou 15 jours de traitement, interrompre pendant une semaine, pour reprendre ensuite jusqu'à guérison.

G. BERGEVIN

Docteur en pharmacie

CHATEAUDUN (E.-et-L.).

ARSÉNICAUX BOUTY

Tous les produits arsénicaux présentés par les LABORATOIRES BOUTY sont à base *d'acide méthylarsinique* remplaçant avantageusement dans tous les cas, l'acide cacodylique.

Gaïarsol Bouty (Méthylarsinate de Gaïacol.)	1° *ampoules* de 1 c. c. renfermant 0,05 de sel. 2° *solution* renfermant 0 05 de sel par XX gouttes. 3° *sirop* renfermant 0,04 de sel par cuillerée à soupe.	Tuberculose Affections pulmonaires.
Sérosthényl Bouty. (Méthylarsinate de strychnin glycérophosphaté.)	1° *ampoules* de 1 cc. renfermant 0,001 de méthylarsinate de strychnine et 0,10 de glycérophosphate de soude. 2° *solution* dosée par XX gouttes comme une ampoule.	Asthénie Faiblesse constitutionnelle.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS

Télé phone : Nord 5 1-64

ARSÉNIODE BURIAT

Forme Gouttes. — Solution inaltérable de tri-iodure d'arsenic méthylarsinée à 1 %.

Indications. — Tuberculoses torpides à manifestations lymphatiques, chlorose symptomatique de tuberculose, anémies, convalescences (fixation d'oxygène).

Emphysème pulmonaire et manifestations du syndrome asthmatico-arthritique.

Mode d'emploi. — Doses moyennes.

Enfant : 2 gouttes par 24 heures et par année d'âge.

Adultes : 15 à 30 gouttes, 2 fois par jour.

Laboratoire BURIAT

25, rue Copernic — PARIS (XVI[e]).

ARSI-STRYCHNAL LONGUET

Association « Strychnal-Cacodylate de Na » des dérivés non-toxiques de la shychnine et de l'arsénic.

Strychnal.....	0 gr. 01
Cacodylate de Na..... .	0 gr. 25
Serum isotonique Q. S...	3 cm³

par ampoule.

Injection rigoureusement indolore.

Doses. — 1 à 2 ampoules par jour.

Indications. — Anémie, Convalescence.

(Voir Strychnal Longuet.)

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS

ARSYCODILE

Cacodylate de Soude pur

Formes. — Ampoules dosées à 0,05, 0.10, 0.20 et 0,50 pour applications progressives (*bien spécifier*).

Indic. thér. — Accélérateur de la nutrition générale, ramenant l'appétit, etc.

Tout spécialement désigné pour l'usage sous-cutané.

Doses et mode d'emploi. — Une injection par jour pendant huit jours, repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

La première spécialité à base d'arsenic organique (1900).

Docteur M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (XVI[e])

ARSYLÈNE " ROCHE "

Acide allylarsinique.

L'Arsylène " Roche " est un arsenic organique nouveau qui, sur les préparations inorganiques, arséniates, arsénites, liqueur de Fowler, etc., etc., possède l'avantage d'une *toxicité pratiquement nulle*, laquelle permet son emploi à doses élevées, sans craindre la brusque apparition de phénomènes d'arsénicisme tels que sécheresse de la gorge et de la bouche, troubles digestifs et nerveux, symptômes cutanés, bouffées congestives, essoufflement, hyperthermie, etc. ; il est en outre, *très bien toléré* par les voies digestives, ne provoque pas de dégagement d'oxyde de cacodyle (odeur alliacée de l'haleine) et il est *utilisé presque complètement* dans l'économie ; peut être substitué, en toute sécurité par le médecin traitant, aux cacodylates généralement employés, dans toutes leurs indications et à toutes doses.

Indications Thérapeutiques.

Affections nerveuses et mentales, *sclérose en plaques, Parkinson, contractures, chorée, mélancolie, anxiété, maladies de la peau, psoriasis, affections parasitaires, tuberculose* au début, *anémie* grave, *période de dépression du traitement Bi ou Hg*, toutes les *Anémies* et toutes les *Asthénies*.

Posologie et Mode d'emploi.

Thérapeutique intensive. — 1 à 4 ampoules de 5 cc. à 0,20 tous les 2 ou 3 jours en injections intramusculaires ou endoveineuses *absolument indolores*.

Thérapeutique toni-stimulante. — 1 ampoule de 2 cc. à 0,05 par jour et plus par voie hypodermique ou intramusculaire (injections *absolument indolores*). — Enfants 1/4 ou 1/2 dose.

Thérapeutique progressive. — Méthode de Fowler. *Granules* à 0,01 : 1 *granule* avant chaque principal repas. Augmenter tous les jours d'un granule jusqu'à 8 par jour, puis, progressivement diminuer jusqu'à deux *granules* par jour.

ARSYLÈNE " ROCHE "

Granules : Flacon de 60.
Ampoules de 2 cc. : Boîte de 12.
Ampoules de 5 cc. : Boîte de 12.

PRODUITS
F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
21, Place des Vosges. Paris (IIIe).

ARTÉRION VINCARDI

Principes actifs. — Complexes vitaminés et stabilisés extraits du Viscum album, de l'allium sativrum, du fucus vesiculosus, du citrus limonum.

Forme. — Capsules enrobées de gluten, ne se dissolvant qu'au contact des sucs intestinaux. **Innocuité absolue,** tolérance parfaite. Pas de contre indication.

Indications. — Hypotenseur, sclérolysant, diminue la viscosité du sang. — **Action élective** au niveau des capillaires qu'il décrasse et assouplit. — Artériosclérose. — Hypertension, scléronéphroses, présclérose.

Doses. — 5 à 6 capsules par jour aux principaux repas.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire de l'Artérion VINCARDI
Ph. VIGUIER, pharmacien

42, Avenue Borriglione — NICE (Alpes-Maritimes)
Chèques postaux, Marseille 105-38

ARTERIO-VEININE

Composition. — Crataegus, passiflora, gui, marrons d'Inde, hamamélis (Extraits stabilisés) iode peptonisé.

Indications. — Troubles de la Ménopause, artério-sclérose, troubles nerveux, états congestifs quels qu'ils soient.

Forme. — Gouttes.

Doses. — De XX à LX gouttes avant chaque repas.

LABORATOIRES J. KRIEGER

121, avenue de Saint-Ouen,
PARIS (XVII[e]).

ASCÉINE

Acet-salicyl-para-acet-phénétidine-caféine.

Analgésique sédatif, antirhumatismal. Par l'association synergique de ses composants, l'Ascéine réalise une médication efficace et inoffensive dont l'action principale et immédiate se traduit par l'atténuation ou la disparition de l'élément douleur.

Indications. — Toutes les algies : Névralgies, sciatique, migraine, etc., Grippe. Arthrites aiguës et toutes manifestations rhumatismales.

Doses. — Adultes : 2 à 4 comprimés par jour ; enfants : 1/2 à 2 comprimés.

Prix. — Le tube de 20 comprimés : 4 francs.

LABORATOIRES O. ROLLAND
1, place Morand — LYON

ASCIATINE

Novamidon-Butylchloral
« Usines du Rhône »

Analgésique. — Douleurs dentaires.

Hypnotique. — Insomnies dues à la douleur ou au surmenage.

Antinévralgique. — Névralgies faciales, intercostales, utérines, sciatiques, etc.

Présentation. — Comprimés à 0 gr. 25. (Boîtes de 3, 12 ou 24.)

Posologie. — 1 à 3 comprimés par dose.

Laboratoire des Produits
« USINES DU RHONE »
21, rue Jean-Goujon, Paris (VIII[e])

ASCLÉROSOL

Traitement de la sclérose et de l'artério sclérose.

Composition :

Combinaison organique des principes actifs du drosera rotondifolia et de la silice.

En isolant du *drosera* les principes actifs, il a été obtenu une véritable combinaison chimique de ces principes avec la silice, combinaison dénommée *acide drosero-silici ue* et dans laquelle ce dernier acide n'existe plus sous sa forme minérale, mais sous une forme organique. En effet, les réactifs habituels de l'acide silicique ne révèlent plus cette substance dans l'acide drosero-silicique qui est une véritable combinaison de la silice, analogue à celle de l'acide phosphorique dans la phytine.

C'est cet acide drosero silicique qui constitue la base de l'asclérosol.

Sa formule a été établie de telle façon qu'une cuillerée à bouche contient 0 gr. 30 cgr. d'acide drosero-silicique, correspondant à 0 gr. 07 cgr. de silice assimilable.

Le médecin peut donc doser exactement la quantité de silice qu'il désire introduire dans un organisme où l'acide silicique est déficitaire.

Prix : 20 francs le flacon (*2 flacons pour un traitement*).

Préparé par de GENCV, pharmacien.

François CARTIER, 1, rue de la Martinière — LYON
Agent général pour la France.

ASCOLÉINE RIVIER

Il a été démontré par l'analyse chimique qu'une cuillerée à café ou cinq comprimés (dose moyenne) d'ASCOLEINE RIVIER équivalent à 1/2 litre de la meilleure huile de foie de morue.

L'ASCOLEINE, à base de lipoïde de foie de morue, contient les vitamines A C et D.

Quatre formes. — *Solution huileuse :* Une cuillerée à café 1/4 d'heure avant chaque repas.

Comprimés (véritables bonbons) : 1 à 5 comprimés suivant l'âge avant chaque repas.

Granulés : De quelques grains à une cuillerée à café avant chaque repas suivant l'âge et depuis un an.

Ampoules : Une injection intra-musculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Toutes pharmacies ou à défaut chez :

Henri RIVIER, Pharmacien
26-28, Rue Saint-Claude — PARIS

ASEPTONE

L'antiseptique idéal en gynécologie.

Formule. — Menthol, trioxyméthylène, essence thym, sulfate de cuivre, acide borique, alun (deux formes), poudre et comprimés.

Indications. — Antisepstie des organes génito-urinaires de la femme, métrites, vaginites, salpingites, flueurs blanches, ulcération du col de la matrice, toilette intime.

Avantages. — Odeur agréable, solubilité parfaite, ne tachant pas le linge, ni toxique, ni caustique, décongestive, microbicide, laissant après l'emploi une agréable sensation de fraîcheur et calmant immédiatement les démangeaisons.

Emploi. — *Poudre :* une cuillerée à café par litre d'eau bouillie chaude en injections et lavages, matin et soir.

Comprimés : 1 comprimé pour 2 litres, même emploi.

Prescrire : Une aseptone, poudre ou comprimés. Littérature et échantillons.

Laboratoires MOULIN

50, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

ASTASOL DOUETTEAU

Composition :

Poudres de plantes sélectionnées.
d'HYDRASTIS
et d'HAMAMELIS
rendues d'assimilation facile.

Formule rationnelle permettant l'emploi de ces 2 plantes sans incompatibilités chimiques. — Action thérapeutique plus puissante que celle des extraits et teintures.

Forme :

Cachets de petit diamètre.

Indications :

Troubles du système veineux. — Stases veineuses. — Varices. — Congestions. — Phlébites. — Hémorroïdes.

Doses :

3 cachets par jour avant les repas.

Laboratoires
DOUETTEAU FRÈRES.
20, Faubourg St Honoré,
Paris (VIIIe).

ASTHMYLOSE

Forme. — Sirop.
Composition. — Chaque cuillerée à bouche renferme :

Sirop thébaïque	10 gr.
KI *pur et desséché*	0 gr. 50
Sirop aromatique	Q. S.

Indications. — Asthme, Emphysème, Bronchite chronique.
Avantages. — Goût agréable ; dosage très rigoureux Action rapide et durable. Pas d'intolérance ; *jamais d'iodisme*.
Posologie. — Adultes 1 cuillerée à soupe ou 2 le soir au coucher *loin du repas*.

Dépôt général et échantillons :

France. — Laboratoires TAETZ
2, Rue Lesdiguières — PARIS (IVe)
Belgique. — M. F. RAMLOT
72, Rue de l'Escaut — BRUXELLES

ATEMNOL

Pansement local.

Stérilisé, antiseptique, émollient, analgésique permettant d'obtenir :

Sans Incision, ni Cicatrice,

l'évacuation rapide et complète du pus des Anthrax et Furoncles.

Trois Dimensions des Epithèmes.

N° 1 diam. : 0,050. n° 2 diam. : 0,065 n° 3 diam. : 0,080

Pharmacie V. HOUSSAYE.
126, rue de la Pompe, Paris (XVIe).

ATOPHAN CRUET

Acide phénylquinolique[2], — carbonique[4].
Produit chimique pur. N'est pas un mélange de médicaments.

Formes. — Cachets ou comprimés dosés à 0,50.

Prop. thér. — Goutte et rhumatismes articulaires. Manifestations arthritiques.

Dose. — 1 à 4 gr. par 24 heures dans les cas aigus. 1 gr. par 24 heures pendant 20 jours, dans les cas chroniques.

Mode d'emploi. — Pendant les repas, si le malade se nourrit, et à intervalles réguliers. Accompagner l'emploi du médicament de boissons abondantes et alcalines.

Robert CRUET, Docteur en Médecine
Pharmacien de 1re Classe
6, Rue du Pas-de-la-Mule — PARIS (IIIe)

ATOQUINOL CIBA

Phénylcinchoninate d'allyle. Solvant de l'acide urique, favorise puissamment son élimination par voie rénale.

Indications. — Diathèse urique en général, goutte, rhumatisme, dermatoses d'origine arthritique et toutes manifestations uricémiques.

Doses. — Etats aigus : 2 à 6 cachets ou cuillerées à café de granulé par 24 heures.

Etats chroniques : 1 à 3 cachets ou cuillerées à café de granulé, huit ou dix jours par mois.

La boîte de 20 cachets : 15 francs.
Le flacon de granulé : 18 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, place Morand — LYON

ATURAL

Composition. — Poudre à base d'anti-lab-ferment et de citrate de soude.

Action. — Produit physiologique, absolument inoffensif, dépourvu de goût. Extrait du sérum du jeune veau, animal le mieux adapté à digérer le lait de vache.

Empêche la coagulation du lait, diminue le séjour des aliments dans l'estomac.

Indications. — Intolérance lactée chez l'enfant et chez l'adulte.

Vomissements, diarrhée, gastro-entérite, troubles digestifs divers.

Mode d'emploi. — Chez l'enfant : Une mesure (environ 1 gr.) pour 100 gr. de lait.

Chez l'adulte : Une mesure dans un peu d'eau avant chacun des trois repas.

(Ne jamais porter à haute température.)

Laboratoires RENARD

142, Avenue de Clichy — PARIS

AVANAZOL COUTURIEUX

Traitement du coryza

Description. — Comprimés composés de Levurine Extractive extrait de gui et acore, pour le traitement du coryza : à employer dès l'apparition des premiers symptômes.
En flacons de 50 comprimés.

Action thérapeutique. — Les comprimés d'AVANAZOL provoquent une réaction de la muqueuse nasale et une phagocytose énergique (Levurine Extractive), avec disparition de la congestion (gui) et de l'irritation (acore).

ndication. — L'AVANAZOL constitue le traitement le plus efficace du coryza, à condition d'absorber, dès les premiers symptômes, *18 comprimés par jour en trois fois*. Continuer à la dose de 12 à 20 comprimés par jour. On obtient ainsi l'avortement du coryza.

Laboratoires COUTURIEUX
18, Avenue Hoche — PARIS

AZIGOL THEVENOT

Spécifique de l'Epilepsie.

Composition. — Comprimés à base de Tartrate boricocalcique (Voir *Borocalcyl Thévenot*), phényléthylmalonylurée, Extrait de Gelsemium, Extrait de Piscidia.

Indications. — Traitement de l'Epilepsie pour lequel l'*Azigol* donne des résultats absolument incomparables. Ce médicament réalise, en effet, une association renfermant de la Phényléthylmalonylurée, à faible dose, dont l'action suspensive sur les crises est fort connue : le Borotartrate de chaux qui agit comme modificateur puissant du tissu nerveux. Les extraits végétaux sont des anesthésiques qui diminuent la sensibilité périphérique et même la sensibilité de certains organes qui sont fréquemment l'origine de réflexes constituant le phénomène qui déclanche les crises. L'*Azigol* donne des résultats durables. Il peut, il doit être, petit à petit, remplacé par le *Borocalcyl* qui contient uniquement du Borotartrate de chaux. L'*Azigol* ne provoque pas l'intolérance des voies digestives, ni d'éruptions cutanées. Son emploi n'est accompagné d'aucun trouble sensoriel.

Dose. — 2 à 4 comprimés par jour, au plus. Les absorber trois quarts d'heure environ avant les repas.

Echantillons sur demande.
Prix de la boîte de 20 comprimés : 16 francs.
Fabriqué par la
Société des **Produits pharmaceutiques THEVENOT**.
21, rue des Roses — DIJON.

AZOTYL

Composition. — Lipoïdes spléniques et biliaires (cholestérine, goménol, camphre).

Forme. — Ampoules et pilules.

Propriétés thérapeutiques. — Médication antibacillaire (tuberculoses).

Doses et mode d'emploi

A. (Ampoules) injections sous-cutanées ou intra-musculaires (tous les jours ou tous les deux jours).

B. Pilules glutinisées, six par jour aux repas et dans l'intervalle des piqûres.

LABORATOIRES RÉUNIS
" LOBICA "
11, rue Torricelli, Paris (XVII^e)

AZUFROL

Soufre colloïdal

Description. — 1° *Capsules* kératinisées contenant 0 gr. 10 de soufre colloïdal sec, en flacons de 60 capsules ; 2° *Pommade* à 1/15 avec, comme excipients, vaseline et lanoline, en tubes d'étain de 45 grammes (usage externe).

Actoin thérapeutique. — Permet l'absorption du soufre colloïdal sous forme agréable, en évitant l'altération du soufre par le milieu acide de l'estomac, à des doses exactes et de conservation indéfinie

Indications. — 1° Capsules : 4 à 12 par jour contre le rhumatisme chronique, les arthrites, l'acné, la séborrhée, la bronchite chronique, le saturnisme. Pour le traitement intensif y adjoindre les injections de sulfurion (voir plus loin).

2° Pommade : Toutes affections cutanées justiciables du soufre.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX
18, Avenue Hoche — PARIS

BACKERINE

ACTIVÉE

Ferments du Docteur de BACKER et sels de magnésie

Modifiant l'organisme par développement des agents de fermentation

Forme. — Ampoules, cachets, dragées.

Indication. — Traitement de toutes les hyperplasies (tumeurs, néoplasmes, fibromes, épithéliomas, carcinomes, sarcomes, etc.).

Mode d'emploi. — Injecter une ampoule SOUS LA PEAU, tous les quatre à six jours. On prescrira en même temps l'usage des dragées ou des cachets de ferments et de sels magnésiens, qui augmentent l'efficacité des injections. Prendre avant les repas, quatre cachets ou huit dragées par jour en moyenne, plus dans les cas d'urgence.

LABORATOIRE AMIDO
A. BEAUGONIN, Pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV[e])

BAIN CARRÉ

Composition. — Bain iodo-bromo-chloruré, renfermant intacts tous les sels marins naturels. Bain marin complet.

Indications. — *Adultes* : nervosisme, asthénie, surmenage, convalescences, rhumatisme, arthritisme.
Enfants : Débilité, lymphatisme, troubles de la croissance, rachitisme.
Gynécologie : Traitement des affections gynécologiques, irrigations vaginales hygiéniques.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 boîte par bain.
Enfants : 1/2 ou 1/4 de boîte suivant la capacité de la baignoire.
Bains toniques et stimulants : 28° à 30°, 15 minutes.
Bains sédatifs : 34° à 38°, 25 à 40 minutes.
Injections vaginales : une cuillerée à soupe par litre d'eau chaude.

LANCOSME
71, avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII[e])

BAKOLYSE

Tuberculose sous toutes ses formes.

Compos. et Forme. — Solution injectable d'*Acides Aminés* et de *Créatinine* en ampoules de 2 cc. (Boîte de 10 amp).

Mode d'emploi. — Les injections se font hypodermiques ou intramusculaires, en moyenne tous les 3 ou 4 jours. — Elles sont indolores et ne risquent aucun accident, la solution ne renfermant ni toxiques, ni produits sériques ou microbiens.

Laboratoires A. SAUVIN

122, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI[e])
Tél. Fleurus 18.00 — Chèques postaux : Paris 810.16.
Adresse télégraphe : Bakolyse, Paris 43.

BALLOTYL

Agent le plus efficace de la Phytothérapie, Antispasmodique. Sédatif du grand sympathique.

Composition :

Alcoolature stabilisée de Ballote.

Posologie :

Irritabilité nerveuse. L à LX gouttes au coucher.

États sympathicotoniques ou *vagotoniques.* 5 prises de XXX gouttes par 24 heures.

Laborat. de PHYTOTHÉRAPIE de PARIS

M. Guillon, Pharmacien.
113, Boulevard Voltaire. Paris (XI[e])

BALMIGA

Tablettes fumigatoires.

Forme pharmaceutique :

Tablettes comprimées effervescentes.

Composition :

Baume du Pérou, Huile de pin sylvestre, Essence d'eucalyptus, Essence de thym, Essence de menthe, Menthol.

Action :

Antiseptie des voies respiratoires.

Indications :

Grippe, Bronchite, Extinction de voix, Coryza, Rhinite, Sinusite, Laryngo-trachéites.

Mode d'emploi :

Mettre successivement deux ou trois tablettes *Balmiga* dans un verre d'eau bouillante et prendre deux ou trois fumigations par jour.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

18, rue Pierre-Curie — PARIS (V^e^)

BALSAMOL LESCÈNE

Composition. — Drosera, Scille, Chlorocinnamates, Benzoate de Benzyle.

Forme. — Plus fluide et moins sucré qu'un sirop.

Caractéristiques. — *Chez les adultes* plus calmant, moins toxique que le BROMOFORME, les composés forméniques et les narcotiques ; *chez les enfants*, il peut être administré à *partir de 5 à 6 mois.*

Antiseptique des voies respiratoires.

Indications. — COQUELUCHE, toux spasmodiques, laryngées, toux émétisante des tuberculeux, asthme, *toux des vieillards.* GRIPPE.

Doses. — *Enfants* de plus de 6 mois : 3 à 10 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires L. LESCÈNE

LIVAROT (Calvados) — PARIS, 58, Rue de Vouillé.

Téléph. : Vaug. 08-19

BALSOFORME

Mélange balsamique du Dr Siauve-Evausy pour l'Anesthésie générale.

Composition. — Mélange de Schleich U. R. 90 p.
Gomenol Prevet..... 6 p.

Avantages. — Le Balsoforme associe les propriétés de ses composants : *faible toxicité, absence d'excitation, absence de mucosités dans le cavum, douceur de l'anesthésie, silence abdominal, réveil rapide et euphorique*, dus au Mélange de Schleich ; *action balsamique et anticatarrhale* du Gomenol garantissant presque à coup sûr contre les accidents pulmonaires post-opératoires.

Le Balsoforme n'a pas de contre-indications formelles, pas même l'ictère.

Présentation. — Ampoules scellées de 40 gr.

Emploi. — Avec l'appareil du Prof. Ombredanne (demander notice).

Laboratoire des Produits
USINES DU RHONE
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIIIe).

BANIKOL

Procédé André LANCIEN

Forme et Composition. — Comprimés de 0 gr. 20 dosés à deux centigrammes d'iodure de tétra-méthyl-ammonium, en association nucléo-albuminique et argentique.

Indications. — *Toutes les affections des organes lymphoïdes et glandulaires.*
Les troubles de la nutrition. Rhumatisme subaigu et chronique.
Les scléroses viscérales et vasculaires.
Les manifestations du tertiarisme.
Paludisme et, en général, *toutes les indications de l'iode et des iodures.*

Avantages. — Pas de contre-indication. Pas de toxicité. Pas d'iodisme.

Posologie.
Cas aigus : 5 comprimés le matin / 5 comprimés le soir } entre les repas.
États chroniques : 3 à 4 comprimés le matin, 3 à 4 comprimés le soir, entre les repas, 10 jours de suite se reposer 10 jours. Faire une cure d'un mois.

Laboratoire chimico-thérapique de Paris
12, rue des Apennins — PARIS (XVIIe)

BARDANE STABILISÉE DAUSSE

Médication abortive de la furonculose.

Forme. — *Pilules de Bardane Dausse* dosées à 0 gr. 20 d'extrait mou par pilule.

Indications. — Spécifique de la Furonculose vraie, mais sans action sur la Folliculite ou sur les autres inflammations superficielles.

Posologie. — 3 pilules matin, midi et soir, soit 9 pilules par jour. *Durée du traitement* : 4 à 5 jours pour obtenir la cicatrisation complète.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot, Paris (IV^e^.)

BAUME AROMA

Spécifique des rhumatismes et des douleurs en général.

Composition et forme. — Baume à base d'essence de plantes aromatiques et des constituants du liniment de Rosen.

Essences aromatiques	6	Salicylate d'amyle	4
Beurre de muscades	2	Acide salicylique	3
Vaseline	60		

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique et résolutif puissant. **Odeur agréable.**

Indications thérapeutiques. — Rhumatisme aigu et chronique, goutte, lumbago, torticolis, efforts et toutes douleurs musculaires, courbatures, névrites, sciatiques crurale et brachiale, pleurésie sèche, points de côté, foulures, varices.

Mode d'emploi. — Frictionner doucement et longtemps avec le baume pour en faciliter la pénétration. Étendre ensuite sur toute la région douloureuse une nouvelle couche de Baume et recouvrir avec une feuille de coton ordinaire que l'on maintiendra par une bande ou une ceinture, suivant qu'il s'agit d'un membre, ou du thorax et des reins.

Faire cette friction suivie du pansement une à deux fois par jour.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER
1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e^)
A Bruxelles : LE MARINEL, pharmacien, 46, r. du Trône.

BAUME DU Dr BAISSADE

Composition. — Association de camphre, soufre, goudron, huile de chaulmoogra, de consistance semi-fluide, d'odeur agréable.

Action. — Anti-prurigineux et analgésique, supprime immédiatement les Démangeaisons et la Douleur. Antiseptique puissant, calme et arrête l'élément inflammatoire des lésions cutanées.

Aucune causticité ; peut être appliqué sur les Eczémas les plus aigus et les plus récents, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

Indications. — Eczémas suintants, secs, aigus, chroniques. Tous les prurits, avec ou sans lésion cutanée. Lichen, Psoriasis, Acné, Folliculites, Furonculose, Impétigo, Séborrhée de la barbe et du cuir chevelu, Sycosis, Gerçures des seins, Papules et Pustules des fièvres éruptives.

Mode d'emploi. — En onction douce (Dermites aiguës), ou énergiques (Dermites chroniques) sur les parties malades, à la main nue ou à l'aide d'un tampon de coton. Recouvrir d'une compresse de gaze.

Un pansement par jour, le soir de préférence.

Ne pas laver la région traitée avant complète guérison ; se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge.

Laboratoire du Baume du Dr BAISSADE
Saint-Loup — MARSEILLE

BAUME BENGUÉ

Analgésique

Composition.

Menthol, salicylate de méthyle, lanoline.

Indications.

Rhumatisme, goutte, névralgies, points de côté, douleurs abdominales, douleurs de la gorge.

Mode d'emploi.

En onctions deux fois par jour en recouvrant d'une serviette ou flanelle.

Docteur BENGUÉ

pharmacien

16, rue Ballu — PARIS (IXe)

BAUME DELACOUR

Gerçures et Crevasses des Seins

Gerçures en général

Baume benzo-tannique

Mode d'emploi : Laver la crevasse avec de l'eau bouillie et un tampon d'ouate, appliquer le baume avec le pinceau qui accompagne le flacon et recouvrir les mamelons avec les bouts de sein en métal afin d'éviter le frottement du linge.

Prix du flacon avec le pinceau et deux bouts de sein :

6 fr. 50 (sans impôt).

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie.

56, boulevard Péreire — PARIS

BAUME DE LA MATERNITÉ

Composition :

Stovaïne	0,10
Résorcine	0,20
Acide borique	2gr.
Dermatol	0,50
Baume du Péron	0,10
Lano-vaseline	Q.S.

pour un tube.

Propriétés thérapeutiques. — Cicatrisant énergique des crevasses du sein et de toutes les gerçures.

Indications. — Érythème fessier, toutes gerçures en général.

Laboratoire NOGUÈS
11, rue Joseph-Bara — PARIS.

BAUME RHODIA

(Salicylate de Glycol solubilisé U. R.)

Succédané propre et inodore des baumes et onguents à base de Salicylate de Méthyle.

Traitement externe des douleurs rhumatismales et névralgiques

Le Baume Rhodia ne provoque pas les irritations constatées avec certains éthers salicylés de la glycérine.

Deux Présentations :

1° Forme liquide. — 2° Forme crème.

Laboratoire des Produits « USINES DU RHONE »
21, Rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^{e})

BAUME SELENIA

AU SÉLÉNIUM COLLOÏDAL

Propriétés thérapeutiques. — Il en est quatre principales :

Le **Baume Selenia** est *décongestif*. Calme la *démangeaison, le prurit. Décape les téguments.* Est *cicatrisant.*

Indications. — Il est le médicament de choix dans le traitement des *Eczémas, Pyodermites. Ulcérations de la peau. Bouton d'Orient* (Clou de Biskra).

Mode d'emploi. — S'applique à froid, mais de *préférence à chaud*, l'action étant ainsi plus immédiatement calmante et plus grande. Dans ce cas, liquéfier le Baume complètement au bain-marie.

C. DAVID-RABOT et ses fils.

Dr en Phie — Phiens Ex. Intes des Hôp. de Paris.

49, rue de Bitche — COURBEVOIE (Seine).

Belgique : H. Cretin, 8, rue des Eburons, BRUXELLES.

BAUME SUELTA

Composition.

Extrait de Marrons d'Inde stabilisé, Euproctol (Di-Iodosulforésorcinate de Bismuth). Stovaïne. Adrénaline 0,001 %. Baume du Pérou.

Indications et Propriétés.

Traitement local des Hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal. **Sédation immédiate de la douleur, décongestion et vasoconstriction**, antisepsie, suppression des hémorragies.

Mode d'emploi.

Onction le matin et après chaque garde-robe. Pansement pour la nuit. Une canule métallique s'adapte au tube pour permettre l'application de la Pommade sur les Hémorroïdes internes.

Échantillons :

MICHEL DELALANDE

13, Rue Lacharrière — PARIS (XIe)

BEATOL

Prop. Thér. — Sédatif nerveux, Hypnotique.

Indications. — Insomnies, Affections aiguës et chroniques, Intoxications. Maladies nerveuses ou mentales.

1° Forme : Ampoules.

Composition :

Diéthylmalonylurée	0 g. 25
Bromhydrate de scopolamine	1/4 de mgr
Soluté de valériane	2 cm³

Mode d'emploi. — Le contenu d'une ampoule injecté sous la peau.

2° Forme : Liquide

Composition :

Diéthylmalonylurée	0 gr. 18
Valériane stabilisée Q. P.	5 cm³
Extrait de jusquiame	0 gr. 015

Mode d'emploi. — 1 à 4 cuill. à café dans de l'eau sucrée, après le repas du soir, une heure avant le coucher.

3° Forme : Comprimés.

Composition :

Diéthylmalonylurée	0 gr. 18
Intrait de valériane	0 gr. 10
Extrait de jusquiame	0 gr. 02

Mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés pris avec de l'eau ou une infusion chaude dans l'intervalle des repas.

Laboratoires Réunis " Lobica "
11, Rue Torricelli — PARIS (XVII^e)

BEEF LAVOIX

ou Vin de Lavoix

Composition. — A base de vieux vin de Banyuls, l · Beef Lavoix contient les principes nutritifs de la viande, les principes actifs du quinquina et des phosphates.

Indications. — Convalescence.
Tuberculose.
Epuisement.
Inappétence.
Anémie.
Grossesse.
Allaitement.

Posologie. — Un verre à Madère avant ou après chaque repas.

Maison du Docteur PILLET
5, Avenue Victoria
PARIS

BELHÉMINE

Ampoules de Sérum pur de Sang de Cheval, Sérum hématopoiétique.

Indications. — Toutes les anémies, hémorragies, faussescouches. En pansements locaux : plaies, ulcères variqueux, brûlures.

Mode d'emploi. — Par voie buccale : 1 à 2 ampoules par jour.

Compléter le traitement par l'usage de la SANGUIPLASMINE.

Granulé préparé avec le Caillot sanguin : 2 cuillerées à café par jour.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire de Sérothérapie
H. AMMANN, Pharmacien Licencié ès Sciences
Boulogne-Billancourt 76, rue Escudier
Tél. : Molitor 01-90.

BELLADENAL " SANDOZ "

Association de Phényl-éthyl-malonylurée et de Bellafoline.
Le plus puissant des anti-nervins

Indications spéciales. — Épilepsie, angine de poitrine, tremblements, asthme, tous états de crise.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour.
Epilepsie : 4 à 6 comprimés.
Enfants. — 2 à 4 demi-comprimés.

Produits SANDOZ,
3 et 5, rue de Metz, Paris (X^{e}).
M. CARILLON, Pharmacien de 1re Classe,
Dépôt général et vente :
Usine des pharmaciens de France,
125, rue de Turenne à Paris (III^{e}).

BELLADONE DAUSSE (1)

Préparation titrée chimiquement et *contrôlée physiologiquement*, présentant toutes les garanties de constance dans son action.

A prendre par gouttes.

Indications. — Tous les états de spasme et d'hyperexcitabilité. Indiqué dans l'*asthme*, les *gastropathies douloureuses*, la *toux spasmodique*, l'*épilepsie*, l'*incontinence d'urine*, le *mal de mer*.
Modérateur des sécrétions dans l'*hyperchlorhydrie*, les *sueurs nocturnes*.

Posologie. — *Adultes :* X gouttes, 3 à 6 fois par jour, dans une tisane.
Enfants : II gouttes par jour et par année d'âge, en 3 fois.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot, Paris (IV^{e}).

(1) Ne pas confondre cette préparation avec la solution d'extrait de Belladone.

BELLAFOLINE " SANDOZ "

Alcaloïdes totaux de la Belladoné sous forme de malates, purs, stables, exactement dosés, injectables.

Traitement à effets constants
du Spasme et des Vagotomies
Modérateur des Sécrétions

Bellafoline :

(Comprimés) : 1 à 2, trois fois par jour
(Gouttes) : 10 à 20, trois fois par jour.
(Ampoules) : 1/2 à 2 par jour.

SIROP DE BELLAFOLINE
spécialisé pour la médecine infantile

PRODUITS SANDOZ
3 et 5, Rue de Metz — PARIS (X^e^)

Dépôt général et vente :
Usine des Pharmaciens de France
125, Rue de Turenne — PARIS (III^e^)

BENZO-BISMUTH MILLOT

(Ampoules. Antisyphilitique énergique).

Indolores. — Ni abcès. — Ni enkystement.

Le **Benzo Bismuth,** sel soluble, contient quatre centigrammes de Bismuth métal par injection (soit 0 gr. 20 de sel), quantité nécessaire pour obtenir l'effet thérapeutique maximum avec une absence complète de toxicité, car il s'agit ici de quatre centigrammes de métal intégralement actif puisqu'intégralement absorbé. Ce qu'on ne peut obtenir avec un sel insoluble.

Le **Benzo Bismuth,** présenté sous forme de poudre, extemporanément soluble, s'injecte dans les muscles de la région fessière haute avec autant de commodité qu'une banale injection de cacodylate.

Le traitement se fait par séries de 10, 15 ou 20 injections bi-hebdomadaires ou tri-hebdomadaires en cas d'urgence.

Les résultats thérapeutiques sont tout à fait comparables à ceux qu'on est accoutumés d'attendre des arsénobenzols, sans aucun des dangers ni inconvénients de ces derniers.

Les accidents primaires et secondaires disparaissent rapidement. Les syphilis viscérales et nerveuses sont profondément et durablement influencées.

La réaction de Bordet-Wassermann devient négative dans des délais très courts et reste négative sous l'influence du traitement benzobismuthé.

Vendu en boîtes contenant poudre et solvant pour 5 injections. Prix médical : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

LABORATOIRES MILLOT

54, rue de la Bienfaisance, Paris (VIII[e])

Tél. Laborde 0-69

BENZOFLORINE JULIEN

Gouttes

Composition :

Extr. fluide valériane fraiche stabil....	1000
Alcoolature de Passiflora incarn.....	1000
Teinture de Cratægus oxyacantha.....	1000
Benzoate de benzyle et dériv. benzylés.	10

Indications. — Tous les états spasmodiques, Insomnies, Angoisses, Vertiges, Éréthisme cardio-vasculaire, Tachycardies, Arythmies Palpitations.

Posologie. — Insomnies : 50 à 60 gouttes le soir dans une infusion.
Spasmes : 25 gouttes 3 à 4 fois par jour.

Louis JULIEN
Docteur en Pharmacie,
103, rue de Rennes — PARIS

BENZOLACTINE

Comprimés digestifs
Alcalins, Absorbants, Reminéralisants.
(Lacto-Alcalino-Phosphatés.)

Propriétés thérapeutiques. — Neutralise l'**Hyperacidité**, supplée à l'**Insuffisance hépatique**, annihile l'**Auto-intoxication**. Puissant sédatif et curatif dans les Affections gastriques, hépatiques et intestinales.
Supérieure aux comprimés lactiques grâce à son action régulière et constante.

Indications. — Gastropathies, Dilatation, Stase, Ulcères, Dyspepsies, Entérites, Colites, Hépatites, Fièvres infectieuses, Déminéralisation, Cachexies, Dermatoses, etc.

Composition. — Chaque comprimé de 1 gr. contient : Benzonaphtol 0 gr. 01 Carbonates de Mn 0.02, de Mg 0.07, de Ca 0,20. Bicarbonate de Na 0. 15. Glycérophosphate de Ca 0.05. Lacto-saccharose et menthe. Q. S. 1 gramme.

Doses et emploi. — Croquer 2 ou 3 comprimés à la fin des 2 principaux repas ou les délayer dans un demi-verre de liquide quelconque. *Enfants* : 2 à 3 comprimés par jour.

Échantillons et Littérature :
Laboratoires BACCAVIN
38, rue Albouy — PARIS (Xe)

BENZOLACTOL

Granulé soluble, d'absorption très agréable

Propriétés therap. — Antiseptique spécifique de toutes les affections du tube digestif. Par son action oxydante (MgO_2), transfixiante et destructive, le *Benzolactol* possede le maximum d'action microbicide gastro-intestinale.

Composition. — Combinaison de Peroxyde de Magnésium Hopogan), de Benzoate de Naphtyle, de Salicylate de Phenyle Lactate de manganèse et sucre granulé

Indications. — Toutes les affections aigues ou subaiguës du tube digestif. Fermentations et infections gastro-intestinales. Entérites. Entéro-colites mucomembraneuses, Embarras gastriques, Langue chargée, Intoxication gastro-Jimentaire, Grippe à forme gastro-intestinale, Ictère, Gastro-entérite des nourrissons, Fièvre typhoïde. Affections cutanées, Furonculose. Paratyphoïdes. Infections alimentaires, etc.

Cas Chirurgicaux et Affections Contagieuses

Dose et Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café après le repas. Laisser fondre dans la bouche.

Pour les enfants (jusqu'à 3 ans), par demi-cuillerées à café 2 à 4 par jour.

Echantillons et litttérature

Laboratoires FÉVRIER et DECOISY

26, rue de Sévigné — PARIS (Ve)

BENZOPHOSPHINE CHRISTIAENS

(Antiseptique des Voies urinaires et de l'intestin).

Solubilisant de l'Oxalate de Chaux

Indications. — Coliques néphrétiques. Lithiase rénale. Diathèse urique et *Oxalalurique*, Fermentations du tube digestif.

Composition. — Phosphines, benzoate, magnésie.

Doses. — Moyenne de 3 cuillerées à café par jour, empêche la précipitation de l'Oxalate de Chaux dans les urines.

Dose de 6 cuillerées à café, comme dissolvant des Calculs.

N'irrite pas le *rein* comme le fait *l'Urotropine* et a au contraire une action nettement sédative.

2, rue du Champs-de-Mars, Reims

BENZYLOL

Spécifique des affections spasmodiques des organes à musculature lisse, à base de Benzoate de Benzyle et de Benzaldéhyde.

Deux présentations : 1° Gouttes. 2° Perles.

GOUTTES. — Action antispasmodique sur tous les muscles lisses de l'organisme.
Spécifique de l'Hypertension. Asthme vrai. Coliques hépatiques ou néphrétiques. Constipation et diarrhée spasmodiques. Hoquet persistant. Coqueluche. Mal de mer.

Posologie. — *Adultes :* 30 à 40 gouttes toutes les 3 ou 4 heures.
Enfants : 2 à 4 gouttes par année, toutes les 3 ou 4 heures.

PERLES. — Spécifique de la Dysménorrhée (règles douloureuses).

Posologie. — Deux perles à un quart d'heure d'intervalle ; 6 à 12 par jour.

Laboratoire E. HAUTDIDIER
37, rue Galilée, PARIS (XVI[e]).

BERKENDYL

(sodium paratoluène sulfochloramine)
en comprimés à 0 gr. 25.

Dérivé chloré pour l'antisepsie suivant la méthode du Dr Carrel.
Non toxique, solubilité parfaite.
Supérieur aux hypochlorites parce que :
Pouvoir bactéricide quatre fois plus grand. Non irritant. Conservation illimitée.

Union Chimique Belge, S. A.
Division :
Produits Pharmaceutiques MEURICE
68, Rue Berkendael,
BRUXELLES (Belgique).

BETUL-OL MIDY

(Méthyl oléo-salicylate comp.)

Liniment pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

Compos. — Menthol et chloral en solution dans de l'essence de Bétula-Lenta obtenue par fermentation et distillation (salicylate de méthyle naturel).

Mode d'emploi. — Imprégner largement un morceau de flanelle, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé. Renouveler l'application plusieurs fois par jour.

L'absorption du *Betul-Ol* se fait si rapidement par la peau, que dix minutes après on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

Propr. thér. — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

Indications. — Lumbago, sciatiques, douleurs des articulations, névralgies.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e)

BEXININE

Spécifique idéal de la Coqueluche, des grippes, toux convulsives, catarrhe bronchique.

Propriétés thérapeutiques :

Seul médicament inaltérable et non toxique. Jugule la coqueluche en moins de huit jours.

Doses et mode d'emploi :

Toujours à jeun dans du lait bouilli et très chaud ou, à défaut, dans infusion de tilleul ou feuilles d'oranger.

Doses pour 24 heures :

Enfant de 2 mois : 10 à 30 gouttes en trois fois.
(Augmenter de 10 gouttes par mois.)
1 an : 2 cuillerées à café.
2 ans : 2 à 4 cuillerées à café.
3 ans : 3 à 6 —
4 et 5 ans : 2 à 3 cuillerées à soupe.
6 et 7 ans : 3 à 4 —
8 à 10 ans : 3 à 6 —
Adultes 6 à 10 —

La *Bexinine* est le seul médicament garanti jugulant la coqueluche en moins de huit jours. C'est le spécifique idéal des toux spasmodiques, grippales et du catarrhe bronchique.

Observations et attestations médicales à l'appui. En 1925, les épidémies de Vichy et de Nancy ont été jugulées par la Bexinine ainsi que celle de Pau en 1927.

Laboratoire AMBLARD
à Cunlhat (Puy-de-Dôme).

BI-CITROL MARINIER

Citrates monosodique et trisodique
en granulé soluble.

Indications :

Dyspepsies de tout ordre (Hyperchlorhydrie, hypochlorhydrie, vomissements).

Insuffisance hépatique (Migraines, constipation, crise hémoclasique).

Hyperviscosité sanguine. — (Hypertension, affections du système veineux).

Arthritisme (Rhumatismes, goutte).

Doses :

2 à 4 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau chaude.

Laboratoire MARINIER

159, Rue de Flandre — PARIS (XIXe)

BILEYL FOURNIER

Sels biliaires
(extraits de la bile de bœuf)

Forme. — Globules glutinisés (digestion intestinale).

Dose. — 4 à 8 globules par jour, à prendre vers la fin du repas, par 2 ou 3.

Indications. — 1° Les causes d'arrêt d'excrétion ; lithiase, compressions, ictères subaigus et chroniques par rétention ;

2° Les cas d'insuffisance biliaire ; cholémie familiale, entérocolite muco-membraneuse.

L'étui de 60 globules : 12 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères

26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

BILIASE RABY

Globules d'extrait de fiel de bœuf renfermant tous les principes actifs de la bile.

Mode d'action. — Cholagogue énergique. Le plus constant de tous les agents opothérapiques biliaires.

Indications. — Coliques hépatiques. Ictère. Lithiase biliaire. Entérocolite et constipation par **insuffisance biliaire.**

Doses. — 4 à 12 globules par jour (aux repas).

R. RABY, Pharmacien
Asnières (Seine).
(Échantillons sur demande)

BILIFLUINE

du Docteur L. BIGNON, de Vichy
Traitement de la Lithiase Biliaire
et des Ictères

Composition. — A base d'oléate de soude et de bile dépigmentée et décholestérinée.

Indications. — Lithiase biliaire. Ictère catarrhal, Ictère par rétention. Constipation. Colite muco-membraneuse. Congestion du foie et cirrhoses sous toutes leurs formes.

Posologie. — 4 pilules par jour, au moment des repas : le matin, à midi, à 4 heures et au souper ; ou encore en deux fois à midi et le soir (pilules et sirop).

Laboratoires "STÉNÉ"
4, Place des Vosges — PARIS

BILIRHÉINE

Principes extractifs végétaux sélectionnés, renforcés par un catalyseur : le Manganèse.

Indication.

Insuffisance hépatique.

Posologie.

Deux pilules glutinisées à la fin de chaque principal repas.

Laboratoires MONDOLAN

58, rue de Clignancourt — PARIS (XVIII^e^)

BILIVACCIN

1° Pastilles Antityphiques Biliées.
2° Pastilles Antidysentériques.
3° Pastilles Anticholériques Bilrées

pour la Vaccination préventive, par VOIE BUCCALE, contre la Typhoïde, les Para A et B, la Dysenterie bacillaire, le Choléra.

Aucune réaction. — Pas de contre-indication.

Aucune limite d'âge.

A prendre à jeun, trois matins de suite.

"LA BIOTHÉRAPIE"

3, rue Maublanc — PARIS (XV^e^)

Téléphone : Ségur 05-01.

BIOCALCOSE

Granulé tonique, Reminéralisant intégral.

Granulé soluble, de saveur très agréable.

Hypophosphite de Ca ; Manganèse, Fer, Magnésie et Chaux en combinaison organique avec le glucose ; Fluor, Silice, etc., dans les proportions où ces corps se trouvent dans l'organisme.

Constitue une véritable synthèse de la matière vivante.

Prop. thér. — Tonique, reminéralisante.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café par jour jusqu'à 8 ans ; 3 ou 4 au-dessus de cet âge, à croquer, ou dissoutes dans un peu d'eau, lors des repas.

Laboratoires LEMATTE et BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS

Télégramme : Chevrematte-Paris

BIODERMYL MONAL

Formes :

Ampoules et globules glutinisées.

Composition :

Chaque *ampoule* de 2 cm³ contient : une solution indolore et bien tolérée de Hg I² à 1 %, soit 0 gr. 02 par ampoule.

Chaque *globule* contient : Hg I² pur 0.0025 ; KI, 0.025.

Doses. — Série de 12 injections.

4 globules par jour, aux repas.

Traitement discret ; pas d'indications sur l'étiquette et le prospectus du flacon de globules.

Laboratoires MONAL & Cie

6, rue Bridaine — PARIS

BIODYNAMINE

Indications générales. — Débilité. Neurasthénie. Phosphaturie. Convalescence. Surmenage intellectuel et tous états asthéniques et atoniques.

1° **Ampoules :**

Sulfate de strychnine	1 milligr.
Cacodylate de soude.	0 gr. 05
Nucléinate de soude.	0 gr. 05
Glycérophosphate de soude.	0 gr. 05
Sérum isotonique camphré.	1 cc. 3

par ampoule.
(1 à 2 ampoules par 24 heures.)

2° **Gouttes concentrées** (facilitant l'administration progressive) : de X à XL gouttes, bien diluées, avant chaque repas, suivant le cas et d'après le tableau :

	20 Gouttes cont.	40 Gouttes cont.	60 Gouttes cont	80 Gouttes cont.	100 Gouttes cont.
Sulfate de Strychnine	1 mill.	2 mill	3 mill.	4 mill.	5 mill.
Méthylarsinate de Soude	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
Polyglycérophosphates donnant en Acide phosphorique . . .	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75

3° **Elixir :** Préparation d'un goût très agréable et contenant par cuillerée à soupe de 15 grammes :

Phosphate de soude	0 gr. 060
Acide phosphorique officinal. . . .	0 gr. 053
Méthylarsinate disodique.	0 gr. 012
Sulfate de strychnine	0 gr. 0006

2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, pharmacien de 1re classe de l'Ecole Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS

BIOGASTRINE

Pansement gastrique complet, c'est-à-dire associé à la médication sédative et à la médication antispasmodique

2 Formes. — 1° Granulé non aromatisé, de couleur blanche, ne contenant pas de sucre ;
2° Granulé aromatisé, de couleur jaune pâle contenant 15% seulement de sucre.

Doses. — Chaque jour régulièrement à jeun, loin des repas, une ou deux cuillerées à café.
1° le matin ; 2° vers 17 heures ; 3° le soir au coucher, au moins 3 ou 4 heures après le repas.

Avantages. — Grande efficacité. Pas d'intolérance ni de contre-indication, ne constipe jamais. Pas d'accoutumance, même en cas de traitement prolongé. Prix très avantageux permettant un traitement peu onéreux.

Echantillons et littérature

BERTHIOT et Cie

PHARMACIENS DE 1re CLASSE

1, Boulevard Henri-IV — PARIS

BIOGÉNOL DEMASLES

Puissant accélérateur de la nutrition.

Granulé. — Contenant, par cuillerée à café :
1 centigr. de glycéro-arséniate.
0.50 centigr. de phosphates organiques.
1 cuillerée à café avant les deux repas.

Liquide. — Même composition que le granulé, mais contient de la cola en plus. 1 verre à liqueur avant les repas.

Gouttes Arséno Biogénol. — Strychnine, glycéro-arséniate, extraits de quina, cola, coca.

Gouttes Phospho Biogénol. — Strychnine, acide phosphorique, extraits de quina, cola, coca.

Pour XX gouttes, 1 milligr. de strychnine, 5 milligr. de glycéro-arséniate ou 25 cgr. d'acide phosphorique. Doses moyennes : X à XX gouttes aux 2 repas. Doses progressivement croissantes : jusqu'à CXX gouttes.

Ampoules. — De 1 cm³ une ampoule contient :

glycéro-arséniate	0.01 centigr.
sulfate de strychnine	0.001 milligr.

LABORATOIRES DEMASLES

à Vienne (Isère.)

BIOLACTYL FOURNIER

Symbiose de deux ferments lactiques orientaux sélectionnés

Usage médical :

1° Culture en bouillon :

En boites de 10 fl., pour adultes.

La boîte : 24 fr.

En boîte de 2 fl., pour nourrissons.

La boîte : 7 fr. 50

En boîte de 6 tubes (pour le caillage du lait).

La boîte : 6 fr.

2° Culture séche ; boîte de 60 comprimés (4 à 6 par jour).

L'étui : 10 fr

Indications. — Traitement des putréfactions intestinales et de l'auto-intoxication digestive.

Usage chirurgical :

1° Culture liquide, en boîtes de 6 tubes

La boîte : 6 fr.

2° Culture sèche en poudre

La boîte : 6 fr.

Indications. — Pansement des plaies infectées, escharres, vaginites, cystite tuberculeuse, affections nasales et laryngées, pyorrhée alvéolo-dentaire.

Laboratoires FOURNIER Frères

26, boulevard de l'Hôpital — PARIS

BIONERGYL

Complexe nucléo manganique. Le plus puissant réparateur des tissus musculaires, nerveux et osseux.

Propriétés thérapeutiques. — Apporte à ces tissus, non seulement le phosphore et l'arsenic (directement assimilables) nécessaire à leur *restitution ad integrum* mais aussi le *manganèse* « véhicule » de l'oxygène indispensable à tous phénomènes d'assimilation et de restauration anatomiques.

Présentation. — 2 formes : Granulé fondant d'une absorption facile.
Elixir d'une saveur particulièrement agréable.

Indications. — Anémies et chloroses. Neurasthénie. Convalescence. Surmenage. Amaigrissement. Tuberculose dans ses triples manifestations : pulmonaire, cutanée, osseuse. Rachitisme. Troubles de la croissance.

Posologie. — Chez l'adulte, granulé : 2 cuillerées à café par jour. Chez l'enfant : 1 cuillerée à café avant les repas.
Elixir : Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.
Enfants : 1 — — —

Marc DELAGE, Pharmacien
2, place du Théâtre-Français — PARIS

BIOPHORINE GIRARD

Kola Glycéro-Phosphatée

Granulé à base de Kola, Glycérophosphate de chaux, Quinquina et Cacao vanillé.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour que l'on peut croquer ou dissoudre dans une boisson quelconque.

Prop. Thér. — *Tonique du système nerveux, facilite l'effort musculaire.*

Indications. — Surmenage, Vertiges, Anémie cérébrale, Névralgies rebelles, Névroses.

Laboratoire A. GIRARD
48, rue d'Alésia. Paris.

BIOPHYTOL

Le plus puissant Reconstituant général

Le « **Biophytol** » associe, sous la forme d'un Elixir très agréable au goût, *l'Arsenic, le Manganèse* et le *Phosphore organiques* à la *Cola fraîche* et à *l'Opothérapie Séro-sanguine totale.*

Composition. — Chaque cuillerée à soupe de « **Biophytol** » contient :

Extrait hématique total obtenu par concentration, dans le vide, à froid, de Sérum et globules d'animaux sélectionnés.	10 cc.
Méthylarsinate de Sodium	0 gr. 03
Nucléinate de Manganèse	0 gr. 05
Glycérophosphate de Sodium cristallisé.	0 gr. 25
Extrait de cola fraîche	0 gr. 75
Sirop à l'Extrait hydro-glycéro-alcoolique d'écorce d'oranges amères et de cannelle vanilliné Q. S. P	15 cc.

Posologie. — *Adultes :* Une cuillerée à soupe pure ou mieux diluée dans un peu d'eau gazeuse, immédiatement avant les deux principaux repas.
Enfants : Une ou deux cuillerées à café, suivant l'âge, avant les deux principaux repas.

Ces doses peuvent être doublées dans les cas graves.

Indications. — Toutes les Affections qui réclament une médication réparatrice énergique : Tuberculoses, Anémies, Convalescences des Maladies Infectieuses graves, Troubles de la Croissance, Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme Paludisme, Diabète, Névroses, Asthénies Physiques et Psychiques.

« **Biophytol** » réalise la Synergie reconstituante la plus puissante qui ait jamais été mise à la disposition du médecin.

Laboratoires R. BOUYSSOU, et Cie
90, Avenue des Ternes, Paris (XVII^e^)
Tél. : Wagram, 61-42

BIOPLASTINA SERONO

Forme. — Ampoules de 5 c. c. (boîtes de 6). Ampoules de 1 c. c. 5 (boîtes de 10).

Composition. — Émulsion de lécithine avec les lutéines (éthers de la cholestérine) diluée dans le sérum physiologique.

Propriétés. — Émulsion stable assurant l'assimilation des substances phosphorées.

Indications. — Épuisement et déminéralisation, anémies, neurasthénie et prétuberculose.

Mode d'emploi. — Injections hypodermiques indolores : 20 à 30 injections pour un traitement, une par jour.

Laboratoires SANTONI
6, Rue des Ursulines — PARIS (Ve)

BIOTRIGON

Composition :

Forme A : Extrait fluide de fénugrec désodorisé, Arrhénal, Manganèse, Iode, Tanins.
Forme C : Extrait fluide de fénugrec désodorisé, Calcium, Phosphore.

Propriétés :

Augmentation du poids, des forces, de l'appétit. Amélioration de l'état général.

Indications :

Biotrigon A : Insuffisance organique, Asthénie, Prétuberculose, Adénopathie, Débilité.
Biotrigon C : Mêmes indications plus tuberculose pulmonaire confirmée à forme évolutive.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 cuillerée à bouche au moment des repas.
Enfants : 1 cuillerée à café au moment des repas.

Laboratoires du BIOTRIGON
1, rue des Tournelles — PARIS

BIOZOL

Puissant tonique régénérateur.
Reconstituant général de l'organisme.

Composition. — Granulé renfermant : Nucléinate de manganèse, Méthylarsinate de soude et de fer, Glycérophosphate de chaux, Extraits de maté et de cola, (méthylarsinates, 5 milligr. par cuillerée à café).

Posologie. — Se prend à la dose de 2 à 3 cuillerées à café par jour, dans de l'eau, du vin, du thé, du lait avant ou après les repas.

Prix du flacon : **10** francs.

Laboratoires CAILLAUD
37, rue de la Fédération, PARIS (XV^e^).
Tél. : Invalides 12-63

BIS-KA-MA

Formes Pharmaceutiques. — Poudre impalpable — comprimés.

Composition. — Bismuth (carbonate), Kaolin, Magnésie, Mucilage, Sucre vanillé.

Action. — Réalise le « poudrage » du tube digestif. Anti-acide, Modificateur de la flore intestinale.

Indications. — Acidité pré ou post-prandiale : 1 cuillerée à café aux 3 repas.
Constipation chez les hyperchlorhydriques et les entérocolitiques : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun.

Un comprimé équivaut à une cuiller à café.

Laboratoires DURET & RÉMY
ASNIÈRES (Seine)

BISMHYDRAL

Composition. — Définie et stable de chlorure mercureux-léger pur, et d'azotate basique de bismuth spécialement préparés.

Propriétés thérapeutiques. — Réalise l'association et la synergie médicamenteuse du bismuth et du mercure dans le traitement de la syphilis (Docteur Milian).

Indications. — Syphilis à toutes les périodes et sous toutes ses formes. Cure d'entretien discrète par voie buccale.
Tolérance parfaite, action sûre, aucune toxicité.

Doses. — Un à deux comprimés une heure avant les deux principaux repas.

Littérature et Echantillons

LANCOSME

71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII[e])

BISMUTH DESLEAUX

Composition. — Carbonate de bismuth pur, amorphe, obtenu par un procédé de fabrication spécial assurant son adhérence parfaite à la muqueuse.
Action. — Pansement idéal de la muqueuse gastro-intestinale, le bismuth étant avant tout dans les affections de l'estomac le médicament de la douleur (Prof. Hayem). — Met à l'abri des accidents provoqués par le sous-nitrate (nitrites). Supérieur aux produits de substitution (kaolin, talc), goût agréable, facilement absorbé par les malades les plus difficiles.
Indications. — Ulcères, Ulcérations, Gastropathies, Hyperchlorhydries, spasmes, gastro-entérites, Oxyuriase, etc.
Posologie. — (Chaque flacon porte un couvercle-mesure dont le contenu correspond à environ 6 gr. de produit). — 10 à 50 gr. par jour suivant les cas, soit le matin à jeun, soit fractionnés 1/2 heure avant chaque repas, dans eau ou tisane. — Oxyures : *Adultes*, 30 gr. par jour, en 2 fois, à jeun. *Enfants*, 5 à 10 gr. par jour en 2 fois, à jeun, selon l'âge, dans un verre d'eau tiède. — Une cure de 6 jours suffit habituellement, une deuxième cure peut paraître utile, une troisième est rarement nécessaire.

Fournisseur des Hôpitaux de Paris et Province

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel III — PARIS (VIII[e])

BISMUTHÉS "MEURICE"

Bismuthyl. — Suspension de Bismuth précipité en milieu glucosé, 97 0/0 de Bi-métallique.

Ampoules de 2 c.c. pour injections intra-musculaires.

Biquinyl. — Suspension huileuse d'iodo-quinate de Bismuth enrichi par addition de BiOCe, 50 0/0 de Bi-métallique.

Ampoules de 3 c.c.

Injections sous-cutanées ou intramus-culaires.

Union Chimique Belge, S. A.

Division : Produits pharmaceutiques "Meurice"

68, r. Berkendæl, BRUXELLES (Belgique).

BISMUTHION COUTURIEUX

Description. — Le Bismuthion est une suspension colloïdale de Bismuth pur dans l'eau distillée, obtenue par procédé électrique et destinée au traitement de la syphilis. En boîtes de 4 ampoules de 3 cc.

Action thérapeutique. — Le Bismuthion s'injecte dans les veines ou les muscles sans précautions spéciales. Il est parfaitement toléré, non toxique, ne provoque aucune réaction douloureuse ou autre, diffuse rapidement dans l'organisme et particulièrement dans les lésions syphilitiques et est facilement éliminé sans irriter les reins. Il paraît agir sur les spirochètes comme *catalyseur*.

Indications. — Le Bismuthion grâce à son absence de toxicité, est spécialement indiqué pour le traitement des syphilis anciennes qui exigent un long traitement et pour maintenir l'organisme sous l'imprégnation bismuthique.

Laboratoires CH. COUTURIEUX
18, avenue Hoche — PARIS

BISMUTHOIDOL

Bismuth colloidal, à grains fins.

Ampoules.

Titrées à 0 gr. 004 par cc.
Indolores.
Stériles.
Solution aqueuse.

Indications.

Spirillicide.
Syphilis.
Toutes maladies à protozoaires.

Mode d'emploi.

Une ampoule tous les 2 ou 3 jours dans les cas ordinaires. — Une tous les jours dans les cas graves.

Laboratoires M. ROBIN
13, rue de Poissy — PARIS

BISMUTH TULASNE

Pansement gastrique.

Au S. Nitrate de Bismuth pur et polybasique préparé suivant la méthode de A. Tulasne, ex-chef de laboratoire à l'hôpital de la Pitié, de façon à ne titrer que 7 % d'acidité. Peut ainsi être employé aux plus hautes doses.

Indications. — Traitement classique des affections douloureuses de l'estomac. Cicatrisation des *Ulcères* par formation d'une couche de mucus protectrice (voir Littérature). Neutralisation d'HCl en excès dans l'*Hyperchlorhydrie*.

Présentation. — En boîtes de 10 tubes-doses de 10 gr. Prix : 25 francs.

Prescrire. — Une dose ou deux, suivant le cas, à prendre en une seule fois le matin à jeun dans un verre d'eau. La même dose peut également être prise en plusieurs fois dans la journée (une demi-heure avant les repas).

Le Bismuth donné à ces doses ne produit pas de constipation.

Littérature et Échantillons.
Laboratoires BAUDRY
68, Boulevard Malesherbes, PARIS.

BIVATOL

Formule. — α Carboxéthyle ; β Méthyle nonoate basique de bismuth.
Produit absolument nouveau, le premier des sels de bismuth français présenté en solution huileuse fluide.

Présentation. — Ampoules huileuses fluides de 2 c. c. contenant 5 centigrammes de bismuth métal par c. c., soit 10 centigrammes au total.
Boîtes de 15 ampoules constituant une cure.

Indications thérapeutiques. — Action spirillicide intense. Le plus rapide, le mieux toléré des sels de bismuth. Incolore et rigoureusement *indolore*, produit des effets au moins comparables à ceux obtenus par l'emploi des doses massives d'arsénobenzol.

Posologie. — *Adultes* : 15 injections de 2 c. c. faites intramusculaires à raison d'une tous les deux jours pendant la première semaine, puis de deux par semaine ensuite.

Enfants : 0 cc. 1 par semaine jusqu'à 3 ans.
0 cc. 5 de 3 à 5 ans.
1 cc. à 10 ans.

Laboratoire Français de Chimiothérapie
21, rue d'Aumale — PARIS

BLÉDINE JACQUEMAIRE

Composition. — Aliment rigoureusement complet, tant par sa teneur en albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone, que par les éléments minéraux et *facteurs de croissance* (vitamines), extraits de la périphérie du grain de blé (recherches expérimentales effectuées sous la direction de MM. les Prof. Morel et Mouriquand au Lab. de Chimie organique et de tox. de la Faculté de Lyon, de mai 1919 à juillet 1920).

Propriétés. — Entièrement digestible et assimilable par les enfants dès le premier âge. Complément nécessaire du lait dans l'allaitement artificiel.

Indications. — Facilite la digestion du lait. Favorise la croissance et la dentition (*Rachitisme*). Prépare et facilite le sevrage. Régularise d'une façon remarquable les fonctions digestives (*Diarrhées, Constipation, Gastro-entérites*) ; désodorise les selles en modifiant rapidement la flore intestinale.

Particularités. — Ni cacaotée, ni lactée, ni maltée, ni torréfiée, ni étuvée et sans addition d'aucun produit pharmaceutique, la Blédine se conserve d'une façon parfaite, en boîtes de fer-blanc hermétiques, sans modification de goût, ni d'odeur, ni de composition.

Doses. — Du 1er au 4e mois : *1/2 à 1 cuillerée à café par biberon.* Du 5e au 6e mois : *1 1/2 à 2 cuillerées à café par biberon.* A partir du 7e mois : *1 cuillerée à soupe par repas ; 1 1/2 à 2 pour les adultes.*

Nota. — La *Blédine* peut se préparer à l'eau. Dans ce cas, doubler les quantités ci-dessus.

Établissements JACQUEMAIRE
VILLEFRANCHE (Rhône).
Soc. à resp. lim. au cap. de 2.000 000 de francs.
Admr-Gérant : **M. MIGUET,** Dr en Pharmacie.

BLENNOSINE-FORNET

Vaccin buccal contre la Blennorragie

Principe actif. — Gonocoques de différentes souches, spécialement préparés.

Indications. — Blennorragie aiguë ou chronique, ainsi que leurs complications.

Forme. — Flacon de 30 pilules.

Dose. — 1 à 3 pilules, trois fois par jour, une demi-heure avant les repas jusqu'à ce qu'une réaction locale et générale se soit manifestée. Cette réaction, d'ailleurs légère, prouve l'efficacité spécifique de ce vaccin buccal antiblennorragique.

Propriétés thérapeutiques. — Fait diminuer puis disparaître l'écoulement, évite toute complication, guérit les complications existantes.

Echantillons sur demande

INSTITUT de MICROBIOLOGIE-SARREBRUCK

BOLDINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

Boldine Houdé

Principes actifs des feuilles de boldo.

Emplois thérapeutiques :

Maladies du foie, lithiase biliaire, ictère, hépatites, insuffisance hépatique, etc.

Mode d'emploi :

De 3 à 6 par jour, le matin, le midi et le soir, un quart d'heure avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS

BOLDOÏNE EPARVIER

Forme et composition. — Granulé sucré, agréable à prendre. Contient, par cuillerée à café, la partie active de 4 grammes de Boldo frais, partie aromatique comprise.

Action physiologique. — Stimulant général. Action spécifique sur le foie, s'oppose au fermentations intestinales, favorise les oxydations et l'élimination des déchets (urée).

Indications thérapeutiques. — Affections du foie en général, Lithiase biliaire, Lithiase rénale, Ictère, Dyspepsies d'origine hépatique, Anorexie, Atonie des voies digestives, Cachexies.

Dose. — 2 à 4 cuillerées à café par jour après les repas, prises en nature ou dissoutes dans un peu d'eau chaude.

Echantillons sur demande adressée à :

Laboratoires ÉPARVIER
26, Grande Rue Saint-Clair — LYON

BOLDOLACTOL

Composition. — Association de ferments lactiques, de ferments biliaires, et de boldine (1/2 milligramme de boldine par comprimé).

Propriétés. — Empêche les fermentations intestinales, excite la secrétion biliaire, stimule les fonctions hépatiques.

Avantages. — Conservation indéfinie. — Tolérance digestive parfaite.

Indications. — Affections hépatiques. — Entérites. — Auto-intoxication intestinale.

Mode d'emploi. — 4 à 10 comprimés par jour, 20 jours par mois.

Laboratoires A. SALLES
11, Boul. de Strasbourg, Paris (X^e^).

BOLDORHÉINE

Composition. — Capsules glutinisées à base d'extrait de boldo, d'extrait biliaire, de podophyllin et de ferment lactique conservé à l'état sec, mais vivant, dans un milieu approprié.

Action thérapeuthique. — Combat l'insuffisance biliaire, stimule l'activité de la cellule hépatique active la sécrétion et l'excrétion biliaires, régularise les fonctions intestinales, et aseptise le tube digestif.

Indications. — Insuffisances hépatiques et biliaires, ictère, lithiase, etc...

Mode d'emploi. — Deux à quatre capsules, au moment des repas, avec une gorgée d'eau.

LABORATOIRE
DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
Dr PH. CHAPELLE
8, rue Vivienne, Paris.

BOLDO VERNE

Le cholagogue sûr et régulier.

Composition. — Extrait total des feuilles de Boldo contenant tous les principes actifs : boldine, essence et matières aromatiques.

Indications. — Tous les troubles fonctionnels du Foie et des voies biliaires-Anorexies, Atonie gastrique, Séquelles du Paludisme.

Posologie. — L à C gouttes par jour.

Laboratoire du BOLDO VERNE
13, rue Docteur-Mazet, Grenoble.

BOLEASE MONAL

Forme. — Globules glutinisés.

Comp. — Bile et boldo, extraits complets et inaltérables.

Dose. — 4 à 6 globules par jour.

Action. — Cholagogue, toni-hépatique, anti-toxique et sédative.

Indications. — Troubles biliaires et hépatiques. *Affections hépatiques* : lithiase, ictères, congestions, cholémie, cirrhose. *Affections intestinales* : entérites muco-membraneuses, constipation, auto-intoxications.

Laboratoires MONAL & Cie
6, rue Bridaine — PARIS

BONBONS LUCAS VERMIFUGES

Actifs et exquis. — 20 ans de succès.

Composition :

Santonine pure cristallisée	0 gr. 004
Calomel chiquement pur	0 gr. 010
Chocolat fin vanillé	0 gr. 986

Pour un comprimé, préparé à froid, pesant 1 gramme.

Dosage rigoureux.

Propriétés thérapeutiques :

Destruction et expulsion de tous les vers intestinaux (ascarides, oxyures, etc.) Suppression immédiate, surtout chez les enfants, de malaises à causes ignorées et qui sont dûs, très fréquemment, à la présence de vers intestinaux dans le tube digestif.

Mode d'emploi :

Faire absorber, le matin à jeun, pendant 3 jours de suite:

De 6 mois à 1 ans	1/2 Bonbon
De 1 an à 2 ans	1 —
De 2 ans à 4 ans	2 —
De 4 ans à 7 ans	3 —
Au-dessus de 7 ans	4 —

(Mode d'emploi dans chaque étui)

Vente en gros : P. JOUBERT et Docteur R. SIBASSIÉ, Pharmaciens à NANTES (Loire-Inférieure).

BORICINE MEISSONNIER

Tetraborate de Sodium chimiquement pur en poudre fine. Sel défini, cristallisé en rosettes résultant de la combinaison de l'acide orthoborique et du biborate de sodium.
Infiniment supérieur à ses composants par :
1° *Sa pureté.* — Sel cristallisé neutre, non caustique.
2° *Sa solubilité.* — 16 °/₀ à froid . dans
75 °/₀ à l'ébullition) l'eau
parties égales dans la glycérine.
3° *Son pouvoir bactéricide* = Stérilisante à 6 °/₀.
4° Sa *non-précipitation des alcaloïdes* et son *inaction sur les métaux.*
Indications. — Succédané des borax impurs et de l'acide borique dans tous leurs emplois. Succédané de l'iodoforme. Hémostatique puissant.
Hygiène et antisepsie générale de la peau et des muqueuses : conjonctivites, otites, ozène, stomatites, laryngites, dermatoses, maladies des voies urinaires, gynécologie, plaies, brûlures.
Mode d'emploi :
En poudre : Insufflation en gynécologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie.
En solution : De 2 à 5 cuillerées à soupe par litre d'eau, 1 cuillerée = 25 gr. **Boricine.**

Laboratoires J. LOGEAIS
22 *bis*, rue de Silly — BOULOGNE-sur-SEINE près PARIS. — Auteuil 40-15 et 40-16.

BOROCALCYL THEVENOT

Composition. — Comprimés de Borotartrate de chaux.
Indications. — Épilepsie, Convulsions, Hyperexcitabilité, Spasmes.
D'une façon générale, le *Borocalcyl* est indiqué là où les bromures ou les préparations de valériane, etc., l'étaient il y a peu de temps encore. Le *Borocalcyl* présente cet énorme avantage d'être à la fois beaucoup plus actif et de ne provoquer aucun des accidents qui accompagnent toujours l'emploi des bromures, à dose quelque peu élevée. Le Borotartrate (Borocalcyl) s'est montré dans les Laboratoires d'essai, très supérieur aux bromures de potasse ou de soude. La théorie permet d'ailleurs de prévoir cette supériorité, puisque le sodium est un excitant du système nerveux alors que le calcium en est un sédatif net.
Doses. — 2 à 4 comprimés par jour, trois quarts d'heure avant les repas.
Échantillon sur demande.
Prix de la boîte de 40 comprimés : 12 francs.
Produit fabriqué par la **Société des Produits pharmaceutiques Thevenot**
21, rue des Roses, DIJON

BOROSODINE LUMIÈRE

Médication Borée — Calmant Antispasmodique

Toutes les applications de la médication bromurée. — Aucun de ses inconvénients. — Nervosité infantile. — Insomnie. — Incontinence d'urine. — Névrose. — Délire. — Neurasthénie.

Action constante, rapide, sûre, sans danger

Adultes. — Borosodine Lumière, titrée à 5 gr. de tartrate borico-sodique chimiquement pur par cuillerée à café. Une demi à deux cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau sucrée à prendre en deux fois à la fin des principaux repas.

Enfants. — Sirop de Borosodine Lumière dosé à 1 gr. de tartrate borico-sodique par cuillerée à café.

Dose : 1 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Produits Spéciaux des Laboratoires A. LUMIÈRE
M. SESTIER Pharmacien
9, Cours de la Liberté. — LYON

BOROSTYROL SCHLATTER

Spécifique cicatrisant des pertes de Substances cutanéo-muqueuses.

Composition et présentation. — 1° Soluté alcoolique ; 2° Pommade ; les deux à base de dérivés terpéniques et de phénols substitués.

Propr. thérap. — Régénérateur de la cellule. Anesthésique local. Antiseptique. Non toxique.

Indications. — Plaies. Brûlures. Contusions. Boutons. Aphtes. Piqûres. Crevasses du sein. Rougeurs des nourrissons. Ulcères variqueux. Vulvites, Vaginites, Métrites, Prurits.

Mode d'emploi. — Badigeonnages, frictions, pansements adhérents au coton, selon les cas. — Prix : Flacon, 8 fr. 50 ; tube 7 fr. 50.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER
1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI°).
A Bruxelles :
LE MARINEL, pharmacien, 46, rue du Trône.

BOROTROPINÉ SÉVIN

Antisepsie urinaire et hépato-rénale

Composition :

Pastille : ce borosalicylate d'héxaméthylène-tétramine avec enrobage seulement soluble en milieu intestinal.

Avantages :

3 fois plus actif que la Formine. — Pas de décomposition par le chimisme gastrique. — Pas de production de formol en deça du rein. — Pas de troubles concomitants (cystalgie). — Action cholagogue, urolytique et antinévralgique des salicylates.

Indications :

Voies urinaires : Cystite, prostatite, blennhorragie aiguë, etc.
Voies biliaires : Ictère, saturnisme, diathèse urique.
Infections générales : Fièvre typhoïde, Grippe, Encéphalite épidémique, etc.

Posologie

2 à 6 pastilles par jour. Ne jamais les faire dissoudre dans l'eau avant l'absorption.

Le flacon : 12 francs

Laboratoires SOULAIRAC

Saint-Quentin (Aisne).

BOUCHON ET BOUTEILLE RADIOACTIFS "EMANA"

Composition. — Armature métallique portant un tube poreux contenant un sel de Radium insoluble spécial donnant un maximum d'émanation radioactive.

Forme. — 1° *Bouteille.* — Hexagonale ; peut être couchée sans rouler, le bouchon radioactif l'obstrue en assurant l'étanchéité.

2° *Bouchon.* — Peut s'adapter sur n'importe quelle bouteille. Etanche, par bague en caoutchouc que l'on presse dans l'intérieur du goulot en tournant la tête du bouchon. Un petit chevalet est joint pour reposer le goulot et empêcher la bouteille horizontale de tourner.

Indications. — Toutes les indications de la radioactivité : goutte, rhumatisme, arthritisme, artériosclérose, troubles, ménopause, troubles de la circulation, névralgies, sciatique, anémie.

Mode d'emploi. — Remplir la bouteille du liquide à radioactiver (eau de source, eau minérale, boisson, etc.), visser le chapeau dans la bouteille EMANIA ou introduire le bouchon dans une bouteille d'eau minérale ou autre. Coucher la bouteille et laisser en contact avec le bouchon pendant une durée de temps en rapport avec le degré de radioactivité à obtenir (voir tableau accompagnant la notice).

Dose. — La radioactivation peut être poussée aux environs de 200 millimicrocuries et le liquide absorbé par doses fractionnées entre les repas jusqu'à la valeur d'un litre par jour.

Une dose double ou triple en émanation, ne peut nuire en quoi que ce soit à l'organisme.

LABORATOIRES "EMA"
14, rue de la Pépinière, Paris.

BOUES RADIOACTIVES EMANIA

Composition. — Sous produits de la fabrication du Radium, spécialement traités et contenant : uranium, radium, actinium, polonium, etc... Préparation ne perdant pas pratiquement sa radioactivité et par suite sans limite d'utilisation.

Forme. — Poudre sèche, sans véhicule, masse entièrement radioactive, pouvant s'utiliser en bains, cataplasmes, pommades, pansements gynécologiques, etc...

Présentées en boîtes de 1 kg., 0 kg. 500, 0 kg. 250.

Pour pansements et applications sur plaies : *boîtes stérilisées* de 0 kg. 250.

Indications. — Rhumatismes divers, goutte, arthrite blennorragique, épididymites, affections nerveuses, névralgies, sciatiques, affections gynécologiques, métrites, salpingo-ovarites, affections cutanées, ulcères variqueux, etc.

Mode d'emploi. — Bains généraux avec 250 gr. Boue Emania.

Bains locaux avec 10 à 40 gr. par litre d'eau.

Cataplasmes avec Boue Emania délayée dans QS. d'eau glycérinée.

Pommade avec, comme excipient : vaseline, lanoline, huile, etc...

Pansements gynécologiques.

LABORATOIRES "EMA"
14, rue de la Pépinière, Paris. — Tél. : Lab. 14-81

BOULES QUIES

Boules plastiques adoptant exactement la forme de l'orifice auditif.

Point de fusion plus élevé que la température maximum du corps = 45° ; pas de risque d'obstruction du conduit auditif.

Boules aseptisées ne pouvant, même en cas d'affections de l'oreille, provoquer de complication. Matières premières chimiquement pures.

Anti-vibratoires, ne transmettant pas au tympan les vibrations de l'atmosphère qu'elles interceptent.

Constituent le seul procédé pratique et sans danger d'isolement des bruits.

Indications. — Accessoire précieux de la Thérapeutique, permettant d'assurer le repos de tous les malades sans avoir recours aux hypnotiques et aux soporifiques toujours dangereux.

Contre le mal de mer, les bruits de l'usine et de la rue, du voyage, de l'hôtel, etc.

Indispensable aux nageurs pour éviter les otites dues à l'introduction de l'eau dans l'oreille.

DORMIR ET TRAVAILLER AU MILIEU DES BRUITS

(Grands Prix Marseille 1922).

Echantillons sur demande.

Boules QUIES

47, boulevard Victor — PARIS (XV^e^)

BRIDES-LES-BAINS (Savoie)

Ses eaux, ses sous-produits amaigrissants :

EAU DE BRIDES (SOURCE HYBORD)

Affections gastro-intestinales.

Dose. — Un grand verre matin et soir.

BRIDIA

Eau de BRIDES artificiellement minéralisée.
Le purgatif doux par excellence.
Un à deux verres le matin, à jeun.

SEL NATUREL DE BRIDES

Extraits des Eaux de la source Hybord (procédés Ketzner-Delas).

Foie. — Intestin. — Obésité.

Dose. — Un à deux paquets le matin, à jeun, dans un grand verre d'eau.

FRUCTIA

Le " Sel de BRIDES " effervescent.

TABLETTES-PILULES de BRIDES

Composition. — Extraits végétaux et sels déshydratés des eaux de BRIDES.

Indications thérapeutiques. — Toute la gamme des affections arthritiques et en particulier l'**obésité**, et l'artério-sclérose.

Doses et mode d'emploi. — De deux à quatre tablettes par jour, soit en deux fois matin et soir, soit en une seule fois au coucher.

THÉ DE BRIDES

à base de plantes à actions réductives et toni-laxatives.

En infusion, une cuillerée à soupe par tasse. A prendre soit le matin comme petit déjeuner soit après les repas soit le soir en se couchant. De préférence sans sucre.

BAINS de BRIDES

Réductifs Amaigrissants.

Un paquet pour un grand bain à 39°-40°.
Un bain tous les jours ou tous les 2 jours.

DÉPOT DE LA COMPAGNIE DES SOUS-PRODUITS DE BRIDES

41, rue de Verneuil, Paris (VII^{e}).
Tél. : Littré 35-77.

BROMÉINE MONTAGU

(Bi-Bromure de Codéine)

Propriétés. — Action sédative et analgésique, particulièrement puissante, sans brutalité par suite de l'union des qualités calmantes du Brome et de la Codéine.

Très efficace contre l'élément douleur, sans accoutumance et moins toxique que la plupart des sédatifs.

Indications. — Insomnies, Névralgies, Névrites, Toux nerveuses, Démorphinisation.

Formes pharmaceutiques. — *Ampoules* dosées 0,02 cgr. — *Pilules :* 0,01 cgr. par pilule. Dose : 2 à 8 pilules par jour. — *Sirop* : 0,03 par cuil. à soupe. Dose : 1 à 3 cuil. par jour.

Gouttes : X à XXX gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Laboratoire MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

BROMIASE

Description. — Capsules kératinisées contenant

Bromure de potassium.....	0 gr. 30
Bromure d'ammonium	0 gr. 20
Levurine extractive.....	0 gr. 10

en fl. de 50 capsules.

Action thérapeutique. — La même que celle des bromures, mais sans bromisme grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage de kératine qui ne libère les bromures que dans le milieu alcalin de l'intestin. Préparation de dosage rigoureux, de conservation indéfinie, et ne répugnant pas au malade.

Indications. — 2 à 12 capsules par jour, dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, les névroses, les vomissements de la grossesse.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale
(Voir l'étude sur l'Iodogénol)

Forme. — Gouttes.

Doses et modes d'emploi. — 20 gouttes de Bromogénol Pépin = 0 gr. 50 de Bromures métalliques. A prendre dans un peu d'eau ou d'infusion aromatique. Renouveler plusieurs fois.

Prop. thér. — Médication bromurée très énergique avec un faible poids de brome. Goût agréable. Tolérance parfaite. Préférable aux sirops bromurés et polybromurés.

Indications. — Toutes celles des Bromures métalliques : affections du système nerveux, insomnie, hystérie, convulsions, épilepsie, névralgies, etc.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUCQ
à COURBEVOIE (Seine)

BROMO-MAISINE

Globules.

Combinaison directe du *Brome* et d'une *Albumine* d'origine strictement *végétale*, sans aucune autre association médicamenteuse.

Propriétés particulières. — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète du bromisme. Disparition de tous les inconvénients dus aux bromures dissimulés ou non. Aucune saturation de l'organisme. Absence de toute altération dans l'estomac. Action directe par absorption intestinale.

Indications. — Médication donnant des résultats certains et permettant, si besoin, d'instituer un traitement intensif dans : tous états névropathiques, psychoses de toute nature, excitabilité, convulsions, épilepsie, insomnies, névralgies, spasmes et toutes affections relevant de la bromothérapie.

Posologie. — Chaque globule contient 2 cgr. de brome actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme de bromure alcalin. *Enfants* : 2 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 15 globules et au delà par jour, en 2 fois, au début des repas.

Laboratoires de l'IODO-MAISINE
J. SOUDAN, Pharmacien, ex-interne des Hôpitaux de Pari
6, rue Rosenwald — PARIS (XV•)

BROMONE ROBIN

Combinaison physiologique de Brome et de Peptone de viande de bœuf.

Gouttes : dont 40 = 1 gr. de bromure de potassium

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :* 20 à 50 gouttes. *Enfants :* 10 à 20 gouttes.
A prendre en deux fois aux principaux repas dans un peu de boisson.

Prop. thér. — Non toxique, très assimilable. Ne fatigue pas le tube digestif. Pas de bromisme. Tolérance parfaite. Aucun mauvais goût.

Indications. — Excitabilité nerveuse, troubles de la femme, fatigues cérébrales, insomnie des vieillards, convulsions des enfants, hystérie, épilepsie.

Laboratoires M. ROBIN
de Poissy — PARIS

BROMOVOSE

Combinaison organique bromo-albuminoïde stable.

Propr. thér. — Grande affinité du brome pour les tissus, élimination beaucoup plus lente qu'avec les bromures alcalins, d'où action thérapeutique plus sûre et plus prolongée par imprégnation des centres nerveux.
Pas de phénomène d'accumulation, ni de bromisme. Tolérance parfaite.
Indic. thér. — Insomnies. Excitabilité nerveuse. Palpitations cardiaques. Convulsions. Névroses. Épilepsie, etc.
Posologie. — 40 gouttes à prendre 2 ou 3 fois par jour dans un peu de liquide.

Laboratoire MADYL
14, rue de Miromesnil — PARIS

BRONCHOSEPTOL LAURIAT

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptise les bronches et les voies respiratoires. Calme la toux, facilite l'expectoration ; fluidifie les sécrétions et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques.

Indications cliniques — Toutes affections broncho-pulmonaires, rhumes, grippe, bronchites, catarrhes, trachéites, broncho-pneumonie, tuberculose pulmonaire.

Composition. — Chaque comprimé renferme :

Poudre de Dover Codéinée (opium 0,01 remplacé par codéine 0,01)	0,10
Bromol	0,02
Extrait d'aconit titré (Codex)	0,0025
— belladone (titré Codex)	0,005
Terpine	0,05
Benzoate de soude	0,10

Comprimés glutinisés se dissolvant seulement dans l'intestin et évitant ainsi l'action émétisante de l'ipéca à doses répétées.

Mode d'emploi :

Adultes. — 4 à 6 comprimés par jour et 2 dans la nuit, s'il y a lieu.

Enfants au-dessus de 8 ans. — 2 à 3 comprimés par jour, et 1 dans dans la nuit.

Laboratoires E. LAURIAT
Docteur en pharmacie, *La Garenne-Colombes* (Seine).

BULGARINE THÉPÉNIER

Culture pure de Ferments lactiques bulgares sur milieu végétal

Forme. — Bouillon, comprimés et poudre.

ndic. thér. — Entérite muco-membraneuse, gastro-entérite (des nourrissons et de l'adulte). Diathèse goutteuse, Constipation, Diarrhée, Entérite tuberculeuse, Infections hépatiques (d'origine intestinale), Dysenterie, Dermatose, Furonculoses, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde et du choléra. *Poudre:* Rhinites, ozènes, stomatites, pansement des plaies.

Modes d'emploi. — Adultes : Sucer deux comprimés ou boire un verre à madère de Bouillon 4 fois par jour une demi-heure avant le repas. Enfants : Demi-dose.
Saupoudrer, insuffler ou priser la Poudre.

Laboratoire des Ferments du Docteur A. THÉPÉNIER
10 et 12, rue Clapeyron — PARIS
R. C. Seine 150.854

BUTELLINE

(Sulfate de para-aminobenzoyl-dibutyl-amino-propanol).

Nouvel anesthésique local non stupéfiant agissant par contact comme la Cocaïne mais exempt de ses dangers.

Principales applications en :

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE,
OPHTALMOLOGIE, UROLOGIE
et STOMATOLOGIE

Solutions isotoniques de 0,5 à 10% additionnées ou non d'Adrénaline U. R.

Laboratoire des Produits
« USINES DU RHONE »
21, rue Jean-Goujon, Paris (VIII).

C 40

Traitement du cancer et des tumeurs malignes

Formes :

1° *C.40 Injectable*, en boites de 10 ampoules de 5 cc. et de 2 ampoules de 2 c.c. 5.

2° *Comprimés*. — En flacons de 120.

Doses :

Ampoules. — Une tous les deux jours par série de 12.

Comprimés. — Deux comprimés le midi. Deux comprimés le soir, pris en mangeant. Faire suivre le traitement pendant un an.

Laboratoires de Biologie et Physiologie appliquées.

D. DROUET & PLET
Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise).

CACHETS DU Dr BOVEIL

à l'Amino-Phéno-Théine.

Calmant infaillible de l'élément douleur, quelle qu'en soit l'origine. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Indications. — Névralgies, Migraines, Crises de Rhumatisme ou de Goutte, Insomnies, Fièvre, Grippe, Influenza, Courbature, Paludisme, Douleurs menstruelles, Maux de dents, Otite, Mastoïdites et toutes douleurs.

Doses et Mode d'emploi. — Un cachet au moment où l'on souffre, avec un liquide chaud de préférence.

Dose moyenne : 2 à 3 cachets par jour.

Échantillon et littérature sur demande.

M. PARIS, pharm. de 1re classe
1, rue Lasalle, LYON (La Boucle)

CACHETS KAPYTAN

contre la Grippe

Composition.—Codéine (1 cent. par cachet), Teinture d'aconit (3 gouttes par cachet), Benzoate de soude, terpine benzonaphtol.

Propriétés thér. — Sédatif de la toux, fluidifiant les sécrétions bronchiques. Antisepsie du tube digestif (Grippe, Influenza).

Indications. — Grippe, Bronchites, Asthme pulmonaire, Rhumes et toutes Affections broncho-pulmonaires.

Posologie. — 4 cachets dans les 24 heures, pris entre les repas, dans un grog fortement alcoolisé.

L'étui de 12 cachets : **9** fr.

Échantillons et Littérature :

Pharmacie BARDET

Fondée en 1860

76, Rue de Sèvres — PARIS (VII[e])

CACHETS " ROCHE "
DE THIOCOL

1 Cachet "Roche" de Thiocol = 0,50 cgr. Thiocol "Roche".

1 gr. Thiocol "Roche" = 0,52 cgr. gaiacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 par jour et plus.

Prop. thér. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique et Orexique.

Indic. thér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, Rhumes, Bronchites, Grippe, Tuberculose, Coqueluche, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, etc.

Avis très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours :

CACHETS " ROCHE " de Thiocol.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C[ie]

21, place des Vosges — PARIS

CAFÉINE INVAR

Produit soumis au contrôle physiologique le plus rigoureux, donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action cardiotonique et diurétique, favorise la contractibilité musculaire, les efforts de la marche ; augmente l'activité cérébrale, facilite le travail intellectuel.

Indications :

Cardiopathie à la période d'asystolie, adynamie cardiaque, maladies infectueuses, syncope, asthme, emphysème, hydropisie.

Forme :

Ampoules à 0,05, 0,10, 0 20, 0,25.

Pharmacie Centrale des Pharmaciens de France
21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IVe).

CALCIONAL (comprimés)

(Chlorure de calcium naissant)

Association de sels organiques de calcium avec un chlor. alcalin, dégageant au contact de l'eau et des sécrétions digestives, 0,25 cg. chlor. de calcium naissant par comprimé.

Pas de saveur désagréable, tolérance parfaite, conservation indéfinie.

Prop. thér. — Celles du chlorure de calcium, sans aucun de ses inconvénients.

Indications. — A titre préventif et curatif : *Hémorragies et États hémorragipares. Réactions sériques tardives, Spasmophilie, Tétanie.*

Dose. — *A titre préventif :* Nourrissons 1 à 2 par jour : enfants 2 à 4 ; adultes 4 à 6, préalablement dissous dans l'eau sucrée. Doubler les doses pour traitements curatifs.

Laboratoires LEMATTE et BOINOT
52, rue La Bruyère — PARIS

CALCIUM-SANDOZ

Gluconate de chaux pur, sel soluble assimilable.
Le calcium scientifique.
Teneur en chaux (CaO) 13 % soit 9,3 % de Ca élément.
Assure toutes les propriétés physiologiques de l'ion calcium.
Le seul injectable par la voie intramusculaire à à doses efficaces, et sans inconvénients.
Ampoules à 10 cc. et forme granulée (sans sucre).

Posologie. — *Ampoules* à 10 cc.
Adultes : Une tous les 2 à 3 jours.
Enfants : 2 à 5 cc. tous les 2 à 3 jours.

Granulés sans sucre :
Adultes : 3 cuillerées à café bien pleines par jour.
Enfants : 2 à 3 cuillerées à café plus ou moins pleine selon l'âge.

Produits SANDOZ
3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^{e})
M. CARILLON, pharmacien de 1re classe.
Dépôt général et vente : Usine des pharmaciens de France.
125, rue de Turenne — PARIS (III^{e})

CALCOLÉOL

à base d'huile de foie de morue *concentrée* et *solidifiée*, contrôlée biologiquement sur sa teneur en vitamines A et D, de vitamine B et de sels de calcium et de fer.

Propriétés thérapeutiques. — Avitaminose, assimilation défectueuse du calcium.

Indications. — Rachitisme. Troubles de croissance. Spasmophilie. Maladies infectieuses et contagieuses. Gastro-entérites. Déminéralisation, (tuberculose, grossesse, allaitement).

Forme. — En dragées inaltérables, sans odeur, forme la plus pratique de prise de l'huile de foie de morue et en granulés.

Dose et mode d'emploi. — *Adultes :* 4 dragées ou 2 cuillers à café de granulés avant ou pendant chacun des trois principaux repas.
Enfants : moitié de ces doses.

Laboratoire des Produits SCIENTIA
D^{r} E. PERRAUDIN, Pharmacien de 1re classe,
21, rue Chaptal, Paris (IX^{e}).

CALCOZYMASE

Cure de désensibilisation.

Composition. — Association de ferments digestifs : pancréatine, maltine, lab-ferment avec un sel de calcium.

Mode d'action. — Les sensibilités étant, en général, des insuffisants digestifs et hépatiques, la Calcozymase réalise dans l'estomac une digestion artificielle et complète l'action de *la Prézimaze* (Voir : Prézymase).

Indications. — Tous les accidents dus à une sensibilisation quelconque : urticaire, asthme, arthropathies d'origine anaphylactique, accidents de la goutte, du rhumatisme, etc...

Mode d'emploi. — Une dragée au milieu de chaque repas.

Laboratoires LEBOIME
19, rue Franklin — PARIS (XVI[e])

CALMOSUPPOS SÉDATIFS

Seul analgésique et antispasmodique agissant d'une façon constante et sans fatiguer l'estomac.

Un seul dosage. — *Pour adultes.*

Extr. Bellad. Codex 1908	0 gr. 025
Extr. Jusqu. Codex 1908	0 gr. 025
Extr. Pisci. Hydroalcool	0 gr. 025
Analgésine	0 gr. 50
CO^3 HNa	0 gr. 10

Beurre de Cacao Q. S. 1 suppositoire.

CALMOSUPPOS ANTITHERMIQUES

Médication idéale pour combattre la fièvre quelles qu'en soient sa violence et son origine.

Trois dosages permettant de les désigner pour tous les âges.

Bébés :

Bromhydrosulf. quinine	0 gr. 10
Amidopyrine	0 gr. 05
Phénédine	0 gr. 05
Théine	0 gr. 005
CO^3 HNa	0 gr. 05

Beurre de Cacao Q. S. 1 suppositoire.

Enfants :

Bromhydrosulf. quinine	0 gr. 20
Amydopyrine	0 gr. 10
Phénédine	0 gr. 10
Théine	0 gr. 02
CO^3 HNa	0 gr. 10

Beurre de Cacao Q. S. 1 suppositoire.

Adultes :

Bromhydrosulf. quinine	0 gr. 30
Amidopyrine	0 gr. 20
Phédédine	0 gr. 20
Théine	0 gr. 05
CO^3 HNa	0 gr. 10

Beurre de Cacao Q. S. 1 suppositoire.

Les Calmosuppos antithermiques et sédatifs sont livrés en boîtes de 2 et en boîtes de 6 et préparés à froid.

Échantillons :

Laboratoires des CALMOSUPPOS
Montguyon (Ch. Maritime).
Pierre Boivert Pharmacien de 1re classe
Reg. du comm. Jonzac : n° 3.079.

CAMPHODAUSSE

(Camphre soluble dans l'eau)

(Camphosulfonate de soude)

Ampoules de 1, 2, 5 et 10 c. c. titrées à 10 % de camphre en solution aqueuse. Même posologie que l'huile camphrée. Action plus rapide grâce à sa facile résorption. Injection complètement indolore et ne laissant jamais de nodosités.

Indications. — Stimulant cardiaque dans l'*adynamie* et au cours des *maladies infectieuses*. Son emploi est particulièrement recommandé dans les cas de *collapsus cardiaque imminent*, où il est nécessaire d'agir vite.

Mode d'emploi. — 1 à 5 c. c une ou plusieurs fois par jour par voie *hypodermique*, *intramusculaire*, ou *intraveineuse*.

Camphodausse cholestérine

L'Ampoule de 2 c. c. contient 0 gr. 10 de Camphodausse et 0 gr. 02 de Cholestérine.

Camphodausse cholestérine et strychnine

Même teneur en Camphodausse et en Cholestérine que ci-dessus avec en plus, ½ mgr. de Strychnine par ampoule.

Une ampoule tous les deux ou trois jours dans les cas d'*épuisement*, de convalescence et dans la tuberculose pulmonaire à ses débuts.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IVe).

CAMPHOSTYL

Composition. — Nouveau dérivé du camphre soluble dans l'eau.

Avantages. — 1° Absorption immédiate. 2° Injection indolore ne produisant ni nodosité ni réaction. 3° Élimination sans subir aucune transformation de l'organisme.

Indications. — Adynamie, pneumonie, broncho-pneumonie, collapsus.

Formes pharmaceutiques. — Ampoules. 1° 12 ampoules de 1 cm³. 2° 12 ampoules de 2 cm³. 3° 6 ampoules de 5 cm³. Pour le corps médical en ampoules de 25, 50 et 100 ampoules.

Échantillon sur demande.

Laboratoires LACROIX

37, Rue Pajol (18e).

CAPILLAIRAL

Composition. — **Alcoolat, coaltaré, éthéré, résorciné** de différents pilocarpus cinchonées, hypericacées, labiées, ombellifères, rutacées et synanthérées.

Forme. — Liquide parfumé saponiné ne graissant et ne desséchant pas.

Propriétés. — Esprit régénérateur tonique. Antisepsie capillaire. Asepsie complète : destruction des tricophytons et autres parasites des cuir chevelu et bulbe pileux. Vésication légère vitalisante.

Indications. — Maladies du cheveu. Pelade. Séborrhées. Teigne. Pellicules. Calvitie.

Mode d'emploi. Légère friction matin et soir à la racine du cheveu.

L. ARQUEVAUX, pharmacien
à ETAMPES (Seine-et-Oise)

Dépôt :

Office commercial pharmaceutique
71, rue du Temple — PARIS

CAPSOVULES DIPLOS

Forme pharmaceutique :

Ovules spéciaux à noyau interne.

Composition :

Coque gélatineuse externe, colloïdes polyvalents : or, argent, étain, cuivre, bismuth, mercure, manganèse.

Noyau interne. Baume du Pérou, Essence de Cèdre, Eucalyptol, Oxyde de zinc.

Action :

Décongestionnante, antiseptique, cicatrisante, provoque l'exsudation des glandes infectées.

Indications :

Un capsovule tous les deux ou trois jours dans métrites, ulcérations cervicales et toute infections vaginales.

Laboratoires
du Docteur Pierre ROLLAND
18, rue Pierre-Curie — PARIS (V^e^)

CAPSULES BARDET

à l'huile de HAARLEM vraie

Composition. — Chaque capsule contient 8 gouttes d'*huile de Haarlem* vraie, garantie importée de la *seule* maison fabriquant la véritable huile.

Indications. Affections goutteuses et rhumatismales, Gravelle, Maladie du foie, Calculs, etc.

Posologie.. 2 à 4 capsules par 24 heures.
Le flacon de 30 capsules : 20 francs.

Formuler : **« Capsules BARDET ».**

Échantillons et littérature.

Pharmacie BARDET
Fondée en 1860
76, rue de Sèvres PARIS (VII^e^)

CAPSULES DARTOIS

Composées de créosote de hêtre véritable, titrée en Gaïacol, à la dose de 0.05 cgr. dissoute dans 0,20 cgr. d'huile de foie de morue garantie d'origine.

Dose. — Commencer par une ou deux capsules pour arriver progressivement à la dose moyenne et généralement suffisante de 3 à 4 à chaque repas ou matin et soir dans une tasse de lait ou de tisane.

Propriétés. — Se dissolvant lentement dans l'intestin répandent le produit actif sur une grande surface, divisent la créosote à l'infini et multiplient son action antiseptique sans jamais amener de troubles digestifs.

Indications. — Toux. Catarrhes. Bronchites chroniques. Tuberculose. etc.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS

CAPSULES D'HOJASOL

Composition de l'essence Hojasol :

Eucalyptol	50
Estragol	25
Linalol	20
Anéthol	3
Eugénol	2
	100

Avantages — L'Hojasol, contrairement aux essences employées jusqu'à ce jour, peut être administré pur, sans causer d'irritation. Il procure un soulagement immédiat et une guérison rapide dans les *affections pulmonaires*, diminution notable des crachats, *l'entérite*, la *constipation* et, en général, toutes les *inflammations du tube digestif*.

En vue d'éviter une fatigue de l'estomac, les capsules d'hojasol sont glutinisées et ne se dissolvent que dans l'intestin.

Mode d'emploi. — Affections pulmonaires : 6 capsules par jour avant les repas. Entérite, Constipation, Désinfection intestinale au cours de furonculose, 2 à 4 capsules par jour avant les repas.

Laboratoire de l'HOJASOL
à Chars (Seine-et-Oise).
Gros et Exportation :
Dépôt : 19, rue Ferdinand-Duval — Paris (IV.)

CAPSULES JORET ET HOMOLLE

Emménagogue

Forme. — Capsules de gélatine de 0 gr. 20, spécialement étudiées pour être rapidement absorbées par l'organisme.

Composition. — Apiol pur et bien défini, préparé et purifié par le procédé des Docteurs Joret et Homolle qui découvrirent et isolèrent ce corps.

Indications. — Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménorragie. Inocuité absolue en cas de grossesse.

Posologie. — Une capsule matin et soir pendant toute la durée de la menstruation.

Prix : 10 Francs

Pharmacie SÉGUIN

165, rue St-Honoré — PARIS

CAPSULES DE MORRHUINE PUY

à l'extrait complet d'Huile de Foie de Morue phosphoré et supériodé

Dosées à 2 milligr. d'iode combiné par capsule.

Elles représentent chacune 15 grammes d'huile de foie de morue débarrassée de l'oléine et margarine indigestes.

L'extrait complet d'huile de foie de morue obtenu par un procédé spécial breveté, contient réellement toutes les Vitamines, les acides gras, le brome, l'iode, le phosphore, la lécithine, principes actifs de l'huile de foie de morue.

Maladies du système lymphatique, Ralentissement des fonctions lymphoïdes, Scrofule, Engorgements ganglionnaires, Adénopathie, Arthritisme, Scléroses, Cachexie, Rachitisme.

Doses. — Enfants de 6 à 17 ans 2 à 4 capsules : Adultes 18 ans et au-dessus 4 à 6 capsules, avant manger.

Envoi de littérature. **Laboratoire PUY**
à GRENOBLE (Isère)

5

CAPSULES NOGUÈS

Codéine 0,002, Aconit et belladone (ext.) ãã 0,001, Lobélie (ext.) 0,002, Quebracho bl. (ext.) 0,01, Grindelia (ext.) 0,005, Terpine 0,0125, Gaïacol et Eucalyptol ãã 0,02.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 par jour, 2 à chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, antiseptique des bronches ; fluidifie les sécrétions bronchiques.

Indications. — Toux opiniâtres : bronchites, laryngites.

Laboratoire H. NOGUÈS
11, rue Joseph-Bara — PARIS (VI^e^)

CAPSULES TAETZ

Elastiques russes à l'Huile de Ricin *vierge*.

Forme. — Capsules molles.

Propriétés. — *Purgatif* le plus doux à l'intestin, *Laxatif* idéal.

Avantages. — Sans odeur ni saveur, de digestibilité parfaite, permettent l'usage même journalier de l'huile de ricin aux personnes les plus délicates.

Présentation. — Boîtes de 4, 6 à 8 capsules selon la grosseur.

Dépôt général et Echantillons :

France. — Laboratoires TAETZ
2, rue Lesdiguières — PARIS (IV^e^)

Belgique. — M. F. RAMLOT
72, rue de l'Escaut — BRUXELLES

CAPSULES TAETZ

à l'Extrait de Foie de morue lécithiné

Forme. — Capsules molles.

Indications. — Toutes celles des glycérophosphates. Toutes celles de l'huile de foie de morue.

Avantages. — Très actives sous un petit volume; d'absorption extrêmement facile ; de tolérance parfaite.

Présentation. — Boîtes de 16 capsules.
— 60 —

Dépôt général :

Laboratoires TAETZ

2, rue Lesdiguières, PARIS (IVe).

CARBATROPINE

Charbon organique (Carbosanis) atropiné.

Composition. — 1 milligr. de sulfate d'atropine pour 10 gr. de carbosanis, soit 1/2 milligr. d'atropine par cuillerée à café.

Indications. — La Carbatropine est utilisée avec succès dans les spasmes du côlon et agit efficacement pour combattre la constipation qu'ils provoquent. L'atropine n'est relâchée par le charbon que là où le bol intestinal est retenu, c'est-à-dire au niveau même du spasme. Le spasme disparaît et la constipation cesse.

Formes. — Granulé dosé à 10 milligr. par 100 gr., soit 1/2 milligr. par 5 gr. (cuillerée à café).
Poudre et cachets.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dosage spécial pour enfants :
1/10 de milligr. par cuillerée à café.

Laboratoire MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

CARBOCITROL

Composition. — A base de citrate trisodique chimiquement pur.

Indications. — Gastrite aiguë et chronique. Dilatation de l'estomac. Dyspepsie flatulente. Congestion du foie. Paresse gastrique de toute origine.

Aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — 2 à 4 paquets par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoires O. VISCONTI
64, Boul. Barbès — PARIS (XVIIIe).
Téléphone : Nord 30-21



CARBOÏODINE

La *Carboïodine* est un composé d'iode pur absorbé par un charbon spécialement activé et provenant de la combustion en vase clos de certaines algues marines riches en sucres.

Composition. — La *Carboïodine* renferme 10 % de son poids d'iode décelable par l'analyse et si énergiquement retenu par le charbon qu'il ne s'en sépare même pas à la température du rouge cerise.

Les solutions acides même fortes sont sans action sur lui, de sorte qu'il peut traverser l'estomac sans altération, ce que ne peuvent faire les iodures.

Par contre, le milieu alcalin de l'intestin détache lentement l'iode de son support, il est immédiatement résorbé par la muqueuse intestinale et va se fixer sur les organes hématopoïétiques en provoquant une importante lymphocytose : on sait qu'il s'agit là d'un processus de défense des plus importants contre les infections microbiennes.

La *Carboïodine* est le convoyeur par excellence de l'iode à travers l'organisme. On peut la considérer comme une sorte de réserve iodée, réserve inoffensive, dans laquelle les éléments cellulaires pourront venir puiser le métalloïde au fur et à mesure de leurs besoins.

La *Carboïodine* n'est ni caustique ni toxique. Par son emploi, on ne constate jamais d'accidents d'iodurisme.

Chaque tablette renferme 0 gr. 10 de *Carboïodine*, soit 1 centigr. d'iode pur.

On peut, sans inconvénient, les donner aux enfants.

Applications thérapeutiques. — Elles englobent tout le champ des maladies infectieuses jusques et y compris la tuberculose pulmonaire, ganglionnaire ou osseuse, les affections parasitaires comme l'actinomycose et la syphilis, les affections respiratoires telles que la grippe, les pneumococcies, la bronchite, l'emphysème, l'asthme ; les affections cutanées, telles que l'érysipèle, la furonculose, comme adjuvant du traitement externe, les affections du cœur et des vaisseaux, l'artériosclérose, et rhumatismes chroniques, etc.

Au point de vue thérapeutique, une tablette agit comme 0 gr. 25 d'iodure, 10 gouttes de peptone iodée ou 30 gouttes de teinture d'iode.

Dose et Mode d'emploi. — Adultes de 1 à 5 tablettes par jour entre les repas.

Enfants, jusqu'à 15 ans : 1 à 3 tablettes et selon l'avis du médecin.

Laboratoires G. CHAMAGNE

Docteur en Pharmacie.

Lauréat de l'Académie de Médecine.

24, rue Damesme — Paris (XIII^{e})

CARBOLACTYL SIMPLE

Cure de désintoxication intestinale, hépatique et rénale.

Composition. — Ferments lactiques et pancréatiques sélectionnés, adsorbés par du charbon végétal pulvérisé, algues à mucilage.

Indications. — Auto-intoxications gastro-intestinales. Entérites, Diarrhées, Troubles de la nutrition, Troubles fonctionnels du foie, Dermatose.

Formes. — 1° Boîte de 30 cachets :
2° Poudre avec cuiller-mesure
(n'existe pas sous forme de comprimés).

Doses. — Adultes : 3 à 4 cachets ou 6 à 8 mesures *pro die*. — Enfants : 2 à 6 mesures *pro die*.

CARBOLACTYL BILIÉ

Composition. — Identique à celle du Carbolactyl simple avec addition de Bile purifiée et dépigmentée.

Indications. — Entérite muco-membraneuse d'origine hépatique, Constipation essentielle, Insuffisances hépatiques et biliaires, Angio-Cholite et Cholécystites, Cholémie, Hépatisme et Cyrrhoses, Diabètes par Dyshépatie, Artériosclérose par intoxication.

Forme. — Boîte de 30 cachets
(ni comprimés, ni poudre biliée).

Doses. — 2 à 3 cachets *pro die*, à la fin des repas.

Échantillons et littérature sur demande.
19, Rue de Fleurus — PARIS (VI^e^).

CARBONAL PRINCEPS

Charbon médicinal superactif Ed. Urbain

Pouvoirs Adsorbant et Catalytique très élevés supérieurs à tous les Produits Similaires actuels.

MÉDICATION ANTITOXIQUE TYPE

Indications. — Diarrhées. — Empoisonnements. — Infections. — Intoxications. — Diarrhées aiguës des pays chauds. — Maladies aiguës. — Tumeurs du tube digestif. — Employé au cours des affections septiques de la bouche, du pharynx et du larynx : neutralise les produits microbiens déglutis.

Dose :

Deux à quatre cachets dans les 24 heures.

En raison de son activité contre les fermentations, le Carbonal Princeps amène un léger effet de constipation. Les deux autres formules du Carbonal répondent aux exigences et permettent d'obtenir le maximum de résultat.

CARBONAL MAGNÉSIEN

Composition :

Carbonal Princeps + Magnésie calcinée.

Indications :

Fermentations stomacales, aérophagie, dyspepsie, gastropathies avec hyperacidité, néoplasies stomacales, affections ulcéreuses.

Dose :

Un cachet après chaque repas.

CARBONAL RÉO-RHAMNIQUE

Composition :

Carbonal Princeps + Rhubarbe + Cascara.

Indications :

Putréfactions et fermentations intestinales dues à la constipation, entérites avec rétention, entéro-colites, cirrhoses, ictères, infections biliaires.

Dose :

Un cachet une demi-heure avant les repas.

Forme :

Boîte de 30 cachets pour chacune des trois formules.

LABORATOIRES du CARBONAL
16, rue Cantin, Courbevoie (Seine).

CARBONATE DE BISMUTH

La forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth est certainement la *Tablette Perroud*. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les réflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Compositions. — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes, elles seront plus rapides en résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie* 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge.) — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite, gastralgie, hypersécrétion* : dans les *fermentations* intestinales, à petites doses, seule ou associée, la *Tablette Perroud* rendra toujours de réels services.

Laboratoire PERROUD
7, rue des Archers — LYON

CARBOSANIS

CHARBON ORGANIQUE A POUVOIR D'ADSORPTION CONSTANT

Propriétés. — Pouvoir absorbant considérable, puissant antitoxique dans toutes les infections de l'estomac et de l'intestin ; agit également comme pansement gastro-intestinal beaucoup plus sûr que le bismuth et le kaolin.

Indications. — Empoisonnements. Fermentations gastro-intestinales. Hyperchlorhydrie. Ulcus. Entéro-colites. Diarrhées intenses.

Formes. — Granulé, poudre et cachets.

Laboratoire MONTAGU
49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

CARDIBAÏNE

Ouabaïne cristallisée chimiquement pure
Principe actif du *Strophantus gratus*.

Présentation et posologie. — 1° *Voie buccale*. Solution glycéro-alcoolique à 2 p. 1000 (25 gouttes = 1 mgr. d'ouabaïne).
Petites doses : 25 gouttes par jour en une fois.
Doses moyen. 50 à 75 gttes par j. en 2 ou 3 fois.
Doses fortes : 100 gouttes par jour en 4 fois.
2° *Voie intraveineuse* — Ampoules titrées telles que 1 cc. = 1/4 mgr. ouabaïne ; 1/4 mgr. p. injec.

Indications. — Toutes les insuffisances cardiaques avec hypotonicité marquée ; en un mot, tous les cas où il y a dilatation cardiaque. Dans toutes les autres variétés d'insuffisance cardiaque, voir **Digibaïne.**

Echantillons et littérature
Laboratoires DEGLAUDE
6, rue d'Assas, Paris (6e). Tél. : Littré 31-85.
Belgique : *Agent général :* **L. Prunières**
19, rue Louis-Hap — BRUXELLES

CARDIOSTHÉNINE

Médicament du Cœur et des Vaisseaux.

Définition :

La Cardiosthénine, à base d'extrait de strophantus, de sulfate de spartéine, d'extrait de cratægus oxyacantha et d'extrait de valériane, constitue un toni-cardiaque anti-spasmodique par action vasculaire dilatatrice qui soutient le cœur et diminue les résistances.

Indications thérapeutiques :

Douleurs précordiales, Dyspnée d'effort, Palpitations, Tachycardie, Angine de poitrine, Goitre exophtalmique, Arythmie, Myocardites, Endocardites, Hypertrophie du cœur, Dilatation des cavités du cœur, Hypertension artérielle, Cardio-artériosclérose, Urémie.

Posologie :

De 4 à 6 capsules par 24 heures, ou davantage suivant prescription du médecin traitant.

Laboratoire de Pharmacologie Générale
Dr Ph. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS

CASCARA MIDY

à base de Cascara Sagrada naturel, complet et épuré, mais non dénaturé par des manipulations chimiques.

Pilules dosées à :

1° 0,12 cgr. d'extrait hydro-alcoolique de Cascara Sagrada contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.

1° 0,10 cgr de poudre sélectionnée de Rhamnus purshianus.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 pilules le soir au dîner. Après 15 jours, espacer les doses.

Propr. thér. — Laxatif doux et à effet constant, ni irritant, ni drastique.

Indications. — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices.

Laboratoires MIDY
4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII°)

CASCARINE LEPRINCE

$C^{12}\ H^{10}\ O^5$

Indic. thér. — Constipation habituelle, Affections du foie, Constipation dans la grossesse, l'allaitement, etc.

Cholagogue puis Copragogue de tout premier ordre. (Spécifique des *causes* et des conséquences de la *constipation*).

Véritable traitement et non pas purgatif banal, employé couramment depuis près de 50 ans.

Doses et mode d'emploi. — Pilules à 0,10 : 1 ou 2 Pilules le soir au début du repas.

Docteur M. LEPRINCE
62, Rue de la Tour — PARIS (XVI°)

CATEMÉNYL

Composition. — Le *Cateményl* est à base : d'*Hamamalis virginica*, décongestif, vaso-constricteur veineux, hémostatique, sédatif ; de marron d'Inde, qui fluidifie le sang et calme spécialement la douleur hémorroïdale ; de *Piscidia erytrina*, sédatif utérin ; de *Viburnum prunifolium*, tonique nerveux, astringent, anti-abortif ; d *Hydrastis canadensis*, vaso-constricteur abdominal, par action élective sur les splanchniques.

Propriétés et indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Hémorroïdes, Etats variqueux, Eczéma variqueux, Phlébites infectieuses et variqueuses, Hyposphyxie des extrémités.

Mode d'emploi. — XV à XX gouttes avant chacun des deux principaux repas dans un peu d'eau. Cesser pendant les règles.

Littérature et échantillon sur demande.

Laboratoire du docteur LALAURIE
CUXAC D'AUDE (Aude).

Dépôt général : **Office commercial pharmaceutique,** 71, rue du Temple, PARIS (IIIe), et ses succursales.

CEPHŒMETINE

Composition. — Combinaison définie d'émétine céphœline et psychotrine déposée sous le nom de **«CEPHŒMETINE»** dont l'action se trouve renforcée et complétée par l'adjonction de noir animal, à grains microscopiques et lavés, maltine, carbonate de bismuth et excipient approprié.

Indications. — Entérite, Dysenterie, Diarrhée gastrique infectieuse et parasitaire (amibiases).

Nota. — Les troubles dus à l'Helminthiase ne sont pas atténués et l'échec de la thérapeutique éclaire le diagnostic.

Posologie. — Un cachet une heure après la fin des repas, suivi d'un autre demi-heure après le premier.

Présentation. — Boîte de 30 cachets.

LABORATOIRE de la CEPHŒMETINE

L. PUECH, Pharmacien

44, Rue Gambetta, à BIARRITZ

Dépôt. — Drogueries et Commissionnaires en spécialités.

CÉRÉALES-BÉBÉ FAVRICHON

Régime de l'enfant constipé

Composition.

Les Céréales-Bébé, préparées avec la partie des céréales la plus riche en sels minéraux, offrent à l'organisme en formation les phosphates naturels sous leur forme la plus assimilable. Les enfants chétifs et malingres qui en font usage ne tardent pas à prendre du poids.

Propriétés.

La constipation, très fréquente chez les petits enfants, provient souvent de l'alimentation concentrée destinée à favoriser leur croissance. Les Céréales-Bébé joignent à leurs propriétés très nourrissantes, celle de faire disparaître rapidement la constipation la plus obstinée.

Particularités.

Elles ne contiennent aucun produit chimique ou pharmaceutique, aussi, peut-on en faire quotidiennement usage, aussi longtemps qu'il est nécessaire.

Dose.

1 an : 4 cuillerées à café pour 150 gr. de lait.
2 ans : 2 cuillerées à soupe pour 200 gr. de lait.
4 ans et plus : 3 à 4 cuillerées à soupe.

CÉRÉALES GRANULÉES. — Déjeuner délicieux pour adultes et personnes âgées. A raison des atonies intestinales les plus anciennes et les plus rebelles.

Echantillons et littérature sur demande.

FAVRICHON et VIGNON
Pharmacien-Chimiste.
à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).

CÉRÉBRINE FOURNIER

Liqueur agréable, de composition définie, spécifique par excellence des migraines, névralgies rebelles, règles douloureuses.

Cérébrine simple. — Pour tous les cas en général de migraines et névralgies.

Cérébrine bromée. — Migraines, névralgies tenaces, agit efficacement contre les coliques menstruelles.

Cérébrine bromo-iodée. — Névralgies rebelles à tous traitements antérieurs, névralgies faciales, sciatiques.

Cérébrine iodée. — Névralgies rhumatismales.

Cérébrine quiniée. — Courbature, grippe infectieuse.

Dose. — Une cuillerée à soupe dans un peu d'eau une heure avant le repas ou deux heures après. Renouveler au besoin la dose jusqu'à 3 cuillerées par 24 heures.

A. FOURNIER & Cie, Pharmacien
147, boulevard Montparnasse — PARIS (VIe)

CÉRÉBROÏL LEYSIN

et Sève Cérébralose Leysin.

Sels solubles non oxydés de phosphore directement assimilables. Yagéine, Yagénine, sels de terres rares.

Présentation. - Liqueur, cachets et comprimés.

Indications. — Insuffisance cérébrale, Dépressions nerveuses, Perte de mémoire, de volonté, Apathie, Irrésolution, Phobies, Tics, Aphasie, Asthénie génitale.

Propriétés. — Augmente la Faculté d'attention volontaire, l'Intensité de la pensée, l'Énergie morale, la Puissance de travail et la Résistance physique. Facilite la Rééducation cérébrale. Spécifique réel de la Fatigue, du Surmenage et des Neurasthénies.

Posologie. — Un cachet ou une cuillérée à café avant chacun des deux principaux repas. Supprimer toutes médications contenant de la strychnine ou de l'arsenic.

Les Laboratoires LEYSIN.
1bis, rue Molitor, PARIS (XVIe).

CÉRÉOSSINE DEHAUSSY

Reconstituant puissant

Phytophosphine (anhydro oxyméthylène diphosphate de chaux et de magnésie), nucléinate de manganèse, vitamines concentrées.

Minéralisateur complet

Os frais physiologique renfermant la totalité des minéraux nécessaires à la reminéralisation intégrale. Vitamines liposolubles de la moelle rouge (fixateurs) Parathyroïdine.

Aucune contre-indication

La Céréossine ne contient ni adrénaline, ni surrénale.

Indications :

A titre préventif. — Prétuberculose, allaitement, grossesse, croissance trop rapide, surmenage, convalescences.

A titre curatif. – Cardiopathies, spasmophilie, tuberculose (pulmonaire osseuse), adénopathie trachéo-bronchique, fractures, asthénies, convalescence des maladies infectieuses, diabète avec acidose, rachitisme.

La Céréossine stimule puissamment la nutrition générale en même temps qu'elle assure la reminéralisation intégrale.

Posologie :

Cachets. — *Adultes :* 2 par j.; 10 ans : 1 par j.
Prix 12 francs : la boîte de 40 cachets.

Poudre. — *Adultes :* 2 cuill. à café par jour.
10 ans : 1 — —
5 ans : 1/2 — —
Prix 12 : francs la boîte.

Granulés. — *Adultes :* 4 à 5 cuill. à café par jour.
10 ans : 1 à 3 — —
5 ans : 1 à 2 — —
1 à 2 ans : 1/2 — —
Prix 12 : francs la boîte.

Laboratoires DEHAUSSY
66, rue Nationale — LILLE
R. C. Lille 1794.

CÉRINIL

Indications :

Tuberculose sous toutes ses formes. Prétuberculose. Anémie. Chlorose. Scrofule, etc...

Action :

Agglutine le Bacille de Koch. Neutralise les Toxines. Provoque l'Oxydase du sang ; augmente le taux de l'hémoglobine, le nombre des hématoblastes et des hématies.

Formule gouttes :

Chlorure de Cérium	2 gr. 50
Chlorure de Sodium	2 gr. 50
Bromure de Radium	2 micros
Eau bidistillée	100 gr.

Formule ampoules :

Chlorures de Cérium	0 gr. 55
Chlorure de Sodium	3 gr. »
Bromure de Radium	20 micros
Eau bidistillée	400 gr.

Formes :

Gouttes : Ampoules de 1 c. c. et de 2 c-c.

Posologie et mode d'emploi :

Les 3 premiers jours faire prendre avant les repas du midi et du soir une goutte.
Tous les 3 jours augmenter d'une goutte à chaque repas, jusqu'à 30 gouttes par jour.
Rester à 30 gouttes pendant deux mois, puis diminuer progressivement jusqu'à 0.
Reprendre le traitement progressif après un mois de repos.
Pour hâter les bons effets du CÉRINIL gouttes, faire des injections intraveineuses ou intra-musculaires avec les ampoules CERINIL.
Ne commencer les injections que vers le 7e jour, après que la tolérance du médicament a été affirmée.

Tous les 3 jours une injection :

1 c. c. les 3 premières ;
2 c. c. les 3 suivantes ;
3 c. c. les 3 suivantes ;
4 c. c. les 3 dernières ;

Suspendre pendant un mois et faire 2 ou 3 séries.
Toutes ces doses sont des doses moyennes. Elles peuvent être augmentées, même doublées sans observer aucun trouble particulier.
Dans le cas de courbature ou de migraine violente, diminuer la dose, pour reprendre après disparition de ces troubles, la progression, mais ne pas arrêter complètement. Pour les enfants doses moitié moins fortes.

Laboratoire BOUTROY
8, rue de Passy — PARIS (XVIe)

CÉRIOMINE

Réminéralisateur opothérapique radioactivé.

Indications. — Tuberculose sous toutes ses formes. Prétuberculose. Anémie. Chlorose. Lymphatisme. Rachitisme. Scrofule. Convalescences. Fractures. Surmenage. Grossesse. Allaitement. Croissance. Formation difficile. Neurasthénie. Caries dentaires.

Action. — Apporte par la poudre d'os frais et donne à l'organisme : la chaux, la magnésie, le manganèse, le fer, l'iode et le fluor qui lui sont nécessaires.
Supplée au rôle défaillant de certaines glandes, par le thymus et la parathyroïde, qui permettent l'assimilation et empêchent la déperdition minérale.
Enfin, la radioactivité induite du radium favorise la division infinie de tous les éléments de la CÉRIOMINE, la libération des ions minéraux et leur fixation dans les tissus vivants.
Par ses rayons alpha et béta, *par son émanation, la radioactivité à dose presque infinitésimale, analogue aux radioactivités naturelles de l'organisme humain en état de santé*, provoque une suractivité chimique des sels en solution et des extraits glandulaires favorisant ainsi considérablement le transport et la fixation des ions minéraux ; en outre, elle augmente le taux de l'hémoglobine, le nombre des hématoblastes et des hématies ; elle détermine une leucocytose utile.
Introduit dans l'organisme, le radium exerce une réelle stimulation vitale, qui résulte vraisemblablement *de son action élective sur les organes sanguiformateurs et le système nerveux* ; on s'explique ainsi le relèvement de l'état général constaté par tous les cliniciens.

Formule :

Poudre totale d'os frais	500	grammes
Carbonate de chaux	1250	—
Silicate de magnésie hyd.	500	—
Carbonate de fer	250	—
Hydrate de magnésie	1000	—
Sulfate de manganèse	65	—
Iodure d'amidon	25	—
Fluorure de chaux	50	—
Parathyroïde	5	—
Thymusine	15	—
Bromure de radium	250	microgrammes
Sucre vanillé	3000	grammes
Cacao	1250	—

Pour 10 000 comprimés.

Forme. — Comprimés agréables au goût.

Posologie et mode d'emploi. — Pour les adultes : 2 comprimés avant le repas de midi et 2 avant celui du soir.
Pour les enfants de moins de 7 ans : moitié de la dose ci-dessus. Délayer les comprimés dans un demi-verre d'eau ou les croquer.

Laboratoire BOUTROY
8, rue de Passy — P XVI[e])

CETHOCAL

Composition. — Complexe de sulfates de terres rares et sels de calcium.

Action. — Les sels, en particulier les sulfates de terres rares, catalyseurs d'oxydation, sont des destructeurs de toxines, d'où leur action puissante dans l'Eczéma, considéré comme réaction de défense (Goucerot). Antiseptiques puissants, à action élective sur le bacille de Koch (Drouin), ils constituent de véritables spécifiques des dermites, en particulier et tout specialement des tuberculoses cutanées.

Forme et prix.

Poudre : **8** francs. *Pâte :* **10** francs.
Gouttes : **12** francs. *Ampoules :* **25** francs.

Indications. — Eczémas de toutes formes, Impétigo, Herpès, Acné, Ulcérations de la peau, Erythème fessier des bébés, Pyodermites, Lupus, Psoriasis, Adénites, Tuberculoses verruqueuses Métrites (en tous pansements). Cure de désensibilisation.

Mode d'emploi. — Poudre : Employer la poudre telle quelle ou, mieux, délayée dans un peu d'eau bouillie, à consistance de crème; l'appliquer sur la lésion et laisser sécher, faire tomber l'excès avec un coton ou un linge sec. Une application matin et soir.

Pâte. — Une application matin et soir.

Gouttes. — *Adultes :* XX gouttes, 2 fois par jour, au début des repas de midi et du soir.
Enfants : A partir de 6 ans, V à X gouttes.

Ampoules. — Voir instructions spéciales dans la notice intérieure des boîtes.

Laboratoire du CÉTHOCAL
4, Rue du Val-d'Osne,
SAINT-MAURICE (Seine)

CÉTAROSE GIGON

Composition. — Solution d'acide protocétrarique C^{20} H^{22} O^{16} à 0,016 milligr. par cm. c.

Forme. — Gouttes.

Indications thérapeutiques. — Médicament à électivité musculaire, Analgésique gastrique, Spécifique contre les vomissements, Vomissements de la grossesse. États nauséeux, Douleurs gastriques, Troubles digestifs, Indigestions.

Mode d'emploi et Doses. — 15 à 20 gouttes en une fois dans un peu d'eau sucrée.
Jusqu'à 200 gouttes par 24 heures.

Laboratoires du Dr André GIGON
7, rue Coq-Héron — PARIS (1er)

CHARBON TISSOT

(Grains anisés de)

Forme. — Charbon de peuplier aggloméré au gluten mucogène, aromatisé à l'anis, très légèrement additionné de benzo-naphtol, ou simple.

Le mode d'agglomération en gros grains glutinisés en fait la meilleure forme d'administration du charbon de peuplier en même temps que la plus agréable.

Indications. — Dyspepsie, Gastralgie, Flatulence, Digestions difficiles, Nausées, Hoquet, Renvoi, Embarras et Fermentations intestinales.

Dose. — 1 cuillerée à café soit après chaque repas soit le soir en se couchant, ce qui suffit habituellement.

Nota. — Avaler comme des graines de lin avec une gorgée d'eau si possible.

Laboratoire du Docteur TISSOT
34, Boulevard de Clichy — PARIS

CHELOÏDINE

Pommade résolutive et calmante à base de Thiosinamine, salicylate de soude et stovaïne.
Dépourvue de toute toxicité

Indic. Thérap. — Traitement du rhumatisme chronique, des cicatrices vicieuses et douloureuses, des scléroses.

Mode d'emploi. — Deux fois par jour, appliquer, gros comme une noisette, sur la surface malade et faire suivre d'un massage léger.

Laboratoires DORANTOWICZ
17bis, Avenue Parmentier — PARIS (XIe
Tél. Roquette 14-12

CHENANTHOL

(Vers intestinaux)

Composition. — Le **CHENANTHOL** est la forme officinale définitive et parfaite de l'*Essence pure de Chenopodium Anthelminthicum* obtenue par une technique spéciale de la distillation des sommités fleuries de cette plante.

Principe actif : Ascaridol (C^{10} H^{16} O^2).

Caractéristiques. — *Inoffensif* : action rapide, sûre et complète. Le **CHENANTHOL** s'est imposé comme traitement spécifique des parasites du tube digestif : *Ascaris, Ankylostome, Anguillule, Oxyures, Trichocéphale*, etc., etc.

Pouvoir vermicide comparé :

B. Naphtol	1 gr. 30	élimine	26 %	des vers
Eucalyptol+chloroforme	—	—	46 %	—
Thymol	2 gr.	—	88 %	—
Chenanthol	1 cc. 5	—	96 %	—

La **SANTONINE** est capricieuse et *dangereuse.*

Le **THYMOL** a occasionné des *accidents mortels*; il est malaisé à prendre, et pleinement actif à fortes doses seulement. Son efficacité tombe à demi dès qu'on sort des doses élevées. Au contraire, l'efficacité du **CHENANTHOL** est pratiquement constante quand on diminue les doses; qualité précieuse dans la thérapeutique infantile.

Posologie et mode d'emploi. — Les capsules de Chénanthol sont rigoureusement dosées en *volume* et non en gouttes (1/4 de cent. cube par capsule). On donne une capsule par 3 années d'âge ; maximum : 6 capsules en 3 doses, heure par heure. Purge saline : 1 heure 1/2 après la dernière.

Régime. — Pas de régime préparatoire. *Diète de rigueur* pendant le traitement jusqu'à effet complet de la purge.

Renouveler le traitement au bout de 10 jours si on juge à propos, comme cure radicale.

Laboratoire L. HINGLAIS
ÉPERNAY (Marne)

CHLOCCI

(Le chlore occit les cocci.)

Antiseptique, non toxique, à base de chlore naissant.

Composition. — Poudre ou comprimés de paratoluène sulfochloramine sodique (0,25.)

Indications. — Petite et grande chirurgie. Pansements humides, lavages. Gynécolgie, Urologie.

Doses. — 5 comprimés par litre d'eau pour lavages, injections. 10 comprimés par litre d'eau pour lavage de plaies, pansements humides, goutte à goutte.

Aucune toxicité. — Aucune causticité.

Laboratoire ADAM Docteur en pharm. à Granville (MANCHE).

CHLORAL BROMURÉ DUBOIS

Médicament spécifique du système nerveux, dissimulant la saveur du chloral, n'irritant pas l'estomac. — Liquide sucré, de consistance sirupeuse, contenant les principes des écorces d'oranges amères, représentant 0,40 chloral et 0,60 bromure par cuillerée de 20 gr.

1 à 4 cuillerées, à café ou à soupe, selon l'âge dans les 24 heures.

Flacons et demi-flacons.

Insomnies, Coqueluche, Épilepsie, Menstruations douloureuses, Névralgies, Névroses, Psychoses. Malaises des Hyper-tendus.

DURIEZ

20, place des Vosges — PARIS

CHLORAL-GÉRANIE

Composition. — Solution concentrée de chloral cristallisé (2 grammes par cuillerée à café) désodorisé par l'essence de géranium distillé sur roses.

Forme. — Délivré en flacon de 60 cm³.

Propriétés. — Calmant, décongestif, antiseptique.

Indications. — Angines, laryngites, pharyngites, amygdalites, stomatites, gingivites.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau tiède en gargarismes et bains de bouche.

Laboratoires GROSJEAN
8, rue Lafayette, PARIS (9e).

CHLORAMINE FREYSSINGE

Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine

Forme. — Pilules à enrobage de gluten recouvert d'un enduit inattaquable par le suc gastrique.

Compos. — Chloramine T 0 gr. 05. Charbon de peuplier pulvérisé 0 gr. 10.

Indic. thér. — Dysenteries, Entérites, Paratyphoïdes, Porteurs de germes, etc.
D'une innocuité absolue, elles permettent *réellement* de réaliser la désinfection intestinale ; (Fétidité des selles, etc.).

Posologie. — 2 à 8 pilules par jour au commencement des principaux repas.

Laboratoire FREYSSINGE
6, rue Abel — PARIS

CHLORÉTHYLE BENGUÉ

Chloréthyle Bengué. — Anesthésie locale, névralgies.
Flacons en métal et en verre. Fermeture à clapet très pratique.

Anestile Bengué. — Mélange de chlorure d'éthyle et de méthyle volatil à 2°.
Anesthésie locale, névralgies.

Narcotile Bengué. — Chlorure d'éthyle pur pour anesthésie générale.
Flacon de 50 gr. gradué à gros jet, fermeture à clapet. — Tubes scellés 3, 5, 10 cc. pour anesthésie générale.

Chlorure de méthyle pur. — Bidons de 250, 500 gr. et 1 kilo.

Docteur BENGUÉ
Pharmacien
16, rue Ballu — PARIS (IX°)

CHLORIDIA

Pepsine – Chlorhydro – Cocaïnée – Chloroformique.

Indications. — Dyspepsie, gastralgie, crampes, renvois, vertige stomacal, dilatation de l'estomac, et, en général toutes les maladies de l'estomac se reliant à une insuffisance de sécrétion du suc gastrique.

Propriétés thérapeutiques. — Le Chloridia restitue au suc gastrique tout son pouvoir digestif par l'effet de la pepsine et de l'acide chlorhydrique, oppose aux fermentations putrides l'action antiseptique de son eau chloroformée, et fait disparaître les sensations douloureuses grâce à la présence d'une légère quantité de chlorhydrate de cocaïne.

Forme et dose. — Le Chloridia est un liquide limpide de saveur sucrée et agréable, que l'on prend à la dose *d'une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau au commencement de chaque repas.*
Les personnes qui n'obtiennent pas un soulagement rapide peuvent doubler la dose ou diminuer la quantité d'eau.

Laboratoire des PRODUITS DANNEC'H
Brun et Dumée pharm., 64, rue des Tournelles, Paris (III°). R. du C. Seine 218-670

CHLORINOL

INHALANT

Forme pharmaceutique et composition. — Huile végétale neutre et stérile avec chlorétone, orthoforme, camphre et essences.

Propriétés. — Sédatif, décongestionnant et antiseptique des voies respiratoires.

Avantages. — Huile de qualité *exceptionnelle* très *diffusible*, très *agréable*, associant à des médicaments actifs des essences dont le *choix* a été déterminé d'après leur *pouvoir antiseptique* et leur action *non irritante*.

Indications. — Toutes affections du rhinopharynx.

Présentation et mode d'emploi. — 2 formes: 1° liquide 3 à 4 gouttes, 3 à 4 fois par jour en instillations nasales ou en pulvérisations et en *injections intratrachéales*.
2° *Capsules* pour injections nasales, 3 à 4 fois par jour.

Prescription. — 1 flacon Chlorinol Falvy, ou 1 boîte capsules Chlorinol Falvy.

Les Laboratoires A. FALVY
Licencié ès sciences, ex-interne lauréat des Hôpitaux de Paris.
40, rue des Acacias - PARIS (XVII°)

CHLOROBYL

Composition :

Tochlorine.....	0 gr. 05
Bile purifiée.....	0 gr. 10
Charbon.....	0 gr. 10

Forme. — En comprimés de 0 gr. 25.

Prop. Thér. — Désinfection intestinale.

Indications. — Entérite, Dysenterie, Affections cutanées

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Laboratoires Réunis "Lobica"
11, Rue Torricelli
PARIS (XVII°)

CHLORO-CALCION

Forme : Solution.

Composition :

Solution titrée de *Chlorure de calcium* chimiquement pur, stabilisé.

80 gouttes (ou 1/2 cuiller à café) 1 gr. Ca Cl^2.

Dose :

20 à 40 gouttes aux repas, dans de l'eau sucrée.

Action :

Chloro-Calcion est le *recalcifiant* physiologique type. La solution de Ca Cl^2, directement assimilable, n'utilise pas l'H Cl du suc gastrique trop souvent déficitaire chez les tuberculeux. Il ménage donc la puissance digestive de l'estomac.

La présence en quantité suffisante de calcium dans le sang est un des facteurs essentiels de la coagulation (Carnot).

Chloro-Calcion apporte au sérum la chaux qui lui manque. C'est l'*Hémostatique de choix.*

Indications :

Recalcifiant. Prétuberculose, Croissance, Rachitisme, Carie dentaire, Allaitement, Grossesse, Spasmophilie.

Hémostatique. Toutes hémorragies, hémophilie, maladies du sang, anémies et chlorose.

Déchlorurant. Néphrites, albuminuries, œdèmes.

MICHELS, Pharmacien de 1re Classe

9, Rue Castex — PARIS

CHLOROFORME ANESTHÉSIQUE LAMBIOTTE Frères

Avantages. — Pureté chimique irréprochable. Stabilité et conservation parfaites. Répond à tous les désidérata des chirurgiens et cliniciens. Est, par surcroît, le moins coûteux des chloroformes.

Présentation. — Ampoules de 30 et 50 gr., et boites de 4 ampoules de 30 gr.

Indications. — Tous emplois chirurgicaux et médicaux.

Littérature et échantillons :

Produits LAMBIOTTE frères

3, rue d'Edimbourg — PARIS (VIII[e])

124, Avenue Rogier — BRUXELLES

CHLOROSULFOL VIGIER

Chute des cheveux.
Antiséborrhéique

Composition. — Solution soufrée à 3 0/0 dans un mélange de sulfure et de tétrachlorure de carbone.

Action. — « Le soufre est le médicament spécifique de toutes les lésions du follicule pilo-sébacé. » (Sabouraud.)

Avantages. — Le soufre n'est habituellement solubilisé que dans le sulfure de carbone — odeur très désagréable — très inflammable, application douloureuse.

Le CHLOROSULFOL est désodorisé — moins inflammable — peu douleureux.

Indications. — Folliculites, acnés, hypersécrétion sébacée, séborrhée, alopécies, et surtout chute des cheveux banale d'origine séborrhéique.

Mode d'emploi — Imbiber de liquide une boulette de coton hydrophile et frictionner rapidement et énergiquement le cuir chevelu.

Deux ou trois frictions par semaine, loin d'une flamme, dans un local largement aéré.

Laboratoire F. VIGIER et R. HUERRE
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

CHOLÉCYSTINE

Pilules kératinisées de sulfate de magnésie.

Réalisation en thérapeutique journalière de l'épreuve de Meltzer-Lyon.

Forme. — Pilules kératinisées de sulfate de magnésie dosées à 0,30 cgr. *La variété peptonée renferme en plus 0,05 cgr. de peptone.*

Indications. — Cholécystites aiguës et chroniques, Ictères, Migraines, Entéro-colites muco-membraneuses.

Doses. — 6 à 10 pilules par jour, en une fois, le matin à jeun, ou en plusieurs fois, trois quarts d'heure avant les repas.

VINCENT, pharmacien

14, Avenue Mac-Mahon — PARIS

CHOLÉOBOLDINE THEVENOT

Composition. — Pilules (enrobées au gluten) à base d'extrait de boldo et d'extrait de fiel de bœuf purifié et concentré dans le vide.

Propriétés. — Cholagogue très puissant légèrement laxatif, légèrement antiseptique.

Indications. — Rétention biliaire, coliques hépatiques, congestion du foie, insuffisance hépatique. Ce sont là des indications qui découlent immédiatement de la composition de la *Choléoboldine.* En dehors de ces cas, on la prescrit avec succès dans certains cas de constipation opiniâtre, de dermatoses liées à des troubles hépatiques,

Dose. — 2 à 3 pilules à chacun des grands repas.

Produit fabriqué
par la **Société des Produits pharmaceutiques THEVENOT.** — DIJON.
Prix : le flacon de 50 pilules, 8 fr. 50.
Échantillons sur demande.

CHOLÉO-COMBRETOL BOLDINISÉ

Composition. — Extrait de Combretum. Extrait biliaires. Boldo boldinisé.

Propriétés. — Opothérapie et Phytothérapie associées : Cholagogue, Diurétique Eupeptique Anti-toxique, Laxatif.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire Cirrhoses, Ictères, Cholécystites, Cholémie Constipation, Entero-Colite muco-membraneuse Fièvre bilieuse hématurique et toutes intoxications.

Dose. — Prescrire 1 à 3 pilules après chacun des deux grands repas Dose moyenne 4 pilules par jour.

Prix : le flacon **10** francs.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e^)

Téléphone : Invalides 12-63

CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf et de kinase
Dragées ovoïdes kératinisées dosées
à 0 gr. 25 d'extrait

Doses et mode d'emploi. — 6 à 12 ovoïdes par jour en 3 doses égales : à la fin du déjeuner, à la fin du dîner, le soir en se couchant. Ces doses peuvent même être doublées au début du traitement.

Prop. Thér. — Active les sécrétions biliaire et pancréatique, améliore la digestion duodénale.

Indications. — Spécifique de l'entérocolite muco-membraneuse.

Laboratoires DURET & REMY

ASNIÈRES (Seine)

CHOLÉO-LACTOL DAGUIN

Formule du Dr L.-G. MARY

Forme. — Comprimés à enrobage de Kératine soluble dans l'intestin seulement.

Composition. — Boldine 1/2 milligr., incorporée avec :

Extraits biliaires dépigmentés..... } aa 0,10
Pancréatine extractive..... }
Ferments lactiques purs..... }

par comprimé.

Dose. — Adultes : 4 à 6 par jour, aux repas. Enfants : 1/2 dose. Avaler sans croquer.

Indications. — Infections intestinales et auto-intoxications. Toutes affections hépatiques. Diarrhées estivales. Troubles de la peau.

Échantillons sur demande aux
Établissements DAGUIN
à SAINT-MAUR (Seine)

CHOLERGINE

Médication Antitoxique, Colloïdes et Lipoïdes
Principes définis du foie et de la bile de taureau dissous dans l'huile végétale.

Société de Thérapeutique (Janvier 1911)
Académie de Médecine (Avril 1911)
Académie des Sciences (Juin 1911)

Forme. — Ampoules injectables de 2 cm³.

Mode d'emploi. — Injections au-dessus de la fosse retro-trochantérienne. Enfoncer l'aiguille à 3 ⅝ de profondeur et injecter très lentement. Piqûre indolore. 20 à 30 injections avec arrêt de 5 à 10 jours entre chaque dizaine. Léger massage après piqûre.

Prop. — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique. — Convalescence des maladies infectieuses.

Préparation sans similaires employée journellement dans les hôpitaux.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET
8, rue de la Source, PARIS (XVIe)
Téléph.: Aut. 11.86.

CHOPHYTOL

à base d'extrait aqueux de feuilles d'artichaut.

Composition :

Chaque pilule contient : Aloe div. 0 gr. 01, Extr. Hép 0 gr. 02, Extr. Bil. 0 gr. 02. Extr. total. Cynarac Scol mus 0 gr. 15. Excipient Q. S. Pour 1 pilule de 0 gr. 2

Propriétés thérapeutiques :

Stimulant et tonique de la cellule hépatique, cholagog Diurétique puissant, Déconstipant.

Indications :

Insuffisance hépatique, *Jaunisse*, Infection de la vésic biliaire, Hypertrophie ou atrophie du foie (cirrhos rhumatismes, Maladies des pays chauds (*à titre prév tif*) comme adjuvant des traitements spécifiques hab tuels. Cure de convalescence après maladies infectieus (fièvre typhoïde, pneumonie, etc.).

Mode d'emploi :

6 à 12 pilules par jour au milieu des repas suivant pr cription du médecin :

G. E. ROSA, Dr en pharmacie.

1, place de la Porte Champerret — PARIS (XVIIe)
Tél. : Carnot 67-75

CIBALGINE

Analgésique, sédatif
(*sans aucune substance du tableau B.*)

Diallylmalonylurée - diméthylaminophénylé méthylpyrazolone.

Indications. Les algies d'une façon généra migraine, névralgies, courbature, torticol sciatiques, douleurs dentaires, angin otites, mastoïdites, sinusites, etc.

Comprimés. Gouttes. Ampoules.

Doses. — 1 à 4 comprimés par 24 heures.
20 à 60 gouttes —
1 à 2 ampoules —

Le flacon de 15 comprimés : 9 francs.
Le flacon de 15 cmc (gouttes) : 13 francs
La boîte de 5 ampoules : 13 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, place Morand — LYON

CINEYL GRYSA

Médicament de défense antibacillaire.

Indications. — Tous les cas de tuberculose à formes aiguës ou chroniques, ainsi que dans les formes hémoptoïques.

Action directe sur le microbe par modification de son enveloppe protectrice.

Innocuité absolue. — Tolérance remarquable.

Posologie.

Adultes : 2 à 6 comprimés par jour ;
Enfants : 1 à 3 — —
suivant l'âge.

PRODUITS CHIMIQUES DU MAINE
7, rue Saint-André, Le Mans.

CITRASE

Composition. — Sérum antianémique selon les formules du Dr Normet, à base de citrates et de tartrates (communications à l'Académie de Médecine).

Propriétés. — *Hémalopoiétique* puissant.
Antirhumatismal.
Antihémorragique.

Indications. — Anémies pernicieuses. Etats leucémiques, lymphoïdes. Pneumonies, Rhumatismes, Hémorragies.

Formes. — *Citrase V* = Injections intra-veineuses 20 cc. (traitement héroïque).
Citrase C = Injections sous-cutanées 5 cc. (indolores).

Laboratoires
ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS

CITRASPIRINE

Présentation nouvelle.
Supprimant les inconvénients du Comprimé et du Cachet.

Aucune action sur l'estomac.

Admise dans les Hôpitaux, l'Assistance Publique et le Ministère de la Marine (sur avis du Conseil supérieur de Santé)

Forme. — Petits comprimés lenticulaires *glutinisés* d'absorption très facile (0 gr. 32 de principes actifs).

Composition. — Acétyl-Salicyl 0.25, caféine 0.02, phénédine 0.05.

Propriétés. — Aspirine renforcée plus active avec effets plus rapides et plus durables tout en restant inoffensive. Aucune contre-indication même chez les cardiaques et rénaux. Ajoute à l'action de l'aspirine les propriétés stimulantes et toni-cardiaques de la caféine. Evite les cas fréquents d'intoxications qui peuvent se produire par l'absorption de comprimés ou cachets d'aspirine dosés à 0 gr. 50.

Indications. — Migraines, Névralgies faciales, intercostales, Douleurs et Abcès dentaires, Goutte, Sciatique, Rhumatismes, Articulaire aigu ou chronique, Lumbago, Pseudo-gastralgies d'origine rhumatismale ou névralgique, Douleurs périodiques, Grippe, Frissons, Fièvres (fièvre des tuberculeux), Pseudo-rhumatismes infectieux, toutes douleurs et tous malaises d'un caractère fiévreux.

Posologie. — 1° *Pour adultes :* 4 à 8 comprimés par jour ou plus selon prescription (à prendre généralement deux par deux).
2° *Pour les enfants de 5 à 12 ans :* 2 à 4 comprimés par jour ou plus selon prescription (prendre un ou deux à la fois selon l'âge).

Mode d'administration. — Enfants et adultes, de préférence dix minutes avant ou une heure ou deux après les repas avec quelques petites gorgées d'un liquide quelconque, excepté les eaux alcalines (Vichy, Vals, etc.).
(Ne jamais sucer ni croquer les comprimés.)
Échantillons sur demande.

Laboratoire de l'UGÉOL
22, boulevard Sébastopol, Paris (IV^e^).
Téléph. : Archives 46-46.

CITROCARBINE

Antiseptie digestive

Composition. — Granulé fondant de goût agréable, répondant à la formule :

Citrate acide de soude	10
Charbon animal	90

Action. — Eupeptique, cholagogue par le citrate de soude, fixateur, antifermentescible par le charbon.

Avantages. — Stabilité du citrate acide non détruit dans l'estomac comme le citrate alcalin. Hyperactivité du charbon animal plus fin que le charbon végétal.

Action constipante du charbon corrigée par le citrate.

Indications. — Dyspepsies. Aérophagie. Insuffisance et infections bilaires. Entérites aiguës et chroniques. Diarrhées. Fermentations intestinales. Auto-intoxication. Artério-sclérose.

Mode d'emploi. — Une à deux cuillerées à café à la fin des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Laboratoires WARIN
4, Chaussée de la Muette, PARIS (XVIe).

CITROFLUYL

citrate monosodique pur

Forme. — Granulés à saveur agréable. Une cuillerée à café contient 0,50 de citrate monosodique.

Dose. — 2 à 6 cuillerées à café par jour avant ou entre les repas, selon l'avis du médecin et l'effet désiré.

Indications. — Hypertension artérielle, insuffisance hépatique, rhumatismes, goutte, dyspepsies, gastrites, vomissements.

Laboratoire G. WARIN
4, Chaussée de la Muette, PARIS (XVIe).

CITROPAÏNE DU Dr FONTAL

Composition.

Phosphocitrate mangano-sodique associé à un ferment végétal.

Propriétés.

Eupeptique, Cholagogue, anti-acide, décongestive, régulatrice des fonctions digestives et circulatoires.

Indications.

Dyspepsies, hyperchlorhydries, gastro-entérites, mauvaises circulations, congestions veineuses, maladies d'estomac, foie, intestin.

Forme et Posologie.

Granulé. — de 3 à 6 cuillerées à café par jour.
Comprimés. — de 6 à 9 par jour,
Cachets. — de 2 à 3 par jour,

Laboratoires JICEM
304, rue Saint-Jacques, Paris (Ve).

CITROSODINE LONGUET

Hyperacidité (douleurs gastriques).
Antiémétique (vomissements des nourrissons).
Eupeptique (dyspepsies, gastro-entérites).
Action lithotriptique et diurétique.
Action sur la viscosité du sang.
(*Pneumonies — Broncho-pneumonies*
Gangrènes séniles.
Comprimés de 0 gr. 25 citrate trisodique.

Dose et mode d'emploi. — *Adultes :* 3 à 4 comprimés (2 ou 3 fois par jour).
Enfants : 3 à 4 comprimés.
Pneumonies : 4 comprimés toutes les heures ou 8 comprimés toutes les deux heures, dans un demi-verre d'eau ; la médication étant continuée jour et nuit, jusqu'au 2e au 3e jour qui suit la crise.

Laboratoires LONGUET
34, rue Sedaine — PARIS (XIe)

CLISÉMINE LONGUET

Médication citratée injectable.

Indications. — HÉMORRAGIES.
Cancers (M. Renaud).
Tuberculose, Hémoptysies.
Gynécologie.
Interventions chirurgicales (Neuhof et Hirschfeld).

Ampoules de 20 cc. de solution stabilisée renfermant 30% de citrate de soude et 10% de chlorure de magnésium.

Dose et mode d'emploi. — Injection intraveineuse de 15 à 30 cc. (20 cc en moyenne), selon le poids du sujet.
Enfants : Injection intraveineuse de 10 cc.

Laboratoires LONGUET
34, Rue Sedaine — PARIS (XI^e^)

CLONAZONE DAUFRESNE

Antiseptique organique chloré
non toxique
(Méthode de Carrel)

Composition. — Chloramine sodique du toluène en poudre cristalline ou comprimés dosés à 0 gr. 25.

Indications. — Gynécologie et obstétrique, urologie, angines, petite et grande chirurgie.

Posologie. — *Usages médicaux :* 2 à 5 comprimés par litre d'eau pour gargarismes, lavages de gorge et du nez, irrigations vaginales.

Usages chirurgicaux : 10 comprimés par litre d'eau, pour pansements humides, tamponnements, irrigation des plaies suivant la technique de Carrel.

Cette solution à 10 comprimés est d'un emploi et d'une action identiques à ceux de la solution de Dakin.

Stérilisation instantanée de l'eau sans ébullition : 1 comprimé par litre.

Avantages. — Action antiseptique puissante et rapide, sans phénomènes d'irritation.

Deux formes :

Comprimés : tubes de 20 et 60 comprimés à 0 gr. 25.

Poudre : tubes de 20 gr. avec cuiller-mesure correspondant à 0 gr. 25 comme les comprimés.

Conditionnements vrac pour cliniques et hôpitaux.

Échantillons médicaux sur demande.

LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES CHLORÉS

40, rue Thiers, Le Havre.

CLUPEYL

Reconstituant général sans équivalent ni similaire.

Forme. — Comprimés dragéifiés faciles à avaler.

Composition. — Poudre intégrale de laitances de harengs, fraîches, desséchées dans le vide et à froid.

Propriétés thérapeutiques. — Par sa richesse en phosphore organique (acide nucléinique, lécithine, cérébrine), le Clupeyl est un reconstituant général de tout premier ordre et un excellent stimulant du système nerveux, sur lequel il agit sans le surexciter.

Indications. — Anorexie, Amaigrissement, Surmenage physique et intellectuel, Neurasthénie, Asthénie post-grippale, Tuberculose, Rachitisme et toutes adynamies et débilités.

Posologie. — *Adultes :* 6 à 8 comprimés par jour. *Enfants :* à partir de 7 ans, 3 à 4. A prendre aux repas. Avaler sans croquer ni sucer.

Laboratoire du CLUPEYL
69, avenue Faidherbe — MALO-LES-BAINS (Nord).

COCAÏNE MIDY

(Chloroboratées)

Chaque pastille contient :

0,002 mgr. de Chlorhydrate de Cocaïne.
0,05 cgr. de Chlorate de Potasse.
0,05 cgr. de Biborate de Soude.

Dose et mode d'emploi. — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

Prop. thér. — Anesthésique local, antiseptique modificateur.

Indications. — Affections de la bouche, gorge, larynx ; Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge.

Laboratoires MIDY
4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII[e]).

CODOCOL

Calmant de la toux.

Composition.

Association de Thiophenolate de Codéine Cinnamate de soude. Soufre assimilable, sous forme de comprimés.

Action thérapeutique.

Antiseptise l'appareil pulmonaire. Fluidifie la sécrétion bronchique. Facilite l'expectoration. Diminue l'excitabilité du centre tussigène. Active la défense de l'organisme.

Avantages.

Médication à la fois causale et symptomatique, forme comprimés pratique, suppression du goût désagréable du Gaïacol

Indications.

Trachéites; bronchites, aiguës et chroniques; grippe, prétuberculose et tuberculose, et toutes les affections de l'appareil respiratoire.

Mode d'emploi.

4 à 8 comprimes par jour.

Laboratoires COUSSINET

20, rue des Martyrs, Paris (IX^{e}).

CODOFORME

Compos. — Comprimés enrobés constitués par une nouv. combinaison bromoformique soluble associée à la codéine ; se dissolvent d. l'intestin seulement où ils libèrent sans fatigue pour l'estomac une quantité rigoureusement constante de bromoforme pur.

Chaque comprimé représente ; Codéine, 1 cgr; bromoforme IV gttes ; teinture d'aconit et belladone aa. V gttes ; terpine et benzoate de soude comme excipient.

Indic. — Spécifique des toux sèches (spasmodiques, laryngo-trachéales, post-grippales, névropath.). Sédatif remarquable de la toux des tuberculeux, assurant calme et repos sans irritation gastrique ou inappétence.

Posol. — 5 compr. p. j.; 6 à 8 d. toux rebelles Grands enf. (à part. de 5 ans) 2 à 3 compr. p 24 h. Avaler s. sucer ni croquer.

Laboratoires BOTTU

35, r. Pergolèse. — PARIS (XVI^{e}) - Tél. Passy 43-85

COLCHI-SAL MIDY

(Colchicine — Ess. de Wintesgreen)

Chaque capsule contient :
1/4 de mgr colchicine pure dissoute dans 0,20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel (Ess. de Wintergreen) obtenu par fermentation et distillation et équivalent à 0,25 egr. Salicylate de Soude.

Dose. — 4 à 16 capsules par jour par prises fractionnées.

Prop. Thér. de l'Ess. de Wintergreen

Augmente l'élimination de l'acide urique et des autres éléments solides de l'urine. — 2° Calme la douleur. — 3° Liquide et augmente la sécrétion biliaire. — 4° Légèrement diurétique. — 5° Diaphorétique. — 6° Diminue la fièvre. — 7° Combat la congestion et facilite la résolution des inflammations (G. Sée). — 8° Action antiseptique sur le sang.

de la Colchicine

Diminue la production d'acide urique. — 2° Augmente rapidement l'élimination de tous les produits brûlés et pousse à l'oxydation. — 3° Soulage la douleur. — 4° Augmente la sécrétion biliaire. — 5° Légèrement diurétique. — 6° Diaphorétique. — 7° Purgatif.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS XVII°

COLITIQUE

Vaccin exclusivement anti-colibacillaire.
(D'après la technique du Dr Fisch.)

Indications. — Toutes les manifestations du syndrome provoqué par le *colibacille seul* et qui se traduisent par des symptômes divers :
Asthénie, Céphalée, Embarras gastrique. Gastro-entérite, Pyélonéphrite, Cystite, Grippe intestinale, Maladies infectieuses des organes génitaux féminins, Ictère, Convalescence des fièvres typhoïdes, etc.

Formes. — Par voie buccale (la plus logique), ampoules de 3 c c.
Filtrat pour applications sur les foyers ouverts, ampoules de 3 c.c.
Par voie hypodermique, ampoules de 1 c.c.

Prix : 25 francs.

Laboratoires P. ASTIER

41 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS

COLLOBIASE D'OR

Or colloïdal bleu Dausse.

Formes. — *Ampoules de 2 cc.* pour injections intramusculaires ou intraveineuses, titrées à 25 centièmes de milligr. d'Or colloïdal bleu par cc.

Indications et mode d'emploi.

AMPOULES DE COLLOBIASE D'OR. Médicament anti-toxi-infectieux dans toutes les septicémies : *Pneumonie, fièvre typhoïde, érysipèle, fièvres éruptives, méningites, endo-cardites,* etc.

ADULTES : 4 à 6 cent. cubes par voie intramusculaire et par 24 heures.
1/2 cc. à 1 cc. 1/2 par voie intraveineuse.

ENFANTS : 1/4 à 1 cc. par voie intramusculaire. Pour éviter la réaction consécutive à l'injection intra-veineuse, prendre X gouttes de solution à 1 p. 1000 d'adrénaline dans un peu de café.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

COLLOBIASE DE SOUFRE

Médicament anti-rhumatismal ;
spécifique des jointures :

Formes. — *Ampoules de 2 cc.* contenant 33 centièmes de milligr. de soufre colloïdal par cc.

Fondant de soufre, titré à 15 milligr. de collobiase de soufre par dose ou 5 grammes.

Indications. — Rhumatismes chronique, déformant, goutteux. Rhumatisme articulaire aigu. Localisations rhumatismales. Sclérites, iritis. Affections du larynx et des bronches, dermatoses.

Posologie. — *Ampoules de collobiase de soufre* : Une injection tous les jours ou tous les deux jours par *voie intraveineuse* (de préférence) ou *intramusculaire*. Débuter par 1/2 cc. et augmenter chaque jour de 1/2 cc. jusqu'à atteindre 2 cc. Faire des séries de 10 piqûres successives, entrecoupées de périodes de repos de 15 jours ou 1 mois.

Fondant de soufre. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

COLLOBIASE DE SULFHYDRARGYRE

Complexe colloïdal de soufre et de mercure.

Médicament *anti-syphilitique* et *anti-rhumatismal*.

Formes. — *Ampoules de 2 cc.* contenant 1/4 de milligr. de soufre et 1 milligr. d'Hydrargyre par ampoules de 2 cc.

Fondant de Sulfhydrargyre titré à 0 gr. 02 de sulfhydrargyre par dose ou 5 grammes de saccharolé fondant.

Pilules de Sulfhydrargyre dosées à 0 gr. 0054 de sulfhydrargyre par pilule.

Indications. — *Syphilis nerveuse, Hérédo-syphilis, Rhumatisme chronique déformant.*

Posologie. — *Ampoules* en injection intra-musculaire ou intraveineuse, tous les jours ou tous les deux jours.

Fondant. — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café par jour. — *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café selon l'âge.

Pilules. — 3 pilules par jour.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot, Paris (IV^e^).

COLLOÏDES AMICROS

Le Laboratoire des Produits Amicros est spécialisé dans la préparation des formules à base de métaux colloïdaux simples ou complexes : (v. Orargol), et des colloïdes radio-actifs « Radiamicros ». — Solutions injectables : boîte de 6 amp. de 5 cc ou 1 amp. de 10 cc. Solutions non inject. ; voie buccale : gouttes Amicros. Pansements et Ovules Amicros et Radiamicros.

Gouttes Amicros : métaux colloïdaux électriques en solution concentrée. Présentation : flacon de 60 gr. avec compte-gouttes. Indications : 3 indications principales. Gouttes d'**Orargol Amicros** : Etats infectieux, fièvres, grippes. Gouttes d'**Etain Amicros** : Staphylococcies, furonculoses. Gouttes de **Fer Manganèse Amicros** ; Anémie, chlorose.

Posologie. — Enfants, 20 à 100 gttes suivant âge ; adultes, 1 à 2 cuil. à café par jour à prendre en plusieurs fois dans une boisson quelconque.

Laboratoire des PRODUITS AMICROS

5, rue Clauzel — PARIS (IXe)

Tél. Trudaine 00-47

COLLOÏDINE LALEUF

Dragées

Composition :

Extrait total pluriglandulaire associé à *l'Iodalbumine*.

Propriétés et indications thérapeutiques :

Remédie à la viciation fonctionnelle des glandes endocrines et, grâce à la présence de *l'Iodalbumine*, favorise la combustion intra-organique.

Est tout spécialement indiquée dans le traitement de *l'Obésité* considérée comme maladie par carence diastasique. Convient aux deux sexes.

Doses et Mode d'emploi :

De 2 à 4 dragées par jour suivant le cas, à prendre de préférence au début des repas. Les avaler en même temps qu'une gorgée d'eau.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos, PARIS (XVe)

COLLOÏDOGENINE DU Dr BAYLE

Nature. — Extrait de rate de porc.

Formes. — Colloïdogénine injectable (ampoule de 5 cc.) ;
2° Colloïdogénine sirop (cruchons).
3° Colloïdogénine (flacons-ampoules pour voie buccale).

Indications. — Tuberculose (toutes localisations et formes) :
Prétuberculose. Anémies de toutes natures.

Action. — Augmentation rapide des hématies (30 %) ; augmentation des leucocytes (40 %) ; augmentation de l'hémoglobine (40 %) ; raréfaction puis disparition des bacilles de Koch ; progression rapide des forces et du poids ; cicatrisation des lésions.

Emploi et doses. — Séries de 12 injections (intrafessières ou sous-cutanées abdominales) en 22 jours. Chaque série est séparée de la suivante par 8 jours de repos. Le sirop de colloïdogénine est donné dans le même temps (4 cuill. à soupe par jour aux repas). Dans les cas légers ou comme prophylaxie le sirop suffit.

Doses chez l'enfant. — Colloïdogénine injectable au-dessous de 5 ans 1 cc. par année d'âge ; au-dessus de 5 ans l'injection sera de 5 cc.
Colloïdogénine sirop, 1 cuill. à café par jour jusqu'à 3 ans, 2 jusqu'à 5 ans, 1 cuill. à soupe jusqu'à 7 ans, 2 jusqu'à 10 ans, 3 jusqu'à 14 ans.

Laboratoire CHAIX
10, rue de l'Orne — PARIS (XVe)

COLLUBORINE DUPUY

Traitements des affections de la Cavité buccale et des **maladies de la gorge.**

Forme. — Collutoire stérilisé et gargarisme aseptique renfermés dans un tube.

Composition. — Borate de soude neutre peroxygéné-Résorcine Stovaine et Trichloréthanal.

Avantages. — Préparation qui remplit le double rôle de Collutoire et de Gargarisme.

Indications. — Stomatites diverses : Angines aiguës, Amygdalites, etc.

Mode d'emploi. — A. En pressant sur le tube, imprégner de Colluborine le coton fixé à l'extrémité d'un porte-tampon et badigeonner la gorge comme avec un Collutoire.

B. En pressant sur le tube, une cuill. à café dissoute dans un verre d'eau chaude donne instantanément un Gargarisme.

LABORATOIRE de THÉRAPEUTIQUE des VOIES DIGESTIVES J. LAUMONIER, PHARMACIEN-DIRECTEUR

223, rue Saint-Martin, Paris.

COMITIOL

Comprimés composés de Phényléthyl-malonylurée et Tartrate Boricopotassique chimiquement pur (Gardénal-Luminal).

1° Phényléthyl-malonylurée : Comprimés *B* 0 gr. 01 : Comprimés *C* 0 gr. 02 ; Comprimés *D* 0 gr. 03. — 2° Tartrat. Boricopotassique 0 gr. 50 pour les comprimés *A*, *B*, *C*, *D*

Indications. — 1° Principale : Epilepsie. — 2° Accessoires Convulsions, Tétanie, Parkinson, Chorée, Angor pectorie

Avantages. — Activité aussi grande que celle des hautes doses de Phényléthyl-malonylurée, sans leurs inconvénients. Tolérance parfaite. Accoutumance nulle.

Conduite du traitement. — 6 Pastilles formule *C* par jour.

Si cette formule se montre insuffisante prescrire comprimés *D*. Après deux mois de traitement intensif intercaler des périodes de repos relatif en donnant 6 comprimés *B* par jour durant 10 jours.

Doses infantiles. — 1/3 comprimé par année d'âge et par jour.

PHARMACIE GRORICHARD

12, Place Labourey, Besançon (Doubs).

COMPLEXES COLLOIDAUX DU Dr RIQUOIR

Néoplalysine

Arrêt rapide des hémorrhagies dans le *Cancer* et le *Fibrome*, cicatrisation dans l'*Ulcère d'estomac*, vérifiée par la radiographie.

Colloixol antibacillaire

Abaissement de la température et *cicatrisation dans la tuberculose pulmonaire* — guérison rapide des adénites et des fistules dans la *tuberculose glanglionnaire*, *osseuse*, et *génitale*.

Colloixol antiarthritique

Sciatique — Goutte — Rhumatisme déformant.

Colloixol antipyosique

Salpingite — Furonculose.

Colloixol antientéritique

Entérite — Diarrhée infantile.

Mode d'emploi :

Ampoules : 1 par jour.
Cachets : 3 par jour.

MERMINOD et Cie
49, rue de Paradis, Paris (Xe).
Ad. Buisson, pharm. de 1re classe
Téléphone : Provence 30-32. R. C. Seine 192-364.

COMPLEXTRAITS

Médicaments à prendre par gouttes.

Cœur. — Complextrait de Digitale.

Estomac. — Complextrait de Condurango.

Utérus. — Complextrait de Gossypium — Piscidia — Viburnum.

Circulation. — Complextrait de Marron d'Inde.

Nerfs. — Complextrait de Cratægus.

Muscles. — Complextrait de Kola.

Pour tous renseignements, littérature, et échantillons, écrire :

Laboratoire des Complextraits
à HÉRICOURT (Haute-Saône)

COMPRIMÉS ADRIAN

a) Comprimés d'hydrate de magnésie Adrian.
b) Comprimés de carbonate de chaux Adrian.

Action. — Médicament saturant de l'hyperacidité gastrique.

Avantages. — Ne neutralise que l'excès d'acide, comprimés très friables, se délitant facilement, grâce à leur constitution presque spongieuse.

Indications. — Hyperchlorhydrie, pyrosis, etc.

Mode d'emploi. — 4 comprimés une heure avant les repas, et au moment des douleurs.

ADRIAN & Cie
9 et 11, rue de la Perle — PARIS

COMPRIMÉS D'ALIBOUR

Composition. — Association de sulfate de zinc et sulfate de cuivre.

Indications. — Traitement des plaies, des inflammations des yeux, des flueurs blanches.

Action. — Antiseptique idéal d'usage courant prophylactique, hygiénique, anticatarrhale.

Dose. — Deux comprimés dans deux litres d'eau bouillie chaude pour injection vaginale, lotion pour les yeux et les muqueuses.

Quatre comprimés par litre d'eau pour traiter les plaies superficielles infectées, l'impétigo, l'ecthyma.

Laboratoires DURET & RÉMY
ASNIÈRES (Seine).

COMPRIMÉS AQUA PURA

Pour la stérilisation rigoureuse de l'eau

Principe :

Iode naissant parfaitement éliminé après action.

Indications :

1° Pour la *Boisson :* stérilisation immédiate de l'eau suspecte ;

2°) Pour tous *lavages aseptiques :* buccaux, gynécologiques, intestinaux.

Avantages :

Sécurité absolue. — Saveur agréable.

Mode d'emploi :

3 comprimés par litre d'eau suivant l'ordre indiqué par la notice.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne, Paris.

COMPRIMÉS CHÉRALYS

Composition. — Nickel catalytique Dufayard. Peroxyde de manganèse colloïdal. Cobalt catalytique.

Carbonate de calcium léger. Silicate d'alumine et de magnésie. (En comprimés agréables à croquer).

Propriétés. — Basées sur les principes scientifiques les plus modernes. Activateurs des ferments digestifs normaux. Neutralisants. Antifermentescibles.

Indications. — Maladies de l'estomac, du foie, des intestins, Diabète.

2 comprimés après les repas et 2 autres ou plus 3 à 4 heures après.

Laboratoires DUFAYARD

12, Rue des Saints-Pères — PARIS (VII[e])

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

à l'oxycyanure d'hydrargyre

Composition. — Comprimés d'oxycyanure d'hydrargyre dosés à 0 gr. 50

Propriétés. — Ces comprimés sont très solubles dans l'eau avec laquelle ils donnent une solution très limpide, d'un pouvoir antiseptique élevé, très bien tolérée par les mains et les muqueuses et n'attaquant pas les instruments nickelés.

Indications. — S'emploient avec succès en gynécologie et en obstétrique, dans les maladies des voies génito-urinaires (métrite, flueurs blanches, vaginite, urétrite, blennorragie), dans le pansement des plaies, enfin comme antiseptique en général.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre un comprimé dans un ou deux litres d'eau. La dissolution s'effectue en quelques secondes si on a soin d'écraser le comprimé dans l'eau.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

COMPRIMÉS KLÉOS

Indications. — Maladies nerveuses infantiles (épilepsie, convulsions, douleurs de dentition, terreurs nocturnes).
Comprimés Kléos aux polybromures. N° 1.
Comprimés Kléos à la phényléthylmalonylurée. N° 2.
Comprimés Kléos aux tartrates borico-potassiques et sodiques. N° 3.

Forme. — Comprimés solubles.

Posologie. — Un comprimé par jour et par année d'âge.

Avantages.—Dosage rigoureux, produits purs et stables.

Littérature et échantillons :

Laboratoires GUÉRET
2, Rue des Cordeliers.
MEUNG-SUR-LOIRE (Loiret)

COMPRIMÉS MAVER

Composition. — Comprimés enrobés de sucre et de gluten.
Chaque comprimé contient : Codéine 2 milligr.; Terpine 5 cgr.; Extrait d'aconite titré 1 milligr.; Extrait mou de grindilia 5 cgr.; Extrait mou de pavot blanc 5 cgr.

Indications. — Toutes les *toux rebelles* et fatigantes. aucune contre-indication.

Avantages. — Tolérance parfaite : *glutinisation*. Action rapide : Association nouvelle très active.

Prix modique : 11 fr. la boîte de 36 comprimés

Posologie. — 5 à 6 comprimés par jour loin des repas. 6 à 8 dans les toux rebelles.
Enfants au-dessus de 5 ans : demi-dose.

M. A.
Établissements WOLLACKER
31, rue Saint-Georges — PARIS

COMPRIMÉS DE PANTOLAXINE

du Docteur BOVEIL

Traitement de la Constipation.

Ainsi que leur nom l'indique, ces comprimés renferment tous les principes actifs de tous les laxatifs reconnus les plus efficaces et doivent, par conséquent, agir dans tous les cas de constipation.

Composition. — Bourdaine, Cuscute, Chardon-Marie, Cascara, Rhubarbe, Aloïne, Evonymine, Belladone, Extraits biliaires.

Indications. — Constipation et ses conséquences (vertige, tension artérielle, éruptions, démangeaisons, haleine fétide, etc.)

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés pris au repas du soir, tous les jours, ou deux à trois fois par semaine suivant les besoins. Demi-dose pour les enfants.

Échantillon et littérature sur demande.

M. PARIS, Pharmacien de 1re Classe.
1, rue Lassalle — LYON (La Boucle).

COMPRIMÉS " ROCHE " DE THIOCOL

1 comprimé " Roche " de Thiocol = 0,50 cgr. Thiocol " Roche ".
1 gr. Thiocol " Roche " = 0,52 cgr. gaïacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 par jour et plus.

Prop. thér. — Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique et Orexique.

Indic. thér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, tuberculose, coqueluche, rachitisme, dyspepsie, entérites, etc.

Avis très important. — Pour éviter toute substitution inactive ou même toxique, bien spécifier toujours.

Comprimés " Roche " de Thiocol.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
21, place des Vosges — PARIS

COMPRIMÉS ROY

Composition :

Comprimés dosés chacun à 0 gr. 005 de *lactate* d'Hg chimiquement pur, spécialement préparé et uni aux principes essentiels du lait.
C'est la seule préparation mercurielle bien supportée *per os* et où le *lactate* d'Hg., sel instable, soit de conservation indéfinie.

Indications :

Syphilis (adultes ou enfants).

Doses moyennes :

Adultes : 4 comprimés (soit 0 gr. 02 de *lactate*) à prendre aux repas.
Enfants : (par 1/2 comprimé au moins) 1/2 comprimé = 0 gr. 0025 de *lactate*.
N. B. — Les boîtes de vente ne renferment aucun indice rappelant la composition ou la destination.

Laboratoires A. ROY & Cie
81, boulevard Suchet — PARIS (XVIe)
Auteuil : 05-46.

CONJONCTOL

Ampoules collyre à base de borosalicyl et d'hamamélis.
Spécialement recommandé dans les conjonctivites aiguës et subaiguës, infections des paupières, kératites phlycténulaires, trachome et sa prophylaxie.
Peut être utilisé également par les personnes surmenées par un long travail intellectuel ou une forte attention visuelle.
Boîtes de 6 et 12 ampoules.
Échantillon gratuit et notice au Corps médical sur demande.

Laboratoires
des Établissements H. SALLÉ
4, rue Elzévir — PARIS (IIIe)

CORAMINE CIBA

Toni-cardiaque eupnéique

Stimulant du système nerveux, de la respiration et de la circulation. Produit synthétique (diéthylamide de l'acide pyridine-B-carbonique) soluble dans l'eau et pouvant être administré par voie buccale, sous-cutanée ou intra-veineuse. Se substitue toujours à l'huile camphrée et parfois aux autres toniques du cœur avec de grands avantages. Pas de contre-indications. Aucune toxicité.

Indications. — Collapsus cardiaque, syncope, états lipothymiques. Faiblesse du cœur au cours des maladies aiguës, des infections, des intoxications, de la période postopératoire. Hyposystolie des vieillards, etc.

Gouttes — Ampoules

Doses. — 25 à 100 gouttes par 24 heures.
1 à 5 ampoules par 24 heures.

Le flacon de 15 cmc : 12 francs.
La boîte de 5 ampoules : 12 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, place Morand — LYON



CORÉÏNE

Mucilage rigoureusement pur, sans l'adjonction d'aucune substance laxative.
Produit exclusivement végétal.
(Procédé Taillandier.)

La **Coréïne n'est pas** de l'agar-agar.

La **Coréïne n'est pas extraite** de l'agar-agar. C'est du mucilage pur, indigestible.

Propriété unique. — Absorbe et retient 50 fois son poids d'eau.

Indications. — Constipation simple, Colite muqueuse. Colite muco-membraneuse.

La **Coréïne** constitue un traitement remarquable souvent le seul, de la constipation et de certaines formes diarrhéiques.

Forme. — Granulé et Paillettes.

"La Coréïne est admise par l'Assistance Publique ".

Pour absorber la Coréïne.

Peu de produits sont plus faciles à absorber que la **Coréïne en paillettes,** à la condition toutefois de tenir compte de nos indications et en **particulier d'éviter deux erreurs** : **1°** de la mettre à sec dans la bouche et **2°** de la mélanger avec de l'eau.

Le matin, mettez dans un bol la quantité de Coréïne en paillettes prescrite, et versez dessus du lait... ou café au lait... chaud, dans la **proportion de 3 cuillerées à bouche pour 2 cuillerées à café de paillettes.**

Mélanger vivement et absorber **tout de suite comme un potage.**

Aux repas du midi ou du soir, mélangez la paillette avec quelques cuillerées de potage, de purée de légumes, ou de compote.

La dose peut être augmentée ou diminuée suivant l'effet obtenu. La régularisation des fonctions intestinales étant obtenue, continuer l'usage de la Coréïne à la dose de 1 à 2 cuillerées à café au petit déjeuner du matin.

Les enfants prennent très aisément la paillette de Coréïne, mélangée avec quelques cuillerées de bouillie (phosphatine, farines lactées..., banania...) ou mélangée avec un peu de lait, de potage, de purée ou de compote.

Quant aux nourrissons et aux bébés une pincée de paillettes dans une cuillerée à café de lait chaud.

Le **Granulé de Coréïne** se prend comme tous les granulés ; mettez directement dans la bouche par cuillerée à café la dose prescrite et avalez un peu de liquide après chaque prise.

La seule chose à éviter, c'est de laisser séjourner le granulé dans l'eau.

Bibliographie. — Pathologie gastro-intestinale, A. Mathieu et J.-C. Roux, etc.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET
8, Rue de la Source — PARIS (XVIe)
Téléphone : Aut. 11.86.

CRATÆGINE

A base de fleurs fraîches d'aubépine stabilisées (non toxique)

Propr. thérap. — Tonique et régulateur cardiovasculaire. Si elle ne peut être considérée comme un succédané de la digitale, elle maintient utilement l'action obtenue avec ce médicament cardiaque comme elle doit maintenir celle que l'on obtient avec l'ouabaïne. — **Vasodilatateur** Hypotenseur par action vasculaire périphérique.

Indic. thér. — Eréthisme cardiaque. Palpitations des nerveux et des neurasthéniques. Troubles congestifs de la ménopause. Tachycardie paroxystique essentielle. Goitre exophtalmique.

Doses et mode d'emploi. — XV à XX gouttes 2 ou 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée. — Dose maxima : XXX gouttes 3 fois par jour.

E. LEROUX, ex-interne des Hôpit. de Paris
Caudebec-lès-Elbœuf (Seine-Inférieure).

CRÈME RÉSOLUTIVE du Dr RAP

Composition. — Produit onctueux sans corps gras, à base de principes à action fortement vaso-constrictive et analgésique :

(Hamamelis, Arnica, Noix vomique, etc.)

Propriétés. — Calme la Phlébalgie, décongestionne, facilite la résorption des œdèmes.

Indications. — Varices, phlébites, insuffisances veineuses. Stase post-traumatique.

Mode d'emploi. — En massage matin et soir. S'il existe une contre-indication au massage, employer la « Friction Rap » en lotion ou en pulvérisation.

Laboratoire R. CAVAILLES
34, rue de Turi C – PARIS (VIIIe)

CREOLINE PEARSON

Après quarante ans d'existence la Creoline Pearson reste un antiseptique moderne. La Creoline Pearson donne avec l'eau une émulsion colloïdale ni toxique, ni caustique, ni oxydante, d'une grande puissance microbicide et antiparasitaire. Cette émulsion émet dans l'air un colloïde gazeux d'odeur agréable jouissant de propriétés antiseptiques et désodorisantes.

Présentation. — En flacon de verre de 60, 125, 500 et 1000 gr.

Indications. — Toutes désinfections et lavages antiseptiques en émulsion dans l'eau de 1 à 4 %. Traitement de la gale.

LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES WILLIAM PEARSON
5, rue Clauzel, Paris (IXe)

CRÉOSAL DUBOIS

Sirop, Comprimés, Solution.

Composition :

Le CRÉOSAL réunit dans sa composition le *Gaïacol*, *l'Acide Phosphorique* et le *Calcium* que la Thérapeutique a toujours associés.

Propriétés et indications thérapeutiques :

Recalcifiant puissant, antibacillaire, accélérateur de la nutrition. Employé avec succès dans : la Tuberculose pulmonaire, osseuse ou cutanée, les Bronchites aiguës ou chroniques, les Toux rebelles, le Lymphatisme, la Scrofule, le Rachitisme, etc., etc.

Laboratoires LALEUF
20, rue du Laos, PARIS (XV^e^)

CRÉOSOFORME LAMBIOTTE FRÈRES

Combinaison d'aldéhyde formique (4 %) et de créosote (96 %). Inodore, non toxique, puissamment antiseptique. Supérieur à l'iodoforme dans tous ses emplois.

Propriétés thérapeutiques. — Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'asepsie complète des plaies et leur rapide cicatrisation.

Indications. — Plaies, Ulcères, Brûlures, Engelures, Fistules, Tuberculoses chirurgicales, Dermites, Gynécologie, hémorroïdes et toutes autres affections anales, etc.

Mode d'emploi. — Existe sous quatre formes :

1° *Créosoforme-Poudre*, présenté en flacons poudreurs, pour saupoudrage des plaies.
2° *Créosoforme-Onguent*, présenté en tubes d'étain.
3° *Créosoforme-Ovules*, pour pansements gynécologiques.
4° *Créosoforme-Suppositoires*, 1 ou 2 par jour.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES
3, rue d'Edimbourg — PARIS (VIII^e^)
124, avenue Rogier, BRUXELLES

CRÉSOPIRINE
DE G. CARRIÈRE & E. GÉRARD

Acide Acétyl Crésotinique Ortho

Produit synthétique défini et pur.

Indications. — Traitement du rhumatisme aigu et chronique et de la douleur sous toutes ses formes.

Posologie. — *Douleurs rhumatismales, névralgies:* Prendre de 1 à 4 comprimés ou cachets dans la journée.

Insomnie: Le soir en se couchant, prendre 1 ou 2 comprimés ou cachets dans une tasse d'infusion de tilleul.

Rhumatisme articulaire aigu, fébrile: Se conformer à l'avis du médecin, qui, selon les cas, peut prescrire d'emblée 4 à 5 grammes par jour.

Grippe: 2 ou 4 comprimés ou cachets par jour.

Laboratoires STENE
4, place des Vosges — PARIS (IV^e^)

CRÉSYL JEYES

Le seul *Crésyl véritable.* Puissant désinfectant antiseptique ; le premier des *Crésols associés et saponifiés.*

Exiger du **« Jeyes »** pour éviter toute substitution.

Le *« Jeyes »* donne des émulsions stables et colloïdales qui enrobent les bactéries et les détruisent à coup sûr.

Dose antiseptique. — 1/2 pour 100 (une cuill. à café par litre d'eau).

Dose bactéricide. — 2 pour 100 (une cuill. à bouche par litre d'eau).

Livré en flacons de 150 et 250 grammes.
Désinfection et lavages antiseptiques.

CRÉSYL-JEYES

Echantillons et rapports scientifiques :
35, Rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV^e^)

CRISTOLAX WANDER

Nouvelle formule.

Huile de paraffine.....	50 p. 100
Extrait de malt.....	40 p. 100
Agar-Agar.....	10 p. 100

Le plus efficace parmi les laxatifs doux, sans action drastique.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Tous les cas de constipation : nourrissons, femmes en couches, vieillards, opérés, grabataires et personnes délicates en général.

Doses. — *Nourrissons :* 1 cuillerée à café 3-4 fois par jour dans le lait ou la bouillie. *Enfants :* 2 cuillerées à café 3-4 fois par jour. *Adultes :* 1 cuillerée à soupe 3-4 fois par jour aux repas, tel quel ou dissous dans un liquide.

Le résultat atteint, continuer un traitement à faible dose : 1 cuillerée à café ou à soupe aux repas principaux.

Etablissements WANDER
58, rue de Charonne — PARIS (XI[e])

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Constitution. — La *Cryogénine* est une semi-carbazide dont la formule est la suivante :

$C^7 H^8 Az^2 O$

Poudre cristalline blanche, inodore, presque insipide, peu soluble dans l'eau (2 p. 100 à 20°), soluble dans la glycérine (5 p. 100) et dans l'alcool 11,50 p. 100).

Propriétés. — La *Cryogénine* représente le médicament antipyrétique, analgésique type. Elle agit avec une égale sûreté contre les températures fébriles et contre les phénomènes douloureux.

Posologie. — De 0 gr. 50 à 4 gr. *pro die* chez l'adulte.

Formes. — Poudre ; Comprimés ; Cachets. En raison de fréquentes substitutions, causes d'échecs ou d'accidents, préférer les formes spécialisées. Comprimés et cachets, doses à 0 gr. 50 et 0 gr. 25 de cryogénine.

Produits spéciaux des
Laboratoires A. LUMIÈRE
M. SESTIER, Pharmacien
9, Cours de la Liberté — LYON

CRYPTARGOL LUMIÈRE

Argentothioglycérine Sulfonate de Sodium

renferme 35 % d'argent métallique

Il se présente sous forme d'une poudre jaune très soluble dans l'eau ; sa solution est neutre et ne noircit pas à la lumière.

A. — **Antisepsie GASTRO-INTESTINALE**

Le *Cryptargol Lumière* a donné comme antiseptique intestinal des résultats remarquables, infiniment supérieurs à ceux obtenus avec les autres méthodes utilisées jusqu'ici.

Mode d'Emploi et Doses :

Adultes. — Pilules : 4 à 6 par jour aux repas.
Enfants. — Sirop : 1 à 4 cuillerées à café par jour, selon l'âge.

B. — **GYNÉCOLOGIE**

Ovules au Cryptargol.
Pansement Gynécologique idéal.

Produits Spéciaux des Laboratoires A. LUMIÈRE
M. SESTIER, Pharmacien
9, Cours de la Liberté — LYON

CRYSIODAL

du Docteur Et. MAIGRE

Complexe organo-métallique à base d'or et d'iode

Indications. — Pré-tuberculose et tuberculose.

Présentation. — Deux sortes de solutions réparties en ampoules de 5 cc. :

1° Pour injections intraveineuses (7 gr. d'iode et 0 gr. 0545 d'or pour 100 cc.) ;

2° Pour injections intramusculaires (3 gr. 50 d'iode et 0 gr. 27 d'or pour 100 cc.).

Doses et mode d'emploi. — Deux séries au moins de 25 ou 30 injections, à raison de de deux injections par semaine, avec repos de un ou deux mois entre les séries.

LA BIOTHÉRAPIE
3, rue Maublanc — PARIS
Téléphone : Ségur 05-01

CUPRESSUS DAUSSE

(extrait fluide à poids égal)
succédané de l'Hamamélis

Vaso-constricteur décongestif et Hémostatique.

Indications. — Hémorragies viscérales ou utérines, hémoptysies, varices, hémorroïdes.

Posologie. — XXV à XXX gouttes, 5 à 6 fois dans le courant de la journée.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot, Paris (IV[e]).

CURALUÈS

Adopté dans les Hôpitaux de Paris, les Hôpitaux militaires, les Prisons de la Seine, le Ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, etc.

Forme. — Ampoules de 1 à 2 cc. contenant : 0 gr. 08 ; 0.16 de Bismuth métal.

Composition. — Suspension huileuse de carbonate de Bismuth.

Propriétés. — Très active, indolore, non toxique.

Indic. thérap. — Tous accid. syphilit.

Doses pour adultes. — 1 ou 2 inject. intramuscul. p. sem., suiv. teneur bismuth choisie par le médecin.

Pharmacie L. LECOQ et F. FERRAND
54, Chaussée d'Antin, PARIS (IX[e])

7

CURATINE BRUNET

Analgésique.
Spécifique de l'élément douleur.

Composition :

Pyrazoline : 0 gr. 50 ; phénacétine : 0 gr. 10 ; théine : 0 gr. 06 ; carbonate acide de sodium : 0 gr. 25 ; borate de soude : 0 gr 06 ; colorant inerte : traces.

Indications :

Grippe. Migraines. Névralgies diverses. Rhumatismes. Règles douloureuses. Algies dentaires, etc.

Posologie :

1 à 4 cachets par jour, de préférence loin des repas, pris à sec ou mieux dans un verre d'eau ou de tisane ; n'a pas de goût désagréable.

Se vend en boîtes de 1 cachet et boîtes de 6 cachets.

Laboratoire
de la CURATINE BRUNET
23, rue des Ecouffes, PARIS (4e).

CURATOXINE VENDEL

Médication anti-infectieuse par voie buccale.

Présentation et posologie. — 1° Granulé soluble : 2 cuillerées à dessert par jour. 2° Cachets : 2 par jour.

Formule. — *Urotrolithine* (0,25 par cuillerée à dessert) en combinaison *Benzo-Salicylés-Sodique*, *Iode combiné* (0,01 par cuil. à dessert) *Extraits* et *Sels* laxatifs et diurétiques Boldo, extrait hépatique, glycérophosphates.

Action. — Anti-toxique. Antiseptique, Emonctoriale " La Curatoxine élimine les toxines ".

Indications. — *Tous les états infectieux* aigus ou chroniques
Infection des voies biliaires, Ictères, Infections vésico-Pyélo-rénales, Maladies infectieuses.
Septicémies, Suppurations chroniques.
Dermatoses d'origine digestive : Acné, Furonculose. Urticaire. *Rhumatismes goutteux. Arthritisme.*

Laboratoires HOURQUET ET VIENNE
114, rue du Temple — PARIS (III°)

CUROXYURE

Traitement efficace des oxyures.

Forme. — Pommade en tube muni d'une canule en os.

Composition. — Acide thymique, naphtaline ; savon médicinal ; extraits d'absinthe et de tanaisie.

S'applique aussi bien aux enfants qu'aux grandes personnes *sans aucun danger.*

Laboratoire B. E. A.
Ch. BEHA, Pharmacien de 1re classe
BELFORT

CYANHERMINE

pour traitements antisyphilitiques

à base de Cyanure de mercure.

Ampoules pour injections intraveineuses pouvant être employées en injections intramusculaires.

Composition :

Cyanure de mercure (chimiquement pur)	0 gr. 01 cgr.
Arséniate de sodium	0 gr. 005 mill.
Sérum isotonique	2 cc.

Propriétés :

La Cyanhermine étant une solution à 1/200 en sérum isotonique réalise le maximum de tolérance. L'Arséniate de soude associé au mercure lutte contre l'anémie ou l'asthénie syphilitique.

Mode d'emploi :

Voie intraveineuse de préférence, et posologie habituelle du Cyanure de mercure.

La boîte de 12 ampoules : 10 fr.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération PARIS (XV^e^).

Tél. : Invalides 12-63.

CYTOBIASE

EXTRAIT OPOTHÉRAPIQUE
FOIES FRAIS DÉGRAISSÉS DE MORUE

Composition — Renferme sous un faible volume tous les éléments actifs des cellules hépatiques, **complètement dégraissées** du gadus morrhua (Éthers cholestériques, vitamines liposolubles. Acide morrhuique.) Sans goût désagréable. Digestion parfaite. Se prend en toutes saisons.

Formes pharmaceutiques :

Gouttes (20 gouttes représentant les éléments actifs de 2 verres d'huile de foie de morue) le flacon 10 fr.

Ampoules, la boîte 14 fr.

Indications thérapeutiques :

Affections des voies respiratoires.
Affections du système osseux.
Affections lymphatiques.

Tous les cas d'amaigrissement et de déchéance.

Posologie :

Gouttes : Enfants jusqu'à 7 ans, 8 à 10 gouttes.
De 7 à 15 ans, 12 à 20 gouttes.
Adultes, 25 à 30 gouttes.

A prendre 2 fois par jour avant les repas dans une gorgée de liquide quelconque.

Ampoules de 2 cc. inject. intra-trachéales : bacilloses pulmonaires. Ampoules 1 cc. injections sous-cutanées : bacilloses ganglionnaires et osseuses.

Laboratoires du CYTOBIASE
24, rue de Charenton — PARIS (XII^e^)
Reg. Comm. Seine : 49-513

CYTO-MANGANOL CORBIÈRE

Médication mangano-calcique arseniée.

Le CYTO-MANGANOL const tue la médication hypodermique la plus active dans les cas d'asthénie, les états de dénutrition, la convalescence des maladies infectieuses et les troubles endocriniens.

Indications. — Déminéralisation en général et en particulier : décalcification ; dénutrition ; asthénies ; surmenage ; amaigrissement ; adénopathies ; lymphatisme ; tuberculose.

Mode d'emploi. — En injection intramusculaire au niveau de la région fessière supérieure, en plein muscle.

Dose. — Une ampoule de 5 centicubes tous les jours ou tous les deux jours pour les adultes ; une ampoule de 2 centicubes pour les enfants.

Présentation. — En boîte de 12 ampoules : ampoules de cinq centicubes pour les adultes (CYTO-MANGANOL). Ampoules de deux centicubes pour les enfants (CYTO-MANGANOL infantile).

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE
27, rue, Desrenaudes, PARIS (XVII^e^)
Téléphone : Wagram 37-64

CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

Composition :

Cacodylate de soude chimiquement pur	*Trente centigr.*
Sulfate de strychnine	*Un milligram.*
Sérum isotonisant chloruré	*Cinq centicub.*

Mode d'emploi. — Une injection sous-cutanée ou intra-musculaire, tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, stimule l'activité cellulaire et accroît la résistance de l'organisme.

Indications. — Lymphatisme. Anémies. Tuberculose. Neurasthénie. Asthénie post-grippale. Convalescences.

Présentation. — Cyto-Sérum pour adultes 12 ampoules de 5 centicubes.
Cyto-Sérum infantile 12 ampoules de 2 centicubes.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE
27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e^)
Tél. : Wagram 37-64

CYTOTROPINES

Associations

lipoïdo - mono - métalliques.

Sn et **Ag** : ampoules et pilules.

Ag : traitement de la blennorragie, chronique (méthode de Tansard).

Laboratoires FOURNIER frères
26, Boulevard de l'Hôpital,
Paris.

DÉCLONAL

(Diéthylchloracétamide).

Hypnotique doux

Sans brome. Non barbiturique.

Indications. — *Insomnies* causées par le surmenage ou le souci des affaires. *Insomnies* dues aux états névropathiques légers (neurasthénie, mélancolie).

Avantages. — Le DÉCLONAL est un hypnotique doux, d'action et d'élimination rapide, de faible toxicité. Il est exempt des inconvénients justement reprochés aux hypnotiques puissants (dérivés barbituriques ou composés bromés).

Présentation. — Cachets à 0 gr. 25 (Boîte de 20).

Posologie. — 2 cachets dans une infusion chaude, au coucher, trois heures après le repas. Si nécessaire, 1 ou 2 autres cachets au cours de la nuit.

Laboratoire des Produits
USINES DU RHONE
21, Rue Jean-Goujon, PARIS (VIII[e])

DECORPA

Mucilage spécial contre la faim.

Mucilage pur, sans adjonction médicamenteuse, gonflant en milieu acide, indigestible, inassimilable, infermentescible ; " faux repas ", remplissant l'estomac (après gonflement), illusionnant le tube digestif, assurant ses fonctions mécanique, sécrétoire et éliminatoire ; ne nourrissant pas.

Action. — Supprime la sensation de faim. — Maintient l'équilibre du tube digestif. — Evite la constipation des hypoalimentés — Ne nourrit pas, mais rend tolérables les régimes de restriction alimentaire, même le jeûne complet.

Indications. — Adjuvant indispensable de toutes les cures de régime avec restriction alimentaire prescrites chez : *Obèses, Hypertendus, Pléthoriques, Urémiques, Uricémiques, Artério-Scléreux, Boulimiques, etc.*

Doses. — 2 à 3 cuillerées à café, 1 heure avant le repas (pour que le sujet se mette à table sans appétit), ou quand la faim se fait sentir.

Laboratoires NORGAN.
Pierre ALEXANDRE, Pharmacien
41, rue de Rome, Paris (VIII[e]). Tél. : Lab. 08-00.

DÉPURATIF KROMELINCK

Essence de salsepareille rouge composée et concentrée

Indications. — Artério-sclérose et toutes affections de l'appareil circulatoire. Affections du tube digestif productrices de toxines. Obésité.

Posologie. — 3 cuillerées à soupe (pur ou dilué dans une eau légère), par jour, pendant un mois.

Salsepareille rouge iodurée du Docteur Kromelinck

Recommandée pour le traitement des spécifiques.

Mêmes indications. — Même posologie.

Laboratoires BELIERES
19, Rue Drouot. — PARIS (IX^{e})

DÉPURIODE

du Dr Roger Weber

Dépuratif diurétique, ioduré, sans sucre ni alcool.
Une cuillerée à soupe contient
0 gr. 25 d'iodure de potassium.

Formule. — Extraits de bardane stabilisée, de fumeterre, de patience, de salsepareille, de pensée sauvage, de guaco, de stigmates de maïs, de noyer stabilisée, aa 2 gr. Réglisse : 5 gr. Iodure de potassium : 16 gr. 70. Benzoate de soude : 10 gr. Glycérine : 50 gr. Eau q. s. p. 1000 cmc.

Indications. — Furonculose, clous, anthrax, orgelets, éruptions, boutons, rougeurs, eczémas, impétigo, gourme, dartres, herpès, aphtes, scorbut, acné, psoriaris, urticaire, démangeaisons, dermatoses,
Arthristime, uricémie, rhumatisme chronique, goutte, douleurs, névralgies, lumbago, sciatique, obésité,
Artériosclérose, athérome, hypertension, étourdissement, vertiges, mouches volantes, bourdonnements, céphalée, troubles cérébraux, pouls fort et tendu, signe de la temporale, crampes musculaires, refroidissement et engourdissement des extrémités, sensation de doigt mort, congestion, couperose, âge critique, scléroses, myocardite chronique, aortite, asthme cardiaque, angine de poitrine, bronchite chronique, emphysème, asthme, cirrhoses, ictère spécifique, néphrite interstitielle, albuminerie spécifique, oligurie, myélites, tabès, névrites, paralysies, infections et intoxications, spécificité, bacillose, lymphatisme, scrofule, adénites, mycoses, actinomycose, alcoolisme, tabagisme, saturnisme, grippe, goître, abcès, suppurations, etc.

Mode d'emploi et posologie. — 20 jours par mois, au milieu de chacun des deux principaux repas, dans un demi-verre d'eau.

Adultes : (dose moyenne), 1 cuillerée à soupe. Contre actériosclérose et hypertension 1 cuillerée à dessert.

Enfants : au-dessus de 5 ans : (dose moyenne), 1 cuillerée à café.

Prix du flacon : 18 francs.

Laboratoire du DÉPURIODE
61, rue de Seine — PARIS (VIe)
Téléphone : Littré 47-76.
ANGELINI, Pharmacien

DERMO-PLASTOL DUMESNIL

(Plastols Dumesnil)

Forme avec le *Zébo-Plastol* et le *Crémo-Plastol* le groupe des Plastols Dumesnil, pâtes poreuses composées, très homogènes et destinées à être appliquées sur la peau, à la manière des pommades, dans toutes les dermatoses et dont le type est l'eczéma sous toutes ses formes.

Propriétés. — Le Dermo-Plastol calme immédiatement les démangeaisons et assure la réparation intégrale des tissus malades.

Indications. — *Les Plastols* peuvent être appliqués sur toutes les parties du corps ou des membres; eczémas de la vulve ou du rectum, psoriasis, parakératoses psoriasiformes de Brocq, eczémas séborrhéiques de Unna, prurits avec lichénification et eczématisation, pityriasis, impétigo, prurigo, etc.

Laboratoires DUMESNIL
10, Rue du Plâtre — PARIS

DÉSENSIBILYSINE

Traitement de l'asthme et de l'emphysème.
(Méthode du Dr Paul Cantonnet).

Traitement principal d'attaque :

Soluté de polypeptone iodée et de chlorure de calcium jaborandique injectable.

Traitements adjuvants et de maintien :

1° Pulvérisations huileuses (aerol, trachéol).
2° Pilules de Pilochlorine.

Traitement forme bronchitique :

Stock-vaccin bronchitique Beauvy-Cantonnet.

LABORATOIRES BÉLIÈRES
19, rue Drouot, Paris (IXe).

DIABÉTIFUGE

Spécialité synthétique antidiabétique à base de bioxyde de manganèse, de bicarbonate de soude, de chlorhydro-méthylarsinate de lithine, d'antipyrine, de nitrate d'urane et de santonine.

Médication complémentaire de l'Insuline.

Doses. — 1 cachet, le matin et l'après-midi, avec un demi-verre d'eau minérale, Pougues de préférence. Continuer pendant 10 jours : diminuer s'il y a lieu, après analyse du sucre ; cesser au bout de 20 jours. Repos de 20 jours et reprendre.

Laboratoire des Produits SCIENTIA
Dr E. PERRAUDIN, pharmacien,
21, rue Chaptal — PARIS

DIACHUSINE

(Traitement externe des néoplasmes)

1° **Vernis à la Diachusine arsénicale.** — S'adresse aux **cancroïdes** en général, surtout aux petits cancroïdes de la face. Ne doit pas être employé sur des tumeurs à surface plus étendue qu'une pièce de 2 fr. environ.

Mode d'emploi. — Détergez l'ulcération de ses croûtes à l'aide de compresses humides, séchez avec un tampon d'ouate hydrophile, puis passez le vernis avec un pinceau.

2° **Poudre de Diachusine.** — S'emploie lorsque la surface ulcérée atteint ou dépasse la grandeur d'une pièce de cinq francs.

Mode d'emploi. — Saupoudrer quotidiennement les cancers ulcérés après appropriation et assèchement.

LABORATOIRES A. LEJEUNE
12, rue Emilio-Castelar. — Paris (XIIe)

DIADERMINE

Excipient pour Pommades.

Définition. — La Diadermine est un savon mou à la glycérine, sans odeur, onctueux, parfaitement homogène, inaltérable, absolument neutre, soluble dans l'eau, et pénétrant très rapidement à travers l'épiderme.

Indications. — La Diadermine doit être substituée à la vaseline, à l'axonge et à la lanoline, dans la confection des pommades médicamenteuses, servir pour les massages, touchers, (n'abime pas les gants), etc., être recommandée comme crème de toilette parfaite, pour les épidermes les plus délicats.

BONETTI Frères

12, rue Vavin — PARIS (VI[e])

DIALACETINE CIBA

Sédatif, Antipyrétique, Analgésique

Diallylmalonylurée, plus éther allylique du paracétaminophénol. Action sédative, analgésique et antipyrétique permettant d'instituer une thérapeutique efficace et sûre dans l'ensemble des cas où l'irritabilité nerveuse compte parmi les symptômes dominants.

Indications. — Agitation et délire au cours des maladies aiguës. Epilepsie, Hystérie, Névroses diverses. Angine de poitrine, Névralgies, lumbago, Insomnie des tuberculeux.

Doses. — Dose sédative : 1 à 3 comprimés par 24 heures par 1/2 ou 1 comprimé, avec intervalle de 2 à 5 heures. Dose hypnotique et analgésique. 1/2 à 2 comprimés au maximum.

Le tube de 15 comprimés : 13 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

DIAL CIBA

Hypnotique anti-nerveux

Diallylmalonylurée. Hypnotique actif et rapidement éliminé, d'où réveil normal, non suivi d'hébétude. Procure un sommeil calme et réparateur et, à dose modérée, n'a jamais d'action nocive, son usage étant même prolongé.

Indicat. — Insomnie nerveuse en général et chez les agités, les émotifs, les surmenés. États démentiels.

Trois formes : Comprimés, Gouttes et Ampoules (Dial soluble).

Doses. — 1 ou 2 comprimés au coucher pour les insomnies du soir, au réveil pour celles du cours de la nuit. Adultes : 1 à 2 comprimés, XXX à LX gouttes, 1 ou 2 ampoules.

Prix : le tube de 12 comprimés, 8 frs. — Le flacon Dial Soluble 11 francs. — La boîte de 5 ampoules, 10 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, place Morand — LYON

DIALYL

Dissolvant urique

Médicament-type de l'arthritique et du rhumatisant.

Indications. — Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Sciatique. Névralgies, Migraines, Lumbago, Gravelle. Calculs, Coliques néphrétiques et hépatiques, Dermatoses, Surmenage physique ou intellectuel.

Forme. — Granulé effervescent.

Posologie. — Deux cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans un peu d'eau, entre les principaux repas. — Dans les crises aiguës, 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 11 fr. le flacon.

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT
16, Rue de Boulainvilliers — PARIS
Téléphone : Auteuil 20-21.

DIASCLÉROL

Composition. — Association Sédobenzyl (C^6H) CH^1 SO^4 K) (antispasmodique, hypotenseur, hydrate de pipérazine et salicylate de lithine en milieu citraté.

Indications. — Diathèse urique, Hypertension, Artério-sclérose, Arthritisme, Goutte. Gravelle. Rhumatisme, Coliques hépatiques et néphrétiques, Obésité, Diabète.

Dose et mode d'emploi. — Granulé effervescent, 3 à 6 cuil. à café par jour, dans un peu d'eau, quelques minutes avant les repas.

Le **DIASCLÉROL** n'étant pas toxique son emploi peut être prolongé.

LABORATOIRE ODILIA

E. LACOMBE, pharmacien,

2, Rue Neuve-Popincourt — PARIS (XI^e).

DIASES PROGIL

Composition. — Farines fraîches diastasées de céréales et de légumineuses renfermant toutes leurs vitamines.

Propriétés. — Elles réduisent au minimum le volume alimentaire à absorber. Grâce à une prédigestion s'opérant pendant la cuisson, elles permettent l'obtention de bouillies très concentrées possédant une agréable fluidité.

Sans aucun surmenage des organes digestifs, elles assurent une suralimentation rationnelle.

Indications. — Nourrissons (particulièrement au moment difficile du sevrage), Enfants, Malades, Convalescents, Vieillards. Tous les malades à régime : Cardiaques brightiques, Rhumatisants, Dyspeptiques, Tuberculeux. Cachectiques.

Mode d'emploi. — Délayer parfaitement et à froid, 3 cuillerées à soupe (soit 50 grammes environ) de Diase dans environ 10 à 15 cuillerées à soupe d'eau, de bouillon de légumes ou de viande. Chauffer à *feu très doux*, en remuant ; la préparation s'épaissit d'abord, puis s'éclaircit. Elle est prête alors à recevoir tous les condiments (sel, beurre, épices) qu'on désire lui ajouter, selon les recettes culinaires pour Diases dont une brochure spéciale est jointe à chaque boîte.

Nomenclature.

DIASE CACAO : Déjeûners et goûters pour adultes et enfants.

DIASE CÉRÉALE : Bouillies très fluides pour bébés au biberon, enfants et adultes délicats.

DIASE LÉGUMINEUSE : Potages excellents, instantanés.

PROGIL

Société anonyme au capital de 50,000.000 de francs

6, Boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e^)

10, Quai de Serin — LYON (IV^e^)

DIASTOGÈNE DEHAUSSY

Reconstituant puissant en même temps qu'agent dépuratif.

Composition et propriétés. — Par ses **Arsines,** stimule puissamment la nutrition.

Par sa **Nucléine Manganésifère,** favorise la réfection du sang et du système nerveux et accélère les oxydations ralenties par la maladie.

Par sa **Kola fraîche stabilisée,** agit comme un tonique cardiaque précieux et comme un diurétique éliminant les déchets mal oxydés et les toxines.

Indications thérapeutiques. — Tous les états de déchéance organique ; chaque fois qu'il faut stimuler puissamment un organisme affaibli, incapable de revenir par lui-même à un meilleur état de nutrition. Très utile médication préparatoire à la cure de reminéralisation.

Posologie et mode d'emploi. — Diastogène élixir (forme la plus active et la plus agréable), légèrement alcoolisée. Adultes : 2 verres liqueur par jour, pur ou dans un peu d'eau.

Diastogène granulé (Dyspeptiques et Entérites) : Enfants : 2 ans : 1 cuillerée à café par jour ; 4 ans : 2 cuillerées à café ; 8 ans : 3 cuillerées à café ; 12 ans : 4 cuillerées à café ; 16 ans et au-dessus : 6 cuillerée à café par jour.

Diastogène compris (p. diabétiques) : 6 par jour.

Laboratoires E. DEHAUSSY
66, rue Nationale — LILLE (Nord).

DICALIODE

Complexe colloïdal d'iode

Médicament de choix pour l'administration de doses massives d'*iode libre*.

Composition et forme. — Suspension aqueuse titrant 4 % d'iode total dont 3 % d'*iode libre*, *métallique*, en petits grains.

Avantages. — Beaucoup plus rapidement qu'avec la teinture d'iode, on peut arriver à des doses importantes d'*iode* libre (0,50 à 1 gr. par jour). On institue pour cela une posologie par progression arithmétique.

Mode d'emploi. — Prescrire toujours le dicaliode en cc. (une mesure graduée accompagne chaque flacon) et *dans du lait froid* (de préférence avant les repas).

Indications. — *Dicaliode à petites doses* : 1 à 2 cc. par jour. Goitre. *Enfants* : perte d'appétit, glanglions, grosses amygdales, rachitisme.

Dicaliode à doses moyennes : 2 à 5 cc. par jour. Affections du *cœur* et des *vaisseaux*, de l'*appareil respiratoire* (bronchite, bronchite chronique, asthme, emphysème, coqueluche, tuberculose). *Affections de la peau* : eczéma, psoriasis.

Dicaliode à hautes doses : 10 à 30 cc. par jour. Tuberculoses localisées, adénites, ostéites, iritis, rhumatisme chronique, mycoses, septicémies, syphilis tertiaire.

Labres MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVIe)

A Bruxelles : LE MARINEL, pharmacien
46, rue du Trône.

DIDIAL CIBA

Hypnotique analgésique

Diallylmalonylurée et diallylmalonylurate d'éthylmorphine, chaque comprimé étant formé de 0 gr. 075 de Dial pur, plus 0 gr. 025 de diallylmalonylurate. Pouvoir narcotique plus prononcé que le Dial, et action nettement analgésique, d'où indication toutes les fois que l'insomnie est sous la dépendance de la douleur.

Indic. — Toutes les insomnies relevant de la douleur : névralgies, traumatismes, tabes, cancers, etc. Agitation maniaque, excitation psychique. Calmant pré et post-anesthésique.

Doses. — 1 à 3 comprimés à 0 gr. 10 par jour, à prendre le soir dans les cas d'insomnie dûe à la douleur; par doses réfractées, aux repas dans les autres cas.

Le tube de 12 comprimés : 14 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

DIENOL

Indications. — Broncho-pneumonie, Infections septicémiques.

Composition. — Métaux colloïdaux, Fe Mn, obtenus par électrolyse.

Forme. — Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 6 ampoules.

Mode d'emploi. — *Adultes :* Une ampoule par jour, en injection hypodermique indolente ou intra-veineuse.

Très jeunes enfants. — Une demi-ampoule de 10 cc. par jour (soit 5 cc.). On peut aussi employer la voie rectale : le contenu d'une ampoule de 10 cc. additionné d'une quantité égale d'eau tiède est administré par voie rectale deux fois par jour. Mais l'injection hypodermique reste, cependant, le moyen le plus rapide et le plus sûr.

J. DEPRUNEAUX,

Pharmacien de 1re classe

18, rue de Beaune et 31, rue de Verneuil
PARIS (VIIe).

DIGALÈNE "ROCHE"

Digitale injectable

Tous les principes actifs de la macération de feuilles fraîches de digitale solubilisés et injectables.

Posologie et mode d'emploi :
Ampoules, Solution, Comprimés.

1 cc., ou XXX gouttes, ou 2 comprimés = 0,15 cgr. poudre feuilles de digitale.

Doses très faibles ou d'entretien cardiotonique :

Adultes : XX gouttes. — Enfants : I à X gouttes (voies buccale ou rectale).

Doses faibles ou sédatives :

Adultes : XXX à LX gouttes (voies buccale ou rectale) : 2 à 4 comprimés (voie buccale) ; 1 à 2 cc. (voie intramusculaire indolore). — Enfants : V à XV gouttes, selon l'âge.

Doses fortes ou antiasystoliques :

Adultes : XC à CLXXX gouttes (voies buccale ou rectale) ; 3 à 6 cc. (voies intramusculaire ou *endoveineuse*). — Enfants : V à XX gouttes et même 1 à 2 cc. *(cas désespérés)*.

Prop. Thér. — Action très rapide, tolérance parfaite, pas d'accumulation.

Indic. Thér. — Chaque fois que le cœur faiblit.

Produits
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
21, Place des Vosges — PARIS

DIGIBAÏNE

Complexe tonicardiaque
Association digitaline-ouabaïne

Présentation et posologie. — 1° *Voie buccale.* — Solution glycéro-alcoolique titrée de telle sorte que XV gouttes = 1/10 millig. digitaline crist. pure + 2/10 millig. ouabaïne crist. pure.
Doses faibles (cures prolongées d'entretien) X à XV gouttes par jour.
Doses moyennes : XXX gouttes par jour en 2 fois (pendant 6 à 7 jours).
Doses fortes : XL à L gouttes par jour en 3 fois (pendant 4 ou 5 jours).
2° *Voie intraveineuse.* (Méthode exceptionnelle.) Ampoules titrées à XV gouttes de solution par cc. 1 cc. par injection et par jour pendant 6 à 7 jours.

Indications. — En général toutes celles des préparations digitaliques. Action plus sûre, plus rapide et plus durable. Tolérance parfaite. Agit là où tous les autres tonicardiaques ont échoué.

Laboratoires DEGLAUDE
6, rue d'Assas, Paris (6e) Tél. : Littré 31-85
Belgique : *Agent général :* **L. Prunières**
19, rue Louis-Hap. — BRUXELLES

DIGIFOLINE CIBA

Préparation digitalique totale contenant, sous une forme optima, l'ensemble des glucosides cardio-actifs de la feuille de digitale. *Stable, d'action constante, toujours bien tolérée, rigoureusement dosée.*

Indic. — Celles de la digitaline et de la digitale, par voie buccale, hypodermique et intraveineuse. Plus spécialement lorsque le foie est gros (ampoules) et lorsqu'il y a lieu de stimuler la diurèse.

Posologie. — Celle de la poudre de feuille de digitale, à laquelle elle correspond poids pour poids.

Formes pharm. — Comprimés de 10 cgr. = 10 cgr. poudre de feuilles. — Ampoules de 1 cm³ = 10 cgr. poudre de feuille.
Le tube de 25 comprimés, 14 francs.
La boîte de 5 ampoules, 15 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, Place Morand — LYON

DIGIMIALBAÏNE

Composition :

L gouttes contiennent :

1/3 de mmgr. de digitaline Mialhe,
2/3 de mmgr. d'ouabaïne Mialhe.

Posologie :

Cardiotonique. — X à XV gouttes par 24 heures.

Sédatif. — XXX gouttes, 2 fois par 24 heures, pendant 7 jours.

Antisystolique. — XL à L gouttes, 2 fois par 24 heures, pendant 5 jours.

Pharmacie du Dr MIALHE
8, rue Favart — PARIS

DIGITALINE CRISTALLISÉE

MIALHE-PETIT

La plus fidèle
de toutes les préparations de digitale.

Titrage chimique rigoureux.

1 cc. = 50 gouttes = 0.001 digitaline cristallisée.

Effets thérapeutiques toujours identiques à eux-mêmes.

Effets physiologiques constants et contrôlés.

(*Employée dans les hôpitaux depuis 1889*).

Dose. — Cardiotonique : 3 à 4 gouttes par jour. — Sédatif : 5 à 10 gouttes. — Antiasystolique jusqu'à 50 gouttes dans les 24 heures.

Pharmacie du Docteur MIALHE
8, rue Favart — PARIS

DIGITALINE INVAR

Produit soumis au contrôle physiologique le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action :

Toni-cardiaque, régularise et stimule les contractions cardiaques, diurétique cardio-vasculaire.

Indications :

Insuffisance aortique, rétrécissement mitral, affections pulmonaires, œdème, hydropisie.

Formes :

Ampoules 1 c. c. au 1/10, boîtes de 6 et 12. Granules roses au 1/10, flacons de 50. Solution au 1/1000, flacons 10 c. c. et 5 c. c.

Pharmacie Centrale
des Pharmaciens de France
21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IVe)

DIGITALINE NATIVELLE

Prix Orfila — Prix Desportes
Décernés par *l'Académie de Médecine* de Paris.

La Digitaline Nativelle agit plus sûrement que toutes les autres préparations de Digitale. Elle est employée dans tous les Hôpitaux de Paris.

Indications. — 1° Asystolie ; 2° Insuffisance cardiaque ; 3° Troubles du rythme cardiaque ;

Formes. — *Granules* au 1/10 et au 1/4 de mill. — *Solution* au 1/1000. — *Ampoules* au 1/10 et au 1/4 de mill.

Ampoules au 1/5 de mil. pour injection intra-veineuse.

Spécifier sur les ordonnances : Granules, Solution ou Ampoules **Nativelle**

Échantillons :

Laboratoire NATIVELLE
49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

DIORADIN

Combinaison radio-active
Médication antibacillaire

Composition. — Sels d'iode, camphre mentholé, terpènes et Bromure de Radium.
Présentation. — Ampoules de 1 cc. 12 ampoules.
Propr. — Bactéricide, exaltant la phagocytose.
Indic. — Tuberculose. Tous états infectieux.
Mode d'emploi et doses. — En injections intra-musculaires ou sous-cutanées, région supérieure du bras et de préférence dans la région musculaire des fesses. — On injectera aux adultes une ampoule de 1 cc. et aux enfants au-dessous de 10 ans 1/2 ampoule de 1/2 cc. 30 injections quotidiennes consécutives ; continuer jusqu'à la 40e, avec une injection tous les deux jours. On peut recommencer une seconde série après un intervalle de 15 jours à 3 semaines.

La boîte de 12 ampoules : **22** francs.

Laboratoires CAILLAUD
37, rue de la Fédération — PARIS (XVe)
Téléphone : Invalides 12-63

DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés Fluo-Nitrités renfermant les Glycérophosphate et Formiate Sodiques associés à la Caféine).

Mode de Présentation. — Présentée sous forme de pastilles comprimées pesant chacune 0,25 cgr.

Mode d'action. — La " Dioséine Prunier" diminue la tension artérielle et régularise la circulation du sang.

Indications. — Artériosclérose, Dilatations veineuses, Menstruations difficiles, Troubles de la ménopause.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour, à prendre en deux fois, matin et soir, en les accompagnant d'une gorgée de liquide.

Chassaing, Le Coq & Cie
(Anc. Mson Chassaing-Prunier)

6, Rue de la Tâcherie — PARIS

DIURÉDAUSSE

(Extrait de Pyrole)

Puissant diurétique végétal, non toxique, extrait de la *Pyrola Umbellata*.

N'occasionne jamais de troubles digestifs, ni de céphalée.

Indications. — *Mal de Bright, néphrites aiguës, néphrite syphilitique, néphrite des calculeux et des prostatiques, oligurie des maladies infectieuses, hypertension artérielle.*

Posologie. — ADULTES : XXX à XL gouttes à prendre en deux fois, dans un peu d'eau sucrée ou sur un morceau de sucre, avant les repas de midi et du soir.

ENFANTS : II gouttes par jour et par année d'âge.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e^).

DIURÈNE

(Extrait total d'adonis vernalis)

Formes. — Liquide. — Pilules.

Prop. Thér. — Tonique cardiaque et diurétique azoturique. Adjuvant inoffensif de la digitale, agit rapidement sans accumulation et sans augmenter la tension artérielle.

Indications. — Indiqué dans tous les cas d'arythmie, d'asystolie, d'œdème, dans toutes les affections du foie, néphrites, artério-sclérose.

Posologie. — 2 à 6 cuill. à café ou 4 à 12 pilules par 24 heures.

Laboratoires CARTERET

15, Rue d'Argenteuil — PARIS

DIUROCALCINE GROS

Composition. — Salicylate de Calcium et de Théobromine.

Indication. — Diurétique cardio-rénal.

Forme. — Comprimés dosés à 0 gr. 50.

Propriétés. — 1° Action diurétique de la Théobromine exaltée par la présence du radical salicylique;
2° Tonique du Myocarde par l'ion Calcium.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour.

Laboratoires GROS
13, Place Delille
CLERMONT-FERRAND

DI-UROIODINE

Composition.

La « DI-UROIODINE » ou iodo-éthylate d'hexaméthylène tétramine est une combinaison organique contenant 48 % **d'urotropine** rigoureusement titrée, associée au benzoate de lithine et à la formine libre.

Propriétés.

Action oxydante, stimulante, bactéricide et antitoxique.
Dissolvant de l'acide urique.
Pouvoir antiseptique remarquable sur le bacille d'Eberth, sur le colibacille, sur le streptocoque et le pneumocoque ; se retrouve après 40 minutes dans le liquide céphalo-rachidien.
Antipyrétique chez les bacillaires.

Indications.

Septicémies de tous genres : Grippe. Pneumonie. Broncho-pneumonie. Fièvre typhoïde. Fièvres éruptives graves. Infections puerpérales. Arthrites infectieuses. Méningites. Erysipèle. Encéphalite épidémique et ses séquelles. Pyélonéphrites, etc...

Forme.

Ampoules de 3 cc. 3/4.

Posologie.

Une à deux ampoules par jour, en injections intramusculaires ou mieux en injections intraveineuses.

(Une boîte est envoyée gracieusement à MM. les Docteurs qui en font la demande.)

Laboratoire de l'UROIODINE
45, boulevard Lafayette — CALAIS

DOLOMA

Professeurs Dubard et Voisenet, de Dijon

Composition. — Carbono-Fluophosphate-Magnésien-Mangano-Calcique.

Formes. — Poudre et granulé.

Propriétés. — Antidyspeptique. Spécifique des états hyperacides, reconstituant puissant des réserves minérales.

Indications. — Dyspepsies. Entérites chroniques. Tous états déminéralisants et leurs conséquences : *Cancer et Tuberculose.*

Cure antidyspeptique. — Entre et loin des repas. *Doloma*, 2 à 3 sachets de poudre, ou 2 à 3 cuillerées à café de granulé.

Cures reminéralisantes, simple ou intensive. — Voir fiche *Œnophos.*

DOLOMA INJECTABLE

Composition. — Citrophosphite Magnésien. Mangano-calcique. Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. sans toxiques. Injections hypodermiques indolores.

Propriétés. — Névrosthénique idéal. Agent le plus actif de reconstitution des réserves minérales : Ph. Mg. Ca., de la cellule nerveuse.

Indications. — Épuisement du système nerveux déminéralisation phospho-terreuse. Prétuberculose, Cancer, Prophylaxie de la récidive post-opératoire. 1 à 2 ampoules de 2 cc. ou 1 ampoule de 5 cc. par jour, par période de 10 jours.

Prix.

La boîte de poudre *Doloma*.....	**12.**
» granulé »	**13.50**
» 10 ampoules *Doloma*....	**13.50**

Communications : à l'Académie de Médecine, avril 1918 ; à la Société française pour l'étude du cancer juin 1919 — décembre 1920 ; Concours médical, mars 1920 ; Journal des Praticiens, mai 1920, etc., etc.

Littérature et échantillons sur demande à

Laboratoire général d'Études Biologiques

S. A., 29, Place Bossuet — DIJON

DOLYSINE

Goutte, Rhumatismes, Névralgies.

1° Cachets. — Acide phénylcinchoninique en cachets dosés à 0 gr. 50.

Propriétés thérapeutiques :

Puissant dissolvant de l'acide urique.

Doses :

1 à 4 gr. par vingt-quatre heures, puis doses décroissantes. Ni intolérance, ni accoutumance.

Mode d'emploi :

Aux repas ou en même temps qu'une boisson alcaline.

2° Liniment. — Chloral-chloroforme-menthol, éther amyl-salicylique en solution éthérée aromatisée, odeur agréable.

Mode d'emploi :

Badigeonnages suivis d'enveloppement.

M. ROCHEREAU, pharmacien, ancien interne des hôpitaux de Paris. SALBRIS (L.-et-C.).

DRAGÉES BENGUÉ AU MENTHOL

Composition. — Menthol cocaïne et borate de soude ou menthol-borate de soude (sans cocaïne).

Indications. — Affections de la gorge, pharyngites, laryngites, angines, faiblesse de la voix, antisepsie de la bouche.

Mode d'emploi. — 8 à 10 dragées par jour. Laisser fondre dans la bouche.

Docteur BENGUÉ

pharmacien

46, Rue Ballu — PARIS (IX°)

DRAGÉES ELKIN

GRANULES ELKIN

Bile, soufre, pancréatine
(sans aucun drastique)

Composition des dragées

Chaque dragée renferme :
0,05 de bile, 0,05 de soufre, 0,05 de pancréatine.

Composition des granules

Chaque granule renferme :
0,001 milligr. de bile, 0,001 de soufre, 0,001 de pancréatine.

Indications :

1. **Dermatoses d'origine gastro-hépato-intestinales :** acné, eczémas, dartres, furonculoses, anthrax, etc.
2. **Insuffisances digestives, hépatiques et pancréatiques fonctionnelles ou lésionnelles : embarras gastriques :** constipation, diarrhées entérites, gastro-entérites, etc. (Désodorisant des selles fétides.) Arthritisme, artériosclérose.
3. **Affections dues à toutes intoxications :** urticaire, érythèmes, migraines, céphalées, malaises divers.
4. **Affections gastriques dues à des troubles de fonctionnement du réflexe pylorique :** digestions lentes, évacuations gastriques retardées, somnolence après les repas, fermentations intestinales et, en général, tous troubles des sécrétions gastro-intestinales, etc.

Mode d'emploi :

Pour les adultes. Pilules dragéifiées solubles dans l'estomac. Une ou deux dragées pendant ou après les repas avaler sans croquer).

Pour les enfants. Granules dragéifiées solubles dans l'estomac. 20 à 30 granules par repas (à prendre dans un dessert : compotes, confitures etc.)

Laboratoires DEPRUNEAUX
18, rue du Beaune — PARIS (VII[e]).

DRAGÉES DU Dr GELINEAU

Composition :

Bromure de potassium associé à l'arsenic et à la Picrotoxine.

Indications thérapeutiques.

Epilepsie. Affections nerveuses.

Posologie :

De 2 à 6 dragées par jour au milieu des repas.

Littérature et échantillons sur demande

Laboratoire J. MOUSNIER

à SCEAUX (Seine) près PARIS

DRAGÉES HECQUET

(Sesqui-Bromure de Fer)

Propriétés. — Associent les qualités antispasmodiques du brome et l'action hématopoiétique du fer sous la forme d'un sel très assimilable ne produisant jamais de troubles digestifs ou intestinaux. Le seul ferrugineux qui réponde à cette indication :

Calmer sans affaiblir.

Reconstituer sans exciter.

Indications. — Chloro-Anémie, Nervosisme.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour.
(Se fait également sous forme de " Sirop ".)

Laboratoire MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

DRAGÉES LE BRUN TONI-CARDIAQUES

Composition.

Strophantus.....	0.01	pour	une dragée
Spartéine.....	0.01	—	—
Caféine.....	0.06	—	—
Ext. de Scille.....	0.04	—	—

Propr. thérap. — Cardiotonique, sédatif de la dyspnée cardiaque. Régulatrices et renforçatrices, elles tonifient le myocarde et activent la diurèse.

Indications. — Insuffisance cardiaque. Asystolie, Maladies mitrales. Œdèmes cardiaques, Myocardites.

Posologie. — 4 à 6 dragées par jour, en 2 prises, soit au début, soit entre les repas.

Le flacon de 50 dragées : 12 francs.

Laboratoire LEBRUN

155, boulevard de Magenta — PARIS (IX[e])

DRAGÉES NÉVROSTHÉNIQUES "YSE"

à base de Phosphure de Zinc (2 milligr. par dragée) Nux vomica - Kola - Guarana.

Indications et propriétés thérapeutiques. — Spécifique de la Neurasthénie, *du surmenage intellectuel, des dépressions physique, cérébrale* et des états adynamiques et asthéniques.

Mode d'emploi (sauf avis du médecin). — Six dragées par jour : deux avant chacun des trois principaux repas.

Les dragées névrosthéniques "Yse" *se font sans sucre* pour les diabétiques. *Formule B.*

Laboratoire « YSE »

H. Chatelut, pharmacien

65, Rue Louis-Blanc — PARIS (X[e])

DRAGÉES PULMONAIRES GIRY

Pour adultes :

Traitement spécifique de la *Bronchite chronique* et des catarrhes rebelles des Bronches et du Poumon.

Composition. — Ail. Tehragaïacolate de Calcium. Grindelia Lobelie, etc.

Propriétés. — Profond modificateur et moderateur des sécrétions bronchiques.
Puissant antiseptique des Bronches et du Poumon. Sédatif de la Toux. Antidyspnéique.

Indications. — Toux. Catarrhes rebelles.

Traitement spécifique des Bronchites chroniques compliquées ou non d'asthme ou d'emphysème.
Tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 5 dragées par jour au début des repas.

Jeunes gens de 12 à 16 ans : 3 à 4 dragées par jour.

Laboratoire GIRY
49, rue de Metz — NANCY

DRYCO, LAIT SEC

Activé anti-rachitiquement par les rayons ultra-violets.

Analyse approximative :

Matières grasses	12 %
Sucre de lait	46 %
Protéine	32 %
Sels	7 %
Eau	3 %

Indications. — Lait spécial pour nourrissons ; digestibilité et assimilation parfaites ; supprime vomissements et troubles intestinaux.

Doses. — *Nourrissons :* sur indication du médecin (dose de base, 2 cuillerées à soupe nivelées pour 90 gr. d'eau) ; sucre comme pour le lait de vache ordinaire.

Adultes : régime de suralimentation ; affections du foie et de l'estomac.

Préparer sans cuisson.

R. DUHAMEL.
3, rue Saint-Roch, Paris.

DYSPEPTINE HEPP

Suc Gastrique physiologique pur,
extrait de porc vivant.
Procédé du Docteur HEPP
Ancien Interne en Chirurgie des Hôpitaux de Paris.

Indications. — Hypopepsie. Dilatation, Gastrites chroniques, Dyspepsie nerveuse, Anorexie des tuberculeux et convalescents, Diarrhées, Entérites tropicales, Gastro-entérites et Dyspepsies des nourrissons.

Doses. — *Adultes :* 1 à 2 cuillerées à soupe un peu avant ou pendant le repas.
Enfants : 1/2 cuillerée à café *avant* chaque tétée ou prise d'aliments.

Adresser toutes demandes :

Laboratoire
de Physiologie du Puits d'Angle
Le Puits d'Angle, LE CHESNAY (S.-et-O.).

Représentants pour la Belgique :
M. MICHAUD
23, rue Plantin — BRUXELLES

ECZÉDA

ZnO — Ichthyosulfosalicylée.

Excipient spécial très absorbant, procure un soulagement immédiat, même en cas de dermatose aiguë et suintante.

Mode d'emploi. — Application renouvelée aussi souvent que nécessaire pour couvrir en permanence la lésion d'une couche protectrice épaisse.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les dermatoses et en particulier les dermatoses prurigineuses qui sont améliorées presque immédiatement.

Indications. — Eczéma sec et suintant, eczéma séborrhéique, érythèmes, dartres, acné, éruptions des nourrissons, engelures, intertrigo, prurits.

Laboratoires GOBEY
21, rue d'Aumale — PARIS

EDISTOL

Composition. — Acides borique, tartrique, citrique : menthol, huile de Pinus sylv., gaïacol, terpinéol, cinéol, Styrax benz.

Indications. — Toutes affections et antisepsie des muqueuses rhino-bucco-pharyngo-laryngées.

Mode d'emploi. — *Gargarismes* et bains de gorge : 1 cuillerée à café par verre d'eau bouillie chaude.

Fumigations : 1 à 2 cuillerées à café par verre d'eau bouillante.

Vaporisations : 1 cuillerée à café dans le verre d'eau d'un pulvérisateur à vapeur.

Bain nasal : 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau bouillie tiède, au moyen de la pipette nasale.

Laboratoire Henri DUFOUR
40, Rue des Carmes — ORLÉANS (Loiret)

EKTOGAN BOCQUILLON

Poudre composée à base de ZnO^2 *traité*, sans odeur ni couleur, *se prêtant à toutes les formes de pansements.*
Sa formule est : $2(Zn^9C^{12}O^{25}H^{22})$.

Propriété. — Dégage d'une façon lente et continue de l'oxygène à l'état naissant dès qu'on le met en contact avec un ferment ou un acide organique quelconque (sang, pus, transpiration, moiteur, salive, etc.).

Indications. — En chirurgie. Gynécologie. Obstétrique. Dermatologie. Hygiène.

Formes. — Poudre. Pommade. Pâte. Emplâtre. Gazes. *Méchettes* pour *Nez* et pour *Oreilles*. *Plura-bandes* pour gynécologie.

Laboratoires des
PEROXYDES MEDICINAUX
12-18, rue Lamartine — PARIS

ÉLATINE BOUIN

Dérivé du Sapin de Norvège (Gemme et Goudron) Liquide limpide et de conservation indéfinie.

Dose et mode d'emploi. — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuil. à soupe par tasse, plusieurs fois par jour. – 1 à 2 cuil. à café pour les enfants.

A titre préventif. — En temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'*Elatine* peut être prise additionnée à la boisson habituelle au repas, à raison d'une cuil. à dessert par verre de liquide.

Indic. thér. — Affections des bronches, (toux rebelles, catarrhes, emphysème, asthme) ; de la vessie et des reins (cystites, pyélites, gravelle)

Laboratoire FAGARD
44, rue d'Aguesseau — BOULOGNE-sur-SEINE
Pharmacie Derneville, 66, Boulevard de Waterloo
BRUXELLES

ELBON CIBA

Cinnamoyl-*p*-oxyphénylurée.

Antipyrétique doux, d'action durable, pour le traitement des pyrexies tuberculeuses et des catarrhes infectieux des voies respiratoires. Se décompose avec mise en liberté d'acide benzoïque qui réalise la benzoïlisation continue de l'arbre broncho-pulmonaire.

Indications. — Tuberculose pulmonaire fébrile. Catarrhes pulmonaires et toutes affections bronchiques fébriles.

Doses. — 2 à 4 comprimés par jour. Commencer par la dose forte pour l'abaisser ensuite progressivement à mesure que la courbe thermique descend.

Le tube de 20 comprimés : 18 francs.

Laboratoires CIBA

O. Rolland, 1, Place Morand — LYON

ELGINE JULIEN

Comprimés

Composition :

Collargol argent colloïdal...	0,05 cent.
Benzoate de soude.....	0,20 —
Urotropine française.....	0,10 —

En comprimés se dissociant rapidement
Dissolution préalable inutile.

Indications. — Maladies infectieuses aiguës. Intoxications, Voies urinaires (urétrites, cystites, pyélites, prostatites). Diathèse urique, (rhumatismes, goutte, lithiase).

Posologie. — *Adultes :* 3 à 6 comprimés par jour. *Enfants :* 1/2 dose. Avaler avec une infusion ou dissoudre dans de l'eau.

Louis JULIEN

Docteur en Pharmacie

105, rue de Rennes — PARIS

ÉLIXIR BONJEAN

à base d'éther et de plantes aromatiques,

Tonique puissant des voies digestives

INDIGESTIONS

DIGESTIONS DIFFICILES

Diarrhée, Cholérine, Vomissements nerveux, Choléra des enfants.

INCOMPARABLE et MERVEILLEUX dans les cas de ***GRIPPE INTESTINALE***

DUSSUEL et FAURE

AIX-LES-BAINS (Savoie).

ÉLIXIR DÉRET

Iodure double de Tanin et de Mercure.

Solution vineuse titrée d'Iodure de Tanin et de Mercure en combinaison stable. Teneur en iode de 0 gr. 0275 et en mercure 0 gr. 005 par cuillerée à soupe. Dépourvu d'arrière-goût métallique.

Prop. Ther. — Antisyphilitique. — 1° Absence d'accidents d'hydrargyrisme, grâce à l'action spéciale du tanin. — 2° Innocuité sur les voies digestives, jamais de diarrhée. Des faits cliniques montrent l'Elixir Déret souvent toléré par des malades qui ne pouvaient antérieurement supporter un autre traitement mercuriel.

Doses. — Adultes : 1 cuil. à soupe ; Enfants : 1/2 à 1 cuill. à café ; à prendre 2 fois par jour dans un verre gradué pour éviter le contact du médicament avec le métal de la cuillère. Ces doses peuvent être doublées.

Nota. — Aucune indication de la nature mercurielle de la préparation n'est faite sur l'étiquette ni sur l'enveloppe, l'Elixir Déret peut donc être pris aussi discrètement qu'on le désire.

Laboratoires CLIN

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ELIXIR DUCHAMP

Composition. — Extrait de Foie de Morue (sans corps gras). Quinquina arsénié et phosphaté. Cacao. Vanille.

Propriétés thérapeutiques. — D'un **goût exquis**, apéritif puissant, tonique, reconstituant et hématopoiétique, l'Elixir Duchamp remplace avantageusement l'huile de foie de morue les amers et les fortifiants.

Indication. — Tous états de faiblesse physique ou intellectuelle. Manque d'appétit. Grippe. Tuberculose. Rachitisme. Convalescence. Lymphatisme. Scrofule, etc.

Dose. — 1 verre à liqueur (enfants 1 cuillère à soupe) un quart d'heure avant les repas. Pur ou avec de l'eau.

Laboratoires
Cie RENÉ de GRAUWE
Pharmacien de 1re classe
16, rue de Rocroy — PARIS. Usine à St-Denis.

ÉLIXIR DUCRO

Préparation aromatique et sucrée, très agréable au goût, 20° alcool, contenant les principes des écorces d'oranges amères et 0,10 d'hypophosphite de soude par 15 gr. d'élixir.

Asthénie, Anorexie, Convalescences : Un verre à liqueur ou une cuiller à soupe selon l'âge, pur ou étendu d'un peu d'eau, avant ou après le repas.

Pneumonie et maladies infectieuses adynamiques : Une cuiller à café ou à soupe, selon l'âge, toutes les deux heures.

Il exerce alors, plus et mieux que la potion de Todd, une action d'épargne très favorable aux malades.

DURIEZ
20, place des Vosges — PARIS

ÉLIXIR DUSSAUD

Véritable suc digestif.

Composition. — Pepsine, diastase, pancréatine, *en milieu alcalin* de lactates et de sels de Vichy.

Propriétés. — Transforme les albuminoïdes en peptones assimilables, les matières amylacées en glucoses ; émulsionne et saponifie les corps gras.

Indications. — *Eupeptique puissant*, réveille l'appétit et facilite la digestion. *Régulateur parfait* des fonctions intestinales, combat la constipation et la diarrhée, même chez les enfants. *Agent d'une assimilation intégrale*, se prescrit dans tous les états de carence ; anémie, convalescences, athrepsie infantile, hypogalactile.

Mode d'emploi. — 1° *Premier âge :* 1, 2 ou 3 cuillerées à café (dans un peu d'eau bouillie sucrée).
2° *Enfants :* 2 ou 3 demi-verres à liqueur.
3° *Adultes :* 4 à 5 verres à liqueur.
Par jour et après le repas ou les tétées.

Laboratoire de l'ELIXIR DUSSAUD
52, rue de Rome — MARSEILLE

ELIXIR EUPEPTIQUE TISY

Composition. — Pancréatine, diastase et pepsine additionnées de sécrétine et d'entérokinase.

Avantages. — Digère les corps gras, amylacés et protéiques.
Contient à l'état de pureté, tous les ferments de l'estomac et de l'intestin. De goût très agréable. Se conserve pendant de longues années.

Indications thérap. — Embarras gastriques, dyspepsie, gastro-entéralgie, douleurs et dilatations d'estomac, manque d'appétit, digestions difficiles, diarrhée, atrepsie, vomissements.

Posologie. — Un à deux verres à liqueur au commencement ou à la fin de chaque repas.

Laboratoires VAUDIN et GUILLAUMIN
Docteurs en Pharmacie
12, rue Charles-V — PARIS

ELIXIR GREZ

chlorhydropepsique

spécialement préparé pour combattre l'*insuffisance gastrique* sous toutes ses formes.

A base de chlorhydropepsine unie aux amers digestifs, son action doit être recherchée dans tous les cas où les fonctions sécrétrices de l'estomac sont déficientes, depuis la simple dyspepsie due à une mastication insuffisante ou trop rapide (mauvaise dentition, repas précipités, etc.) jusqu'aux plus graves troubles sécrétoires.

Joignant l'utile à l'agréable

Il est employé dans le monde entier et universellement apprécié par le corps médical. Le nombre des Docteurs qui emploient l'Elixir Grez chlorhydropepsique pour leur usage personnel augmente de jour en jour. C'est pour nous la meilleure preuve de la qualité de notre produit et de son efficacité.

Posologie. — Un verre à liqueur après chaque repas.

Dépôt général :

Laboratoire de l'ELIXIR GREZ

49, rue de Maubeuge — PARIS (IXe)

ÉLIXIR du Dr MIALHE

Préparation. — Suc gastrique complet. — Un procédé particulier lui conserve toute son activité plusieurs années. *(Journal de Pharmacie et de Chimie.)*

Indications thérapeutiques. — Dans tous les cas où le suc gastrique fait défaut : Dyspepsies ; douleurs nerveuses ; digestions lentes et difficiles ; vomissements incoercibles de la grossesse.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à bouche immédiatement après le repas ; demi-dose pour les enfants.

Pharmacie du Dr MIALHE

8, rue Favart — PARIS

ELIXIR SPARK

Composition. — Extrait fluide composé d'espèces amères stomachiques et digestives. Au complexe végétal obtenu par des lixiviations successives, il est ajouté une quantité de glycérine et d'alcool strictement suffisante pour assurer une stabilité et une conservation parfaites; le produit final, d'une amertume aromatique, possède une saveur agréable et franchement apéritive.

Propriétés thérapeutiques. — *Affections du foie :* gastro-hépatite, insuffisance biliaire, congestion du foie, lithiase biliaire.

Affections de l'estomac : dyspepsies, hypo ou hyperchlorhydries, stases gastrique, dilatations stomacales; atonie des voies digestives;

Affections de l'intestin : entérites, ballotement abdominal : *constipation et ses conséquences.*

Pas de contre-indications.

Doses. — Une cuillerée à café, dans un peu d'eau pure ou sucrée, avant ou après les deux principaux repas.

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE :

LABORATOIRES NARODETZKI
19, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ÉLIXIR SPES

Iodure double d'Arsenic et de Mercure

Préparation moins alcoolique qu'un vin et posologiquement assimilable au Sirop de Gibert.

Composition de l'Elixir. — Une cuillerée à soupe contient exactement :

I.... 0,008)
Hg.. 0,006) correspondant à (0,01 Biiodure Hg
As.. 0,001) (0,005 Iodure As

Très agréable à prendre

Indications. — Syphilis et Hérédo-syphilis. Bien toléré, son emploi n'occasionne ni hydrargyrisme, ni stomatite, ni érythème, ni diarrhée.

Doses. — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour.
Adolescents : 2 cuillerées à café par jour.
Enfants : 2 cuillerées à café par jour, au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau.

Verre mesure gradué accompagnant le flacon

Observation importante. — Présenté comme tonique et modificateur, l'**Elixir Spes** ne contient aucune indication permettant de soupçonner la présence du Mercure.

Susceptible de rendre les plus grands services en Gynécologie, Ophtalmologie Oto-Rhino-Laryngologie.

Docteur GUIRAUD
Ex-Pharmacien des Hôpitaux
60, cours d'Aquitaine — BORDEAUX

ELIXIR THIOGAIACOLÉ ARQUEVAUX

Composition. Thiogaiacol cryst. pur ; Extrait Thébaïque total ; Codéine complémentaire ; Bromoforme ; Teint. Rac. Aconit, titre interne ; Teint. Belladone titre int. ; Benz. Sodique ; E. d. Laur.-Cerise t. int. ; véhicule : Elixir de Polygala au Garus.

Forme. — Liquide.

Indications. — Antiseptique antituberculeux cicatrisant des voies respiratoires. Enrouement, Bronchite et Toux chroniques. Tuberculose. Asthme. Catarrhes.

Posologie. — *Adultes seulement.* Sauf indications médicales contraires, 3 à 5 cuil. à dessert par jour, entre les repas, pures, suivies d'une tasse de tisane très chaude, pectorale ou autre.

L. ARQUEVAUX, pharm. à Étampes (S.-et-O.).

Dépôt: O. C. P. 71 Rue du Temple — PARIS (III^{e})

EMERSON'S BROMO-SELTZER

(The Emerson drug Company. Baltimore)

Indications.

Céphalalgies, névralgies. Action rapide.

Composition.

Citrate de Soude. Acétanilide. Bromure de Sodium. Caféine

Posologie.

Une cuillerée à café dans un verre d'eau, et boire de préférence quand le liquide est en effervescence.

Littérature et échantillons au Dépôt Général.

PHARMACIE ANGLAISE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

62, avenue des Champs-Élysées, Paris (VIII^{e})

Téléph. Élysées 22 52

EMPLATRES R. CAVAILLÈS

Caoutchoutés, adhésifs (formules de l'hôpital Saint-Louis). Dermatoses subaiguës et chroniques: Oxyde de zinc. Rouge de Vidal. Vigo. Huile de Cade. Ichtyol, etc.

Coloplastre pour pansements. Emplâtre caoutchouté adhésif à l'oxyde de zinc, en bobines de 1, 2, 3, 5 %, etc.

Coloplastre perforé, toutes dimensions.

Gaze anadhère. Gaze grasse stérilisée, non adhérente aux plaies. Simple. Baume du Pérou. Ichtyol. Sapolan.

Laboratoire R. CAVAILLÈS
34, rue de Turin — PARIS (VIIIe)
Détail : 116, bd Haussmann et toutes pharmacies

EMULSION MARCHAIS

Médication des voies respiratoires.

Composition. — Préparation émulsive à base de créosote de hêtre, de baume de Tolu, glycophosphate de chaux.

Action thérapeutique. — Aseptise l'appareil respiratoire, modifie les sécrétions bronchiques, sclérose les lésions pulmonaires, récalcifie l'organisme.

Avantages. — Tous les éléments de l'EMULSION MARCHAIS sont solubilisés ou émulsionnés. Activité considérablement augmentée. Pas de troubles digestifs. Créosole partiellement désodorisée, ne provoquant jamais d'intolérance.

Indications. — Trachéites, bronchites, pleurites, tuberculose pulmonaire, et en général toutes les maladies du poumon, des bronches et de la plèvre.

Mode d'emploi. — 3 à 6 cuillerées à café, par jour, dans un liquide quelconque.

L'EMULSION MARCHAIS peut être également administrée en inhalations (2 cuillerées à soupe dans un bol d'eau bouillante) et en lavements (1 à 2 cuillerées à soupe dans 500 grammes d'eau tiède).

LABORATOIRE de l'EMULSION MARCHAIS

11, rue Mission-de-France, Marseille.

ENDOCALCASE

Médication spécifique de toutes les déminéralisations.

Composition. — Sels insolubles de chaux, de manganèse, de fluor et de silice. *Poudre d'os frais.* Extraits secs de *surrénale* et de *thymus*. Rate. Foie.

Présentation. — Deux formes : Dragée et granulé ondant

Prop. thérap. — L'addition de poudre d'os frais (aliments minéraux *vitalisés*) et de surrénale et de thymus (dont la déficience est une des causes déterminantes de la déminéralisation) aux sels de chaux, rendus assimilables selon la formule de Ferrier, assure leur fixation rapide et definitive dans l'organisme.

Indications. — Tuberculose. Toutes les affections osseuses : troubles de la dentition, carie dentaire, rachitisme, consolidation de fractures. Retard de croissance. Grossesse. Surmenage. Débilité. Convalescences. Anémie. Neurasthénie. Lymphatisme. Blessés et Intoxiqués de guerre.

Doses et mode d'emploi. — Toujours au début des repas. Granulé : Par jour : Adultes : 2 cuillerées à café ; enfants : une cuillerée à café.
Dragées : Par jour : Adultes : 4 à 5 dragées.
Enfants : 1 à 2 dragées.

LE GARREC, Pharmacien
74, rue des Jacobins — AMIENS

ENDOPANCRINE

Forme et composition. — INSULINE FRANÇAISE, présentée en tube de 6 cc.
Chaque cc. correspond à 20 unités cliniques.

Avantages. — La présentation spéciale permet de prélever dans le tube le nombre exact d'unités que l'on désire, le reste du tube conservant toutes ses propriétés.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, intra-musculaires ou intra-veineuses.

Dose de début. — un cc. La conduite du traitement ultérieur sera dictée par les dosages du sucre dans les urines ou éventuellement dans le sang.

Demander notre notice,
" La Thérapeutique par l'Insuline "
Laboratoire de Thérapeutique générale
48, rue de la Procession — PARIS (XV^e^)

ENERGÉTÈNES BYLA

Sucs purs de Plantes fraîches inaltérables,

Chimiquement dosés, stabilisés.
Physiologiquement titrés.

Unification de leur posologie :

AUBÉPINE BYLA, régulateur cardiaque.
Genêt Byla, diurétique.
GUI BYLA, vaso-dilatateur. (Voir page).
Muguet Byla, toni-cardiaque.
Sauge Byla, anhydrotique.
Cassis Byla, antirhumatismal.
MARRONS D'INDE BYLA, toni-vasculaire.
VALÉRIANE BYLA, sédatif. (Voir page).
3 cuillerées à café par jour.

Médication héroïque :
Colchique Byla, antigoutteux.
Digitale Byla, toni-cardiaque.
X à XXX gouttes par jour.

Les ETABLISSEMENTS BYLA
26, avenue de l'Observatoire, PARIS
R. C. Seine 71895.

ÉNÉSOL

Comp. — Salicylarsinate de mercure, à arsenic et mercure dissimulés. Renferme 38,46 % de Hg métal et 14,4 % de As sous forme dissimulée. Les solutions sont incolores et ne coagulent pas l'albumine.

Formes. — Ampoules de 2 cm³ et de 5 cm³ contenant 0 gr. 03 de salicylarsinate de mercure par cm³ correspondant à 0,0115 de Hg métal et à 0,0043 de As métalloïde par cm³.

Prop. Thér. — Agent antisyphilitique (agissant à la fois par son arsenic et par son mercure). Action analeptique par l'arsenic

Doses et Mode d'emploi. — Dose moyenne : Injection intra-musculaire d'une ampoule (2 cc. par jour. Dose massive : Injection intra-musculaire ou intra-veineuse de 4 à 8 cc. tous les 2 ou 3 jours.

Laboratoires CLIN
20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

ENIODE LEFEBVRE

Composition. — Iode en combinaison stable avec une albumine d'origine animale.

Forme. — Comprimés kératinisés contenant chacun *Un centigramme* d'iode en combinaison organique.

Propr. thérap. — *L'Eniode* possède toutes les propriétés de l'Iode, sans les inconvénients de l'iodisme.

Doses et mode d'emploi. — *Enfants :* 1 à 2 comprimés par jour ; *Adultes :* 2 à 8 comprimés par jour, avant le repas.

Pharmacie GRIGNON
2, Rue Duphot — PARIS

ENNEGO

Extrait dragéifié de Lawsonia Inermis

Propriétés. — Antiseptique urinaire parfait. Diurétique et sédatif.

Avantages. — Ne fatigue pas l'estomac, ni les reins comme le santal.
Assure la désinfection urinaire mieux que l'Hexaméthylènetétramine.

Indications. — Pyélonéphrites, Blennorragies. Cystites, Néphrites, Albuminuries, Lithiase rénale.

Posologie. — 6 à 8 dragées par jour.

Laboratoires ROBERT & CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS

ENTÉRO-ANTIGÈNES

préparés d'après la méthode et selon les procédés de M. J. Danisz.

Propr. thérap. Anti-anaphylaxie *curative* des maladies chroniques non contagieuses.

Indications. — *Intestin* (Constipation chronique, Colites, Entérocolites, Diarrhées chroniques, Dysenterie microbienne (Shiga, Fleixner, etc..
Asthme. Rhume des foins, Migraines, Neurasthénies, Insuffisances hépatiques et polyglandulaires.
Peau. Eczémas chroniques, Urticaires, Prurits généralisés ou localisés (anal, vaginal), Prurigo, Psoriasis, Furonculose, etc.
Rhumatismes chroniques. Troubles de la ménopause, dysménorrhées.

Tous les cas de dysharmonie endocrinienne.

Deux formes. — 1° Ampoules à injecter.
2° Ampoules à boire.

Boîtes de 10 ampoules. Littérature sur demande.

LABORATOIRES F. DUCATTE
31, Rue des Francs-Bourgeois — PARIS (IV°)

ENTEROSEPYTL CLERAMBOURG

Composition :

Phosphate de β Trinaphtyle P O — | C^{10} H^{7} O / C^{10} H^{7} O / C^{10} H^{7} O

Forme. — Comprimés.
Propriétés. — Poudre blanche, cristalline, inodore et sans saveur, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool, l'éther, fondant à 108-110°.
Indications thérapeutiques. — Toutes les fois que l'intestin est le siège de fermentations, qu'il s'agisse de *Diarrhée* ou de *Constipation*. Entéro colite muco-membraneuse. Entérite. Colite, Dyspepsie gastro-intestinales. Disparition des divers troubles provoqués par les auto-intoxications : Ictère, Albuminurie hépatique. Eczéma et Dermatoses diverses. — Antiseptique de choix dans les localisations intestinales des diverses *Maladies infectieuses* : Fièvre typhoïde, Affections cholériformes.
Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour, à jeun ou 1 heure avant les repas.

Laboratoire CLÉRAMBOURG-DELONDRE
Fondé en 1598
4, rue Tarbé — PARIS (XVII°)

ENTEROVACCIN LUMIÈRE

antitypho-colique polyvalent
contre les infections éberthiennes, coli-bacillaires et paratyphiques.

Constitution. — Masse pilulaire constituée par des corps bacillaires (éberth. coli-bacille, paratyphique A et B) rigoureusement stérilisée et enrobée dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver jusqu'à l'intestin sans subir aucune désintégration des produits immunisants,

Indications. — L'*Entérovaccin* antitypho-colique Lumière possède à la fois des propriétés immunisantes très actives, capables d'assurer une protection efficace contre les affections typhiques, paratyphiques et coli-bacillaires. Il agit également très efficacement comme vaccin curatif, en particulier chez les malades atteints de fièvre typhoïde. L'affection évolue alors très rapidement et de façon tout à fait anodine.

Mode d'emploi. — Administrer 4 pilules par jour, loin des repas.

Produits spéciaux des
Laboratoires A. LUMIÈRE
M. SESTIER, Pharmacien
9, cours de la Liberté — LYON

ENTÉROZONE

(Peroxydine) Voie buccale

Solution hydro-alcoolique (45° d'alcool) d'ozone stable à la température ordinaire (1/10 en vol.) à réaction très acide — Couleur ambrée — Saveur agréable.

Prop. thér. — Oxygène actif à l'état naissant. Double pouvoir : d'une part, Antiseptique intestinal et, partant, Antithermique ; d'autre part, Oxydant et Régénérateur des globules du sang.

Indic. thér. — Antisepsie des Voies digestives et des Voies respiratoires. Tous les états infectieux fébriles. Reconstituant. Régénération des globules sanguins.

Posologie et dose. — Adultes : 4 à 6 cuill. à café prises 2 par 2 dans un demi-verre d'eau sucrée, à température ordinaire, une demi-heure avant les repas. — Enfants : 1 à 3 cuill., suivant l'âge dans les mêmes conditions.

H. ROGIER, pharmacien
56, boulevard Péreire — PARIS

EPILEPTIQUE (ANTI) DE LIÉGE

Elixir bromuré d'une action puissante évitant les inconvénients du bromisme. En 4 numéros.

Epilepsie, crises nerveuses, neurasthénie.

EPILEPSIE. POSOLOGIE

1° *Enfants au-dessous de 7 ans.* — Seulement le n° 1 :

Moins de 5 mois : 1/4 mes. par j.
5 mois à 1 an : 1/2 mes. —
1 à 3 ans : 1 à 2 mes. par j. } en augm.
4 à 7 ans : 2 à 3 mes. — } graduell.

2° *De 7 à 10 ans.* — Seulement le n° 1.

3° *De 10 à 14 ans.*

N° 1.	1re	bouteille.....	2 1/2	mesures	par jour.
»	2e	»	3	»	»
»	3e	»	3 1/2	»	»
N° 2.	1re	bouteille.....	3	»	»
»	2e	»	3 1/2	»	»
»	3e	»	4	»	»

4° *Adultes.* — Le choix du numéro de début dépend de l'intensité de la maladie et de la constitution du malade. Les personnes faibles et celles qui n'ont d'accès qu'à un mois d'intervalle commenceront par le N° 1. Les bonnes constitutions victimes d'accès fréquents commenceront par le N° 2.

N° 1.	1re	bouteille.....	3	mesures	par jour.
»	2e	»	3 1/2	»	»
N° 2.	1re	»	3	»	»
»	2e	»	3 1/2	»	»
N° 3.	1re	»	3	»	»
»	2e	»	3 1/2	»	»
N° 4.	1re	»	3	»	»
»	2e	»	3 1/2	»	»

La mesure dont nous nous servons jauge 15 cc. (soit une cuillère à soupe).

Les doses indiquées plus haut sont toujours prises en trois fois, diluées dans une infusion de thé diurétique de Liège.

Laboratoires FANYAU
46, rue Claude-Lorrain — LILLE

ERANOL

Iode en suspension colloïdale aqueuse isotonique.

L'*Eranol* ne saurait être comparé aux composés iodo-organiques, aux peptones iodées, à l'albumine iodée, à la caséine iodée, à l'huile iodée, ni aux iodures alcalins, tous produits dans lesquels l'iode se trouve à l'état de combinaison stable, difficilement dissociable. C'est un iode libre, non caustique, ni toxique, même aux doses thérapeutiques élevées.

Propriétés. — Grâce à l'état particulier sous lequel se présente cet iode vitalisé, l'*Eranol*, de beaucoup plus actif que l'iode métalloïdique dans ses indications habituelles, possède une action catalytique très nette, qui augmente, par excitation, le pouvoir thérapeutique de l'iode. Son hyperactivité, sa faible teneur relative en iode (10‰) sa parfaite tolérance, son isotonie et sa forme aqueuse en font la préparation d'iode la plus maniable, la plus active et la moins toxique.

Formes et posologie. — 1° Gouttes, en flacons pour l'usage interne.

Ampoules de 1, de 2 et de 5 cc. pour injections intramusculaires ou intraveineuses.

Mode d'emploi. — *Usage interne: Gouttes.* Au moment des repas dans une boisson quelconque; eau, vin, etc.

Adultes: L gouttes jusqu'à C et plus, progressivement, par jour en deux fois.

Enfants: V gouttes par jour et par année d'âge.

Ampoules de 1, 2 et 5 cc. (non douloureuses). Une injection intra-musculaire tous les un, deux ou trois jours pendant 12 jours et repos 8 jours.

Usages locaux. — En applications locales (ampoules de 5 cc. de préférence).

Laboratoire de L'ÉRANOL
45, Rue de l'Echiquier — PARIS

ERBAMIL

Essence de Camomille " ERBA "

Solution alcoolisée de teinture de passiflore et extrait de camomille. Contre les troubles d'origine nerveuse, digestions difficiles, douleurs de ventre, etc., etc.

Produit d'un goût très agréable, se prenant par demi-cuillerées sur un morceau de sucre ou dans l'eau.

Prix au public du flacon : 10 fr.

PRODUITS CARLO ERBA

G. Hugues, pharmacien.

105, boulevard Malesherbes (passage)
PARIS (VIIIe).

ERCERHINOL

Ampoule nasale à l'Argent Colloïdal

Avantages. — Bactéricide puissant, Traitement *pratique*, rapide et propre.

Indications. — *Grippe*, Infections broncho-pulmonaires, Catarrhe nasopharyngien, Coryza, Sinusite, etc.

Mode d'emploi. — Verser quelques gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour, la tête inclinée en arrière.

Laboratoires
ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS

ERGOTINE LAMANTE

Traitement des hémorragies.

Forme. — Gouttes et ampoules pour injections hypodermiques.

Composition. — Solution stabilisée et inaltérable de tous les alcaloïdes de l'ergot de seigle, o tenue par le procédé de fabrication spéciale de Lamante.

Indications. — Hémorragies de toutes nature, Hémorragies utérines, Accouchements, Fausses couches, Fibromes, Accidents de la Ménopause, Hémorroïdes, Cra.hements de sang, Saignements de nez, Leucorrhée, Troubles de la Puberté, Incontinence d'urine chez les enfants. Contre l'Asthme bronchique et la Toux quinteuse, en injections hypodermiques.

Dose et mode d'emploi — XXX à XL gouttes par 24 heures chez les *adultes* en deux fois dans un peu d'eau s crée. XXX gouttes à la fois, 3 à 4 fois dans les 24 heures dans les très fortes hémorragies. *Enfants :* 1/3 des doses ci-dessus.

Ampoules. — En injections hypodermiqu s : I ampoule comme préventif d'hémorragie apres l'accouchement, ou dans les hémorragies légères. II ampoules consécutives dans les hémorragies abondantes. A répéter au besoin 2 à 3 fois dans les 24 heur.s.

Échantillon et littérature sur demande.

M. PARIS, Pharmacien de 1re classe.

1, rue Lassalle, LYON (La Boucle).

ESCULEOL

Composition. — Alcoolé concentré de Marron d'Inde frais et stabilisé.

Ind. et Prop. — Action vaso-constrictive sur le système nerveux périphérique et en particulier dans les cas d'hémorroïdes, varices, varicocèles, phlébites, stase veineuse, etc.

Supérieur aux préparat. médicinales parce que concentré, stable et d'action constante.

Mode d'emploi. — **Hémorroïdes :** Administrer 2 fois p. j. dans l'intervalle des repas 15 gouttes d'Esculéol dans un peu d'eau. Dans les cas rebelles, graduer la dose suivant l'intensité des douleurs, en augmentant de 5 gouttes par jour. **Varices, varicocèles,** etc.. toutes les fois que la médication devra être continuée pendant un certain temps administrer 15 gouttes 2 fois p. j. dans l'intervalle des repas, 20 jours par mois.

Échantillons :

MICHEL DELALANDE

13, Rue Lacharrière — PARIS (XIe)

EUCALCIUM

Reminéralisateur mangano-calcique.
Formule la plus active
de la médication réa cifiante.

Composition :

Calcium, manganèse, magnésie, phosphate, fluorure.
Les cachets opothérapiques et les granulés contiennent en plus : parathyroïde, surrénale, thymus.

Trois formes :

POUDRE, de goût agréable.

CACHETS de 3 sortes : { d'Eucalcium pur. / d'Eucalcium méthylarsiné. / d'Eucalcium opothérapique.

GRANULÉS fondants opothérapiques
(forme de choix pour enfants).

Indications :

Débilité. — Anémie. — Tuberculoses. — Grossesse. — Allaitement. — Rachitisme. — Croissance. — Scrofulose. — Lymphatisme. — Convalescence. — Consolidation des fractures. — Caries dentaires et évolution de la dentition.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 cuillerée à café de poudre, ou 1 cachet ou 1 cuillerée à dessert de granulés, à la fin de chaque repas (3 fois par jour).
Enfants de 5 à 10 ans : 1 cuillerée à café de poudre ou de granulés ou 1 cachet à la fin des repas (2 fois par jour).
Enfants au-dessous de 5 ans et *nourrissons :* donner la poudre ou les granulés par demi-cuillerée à café, ou par pincée, suivant l'âge, (2 fois par jour).

Aucune contre-indication

A. BASTIDE

Pharmacien de 1re Classe,
50, boulevard de Paris, Marseille.

EUCALYPTINE LE BRUN

(Antiseptique pulmonaire)

Composition. — Eucalyptol 0,15 cgr. ; Gaïacol, 0,05 cgr ; Acide phénique, 0,02 cgr. ; Camphre, 0,05 cgr. ; pour une ampoule de 1 cc. le tout dans une décoction huileuse de plantes balsamiques calmantes, spécialement étudiée et rendant *l'injection absolument indolore.*

Formes. — Amp. de 1 cc. — Caps. glutinisées.

Propr. thér. — Antiseptique pulmonaire Antioxygène. Antithermique. Sédatif de la toux. Diminue et facilite l'expectoration.

Indications. — Toutes les affections aiguës des voies respiratoires : Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Tuberculose, Gangrène pulmonaire, Maladies infectieuses.

Posologie et mode d'emploi. — Sous la forme capsules : 3 à 6 par jour, 2 chaque repas. En injections sous-cutanées. Adultes : 1 à 3 amp. de 1 cc. par jour. Enfants de 5 à 12 ans : 3/4 de cc. 2 mois à 5 ans, 1/2 de cc. Le flacon de 50 capsules : 9 francs. La boîte de 12 amp. : 15 francs.

Laboratoire LEBRUN
155, boulevard de Magenta — PARIS (X^e^)

EUCYTOL

Composition. — Combinaison d'extraits végétaux et de sels phospharsenicaux organiques, 25 cc = 3 centigr. d'iode + 2 milligr. d'arsenic.

Forme. — Liquide à base de vins de liqueur.

Avantages et propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur et stimulant dans toutes les déchéances organiques. Plus assimilable que l'huile de foie de morue et plus actif que les sirops iodotaniques.

Indications. — *Enfants* : Affections des os et de la nutrition. Affections des glandes et des voies respiratoires. Etats prétuberculeux et tuberculose sous toutes ses formes. Anémie et troubles nerveux.

Adultes : Convalescence des maladies infectieuses, affections des voies respiratoires, troubles de la circulation.

Posologie. — *Enfants* : de 2 à 5 ans, 2 cuillerées à soupe par jour : de 5 à 10 ans, 2 verres à liqueur par jour ; de 10 à 15 ans, 3 à 4 verres à liqueur par jour.

Adultes : 1 à 2 verres à liqueur à chaque repas.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER
1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e^)
A Bruxelles :
LE MARINEL, pharmacien, 46, rue du Trône,

EUDYNOL

Composition. — Arsenic, phosphore, strychnine.

Formes. — Ampoules, gouttes, perlules.

Indications. — Asthénie, pré-tuberculose, surmenage, dépressions nerveuses, convalescence, paludisme.

Dosage, Prix et Posologie.

Ampoules, 14 fr. la boîte de 12. Arsenic : 0 gr. 015 ; Phosphore : 0 gr. 008 ; Strychnine : 0 gr. 002 pour 1 c. c. Une injection par jour.

Gouttes, 12 fr. le flacon. Arsenic : 0 gr. 02 ; Phosphore : 0 gr. 01 ; Strychnine : 0 gr. 002, pour 1 c. c. soit 34 gouttes. 10 à 12 gouttes 2 fois par jour aux repas.

Perlules, 14 fr. le flacon. Arsenic : 0 gr. 005 ; Phosphore : 0 gr. 007 ; Strychnine : 0 gr. 0005 par perlule. 2 perlules à chacun des principaux repas.

Échantillons François CARTIER,
1, rue de la Martinière — LYON
Préparé par Dr ROGER, pharmacien.

EUGYNOL GRANDVAL

Composition :

Association d'extraits d'Hydrastis-Hamamélis-Viburnum Gossypium.

Propriétés thérapeutiques :

Il favorise la formation chez les Jeunes Filles, évite les Palpitations et provoque l'élimination des Toxines.

Vaso-constricteur par excellence, il régularise la circulation du sang, décongestionne les organes, et apporte toujours un soulagement à la souffrance produite par la moindre affection des organes de la Femme.

L'*Eugynol* permet d'enrayer la formation des Varices ; soit, au moment de la grossesse, soit, au Retour d'Âge.

Il rétablit la régularité des Règles. Son usage à dose modérée finit par supprimer les douleurs qui accompagnent ou qui précèdent si souvent ce moment désagréable.

Indications thérapeutiques :

Complications du retour d'âge, telles que Varices, Hémorroïdes, Hémorrhagies, Flux sanguins de toute nature, Éruptions diverses, etc.

Dose :

XV à XX gouttes avant chaque repas.
On peut aller jusqu'à XXX gouttes.

LABORATOIRES GRANDVAL
12 14, rue Féry, Reims.

EUMICTINE

Indic. Thér. :

Antigonococcique diurétique, antiseptique etc.

Affections des voies urinaires :

Blennorragie, Urétrite, Cystite, Pyélite, Catarrhe, Prostatisme, etc.

Traitement complet, sans aucun retentissement sur les organes, estomac en particulier.

Doses et mode d'emploi :

Capsules enrobées au gluten pur, contenant chacune 0,20 Santalol, 0,05 Salol et 0,05 Hexaméthylène — Tétramine : 8 à 12 par jour aux repas, ce qui constitue un traitement complet des affections urogénitales et prostatites.

Docteur M. LEPRINCE

62, Rue de la Tour — PARIS (XVIe)

EUONYMINE PAUL THIBAULT

Pilules d'Evouynime purifiée, procédé *Paul Thibault*, licencié ès sciences Physiques, ancien président de la Société de Pharmacie de Paris. Le plus actif cholagogue d'origine strictement végétale. Stimulant par excellence de la cellule hépatique.

Indications :

Affections du foie, Insuffisance biliaire, Cirrhoses, Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystites, Céphalée, Migraines et Constipation chronique d'origine hépato-biliaire.

Posologie :

1 à 3 pilules dosées à 0,06 de produit actif, soit avant le dîner, soit au coucher,

Laboratoires des Produits PAUL THIBAULT

6, rue Rosenwald — PARIS (XVe)

Nota. — Afin d'éviter les mécomptes donnés par de nombreuses evonymines du commerce, prescrire toujours : ***Pilules d'Euonymine Paul Thibault.***

EUPHON

Sirop et Pastilles contre l'enrouement.

Composition et forme. — Sirop à base d'extraits de plantes et de produits organiques : extrait fluide de coca I + Teinture rac. aconit0, 20 formiate sodique 5 + sirop d'erysinnum et d'aunée 100.

Propr. thérapeut. — Tonique par excellence des cordes vocales (tant chez l'adulte que chez l'enfant), calme complètement les picotements de la gorge qui accompagnent souvent un rhume ou une bronchite. Son emploi s'associe à tous les sirops pectoraux sans aucune contre-indication.

Indic. thérap. et posol. — Entretien de la voix : 3 cuill. à café par jour. — Enrouements, toux laryngées : 3 cuill. à dessert par jour. — Aphonie, trachéite, laryngite (simple ou chronique) 3 cuill. à potage par jour. — Chez les enfants ne pas dépasser 3 cuill. à café par jour.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER
1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^{e})
A Bruxelles : LE MARINEL, ph^{ien}, 46, r. du Trône.

EUPHORYL

Méthode de désensibilisation polyvalente. Traitement des dermatoses prurigineuses et affections anaphylactiques.

Formule. — Hyposulfite de soude et chlorure de calcium en combinaison bromurée silicatée.

Présentation. — 1° Cachets ; 2° ampoules pour injections intraveineuses.

Indications. — *a*) Dermatoses prurigineuses : Eczémas secs et suintants. Prurits, érythrodermies, dermites médicamenteuses et professionnelles, psoriasis.
b) Manife-tations anaphylactiques : Urticaire, migraines, Œdème de Quincke, maladie sérique.
c) Affections à tendance suppurative des voies respiratoires.

Posologie. — *Cas moyens* : 3 cachets par 24 heures, combinés à un traitement local approprié.
Cas aigus : une injection intraveineuse bi-hebdomadaire, avec prise de 2 cachets les jours intercalaires.
Not^{a} : Il est recommandé de pratiquer simultanément l'injection intraveineuse d'Euphoryl et une autohémothérapie de 10 c c.

Laboratoires HOURQUET et VIENNE
114, rue du Temple — PARIS (III^{e})

EUPHYTOSE

Traitement phytothérapique des états anxieux et des dystonies du sympathique.

Forme. — Solution.

Composition :

Association synergique d'extraits de plantes stabilisées : Crataegus. — Ballotte. — Paullinia sorbilis. — Passiflore.

Posologie :

De une à trois cuillerées à café en 24 heures dans un peu d'eau sucrée ou dans une infusion chaude.

Indications :

Angoisse et états anxieux. — Insomnie anxieuse. — Eréthisme cardio-vasculaire. — Palpitations. — Tachycardie. — Angoisse précardiale. — Vertiges. — Spasmes viscéraux.

Propriétés Thérapeutiques :

L'Euphytose n'est pas toxique aux doses thérapeutiques. Elle est très bien tolérée par les voies digestives. Elle n'a pas d'effets secondaires sur le foie et le rein. Les artérioscléreux, les cardiorénaux, les angineux n'ont rien à redouter de son usage prolongé : elle n'élève pas la pression artérielle.

La présence du Paullinia Sorbilis (Guarana), son action tonique et euphorique s'oppose victorieusement à cette dépression secondaire si fréquente chez les nerveux insomniques ou algiques qui font usage de calmants, toxiques pour la plupart, et que le médecin hésite à prescrire dans la crainte de ne plus pouvoir les interrompre à son gré.

L'Euphytose n'est pas un hypnotique au sens habituel du mot : c'est le type du régulateur du système nerveux, du médicament euphorique.

LABORATOIRE MADYL

14, rue de Miromesnil, Paris.

EUPNOGÉNOL

Forme. — Élixir.

Indications. — Asthme, Emphysème, Oppressions et toutes affections des voies respiratoires.

Doses. — 4 cuillerées à café par 24 heures pour les Adultes et suivant avis du médecin pour les enfants.

C. DAVID-RABOT et ses fils.
Dr en Phie — Pharmaciens Ex-Intes. des Hôpitaux de Paris.
49, rue de Bitche - Courbevoie (Seine).

EURONAL

Composition et Forme. — Comprimés.

Diéthylmalonylurée	0,15
Intrait de Valériane	0,10

Propriétés Thérap. — Analgésique et Antispasmodique, Hypnotique léger des surmenés et névropathes, Sédatif nerveux des excités et neurasthéniques.

Indications. — Insomnies rebelles et nerveuses, Épilepsie. Névralgies, Traumatisme. Toxicomanies.

Posologie. — *Dose sédative:* Un comprimé avant chaque repas.
Dose hypnotique: 2 ou 3 comprimés avant le repas du soir.

Laboratoires CARTERET
15, Rue d'Argenteuil — PARIS (Ier)

EUSOMNINE BÉLIÈRES

(Diéthylmalonylurée ammonio-bromée)

Forme. — Comprimés.
Propriétés thérapeutiques. — Hypnotique, sédatif, antialgique.
Indications. — Insomnies nerveuses, Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Dyspnée, Névralgies, Démorphinisation. Dyspepsie nerveuse.
Mode d'emploi et dose :
Comme sédatif : Un comprimé pour les adultes. Un demi-comprimé pour les femmes. Deux fois par jour.
Comme hypnotique : Une heure avant de se coucher : Pour les adultes, 2 comprimés. Pour les femmes, 1 comprimé 1/2. Ces comprimés doivent être pris le soir dans une tasse de tisane chaude, camomille, tilleul, oranger, thé léger.
Chez les enfants atteints de Coqueluche et de Crises nerveuses, on peut très utilement donner 1/6 ou 1/4 de comprimé.

Laboratoires BELIÈRES
19, rue Drouot — PARIS (IX^{e})

EUSTHÉNOL-ROZE

(Dragées Gmet)

Tonique. Stimulant. Reconstituant, facilite l'assimilation des phosphates.
Composition. — Mélange de noix de kola et de glycérophosphate de chaux.
Forme. — En boîte de 50 dragées agréables au goût (parfumées au curaçao et n'ayant pas l'air d'un médicament.
Indications. — Asthénie, fatigue, surmenage, anémie, neurasthénie, convalescence, grossesse, allaitement.
Très recommandé pour les enfants.
Doses. — 1 à 5 dragées par jour (maximum 6) 1/2 ou 1/4 de dose suivant l'âge pour les enfants.

Échantillons, **Laboratoire GMET**
A. LOROT, Pharmacien.
27, Faubourg Montmartre, Paris (IX^{e}).
R. C. 214 484 B
Téléph. Provence 43-10 (Voir GMET, p. 303)

EUTENSYL GRÉMY

Traitement de l'hypertension artérielle

Formule. — Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais.

Corps thyroïde.....	0 gr. 02
Muscle cardiaque...	0 gr. 50
Parenchyme rénal...	0 gr. 50
Iodotyrosine	0 gr. 05
Scille	0 gr. 06
Scammonée	0 gr. 04

pour une pilule.

Dose et mode d'emploi. — Deux à quatre pilules par jour à prendre une demi-heure ou une heure avant les repas.

Indications. — Artériosclérose au début, hypertension artérielle, obésité avec hypertension. Athéromateux, Néphrite chronique hypertensive, Cardiopathies avec hypertension.

L'Eutensyl provoque une hypotension mesurable au Sphygmomanomètre, et il compense cette hypotension en excitant le rein, en favorisant les évacuations intestinales, en rassurant le cœur.

Le médecin peut associer à l'Eutensyl la digitale.

14, rue de Clichy — PARIS (IX^{e})

EVINE

Antiseptique gynécologique, soluble.

Son originalité. — La Sénegine, hémolytique, détersif puissant et onctueux.

Son principe. — Réalisation du maximum d'antisepsie par association d'antiseptiques faibles, *en solution alcaline isotonique*, sur une muqueuse préalablement détergée (par la Sénegine).

Composition. — Sénegine, Borate de soude, Fluosilicate de soude, acide salicylique, cérasine, huiles essentielles, parfums.

Forme. — Poudre parfumée, entièrement soluble, en paquets et boîte métal.

Propriétés. — Antiseptique, alcaline, adoucissante, cicatrisante, désodorisante, détersive, tonique, sédative. Non caustique, non toxique, ne tache pas, parfume.

Indications. — Hygiène et prophylaxie féminines, leucorrhées, vaginites, vulvites, etc.

Gynécologie : précieux adjuvant aux pansements.

Obstétrique.

Posologie. — *Hygiène* : 1 paquet pour 2 litres d'eau bouillie tiède en injections ou lotions.

Gynécologie et obstétrique : 2 à 3 paquets pour 2 litres d'eau bouillie, à température voulue, en injections et lotions.

LABORATOIRES DE L'ÉVINE
3, rue de la Perle, Paris.

ÉVOLAXINE

(Le Laxatif de la Femme)

Traitement physiologique de la constipation habituelle de la femme.

Pas d'accoutumance. Pas de coliques.

Par ses lipoïdes ovariens stabilise et régularise la sécrétion endocrinienne en général, la sécrétion intestinale en particulier.

Par son mucilage lubrifie les parois intestinales.

Par son rhamnus frangula excite le péristaltisme.

Par sa duodénase augmente les sécrétions biliaire, pancréatique et intestinale.

Par ses sels biliaires désinfecte le tube digestif.

Indications. — Constipation habituelle de la femme. Entéro-colite chronique. Dermatose, Acné furonculose, auto-intoxication intestinale.

Doses. — 1 à 3 comprimés le soir en se couchant (action rapide). 1 comprimé par jour pendant 30 jours (cure de régularisation intestinale).

Laboratoires du Dr LAURENT-GÉRARD
Docteur ès sciences,
Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris,
40, rue de Bellechasse, Paris.
Tél. : Littré 97-96.

EXTRAIT DE CÉRÉALES ADRIAN

Composition :

Extrait aqueux obtenu dans le vide, à basse température, contenant les principes solubles et assimilables des céréales, orge, seigle, avoine, très riche en sucres, sels, oxydases, vitamines.

Mode d'action :

Reminéralisant, tonique général, apport de vitamines.

Indications :

Anémie, chlorose, troubles dyspeptiques prolongés, hémorragies, lymphatisme, scrofule, neurasthénie, etc.

Formes et mode d'emploi :

Liquide : 4 cuillerées à soupe dans un peu d'eau ;
Granulés : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
Demi-dose pour les enfants.

ADRIAN & Cie
9 et 11, rue de la Perle — PARIS

EXTRAIT HAMYD

(*Hamamelis-Hydrastis*)

Décongestif viscéral et vasculaire

Composition. — Hamamélis Gmet, Hydrastis Gmet (sans alcool.)

Forme.— Extrait liquide, goût agréable.

Indications. — Congestion veineuse, pelvienne, fibromes, métrites, salpingites, prostatites ; règles difficiles, douloureuses, trop abondantes ; ménopause, vertiges, céphalée.

Doses. — 1 à 3 cuil. à café par jour dans un peu d'eau froide.

Echons Laboratoire GMET
Dr A. LOROT, pharmacien
27, Fg Montmartre, Paris (IXe).
(Voir Gmet, p. 303)

EXTRAIT DE MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indic. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés, Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes* : Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Établissements DÉJARDIN

10, rue Parent de Rosan — PARIS (XVI[e])

FACMINE LONGUET

Agent puissant et facilement maniable de désinfection et désintoxication intestinales

Indications thérapeutiques. — Entérites glaireuses et muco-membraneuses ; constipation chronique et toutes maladies et troubles fonctionnels reconnaissant pour cause l'AUTO-INTOXICATION intestinale.
principalement dans les maladies de la peau : Eczémas, Furonculose, Acnés, Urticaires Herpès, etc.

Doses et mode d'emploi. — 3 à 4 comprimés après les repas du matin, de midi et du soir. Chaque comprimé correspond à 0 gr. 30 d'alumine lactique et 0 gr. 05 phosphate de chaux. Pour les enfants ; 1/2 dose.
Les comprimés peuvent être avalés à la façon d'une pilule ou délayés dans un peu d'eau.

Laboratoires LONGUET
34, rue Sedaine — PARIS (XI[e])

FARINE LACTÉE DIASTASÉE SALVY

Composition. — Produit français : farine de céréales sélectionnées, additionnée de sucre et de lait, effectivement diastasée sous un contrôle scientifique rigoureux.

Dose. — De 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à soupe par prise, suivant l'âge.

Propriétés. — Aliment diastasé, prédigéré, homogène, entièrement digestible et assimilable.

Indications. — Aliment spécial du premier âge, avant, pendant et après le sevrage.

Particularité. — Veiller soigneusement au mode de préparation des bouillies : cuire à feu doux dans l'eau, 8 à 10 minutes en remuant constamment, pousser à l'ébullition, ajouter ensuite le lait dans la proportion convenable. On obtiendra ainsi la bouillie semi-liquide prédigérée.

Société SAFALASA
4, rue Lambrechts, Courbevoie (Seine).

FARINES MALTÉES JAMMET

Farines maltées de céréales et de légumineuses, préparées avec des grains sélectionnés, moulus et blutés, de manière à conserver l'intégralité des éléments minéraux combinés, des céréalophosphates et des vitamines.

Propriétés. — D'une digestibilité parfaite, grâce aux diastases actives que la germination développe dans les grains, elles sont très facilement assimilables, très nutritives sous un volume réduit, et très reconstituantes. Leur diversité permet de répondre à toutes les exigences et d'éviter l'inappétence résultant de l'emploi d'un seul et même aliment.

Indications. — *Enfants* : Elles sont parfaitement adaptées aux besoins de l'enfant, dont elles facilitent le sevrage. Elles suppléent à son insuffisance digestive naturelle tout en laissant aux organes la participation nécessaire à toute bonne assimilation. Elles permettent de graduer et varier son alimentation, lui procurant, à chaque âge, tous les éléments nécessaires à son parfait développement.

Adultes : Elles se recommandent aux adultes, dont la nutrition est viciée ou ralentie, leur offrant une alimentation rationnelle et une suralimentation effective, sans fatigue ni surcharge gastriques.

Nomenclature. — D'après leur composition et leurs propriétés, on peut les classer en 4 catégories :

1° *Farines très légères* (enfants à partir du 6e mois) : Arrow-root, Crème de Sagose, Féculose, Rizine, Aristose (à base de blé et d'avoine).

2° *Farines légères* (enfants à partir du 11e mois) : Cérémaltine (arrow-root, blé, maïs, orge). Cacaose, Orgéose, Gramenose, (avoine, blé, maïs, orge). Bléose.

3° *Farines plus substantielles* (enfants à partir du 15e mois) : Avenose, Zéose, Castanose, Bananose, Seigiose.

4° *Farines très riches en matières azotées* (enfants à partir du 18e mois) : Crème de Pois, Aricose, Lentilose et Nucléose.

Mode d'emploi. — Elles se préparent au lait, au bouillon de céréales Jammet, de Légumocéréal, s'utilisent en bouillies, potages, purées, crèmes, gâteaux.

Établissements JAMMET
POUILLARD et ses Fils,
Docteurs en Médecine et Pharmaciens,
47, rue de Miromesnil — PARIS (VIIIe).

FARINE DE MALT HEUDEBERT

Compos. — La **Farine de malt HEUDEBERT**, produit de la mouture de l'orge germée, est à la fois riche en diastases et en vitamines.

Avantages. — Une bouillie bien maltée est à moitié digérée. La farine de malt doit être employée de préférence aux extraits liquides, pâteux ou secs, dont une partie importante des ferments est détruite pendant la fabrication.

Indicat. — Troubles de la nutrition et tous désordres du tube digestif amenant un ralentissement de l'assimilation des substances amylacées.

Mode d'emploi. — On peut en saupoudrer tous les aliments. Les bouillies ou purées, préparées avec une cuillerée à soupe de farine (de céréales ou de légumineuses), seront maltées, avec une cuillerée à café de farine de malt, 2 à 3 minutes après cuisson. Laisser un quart d'heure en contact et faire suivre d'une courte ébullition.

Produits de Régime HEUDEBERT
85, Rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)

FÉLAMINE "SANDOZ"

Association de l'acide cholique cristallisé pur et de l'hexaméthylène-tétramine

Forme. — Comprimés à 0 gr. 30.

Prop. thérap. — Opothérapie biliaire. Cholagogue, désinfectant des voies biliaires, dissolvant de la cholestérine.

Indications. — Cholélithiase et cholécystites, ictères, constipation par acholie, insuffisances hépatiques.

Posologie. — Après les repas, avaler les tablettes sans les mâcher.
1° Cas aigus : 2 à 6 comprimés. — 2° Cas chroniques : 3 à 4 comprimés par jour.
Traitement : 15 jours par mois et pendant plusieurs mois de suite (cholélithiase).

PRODUITS SANDOZ
3 et 5, rue de Metz — PARIS (X°)
Dépôt général et vente :
USINE des PHARMACIENS de FRANCE
125, rue de Turenne — PARIS (III°)

FER BRAVAIS

(nouvelle formule)

Formule. — Ions de Fer catalysé actifs.

Composition. — Solution colloïdale de Fer à 30,00 % et de Manganèse catalyseur à 0,50 %.

Propriétés thérapeutiques. — Fer colloïdal, à l'état simple, infiniment divisé par le manganèse catalyseur, assimilable sans réactions internes.

Indications. — Appauvrissement du sang et toutes ses conséquences. Anémie. Chlorose. Débilité. Dysménorrhée. Fièvre des pays chauds. Formation de la jeune fille. Incontinence d'urine. Leucorrhée. Neurasthénie, etc.

Dose. — X à XX gouttes (une goutte par année d'âge) à chaque repas dans de l'eau sucrée.

Examen du Sang
avant et après le traitement
par le Fer Bravais.

(moyenne de très nombreux cas).

	Avant.	Après.	Augmentation.	Diminution.
Globules rouges.	3.500.000	4.500.000	30 %	
Globules blancs.	7.150	6.500		10 %
Hémoglobine . .	60 %	85 %	40 %	

Laboratoires
Cte René de GRAUWE
Pharmacien de 1re classe,
16, rue de Rocroy — PARIS, Usine à St-Denis.

FER LARCADE

Composition. — Combinaison d'hydrate ferrique et d'acide organique, associée aux principes toniques et aromatiques des oranges amères.

Forme. — Liqueur d'un goût agréable et d'une très faible teneur en alcool.

Action. — Favorise la formation des hématies, augmente leur richesse en hémoglobine.

Indications. — Spécifique de tous les états anémiques, des cachexies chroniques.

Mode d'emploi. — Un verre à liqueur (2 cuillerées à soupe) au commencement des deux repas.

Paul ROUX
151, rue Lafayette — PARIS

FER OVARINE VITALIS

Composition. — Pilules composées, à base d'extrait d'ovaire, de fer et de manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Excitant de la sécrétion interne de l'ovaire déficient, régénérateur des globules rouges.

Indications. — Anémies, Puberté, Ménopause, Asthénie nerveuse, Obésité, Dysménorrhée.

Échantillons et Notice documentaire sur demande

Laboratoire de la FER-OVARINE VITALIS
38, Boulevard de Charonne — PARIS
BEAULIEU, pharmacien,
Ancien Interne des Hôpitaux

FEROXAL BUISSON

Granulé de protoxalate de fer
(0 gr. 10 par cuillerée à café)
combiné à des phosphates alcalins.

Prop. thér. — Hyperglobulise et minéralise. Tolérance absolue par le tube digestif. Action rapide et non constipante.

Indications. — Celles des ferrugineux et des phosphates : Anémies diverses. Prétuberculose. Chlorose. Anémie des jeunes enfants. Grossesse. Allaitement. Convalescence.

Dose. — Une à deux cuillerées à café à chaque repas.

Etablissements Albert BUISSON
F. JALOT & Cie
157, rue de Sèvres — PARIS
R. C. Seine 222.705 B

FERROCODILE ET FERRICODILE

Cacodylate Ferreux — Cacodylate Ferrique

Indic. thérap. — Spécifiques de l'Anémie et de la Chlorose, Malaria, Anémie palustre, etc... Tous les avantages des sels ferreux et ceux de l'arsenic organique. Le Cacodylate Ferrique est le seul sel de fer agissant très bien en injections hypodermiques, qui, faites intra-musculaires, ne sont pas douloureuses.
Préparations réellement supérieures dans les infections des pays chauds.

Doses et mode d'emploi. — *Ferrocodile* :
Pilules à 0,025 : 4 par jour aux repas.
Ferricodile : Ampoules à 0,01. Une injection par jour pendant huit jours : repos un temps égal, reprise en alternant jusqu'à guérison.

Docteur M. LEPRINCE
62, rue de la Tour — PARIS (XVI^{e})

FERROPHYTINE CIBA

Phosphate de fer colloïdal

Sel ferrique neutre de l'acide inosito-phosphorique, contenant 7,50 % de fer et 6 % de phosphore, ces deux éléments sous forme très assimilable. — Stimulant de l'hématopoïèse et excitant des fonctions cellulaires, la *Ferrophytine* est le médicament type des états anémiques et chloro-anémiques accompagnés de dénutrition.

Indic. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Scrofulose, Croissance défectueuse.

Médicament toujours bien toléré.

Doses. — Adultes : 3 cachets ou 3 cuillerées à café de granulé. Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café de granulé.

La boîte de 30 cachets : 14 francs.
Le flacon de granulé : 16 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

FLUDIOSE
à l'Iodure de Manganèse

Composition.

Iode, Tanin, Lactophosphate de chaux, Fer, Iodure de manganèse, Méthylarsinate de soude, Vanille et Cacao.

Forme pharmaceutique.

Sirop de goût très agréable, Infermentescible, ne constipe pas.

Indications.

Lymphatisme, Rachitisme, Prétuberculose, Scrofulose, Mal de Pott, Cyphose, Lordose, Scoliose, Chétivité, Troubles de la croissance, Paresse, Glandes, Ganglions, Impétigo, Engelures.

Mode d'emploi et doses.

En plus des autres éléments constitutifs, chaque cuillerée à café contient : 1 cg. 25 d'Iodure de Magnèse pur et 2 mmgr. 5 de Méthylarsinate de soude.
Enfants de 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.
3 à 6 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.
6 à 12 ans : 2 cuillerées à potage par jour.
12 à 16 ans : 3 cuillerées à potage par jour.
Se prend pur ou dans un peu d'eau avant ou pendant les repas.
La **Fludiose** est le plus puissant succédané de l'huile de Foie de Morue.
Par son Iodure de Manganèse, la Fludiose dépasse toutes les préparations iodotanniques.

Prescrire.

Fludiose : 1 flacon.

LABORATOIRE DE MÉDECINE EXPÉRIMENTALE
1 et 3, rue de Malherbe, Beauvais (Oise).

FLUODYLE

Sérum fixo-tonic

Le Fluor est l'élément fixateur du phosphore pour la constitution du noyau cellulaire. (Arm. Gauthier.)

Forme. — Ampoules.

Composition. — Une ampoule renferme :

Fluorure de sodium	0,001
Hypophosphite de manganèse	0,001
Cacodylate de soude	0,15
Sulfate de strychnine	0,002
Sérum physiologique	2 c mc

Indolore.

Indic. — Déminéralisation, convalescence, affections pulmonaires, anémie, surmenage, neurasthénie, amaigrissement, paludisme.

Mode d'emploi. — Pendant 10 jours consécutifs faire une injection sous-cutanée, se reposer pendant 10 jours et recommencer une nouvelle série de piqûres.

Établissements SABATIER
A. EMPTOZ, Pharmacien
10, rue Pierre-Ducreux — PARIS-XVI[e]

FONDANT DE COLA DAUSSE

(Saccharolé-Fondant) titré à 0 gr. 50 d'Extrait de Cola stabilisée par dose (ou 5 gr. de saccharolé).

Toni-nervin et *toni-musculaire* présentant l'activité entière de la noix de cola fraîche (stabilisée par le procédé **PERROT-GORIS**).

Indications. — *Adynamie, asthénie, surmenage physique et intellectuel, convalescence des maladies infectieuses.*

Posologie. — ADULTES : 1 à 4 cuillerées à café par jour en moyenne et davantage si nécessaire. En cas d'effort à exécuter, ingérer la cola une heure au préalable et répéter la dose si l'effort doit durer.

FONDANT IODOTANNIQUE DAUSSE

Granulé à base de *Tormentillo-tanin*, tanin physiologique essentiellement assimilable. Remplace avantageusement l'huile de foie de morue et les préparations antiscorbutiques.

Indications. — *Lymphatisme, scrofule, arthritisme, emphysème, rhumatismes, obésité, eczéma, impétigo.*

Posologie. — La teneur en iode dissimulé du Fondant Iodotannique étant la même que celle du sirop iodotannique du Codex, sa posologie est la même.

ADULTES : 5 à 6 cuillerées à café par jour.

ENFANTS : jusqu'à 15 mois ½ à 1 cuil. à café p^{r} jour.
3 ans 1 à 2 — — —
5 ans 2 à 3 — — —
12 ans 4 à 5 — — —

FONDANT MANGANO FERREUX

Puissant excitant cytoplasmique et nucléaire par le *Manganèse*, vecteur d'oxygène et stimulant de l'hématopoïèse par le *fer*, ce saccharolé active les phénomènes de nutrition et favorise la régénération du sang.

Indications. — Tous les états anémiques : *anémie, chlorose, convalescences, pertes sanguines.*

Posologie. — ADULTES : 1 à 3 cuill. à café p^{r} jour. ENFANTS : de ½ à 2 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot; PARIS (VI^{e}).

FORCIVAL

Aliment nutritif et fortifiant

Composition. — Concentration des meilleurs aliments naturels : farines de céréales et de légumineuses maltées, sucre, cacao. Aucun médicament surajouté.

Forme. — Farine d'un goût très agréable.

Mode d'emploi. — Bouillie délicieuse à l'eau ou au lait

Propriétés. — Aliment léger et substantiel, reconstituant énergique, reminéralisateur d'une grande digestibilité.

Indications. — Suralimentation chez les enfants, les adultes et les vieillards.

Laboratoires du FORCIVAL
6, rue Bridaine — PARIS

FORMADERMINE

(Ether méthylénique du Gaïacol)

Traitement spécifique des plaies atones

Sous l'action de la FORMADERMINE, les plaies anciennes, grises, sans tendance à la cicatrisation, bourgeonnent rapidement et le processus de réparation se développe remarquablement.
La FORMADERMINE est, à la fois, un :

Antiseptique
Antiprurigineux
Analgésique
Epidermisant — Désodorisant

Principales indications. — Toutes plaies atones, brûlures, gelûres, ulcères variqueux, eschares sacrées, ulcérations par compression, dermatites fessières des nourrissons, etc.
(Thèse MALLEIN-GERIN, Paris 1923)
Présentée en flacons poudriers.

Laboratoire des Produits
USINES DU RHONE
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII[e])

FORMINE ADRIAN

Composition. — Hexaméthylène tétramine rigoureusement pure.

Mode d'action. — Antiseptique urinaire, hépatique et intestinal.

Indications. — Néphrites, cystites, prostatites, uréthrites, phosphaturies, calculs. — Hépatites, cholécystites, angiocholécystites, fermentations intestinales, entérite chronique, etc...

Formes.

Comprimés : dosés à 50 centigr., deux à quatre par jour.

Ampoules : dosées à 0 gr. 50 et 1 gr. une à deux par jour.

Sel cristallisé : flacons de 50 gr., 100 gr. 250 gr. pour formules.

ADRIAN & Cie.

9 et 11, rue de la Perle. — PARIS.

FORMOCARBINE

Composition :

Association du **Charbon Animal pur**, ultradivisé, **absolument privé de Cyanogène**, à la **Formine** (Hexaméthylènetétramine cristallisée).

Forme pharmaceutique :

Granulé friable, aromatisé, agréable au goût avec ou sans addition de Benzonaphtol :

Formocarbine simple.
Formocarbine naphtolée.

Les granulés de Formocarbine ne sont pas durs à la dent, fondent très bien dans la bouche, se désagrégent instantanément dans l'eau.

Propriétés :

Antiseptique Interne de choix. Pouvoir absorbant et adsorbant considérable.

Indications thérapeutiques :

Infections Gastro-Intestinales. — Dyspepsie, Fermentations, Entérites, Flatulences, Putréfactions intestinales Stase intestinale, Auto-intoxication, Maladies Infectieuses, Colibacillose.

Infections Biliaires. — Désinfecte par la **Formine** la Vésicule et les canaux en même temps que son **Charbon animal** absorbe les bactéries intestinales montant au foie par la Veine porte en ses diverses origines.
Angiocholites, Angiocholécystites, Lithiase biliaire, Tuberculose des voies biliaires Hépatisme.

Infections Urinaires. — Toutes les infections urinaires, rénales, vésicales, cystite, Pyélonephrites, Urétérites, Prostatites.

Posologie :

1 à 2 cuillerées à café après les repas à croquer ou à délayer dans un peu d'eau. Par demi-cuillerées à café chez les enfants.

Prescrire :

Formocarbine simple ou Formocarbine naphtolée : 1 flacon.

Il est à remarquer que la Forme Naphtolée ne provoque jamais de constipation.

Laboratoire de MÉDECINE EXPERIMENTALE

1 et 3, rue Malherbe, Beauvais (Oise)

Echantillons et littérature à la disposition de MM. les docteurs.

FORMO-VACCINS OU VACCINS LUCINIA

préparés d'après la méthode du Professeur Costa.

Les Formo-vaccins sont des suspensions dans du sérum physiologique d'éléments bactériens cultivés sur milieux spéciaux et fixés par la Formaldéhyde.

Ce qui assure : 1° une activité toujours égale ; 2° une conservation indéfinie ; 3° la neutralisation complète des toxines ; 4° la lyse très lente des cellules dans l'organisme.

Il en résulte les avantages suivants : 1° vaccins atoxiques ; 2° vaccins indolores ; 3° ni réaction, ni choc colloïdal ; 4° maximum de puissance d'immunisation.

Toutes variétés de Vaccins.

Laboratoires LUCINIA
154 *bis*, rue Breteuil — MARSEILLE

FORMYL

Composition. — Solution alcoolique incolore de formol et de menthol.

Propriétés. — Bactéricide, désinfectant, antiprurigineux, anesthésiant, non toxique, d'odeur agréable et de conservation indéfinie.

Mode d'emploi. — Vaginites, métrites, leucorrhées, salpingites, plaies de toute nature, hygiène intime de la femme : 1 cuillerée à café dans un litre d'eau. Laryngites, pharyngites, plaies buccales, hygiène de la bouche, 30 gouttes dans 1 verre d'eau bouillie.

Laboratoire du FORMYL
23, Rue Valery-Meunier — PAU

FORTOSSAN CIBA

Phytine spéciale pour les nourrissons

Sel sodique neutre de l'acide inosito-diphosphorique (principe phospho-organique végétal). Médicament phosphoré très assimilable, spécialement préparé pour la pratique infantile.

Indicat. — Rachitisme, ostéomalacie, retard du développement et de la dentition scrofulose et tuberculose infantile. Convalescence des maladies infectieuses, etc.

Doses. — Poudre s'administrant avec le lait du biberon ou les bouillies, à la dose de une à deux cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

La boîte : 8 fr. 50

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

FOSFOXYL CARRON

PHOSPHORE COLLOIDAL

A l'état de terpénol hypophosphite de sodium.

Formes. — Fosfoxyl *sirop* : sirop opalin anisé, goût agréable.
Fosfoxyl *pilules* : petits grains couleur de jade, très faciles à avaler.
Fosfoxyl *liqueur* : liquide opalin glycériné menthé spécialement destiné aux diabétiques.

Dosage. — 10 cmc de formes liquides (soit une cuillerée à dessert) ou 4 pilules contiennent 0 gr. 10 de colloïde chimique exprimé en terpénol hypophosphite sodique et équivalent à 13 milligrammes de phosphore blanc.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de la dépression nerveuse et mentale, stimulant et tonique du système nerveux central. Modificateur de la nutrition et de l'assimilation. Apéritif créateur d'énergie physique et mentale.

Indications. — Maladies du système nerveux, maladies de la nutrition. Dépressions nerveuses et mentales, Impuissance, Surmenage, Neurasthénie, Psychasthénies, Convalescence, Anémie, Tuberculose, Diabète, Rachitisme, Arthritisme, Rhumatisme, Fatigues cérébrales ou physiques exagérées, Périodes d'entraînement, de préparation à des examens ou concours.

Contre-Indication. — Etat congestif aigu.

Mode d'emploi. — Dose moyenne : une cuillerée à dessert (10 cmc) de liqueur ou sirop, étendue d'eau ou d'un liquide froid quelconque ou 4 pilules, avant les deux principaux repas. Si le malade est très excité ou dans le cas d'insomnie nerveuse, commencer par une cuillerée à café ou 2 pilules.

Dans le cas de dépression accentuée, doubler la dose moyenne.

Prescrire **Sirop de FOSFOXYL CARRON**
ou **Pilules de FOSFOXYL CARRON**
ou **FOSFOXYL LIQUEUR**
afin d'éviter les substitutions.

Laboratoire du FOSFOXYL
69, rue de St-Cloud — CLAMART (Seine)

CARRON, Pharmacien de 1re classe,
ancien Pharmacien-Chimiste de la Marine.

FOSYLS CARRON

Terpénolhypophosphites minéraux.

Reminéralisateurs chimiques physiologiques assimilables directement.

Modificateurs de la Nutrition et de la Composition chimique des Tissus.

Tous ces nouveaux corps — création des Laboratoires CARRON — possèdent les propriétés dynamiques et trophiques du phosphore sur le système nerveux et sur la nutrition générale, mais chacun d'eux, en raison de la base qu'il contient, présente en outre une électivité d'action particulière qui conditionne sa prescription dans les diverses affections. Ils ne sont ni toxiques ni irritants et ont été reconnus parfaitement assimilables.

Les corps de cette série actuellement à la disposition du Corps médical sont :

Les Terpénolhypophosphites de Calcium, de Magnésium, de Manganèse et de Cuivre. Tous sont présentés sous forme de comprimés lenticulaires dosés à cinq centigrammes (1).

Dénomination	*Mode d'emploi*	*Titre*
CALCOFOSYL $(C^{10}H^{16}PO^3)^2Ca$ Terpénolhypophosphite de Calcium.	4 à 8 comprimés par jour. (Sirop pour enfants).	13,19 % de Phosphore. 8,51 % de Calcium.
MAGNÉSOFOSYL $(C^{10}H^{16}PO^3)^2Mg$ Terpénolhypophosphite de Magnésium.	4 à 8 comprimés par jour.	13,65 % de Phosphore. 5,28 % de Magnésium.
MANGANOFOSYL $(C^{10}H^{16}PO^3)^2Mn$. Terpénolhypophosphite de Manganèse.	4 à 6 comprimés par jour.	12,57 % de Phosphore. 11,34 % de Manganèse.
CUPROFOSYL $(C^{10}H^{16}PO^3)^2Cu$ Terpénolhypophosphite de Cuivre.	2 à 4 comprimés par jour.	12,57 % de Phosphore. 12,77 % de Cuivre.

Littérature et échantillons sur demande aux

Laboratoires CARRON

Rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

(1) N. B. — Les Terpénolhypophosphites de Fer, de Lithium, d'Urane, de Plomb et de Quinine ont été également obtenus dans les Laboratoires CARRON ; ils ont actuellement à l'étude.

FREINIX

Association Chlorh. de Papavérine et Adrénaline en solution isotonique (Ampoules de 1 cent. cube) pour injections sous-cutanées.

Propriétés thérap. — Freine le Pneumogastrique. Excite le Sympathique.

Indications. — Asthme, Emphysème, Asthme et Rhume des foins. Spasmes viscéraux. Tous les phénomènes liés à l'hypervagotonie.

Mode d'emploi et Doses. — Une injection sous-*cutanée* de 1/2 cc. à 1 cc. suffit à juguler une crise d'asthme en quelques minutes.

Le *Freinix* peut également être employé en pulvérisations nasales dans le rhume des foins, en particulier.

Établissements Albert BUISSON
F. JALOT & Cie
157, Rue de Sèvres — PARIS (XVe)
R. C. Seine 222.705 B.

FUCOBILINE

(comprimés)

le médicament du foie insuffisant

Composition. — Extrait biliaire dépigmenté et décholestériné, associé aux cholagogues végétaux et à l'agar-agar.

Forme. — Comprimés glutinisés et dragéifiés.

Posologie. — Avaler sans croquer 1 ou 2 comprimés à chaque repas (dose moyenne).

Indications. — Tous les cas d'insuffisance Hépatique et Biliaire, toutes les manifestations de l'Hépatisme.

Laboratoire L. PROTHIÈRE
55, Rue Auguste-Comte — LYON

FUCOSINE

Traitemen efficace de la Constipation habituelle.

Compos. — Agar-agar, extrait de rhamnées.

Propriétés. — Mucilagineux, émollient, cholagogue ; véritable aliment du constipé ; innocuité absolue.

Formes et Posologie :

Paillettes. 1 à 3 cuillerées à café
Poudres.. 1 à 3 mesures
Cachets .. 1 à 3 cachets
à chaque repas régulièrement

Indications. — Constipation habituelle, quelle qu'en soit l'origine.

Laboratoire L. PROTHIÈRE
55, Rue Auguste-Comte — LYON

FURONCULASE

Médication interne actuellement la plus efficace contre toutes les suppurations à staphylocoques dont elle empêche les récidives.

Composition. — Combinaison de chlorolactate de potassium ferrique associé à une forte proportion de coculus palmatus (colombo). Pilules enrobées dans une mince enveloppe de gluten, de manière à assurer la désagrégation de la masse dans le milieu intestinal sans provoquer la moindre action irritante sur une portion quelconque du tube digestif.

Propriétés thérapeutiques. — Agit : 1° par une action spécifique sur le foie. 2° par son pouvoir oxygénant sur les globules en activant l'action phagocytaire. — 3° par une action nettement antiputride sur le tube digestif.

Indications. — Anthrax, Acnés, Orgelets, Abcès, Furoncles, Phlegmons, certaines Dermatoses, toutes les Staphylococcies et les diverses intoxications d'origine gastro-intestinale.

Posologie. — Dose journalière : Adultes, 6 pilules, 2 avant chaque repas ; enfants, 2 à 3 pilules, 1 avant chaque repas.

Complément indispensable à la méthode des vaccins, la Furonculase ne présente aucune contre-indication : Elle ne contient ni sucre, ni alcool, ni produit toxique.

Laboratoires DALET
94, boul. des Batignolles — PARIS (XVII[e])

GADUAMINE

Composition.

Extrait total opothérapique de foie frais de morue (avec sa vésicule biliaire) obtenu par un procédé spécial.

Action.

Reconstituant, antirachitique, antibacillaire par le phosphore, l'acide morrhuique, les vitamines A et D. — Antitoxique et antihémolytique par la cholestérine et l'extrait hépatique.

Avantages.

Plus actif que l'huile de foie de morue, pas de goût ni d'odeur, pas d'intolérance digestive, volume réduit.

Indications.

Croissance, grossesse, allaitement. Chlorose, rachitisme, convalescence, prétuberculose, tuberculose, etc...

Mode d'emploi.

Enfants : 10 à 40 gouttes par jour.
Adultes : 50 à 60 gouttes par jour.

Laboratoires RENARD
142, Avenue de Clichy — PARIS

GADUASE

Succédané classique de l'huile de foie de morue.

Composition. — Hypophosphites de sodium et de calcium (stabilisés par la glycérine), toniques nervins, antirachitiques et reminéralisateurs, stimulants de la nutrition.

Méthylarsinate disodique (0,015 par cuillerée à soupe), reconstituant des tissus nerveux et sanguins

Iode (en combinaison tannique parfaitement stable et inaltérable) régulateur du métabolisme et antifectieux de premier ordre.

Convient à tous les âges, aucune incompatibilité.

Excipient. — Sirop framboisé très agréable, se prend en toute saison.

Indications. — Anémie, anorexie, lymphatisme, affections pulmonaires, asthénie, etc...

Posologie. — Pure ou dans un peu d'eau, avant ou après les repas.

Nourrissons : demie à une cuillerée à café prodie. *Enfants :* deux à trois cuillerées à café. *adolescents et adultes :* deux à trois cuillerées à soupe.

Flacon : 9 fr. — Grand flacon : 15 fr.

Laboratoires SERVIER
25, rue Eugène-Vignat, Orléans.

GALABACTÉINE

La Galabactéine est une culture de bactéries lactiques sélectionnées en milieu protéino-lacto-sérique.

Forme. — Présentée en tube scellés de 10 c. c.

Indications. — Toutes infections intestinales et autres intoxications d'origine digestives, métrites, vaginites, pansement des plaies.

Mode d'emploi. — 1° Prendre le contenu de 2 tubes, le matin, à jeun, dans une tasse d'eau sucrée.

2° Enfants jusqu'à 3 ans : 1 tube dans de l'eau sucrée par la bouche ou en petit lavement.

3° En pansement lorsqu'il s'agit d'une infection externe.

Laboratoires LUCINIA
154 *bis*, rue de Breteuil — MARSEILLE

GALACTOGIL

Extrait titré maltosé phosphaté de Galéga. Granulé à base d'extrait de malt, extrait de galéga stabilisé, phosphate tricalcique, cumin, fenouil, etc.

Indications :

Allaitement. — Insuffisance lactée. — Montée laiteuse tardive. — Reprise de l'allaitement. — Nourrissons déficients.

Mode d'emploi :

Trois fois par jour, une ou deux cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de tisane et persister à donner le sein avec régularité.

Associé aux **Diases Progil**

Farines fraîches diastasées de céréales et de légumineuses (voir page n° 206) les résultats obtenus sont des plus remarquables.

PROGIL
Société anonyme au capital de 50 000 000 de francs.
10, Quai de Serin, Lyon (IV°)
6, Boulevard de Strasbourg, Paris (X°)

GALFORM LAMBIOTTE FRÈRES

Pastilles à l'Aldéhyde Formique

Prop. thérap. — Réalisent l'asepsie du rhino-pharynx sous une forme commode, agréable et inoffensive ; au fur et à mesure qu'elles se dissolvent dans la bouche, leur principe formolé se dégage à l'état naissant, communiquant à la salive ses actives propriétés germicides.

Indications. — 1° Prophylaxie des maladies infectieuses ; 2° Remède curatif des angines, amygdalites, stomatites, rhino-pharyngites, laryngite ; 3° Hygiène de la voix.

Mode d'emploi. — 1 pastille 4 à 5 fois par jour et, au besoin, toutes les heures ou 1/2 heures. La laisser fondre lentement dans la bouche.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES
3, rue d'Edimbourg — PARIS (VIII[e])
124, avenue Rogier — BRUXELLES

GALYL

Spécifique de la Syphilis

Indications. — Syphilis, Fièvre récurrente, Pian, Maladie du sommeil.

Formes. — Ampoules pour injections intraveineuses, injections intramusculaires et injections sous-cutanées.

Posologie. — Débuter avec 0 gr. 15 et passer progressivement à 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50 suivant les malades.

Établissements MOUNEYRAT
12, Rue du Chemin-Vert
à VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine)

GAMBÉOL

Principe actif.

Protochlorure de mercure léger et dissociable, nouveau sel mercuriel (Proto-Gambier).

Propriétés.

Se dissocie dès sa mise en contact avec les tissus, en mercure métal et oxyde de mercure à l'état colloïdal, sans formation de sublimé.

S'absorbe très facilement tout en s'éliminant lentement. Donc jamais d'accumulation, jamais de décharge brusque, jamais d'accidents d'intoxication.

Est plus actif que tous les autres composés mercuriels, même que le calomel, et est beaucoup moins toxique.

Est à la fois microbicide, décongestionnant du foie, hypersécréteur biliaire, antiparasitaire.

Indications.

Syphilis acquise ou héréditaire de l'adulte et de l'enfant, à toutes les périodes. Congestions hépatiques. Insuffisance biliaire. Infections intestinales. Ulcères stomacaux spécifiques. Efficace contre les oxyures.

Formes et Posologie.

1° Cachets à 1 cent. 2 ou 3 ch. j.

2° Cartouches de pommade pour frictions à 50 °/₀

Adultes..... 1 ch. j.
Enfants. Fractions suivant âge

3° Suppositoires adultes à 10 cent. 1 ch. j.
— enfants à 5 cent. 1 ch j.

Le Gambéol est adopté par le Ministère de l'Hygiène.

J. GAUTIER'' Pharmacien de 1re classe.

24, rue de Ponthieu, Paris (VIIIe).

GARDENAL

Phényl-éthyl-malonylurée

Poudre blanche, insipide, très peu soluble dans l'eau.

Indications. — Hypnotique et sédatif du système nerveux, spécialement indiqué dans l'**Epilepsie**, ainsi que dans la Chorée, les Convulsions, les états anxieux, certaines formes d'asthme, etc.

Mode d'emploi, Posologie. — Comprimés à 0 gr. 10, 0 gr. 05 et 0 gr. 01. Chez l'adulte, 1 à 4 comprimés à 0 gr. 10 par 24 heures. Chez l'enfant, doses réduites selon l'âge. Surveiller le traitement et éviter la suppression brusque du médicament.

Littérature sur demande

Les Établissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (IIIe)

R. C. Paris 5386

GASTRICINE DU Dr E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait opothérapique, liquide, de muqueuses fraîches, d'estomacs de porcs et de caillettes de veaux.

Renferme tous les éléments naturels du suc gastrique organique, ses ferments lab, pepsine, et toutes les zymases enlevées à la muqueuse gastrique.

Indications. — Affections organiques de l'estomac. Cas de souffrance de l'organe (insuffisance gastrique par excès ou par défaut).

Mode d'emploi. — A un 1/2 verre d'eau ajouter une cuillerée à café de gastricine.

Prendre une gorgée *de temps en temps* pendant *le repas*.

Doses. — 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Laboratoires du Dr E. DUHOURCAU

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

Anciennement, 10, rue de Turenne — PARIS (IVe).

GASTROCALCINE

Forme. — Granulé.

Composition :

Carbonate de chaux.....	0 gr. 40
Carbonate de magnésie.....	0 gr. 20
Bi-carbonate de soude.....	0 gr. 20
Sucre anisé, q. s. pour.....	5 gr.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café, immédiatement après les principaux repas, ainsi qu'au moment des crises.

Indications. — Dyspepsies, Dilatations de l'estomac, Hyperchlorhydrie, Pyrosis.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1re Classe de l'Ecole Supérieure de Paris.

17, rue Cadet — PARIS

GASTROCAOL

Pansement gastrique

Composition. — Parties égales de Silicate hydraté pur d'Alumine et de Silicate hydraté pur de Magnésie, lavés, étuvés, stérilisés, porphyrisés.

Forme. — Poudre insoluble, en sachets de 20 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — Réalisant le plus parfait des pansements gastriques, *peut* et *doit* remplacer dans cet usage les Sels de Bismuth :

Mêmes indications — Plus efficace,
Mêmes doses — Jamais toxique,
Même mode d'emploi — 6 fois moins coûteux.

Indications. — Pansement gastrique. — Hyperchlorhydrie. — Ulcères de l'estomac et du Duodénum — Spasmes du Pylore. — Aérophagie. — Dyspepsies douloureuses. — Hémorragies du Tube digestif. — Diarrhées aiguës. — Diarrhée des tuberculeux. — Dysenteries bacillaires et amibiennes. — Etats cholériformes.

Doses. — 1° Moyennes : 20 gr. par jour (un sachet) en une ou trois fois.

2° D'entretien : 10 grammes par jour en une ou trois fois.

3° Exceptionnelles : 100, 150, 200 grammes par jour dans les états cholériformes.

Mode d'emploi. — En suspension dans de l'eau pure, sucrée ou non, soit le matin à jeun en une fois, soit en 3 fois, avant chacun des repas principaux.

Prix. — 12 fr. pour un minimum de traitement de 12 jours.

Laboratoire de la Sulfoleïne ROZET
BENDERITTER, Pharmacien à VENDOME
(Loir-et-Cher).

GASTRO-SODINE

Trois Formules. — Trois Prescriptions par C. à S.

1° Bicarbonate de soude.... 2
Phosphate de soude..... 1
Sulfate de soude..... 0.50
} chimiquement purs et desséchés

Prescrire « GASTRO-SODINE »

2° Bicarbonate de soude.. 2
Phosphate de soude..... 1
Sulfate de soude..... 0.50
Bromure de sodium..... 0.25

Prescrire « GASTRO-SODINE » Formule B

Sulfate de soude..... 2
Phosphate de soude..... 1
Bicarbonate de soude.... 0.50
} chimiquement purs et desséchés

Prescrire « GASTRO-SODINE » Formule S

Forme unique. — Granulé soluble.
Dose. — 1 cuillerée à café, tous les matins à jeun dans un verre d'eau, de préférence chaude
Indications. — Tous les états Gastro-Intestinaux et Hépatiques.

ODINOT, Pharmacien
21, rue Violet — PARIS

GASTROTHÉRIB

Suc gastrique naturel liquide.
Sans odeur, actif, inoffensif.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les dyspepsies hypopeptiques et hypochlorhydriques, digestions lentes, ballonnements, Inappétence des tuberculeux, des convalescents, des grippés, des coloniaux hépatiques, des neurasthéniques. Vomissements incoercibles de la grossesse. Chez l'enfant et le nourrisson, pendant la période critique de réalimentation, après entérites, diarrhées infantiles, colites.

Doses. — De 4 à 15 cc. chez l'adulte à doses croissante selon effet, de 1 à 4 cc. chez l'enfant au-dessous de 10 ans et selon effet (un quart d'heure avant le repas). De 40 gouttes à 3 cc. chez le nourrisson (un quart d'heure avant chaque tétée).

LA BIOTHÉRAPIE
3, rue Maublanc — PARIS (XV^e^).
Tél. : Ségur 05-01.

GAUROL

Nouveau sel phosphoré et calcique entièrement assimilable.

3 formes. — Ampoules injectables de 1 cc.
Comprimés.
Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant. Récalcifiant intensif par autofixation dans les tissus, du phosphate tricalcique naissant et colloïdal.

Indications thérapeutiques. — Tous les états pathologiques médicaux et chirurgicaux, où l'amaigrissement et la déminéralisation très marqués demandent à être rapidement jugulés.

Mode d'emploi. — 1 ampoule par jour, en injections sous-cutanées.
1 à 3 comprimés par jour, suivant l'âge.
1 à 3 cuillerées à café de granulé, par jour, suivant l'âge.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUCQ
Courbevoie (Seine).

GAZE NÉOLÉE

Demi-grasse, antiseptique, non adhésive.

La *Gaze Néolée*, constituée d'un tissu à mailles assez lâches dont les fibres sont imprégnées d'un corps gras rendu stérile par l'adjonction d'essences antiseptiques (Niaouli, Thym, etc.), est à la fois perméable aux liquides aqueux tout en n'adhérant pas aux tissus. Elle réalise les trois conditions du pansement des plaies (brûlures, ulcères, escarres, amputations, etc) :

1° Ne pas coller, de façon à éviter : douleurs, saignement et arrachement des jeunes cicatriciels, cause de réinfection et de retard dans la cicatrication.

2° Être perméable, de façon à permettre l'évacuation des divers suintements de la plaie et éviter la rétention du pus.

3° Ne pas gêner ou détruire l'action thérapeutique, des médicaments utilisés pour les pansements.

Laboratoires BOTTU
35, rue Perzolèse — PARIS (XVI°). Passy 43.49

GELAGAR

Médication nouvelle des *Gastropathies*.

Composition. — *Agar, Agar*, Gélatine, Silicate de Magnésie.

Forme. — Sachet de 20 gr. de poudre insoluble.

Indications. — Tous les états dérivant de l'hyperacidité et de l'hypersécrétion gastrique

Avantages. — Il *ne constipe pas*. Action rapide et durable.

Prix très modique : 12 fr. la boîte de 20 paquets.

Posologie. — Deux paquets par jour dans un 1/4 de verre d'eau, en deux fois, ou au début des crises.

Ulcus constitué : 4 à 5 paquets **à la fois** dans 1/2 verre d'eau.

M. A.

Établissements WOLLACKER et Cie
31, rue Saint-Georges — PARIS

GELOCALCINE

Composition. — Phosphate de chaux gélatineux aminé en suspension, à l'état de division extrême.

Assimilation presque totale.

Indications. — Croissance, dentition, ossification, lymphatisme, affection des os, prétuberculose, tuberculose.

Forme. — Elixir.

Doses. — *Adultes :* une à deux cuillerées à soupe avant les principaux repas.

Enfants : demi-dose.

LABORATOIRES J. KRIEGER
121, avenue de Saint-Ouen,
PARIS (XVIIe).

GÉLOGASTRINE LICARDY

granulé ou tablettes.

A base de Gélose Gélatine et Kaolin purifié. Réalisation pratique de la thérapeutique par le pansement gastrique à l'*exclusion de tous narcotiques, alcalins ou astringents.*

Posologie. — *Traitement des douleurs de l'estomac:* 1/2 cuillerée à soupe de *granulé*, ou *2 tablettes*, au moment des crises douloureuses et à n'importe quelle heure de la journée.

Traitement de l'Hyperchlorhydrie et de l'Ulcère gastrique : 1/2 cuillerée à soupe de *granulé*, ou *2 tablettes*, le matin à jeun, le soir avant de se coucher et une demi-heure avant chacun des principaux repas.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS

Téléphone : Maillot 17-75.

GÉLOIDE STALYS DU Dr WAGON

But et principe :

Application pratique aux affections cutanées des propriétés d'un bactériophage antistaphylococcique multivalent.

Composition :

Filtrat bactériophagique antistaphylococcique..... 1 000 milliards
Orthoquinoléine sulfonate de potasse. 0 gr. 25
Excipient soluble dans l'eau..... 1 kilog.

Indications :

Toutes staphylococcies cutanées :
Furoncles, Anthrax, *Acné*, *Sycosis*, Impétigo, Eczémas suintants, Intertrigo, Pyodermites, Otites externes. Ulcères variqueux.

Mode d'emploi :

Étaler une mince couche sur la zone malade, compresse, pansements.
Renouveler les 2e et 3e jours.
Éviter l'usage concomitant de tout antiseptique.

Résultats :

Disparition des troubles inflammatoires en 2 à 4 jours.

Remarques. — *a*) Pour l'*acné* et le *sycosis*, un traitement d'entretien doit suivre les premières applications qui, d'ailleurs, se font à la manière d'une crème de beauté appliquée chaque soir et chaque matin après toilette.
b) Pour les vastes placards d'épidermite, limiter les premières applications à une surface restreinte de la dimension d'une pièce de 2 francs pour éviter les inconvénients pouvant résulter d'une bactériolyse trop intense.

Établissements SIDEPAL
64, rue de la Boétie — PARIS (VIIIe

GÉLO-PANSEMENT BYLA

(cutané, cutanéo-muqueux)
suivant la technique de Jausion et Diot.

Composition. — Géloses vaccinées par la culture de germes pyogènes.

Indications thérapeutiques.

Gélo-pansement cutané (ampoules et *compresses*) : traitement de *toutes les plaies septiques ou non*, anthrax, furoncles pyodermites, phlegmons, etc...
Gélo-pansement cutanéo-muqueux : ulcérations génitales, chancres mous, suppuration des muqueuses, etc...

Mode d'emploi. — 1° *Ampoules* : Plonger l'ampoule fermée dans l'eau bouillante, jusqu'à fusion complète de la gelée. Laisser *refroidir* au voisinage de la température ordinaire. A l'aide de la lime, couper le col de l'ampoule au ras de l'épaulement. Verser le contenu soit sur une compresse stérilisée, soit sur le foyer infecté lui-même. 2° *Compresses* : à appliquer directement sur le lieu de l'infection, après les avoir trempées un instant dans l'eau bouillie chaude.

Les Établissements BYLA,
26, avenue de l'Observatoire, Paris.
C. Seine 71895.

GÉLOR

Lubrifiant et régulateur de l'intestin

Composition. — Émulsion solidifiée d'une finesse microscopique et de stabilité parfaite, de 60 p. 100 *d'huile de paraffine* chimiquement pure et de haute viscosité dans de *l'agar-agar* et du *suc d'oranges douces*.

Propriétés. — Gélor cumule les avantages de l'huile de paraffine et du mucilage sans en avoir les inconvénients: suintements, saveur huileuse, digestion pénible.

Indications. — Traitement de la constipation sous toutes ses formes.

Son goût très agréable, sans aucune saveur huileuse permet au malade d'absorber l'huile de paraffine *sans s'en douter* (la composition n'étant pas publiée).

Posologie. — Doses quotidiennes à prendre aux repas:
Bébés : 1/2 cuillerée à café.
Enfants : 1 à 2 cuillerées à café selon l'âge.
Adultes : 2 à 6 cuillerées à café.

Échantillons sur demande adressée aux

Laboratoires A. CESBRON

63, rue de la Faisanderie — PARIS (XVI[e])

GÉLOTANIN

Nature. — Tannate de gélatine.
Poudre blanche, inodore, insipide, insoluble, dans l'estomac, dissociable dans l'intestin en ses éléments antidiarrhéiques : tanin et gélatine.
Indications. — Toutes diarrhées non infectieuses. Aucune contre-indication.
Formes pharmaceutiques et posologie. — 1° Pour nourrissons et jeunes enfants : *Paquets* de 25 cgr. : 1/2 à 3 paquets par jour en suspension dans du lait ou tout autre liquide tiède, mais non pas chaud ;
2° Pour adultes : *Cachets* dosés à 50 cgr. : 4 à 8 par jour.
Pour formuler, prescrire : Cachets ou Paquets de Gélotanin : 1 boîte.

Laboratoire CHOAY
48, Rue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e^)
Téléph. : Auteuil 44-09 et 44-10

GÉLOTUBE 29

(nom, forme et dispositif déposés)
protège contre les maladies vénériennes.

Composition :

Le Gélotube 29 contenant la pommade au cyanure de mercure, — thymol, — calomel (formule de M. le Docteur GAUDUCHEAU) est le désinfectant le plus puissant et le plus efficace que l'on connaisse aujourd'hui pour se protéger à la fois contre la syphilis et la blennorragie après qu'on s'y est exposé.

Présentation :

En boîtes contenant 6 GÉLOTUBES 29 (pour 6 applications). Un mode d'emploi accompagne chaque objet,

C. DAVID-RABOT et ses Fils,
Dr. en Ph^ie^. — Ph^iens^ Ex-Int^es^ des Hôp. de Paris.
Agent G^l^ pour la Belgique : **M. CRÉTIN,** Ph^ien^.
8, rue des Eburons — Bruxelles.
49, rue de Bitche, Courbevoie (Seine).

GELSÉMIUM DAUSSE

(gouttes)

Extrait de *Gelsemium sempervirens* titré chimiquement et contrôlé physiologiquement.

Modérateur du système nerveux central.

Indications. — *Nervosisme, névroses* (Hystérie, épilepsie, chorée), *céphalées* persistantes, *toux, crises angineuses.*

Posologie. — ADULTES : X à XII gouttes, 3 fois par jour, avant les repas.

ENFANTS : II gouttes par année d'âge, par doses fractionnées.

Les doses précédentes peuvent être continuées pendant 15 à 20 jours et reprises, en cas de nécessité, après repos de 8 à 10 jours.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IVe).

GENATROPINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Dyspepsie Hyperacide. Douleurs intestinales. Sueurs des tuberculeux.

Entérite muco-membraneuse.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = un mmgr. Granules au 1/2 milligr. Ampoules à 2 milligr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour ou quatre à dix granules par jour. Dose injectable de deux à six milligrammes.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IVe)

GENESERINE

Polonovski et Nitzberg
Salicylate de Généserine

Formes. — Granules et dragées au 1/2 milligr. Gouttes (Solution au millième). Ampoules.

Indications. — Traitement du syndrome solaire et en particulier des dyspepsies hypochlorhydriques nerveuses. Excitant des sécrétions et de la motilité du tube digestif. Spécifique des troubles sympathiques.

Mode d'emploi. — La dose moyenne est de six dragées ou granules par jour. Si l'on prescrit les gouttes, on en donnera XX avant chaque repas, LX par jour. Les injections sous-cutanées sont surtout indiquées dans les cas de crises douloureuses intenses, contre l'angoisse et l'insomnie persistante des dyspeptiques.

Injecter une ampoule tous les jours pendant les cinq premiers jours, puis une ampoule tous les deux jours.

LABORATOIRE AMIDO
A. BEAUGONIN, pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV[e])

GENHYOSCYAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Etats spasmodiques en pathologie digestive. Chorée. Tremblement mercuriel et de causes diverses. Delirium tremens.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = un mmgr. Granules au 1/2 milligr. Ampoules à 2 milligr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à six granules par jour, ou injecter une ampoule par jour.

Laboratoire AMIDO
A. BEAUGONIN, pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV[e])

GENOSCOPOLAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications :
ÉTATS PARKINSONIENS Paralysie Agitante, Syndromes, Post-encéphalitiques, Anesthésie chirurgicale.

Formes : Gouttes : XX gouttes = un mmgr. Granules au 1/2 milligr.
Ampoules dosées à 3 milligr. et à un mmgr.

Mode d'emploi : XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à dix granules par jour. Anesthésie chirurgicale : Quatre granules la veille de l'opération.
Trois quarts d'heure avant l'opération une ampoule de Génoscopolamine suivie de l'injection d'un centigr. et demi de morphine.

Laboratoire AMIDO
A. BEAUGONIN, pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IVe)

GENOSTRYCHNINE

Polonoveki et Nitzberg.

Indications. — Système nerveux. Paralysies diphtériques. Paralysies bulbaires Cœur et circulation. Alcoolisme. Asthénie. Neurasthénie. Affections oculaires.
Formes. — Gouttes : XXX gouttes = 5 mmgr. Granules à 0 gr. 002.
Ampoules à 0,01.
Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à dix granules par jour.
Dose injectable : une ampoule par jour.

Laboratoire AMIDO
A. BEAUGONIN, pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IVe)

GERMOSE

Gouttes à base de Fluoroforme et de Bergénite. Non toxique. Goût agréable.

Indications. — Employée contre la coqueluche dont elle arrête très rapidement l'évolution et évite les complications si graves.

Calme rapidement la Toux (sans en excepter la Toux sèche émétisante des tuberculeux), la Toux spasmodique, quinteuse, les crises d'asthme, les Toux opiniâtres.

Hâte la guérison des affections des voies respiratoires : Bronchites, Trachéo-bronchites, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Grippes pulmonaires, etc., etc.

Propriétés. — Microbicide, antiseptique des voies respiratoires, puissant antispasmodique, sédatif. Combat efficacement l'infection.

Agit sur le symptôme Toux et sur l'affection qui le provoque. N'est pas toxique et n'a aucune action nuisible sur les fonctions digestives, propriétés précieuses qui permettent de prescrire directement la *Germose* aux nourrissons atteints de bronchites, de coqueluche, etc., etc., dans un peu de lait ou simplement dans de l'eau sucrée ou non.

Forme. — Gouttes concentrées : 1 gr. (46 gouttes) contient 1/10 de centimètre cube de fluoroforme stabilisé et 0 gr. 30 de bergénite.

Doses habituelles dans les 24 heures. — Jusqu'à 1 an, 4 fois 10 gouttes ; de 1 à 3 ans, 4 fois 25 gouttes ; de 3 à 12 ans, 4 et 6 fois 30 gouttes ; au-dessus, 4 et 6 fois 40 gouttes. A prendre dans une ou deux cuillerées d'eau ordinaire ou sucrée ou un peu de tisane.

Nota. — Le médecin peut prescrire, sans inconvénient, la *Germose* à des doses plus élevées ; il doit même le faire si les résultats ne lui paraissent pas suffisamment rapides.

Dans tous les cas, les doses doivent être prises aussi régulièrement que possible, toutes les deux ou trois heures par exemple, sans tenir compte des accès de toux ou des quintes.

Aucune contre-indication.

Laboratoire MOREAU
7, rue d'Hauteville — PARIS

Laboratoire et Dépôt
Pharmacie Centrale de France,
21, Rue des Nonnains d'Hyères — Paris (IV e).

GLOBUGENOL CHANAL

Médication
stimulante néophosphorée type

Composition. — Arrhénal, acide nucléinique, vanadium, fluorure de calcium, glycéros, kola, sels de chaux assimilables, strychnine.

Formes. — Présenté sous quatre formes différentes (formules alternées).

Posologie :

Tubes .....1 injection par jour.
Cachets .....2 cachets —
ELIXIR .....2 gobelets —
Granulé .....2 mesures —

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant énergique, récalcifiant rationnel, rénovateur cytoplasmique, agent hématopoiétique puissant.

Indications. — Anémies, convalescence, états dépressifs, surmenage, asthénies diverses, neurasthénie, affections pulmonaires, chlorose, diabète, paludisme, phosphaturie, rachitisme, pré-tuberculose, suites opératoires obstétricales.

Observations. — Les cachets ne contenant pas d'arrhénal permettent une médication intercalaire récalcifiante et pratique, le cachet se déboîtant facilement. Enfants : 1/2 dose.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoires COMTOS
FESCHES-LE-CHATEL (Doubs)

GLOBULES ROMON

Forme. — Globules glutinisées.

Compos. — Extraits orchitique, prostatique et de moelle épinière joints à la strychnine, à l'Yohimbine et au phosphure de zinc pur.

Indications. — Traitement le plus rationnel de l'impuissance.

Dose. — 4 à 6 globules par jour.

Observation. — La même formule existe également en ampoules : *Ampoules Romon.*

Dose. — Une injection tous les 2 jours.

Laboratoires ROMON
6, Rue Bridaine — PARIS

GLOTTYL

Composition. — Association d'Eresymum, Euphorbia Pilulifera, Coca, faibles doses de Belladone et d'Aconit.

Forme pharmaceutique. — Gouttes.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionne la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique, fluidifie et favorise les secrétions, Eclaircit la voix, arrête la toux, calme la dyspnée.

Indications. — Laryngites aiguës et chroniques. Trachéïtes, bronchites. Toux coqueluchoïdes.

Posologie. — Enfants : 10 à 20 gouttes, 2 à 3 fois par jour. Adultes : 40 à 60 gouttes, 4 à 6 fois par jour, dans un peu d'eau ou de tisane chaude.

Prix : 9 francs

Laboratoires DENIS
35 *bis*, rue du Ranelagh — PARIS (XVI[e])
Téléphone : Auteuil 13.80

GLUTÉOKINA

Composition. — Comprimés dosés rigoureusement à 0 gr. 20 de chlorhydrate neutre de quinine enrobé dans une double enveloppe de gluten kératine.

Avantages. — **Pas d'action nocive sur l'estomac.**
Dissolution intégrale dans l'intestin.
Dosage rigoureux.
Pas de saveur.

Indication. — Paludisme et tout emploi de la quinine.

Mode d'emploi. *(Paludisme.)*
A titre préventif : 1 comprimé matin et soir.
A titre curatif : 2 premières semaines, trois jours de suite, 5 comprimés matin et soir.
2 semaines suivantes, trois jours de suite, deux comprimés, matin et soir.

Laboratoire Th. MAZURE
3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e^)

GLYCÉROPHOSPHATE DALLOZ

Granulé dosé à *0,50* de Glycérophosphate de chaux, chimiquement pur, par cuillerée à café.

Indications. — Reconstituant minéralisateur. Tonique nervin. — Médicament des enfants ; des mères pendant la période de l'allaitement ; des déprimés.

Dose. — 1 ou 2 cuillerées à café par jour, à croquer ou à dissoudre dans un peu d'eau.

Laboratoire DALLOZ
13, Bd de la Chapelle — PARIS (X^e^).

GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Comprimés effervescents dosés à 0,25 centigr. par unité.

Granulé dosé à 0,30 centigr. par cuillerée-mesure.
Ampoules injections dosées à 0,10 centigr. par ampoule 1 cc.

Doses et mode d'emploi. — Granulé ou comprimés : 1 gr. par jour en 2 fois dans un peu d'eau ; ampoules 1 à 2 cc. ou 3 fois par semaine.

Prop. thér. — Reminéralisateur physiologique. Ne fatigue pas l'estomac. Son emploi continu ne présente aucun inconvénient.

Indications. — Dans tous les cas de déminéralisation phosphorée et d'asthénie nerveuse.

Laboratoires M. ROBIN
13, Rue de Poissy — PARIS

GLYCOCARPINE

Élément actif. — Nitrate de pilocarpine associé à la dose de 2 mmgr. par pilule à de faibles quantités d'extraits végétaux (hamamelis et cimicifuga).

Indications

1re groupe. — Vertiges des artérioscléreux. — Ictus. — Hypertension artérielle et ses conséquences. — Troubles congestifs de la ménopause et de la puberté. — Glaucome. — Bourdonnements.

2e groupe. — Troubles vago-sympathiques par insuffisance du vague. — Asthme. — Coqueluche. — Rhume des foins. — Ozène. — Pelade.

Mode d'emploi. — Adultes : 2 pilules au début des trois repas.

DALIN, pharmacien de 1re classe.
49, quai Saint-Vincent, LYON

GLYCOJASOL

Eau antiseptique dérivée de l'Hojasol.

Composition :

Eucalyptol.	0,30	Estragol.....	0.05	1000, »
Linalol.....	0,20	Acides gras volatils.	0.28	
Anéthol....	0,05	Eau distillée..	989,07	
Eugénol....	0,05	Glycérine.....	10, »	

Indications. — En gargarismes dans les Laryngites, Trachéites, Infections de la gorge, Lavage des plaies, Pansements humides.

En gynécologie, pour injections vaginales, petits lavements modificateurs et soins intimes de la femme.

Mode d'emploi. — Lavage des plaies et pansements humides ; Gargarismes ; Petits lavements modificateurs : 1/3 Glycojasol avec 2/3 d'eau bouillie.

Soins intimes de la femme : une cuillère à soupe ou deux pour un litre d'eau bouillie.

Laboratoire de l'HOJASOL
à CHARS (S-et-O.)
Gros et Exportation :
Dépôt : 19, rue Ferdinand-Duval, PARIS (IV^{e}).

GLYCO-LACTIMASE

Description. — Association symbiotique de bacille lactique Bulgare et de bacille glycobacter, en comprimés de 0 gr. 50, 40 comprimés par flacon.

Action thérapeutique. — Le bacille glycobacter transforme les matières amylacées en sucres et fournit par conséquent un milieu de culture éminemment favorable au bacille lactique, dont l'activité se trouve ainsi considérablement renforcée.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour, dans les intoxications intestinales, diarrhées, entérites, affections du foie.

Laboratoires Ch. COUTUTIEUX
18, Avenue Hoche — PARIS

GLYCTONE PHOSPHATÉE CHARRIÈRE

Zomothérapie

Forme. — Liquide.

1° *Simple :*

Composition.—Ferments musculaires, Corps Immunisants, Albuminoïdes spécifiques et Vitamines des muscles frais, Matériaux salins vitalisés phosphatiques, Hémoglobine, du Plasma de bœuf additionné de sucs de cerise et de framboise, Saccharose.

Dose. — *Après les repas :*

Enfants : 3 à 6 cuillerées à café ou à dessert par jour suivant âge.

Adultes : 3 à 6 cuillerée à soupe *pure ou non de préférence dans de l'eau froide gazeuse* ou du lait froid.

2° *Strychn-Arsinée*

ou Glyctone phosphatée « *S* » :

Composition :

Glyctone Phosphatée simple...	500 cc.
Arséniate de soude.....	5 centigr.
Glycérophosphate de soude.....	5 grammes.
Sulfate de strychnine.....	8 milligr.

Dose. — De 1 à 3 cuillerées à café, à dessert ou à soupe suivant âge et prescriptions médicales *après* les repas.

Indications. — Anémie, Chlorose, Convalescence, Grossesse et Allaitement, Épuisement musculaire, Surmenage, Rachitisme, Tuberculose, Misère physiologique et Déchéances physiques carentielles.

Contre-indications. — Albuminurie, Diabète et Artério sclérose.

L. ARQUEVAUX

Pharmacien à Étampes (S.-et-O.).

Dépôt. — Office commerciale pharmaceutique, 71, rue du Temple, et 43, rue des Francs-Bourgeois, à Paris (IIIe), et dans ses succursales d'Alger, Bordeaux, Lyon, Rennes, Rouen.

GLYKOLAINE ROBIN

Association de la kola
aux glycérophosphates.

Granulé.

Dose et mode d'emploi :

1 à 2 cuill. à café par repas.

Indications :

Stimulant du système nerveux, Surmenage, Névralgies, Neurasthénie.

Laboratoires M. ROBIN
13, Rue de Poissy
PARIS

GLYPHOSPHER

Élixir non sucré, à très faible degré alcoolique, à base de Glycérophosphates chimiquement purs :

Glycérophosphate de Soude cristallisé
— Fer
— Quinine
— Strychnine

Stimulant de la nutrition chez les surmenés, neurasthéniques, convalescents, anémiques.
Réminéralise l'organisme, reconstitue la cellule nerveuse :
Asthénie, anémie, chlorose, phosphaturie, névralgies faciales et sciatique, hystérie.
Sa composition permet d'en recommander l'emploi dans le diabète.

GIVAUDAN-LAVIROTTE
56, Chemin de Combe-Blanche — LYON

GMET

(Produits Gmet)

Extraits végétaux, liquides concentrés **sans alcool, ni sucre, ni éther,** par un procédé spécial n'altérant pas la plante (Extraction totale).

CORRESPONDENT tous à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

SE PRESCRIVENT tous : de 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau froide après ou entre les repas, ou un peu avant. Dose habituelle : 1 seule cuiller à café par jour.

BOLDO	HYDRASTIS
COCA	JUGLAND
COMPOSÉ	KOLA
CONDURANGO	PISCIDIA
CRATÆGUS	QUINQUINA
FRÊNE	SAUGE
FUCUS	ULMAIRE
GUI	VALÉRIANE
HAMAMELIS	VIBURNUM

Littérature de chaque produit et échantillon sur demande adressée à :

Laboratoire GMET

27, Faubourg Montmartre, PARIS (IX^{e})

R. C. 214. 484. B.

GOBÉROL

Eau oxygénée en poudre et comprimés.
Gobérol tarit Leucorrhées.

Présentat. — Poudre, comprimés, sachets, Savon. Suspendu et Ovule.

Compos. — (Perborate de soude, Menthol).

Propr. — Soluble instantanément dans l'eau chaude à 38°, 48° en donnant une solution d'H^2O^2 faible, mais à l'*état naissant alcaline et isotonique*.

Avantages. — Pas d'intolérance. Ni toxique, ni corrosif, ni salissant, ni acide. Tous les avantages de l'H^2O^2 sans en avoir les inconvénients. *Titre fixe, alcalinité, état naissant* qui donne une suractivité que le Professeur A. Robin évalue de 1 à 5.

Indic. — Injection alcaline, oxygénée, isotonique et analgésique : Toilette journalière. Gynécologie, Leucorrhée, Vulvite, Vaginite. Prurit, etc.

Posologie. — *Solution normale* : une mesure ou un sachet ou 1 comprimé (pour 2 litres d'eau chaude à 38°-40°). — *Solution forte* : deux mesures ou deux comprimés ou 2 sachets (pour 2 litres d'eau chaude à 38°-40°).

A. CHARMAISON
Pharmacien de 1re Classe de l'Université de Paris
35, avenue de Royat — CLERMONT-FERRAND

GOMENOL

Essence provenant d'une variété sélectionnée de Melaleuca viridiflora.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, anticatarrhal, désodorisant, hautement diffusible. Toxicité et causticité nulles.

Action thérapeutique et usages. — Préconisé, à l'intérieur, comme balsamique et anticatarrhal. Convient spécialement aux affections chroniques des voies respiratoires : Bronchites, bronchectasies, tuberculose. On le prescrit utilement dans l'urétrite et la cystite. — A l'extérieur, il est surtout employé en inhalations et pulvérisations dans le coryza, les laryngites, les bronchites, la coqueluche; en pansements chirurgicaux dans les cas de brûlures, plaies septiques, ulcères, furoncles, phlegmons; en pansements vaginaux dans les métrites. — L'OLÉO-GOMENOL à 5 % est un bon antiseptique nasal non irritant. — Sous forme d'OLÉO-GOMENOL, il est donné en injections intra-musculaires (tuberculose, infections généralisées) et intra-trachéales (laryngite tuberculeuse, bronchite fétide, tuberculose pulmonaire); en instillations intravésicales (cystites).

Laboratoire du GOMENOL
17, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IXe)

GOSIERINE " DALLOZ "

Formule % :

Cocaïne.....	0,05
Menthol.....	0 40
Borate de soude...	4,00

Forme.
Dragées.

Propriétés. — Analgésiques, antiseptiques et antispasmodiques.

Action. — Antisepsie de la bouche et des voies respiratoires, soulagement immédiat et guérison des aphtes, gingivites, amygdalites, laryngites, angines, etc...

Doses. — 6 à 8 dragées par jour, pour les adultes.

Laboratoire DALLOZ
13, boulevard de la Chapelle — PARIS

GOUTTES ANTISPASMODIQUES DAUSSE

A base de benzoate de benzyle et de Gelsémium.
X gouttes = 0 gr. 04 de Benzoate de Benzyle
et II gouttes de gelsémium Dausse.

Indications. — Tous les états spasmodiques : *asthme vrai, coqueluche, hoquet persistant, affections spasmodiques du tube digestif, coliques utérines, vomissements de la grossesse, crises vasculaires des hypertendus.*

Posologie. — ADULTES. XX à XL gouttes par prise, répétées suivant les cas, 4 ou 5 fois par jour ; à prendre dans un peu d'eau sucrée ou de lait.

ENFANTS : X gouttes par jour et par année d'âge.

GOUTTES PHOSPHOSTHENIQUES DAUSSE

Administration de la strychnine, par voie gastrique, à doses progressives, en association avec l'acide phosphorique officinal.

XX gouttes renferment :
un milligramme de sulfate de strychnine ;
III gouttes d'acide phosphorique officinal ;
deux centigr. d'extrait de quina,
deux centigr. d'extrait de Coca.

Indications. — Asthénie, atonie nerveuse, Neurasthénie, adynamie des convalescents. Dépression nerveuse, surménage physique et intellectuel.

Posologie. — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C. et même CC. gouttes par repas. *Eviter tout arrêt dans l'administration progressive* du médicament.

GOUTTES ARSÉNOSTHÉNIQUES DAUSSE

Association de la Strychnine par voie gastrique à doses progressives, avec le méthylarsinate de soude.

XX gouttes renferment :
un milligramme de sulfate de strychnine ;
cinq milligrammes de méthylarsinate de soude ;
deux centigrammes d'extrait de quina ;
deux centigrammes d'extrait de cola stabilisée.

Indications. — Atonie nerveuse, asthénie, amaigrissement, neurasthénie, adynamie.

Posologie. — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C. et même CC. gouttes par repas. *Eviter tout arrêt dans l'administration progressive* du médicament.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot — Paris (IV^e^).

GOUTTES FLUXINE

XX gouttes =
0,01 centigr. d'intrait de marron d'Inde Dausse.
IV gouttes d'alcoolat. concent. d'anémone.
IV gouttes de teinture de noix vomique.
en combinaison inaltérable, radio-activée par les rayons ultra-violets.

Propriétés. — Vasoconstricteur énergique. Tonique de la paroi vasculaire, stimulant ovarien, sédatif utérin.

Indications. — Stases sanguines, inflammations de l'utérus et du bassin, inflammations veineuses : métrorragies, dysménorrhée, aménorrhée, hémorragies du retour d'âge, règles douloureuses, varices, hémorroïdes, phlébite, ulcères variqueux, etc.

Mode d'emploi. — Dix gouttes à la fois dans un peu d'eau sucrée ou non, dose à renouveler 2 à 3 fois par jour avant les repas.

J. BONTHOUX
pharmacien de 1re classe
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône)

GOUTTES LIVONIENNES
DE TROUETTE-PERRET

Capsules de goudron de Norvège, de Créosote de Hêtre et de Baume de Tolu.

ndications. — Rhumes, toux, bronchites, catarrhes, tuberculose, maladies des voies respiratoires, antisepsie des voies digestives.

Le meilleur moyen de faire tolérer la créosote. Médicament préventif et curatif.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 8 gouttes livoniennes de Trouette-Perret par jour *au milieu des repas.*

Bien spécifier : GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET, pour éviter les contrefaçons.

Laboratoires TROUETTE-PERRET
15, Rue des Immeubles-Industriels
PARIS (XIe)

GOUTTES NICAN

(sans sucre)

Composition. — Bromoforme et codéine purs, Aconit, belladone, drosera grindelia, benzoate de soude, eau de laurier-cerise.
(4 gouttes — 1 goutte de Bromoforme stabilisé)

Caractéristiques. — Effet rapide et persistant, souvent surprenant. Tolérance parfaite. Pas de contre-indications.

Incompatibilité. — Tabac dont l'usage retarde la guérison.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif, décongestif, antispasmodique très puissant et fidèle.

Posologie. — A absorber loin des repas dans un liquide tiède eau, grog ou lait qu'on agitera en y ajoutant les gouttes.

1° Toux des tuberculeux, asthme, rhume des foins, etc. — (Calme et repos immédiats).

Grippe, *Toux* spasmodique, — (Succès immédiat, jugulation complète en quelques jours, souvent en quelques heures).

Doses initiales. — Adultes 240 gouttes.
Enfants. 12 gouttes par année.
A prendre en 4 fois dans les 24 heures.

2° Coqueluche. — (Amélioration immédiate. Jugulation complète en moins de 15 jours).

Doses initiales. — Adultes, 120 gouttes.
Enfants, 18 gouttes par année.

A prendre en 3-4 fois, après une quinte. Augmenter progressivement pendant les huit premiers jours.

Consulter la posologie détaillée par âge, dans la notice jointe au flacon.

N. B. — En cas de recrudescence des quintes ou de somnolence accentuée, cas excessivement rares, interrompre le traitement pendant 24 heures. Puis continuer la progression ascendante, si nécessaire.

Se méfier des contrefaçons
Échantillons et Littérature

Laboratoires CANTIN
PALAISEAU (S.-et-O.) France
Ch. Schœffer, 34, rue du Canada, Bruxelles.

GOUTTES PILKA

(Pilka Golaz ou Thymipin)

Composition :

Les gouttes *Pilka* sont exclusivement composées des dialysés de thym, grassette et drosera (absolument sans danger pour les nourrissons).

Propriétés :

Action élective spéciale due à des ferments.

Indications :

A recommander dans la *coqueluche* et les *toux convulsives* des enfants et des adultes, ainsi que les *affections des bronches* en général : bronchite, pneumonie, asthme.

Mode d'emploi :

On donne le matin à jeun et le soir en se couchant : une à deux gouttes de *Pilka* aux nourrissons, deux à quatre gouttes aux enfants au-dessus de cinq ans, et cinq à dix gouttes aux adultes.

Laboratoire "ZYMA"
4, rue Bellart — PARIS (XV^e^)

GOUTTES SCANDINAVES

à l'essence de sève de pin, au gaïacol, au goudron pur.

Forme. — En capsules gélatineuses légères et très digestes. *Plus de 30 ans de pratique et de succès.*

Propriétés. — Antisepsie des voies respiratoires par l'essence de sève de pin.

Indications. — Toux, rhumes, bronchites à toutes les périodes, catarrhes, emphysème, tuberculose chronique.

Dose. — 6 à 8 capsules par jour, dont 3 à 4 avant chaque repas.

Laboratoire du D^r^ H. PHILIPPE
14, rue du Palais-Grillet — LYON

GOUTTES DE SERÛ

Extrait total et concentré des galbules de cupressus sempervirens.

Indications. — Vaso-constricteur et tonique puissant du système veineux. — Spécifique *efficace sûr et constant* des varices, ulcères variqueux, périphlébites, *hémorroïdes*, varicocèles et des *troubles de la ménopause*.

Dose moyenne. — 30 gouttes avant chacun des deux principaux repas.

LETTRY

69, rue de Sèvres — PARIS

GRAINS CÉPHALGIFUGES

AU
JASMIN DE VIRGINIE
CURATIFS DES NÉVRALGIES REBELLES
EN UNE SEMAINE
PAR
MÉDICATION SYNERGIQUE ORGANO-VÉGÉTALE
PRÉPARATION MÉDICINALE FRANÇAISE

(Marque déposée)

COMPOSITION

FORMULE

Poudre de racines de **Gelsémium sempervirens**	0 gr. 05
Poudre de racines d'**aconit des Vosges**.....	0 gr. 01
Extrait mou de **quinquina jaune**.....	0 gr. 05
Cholestérine pure (*).....	0 gr. 01
Poudre de rac. de piscidia et cimicif. ga, ensemble.	0 gr. 02
Extrait mou de colombo, gentiane et quassia, ens.	0 gr. 03

Excipient spécialement étudié. Q. S. pour un **grain** dragéifié.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

NÉVRALGIES REBELLES DE LA TÊTE et de LA FACE
Tous les types de névralgies en général.

MODE D'EMPLOI ET DOSES

Se prennent au cours ou en dehors des repas.
Adultes : **1 grain matin et soir** durant **7 jours consécutifs**
Pour doses supérieures prendre avis du médecin.

DÉLIVRÉS EN FLACONS DE 14 GRAINS

Laboratoire des Produits médicinaux spécialisés.

L - M - D

A. ROLLAND, Pharmacien de 1re classe.
12, rue d'Aguesseau — PARIS (VIIIe) Tél. ; Élysées 91-90

GRAINS DE VALS

Podophyllin 0,01
Cascara et Bourdaine (extr.) aa 0,025
Belladone (extr.) 0,01

Dose et mode d'emploi :
1 à 2 le soir avant ou au milieu du repas.

Prop. thér. :
Laxatif, régulateur de l'intestin, ne donnant pas de coliques.

Indications :
Constipation, embarras gastrique.
Pas de contre-indications.

Laboratoire H. NOGUÈS
11, Rue Joseph-Bara — PARIS (VIe)

GRANIONS DE FOUARD

Colloïdes organo-métalliques chimiquement purs préparés suivant une méthode entièrement différente de celle de Brediq.

Propriétés essentiellement nouvelles.

1° Conservation indéfinie sans altération de l'état colloïdal et des propriétés thérapeutiques.
2° Suppression de la réaction du choc.

Communications
Académie des sciences, 7 février 1927
Congrès de Lyon (avancement des sciences), 1926

Granions		
As	Tuberculoses, dermatoses, anémie, dénutrion, etc.	Ampoules de 2 cmc. voie buccale, inject. intramusculaires et intraveineuses.
Argent	Infections générales locales.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses.
Cuivre	Cancer, angiocholites cholécystites.	Ampoules de 2 cmc. voie buccale.
Bismuth	Syphilis.	Ampoules de 2 cmc injections intramusculaires et intraveineuses.
Mercure	Syphilis.	id.
Iode	Hypertension, rhumatismes, syphilis, tuberculose etc.	En ampoules de 2 cmc. pour injections, en solution pour voie buccale.
Soufre	Sciatique, rhumatismes.	En flacon : voie buccale.
Or	Tuberculose, infections, générales, locales.	Ampoules de 2 cmc. injections intramusculaires et intraveineuses.

Littérature et échantillons sur demande

Laboratoires FOUARD
61, rue G.-Laureau à MONTREUIL (Seine)
F. GAUTIER, pharmacien
Téléphone : Avron 01-42

GRANULÉ CARESMEL

Produit contenant le phosphore sous forme végétale, saturé de chaux et de magnésie, associé au carbonate de chaux fluoré et à l'oxyde de magnésium dans les proportions les plus aptes et les plus utiles à la formation du squelette et à la constitution de la cellule nerveuse.

Propriétés thérapeutiques. — D'une assimilation parfaite, stimulant des échanges nutritifs, c'est un puissant reconstituant et reminéralisateur indiqué dans tous les cas de faiblesse constitutionnelle, neurasthénie, névroses, etc., ou dans les maladies amenant l'épuisement : anémie, rachitisme, prétuberculose, tuberculose, etc.

Doses : Adultes : 1 cuillerée à café à chaque repas.
Enfants : 1/2 — — —

Le flacon 12 francs (sans impôt)

Échantillons :

Laboratoire CARESMEL
2, Quai Paul-Bert — TOURS.
Téléphone : 19-42.

GRANULÉ-DÉPURATIF VÉGÉTAL

du Dr A. Künckel.

Le dépuratif classique, sous la forme nouvelle d'un *granulé fondant* permettant d'obtenir extemporanément un sirop toujours frais. *Médicament d'ordonnance.*

Composition. — Douce-amère, patience, fumeterre, salsepareille, squine, gaïac en extraits stabilisés plus arseniate de soude.

Indications. — Toutes les altérations du sang.

Posologie. — 3 cuillerées à café par jour dissoutes dans un peu d'eau, soit 0,75 d'extraits dépuratifs et XV gouttes liqueur de Pearson.

Littérature et échantillon médical.

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
3, rue Watteau, Courbevoie (Seine

GRANULES DE PANTOFORT
du Docteur BOVEIL

Composé formé des plus énergiques stimulants, destiné à favoriser l'assimilation, à combattre la éminéralisation, le surmenage, la déchéance organique du système nerveux, la dépression générale.

Composition. — Nucléinate de Manganèse, Sulfate de Strychnine, Quassine cristallisée, Arséniate de soude.

Indications. — Surmenage physique ou intellectuel, asthénie, épuisement nerveux, lymphatisme, neurathénie, suite de grippe, convalescence, état pré-tuberculeux.

Dose et mode d'emploi. — Adultes : 3 à 6 granules par jour, 1 avant chacun des 3 repas. Enfants : demi-dose.

Échantillon et littérature sur demande.

M. PARIS, Pharmacien de 1re classe
4, rue Lassalle — LYON (La Boucle).

GRANULÉ PULMONAIRE GIRY

pour Enfants

Forme. — Granulé agréablement parfumé. *Véritable friandise* fondant instantanément dans la bouche. D'où supériorité incontestée sur les Gouttes. Sirops, Potions, etc., souvent difficiles à faire absorber.

Composition. — *Ail.* — *Tetragaïacolate* de Calcium, Grindelia, Drosera, Thym, Serpolet, Bromure, Antipyrine etc.

Propriétés. — Bactéricide. Puissant antiseptique des voies respiratoires. Modificateur et modérateur des Sécrétions bronchiques, Antispasmodique énergique Sédatif de la Toux.

Indications. — Rhumes, Toux rebelles ou quinteuses, Catarrhes des Bronches, Asthme, Toux des Tuberculeux (amélioration rapide).

Coqueluche 50 % de guérisons en 10 jours ou moins si le traitement est commencé dès le début de la maladie. En tout cas amélioration rapide.

Mode d'emploi. — Une mesure par année d'âge, soit pure en faisant boire en même temps une boisson chaude, soit délayé dans du lait, de la confiture, du sirop ou du miel.

Laboratoire GIRY
49, Rue de Metz — NANCY

GRASSYL

A base de chaton de saule frais.
Antispasmodique d'origine exclusivement végétale, dépourvu de toute toxicité.
Sédatif de l'éréthisme nerveux
Régulateur du déséquilibre neuro-végétatif.

Indications :

États spasmodiques. — Nervosisme. — Angoisses. — Palpitations. — Règles douloureuses. — Troubles de la ménopause et de la puberté. — Insomnies diverses.

Posologie :

Une à deux cuillerées à café trois fois par jour et avant de se coucher dans un peu d'eau ou une infusion.

Établissements Albert BUISSON.
F. JALOT et Cie.
157, rue de Sèvres, 157, Paris (XVe).
R. C. 222 705 B.

GRIPPOL-FORNET

Vaccin buccal antigrippal

Principe actif. — Différentes souches de microbes isolés du sang d'un grand nombre de malades atteints de Grippe et Influenza. Les microbes sont soigneusement stérilisés et dégraissés par un procédé spécial breveté en France.

Indicat. — Refroidissements, Rhume, Coryza, Grippe, Influenza et leurs complications.

Forme. — Flacon de 30 pilules.

Dose. — 1 à 3 pilules toutes les 2 heures.

Propriétés thérap. — Pris à temps, dès l'apparition des premiers symptômes, il empêche le développement de la maladie ; plus tard, fait disparaître tous les symptômes de la maladie en quelques jours.

Echantillons sur demande.

INSTITUT de MICROBIOLOGIE
SARREBRUCK

GUI BYLA

(Vaso-dilatateur, antiscléreux, antihémorragique).

Contient l'alcaloïde, les saponines et l'inosite du gui.

Propriétés thérapeutiques. — Hypotenseur par action centrale sur les vaso-dilatateurs. Dépresseur de l'excitabilité exagérée. Toni-cardiaque par action myocardique. Diurétique par action cardio-rénale.

Indications. — Artério-sclérose, hypertension cardiopathies artérielles, albuminurie, néphro-sclérose, éclampsie, hémoptysies, hémorragies, ménorragies, épistaxis, migraines.

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à café par jour.

Les Établissements BYLA
26, avenue de l'Observatoire, Paris.
R. C. Seine 71895

GUIPSINE

Principes utiles du Gui

Indic. Thér. :

Véritable régulateur du travail du cœur et de la circulation générale non vaso-constricteur.

Médication hypotensive. — Hypertension, Artério-sclérose, Hémoptysie, Goutte, Troubles de la Ménopause (Spécifique), Néphro-sclérose, Prostatisme.

Doses et Mode d'emploi :

Pilules à 0,05 : 4 à 10 par jour entre les repas.

Ampoules à 0,05 : 1 ou 2 injections par jour (réservées aux cas d'urgence).

Docteur M. LEPRINCE
62, Rue de la Tour — PARIS (XVI[e])

GUITOSE

Hypotenseur végétal aux principes actifs du *Viscum album*.

Forme et dosage. — Pilules dosées à 0 gr. 05.

Posologie. — 4 à 8 pilules par jour entre les repas.

Prix. — L'étui de 60 pilules : 10 francs.

Indications. — Artériosclérose, hémoptysie, goutte, troubles de la ménopause, néphrosclérose.

Échantillons et vente en gros :

F. CARTIER

1, rue de la Martinière — LYON

MURARD, Pharmacien

GYNERGÈNE SANDOZ

Compos. — Tartrate de l'Ergotamine cristallisée (C^{35} H^{35} N^5 O^5), principal alcaloïde isolé de l'ergot de seigle et principe actif spécifique. Produit pur, exactement dosable.

Forme. — Ampoule 1 cc de solution contenant 0 gr. 0005 de tartrate d'ergotamine, pour injection intramusculaire. Solution : 0,1% p. usage interne. Comprimés : 1 mgr. de tartrate d'ergomatine.

Propr. thér. — Le Gynergène Sandoz est **le plus puissant des hémostatiques utérins et l'inhibiteur du sympathique.** Effets constants.

Indic. — Toutes hémorragies utérines. Atonie de l'utérus. Cancer utérin. Les sympathicotonies.

Posol. — 1/2 c.c. à 1 amp. par jour. 15 à 20 gouttes ou 1 à 2 comprimés deux fois par jour.

PRODUITS SANDOZ

3 et 5, rue de Metz — PARIS (X^e)

Dépôt général et vente :

USINE des PHARMACIENS de FRANCE

125, rue de Turenne — PARIS (III^e)

11

GYNOCALCION

Forme M. — Traitement rationnel des troubles de la *Ménopause* naturelle, chirurgicale ou radiothérapique.

Forme P. — Traitement des accidents de la Puberté chez la jeune fille.

Propriétés. — Action sur le tonus du système vago-sympathique par son lactate de calcium et de manganèse; agit par son phosphore sur l'élément douleur; supplée à la déficience glandulaire par ses extraits opothérapiques.

Le *Gynocalcion P* agit en outre par son Hypophyse (lobe antérieur) sur le développement génital de la jeune fille.

Doses. — *Gynocalcion M.* — 8 à 12 dragées par jour, huit à dix jours par mois. En cas de formes rebelles, et surtout dans les ménopauses chirurgicales, deux séries par mois séparées par un repos de huit jours.

Gynocalcion P. — 8 à 12 dragées par 24 heures en série de dix jours par mois.
Effets rapides. Tolérance parfaite.

Echantillons, Littérature :

LABORATOIRES CORTIAL

15, Boulevard Pasteur. — Paris.

GYNOPAUSINE

Composition. — Association pluriglandulaire (thyroïde, ovarine) à un nouveau sel de Benzyle, le Sédobenzyl ($C_6H_5CH_2SO_3K$) antispasmodique et hypotenseur.

Propriétés thérapeutiques. — Le Sédobenzyl ($C_6H_5CH_2SO_3K$) est un nouveau sel de benzyle, c'est un produit stable, très soluble dans l'eau, non toxique aux doses habituelles, qui s'élimine aisément et qui peut être employé sans danger pendant un temps prolongé. Il a surtout une action antispasmodique, aussi a-t-il une action sédative dans les règles douloureuses, les coliques utérines et les douleurs de la métrite aiguë ou chronique.

Indication. — Insuffisance ovarienne, troubles de la ménopause et de la puberté, coliques salpingiennes ou utérines, dysménorrhée.

Dose et mode d'emploi. — 2 cachets ou 4 comprimés par jour avant les repas. Il est possible de prescrire, dans certains cas, 3 et même 4 cachets par jour, avant les repas. Le traitement doit être suivi de préférence dans les 8 à 10 jours qui précèdent l'époque des règles.

LABORATOIRE ODILIA

E. LACOMBE, pharmacien,

2, rue neuve Popincourt — PARIS (XI^e).

HAMAMELINE ROYA

Principe actif aromatique de l'Hamamélis virginica, en solution aqueuse.

Obtenue directement de la plante, contient en dilution convenable (20 cgr. p. cuil. à soupe) l'Huile Essentielle aromatique, véritable principe actif de la plante, à l'exclusion de l'extractif, inerte au point de vue vasculaire.

Propriétés. — Vasoconstricteur. Tonique des fibres lisses. Sédatif vasculaire. Stimulant circulatoire.

Indications. — Toutes les dilatations, congestions et inflammations veineuses (Varices, varicocèles, hémorroïdes, phlébites aiguës et anciennes). Troubles circulatoires utérins (Ménorragies, Dysménorrée, Accidents congestifs de la Ménopause).

Dose. — Par cuill. à soupe, 2 à 4 par jour, aux repas ou en dehors des repas.

Pierre ALEXANDRE Pharmacien
41, Rue de Rome — PARIS (VIII^{e}) — Lab. 08-00.

HAMAMÉLIODE

Combinaison stable et définie de l'iode métalloïdique aux principes totaux de l'Hamamelis Virginica.

Indications. — Maladies du système vasculaire, Varices, Hémorroïdes, Troubles de la Ménopause, Troubles congestifs de l'artério-sclérose.

1° **Gouttes concentrées** renfermant 0 gr. 04 d'iode métal. pour L gouttes d'extrait représentant son propre poids de plante.

De XXX à XL gouttes par 24 heures.

2° **Elixir** (Préparation très agréable au goût). Deux à trois cuillerées à soupe dans les 24 heures, de préférence à la fin des repas.

Laboratoire OBERLIN
J. Tinardon, Pharmacien de 1re Classe,
de l'École supérieure de Paris
17, Rue Cadet — PARIS

HAMAMELIS GRANDVAL

Forme et Composition. — Gouttes renfermant sous le plus petit volume l'activité complète de la feuille d'Hamamélis traitée de façon à fournir un produit soluble dans l'eau, possédant l'arôme tout spécial de la plante et d'une activité incomparable dans tous les cas de :

Indications. — Varices. — Hémorroïdes. — Ulcères variqueux. — Métrites. — Accidents du retour d'âge. — Hémorrhagies. — Œdème chronique. — Congestions etc., etc...

Dose. — XXX à XL gouttes avant chaque repas, 2 ou 3 fois par jour. — Dans les cas aigus, on pourra doubler la dose sans inconvénient, pendant quelques jours.

Laboratoires GRANDVAL
12-14, rue Féry — REIMS

HECTARGYRE

Spécifique de la Syphilis

Indications. — Syphilis, Paludisme.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B. Gouttes, Pilules.

Posologie. — *Adultes.* — 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours, ou 40 gouttes par jour pendant les 4 premiers jours ; ensuite 60 à 80 gouttes pendant 15 jours.
Enfants. — Moitié doses.

Établissements MOUNEYRAT
12, Rue du Chemin-Vert
à VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine)

HECTINE

Spécifique de la Syphilis
et succédané du cacodylate de soude

Indic. — Syphilis, Paludisme, Fièvre des Foins, Tuberculose, Anémie.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

Posologie. — *Adultes :* 15 ampoules pour une cure ou 2 pilules par jour pendant 15 jours, ou 60 gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite 80 gouttes pendant 15 jours.

Enfants . Moitié doses.

Etablissements MOUNEYRAT
12, Rue du Chemin-Vert
à VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine)

HÉLÉNINE DE KORAB

Spécifique de la toux

Composition. — Hélénine cristallisée obtenue par le procédé de Korab et codéïne.

Forme. — Pilules.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires. Bronchites. Emphysème. Asthme. Trachéo-bronchite. Catarrhe.

Doses. — 2 à 6 pilules par jour.

N. B. — Une seconde formule contenant deux centigrammes de créosote de hêtre par pilule est recommandée dans les cas de Bacillose.

Laboratoires CHAPÈS
12, rue de l'Isly, Paris.

HÉLITAL

Médication dynamisante et régénératrice.

Composition :

Arrhénal
Nucléinate disodique } chimiquement purs
Excipient spécial

Forme. — Dragées d'un goût exquis.

Propriétés. — Reconstituant énergique. Régénérateur physiologique normal de la cellule organique.

Action. — Sûre, rapide et facilement réglable, grâce à une posologie nettement déterminée, qui donne immédiatement : *Appétit*, *Force*, *Poids*.

Indications. — Anémie, Convalescence, Dépression, Surmenage, Toutes fatigues, Neurasthénie, Tuberculose.

Doses. — de 2 à 6 dragées par jour aux adultes.
de 1 à 3 dragées par jour aux enfants.

Laboratoire de l'HÉLITAL

Directeur : **L. Simon**, Docteur en Pharmacie
15-17, place Nationale — DIEPPE (S.-Inf.).

HÉMAGÈNE TAILLEUR

EMMÉNAGOGUE-ANALGÉSIQUE COMPLET

à effet polyvalent et immédiat.

Forme. — Dragées.

Composition. — Folliculine, Principes vaso-dilatateurs, et analgésiques sélectionnés.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant immédiat des douleurs les plus vives de la dysménorrhée et des coliques post-partum

Indication et posologie.

1° DYSMÉNORRHÉE : 2 dragées dès l'apparition des douleurs, une demi-heure après, deux autres. Maximum : 8.
2° AMÉNORRHÉE et MÉNOPAUSE : 4 à 6 dragées par jour.
3° COLIQUES POST-PARTUM : 2 dragées par heure. Maximum : 10.

Petit flacon de 12 dragées : 7 fr.
Grand flacon de 30 dragées : 12 fr.

Laboratoire SEVENET
10, rue Le Chapelais — PARIS (XVII°)

HÉMAGÉNINE GIRAUD

Médication iodo-arsénicale
phosphorée-strychnique

Doses et mode d'emploi. — Doses ascendantes et descendantes indiquées sur chaque flacon.

Prop. thér. — Lymphatisme, Adénopathie, Rachitisme, Anémie. Toutes maladies consomptives. Convalescences.

Tonique puissant, antiscrofuleux

Eugène PETIT
Pharmacien de 1re Classe
Ex-Interne des Hôpitaux de Paris
ARGENTEUIL (Seine-et-Oise)

HÉMOANTITOXINE " SOFOS "

de l'Institut du Pr E. Maragliano

Composition. — Sang de bœuf immunisé contre la tuberculose, contenant 20 % d'antitoxine Maragliano ..... 25 %
Alcool ..... 14 %
Glycérine ..... 10 %
Eau aromatique ..... 51 %

Indications. — Reconstituant spécifique du sang. Remède contre le rachitisme et la scrofulose. Préventif immunisant dans la prébacillose. Traitement spécifique de la tuberculose.

Formes et Posologie. — *Simple:* une cuillerée à potage quatre fois par jour (avant les repas). *Triple:* même dose (s'emploie dans les périodes fébriles).
Se prend pure ou mélangée avec de l'eau alcaline ou avec du sirop.

Prix : 18 fr.

Échantillons François CARTIER
1, rue de la Martinière, LYON.
MURARD, Pharmacien.

HÉMO-CYTO-SÉRUM
CORBIÈRE

Composition. — Soluté de cacodylate de sodium chimiquement pur, fer et strychnine.

Mode d'emploi. — Une injection intra-musculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, accroit la valeur globulaire.

Indications. — Anémies de toute origine. Convalescences. Chlorose. Surmenage. Troubles de la croissance et de la puberté.

Présentation. — Hémo-Cyto-Sérum pour adultes 12 ampoules de 5 centicubes.
Hémo-Cyto-Sérum infantile 12 ampoules de 2 centicubes.

LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes - PARIS – Tél. : Wagram 37-64

HEMODROME

(Berberis vulgaris. Thlaspi)

Forme. — Extrait fluide à prendre en gouttes.

Avantages. — Action supérieure à l'hamamelis et similaires. Assimilation plus rapide sous sa forme liquide que les produits présentés en pilules ou comprimés.

Indications. — Varices, Hémorroïdes, Troubles de la ménopause. Règles irrégulières, Phlébite.

Posologie. — 15 à 20 gouttes trois ou quatre fois par jour dans un peu d'eau.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III. — PARIS

HÉMODUCTYL
Pilules ou Solution

Extraits d'hamamélis, cupressus, marron d'Inde stabilisé, boldo et condurango associés aux extraits de gui et d'aubépine.

Dose moyenne. — 2 *pilules*, 1 cuillerée à café de *solution*, matin, midi et soir, avant les repas.

Indications. — Ménopause, Dysménorrhées douloureuses, Varices et Hémorroïdes, Hypertension, Bourdonnements d'oreilles.

Laboratoires LICARDY
38, Boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS
Téléphone : Maillot 17-75.

HÉMOFIXINE BRANCHU

Forme. — Comprimés drageifiés.

Composition. — Nucléinate de manganèse. Lécithine de l'œuf. Oxyhémoglobine. Méthylarsinate de soude. Quassine. Zymases.

Propriétés thérap. — Reconstituant. Régénérateur des globules sanguins et des éléments protoplasmiques.

Indications. — Etats anémiques. Chlorose. Convalescences. Surmenage intellectuel et physiqu Neurasthénie. Phosphaturie. Diabète. Bacillos

Posologie :

Adolescents	1 comprimé à midi		au
	1 —	le soir	milieu
Adultes	2 comprimés à midi		des
	2 —	le soir	repas

Pendant 20 jours par mois. Se reposer 10 jours avant de reprendre le traitement.

Laboratoires BRANCHU
4, rue Beaurepaire — PARIS (X^e^)

HÉMOGÉNOL DAUSSE

Sérum hémopoïétique de cheval.

Formes. — *Ampoules d'Hémogénol* contenant 10 cc. de sérum liquide.

Sirop d'Hémogénol à base de sérum hémopoïétique.

Dragées d'Hémogénol contenant chacune 0 gr. 15 de sérum hémopoïétique desséché, enrobé dans le gluten.

Indications. — Tous les états d'*adynamie* et toutes les *cachexies*. Puissant stimulant de l'hémopoïèse, particulièrement indiqué dans le traitement des *anémies*. Hémostatique énergique recommandé dans les affections hémorragipares et l'*hémophilie*.

Mode d'emploi. — *Ampoules d'Hémogénol.* — 1 à 3 ampoules par jour prises par la bouche dans un peu d'eau sucrée ou en lavements.

Dragées d'Hémogénol. — Avaler, sans croquer, 4 à 6 dragées par jour.

Sirop d'Hémogénol. — *Enfants* : 3 à 6 cuillerées à café par jour. — *Adultes* : 3 cuillerées à soupe par jour.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Abriot, Paris (IV^e^).

HÉMOGLOBINE DESCHIENS

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE TOTALE

Médication rationnelle des
syndrômes anémiques

Nature. — Le sirop de DESCHIENS à l'Hémoglobine contient :
1° Une hémoglobine vivante, préparée à froid, sans traumatisme histologique, physique ou chimique ;
2° Les substances minimales globulaires intactes ;
3° Les substances minimales du plasma (Hémopoïétines, cytopoïétines) non altérées.
Ces éléments sont incorporés à un excipient dosé avec soin, sorte de sérum aseptique où leur vitalité persiste.

Action.
1° Apport d'hémoglobine vivante (fer globulaire).
2° Stimulation prudente des organes hémopoïétiques (Hémocytopoïétines).
3° Puissante action tonique par les substances minimales : globulaires et plasmatiques.

Indications :
Anémies.
Chlorose.
Déchéances organiques.
Tuberculose.
Convalescence.
Grossesses.
Suites de couches.
Paludisme.

Posologie. — Une cuillerée à potage au début et à la fin des 2 principaux repas.

Doubler dans les cas graves.

Pas de contre-indications.

Littérature. Echantillons.

DESCHIENS

Docteur en Pharmacie

9, rue Paul-Baudry — PARIS (VIII°)

HÉMOLUOL

Régulateur du système neuro-végétatif et des troubles de la circulation veineuse et génitale.

Composition. — Quinquina, condurango, hamamelis et viburnum. Extraits de choix, combinés judicieusement sans perte de substances actives en un élixir agréable à prendre.

Indications. — Métrorragies, Troubles des fonctions menstruelles : aménorrhée, dysménorrhée, ménopause naturelle et opératoire, varices, hémorroïdes, congestion pelvienne.

Doses. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau avant ou après chaque repas, **quinze jours** par mois.

Laboratoires de l'HÉMOLUOL
16, rue Cantin — COURBEVOIE (Seine)

HEMOPAUSINE

Composition. — Liqueur à base de : Hydrastis, Viburnum, Hamamélis, Capsicum, Cinéraria, Sels de chaux, Gentiane, Ecorce d'oranges amères.

Action. — Vaso-constriction veineuse, décongestive, hémostatique, circulatoire.

Indications. — Troubles de la ménopause et de la puberté, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, règles douloureuses.

Modes d'emploi. — Adultes : 1 à 3 verres à liqueur. Adolescents : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Laboratoire de l'HEMOPAUSINE
16, Rue du Petit-Musc — PARIS

HÉMOPECTAL

(Médication antihémorragique)

Forme pharmaceutique et composition. — Boîte de 3 flacons ampoules de formule :

Solution *pectine stabilisée* à 2 °/₀	10 cc.
Chlorhydrophosphate de calcium	0.50
Solution titrée de genêt	0.20

(Pour 1 ampoule).

Avantages. — Produit très actif, s'employant par voie *buccale*, pas de contre-indication, pas de toxicité même pour le très jeune enfant, pas d'*accidents sériques*, *pas désagréable à absorber*.

Indications thérapeutiques. — Toutes hémorragies (métrorragies, hémoptysies, hémorragies post-opératoires). A prescrire à titre *préventif avant* et *après* toute intervention sanglante.

Mode d'emploi. — 3 (enfants) à 6 (adolescents et adultes) flacons-ampoules par jour dans un peu d'eau sucrée ou gazeuse.

Prescription. — 1 boîte ampoules Hémopectal Falvy.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences, ex-interne lauréat des Hôpitaux de Paris.
40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e^)

HÉMO-PHAGOSTHYL

Phagosthyl ferrugineux

(pour Adultes).

Composition :

Association de cacodylates alcalins (soude et magnésie), de sulfate de strychnine et fer colloïdal en milieu isotonique. Ampoules de 5 centimètres cubes.

Indications :

Chloro-anémie, anémies de toute origine, asthénie, troubles de la puberté, douleurs périodiques, surmenage, convalescences, leucémies.

Emploi :

Une injection intra-musculaire ou sous-cutanée tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse. Absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 c. c.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS
4, Rue de la Motte-Picquet. — PARIS (XV^e^)

HÉMOSTYL du Dr ROUSSEL

Agent d'hémostase
(Voir en outre page suivante)

Sérum frais, hémopoïétique de cheval.

Action.

Hémostatique et Hyperleucocytaire général et local. Hémopoïétique.

Formes pharmaceutiques.

1° Boîte de six flacons-ampoules.
2° Boîte de quarante-cinq comprimés.
3° Flacon de sirop.
4° Ovules : usage gynécologique.

Le sérum liquide (flac.-ampoules), seul, est hémostatique

Indications :

Syndromes toxi-hémorragiques, hémophilie. Hémorragies (hémoptysies, entérorragies, métrorragies, etc.). Plaies saignantes.

Posologie dans les hémorragies.

Dans les cas aigus : injection de 30 cc. (technique du sérum antidiphtérique). Dans tous les autres cas : ingestion ou mieux lavement de trois flac-ampoules, Utiliser, en outre si possible, l'application locale : tamponnements (métrorragies, épistaxis, etc.).

Littérature et échantillons :

Laboratoire de l'HÉMOSTYL
97, rue de Vaugirard — PARIS (VIe)
Téléphone : Littré 68-22, 23, 24.

C. 18.000

HÉMOSTYL du Dr ROUSSEL

Agent d'hémopoïèse

Sérum *hémopoïétique* frais de cheval, c'est-à-dire recueilli sur un animal mis, par une saignée préalable, en pleine crise de régénération hématique.

Action. — 1° Hémopoïétique spécifique (Prof. Carnot, Acad. des Sciences 1906) ; 2° Tous les autres emplois du sérum de cheval : Hémostatique, Hyperculeucocytaire général et local.

Formes phar. — 1° Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc. de sérum pur ; 2° Boîte de 45 comprimés de Sang hémopoïétique total desséché ; 3° Flacon de trois cents grammes de Sirop de Sang hémopoïétique total liquide ; 4° Ovules.

Indications et posologie dans les Anémies. — Toutes les Anémies, quelle qu'en soit la nature : Convalescences, Tuberculose, Paludisme, Suites opératoires et Obstétricales, etc.

Mode d'emploi. — Un ou deux flacons-ampoules de 10 cc. par jour, en ingestion ou lavement, ou 6 à 8 comprimés, ou 2 à 3 cuillerées à potage de Sirop.

Enfants demi-dose.

Littérature et Échantillons :

Laboratoire de l'HÉMOSTYL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VIe)

Téléphone : Littré 68-22, 23, 24.

R. C. 18.000

HÉMYPNAL CIBA

Analgésique obstétrical et urinaire.

Trichloro-butylalcool-diallylmalonylurate d'éthylmorphine. Analgésique particulièrement propre à atténuer considérablement les douleurs de l'accouchement, sans aucun danger ni pour la mère ni pour l'enfant. Utilisable également pour les petites interventions gynécologiques ou urologiques.

Trois formes : Cachets, Suppositoires, Ampoules.

Indic. — Accouchements douloureux (rigidité du col, hypertonie utérine). Curettages, cystoscopies. Cathétérismes, prostatectomies.

Doses. — Pour un accouchement : 2 à 4 suppositoires, 1 à 3 ampoules. Interventions : 1 à 2 cachets ou suppositoires dans l'heure qui précède : 2 à 4 suppositoires par 24 heures après l'opération.

Le tube de 10 cachets.
La boîte de 4 suppositoires. } 20 francs.
La boîte de 4 ampoules.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, place Morand — LYON

HÉPACOLINE

Composition. — Comprimés à base de ferments lactiques, ferments biliaires, extrait de boldo.

Action. — Cholagogue, laxatif, antiseptique intestinal.

Indications. — Toutes les affections du foie et de l'intestin. Hépatites, cirrhoses, cholécystites, entérites, fermentations intestinales, diarrhées, constipation.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour, à prendre dans un peu d'eau sucrée. 1/4 d'heure avant les deux principaux repas.

Enfants au-dessus de 2 ans : 1 à 3 comprimés par jour.

Laboratoires Saint-Vincent-de-Paul
A. Corhumel, 25, rue des Petits-Hôtels,
PARIS (X^{e}).

HÉPATO-BYL

Opothérapies entérique, hépatique et biliaire en ovoïdes glutinisés.

Dose. — 4 à 8 ovoïdes par jour, en trois fois, dix minutes avant les repas, avec un demi-verre d'eau, ou le soir, la dose complète en une seule fois avant de se coucher.

Propriétés. — L'extrait biliaire seul est thérapeutiquement insuffisant. Aussi le Corps Médical prescrit de préférence l'extrait total de la glande hépatique (bile et foie) additionné d'extrait intestinal, dans la Constipation, l'Entérocolite et toutes les Affections du foie.

Médication sans similaires.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET
8, rue de la Source, PARIS — (XVI[e])
Tél. Aut. 11.86

HÉPATOSODINE

Composition. — Bicarbonate, phosphate, sulfate de soude sec, citrate, benzoate de soude, hexaméthylène, tétramine.
Action. — Sur l'estomac, le foie, le sang, l'intestin.
Indications. — Insuffisance hépatorénale sous toutes ses formes. Angiocholécystites chroniques ou subaiguës. Congestion hépatique, lithiase biliaire, ictère. Hypotonie gastrique avec retard à l'évacuation. Constipation avec insuffisance biliaire. Désintoxication pré- ou post-opératoire.
Doses. — *Avant une opération :* Une cuillerée à café dans un verre d'eau au réveil, pendant les huit jours qui précèdent l'intervention.
Troubles gastriques : Une demi-cuillerée à café dans 100 gr. d'eau tiède, à jeun le matin, et le soir à dix-huit heures.
Troubles hépatiques : Une demi-cuillerée à café dans un verre d'eau le matin à jeun, 10 jours chaque mois.
Constipation : Une à trois cuillerées à café dans un verre d'eau au réveil.

Laboratoires DURET et REMY
ASNIÈRES (Seine).

HÉRACLÉOL

A base d'arrhénucléine glycérophosphatée, l'Héracléol constitue le plus puissant traitement de la faiblesse sous tous ses aspects.

Stimulant énergique, toni-réparateur des forces et régénérateur de toutes les cellules du corps, l'Héracléol augmente l'appétit, favorise les échanges gazeux, facilite l'élimination des déchets toxiques, en un mot, rajeunit l'organisme tout entier, physiquement et moralement.

Quatre formes : Élixir, granulés, comprimés, ampoules.

Échantillon gratuit et notice au Corps médical sur demande.

Laboratoires des Établissements H. SALLE.

4, rue Elzévir — PARIS (3e).

HERGÉNOL

Coqueluche — Toux spasmodiques.

Composition. — Essences naturelles balsamiques et Carbures halogénés antispasmodiques.

Indication. — Sédatif antispasmodique.

Forme. — Ampoules scellées à briser sur un carré de flanelle et à maintenir en permanence à proximité des voies respiratoire;

Doses:

Bébés et Enfants : 1 le soir, au coucher. 1 le matin, au réveil (1 troisième si nécessaire).

Adultes : 3 à 4 par jour, suivant besoin.

Adjuvant précieux de tout traitement interne.

Laboratoires GROS

13, Place Delille — Clermont-Ferrand.

HEXOTAL

Antiseptique urinaire et hépato-rénal.

Composition. — Citroléate d'Hexaméthylènetétramine ; Santatol pur et gluten.

Avantages. — Stabilisation de l'urotropine sous une forme combinée et indécomposable par le chimisme gastrique. Production de composés formolés dans l'appareil urinaire seulement. Pas de troubles concomitants. Jamais d'hématurie. Antisepsie de surface et de profondeur (Santalol). Histogénèse puissante. Action urisolvante. Tolérance indéfinie.

Emploi et doses. — *Cas aigus :* 6-12-15 globules par jour, à doses filées.
Cas chroniques : 6-8-10 globules par jour.

Indications. — Cystites. Prostatites. Gonococcies. Bactériuries. Pyélites. Pyélonéphrites. Colibacilloses, etc. Phosphaturies. Urines ammoniacales Coliques hépatiques et néphrétiques. Cholécystites. Diathèse urique. — Échantillons. Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**
7, Rue du Rocher — PARIS
Laboratoires CAMUSET
18, Rue Ernest-Rousselle — PARIS

HIPPOSARCINE ROY

Suc musculaire total exprimé à froid.
Provenant du cheval vigoureux et reposé.
Supérieur au suc musculaire des bovidés :

par sa plus grande richesse en Azote, en Glycogène, en Hémoglobine, en Phosphate et en Fer :

par l'absence totale de Bacilles tuberculeux, de Cysticerques du Tænia.

Assimilation parfaite.
Aucun inconvénient digestif.

Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades qui en retirent toujours grand profit.

Tuberculoses pulmonaires et chirurgicales. Tout état d'affaiblissement et de Consomption. Maladies de l'estomac et des intestins.

GIVAUDAN-LAVIROTTE
56 Chemin de Combe-Blanche — LYON

HISTOGÉNOL

Puissant reconstituant général

Indications. — Tuberculose, Bronchites, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc...

Formes. — Élixir. Granulé, Ampoules, Comprimés, Concentré.

Posologie. — *Adultes :* Une cuillerée élixir ou une mesure de granulé avant chaque repas ou un comprimé matin et soir ou une ampoule par jour.
Enfants : Moitié doses.

Établissements MOUNEYRAT
12, Rue du Chemin-Vert
à VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine)

HOJASOL

Essence pure d'une plante des tropiques.

PRODUITS A L'HOJASOL

Oléojasol

Voir page 480.

Maladies des Voies respiratoires, Sinusites, Coryza, Rhume des foins, Otites, Laryngites, Bronchites, Inflammation de tous les tissus, Furonculose, Anthrax, Eczéma, Brûlures.

Capsules d'Hojasol

Voir page 126.

Affections pulmonaires, Entérite, Constipation, Désinfection intestinale au cours de furonculose.

Glycojasol

Voir page 300.

Laryngites, Trachéites, Infections de la gorge, Lavage des plaies, Pansements humides, Gynécologie.

Nécessaire inhalateur

Voir page 447.

Pulvojasol

Pulvérisateur spécial à canules amovibles et stérilisables.

Stillojasol

Compte-gouttes spécial, à bout olivaire, pour nez et oreilles.

Laboratoires de l'HOJASOL

à CHARS (S.-et-O.).

Gros et exportation :

Dépôt : 19, rue Ferdinand-Duval, PARIS (IVe).

HOLOS

Opothérapie osseuse

Nature. — Extrait opothérapique d'os vivants, renfermant périoste, corps osseux, éléments actifs (non gras) de la moelle, retiré à température physiologique d'os de bœufs et de veaux pris directement à l'abattoir sur des animaux encore chauds.

Indications. — Reminéralisation du terrain tuberculeux : Prétuberculose, tuberculoses osseuse et pulmonaire. Rachitisme et tous les troubles de l'ostéogénèse. Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences, Dentition, Fractures et en général dans tous les cas où s'impose une prompte reconstitution du terrain organique par des éléments phosphatés et fluorés réellement assimilables.

Posologie. — Une petite cuiller-mesure, bien pleine (1 gr.) à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût). Chez les très jeunes enfants se contenter d'une 1/2 mesure.

Littérature — Echantillons

DESCHIENS, Docteur en Pharmacie
9, rue Paul-Baudry — PARIS

HOLOVARINE

Forme et composition. — Cachets dosés à 0 gr. 10 et 0 gr. 20 de poudre d'ovaire intégral. Odeur agréable. Assimilation facile.

Avantages. — Desséchée par un procédé nouveau qui, par sa rapidité, permet à l'organe de conserver toutes ses propriétés. Contient tous les principes actifs de l'ovaire.

Indications. — Toutes les insuffisances ovariennes ; troubles de la puberté, de la ménopause, de la menstruation, de la grossesse, de la sécrétion lactée, stérilité, obésité.

Mode d'emploi. — Adultes : 1 à 2 cachets à 0 gr. 20 par jour.

Adolescentes : 1 à 2 cachets à 0 gr. 10 par jour. Cures successives de 5 à 10 jours.

Laboratoire de Thérapeutique générale

48, rue de la Procession — PARIS

HOPOGAN BOCQUILLON

Composé organo-minéral, à base de Peroxyde de Magnésium retraité pour l'emploi thérapeutique (interne),

Les Sels d'HOPOGAN-BOCQUILLON se désagrègent, entrent en réaction et agissent à volonté (suivant formes médicamenteuses), soit dans l'estomac, soit dans l'intestin, dont ils recouvrent et « tapissent » la paroi, à l'exemple d'un véritable pansement interne chargé de détruire par l'*Oxygène* et la *Magnésie*, les fermentations anormales et les acides gastro-intestinaux qu'ils transforment, par réaction lente, en produits d'élimination.

L'emploi de l'*Hopogan* assure : la désinfection la plus complète, la désintoxication et la vivification de l'organisme dans chacune de ses fonctions cellulaires normales.

Formes. — *Estomac :* comprimés, cachets. — *Intestin :* pilules kératinisées, gélacapsules, prise-bébé. — *Arthritisme :* Hopoganase.

Laboratoire des Peroxydes médicinaux
12-18, Rue Lamartine — PARIS

HORMOBILINE

Laxatif opothérapique

Médicament héroïque et rationnel de la CONSTIPATION et des affections chroniques du gros intestin.

Composition. — Hormone cœco — appendiculaires et extraits biliaires sélectionnés.

Indications. — Constipation, colopathies, séquelles d'appendicectomie, entéro-colite muco-membraneuse, insuffisances biliaires, ictères, cholémies.

Avantages. — Ne provoque ni dégoût, ni accoutumance, est facilement absorbable et ne présente aucune contre-indication.

Posologie. — *Forme liquide :* 1 à 3 cuillerées à café, diluées dans un peu d'eau naturelle ou gazeuse (Saint-Galmier ou Couzan) avant le repas du soir ou au moment du coucher.
Clystère : 4 cuillerées à café pour un litre d'eau bouillie.
Forme pilulaire : 2 à 4 pilules avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Echantillons et littérature

Laboratoires DORANTOWICZ
17 *bis*, avenue Parmentier — PARIS (XI[e])
Tél. : Roquette 14-12

HORMOLAXINE

Opothérapie intestinale.

Composition. — Extrait appendiculo cœcale associé à la bourdaine.

Indications. — L'*Hormolaxine* est le remède spécifique de la CONSTIPATION et de l'insuffisance d'évacuation intestinale, dont la cause est un fonctionnement défectueux du cæcum « *Spasmes du cæcum, atonie du cæcum, inflammation chronique du cæcum, Typhlite, Périlyphlite, Appendicite chronique.* »

Propriétés. — Régulateur de la fonction intestinale à laquelle il rend son énergie naturelle.

Doses et mode d'emploi. — Une à trois cuillerées à café avant le repas du soir, dans un demi-verre d'eau froide.

DARRASSE FRÈRES
13, rue Pavée — PARIS

HORMOVARINE BYLA

(Folliculine)
(en ampoules injectables).

Composition. — Folliculine, ou hormone ovarienne spécifique, physiologiquement titrée.

Propriétés thérapeutiques. — L'HORMOVARINE BYLA remplace la sécrétion intime de l'ovaire, supprime l'atrophie de l'utérus, régularise la croissance et rétablit le métabolisme de base.

Indications. — L'HORMOVARINE BYLA peut être utilisée dans tous les cas d'*hypo-fonctionnement ovarien* et donne des résultats très favorables dans l'aménorrhée, la dysménorrhée, l'hypoplasie utérine, les troubles de la ménopause, l'ovariectomie, la stérilité, etc..., et dans certains cas de diabète ovarien résistant à l'insuline.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les deux jours en injection lente, par voie intramusculaire (intra-fessière), avec les précautions d'usage.

Les Établissements BYLA,
26, avenue de l'Observatoire, Paris.
R. C. Seine 71895.

HUILES CHOLESTÉRINÉES DAUSSE

Association de la cholestérine à des stimulants diffusibles et à des médicaments antituberculeux éprouvés.

Traitement des états infectieux adynamiques et de la tuberculose pulmonaire.

Premier groupe,

Ampoules de 2 cc. ou de 5 cc.

I. — Huile camphrée cholestérinée.
II. — — — — éthérée.
III. — — — — strychninée.
IV. — — — — éthérée strychninée.

Posologie. — 1 ampoule de 2 cc. tous les 2 ou 3 jours ou de 5 cc. tous les 5 jours.

Deuxième groupe.

I. — Chaulmoogra térébenthiné cholestériné.
II. — — gaïacolé cholestériné.

Posologie. — Injection hypodermique ou intramusculaire d'une ampoule tous les 3 jours dans la *tuberculose pulmonaire.*

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot, Paris (IV^e^).

HUILE CROLAS

de Ricin, chimiquement pure

Obtenue par des procédés purement mécaniques, sans l'intervention d'aucun produit chimique.

Absolument sans saveur et sans odeur, ne contient cependant que de l'huile de Ricin.

Le purgatif par excellence des enfants et des personnes délicates.

En flacons spéciaux à bouchage hermétique de 15, 30, 45, 60 grammes et flacon provision de 250 grammes.

GIVAUDAN-LAVIROTTE
56, Chemin de Combe-Blanche — LYON

HUILE GALLINA

Lipoïdes des Galli résistants au Bacille de Koch, Morhuate d'Éthyle, Cinnamate de Benzyle.

Formes :

Ampoules de 5 c. c. (voie parentérale, tissus).

Indications :

Toutes les formes de la tuberculose viscérale.

Établissements GALLINA
4, rue Candolle — PARIS (Ve)

HUILE GRISE ERCÉ

Constitution. — Huile grise de formule spéciale, complètement résorbable, sans huiles minérales.

Forme. — Ampoules-seringues auto-injectables.

Avantages : 1° *Indolore*, neutralité absolue.
2° Assimilation totale. *Résorption* rapide.
3° *Dosage* absolument rigoureux.

Posologie. — 0.02 à 0.15 de Hg. complètement injecté.

LABORATOIRES ROBERT & CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS

HYDRALIN

antiseptique gynécologique

Composition. — Perborate de soude. Borate de Soude Bicarbonate de Soude, Fluorure de Sodium. essences aromatiques.

Propriétés. — Est une source d'oxygène naissant. Donne une solution dialytique alcaline. Exalte le pouvoir défensif des muqueuses. Evite la pullulation des germes pathogènes. Dissout les sécrétions et les mucosités.

Indications. — Leucorrhées, métrites, vaginites. Antiseptique idéal pour les soins intimes et hygiéniques de la femme.

Présentation. — Sachets de poudre agréablement parfumée et immédiatement soluble.

Mode d'emploi. — Prescrire pour une injection chaude, un sachet pour 1 litre d'eau.

La boîte de 30 sachets : **10** francs.

Laboratoires CAILLAUD
37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e^)
Téléphone : Invalides 12-63

HYDRASTOL

(J'arrête l'eau.)

Spécifique de l'hydrorrhée nasale.

Chimiothérapie atoxique, désensibilisatrice de la muqueuse nasale.

Indications. — Hydrorrhée, Coryza, Rhume des foins, Grippe.

Prescription. — Trois cachets par jour. Aucune contre-indication, rénale ou autre.

Laboratoire Laryngologique du Dr CORDIER
222, Faubourg Saint-Martin, PARIS.

HYOSCYAMINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

Hyoscyamine Houdé. — Produit pur cristallisé, extrait de l'Hyoscyamus Niger.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, calmant, hypnotique, d'un emploi très répandu dans le traitement des séquelles de l'encéphalite léthargique où elle donne des résultats surprenants.

Produit stable, d'action certaine et constante.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 granules *pro die* ; les prendre avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS.

HYPOCHLORINE POURTAL

Composition. — Solution aqueuse d'hypochlorite de magnésium, au titre de 8 gr. de chlore actif par litre.

Action. — Antiseptique, désodorisant, cicatrisant.

N'irrite pas les tissus, indolorité absolue.

Indication. — Plaies, angines, hygiène de la femme, gynécologie, petite chirurgie.

Mode d'emploi. — 2 à 5 cuillerées à soupe par litre d'eau.

Crème Hypochlorine Pourtal : cicatrisations de toutes plaies atones, brûlures, engelures, gerçures, ulcères même variqueux en consolidation.

" L'ANTISEPTIQUE "

48, rue de Londres — PARIS

R. C. Seine 374.558

HYPOCHLORYL

Composition et forme. — Solution parfumée d'hypochlorite de soude, de borate de soude, de chlorure de sodium, de terpinol et d'eucalyptol.

Avantages. — Antiseptique puissant, non toxique, non caustique et non irritant. Légèrement parfumé.

Indications. — Hygiène sexuelle de l'homme et de la femme. Soins de la bouche et des dents. Traitement des plaies. Antisepsie générale.

Posologie. — *Injections vaginales* : une cuil. à soupe par litre.

Injections uréthrales : à titre préventif : une cuil. à soupe par litre d'eau. Pour traitement, prendre avis du médecin traitant.

Hygiène dentaire : une demi-cuil. à café dans un grand verre d'eau.

Angines. Affections buccales : une cuil. à café dans un grand verre d'eau chaude.

Antisepsie générale : une cuil. à soupe par litre d'eau.

La solution à la dose d'emploi n'oxyde pas les instruments.

Prix du flacon : 12 francs.

Laborat ires de l'HYPOCHLORYL

7 *bis*, rue de Musset — PARIS (XVI[e])

HYPODERMOZONE

(Peroxydine injectable)

Ampoules de 2 cc. d'ozone stable à la température ordinaire. (*Voir fiche Entérozone*) pour usage hypodermique.

Prop. thér. — Bactéricide puissant. Antiseptique intestinal. Antithermique. Oxydant et régénérateur des globules sanguins. Cicatrisation rapide des plaies rebelles.

Posologie et dose. — Doit être employée dans les cas graves à raison d'une injection de 2 cc. chaque matin. Il est bon de faire boire en même temps au malade de l'*Entérozone* pour compléter le traitement.

H. ROGIER, pharmacien

56, boulevard Péreire — PARIS (XVII[e])

ILOGLANDOL " ROCHE "

Solution aqueuse stérilisée des principes actifs des îlots de Langerhans.
un cc. = 15 unités cliniques.
Titrage conforme aux décisions prises par la Convention de Genève.
Activité correspondant à l'activité de l'étalon officiel de Londres.

Indications thérapeutiques.

Toutes celles de l'insulinothérapie.

Doses et modes d'emploi.

N. B. — Le médecin traitant est seul juge de la posologie et des modalités d'application de l'ILOGLANDOL " ROCHE ", car le traitement insulinien est toujours conditionné par l'état général (poids) du malade et par les examens systématiques répétés de son sang et de ses urines (glycosurie, glycémie, acidose, réserve alcaline du plasma).

Doses d'urgence (Coma diabétique).

Voie endoveineuse : 1/2 à 3 cc. en 1 fois, puis 1/2 à 1 cc. toutes les heures.
Voie intramusculaire : 2 à 4 cc. en 1 fois, puis 1 cc. toutes les heures.
En même temps : Sérum glucosé, sérum physiologique et bicarbonate de soude (par voies buccale, rectale, intramusculaire, endoveineuse) et tonicardiaques.

Doses habituelles (Tous autres cas).

Voie intramusculaire (intrafessière) : 2 cc. par jour (un quart d'heure à une demi-heure avant les repas pendant 21 jours.
En même temps : Chez les diabétiques, régime alimentaire aussi riche que le permettra l'état du malade, en hydrates de carbone, graisses et albuminoïdes.

Iloglandol " Roche "

Boîtes de 6 ampoules de 1 cc.

PRODUITS
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie

21, place des Vosges, Paris (IIIe).

IMMUNIZOLS

Vaccins

I. Ampoules

10. Furonculose, Ostéomyélite.
11. Entérite, Appendicite.
13. Asthme, Asthme des foins.
15. Eczéma, Psoriasis.
16. Bronchites chroniques.
17. Rhumatismes.
18. Urétrites.
19. Acné.

II. Bouillon-Vaccins

A. — *Non Gélosés.*

10. Furonculose, Toutes staphylococcies.
24. Streptococcies.
25. Pneumococcies.
26. Colibacilloses.
31. Abcès chauds.
35. Ulcères variqueux.
36. Brûlures infectées.
41. Métrites.
50. Otites, Rhino-Pharyngites.

III. Hibévé =

Concentré polyvalent à diluer pour obtenir

IV. Comprimés avec pilules

Adjuvants de bile.

10. Furonculose-Ostéomyélite.
11. Entérite-Appendicite.
13. Asthme, Asthme des foins.
15. Eczémas, Psoriasis.
18. Urétrites.
22. Typhoïde.
31. Abcès, plaies infectées.
40. Cystites, Pyélonéphrites.
41. Métrites.
70. Pyorrhée alvéolo-dentaire.

14, rue de Clichy

GRÉMY

Microbiens

injectables

22. Typhoïde.
23. Grippe.
31. Abcès chauds et froids, plaies suppurées.
34. Gangrène.
40. Cystites, Pyélonéphrites.
41. Métrites, Salpingites.
50. Otites, Sinusites, Rhino-Pharyngites.
70. Pyorrhée alveolo-dentaire.

pour pansements

B. — *Gélosés.*

10. Furonculose et toutes staphylococcies.
31. Abcès chauds, Plaies infectées.
35. Ulcères variqueux.
36. Brûlures infectées.
41. Métrites. OVULES pour pansements Gynécologiques.

Bouillon-Vaccin.

½ litre de bouillon-vaccin normal.

V. Immuniperos

(*Vaccins liquides pour vaccination buccale*).

10. Furonculose.
11. Infection intestinale.
15. Dermatoses.
22. Fièvre typhoïde.

PARIS (IX[e])

R. C. S. 48.556.

12

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

Médications végétale et opothérapique associées.)

Composition.

Principes végétaux de l'**Indhaméline Lejeune simple** associés aux sucs glandulaires de: Hypophyse, ovaire, surrénale et thyroïde.

Indications.

Cette forme de l'Indhaméline Lejeune est plus particulièrement indiquée dans les trouble des la ménopause et de la puberté, dans les métrites, salpingites non suppurées, ovarites chroniques, sclérose utérine, etc.

Mode d'emploi.

20 à 30 gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jour par mois).

Laboratoires A. LEJEUNE

12, Rue Emilio-Castelar — PARIS (XII[e])

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale)

Composition. — Principes actifs d'Hamamélis, marron d'Inde, condurango viburnum, anémone, séneçon, piscidia. (Alcaloïdes et principes vitaux de la plante fraîche stabilisée).

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de la circulation générale. Décongestif par vasoconstriction périphérique. Analgésiqueparaction sur les terminaisons nerveuses sensitives. Tonivasculaire et sédatif utérin précieux dans la dysménorrhée. Décongestionnant ovarien, régulateur des menstrues

Indications. — Troubles circulatoires, ménopause, varices, hémorrhoïdes.

Mode d'emploi. — 20 à 30 gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours p. mois).

LABORATOIRES A. LEJEUNE

12, rue Emilio-Castelar. — Paris (XII[e])

INHALATEUR "EXCELSIOR"

Inhalateur ordinaire comportant un récipient à essences à débit réglable.

Dans l'ancien système, les liquides volatils mis en masse dans l'eau chaude donnent au début une bouffée suffocante et s'épuisent rapidement.

Avec l'Inhalateur *Excelsior*, l'essence distribuée goutte à goutte permet une inhalation régulière et active jusqu'à la fin.

A l'inverse des anciens systèmes, l'Inhalateur *Excelsior* permet de graduer l'arrivée d'essences et l'augmenter à mesure que la muqueuse s'accoutume.

Il permet aussi l'arrêt de l'inhalation si le malade veut prendre un temps de repos.

Produits pour Inhalations :

EUCALINHAL. — Inhalation à base d'Eucalyptus. Essence de Pin. Terpinol. Benjoin.

Indic. thérap. — Rhinites, laryngites, sinusites, bronchites.

GOUDRINHAL. — Inhalation à base de Goudron de Norvège. Essences de lavande et de Thym.

Indic. thérap. — Affections rhino-pharyngites, bronchites chroniques.

SULFINHAL. — Inhalation à base de Mono Sulfure de Sodium et Engénol.

Indic. thérap. — Catarrhe rhino-pharyngé, rhinite atrophique.

Laboratoire « INHAL »
Directeur L. HÉRIN,
Pharmacien ex-interne des Hôpitaux.
Ω I.P. ☃ ✠ ⊙,
CONDÉ-SUR-ESCAUT (Nord).

INHALATION LANCOSME

Composition. — Essences naturelles à pouvoir antiseptique élevé (girofle, citron, thym, etc.) associées à la créosote de hêtre pure.

Forme. — Liquide.

Propriétés. — Aseptise la muqueuse de l'arbre trachéobronchique et des alvéoles pulmonaires, diminue les sécrétions et l'expectoration.

Indications. — Coryza. Rhinite. Ozène. Laryngites aiguë et chronique. Trachéite. Bronchite aiguë. Emphysème pulmonaire. Grippe. Tuberculose pulmonaire.

Contre-indications. — Tuberculose aiguë à forme éréthique avec tachycardie et dans les formes congestives et fébriles avec hémoptysies.

Emploi. — Avec un inhalateur ; verser la valeur d'une cuillerée à café, goutte à goutte, dans l'eau chaude, mais non bouillante, deux à trois inhalations par jour.

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel-III, PARIS (VIIIe).

INHALO-BOL

Cornet à inhalations, en papier parcheminé, appareil simple, pratique et bon marché.

Prix : 4 fr. 50

LABORATOIRE
DE L'INHALO-BOL
32, rue de l'Ouest, Paris.

P. TAVERNIER,
Docteur en pharmacie.

INHALOL

Médication
des voies aériennes supérieures.

Composition. — Association d'essences volatiles (Isopropylmétacrésolmenthol et Cajeputol) sans alcool.

Action thérapeutique. — Antiseptique, anticongestif, analgésique.

Indications. — Coryzas, rhinites, pharyngites, laryngites, sinusites, trachéites, bronchites.

Mode d'emploi. — IV à V gouttes dans un verre d'eau bouillante en inhalations.

Laboratoires BOUVELOT
62, rue d'Antibes, Cannes (A.-M.).

INHALONE

Inhalation *solide* à l'état pulvérulent.

Exempt d'alcool.

Formule : de conception inédite :
Cupressol, hydrure de naphtyle, essence de thym, goménol, benjoin.

Donne des résultats surprenants, dans tous les cas d'inflammation des muqueuses buccales et rhino-pharyngiennes. Diminue rapidement l'intensité des quintes et leur fréquence, dans la coqueluche.

Modifie nettement les sécrétions nasales. N'irrite jamais, ne dessèche jamais les muqueuses. Jouit vis-à-vis d'elles de propriétés antiseptiques inégalables.

Echantillons et littérature sur demande.

AUX LABORATOIRES CH. DEHAY
58, rue Saint-Géry, Arras.

INHALO-SEL

Composition. — Comprimés pour inhalations à base de menthol et d'essences volatiles.

Avantages thérapeutiques. — Peu de menthol, pas d'alcool, donc pas d'irritation.

Indication thérapeutique. — Laryngites, bronchites, rhino-pharyngites, sinusites.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 comprimés dans un demi-bol d'eau bouillante en inhalation.

Laboratoire de l'Inhalo-Bol
32, rue de l'Ouest, Paris.
P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

INHALOXYL

Comprimés pour inhalations. Permet une inhalation complètement exempte d'alcool et pauvre en vapeur d'eau.

Composition. — Les essences ont été choisies en s'inspirant des travaux de Morel et Rochaix sur le pouvoir antiseptique de chacune d'elles vis-à-vis des différentes bactéries pathogènes.

Mode d'emploi. — Dans un demi-bol d'eau tiède, mettre un ou deux comprimés et respirer les gaz qui se dégagent entraînant les vapeurs antiseptiques.

Indications. — Coryza, Laryngites, trachéites, bronchites aiguës et chroniques.

Laboratoire G. WARIN
4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI[e])

INOLÈNE

Solution concentrée de Coaltar
de *saveur agréable.*

Propriétés. — Antiseptique puissant. Décongestionnant, cicatrisant rapide. Innocuité absolue. Réaction alcaline.

Indications. — Gingivites, stomatites, pharyngites, Amygdalites, Angines, Abcès, fistules dentaires, soins post-opératoires. Hygiène de la bouche.

Mode d'emploi.

Lavages : 2 à 4 cuillerées à café par litre d'eau.
Gargarismes : Bains de bouche : XX à XXX gouttes dans un verre d'eau chaude.
Badigeonnages : Pur ou au 1/2.
Dentifrice : X à XX gouttes dans 1 verre d'eau.

LABORATOIRE ODILIA
E. LACOMBE, Pharmacien
2, rue Neuve Popincourt, 2, Paris (XI[e])

INOTYOL DU Dr DEBAT

Principes actifs. — Sulfo-schistol. Lithol. Extrait distillé d'Hamamélis frais.

Indications. — Eczémas, Ulcères. Brûlures. Prurits et toutes lésions ou irritations de la peau.

Formes. — Pommades : 3 grandeurs :

Tube de 50 gr.	9 » 50
1/2 tube de 25 gr.	5 » 50
Quadruple tube de 200 gr.	25 fr.

Sauf indications spéciales, les pharmaciens délivrent le tube de 50 gr.

Poudre : Complète l'action de la pommade ; calme les érythèmes légers ; indiquée pour la toilette des nouveau-nés. La boîte poudreuse ..... 5 fr. 50

Savon : Traitement de la Séborrhée, le pain, prix : ..... 5 fr. 50

Laboratoires du Dr DEBAT
60, rue de Prony — PARIS (XVII[e]).

INSULANOL

(Insulyl-Pommade du Dr Roussel).

Forme. — Pommade.

Mode d'action. — Agit en applications locales par l'Insuline qu'elle renferme, que les malades soient ou non diabétiques.

Indications. — 1° Ulcères variqueux et plaies atones ;
2° Prurits de toute nature ;
3° Hémorroïdes ;
4° Brûlures.

Mode d'emploi. — En onctions sur les parties malades.
Recouvrir les plaies d'un pansement aseptique.

Laboratoire des PROXYTASES
97, rue de Vaugirard — PARIS (VIe)
R. C. 18.000. Téléph : Littré 68-22, 23, 24.

INSULINE-BUCCALE FORNET

Principe actif :
Extrait des îlots de Langerhans du Pancréas.

Indications :
1° Le Diabète léger et ses complications.
2° L'Anorexie, la Dyspepsie, l'Athrepsie, l'Amaigrissement pathologique, les vomissements de grossesse.
3° Dysménorrhées, Malaise menstruel.

Formes :
Boites, tubes ou flacons de 30 pilules.

Posologie :
3 pilules 3 fois par jour, une demi-heure avant les repas.

Propriétés thérapeutiques :
Abaisse la glycosurie, diminue la polydipsie et la polyphagie, augmente la vitalité du diabétique.
Rend aux autres malades et aux convalescents l'appétit, les fait rapidement gagner en poids.

Informations commerciales :
Laboratoires Thaidelmo 23, Rue du Caire, Paris (IIe).

Informations scientifiques :
Echantillons médicaux et littérature.

INSTITUT DE MICROBIOLOGIE SARREBRUCK

INSULINE BYLA

Autorisée par l'Académie de Médecine.
Adoptée dans les hôpitaux.

Purifiée, débarrassée des matières salines et protéiques de la glande.
Présentée sous *deux formes injectables :*
1° *Insuline Byla* (poudre) soluble dans l'eau, enfermée dans des ampoules stériles de 15 unités internationales (enfants, 5 unités). Chaque ampoule est accompagnée d'une ampoule de 2 cc. sérum physiologique, dans laquelle on la fait dissoudre.
2° *Insuline Byla liquide*, en flacon de 6 cc. soit 120 unités internationales. Chaque cc. = 20 unités.
Indications. — Traitement du diabète et de toutes ses manifestations.
Posologie. — 1 à 5 ampoules, ou 1 cc. à 6 cc. de solution, par jour, suivant avis du médecin.

Traitement des plaies atones :

Pommade à l'Insuline Byla
Poudre à l'Insuline Byla

L'*Insuline Byla* est titrée en *unités internationales*, conformément à la décision du Comité d'Hygiène de la Société des Nations.

Envoi sur demande de la notice détaillée,

Les Établissements BYLA,
26, avenue de l'Observatoire, Paris. — R. C. Seine 71865.

INSULINE ROGIER

Principe actif des îlots endocrines du pancréas isolé et purifié.
Forme. — Poudre soluble inaltérable conservée en ampoules stériles.
Titre. — Les ampoules d'INSULINE ROGIER se font en boîtes de 4 ampoules de 3 grandeurs :
Ampoules à 15 unités cliniques.
Ampoules à 30 unités cliniques.
Ampoules à 60 unités cliniques.
Ampoules à 15 unités. Chaque boîte d'INSULINE contient 4 ampoules de Solution isotonique de 1 cmc. de sorte que la solution, une fois effectuée, contient 15 unités par cmc.
Ampoules à 30 et à 60 unités. Chaque boîte d'INSULINE contient 4 ampoules de solution isotonique de 2 cmc, de sorte que la solution, une fois effectuée, contient 15 unités par cmc pour les ampoules à 30 unités et 30 unités par cmc pour les ampoules à 60 unités.
Indications. — Diabète et ses manifestations.
Posologie. — Doses variables selon les cas.
En moyenne 15 à 60 unités par jour. Dans le coma 200 à 300 unités et plus.
Nota Bene. — Voir « Levulose Rogier » et « Vitamine Rogier ».

Littérature sur demande.

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie
56, boulevard Péreire — PARIS

INSULYL DU Dr ROUSSEL

Autorisé par l'Académie de Médecine.
Adopté dans les Hôpitaux.
Produit de la sécrétion interne du pancréas (Ilôts de Langerhans).

Action. — Abaisse la glycémie, permet l'utilisation des hydrates de carbone ingérés.

Indications. — 1° Diabète et ses complications ; 2° Psoriasis ; 3° Athrepsie des nourrissons ; 4° Acidose.

Forme. — Boîte de 10 ampoules de 1 cc. ½ environ. Chaque ampoule renferme 20 unités cliniques.

Doses. — En moyenne une ampoule en injection intra-musculaire avant chaque repas. Il est nécessaire d'associer la cure diététique à la cure d'Insulyl.

Laboratoire des PROXYTASES
97, rue de Vaugirard — PARIS (VIe)
Téléph. : Littré 68-22, 23, 24.

INTRAIT DE DIGITALE DAUSSE

Préparation conservant intacts tous les principes actifs de la feuille fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Toni-cardiaque à zone maniable très étendue.

Forme. — *Solution d'Intrait de Digitale Dausse*, correspondant comme posologie à la solution de digitaline au 1000e du Codex.
Ampoules d'Intrait de Digitale Dausse dosées à 25 mill. d'Intrait par cc. ; Ampoules de 2 cc.

Indications. — Tous les cas de défaillance cardiaque : *Asystolie, troubles pulmonaires, œdèmes, oligurie.* Action plus complète que celle de la digitaline cristallis é et comparable à celle de la macération de poudre de digitale avec l'avantage d'un titrage rigoureux et constant.

Posologie. — SOLUTION D'INTRAIT : *Dose d'entretien cardio-tonique:* 5 gouttes par jour pendant une quinzaine. *Dose antiasystolique:* XXV à L gouttes en une fois ou XX gouttes par jour pendant 3 ou 4 jours.
AMPOULES D'INTRAIT (0,05 d'intrait en 2 c.c.) : 1 à 2 ampoules en une seule dose par voie hypodermique, en cas d'urgence ou en cas d'intolérance gastrique de la digitale. 1 ampoule par voie intraveineuse encas de collapsus cardiaque imminent.

INTRAIT DE GUI

Préparation conservant intacts tous les principes actifs de la plante fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*).

Médicament hypotenseur

Forme. — *Solution d'Intrait de Gui* titrée à 0 gr. 10 d'intrait par cuillerée à café.

Indications. — *Hypertension artérielle, artériosclérose, hémoptysies congestives des tuberculeux.*

Posologie. — *Solution d'Intrait de Gui* : 2 à 3 cuillerées à café par jour ; maximum : 5 cuillerées à café dans les 24 heures.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot, PARIS (IVe).

INTRAIT DE MARRON D'INDE DAUSSE

Préparation conservant intacts les principes actifs de la semence fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Vaso-constricteur veineux, spécifique des *Hémorroïdes, varices, phlébites.*

Forme. — *Solution d'Intrait de marron d'Inde* : X gouttes = 0 gr. 01 d'Intrait.

Mode d'emploi. — USAGE INTERNE : V gouttes matin et soir de *solution d'Intrait de marron d'Inde Dausse.*

INTRAIT DE STROPHANTHUS

Préparation de *Strophanthus gratus* conservant intacts tous les principes actifs de la semence fraîche. (Stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Toni-cardiaque puissant.

Formes. — *Solution d'Intrait de Strophanthus* : X gouttes renferment un milligr. d'Intrait.

Ampoules d'Intrait de Strophanthus dosées à un milligr. d'Intrait par cc.

Indications. — Dans tous les cas d'insuffisance cardiaque, chez les cardiaques vrais, chez les cardiorénaux et toutes les fois que la Digitale ne réussit pas.

Posologie. — SOLUTION D'INTRAIT. *Dose d'entretien cardiotonique* : V gouttes par jour pendant 15 jours. *Dose antiasystolique.* — XX à XXX gouttes en une fois. AMPOULES D'INTRAIT. — Exclusivement par *voie intramusculaire* : 1/2 à 1 ampoule, en cas de collapsus cardiaque imminent.

INTRAIT DE VALÉRIANE DAUSSE

Préparation dépourvue d'odeur et conservant intacts les principes actifs de la racine fraîche ; stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*).

Antispasmodique, sédatif du système nerveux.

Forme. — *Solution d'Intrait de Valériane Dausse.*

Indications. — *Insomnie* d'origine nerveuse due à un éréthisme sensoriel ou cérébral.

Nervosisme, irritabilité nerveuse, affections spasmodiques, dermatoses prurigineuses, chorée, tics, convulsions infantiles.

Posologie. — SOLUTION D'INTRAIT DE VALÉRIANE. 2 à 3 cuillerées à café par jour. Doubler la dose si nécessaire.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV[e]).

IODA

Iode organique entièrement assimilable.

Composition. — Hexosane iodé $(C^6H^{10}O^5)^{40}I^6$; nouveau composé organique défini, stable, soluble dans l'eau, *assimilable seulement en milieu alcalin* (intestin).

Absolument inoffensif, parfaitement toléré, permet *le traitement iodé intensif sans iodisme.*

Indications. — Celles de l'iode et des iodures.

Posologie : Un comprimé correspond à :
2 centigrammes d'iode métalloïdique.
20 gouttes de teinture d'iode iodurée Codex.

Doses quotidiennes à prendre aux repas :
Enfants : 1 à 4 comprimés selon l'âge.
Adultes : 4 à 10 comprimés et plus selon nécessité.

Échantillons sur demande adressée aux

Laboratoires A. CESBRON
63, rue de la Faisanderie — PARIS (XVI^e).

IODALOSE GALBRUN

Gouttes titrées renfermant cinq centig. d'iode par centim. cube. Première combinaison directe de l'iode avec la peptone. Communication au XIII^e Congrès international de médecine de Paris (1900).

Remplace Iodes et Iodures dans toutes leurs applications internes sans iodisme.

Arthritisme. — Goutte. — Rhumatisme. — Artério-sclérose. — Maladies du cœur et des vaisseaux. — Affections glandulaires. — Rachitisme. — Goitre. Fibrome. — Syphilis. — Obésité.

Pour les adultes : 20 à 60 gouttes par jour.
Pour les enfants : 5 à 20 gouttes par jour.

Laboratoire GALBRUN
8 et 10, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e)

IODAMELIS LOGEAIS

Véritable combinaison définie, glycérinée, sans alcool, en gouttes concentrées, d'*Hamamélidine* et d'*Iodo-Iodure de Potassium*, découverte par M. Logeais et exaltant par cette association l'activité pharmacodynamique du produit.

Propr. — Par son *Hamamélidine*, spécifique veineux chez les hypertendus veineux, cyanotiques variqueux, par son *Iodo-Iodure* de K, spécifique cardio-artériel chez les artério-scléreux uricémiques, hypervisqueux, l'*Iodamélis* représente le traitement le plus complet et le plus judicieux des diverses affections cardio-vasculaires.

Indic. — Artério-sclérose, angine de poitrine, phlébites, varices, emphysème, asthme, troubles de la puberté et de la ménopause, obésité, jambes " en poteau ", etc...

Posologie. — En se rappelant que :

1 gr. = L gouttes = { 0,20 Hamamélidine. 0,03 Iode. 0,25 Iodure de K.

on prescrira de X à XXV gouttes aux deux repas, dans *un peu d'eau de Vichy*. Demi-dose pour les enfants. Tolérance parfaite. Pas d'iodisme.

Laboratoires J. LOGEAIS
22bis, r. de Silly — BOULOGNE-s/Seine, près PARIS
Auteuil 40-15 — 40-16

IODARSENIC GUIRAUD
ou
GOUTTES PAIDOPHILES

du Docteur **Guiraud**
Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux

Formule. — Solution stable au centième (procédé spécial) de tr iodure d'arsenic, chimiquement pur, dans l'eau distillée.

Indications. — Lymphatisme, Rachitisme, Scrofulose, Emphysème. Asthme, Bronchites à répétition, Adénopathie, Trachéo-bronchite, Adénites en général, Kératites phlycténulaires, Affections de la peau (Eczémas, Impetigo. Psoriasis, Urticaire...) Enfin, toutes les fois que la médication iodée ou iodurée est mal supportée.

Posologie. — Enf. de 6 mois à 2 ans 2 à 10 gouttes par jour
— 2 ans à 8 ans 4 à 20 —
— 8 ans à 15 ans 4 à 30 —
Adultes 10 à 40 —
à prendre en se conformant à la notice, dans un peu d'eau ou de lait sucré, au moment des deux principaux repas.

Présentation. — Flacon compte-gouttes 45 gr.

Laboratoire
60, cours d'Aquitaine — BORDEAUX

IODASEPTINE CORTIAL

Composition. — Iodobenzométhylformine, corps cristallisé, contenant 42 % d'iode, très soluble dans l'eau, dialysable, injectable par voie intraveineuse ou intramusculaire, sans réaction locale ou générale. Tolérance sans réserve.

Prop. Thérap. — Dérivées de la nature de ses composants; Iode et antiseptiques (Formol de l'Hexaméthylène tétramine et groupe Phényl des corps benzoylés). Antiseptique général des infections chroniques ou parasitaires: Rhumatismes, Tuberculose (jamais d'hemoptysies), Adénopathies, Paludisme, Spirillose,

Prép. Pharm. Posol. — *Ampoules* : Solution au 1/10 : A, 2 cc., B, 5 cc., C. 10 cc., par voie intraveineuse ou intramusculaire à doses progressives. Tuberculose (doses faibles) 2 à 5 cc, Rhumatismes chroniques (doses fortes) 5 à 20 et même 25 cc. pro-die. *Gouttes* : 1 ctg. d'Iodaseptine par goutte, XX à C par jour (Enfants X à XXX. *Comprimés* : A, 20 Ctg. — B, 0,50 ctg. (1 à 4 par jour).)

Laboratoires CORTIAL

15, Boulevard Pasteur — PARIS

IODÉINE MONTAGU

(Bi-Iodure de Codéine)

Propriétés. — Action calmante de la toux, régularisateur du rythme respiratoire, antidyspnéique ; facilite l'expectoration.

Indications. — Toux, Emphysème, Asthme.

Formes pharmaceutiques :

Sirop. — 0,04 cgr. d'Iodéine par cuillerée à soupe.
Dose : 1 à 3 cuillerées par jour.

Gouttes. — X gouttes = 0,01 cgr d'Iodéine crist.
Dose : X à XL gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Pilules. — 0,01 cgr. d'Iodéine par pilule.
Dose : 4 à 8 pilules par jour.

Ampoules (0,02 cgr.) : 2 à 3 par jour.

Laboratoire MONTAGU

49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

IODENTÉROL

Iode métalloïdique et iodure de potassium en *solution* alcoolique, et *poudre* iodophile (substances amylacées et calcifiantes) assurant : 1° la tolérance parfaite de l'iode pur par la voie stomacale ; 2° la calcification simultanée de l'organisme.

Indications. — Toutes les manifestations de la bacillose extra-viscérale : adénopathies, synovites, ostéites, etc...

Formes et doses. — *Gouttes* administrées par la voie entérale ou digestive, selon un régime progressif jusqu'à quantités massives.

Établissements GALLINA
4, rue Candolle, Paris (V^e^).

IODE ORGANIQUE BOISSY

(C^8 H^{12} N^4 — C^2 H^5 I)

Comprimés de 10 centigrs, glutinisés et dragéifiés.

Propriétés. — *L'Iode organique Boissy* (Iodéthylhexaméthylènetétramine) est un corps cristallisé, blanc, renfermant 43% d'iode. Très soluble dans l'eau, il donne des solutions neutres, incolores, très dialysables. Ne provoque jamais d'iodisme. Se dissocie dans l'organisme avec mise en liberté d'*iode naissant*, puissamment *antitoxique* et *antiseptique*. Abaisse la tension artérielle et provoque une diurèse surtout manifeste au début de son emploi.

Indications. — Plus actif que l'iode et les iodures, les remplace avec avantage. Particulièrement efficace contre Hypertension, Angine de poitrine, Artériosclérose, Asthme, Emphysème, Rhumatisme, Goutte, etc.

Doses moyennes. — 2 à 8 comprimés par jour.

Laboratoire BOISSY
49, rue Hoche, COURBEVOIE près, Paris.

IODEX

Constitution. — Onguent non caustique à base d'iode assimilable (5%), exempt d'iodures minéraux.

Propriétés — Antiseptique, anti-inflammatoire, pénétrant, résolutif. N'irrite pas, ne tache pas l'épiderme, peut s'appliquer sur les plaies et les muqueuses. Toutes les propriétés thérapeutiques de l'iode libre, aucun des inconvénients de la teinture d'iode.

Indications. — Adénopathies, Engorgements glandulaires, Affections respiratoires, Maladies de la Peau, Rhumatismes, Hémorroïdes, Ulcères, et en général dans tous les cas où l'iode est indiqué.

Mode d'emploi. — Frictionner la partie malade avec de l'Iodex jusqu'à disparition de la coloration. Dans les cas où la friction est rendue impossible, appliquer l'Iodex en couche épaisse et bandager légèrement. L'Iodex s'emploie aussi en tampons vaginaux.

Littérature et échantillons.

LABORATOIRES FANYAU

46, rue Claude-Lorrain, Lille.

IODEX AU SALICYLATE DE MÉTHYLE

Constitution. — Iodex combiné à 5% de salicylate de méthyle.

Propriétés. — Analgésique, antiseptique, résolutif. Réunit les propriétés thérapeutiques de l'Iodex et celles du salicylate de méthyle.

Indications. — Rhumatisme, Arthrite, Sciatique, Goutte, Névralgies, Névrite, Myalgie, Lumbago, Tabès, Ankyloses, Entorses, Engelures non ouverte, et en général dans les Etats inflammatoires particulièrement douloureux. Dans les cas où le salicylate de méthyle est contre-indiqué, prescrire l'Iodex simple.

Mode d'emploi. — Après fomentation à l'eau chaude, masser les parties atteintes avec l'Iodex au Salicylate de Méthyle jusqu'à disparition de la coloration. Répéter les massages 3 ou 4 fois par jour suivant les cas. Sur les endroits trop sensibles pour supporter la friction, étendre l'onguent et recouvrir d'un léger bandage.

Littérature et échantillons,

LABORATOIRES FANYAU

46, rue Claude-Lorrain, Lille.

IODHÉMA

Iodo-alcoylate-méthyle-benzile d'hexaméthylène tétramine, en solutions aqueuses (43% d'iode assimilable).

Indications :

Toutes les formes du rhumatisme chronique.

Formes :

1° *Ampoules* de 5cc. et de 10cc. : 1 ou 2 par jour (veines et tissus), en boîtes de 10 ;

2° *Flacons* (voie entérale ou digestive). 1 ou 2 cuillerées à café par jour dans de l'eau sucrée, *entre les repas.*

Mêmes présentation pour :

1° *Iodhéma M* (Méthyle pur) indiqué dans la goutte aiguë et chronique ;

2° *Iodhéma B* (Benzyle pur) utilisé dans les infections urinaires et hépatiques.

Établissements GALLINA
4, rue Candolle — PARIS (V^e^)

IODINE MEDOL

Pommade pour pansement : désinfecte et guérit les plaies, les coupures, les brûlures et toutes les affections de la peau.

Composition. — Les principes actifs de l'*Iodine Medol* sont l'*Iode* et la *Creoline* dans un excipient spécial miscible aux sécrétions en donnant une émulsion qui pénètre dans la peau et atteint les tissus profonds.

Indications. — Traitement de toutes les dermatoses et pansement de toutes les plaies.

Présentation. — En tube d'étain.

LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES WILLIAM PEARSON
5, rue Clauzel, Paris (IX^e^)

IODO-BISMUTHATE DE QUININE FRAISSE

Composition :

Iodo-Bismuthate de Quinine : 0 gr. 30 ; huile d'olive : 3 cm³.

Indications :

Dans toutes les formes de la syphilis.

Traitement ordinaire 15 à 20 ampoules, dont une tous les trois jours.

Prix de la boîte de 6 ampoules :

18 francs.

Laboratoires FRAISSE

8, rue Jasmin, 8 — PARIS

IODO-BISMUTH ERCÉ

Iodo-bismuthate de quinine

Forme. — Ampoules-seringues auto-injectables, pour injections intra-musculaires.

Avantages sur les préparations analogues.

1° Trois fois *moins* d'excipient à injecter.

2° Suspension *stable* permettant d'éviter une agitation longue et pénible.

3° Suppression du transvasement toujours difficile d'une suspension huileuse.

4° *Résorption parfaite.*

Indications. — Syphilis à toutes ses périodes.

Laboratoires ROBERT & CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS

IODOGÉNOL PÉPIN

Peptone iodée spéciale.

Gouttes titrées. Supérieur à tous les produits similaires, aux iodures métalliques et aux vins et sirops iodés.

S'en différencie par : 1° L'absence d'acide iodhydrique libre ; 2° La grande stabilité des iodures organiques et la nature de leurs bases ; 3° La très grande proportion d'iode substitué (25 %) de l'iode total au lieu de 0 à 8 %) ; 4° La très grande activité pharmacodynamique de l'iode sous cette forme.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

Les études clinique et physico-chimique montrent que c'est la meilleure forme d'administration de l'iode et des iodures.

Posologie. — Enfants : 10 à 30 gouttes par jour; adultes : 40 à 60 gouttes par jour, dans un peu d'eau, aux repas, en 2 fois. (Syphilis : 100 à 120 gouttes par jour.)

Laboratoires PÉPIN et LEBOUCQ
à COURBEVOIE (Seine)

IODO-MAISINE

Globules.

Combinaison directe de l'*Iode* et d'une *Albumine* d'origine strictement *végétale*.

Propriétés particulières :

Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète de l'iodisme. Aucune désagrégation dans l'estomac. Action directe par voie intestinale sur les organes hématopoïétiques.

Indications :

Maladies infectieuses, tuberculose, affections parasitaires, syphilis, affections cardio-vasculaires, artériosclérose, arthritisme, obésité, carence organique d'iode, tumeurs, insuffisance thyroïdienne, goitres, asthme, emphysème, engorgements ganglionnaires, lymphatisme, rhumatisme, goutte. Puissant adjuvant des médications reminéralisantes.

Posologie :

Chaque globule contient un cgr. d'iode actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme d'iodure alcalin. *Enfants* : 4 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 10 globules et au delà par jour, en deux fois, avant les repas.

IODO-MAISINE

Pommade.

Iodo-Maïsine incorporée à un excipient spécial totalement exempt de vaseline ou de lanoline inabsorbables.

Propriétés particulières :

Pénétration intradermique complète. Teneur élevée en principe iodé actif. Absence de toxicité. Suppression de l'iodisme et de l'irritation locale. Efficacité 15 à 20 fois plus grande qu'une pommade iodée ou iodurée au même titre.

Indications :

Adénites, engorgements glandulaires, goitres, sporothricoses, arthrites, lymphangites, ostéites, dermatoses sèches, eczémas secs, psoriasis, affections rhino-pharyngiennes. Toutes affections justiciables d'un traitement iodé ou ioduré local.

Mode d'emploi :

Frictions (ou onctions) matin et soir sur la région choisie pendant deux à trois minutes jusqu'à absorption complète. Aucun pansement consécutif.

L'*Iodo-Maïsine pommade* est présentée en *tube*. Une section de deux centimètres de longueur sortant du tube correspond à un centigramme d'iode complètement assimilable.

Laboratoires de l'IODO-MAISINE
J. SOUDAN, pharmacien ex-interne des hôpitaux de Paris
6, rue Rosenwald — PARIS (XV^e^)

IODOMÉTINE

Solution concentrée et titrée d'iodhydrate d'hexaméthylène tétramine.

Combinaison organique d'iode soluble et assimilable, 5 gouttes représentent 1 centigramme d'iode ; 20 gouttes agissent comme 1 gramme d'iodure alcalin.

Propriétés thérapeutiques. — Excitateur puissant des fonctions lymphoïdes, déterminant une hyperleucocytose intense. Agent antiinfectieux énergique par son radical hexaméthylène tétramine.

Indications. — Toutes affections glandulaires. Adénites. Végétations adénoïdes. Scrofulides, etc. Maladies de la nutrition. Goutte. Rhumatismes chroniques. Sciatique. Asthme. Emphysème, etc.

Posologie. — *Adultes :* 20 à 60 gouttes par jour. *Enfants :* 5 à 20 gouttes par jour.

Laboratoire E. HAUTDIDIER
37, rue Galilée, PARIS (XVI[e]).

IODONE ROBIN

Combinaison physiologique d'iode et de peptone de viande de bœuf.

Gouttes : dont 20 = 1 gr. d'iodure de potassium.
Doses et mode d'emploi. — 10 à 40 gouttes à prendre en 2 fois aux repas dans un peu de boisson.

Prop. thér. — Dépuratif, reconstituant assimilable, non toxique, tolérance parfaite, jamais d'iodisme.

Indications. — Maladies par ralentissement de la nutrition ; artério-sclérose ; obésité ; polysarcie ; dégénérescence graisseuse ; intoxications chroniques ; asthme ; emphysème ; rhumatisme ; arthritisme ; goutte ; tertiarisme.

Laboratoires M. ROBIN
13, Rue de Poissy — PARIS

IODONUCLÉOL

Iode organique soluble (orthoïodobenzoate de soude).

Forme. — Gouttes.

Odeur et saveur agréables. Pas de manifestation d'iodisme.

Indications. — Hypertension, Artériosclérose, Emphysème, Asthme, Obésité, Adénites, etc.

Doses. — XX gouttes avant chaque repas dans un peu d'eau, 2 ou 3 fois par jour.

Laboratoire P. MAUCHANT
14, rue de Birague — PARIS (IVe)

IODOSTARINE "ROCHE"

Acide diiodo 6-7 élaïdique ou taririque diiodé du Professeur Arnaud (Communication à l'Académie des Sciences, Paris, CXLIX, page 220), 47,56% d'iode organique complètement assimilé, sans aucune saveur. Absorbé seulement dans l'intestin.

Indic. Thér. :

Remplace KI aux mêmes doses.

Posologie et mode d'emploi :

Iodostarine "Roche" cachets, dosés à 0,25 cgr. Adultes : 1 à 4 par jour, selon les cas.

Iodostarine "Roche" comprimés, dosés à 0,125 mgr. Adultes : 2 à 8 par jour, selon les cas ; Enfants 1 à 4 par jour, selon l'âge. Les comprimés peuvent être absorbés très facilement avec un peu de liquide (eau, vin, thé ou café), au choix du malade.

Iodostarine "Roche" granulé, dosé à 0,25 cgr. par mesure (intérieur de la capsule en aluminium). Adultes : 1 à 4 mesures par jour, selon les cas ; Enfants : 1/2 à 2 mesures par jour, selon l'âge.

Toutes ces préparations sont d'une blancheur immaculée.

N. B. — On prend l'Iodostarine "Roche" de préférence à la fin des repas.

Produits
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
21, Place des Vosges — PARIS

IODO-THYROIDÏNE CATILLON

Forme :

Tablettes de Catillon à 0,25 de Corps Thyroïde, titré, stérilisé.

Indications :

Obésité, Goitre, Myxœdème, Dermatoses.

Doses :

1 à 2 contre Myxœdème ; 2 à 8 contre Obésité, Goitre, Herpétisme, Ostéogénèse.

Laboratoire CATILLON
3, Boulevard Saint-Martin — PARIS

IODOVEINE LEDUC

Complément rationnel du Traitement sclérosant.

Combinaison stable et concentrée d'iode, d'hamamélis, de marron d'Inde, de Viburnum d'hydrastis renfermant 0,03 cgr d'iode métal pour 50 gouttes d'extrait représentant son propre poids de plantes.

Indications. — Varices, ulcères variqueux, hémorroïdes, phlébites, varicocèles, artériosclérose, troubles de la ménopause. Toutes les indications de l'iode sans ses inconvénients.

Doses. — Débuter par 5 gouttes à midi et le soir augmenter 1 goutte par repas pour arriver insensiblement à 25 gouttes soit : 50 gouttes par jour — vingt jours par mois.

B. E. JAUME
Pharmacien à Tamaris près Alès (Gard).

IODURASE

Description. — Capsules kératinisées contenant:

Iodure de potassium pur.....	0 gr. 50
Levurine extractive.....	0 gr. 10

Action thérapeutique. — La même que celle de l'iodure, mais sans iodisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère l'iodure que dans le milieu alcalin de l'intestin. Dosage rigoureux, conservation indéfinie et facilité d'absorption.

Indications. — 1 à 6 capsules par jour dans l'artériosclérose, l'asthme, l'emphysème, l'arthritisme, la syphilis, le goitre, l'obésité, le saturnisme.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, Avenue Hoche — PARIS

IODURES PACHAUT

chimiquement purs

Tubes doses d'Iodure de potassium à faire dissoudre au moment de l'emploi. — Conservation parfaite.

Présentation :

Tubes dosés à 0 gr. 25, 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr.

Laboratoires PACHAUT

130, Bd Haussmann — PARIS

IODURE PHILIPPE

Forme. — En *pilules kératinisées* : elles évitent les maux d'estomac, suppriment réellement l'iodisme. — *Plus de 30 ans de pratique et de succès.*

Prière de prescrire :

Pilules Philippe à l'iodure de potassium { à 0,50 / à 0,20 / à 0,10

Sans indication spéciale, ce sont les **Pilules Philippe** à 0,20 centigr. d'iodure qui sont délivrées.

Pilules Philippe à l'iodure de sodium à 0,20.

Indications. — Artério-sclérose, Adénopathies, Tension artérielle, Goître, Obésité, Syphilis, etc.

Dose. — 2, 4, 6 et même 8 pilules par jour, en deux ou trois fois.

Littérature et Echantillons

Laboratoire du Docteur H. PHILIPPE

11, rue Palais Grillet — LYON

IPECA-DIGITALE DAUSSE

Traitement des Hémoptysies
(voie intraveineuse)

Ampoules injectables de 1 cc., correspondant à 0 gr. 20 de poudre d'ipéca titrée et à 25 milligr. d'intrait de digitale.

Action rapide, en injection intraveineuse, sur les hémoptysies tuberculeuses graves.

Mode d'emploi. — Dès le début d'une hémoptysie grave, ou après échec des autres traitements, injecter dans les veines, chaque jour tant que dure l'hémorragie, 1 cc. d'ipéca-digitale Dausse. Dans les cas rebelles ou dans les hémoptysies abondantes, on injectera 2 cc. (soit 2 ampoules). On peut poursuivre cette médication pendant une dizaine de jours sans inconvénient (M. Piéry et A. Michel).

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV^e^).

IRRASTÉRINE

(anciennement Uviostérine)

Ergostérine irradiée par les rayons ultra-violets.
Vitamine D.

Composition. — Ergostérine pure irradiée aux rayons ultra-violets, en solution dans l'huile d'olives, sans aucune addition de cholestérine.

Propriétés thérapeutiques. — Véritable catalyseur du calcium et du phosphore, l'*Irrastérine* peut être considérée comme la médication spécifique de toutes les carences de l'organisme. — Cinq milligr. d'*ergostérine* équivalent à un litre d'huile de foie de morue.

Indications. — Toutes les indications de l'huile de foie de morue. — Troubles de l'ossification, rachitisme, accidents de carie dentaire, lésions d'ostéomalacie, prétuberculose et tous états de déminéralisation.

Dose et mode d'emploi. — Jusqu'à un : 10-15 gouttes, de 1 à 2 ans : 15-20 gouttes, de 3 à 10 ans : 20 à 30 gouttes et plus si besoin, le produit n'étant nullement toxique.

Les Établissemenis BYLA,
26, avenue de l'Observatoire, à PARIS.

R. C. Seine 71895.

ISACÈNE " ROCHE "

Laxatif synthétique nouveau.

Action thérapeutique. — L'Isacène " Roche " est la diacétyldioxyphénylisatine, insoluble dans l'eau et l'acide chlorhydrique, soluble seulement dans le milieu alcalin du côlon, où se constitue la constipation. Il est absolument atoxique, sans odeur, sans saveur, sans aucun effet nocif ; il agit d'une manière douce, constante, certaine, sans coliques, sans épreintes et sans ténesme. Il n'est pas absorbé au niveau de l'intestin, il ne passe pas dans l'organisme et il est éliminé en totalité avec les matières fécales.

Indications thérapeutiques. — Tous les cas de constipation (sans aucune exception), adultes bien portants ou malades, alités, opérés, rénaux, vieillards, intoxiqués, femmes enceintes, enfants, etc.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes.

Dose laxative	légère . . .	2 granules.
—	moyenne .	2 à 4 granules.
—	forte	4 à 8 granules.

Enfants.

1/4 ou 1/2 dose, selon l'âge et le cas.

ISACÈNE " ROCHE "

Flacon de 40 granules.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

21, Place des Vosges, Paris (III[e]).

ISOTONYL BOURET

(Poudre de Lausanne)

Action.

L'estomac dilue ou concentre son contenu de façon à lui faire atteindre toujours le point cryoscopique de 0,38, nécessaire pour que le chyme franchisse le pylore.

L'Isotonyl Bouret aide l'estomac à remplir cette condition. Il stimule la fonction secrétrice des glandes gastriques, neutralise le suc gastrique hyper-acide, assure l'évacuation gastrique.

Formes et mode d'emploi.

Paquets, 1 pour 1 litre.
Discoïdes, 2 pour un verre.
Adultes : 2 à 3 verres par jour.
Enfants : 1/2 verre à Bordeaux à 2 verres par jour.
Après les repas, au moment des douleurs ou pesanteurs; ou le matin à jeun.

PHARMACIE CHAUMEL
87, rue Lafayette, Paris (IX°).

IXIUM

Solution isotonique stérilisée de Thorium X pour usage médical.

Principales utilisations et posologie du Thorium X

Affections traitées.	*Doses de thorium X employées.*	*Marche et durée du traitement*
Anémie Chlorose Neurasthénie	De 25 à 75 microgrammes, par augmentations successives de 25 microgrammes toutes les deux semaines.	8 à 10 injections, au rythme d'une injection par semaine.
Goutte	Débuter par des doses légères, en dehors des crises douloureuses, — de 50 à 200 micros — par augmentations successives de 50.	10 injections successives, au rythme d'une par semaine.
Rhumatisme Spondylose Sciatique Névsite	Débuter par 100 microgrammes et augmenter progressivement de 25 ou 50 par semaine jusqu'à la dose de 250 micros, dose à maintenir jusqu'à la fin de la série.	8 à 10 injections, au rythme d'une injection par semaine.
Leucémies Tumeurs Cancer Maladie de Hodgkin	Commencer par 350 microgrammes pour arriver à 500 par augmentations successives de 50 microgramme.	5 à 6 injections, au rythme d'une injection par semaine.
Psychoses Aiguës	Doses variant entre 350 et 500 microgrammes.	5 injections, au rythme d'une injection par semaine.
Blennorrhagies chroniques	Solution de 5 cmc. de Thorium X, de 25 à 50 microgrammes.	1 à 2 injections uréthrales par semaine, pendant 3 semaines.

Il est bien entendu que les doses ci-dessus peuvent être modifiées au gré du médecin et que les séries peuvent être renouvelées après un intervalle d'environ 2 mois de repos.

Toutes les doses sont exprimées en microgrammes de bromure de radium.

L'Ixium est préparé à Paris tous les mardis par les

Etablissements ALBERT BUISSON

F. JALOT et Cie, 157, rue de Sèvres. Paris (XVe)

R. C. 222-705 B.

IXOGYNE

Antiseptique gynécologique
(*Usage externe.*)

Composition. — Association de formaldéhyde, aldéhyde trichlorée, excipient spécial au baume benjoin de Siam. Parfum très agréable.

Action. — Antiseptique, antiprurigineux, décongestif, cicatrisant, désodorisant.

Indications. — Affections gynécologiques : vaginites, bartholinites, métrites, salpingites, prurit vulvaire, hygiène quotidienne de la femme. Soins obstétricaux.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café dans un litre d'eau chaude pour une injection, deux par jour.

LABORATOIRE CHIMICO-THÉRAPIQUE DE PARIS
12, rue des Apennins — PARIS (XVII[e]).



JÉCOL

Régulateur entéro-hépatique.

La déficience du foie étant la cause initiale de nombreux états morbides, l'effort thérapeutique doit porter sur la cellule hépatique qu'il convient de stimuler afin d'en rétablir le délicat fonctionnement.

Par son action progressive et douce, le Jécol se classe au premier rang des médicaments destinés à traiter l'*hépatisme* sous toutes ses formes :

Congestion et *Insuffisance du foie, Gastro-entérite, Entérite muqueuse, Auto-intoxication*, etc.

Formule. — *Combretum* (extrait spécialisé de kinkélibah).
Boldo (extrait aqueux).
Evonymus (extrait titré).

Forme. — Petits cachets.

Prescription. — 2 à 4 cachets par jour fin des repas, 3 à 6 semaines.

Cette dose pourra être augmentée ou diminuée chaque semaine, suivant les résultats constatés, par le médecin traitant, chez le malade.

LABORATOIRE DU JÉCOL
3, rue Watteau, Courbevoie (Seine).

JEMALT WANDER

A base d'huile de foie de morue
et d'extrait de malt à l'état de paillettes.

Composition. — Huile de foie de morue 30 %, Extrait de malt 64 %, Cacao 6 %, Essences aromatiques Q. S.

Indications. — Le jemalt réalise la médication à l'huile de foie de morue renforcée des éléments nutritifs et digestifs (diastases) de l'Extrait de malt. Anémie en général, Croissance des enfants.

Doses. — Enfants jusqu'à deux ans, une à deux cuillerées à café par jour.

Enfants plus âgés, adolescents et adultes : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Se prend le matin, le soir, ou entre les repas tel que (il fond rapidement dans la bouche), ou dilué dans du lait tiède ou infusion.

Etablissements WANDER
58, rue de Charonne — PARIS (XI[e])

JUGLANE

Composition. — Principe actif du noyer sauvage.

Indications. — Toutes les formes du diabète et ses complications : acidose, acétonémie, en particulier les diabètes gras, arthritiques, hépatiques. Aucune contre-indication, tolérance parfaite, innocuité absolue, aucune incompatibilité.

Mode d'emploi. — Trois à quatre pilules avant chacun des trois repas. Cette dose peut être doublée sans inconvénient. Continuer progressivement le traitement jusqu'à complète disparition du sucre dans les urines.

Produits Euthérapiques
C. CONS, Anc. Int. des Hôpitaux de Lyon
Rue des Ecoles — CHAMBERY (Savoie)

KAOBROL

Composition. — Bromure de sodium et Poudres absorbantes. Kaolin, carbonate de magnésie, carbonate de chaux, gomme pour homogénéiser la poudre.
Poudre blanche de saveur agréable, sucrée et aromatisée à la menthe.

Indications. — Toutes les dyspepsies, plus spécialement hyperchlorhydriques et nerveuses. Troubles digestifs de la femme enceinte. Gastro-entérites,

Posologie. — Une cuillerée à café après les repas et au moment des crises douloureuses.
Littérature et Echantillons à Messieurs les Docteurs.

Laboratoire du KAOBROL

51, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

KAOLINASE

Pour pansements gastriques.

Kaolin purifié, en poudre fine très adhésive, livré en boîtes de 20 paquets de 10 gr.)

Dose et mode d'emploi. — 1 ou 2 paquets le matin à jeun (mode d'emploi sur prospectus).

Propr. thérap. — La KAOLINASE constitue le médicament de choix pour le *plâtrage* de l'estomac (Prof. Hayem, *A. M.*, 13-5-1920.

Indications. — Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Ulcères et ulcérations de l'estomac, Colites, Fermentations gastro-intestinales, etc., etc.

Échantillons gratuits.

PHARMACIE RATIONNELLE

20, Rue Faubourg-Poissonnière — PARIS (X^e^)

KERLACTINE

Composition. — Pilules kératin, d'acide lactique pur de ferment (principe actif de tous les ferments actiques comprimés ou liquides) *ne libérant son spécifique que* **loco dolenti.**

Indications. — Médicament le plus sûr, pratique et scientifique des **entérites** et de toutes les affections intestinales ou d'origine intestinale avec leurs répercussions *cutanées, rénales, hépatiques* et *colibacillaires.*

Posologie. — 6 à 10 pil. pro. die, à la fin des repas.
(pas de contre-indication et rigoureusement *atoxique*).

Échantillons : **« KERLACTINE »**
71, avenue de Saxe, Lyon (VIe)

KIDOLINE

Huile adrénalinée au millième.

Indications.

1) Coryza aigu du nourrisson chez lequel la kidoline permet l'alimentation en rétablissant en partie la perméabilité nasale.
2) Adénoïdite aiguë de l'enfance ; décongestionne puissamment les muqueuses, modifie la nature des sécrétions et permet l'usage *utile* de sels argentiques qui sans cela pénètrent trop insuffisamment.
3) Accès de faux croup.
4) Rhinites aiguës avec menace de sinusite.

Mode d'emploi.

Chez les nourrissons instiller à la fois V à VI gouttes dans chaque narine 5 minutes avant la tétée.
Chez l'enfant : 4 fois par jour instiller VI à X gouttes en pulvérisations.

Tolérance parfaite. Aucune contre indication.
Flacon de 20 centilitres.

LABORATOIRE R. GALLIER
38, Boulevard Montparnasse, Paris.

KINA ELZÉVIR

Apéritif, digestif, fortifiant, fébrifuge.

Par ses propriétés apéritives et digestives, procure l'appétit, régularise et active la nutrition et l'assimilation.

Par son action tonifiante, relève les forces, agit favorablement sur le système nerveux, le système musculaire et, en général, sur tous les tissus de l'organisme.

Par ses propriétés fébrifuges, sert d'adjuvant essentiel à la médication habituelle de toutes les formes du paludisme.

Préparation concentrée de quinquina, de kola, de coca, de gentiane, de quassia et de phosphates assimilables, cette association assure au *Kina Elzévir* une activité maximum.

Il peut, avec avantage, être donné aux enfants.

Flacon dose pour un litre (prix modique).

Echantillon gratuit et notice au Corps Médical sur demande.

Laboratoires des Établissements H. SALLE
4, rue Elzévir — PARIS (III^{e}).

KINECTINE

Spécifique de la Fièvre des Foins
et du Coryza aigu

Indications :
Fièvre des Foins, Coryza aigu.

Forme :
Comprimés.

Posologie :
Adultes. — 3 comprimés par jour.
Enfants. — Moitié dose.

Établissements MOUNEYRAT
12, Rue du Chemin-Vert
à VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine)

KIPSOL

(en pilules)

Cacao pulv. et tannates actifs d'alcaloïdes.

(Avantages curatifs des préparations belladonées et opiacées, à l'exclusion de leurs inconvénients.)

Dose et Mode d'emploi. — 2 à 7 pilules par jour, espacées au moins de deux heures. — Ces pilules, très petites, s'avalent facilement avec une gorgée d'eau et même sans aucun véhicule liquide.

Prop. Thér. — Spécifique des Coryzas accidentels ou chroniques, des toux, bronchites, coryza des iodures, grippe, etc.

Indications. — Préservatif et curatif des rhumes.

BERTAUT-BLANCARD Frères
64, rue de La Rochefoucauld — PARIS

KLUCHOL REMEAUD

à base de Benzoate d'Anéthol Solubilisé.

Forme. — Sirop d'un goût très agréable, bien accepté des enfants. — Non toxique.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique puissant, calmant et curatif de la coqueluche, des toux coqueluchoïdes ou nerveuses, asthme, etc...

Posologie. — *Adultes* 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Enfants.

Moins d'un an.....	2 à	4 cuill. à café par jour.	
1 à 5 ans.....	4 à	8	—
5 à 10 ans.....	5 à	10	—
au-dessus de 10 ans.	8 à	10	—

Nota.

L'innocuité absolue permet d'augmenter progressivement, et même de doubler les doses ci-dessus, jusqu'à l'obtention rapide de l'effet désiré.

LABORATOIRE REMEAUD
38, Avenue J. Baptiste Clément, Boulogne sur-Seine.
Téléphone : 459.

KOLA GRANULÉE ASTIER

Composition. — Extrait de Kola granulé contenant tous les principes actifs de la noix fraîche : caféine, théobromine, combinaisons tanno-caféiniques, rouge de Kola et tanins actifs.

Prop. thér. — Régulateur du cœur. Excitant musculaire. Reconstituant du système nerveux. Tonique général des forces intellectuelles et physiques.

Indications. — Neurasthénie, dépression mentale, adynamie cardiaque, troubles fonctionnels cardiaques, grippe, convalescence des maladies infectieuses et maladies graves, asthénie, surmenage physique et intellectuel.

Posologie. — Dose moyenne : 2 cuill. à café par jour, à prendre tel que dans le creux de la main, ou en dissolution dans tout liquide aqueux.

Prix : 10 francs.

Laboratoires P. ASTIER
41 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI[e])

KYDALOSE

Poudre à priser sulfo-iodée

Indications

Obstruction nasale et ses conséquences.
Catarrhe de la trompe d'Eustache.
Coryza chronique et aigu.
Ozène — Rhume des foins.

N. B. — Une modification récente dans la formule de la Kydalose a permis de l'employer avec succès dans le coryza aigu, l'élément iodé étant actuellement incorporé dans une combinaison organique bien tolérée par la muqueuse nasale congestionnée.

JALIN, 49, Quai Saint-Vincent, LYON

KYMOSINE ROGIER

(Anciennement Pegnine)

A base de Ferment lab et sucre de lait purifiés. — Poudre blanche.

Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

Dose. — Une cuillerée-mesure dans 200 cm³ de lait tiède à 40°.

Une pincée dans une cuillerée à café d'eau avant chaque tétée.

Le flacon, 12 fr. 50

Henry ROGIER

Docteur en Pharmacie

56, boulevard Péreire — PARIS

LAB LACTO FERMENT MIALHE

Digestion du lait.

Indications. — Diarrhées vertes des nourrissons et dans tous les cas de mauvaise digestion du lait, troubles gastro-intestinaux, régime lacté où le malade doit absorber une forte quantité de lait.

Dose. — Pour adultes et enfants: une cuillère-mesure par verre de lait. Nourrissons: une demi-cuillère-mesure par biberon ou par tétée.

Mode d'emploi. — Mettre la dose indiquée dans une à deux cuillerées d'eau, puis ajouter le lait, froid ou tiède.

Pharmacie du Dr MIALHE
8, rue Favart — PARIS

LABORATOIRES DU Dr L. BERTRAND (Anvers).

Immuno-vaccins :

Anti-rhumatismal, Anti-typhique (préventif et curatif), Anti-grippal, Anti-staphylococcique, Anti-gonococcique, etc.

Immuno-antivirus :

Gripp l, Tuberculeux, Staphylococcique, Gonococcique, Streptococcique, etc.

N.-B. - L'Antivirus n'exerce que localement ses propriétés immunisantes (territoires infectés de la peau et des muqueuses). Donc, si l'infection s'étend, il est indiqué d'employer, en même temps, un vaccin correspondant.

Seuls concessionnaires pour la Belgique et le Congo belge :

Union Chimique Belge, S. A.
Division : Produits pharmaceutiques "Meurice"
98, rue Berkendael, BRUXELLES (Belgique).

LACCODERMES

Vernis pour le traitement des Dermatoses. — Pansement Médicamenteux

Laccoderme à l'oxyde de zinc. — Rougeurs. — Boutons. — Dartres.
Laccoderme Sulfocadique. — Séborrhées. — Impétigo. — Folliculites. — Acné.
Laccoderme au Goudron de Houille. — Eczémas aigus et chroniques.
Laccoderme à l'Ichthyol. — Eczéma. — Ecthyma. — Brulures.
Laccoderme Ichthyol Stovaïne. — Prurits. — Zona.

Mode d'emploi. — Nettoyer la peau au savon Denisol. Étendre le laccoderme. Laisser sécher et saupoudrer avec l'Anytal Brisson.

Laboratoires P. BRISSON et Cie.
114, Avenue Michelet Saint-Ouen, Seine.

LACHÉSINE

Extrait du venin du *Trigonocephalus lachesis.*

Forme. — Comprimés solubles dans l'eau.

Mode d'emploi. — Deux à quatre comprimés par jour en dehors des repas. Résultat rapide.

Indications. — *Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale.* (Bouffées de chaleur, sueurs, vertiges, congestion céphalique, dyspepsie, mélancolie, etc.)
S'abstenir pendant les règles.

Laboratoire RENAUD
2, rue Demours, Paris (XVIIe).
Téléphone Wag. 83-97.

LACTIMASE

Description. — Comprimés de ferment lactique de 0 gr. 50 ; par flacons de 40 comprimés.

Action thérapeutique. — La *Lactimase* détruit les microbes pathogènes de l'intestin par accaparement du milieu, action renforcée par la symbiose du bacille Bulgare et d'une levure spéciale.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour dans les intoxications intestinales, diarrhées vertes de nourrissons, constipation, dysenteries, entérites.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX
18, avenue Hoche — PARIS

LACTOBYL

Composition :
Extrait Biliaire dépigmenté.
Extrait total de glandes intestinales.
Charbon poreux hyperactivé.
Ferments lactiques sélectionnés.
Extrait Cytoplasmique de Lammaria flex.
Hypophyse (lobe postérieur).

Forme. — En comprimés de 0 gr. 25.

Prop. Thér. — Rééducateur intestinal.

Indication. — Constipation. Stase intestinale chronique.

Dose et mode d'emploi. — Commencer le traitement par deux comprimés 10 minutes avant les repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

LE " LACTOBYL "
11, rue Torricelli. PARIS (XVII^{e})

LACTOCHOL

Composition.— Ferments lactiques. Extraits biliaires dépigmentés.

Forme. — Comprimés et granulés (enfants et nourrissons).

Propriétés thérapeutiques. — Infections intestinales, entérite, dermatoses.

Dose et mode d'emploi :

Adultes : (comprimés) 4 à 12 avant le repas dans de l'eau sucrée (avaler sans mâcher).

Enfants : 2 à 6 comprimés par jour dans miel, confiture ou 2 à 6 cuillerées à café de granulé.

Nourrissons : Une demi-cuillerée à café de granulé avant une tétée, ou un biberon, matin et soir.

LABORATOIRES RÉUNIS
" LOBICA "
11, rue Torricelli, Paris (XVII[e]).

LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs.

Compos. — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaire, agar-agar, ph-phtaléine.

Forme. — Comprimés.

Propr. thér. — Supprime la constipation, les intoxications gastro-intestinales, les fermentations putrides, rétablit les fonctions normales de l'intestin sans la moindre irritation.

Doses. — 1 à 3 comprimés pour adultes pris le soir avec un peu d'eau sucrée.

Enfants, 1/2 comprimé suffit.

Se vend par boîtes de six tubes de six comprimés.

Laboratoires Biologiques
André PARIS
4, Rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV[e])

LACTO-MANNITASE

Ferments Lactico-Mannitiques
et Levures symbiotiques à durée de vie
pratiquement illimitée.

Troubles fonctionnels de

l'ESTOMAC et de l'INTESTIN

Infections intestinales. Entérites. Maladies Infantiles, etc.

Action. — Diastasique. Antimicrobienne. Evacuatrice (Mannite biologique).

4 à 6 comprimés par jour suivant avis médical.

Aucune contre-indication.

Laboratoires :

37, rue de Tivoli — BORDEAUX

LAIT DE MAGNÉSIE PHILLIPS

(The Chas H. Phillips Chemical Company. New York et Londres)

Composition.

Le Lait de Magnésie Phillips est une combinaison définie d'Oxyde de Magnésie et d'eau dont la formule est $Mg.H_2o_2$. Trente grammes environ de liquide contiennent 1 gr. 60 d'Hydroxyde de Magnésie.

Particularités.

Le Lait de Magnésie Phillips est entièrement soluble dans le suc gastrique, agréable à prendre, et son usage prolongé ne présente aucun inconvénient.

Il ne contient aucun carbonate et ne donne lieu à aucun dégagement d'acide carbonique lorsqu'il se combine avec les acides, en conséquence il ne produit pas de dilatation d'estomac.

Il a l'avantage sur les autres alcalins d'être laxatif, et l'on sait que l'hyperacidité est une cause de constipation. Cette propriété laxative contribue, elle aussi, à la guérison de l'hyperacidité.

Indications.

Hyperacidité. Indigestion. Constipation.

Doses.

Antiacide et neutralisant : une cuillerée à café à une cuillerée à bouche étendu d'eau environ une demi-heure après les repas.

Sédatif gastrique : une cuillerée à café dans de l'eau très froide ou de la glace pilée.

Laxatif : Prendre de 30 à 60 grammes de Lait de Magnésie. Pour faciliter son action, on peut ensuite absorber du jus de citron ou d'orange.

Pour les enfants les doses doivent être réduites de moitié 1et au quart pour les Bébés.

Il est également par ses propriétés neutralisantes un excellent dentifrice, il protège les dents contre les érosions dues aux acides cause de carie.

Littérature et échantillons au Dépôt Général :

PHARMACIE ANGLAISE
des CHAMPS-ÉLYSÉES

62, Avenue des Champs Élysées, Paris (VIII[e]).
Téléph. : Elysées 22-52.

LAIT SEC GLAXO

Provient d'animaux parfaitement sains au pâturage toute l'année. Desséché par le procédé des cylindres qui conserve au produit toutes les vitamines du lait naturel. Composition uniforme et très voisine de celle du lait humain. Contrôle chimique et bactériologique rigoureux : par sa pureté Glaxo est supérieur à tous les autres laits (1 000 fois plus pur que le lait crû aseptique, 100 000 fois plus pur que le lait ordinaire de consommation).

Digestibilité parfaite. Conservation de longue durée.

Trois formes : trois-quarts crème (degré normal), demi-crème, tout-crème.

Indications :

Alimentation exclusive ou allaitement mixte du nourrisson. Toutes les intolérances lactées. Troubles gastro-intestinaux (entérites, diarrhées, vomissements). Convient particulièrement aux prématurés, aux débiles, aux athrepsiques. Très utile comme aliment de transition entre la diète hydrique et la reprise de l'alimentation habituelle Sera encore prescrit chez les adultes qui tolèrent mal le lait de vache au cours des maladies nécessitant une alimentation substantielle et de digestion facile. Rendra enfin de grands services en voyage et dans les colonies.

Posologie :

Diluer la quantité voulue de Glaxo dans sept fois son poids d'eau bouillie tiède (une cuiller à café ou une mesure rases de Glaxo pèsent 4 grammes).

Littératures et échantillons.

Laboratoires GLAXO

41, rue Bergère, Paris (IX^{e}).

Tel, Provence : 29-98. — R. C. Seine : 210-361 B.

LANSOYL

HUILE DE PARAFFINE ROBERTS

Deux formes. — Liquide et gelée

Liquide : Huile de paraffine chimiquement pure, très visqueuse et de dentisité très élevée. Sans goût ni odeur.

Gelée : Contient 90% de Lansoyl liquide et 10% de sucs de fruits et d'agar-agar. Goût, odeur et aspect agréables. Parfait pour enfants, vieillards et personnes à estomac délicat.

Propriétés thérapeutiques. — Lubrifie l'intestin, le décongestionne, régularise ses fonctions.

Indications. — Constipation chronique. Inflammations, Entéro-Colite, Flatulences, Coliques, et en général toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Doses. — *Adultes :* Une cuillerée à soupe le matin et le soir.

Enfants : Une cuillerée à café trois fois par jour.

Nourrissons : Une demi-cuillerée à café trois fois par jour.

ROBERTS & Cie Pharmaciens
5, rue de la Paix — PARIS

LANTOL

(Procédé André LANCIEN)

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de rhodium à 0 gr. 20 par litre ; en ampoules de 3 cc. par boîtes de 4 ampoules, et en capsules kératinisées pour la voie gastrique en flacons de 60 capsules.

Action thérapeutique. — Colloïde isotonique, non toxique et indolore. Provoque la baisse de la température, une sensation de bien-être notable et une hyperleucocytose considérable, suivie de la destruction des agents infectieux localisés ou disséminés dans l'organisme.

Indications. — 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses, dans toutes les septicémies, pneumonies, péritonites, scarlatines, typhoïdes et tous états infectieux. Les capsules servent à compléter et achever le traitement tout le temps nécessaire.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX
18, Avenue Hoche — PARIS

LAURÉNOL MÉDICINAL

Chloro-aluminate de zinc sulfo-cuprique

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, désodorisant, ni toxique, ni caustique.

Indications. — En chirurgie, gynécologie, obstétrique, brûlures, dermatologie, hygiène médecine générale.

Mode d'emploi. — Pansements, injections vaginales.

Puissance antiseptique absolue (solution 3%).

Dose. — Suivant les indications.

Formes actives. — SAVON LAURENOL (antisepsie, toilette). — SAVON DENTIFRICE au Laurénol (asepsie buccale, 24 h.). — OVULES au LAURENOL (métrites, vaginites, pertes, etc.). — POMMADE au LAURENOL (affections de la peau).

LAURENOL n° 2, désinfectant, sans odeur ni mercure.

Laboratoires BELIÈRES
19, rue Drouot — PARIS (IX^{e})

LAXAMALT

50 % huile de paraffine, 50 % extrait de Malt.

Poudre cristalline d'un goût très agréable.

Posologie :

Nourrissons : une cuillerée à dessert administrée le soir dans le dernier biberon ou dans un peu d'eau bouillie.

Enfants : Deux cuillerées à soupe par jour avant ou après les repas ou le matin à jeun et le soir avant de se coucher.

Adultes : Trois ou quatre cuillerées à soupe le soir avant de se coucher.

Laxatif physiologique dépourvu de toute action irritante sur l'intestin.

Particulièrement indiqué chez les entéritiques, les nourrissons, les femmes enceintes et les opérés.

Laboratoires LICARDY
38, boulevard Bourdon, NEUILLY, PARIS
Téléphone : Maillot 17-75

LAXAMER

(laxatif amer)

Composition. — Extrait fluide sucré à base de : Cascara sagrada, noix vomique, badiane, gentiane fraîche, écorces fraîches d'oranges amères.

Propriétés thérap. — Celles des amers et laxatifs doux n'irritant pas l'intestin ; cholagogue énergique, s'emploie dans la constipation. Il peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices car il n'a pas de contre-indication.

Mode d'emploi. — Une à deux cuillerées à café par jour, avant le repas.

Échantillons :

Laboratoire du Docteur C. LEFÈVRE
52, Rue Decamps — PARIS (XVI[e])

LAXATIFS MIRATON CHATEL-GUYON

Pastilles Miraton Chatel-Guyon. — Laxatif hydrominéral aux sels de la source Miraton Chatel-Guyon, stimulant idéal du péristaltisme intestinal, non irritant.

Dose. — 1 à 2 pastilles le soir au coucher.

Grains Miraton Chatel-Guyon. — Sels de la Source Miraton Chatel-Guyon associés à l'extrait total des glandes intestinales, à l'extrait biliaire et aux ferments lactiques. Régulateur physiologique de l'intestin, non irritant, sans accoutumance.

Dose. — 1 à 2 grains au repas du soir.

Littérature, Echantillons

Etablissements MIRATON
6, rue Rosenwald — PARIS (XV[e])

LAXIA DANNEC'H

Ferments lactiques laxatifs.

Ferments lactiques sélectionnés sur lactose	0 gr. 20
Phénolphtaléine	0 gr. 05
Excipient sucré vanilliné	0 gr. 15
	0 gr. 40

Traitement biologique de la constipation et des maladies causées par l'intoxication intestinale.

Propriétés Thérapeutiques. — Désinfection et évacuation régulière de l'intestin grâce à l'action combinée d'un laxatif doux, non toxique, et d'une culture concentrée de ferments lactiques sélectionnés, très riche en ferments vivants, dont la présence dans l'intestin en acidifiant le milieu empêche le développement des microbes basophiles de la putréfaction.

Mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés par 24 heures.

Efficace, inoffensif, de goût agréable le **Laxia Dannec'h** *est le purgatif idéal des enfants.*

Prix 4 fr. 50 le tube de 30 comprimés.

LABORATOIRE DES PRODUITS DANNEC'H

Brun et Dumée pharm., 64, rue des Tournelles, Paris (IIIe) R. du C. Seine 218-670

LAXOPEPTINE GIRARD

Laxatif pour Enfants.

Poudre à base de ferments de céréales, de citrate de soude et d'eupeptiques divers.

Mode d'emploi. — Une ou deux cuill. à café dans du lait ou de l'eau bouillie, le matin au réveil ou le soir au coucher. Doubler la dose pour les enfants de 2 à 7 ans.

Prop. Thér. — La Laxopeptine combat la constipation, régularise les fonctions digestives en assurant une bonne antisepsie intestinale.

Indications. — Gastro-entérites, ballonnement, gros ventre, vomissements, maladies aigües, fébriles et toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Laboratoire A. GIRARD

48, rue d'Alésia, Paris (XIVe)

LENICURE-VICHY

Médication préventive et curative des affections hépatiques et biliaires.
Adjuvant précieux de la cure de Vichy.

Composition :

Acides oléique et palmitique associés au combretum R.

Forme :

Pilules enrobées de gluten pour les soustraire à l'action dissolvante des sucs de l'estomac.

Propriétés thérapeutiques :

Le **Lenicure-Vichy** a une action dissolvante remarquable sur les calculs hépatiques. Il empêche la formation des boues biliaires en maintenant en dissolution la cholestérine, désagrège et permet l'élimination de ceux-ci sans douleur, excite et fluidifie la sécrétion biliaire.

Indication :

Coliques hépatiques, Congestions douloureuses du foie et de la vésicule biliaire, Hépatite paludéenne, Cirrhoses, Constipation d'origine hépatique.

Posologie :

1° Pendant la cure de Vichy : action adjuvante : de 4 à 8 capsules par jour.
2° Action préventive des coliques hépatiques : 8 capsules par jour, 10 jours par mois.
3° Action curative des coliques hépatiques : 12 capsules par jour.
4° Congestion douloureuse du foie et autres cas, 6 à 8 capsules par jour 10 jours par mois.

L'action du **Lenicure-Vichy** peut être prolongée *sans inconvénient*.

Laboratoires DALET
94, boulevard des Batignolles, Paris.

LEUCAGINE

Médication radioactive et bactéricide des infections utérines aiguës et chroniques.

Application. — Pansements utérins. 2 formes :

1° — **CRAYONS**

Présentation. — Crayons stérilisés à base d'organate d'argent et de bromure de radium, dosés à 1, 5 et 10 micros.

Indications. — Métrites. Affections du col et du corps — 2 applications par semaine (Consulter la notice).

N.-B. — Utiliser pour l'application notre appareil " *Porte-pansement* " spécial.

2° — **OVULES**

Indications. — Tous les cas d'infections des voies génitales. Un ovule tous les 3 ou 4 jours.

Demander renseignements et littérature aux

Laboratoires L.-G. TORAUDE O. ✻ O. I. Q
Docteur en Pharmacie. — Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.
22, Rue de la Sorbonne — PARIS (V°)

LEVULOSE ROGIER

Aliment hydrocarboné assimilable par le diabétique. Remplace le sucre ordinaire dans ses emplois.

Indications. — Diabète.

Forme et Dose. — Solution 2 à 4 cuillerées à dessert par 24 heures.

« L'influence passagère de l'Insuline peut être prolongée par un régime équilibré.

D'autre part l'adjonction à ce régime, soit de Vitamine B, soit de Lévulose ou du mélange de ces deux corps permet d'espacer les injections d'Insuline et de rendre mieux opérante une même dose de cette substance. »

(Communication faite à l'Académie des Sciences, séance du 22 Octobre 1923).

Littérature et échantillon sur demande.

HENRY ROGIER
Docteur en pharmacie.
56 boulevard Péreire — PARIS

LEVURE B 17

Levure *vivante, rigoureusement pure* de ferments étrangers. *Isothermique* (vit et se développe à 37° C.)

Livrée en boîtes de 6 ampoules de 2 c. c. contenant la levure en *milieu isotonique* où elle reste *vivante* plusieurs années.

Propriétés. — Élimine les ferments pathogènes de l'intestin par concurrence vitale.

Indications. — Diarrhée infantile, Diarrhée banale des adultes, Dysenterie amybienne ou bacillaire, Entérites, Furonculose d'origine intestinale.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour dans un liquide sucré et tiède.

Laboratoire CHANTEREAU

8, rue de Constantinople — PARIS (VIII[e])

LEVURE FRAICHE MYCÉTA

Composition :

La levure fraîche Mycéta est une levure pure fraîchement essorée, appartenant au type *Sacaromyces cerevisiae*; sélectionnée et très active, sans aucune addition de matières étrangères.

Propr étés :

Par son action fermentaire, ses diastases et ses vitamines, la levure Mycéta régularise les fonctions digestives, entrave le développement des putréfactions intestinales, agit sur les troubles de la nutrition, désintoxique le sang et augmente la résistance de l'organisme aux infections microbiennes.

Indicat ons :

Infections microbiennes, troubles digestifs et maladies de la n trition, en particulier : états arthritiques, insuffisance hépatique, goutte, diabète et maladies de peau (urticaire, furoncles, orgelets, etç...)

Mode d'emploi :

Une dose par jour de 15 gr. environ, en une ou deux fois, une demi heure au moins ou une heure après les repas. La livraison est faite par le Laboratoire tous les deux jours.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV[e])

LEVURINE EXTRACTIVE

Description. — Comprimés de 0 gr. 30 d'extrait sec de levure de bière en flacons de 50 comprimés.

Action thérapeutique. — Contient sous un poids 35 fois moindre tous les principes actifs de la levure fraîche, auxquels celle-ci doit son activité, car ils agissent comme poisons vis-à-vis des microbes et surtout des staphylocoques. Conservation parfaite et facilité d'absorption.

Indications. — 4 à 12 comprimés par jour dans les cas d'abcès, anthrax, acné, eczéma, furoncles, herpès, phlegmons et toutes affections de la peau.

Laboratoires CH. COUTURIEUX
18, avenue Hoche — PARIS

LIBÉRINE

Antinévralgique immédiat.

Propriété. — Non toxique.

Indications. — Migraines, Névralgies, Grippes, Courbatures.

Posologie. — Un ou deux cachets par jour.

Laboratoire de l'ANTIPHI JEAN CAPIN Pharmacien à Roquefort (Landes).

LIMOL CHURCHILL

(Hypophosphite de chaux : 0 gr. 20 par dose.)
Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules.

Préparation de *chaux* et de *phosphore* au minimum d'oxydation et, de ce fait, complètement assimilable. Récalcifiant idéal.

Indications. — Récalcification, phosphaturie, tuberculose, asthénie, bronchites, rachitisme, dentition, allaitement.

Mode d'emploi. — *Adultes :*

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.
Comprimés. — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.
Ampoules. — 1 injection intra-musculaire chaque deux jours.

Enfants :

Sirop. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.
Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.
Ampoules. — Suivant indication du médecin traitant.

Exiger la signature du docteur Churchill.

Laboratoire CHURCHILL
12, rue Castiglione — PARIS (1er)

LIPOCÉRÉBRINE CHEVRETIN

Extrait éthéré de cervelle de mouton.
Ampoules de 2 cc. contenant 0,20 d'extrait.
Dragées dosées à 0,05 cg. d'extrait.

Propriétés thérapeutiques. — Agit par ses phosphatides, lipoïdes et antitoxines (50 % de lécithine, soit 2% de phosphore et 25 % de cholestérine). Anti-toxique, Sédative, Anti-convulsivante, Tonique.

Indications. — *États dépressifs du système nerveux, Neurasthénie, Anémie cérébrale, Convalescences, Hystérie, Psychoses.*

Dose. — Une injection sous-cutanée de 2 cc. tous les jours pendant 12 jours ou 2 dragées avant chaque repas. Dans les cas graves doubler les doses.

Laboratoires LEMATTE & BOINOT
52, rue La Bruyère — PARIS

LIPODÉTERPÉNOL

Com-osition :

Le Lipodéterpénol est un composé d'huiles essentielles d'essences déterpénées, de lipoïdes et d'huiles purifiées. Il est utilisé sous deux formes en pommade et en injections sous-cutanées.

Propriétés :

Le Lipodéterpénol injectable possède une action à la fois antigénique, antihémolytique, antitoxique, leucogénétique et autoprotecteur de l'organisme.

Indications :

Toutes les infections graves chroniques : larges phlegmons, septicémie, pleurésies purulentes, hématomes infectés, etc., spécialement chez les malades manquant de réaction (37° 5 à 38° de température). On obtiendra des résultats encore plus nets notamment dans le traitement des affections graves et de l'ostéomyélite en associant le traitement par la *Themsaline* au Lipodéterpénol. Il n'y a guère de contre-indications que dans l'hypercholestérinémie.

Mode d'emploi :

Une injection sous-cutanée tous les deux jours dans la région du flanc ou de la cuisse. Frictions journalières de 10 minutes avec la pommade, alternativement sur la poitrine, le dos, l'abdomen, les reins et les membres.

Laboratoire ZYMA
4, rue Bellart — PARIS (XV^e^)

LIPOFÉINE

Médicament eupnéique.

Éthyl-diiodo-brassidate d'éthyle-caféine.

Active le travail du cœur, abaisse la tension artérielle, fluidifie les sécrétions bronchiques, facilite l'expectoration, dissipe la dyspnée et régularise le rythme respiratoire.

Indic. — Etats dyspnéiques en général. Plus particulièrement: asthme et emphysème, catarrhes, bronchites et laryngites chron.

Doses. — 1 à 4 comprimés par jour. Chaque comprimé contient 0 gr. 12 d'iode et 0 gr. 05 de caféine. Périodes de traitement de 15 à 25 jours.

Le tube de 15 comprimés : 15 francs.

Laboratoire CIBA, O. ROLLAND
1, place Morand — LYON

LIPOGAZES DERMATOLOGIQUES

Les Lipogazes dermatologiques sont des mousselines enduites d'un excipient spécial qui sert de véhicule aux substances médicamenteuses habituellement usitées en thérapeutique dermatologique.

Les Lipogazes diffèrent des emplâtres, parce qu'elles s'appliquent à la peau sans y adhérer ; elles remplacent les pâtes et les pommades et ont sur celles-ci l'avantage d'être moins salissantes, moins irritantes, de mieux décaper la peau des squames ou croûtes qui la recouvrent.

Formes :

1. Lipogaze simple à la pâte de zinc.
2. Lipogaze réductrice faible.
3. Lipogaze réductrice forte.
4. Lipogaze réductrice très forte.
5. Lipogaze antiseptique à l'oxyde jaune de mercure.

Chaque boîte de Lipogazes renferme six bandes Lipogaze de 0^m10 sur 0^m15.

Mode d'emploi. — Appliquer la Lipogaze sur la partie malade et la recouvrir avec le papier imperméable perforé ou non, qui y est joint. Fixer ensuite le pansement à l'aide d'un tour de bande ou par une bande de sparadrap caoutchouté.

Dépôt ; Pharmacie Générale,
54, rue de la Chaussée-d'Antin, PARIS

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND
14, rue Gravel, Levallois (SEINE).

LIPOGYRE CIBA

(Lipoiodine Hg)

Médicament iodo-mercuriel

Combinaison iodo-mercurielle de l'éther éthyl-diiodobrassique (lipoiodine), réalisant l'association et la synergie médicamenteuse de l'iode et du mercure avec exaltation de l'activité thérapeutique de chacun de ses composants.

Indicat. — La syphilis dans ses diverses manifestations et particulièrement dans ses accidents tertiaires et secundo-tertiaires. (Cures d'entretien et de sécurité.)

Doses. — 1 à 4 comprimés par jour aux repas. Chaque comprimé contient 0 gr. 15 d'iode et 0 gr. 02 d'Hg.

Le tube de 20 comprimés : 14 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, Place Morand — LYON

LIPOÏDES ISCOVESCO

Hormones purifiés de tous les organes

Formes :

1° Ampoules huileuses stérilisées à 110° pour injections hypodermiques, indolores.

2° Pilules kératinisées.

Adrénol Cortex, Adrénol Total (sans adrénaline), Androcrinol, Cardiocrinol Cérébrocrinol, Entérocrinol, Gastrocrinol, Gynocrinol, Gynolutéol, Hémocrinol, Hépatocrinol, Hypophysol, Mammol, Néphrocrinol, Pancréol, Placentocrinol, Prostatocrinol, Pulmocrinol, Splénocrinol, Thymocrinol, Thyrol A.

Indications : Chaque lipoïde constitue un aliment et un excitant, spécique de l'organe dont il provient.

LIPOÏDES ASSOCIÉS

Andro-Polycrinol : Androcrinol — Thyrol-Adrenol total et Hypophysol.

Gyno-Polycrinol : Gynocrinol — Thyrol — Adrenol total et Hypophysol.

Posologie

1 injection hypodermique ou 6 à 8 pilules par jour.

AFATYL

Médication iodée sensibilisée.
(Association d'iode et de lipoïde thyroïdien). (Arthritisme, Obésité thyroïdienne, Rhumatisme chronique, Artériosclérose).

Laboratoire ISCOVESCO
107, rue des Dames — PARIS (XVII°)
Téléphone : Galvani 07-90.
Adresse télégraphique : Lipoïdes — PARIS 54

LIPOIODINE CIBA

Iode organique assimilable

Diiodo-brassidate d'éthyle, 41, 1% d'iode. D'une élimination plus lente que les iodures de potassium et de sodium, la lipoiodine remplace avantageusement ces deux médications à dose moindre, avec une tolérance meilleure et sans accidents d'iodisme.

Indic. — Celles de l'iode et des iodures : Artériosclérose, hypertension artérielle, Angine de poitrine. Affections des voies respiratoires. Rhumatisme chronique, Obésité, Goitre, Scrofule, Adénopathies, Syphilis, etc.

Doses. — Adultes : 1 à 6 comprimés par jour, une ampoule tous les 2 jours. Enfants : 1/2 à 3 comprimés (aux repas principaux).

Le tube de 20 comprimés : 14 francs.
La boite de 6 ampoules : 20 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, Place Morand — LYON

LIPOSPLÉNINE DU Dr GROC

Opothérapie splénique spécifique.

(Communication à l'Académie de médecine du 18 janvier 1927.)

Composition. — 1° Lipides (contenus dans la pulpe splénique), extraits par un procédé spécial (Soula).
2°) Agent cholestérogénique soluble, fourni par la rate et les autres formations réticulo-endothéliales.

Indications. — 1° *Médication spécifique* des :
a) Anémies (quelle qu'en soient la cause et la nature).
b) Amaigrissements graves et persistants.
c) Grossesses et retours de couches pénibles et difficiles.
d) Retards de croissance, débilité infantile, rachitisme, surmenage. Convalescence. Dépression nerveuse. Neurasthénie. Faiblesse et fatigue générale. Tous états de déchéance organique.
2° *Puissant modificateur du terrain dans* : Prétuberculose, Tuberculose pulmonaire, osseuse et viscérale.

Présentations. — 1°) *Comprimés* de 50 centig. dosés à 0,03 de principes actifs. Six à huit par jour, en deux fois, *au milieu* de chacun des deux principaux repas. Ne pas croquer les comprimés, les avaler avec une gorgée d'eau. Par séries de 80 (soit une boîte : 10 à 12 jours de traitement, 15 fr.) séparées par un repos de trois jours.
2° *Ampoules* de deux cc., titrés à 0,04 de principes actifs. Une injection (*intramusculaire profonde;* indolore) tous les deux jours. Repos de six jours après la huitième injection. Au moment de l'emploi réchauffer légèrement l'ampoule (à la température de la main) et l'agiter de manière à remettre les lipides en émulsion homogène dans le véhicule aqueux. Pour atténuer la réaction thermique parfois notable, que peut provoquer l'injection initiale d'une dose trop forte de lipides chez le tuberculeux fébricitant, tâter la susceptibilité de chaque sujet en commençant par une injection de un cc. En outre, laisser un intervalle de trois jours entre les premières injections. (La boîte de huit ampoules : 20 fr.).
3° *Sirop*, dosé à 4 cgr. de principes actifs, par cuillerée à café. *Spécialement réservé aux enfants.* Avant un an, 2 demi-cuillerées à café par jour, dans l'intervalle des repas ; après un an, 2 cuillerées à café par jour.

Approvisionnement médical et littérature :
40, rue d'Enghien — PARIS X°).
Tél. : Provence 37-13

Vente en gros : **J. OLIVE, Pharmacien.**
16, rue Saint-Gilles, Paris (III°)

LIPO-VACCINS

Vaccins hypo-toxiques en suspension huileuse utilisés par l'Armée, la Marine, les Colonies et les Hôpitaux :

N° 1. — Vaccin antityphique et antiparatyphique A et B Lipo-Vaccin T. A. B.

N° 2. — Vaccin anti-staphylo-strepto-pyocyanique. Lipo Vaccin « Antipyogène ».

N° 3. — Vaccin antigonococcique « Lipogon ».

N° 4. — Lipo-vaccin anti-entéro-colibacillaire.

N° 5. — Lipo-vaccin mixte antipyocyanique.

N° 6. — Lipo-vaccin anti-grippal (pneumo-staphylo-strepto-pyocyanique).

N° 7. — Lipo-vaccin anti-coli et para-colibacille.

N° 8. — Lipo-tuberculine (solution huileuse de tuberculine au 1/10, 1/5, 1/2, 1 milligr. par centimètre cube).

N° 9. — Lipo-vaccin anti-staphylococcique.

N° 10. — Lipo-vaccin anti-streptococcique.

N° 11. — Lipo-vaccin anti-pesteux.

N° 12. — Lipo-vaccin anti-cholérique.

N° 13. — Lipo-vaccin anti-pyorrhée.

N° 14. — Lipo-vaccin anti-pneumococcique.

N° 15. — Lipo-vaccin anti-pneumococcique et T. A. B.

Dans ces vaccins, les microbes, en suspension dans l'huile, sont pour ainsi dire « embaumés » et conservent durant plusieurs mois (de 12 à 18 mois) leur pouvoir antigénique. La résorption des Lipo-vaccins par l'organisme est beaucoup plus lente que celle des hydro-vaccins ; ce qui permet d'injecter des quantités de microbes trois ou quatre fois plus grandes.

Les Lipo-vaccins ne causent pas les chocs vaccinaux très graves qui ont été signalés dans l'emploi de certains vaccins en suspension aqueuse dont les corps microbiens lysés provoquent l'intoxication brutale de l'organisme.

Les accidents anaphylactiques, le réveil des foyers tuberculeux et de l'insuffisance de certains organes à l'état latent sont évités grâce à la lente résorption des protéines microbiennes en suspension huileuse.

Laboratoire des LIPO-VACCINS

32, rue de Vouillé et 1, boulevard Chauvelot
PARIS (XV^e^)

14

LISTOSE VICARIO

Huile de paraffine chimiquement pure
Spécialement préparée pour l'absorption
par voie buccale.

(La première en date en France.)
MANQUAT, Académie de Médecine, 27 janvier 1914.
Paris-Médical, 25 avril 1914.)
VICARIO. Nouvel emploi pour usage interne. (*Journal de Pharm. et de Chim.*, 16 février 1914.)

Laxatif mécanique, doux, inoffensif, non assimilable, non fermentescible.
La **LISTOSE** se présente sous deux formes :

LIQUIDE (légèrement aromatisée)
GELÉE (consistante et sucrée)

Mode d'emploi. — Liquide : Une cuillerée à soupe matin et soir. — Gelée : Une cuillerée à café matin et soir.

Indications. — Constipation, Entérites, Colites, etc. Pendant la grossesse et après les opérations intestinales.

Laboratoire VICARIO
17, boulevard Haussmann — PARIS (IX[e])

LOBULINE

Insuline per os.

Composition.

Extrait des ilôts de Langerhans du pancréas associé à une levure glycolytique pure.

Forme.

Comprimés dragéifiés pour administration *par voie buccale*.

Indications. Diabète.

Avantages.

Innocuité absolue. Simplicité d'emploi. Action très persistante.

Mode d'emploi.

Deux à 6 comprimés par jour, suivant la glycosurie.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne, Paris

LUDIN

Traitement Arséno-Mercuriel dissimulé.

Formes

Sirop. — Granules.

Composition :

1 cuillerée à soupe de sirop ou 3 granules = 1 Cgr. Hg. + 1 Milligr. As.

Doses moyennes :

Sirop :

Adultes : de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : par cuillerées à café.

Granules :

Adultes : 6 à 12 granules par jour.

Enfants : 2 à 3 granules par jour.

Nota. — Prendre ces doses de préférence pendant les repas.

Propriétés thérapeutiques :

Tolérance parfaite, sécurité absolue. Beaucoup plus actif que le bismuth sans en présenter les inconvénients (stomatites, etc.). Activité égale à celle des arséno-benzols sans en avoir la toxicité.

Indications thérapeutiques :

Enfants hérédos, Prophylaxie pendant la grossesse, Traitement d'épreuve, Syphilis larvée, Dysenterie amibienne relevant des Hématozoaires, Eczémas, Dermatoses, etc.

Peut être prescrit aux enfants en bas âge en diluant le sirop dans eau ou sirop simple.

Laboratoires REY
DIJON

LUSOFORME

(Formol saponiné)

1 cuillère à café ou 5 gr. = 1 gr. de Formol à 40 %.

Lusoforme médical. — Antiseptique général de 1/4 à 1 %.

Lusoforme brut. — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 %.

Le Lusoforme est un savon légèrement alcalin liquide contenant 20 % de formol et fabriqué à l'autoclave.

Laboratoires CARTERET

15, Rue d'Argenteuil — PARIS

MAGNÉSIE ERBA

En flacons de 50 grammes net.

Prix au public : 6 fr.

Oxyde de magnésie hydratée pure sans adjonction d'autres substances.
Rafraîchissante prise par petites doses.
Laxative en dose normale.
N'occasionne pas de troubles douloureux et n'a pas de saveur désagréable.

Produits CARLO ERBA

G. Hugues, Pharmacien.
105, Boulevard Malesherbes (passage)
Paris (VIII^e^).

MAGNÉSIE LOURDE DE DUREL

Magnésie anglaise calcinée.

Cette Magnésie présente les avantages suivants :
Elle ne possède aucun goût et se mêle facilement à tous les liquides.
Elle est éminemment active et ne provoque jamais de coliques.
Elle agit, suivant la dose, comme un simple laxatif ou comme un purgatif énergique.
Elle ne provoque pas l'accoutumance ni la paresse consécutive intestinale, de sorte qu'elle peut être employée indéfiniment.
Cette qualité la rend précieuse dans toutes les affections hépatiques où son emploi journalier permet l'élimination régulière de la bile.

Posologie. — Une cuillerée à café le soir.

LABORATOIRE DUREL
7, boulevard Denain, Paris.

MAGOL CHURCHILL

(Hypophosphite de manganèse : 0 gr. 20 par dose)
Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable.

Préparation assimilable de *phosphore* et de *manganèse*. Métal-Ferment grand Catalyseur, Agent et Cause de toutes les oxydations qui régissent le Substratum vital. Remplace avantageusement le Fer.

Indications. — Anémie, troubles de l'ovulation, croissance difficile, insuffisances hépatique et mitrale, diabète, chlorose.

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intra-musculaire chaque deux jours.

Sirop. — A partir de 7 ans, par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.

Laboratoire CHURCHILL
12, rue Castiglione — PARIS (1er)

MALARSAN

Sel de quinine de l'acide acétyl-amino-oxyphényl-arsinique.

Propriétés thérapeutiques :

Traitement par **voie buccale :**
du **paludisme** (*Plasmodium vivax* et *Plasmodium malariæ*) et des **Parasitoses intestinales** à protozoaires (diarrhées rebelles à amibes, spirilles ou lamblias).

Présentation :

Tube de 30 pilules vernies et inaltérables à 0 gr. 20 de sel actif.

Posologie :

3 pilules par jour, pendant 10 jours.
Activité remarquable, tolérance parfaite. Action sur l'état général.

Laboratoires P. AUBRY
54, rue de la Bienfaisance — PARIS (VIIIe).
Tél. : Laborde 15-26.
Belgique : Agent général, Ch. SCHOEFFER
34, rue du Canada — BRUXELLES

MALTEA MOSER CRISTALLISÉE

Extrait de Malt pur et sec.
Aliment-ferment vitaminé.

Indications :

Alimentation rationnelle (suralimentation et adjuvant des régimes).
Régulateur des fonctions digestives (entérites, entérocolites infantiles et des adultes).
Galactagogue efficace.
Préparation rapide des bouillies maltosées pour alimentation infantile.
Reconstituant général anticonstipant.

Mode d'emploi :

Se prend pure ou mélangée à toute boisson.
Pour adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.
Pour enfants : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

MOSER et Cie
8, Chemin de Montbrillant — LYON (Monplaisir).

MALTOSAN

Soupe maltée en poudre

Composition. — Maltose 30 %. Dextrines 25 %, Céréales 40 %, Sels minéraux 2 %, H_2O 3 %, Diastases.

Indications. — Affections gastro-intestinales de la première et seconde enfance : diarrhée estivale, dyspepsies diverses, etc. Réussit dans les cas les plus rebelles. Rend aisé le sevrage et en évite les périls.

Doses. — 2 cuillerées à café par repas de 100 gr. (lait et eau). Augmenter de 1 cuillerée nouvelle par 50 gr. de liquide supplémentaire.

Cuire rapidement sans cesser de remuer.
Retirer du feu avant le premier bouillon.

Établissements WANDER
58, Rue de Charonne — PARIS (XI^e)

MALT PAILLETÉ PROGIL

Extrait de malt cristallin garanti pur.
Reconstituant diastasique vitaminé.

Préparé par évaporation dans le vide des liqueurs extractives du malt. Renferme la totalité de la diastase, du malt, du maltose, des phosphates naturels, de la lécithine, des peptones et des vitamines.

Reconstituant. — Aliment très concentré de digestibilité parfaite.

Indications. — Convalescents, Anémiés, Surmenés, Opérés, Dyspeptiques, Cardio-Rénaux, Hépatiques.

Galactogène. — Produit sans alcool, sans risque d'intoxication, augmente la quantité et la qualité du lait.

Il s'associe très bien aux *Diases Progil*, farines fraîches diastasées de céréales et de légumineuses (voir page nº 206) et cet ensemble constitue une suralimentation idéale.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour soit tel quel, soit dans de l'eau ou dans une infusion.

Enfants 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, à faire prendre de la même façon.

PROGIL

Sté Anonyme au capital de 50. 000. 000. de francs.

10, Quai de Serin, Lyon (IVe).

6, Boulevard de Strasbourg, Paris (Xe)



MALT WANDER ou GLOMA

GLOMA PUR

(Extrait de malt sec)

Composition. — Matières azotées 5,87%, Hydrates de Carbone (maltose et dextrine) 89,17 %, Substances minérales 1,56 %, Eau 3,40 %, Acide phosphorique en pour cent des substances minérales 9 %.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Aliment végétal, nutritif et digestif. Asthénie générale, Convalescence, Dyspepsie, Entérocolite chronique par insuffisance amylolytique. Scorbut et maladies par avitaminose. Permet la préparation des bouillies maltées.

IODO-GLOMA

(Gloma à l'iodure de fer)

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0,12 grs. de proto-iodure de fer.

Indications. — Répond aux indications du fer et de l'iodure. Chez les lymphatiques, les chloro-anémiques, les adénoïdiens dans le traitement interne des dermatoses remplace avec avantage et agréablement l'huile de foie de morue. L'extrait de malt évite les inconvénients de la médication ferrugineuse et de l'iodurisme.

GUAYA-GLOMA

(Gloma au carbonate de gaïacol)

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0,35 grs. de Carbonate de gaïacol.

Indications. — Médication de bronchites et pneumopathies diverses, en particulier de la tuberculose. Répond aux nom-

breuses indications de la créosote, sans en avoir ni sur les voies digestives, ni sur la circulation pulmonaire, les inconvénients redoutés.

GLYCERO-GLOMA

(Gloma au glycérophosphates)

Composition. — 1 cuillerée = 0,40 grs. de Glycérophosphates combinés, de chaux, de soude, de fer, de magnésie.

Indications. — Convalescence des maladies aiguës (grippes, bronchites, typhoïdes, etc.) Surmenage, déminéralisation, anémie, tuberculose. L'extrait de malt facilite la digestion et favorise l'assimilation des médicaments qui lui sont, ici, associés.

CALCIO-GLOMA

(Gloma au Phosphate de chaux)

Composition. — 1 cuillerée à soupe = 0,15 grs. de chlorhydrophosphate de chaux.

Indications. — Contribue par son phosphore à la nutrition du système nerveux, par sa chaux à celle des tissus osseux (rachitisme, scrofule, etc.) Permet la cure de récalcification dans la tuberculose. Utile aux femmes enceintes et à celles qui allaitent.

Doses. — *Enfants* : 1-3 cuill. à café 3-4 fois par jour
Adultes : 1-3 — soupe 3-4 — —

Au début des repas pur ou dissous dans de l'eau ou du lait.

Etablissements WANDER

58, rue de Charonne — PARIS (XI^e)

MANGAÏNE

Peroxyde de Manganèse.
chimiquement pur.

Forme et Dose :

Tablettes 0,10 de Peroxyde de Manganèse.

Propriétés thérap. :

Elles constituent la préparation la plus rationnelle pour l'assimilation rapide et efficace des sels de manganèse.

Indications thérap. :

Dyspepsies gastro-intestinales, Anémies.

Dose :

4 à 6 tablettes par jour.

Pharmacie SCHMIT

71, Rue Sainte-Anne — PARIS

MANGANÉSIA

Solution permanganique arsenicale.
Traitement du diabète.

Propriétés thérapeutiques. — Le Manganésia diminue la soif, diminue la quantité des urines et celle du sucre qu'elles contiennent, favorise les échanges nutritifs, tonifie le système nerveux, rétablit les fonctions de la peau et rend au sang son alcalinité normale.

Dose et mode d'emploi. — *20 gouttes au commencement de chaque repas dans du vin.*

Continuer pendant trois semaines, se reposer une semaine, puis reprendre.

En cas d'intolérance, commencer par 10 gouttes par repas, puis augmenter progressivement.

On doit compter dans le diabète moyen sur un traitement d'environ 3 mois.

Les diabétiques qui font usage du Manganésia peuvent s'alimenter comme en état de santé.

Laboratoire des PRODUITS DANNECH

et DUMEE pharm., 64, rue des Tournelles.
(R. du C. Seine 218.670)

MANGANO PHOSPHAL

Julien

(GOUTTES)

XX gouttes contiennent :

Glycérophosphates divers.....	0 gr 90
Acide phosphorique.....	0 gr. 50
Sels de manganèse.....	0 gr. 10

Composition :

Acide phosphorique.....	1000
Glycérophosphate de soude.....	1000
— de potasse	500
— de chaux.....	250
— de magnésie.....	100
— de manganèse....	150

Nucléinate de Manganèse à satur.

En solution sans alcool et sans sucre.

Propriétés et Indications. — Puissant reconstituant. Sans aucun toxique, convenant. à tous. Médication mangano-phosphorée intensive.

Enfants. — Manque d'appétit. Retards de la dentition et de la marche. Rachitisme. Insuffisance du poids et de la taille. Troubles de la nutrition.

Adultes. — Anémie. Faiblesse. Neurasthénie. Surmenage intellectuel et physique. Convalescences. Carie dentaire. Phosphaturie. Grossesse. Allaitement.

Vieillards. — Dépression. Faiblesse. Troubles nerveux. Fatigue avec hypertension.

Posologie. — *Enfants.* — 2 gouttes par jour, par année d'âge dans un peu d'eau sucrée.

Adultes. — 20 gouttes à chacun des repas de midi et du soir dans 1/3 de verre de liquide.

Aucune contre-indication.

Flacon gratuit sur demande.

Louis JULIEN

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris

105, rue de Rennes (angle de la rue d'Assas)

PARIS (VI^e^)

R. C. 79719.

MARINOL

Reconstituant marin physiologique.
Inaltérable. De goût agréable.

Composition. — Eau de mer captée au large. Iodalgol (iode organique). Phosphates calciques en solution organique. Algues marines iodifères. Méthylarsinate disodique.

Particularités. — Seul succédané naturel de l'huile de foie de morue. Permet seul l'administration de l'iode organique marin dans son véhicule normal, l'eau de mer. Tolérance absolue.

Indications. — Lymphatisme. Anorexie. Tuberculoses. Anémie. Convalescences.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe. *Enfants* : 2 à 3 cuillerées à dessert. — *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café.

Avant ou après les repas. Pur ou dilué.
Littérature et échantillons.

Laboratoires LA BIOMARINE
(Laboratoires spéciaux de thérapeutique marine)
DIEPPE (Seine-Inférieure).

MARRUBIASE

Extrait de plantes " incisives " et surtout de Marrube blanc.

Formes. — Dragées et sirop.

Propriétés. — Diarrhée rapidement jugulée sans constipation. Suppression presque immédiate du sang et des glaires. Retour à bref délai de la selle moulée quotidienne. Aucune toxicité. Pas de contre-indication.

Indications et Posologie. — *Diarrhée infantile* (nourrissons) : 1 cuillerée à café toutes les 2 heures (pure ou dans un peu d'eau sucrée).
Intoxications, Dysenteries : (selles nombreuses) 2 cuillerées à soupe ou 4 dragées toutes les 2 heures. Réduire dès résultat obtenu.
Entérite chronique : Progressivement, 2 à 5 cuillerées ou 4 à 10 dragées par jour avant les repas et au coucher.

COMTE, Pharmacien
60-62, Rue Saint-Guilhem — MONTPELLIER

MATÉ DOUGLAS

au Maté du Paraguay

Indications.

Nutritif, fortifiant, stimulant. Développe les facultés intellectuelles. Tonifie le système nerveux. Détermine une sensation de bien-être et de vigueur sans amener de dépression, ni d'inconvénient quelconque après son emploi.

Composition.

Vin : Muscat de Samos et Maté.
Elixir : Crême de Cacao et Maté.
Granulé : Maté glycérophosphaté.

Littérature et échantillons au Dépôt Général :

PHARMACIE ANGLAISE DES CHAMPS-ÉLYSÉES

62, avenue des Champs-Élysées, Paris (VIIIe)
Téléph. Élysées : 22-52

MÉNOSÉDINE

Extraits végétaux associés à calmants minéraux et substance protéidique tirée de l'ovaire. Sans toxicité.

Indications. — 1° Sédatif utérin. Calme les phénomènes douloureux et malaises qui accompagnent et précèdent les règles.
2° Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles espacées.

Deux formes. — Comprimés. Liquide

Comprimés. — 3 comprimés dès le début des malaises occasionnés par la menstruation dans une infusion chaude ou dans un peu de confiture. — 3 comprimés une demi-heure après, si besoin est.

Liquide. — Une cuillerée à bouche, une deuxième une demi-heure après, si la première n'a pas suffit.

LABORATOIRES DEMASLES
à Vienne (Isère).

MENOVARINE

Principes extractifs végétaux sélectionnés, renforcés par un catalyseur : le Manganèse.

Deux indications :

Maladies veineuses ; troubles congestifs de la fonction ovarienne.

Posologie :

Deux dragées à chaque principal repas.

Laboratoires MONDOLAN
53, rue de Clignancourt — PARIS (XVIII[e])

MÉSOTHORIUM BUISSON

Solution de bromure de mésothorium pour injections hypodermiques, intra-veineuses ou interstitielles.

1° Solution faible (concentration A) : dosée à 1/4 de micr. par cc. Injecter de 1 à 3 cc. par jour, pendant une ou deux semaines. Observer des intervalles de repos d'environ une semaine entre chaque série.

Indications : artério-sclérose, états asthéniques et anémiques, prétuberculose.

2° Solution moyenne (concentration B) : dosée à un micr. par cc.

Indications : rhumatisme chronique, rhumatisme blennorrhagique, anémie et adénite tuberculeuse. Séries de 12 piqûres, au rythme d'une piqûre tous les jours ou tous les deux jours, intervalles de repos d'une semaine entre deux séries.

3° Solution forte (concentration C) : dosée à 2 micr. par cc.

Indications : rhumatisme chronique, rebelle et déformant, sciatique, névrites, leucémie, cancers inopérables, tumeurs de la prostate et de la vessie. Séries de 12 piqûres, au rythme d'une piqûre tous les jours ou tous les deux jours, intervalles de repos d'une semaine entre deux séries.

4° Solution forte spéciale (concentration D) : 2 micr. par cc. en ampoules de 5 cc.

Indications : tumeurs malignes, cancers de la vessie. — Plus spécialement réservée aux instillations vésicales.

Etablissements ALBERT BUISSON

F. JALOT et Cie

157, rue de Sèvres, Paris. R. C. Seine 222.705 g.

MÉTARSÉNOBENZOL SACA

Dioxydiaminoarsénobenzène - monométhylène. Sulfoxylate de soude (914).

Rigoureusement pur (double contrôle chimique et physiologique). Traitement d'attaque et d'entretien de la syphilis.

Métarsénobenzol SACA Intraveineux.
Poudre très aisément soluble dans l'eau distillée pour injections intraveineuses.
Doses progressives de 0 gr. 15 à 0 gr. 90.

Métarsénobenzol SACA sous-cutané.
Solution stabilisée directement injectable dans le tissu sous-cutané ou musculaire.
Doses progressives :
de 0 gr. 01 à 0 gr. 05 (*nourrissons*).
de 0 gr. 10 à 0 gr. 50 (*adultes*).

USINES CHIMIQUES DU PECQ
Siège social : 11, rue Beautreillis, PARIS.

MÉTRITOLS

Comprimés effervescents, alcalins, astringents antiseptiques

Composition. — Acide picrique, thymol, bicarbonate et borate de soude, formaldéhyde. Parfum agréable des essences alpestres.

Propriétés thérapeutiques. — Donnent des résultats merveilleux dans les leucorrhées de toute nature.

Mode d'emploi. — Injections vaginales. Un comprimé dans un litre d'eau bouillie chaude 40 à 45°. Position couchée, bock très bas.

Laboratoire LEES
124, Rue du Bac — PARIS

MIALBAÏNE

Solution d'ouabaïne Mialhe à 1/1000, XXV à C gouttes par 24 heures.

Pharmacie du docteur MIALHE

8, rue Favart — PARIS

MICELLIODE

(Marque déposée)

IODE COLLOIDAL MICELLAIRE
ÉLECTRO-POSITIF

a grains ultramicroscopiques de diamètres inégaux
animés de vifs mouvements browniens
(micelles iodées)

PRÉPARATION BIOLOGIQUE FRANÇAISE

rigoureusement scientifique
Hyperactive par un seul de ses éléments (l'iode libre des micelles.

COMPOSITION :

Le « Micelliode » se présente sous l'aspect d'une
PSEUDO-SOLUTION AQUEUSE
fortement colorée en brun rouge caractéristique
PARFAITEMENT STABLE
(conservation intégrale assurée pendant plus de 6 ans)
réalisée par «ADSORPTION» sans combinaison
d'après une technique particulièrement délicate :
Véritable condensation d'iode métalloïdique soluble chimiquement pur
en minces pellicules adhérentes à la surface de multiples granules solides en suspension dans un
véhicule colloïdal micellaire aqueux défini
d'action thérapeutique négligeable
extrait du foie frais d'animaux sélectionnés
spécialement alimentés avant l'abatage
en vue d'un optimum d'état physiologique.

FORMULE :

Extrait hépatique déprotéiné en pseudo solution aqueuse	1000 c. c.
Iode métalloïdique libre en suspension colloïdale	1 gr. 50

LE MICELLIODE N'A PAS DE SIMILAIRE
relativement à sa constitution et sa faible teneur en iode

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES GÉNÉRALES

PUISSANT RÉNOVATEUR
cellulaire, tissulaire et humoral par
action élective sur les glandes endocrines
DÉPURATIF **TONIQUE** DÉCONGESTIF
ANTI-SCLÉREUX
Antitoxinique **ANTI-INFECTIEUX** Antitoxique.
Vraie pierre de touche de la syphilis,

PRINCIPALES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

REMPLACE IODE ET IODURES
dans leurs applications courantes
Lymphatisme. - Rachitisme - Scrofule. - **Arthritisme**
Toutes les scléroses **Toutes les infections**
SURDITÉS REBELLES
Traitement pré et post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES

Remède héroïque à doses infinitésimales d'iode libre
ÉMINEMMENT ASSIMILABLE
exempt de toute substance irritante (alcool, acide iodhyd.).
TOLERANCE INCOMPARABLE A TOUS LES AGES
JAMAIS D'IODISME — JAMAIS DE CHOC

AUCUNE CONTRE-INDICATION
ACTION THÉRAPEUTIQUE COMPARÉE

50 gouttes de « Micelliode »
agissent comme
un gramme d'un iodure alcalin.

FORMES PHARMACEUTIQUES :

MICELLIODE-GOUTTES :
FLACONS de 60 c. c. DEMI-FLACONS de 30 c. c.
MICELLIODE INJECTABLE :
BOITES de 10 ampoules de 2 c. c.
DEMI-BOITES de 5 ampoules de 2 c. c.

VOIES D'INTRODUCTION

GOUTTES :
pour la **voie buccale** bien acceptées par les enfants.
INJECTIONS :
pour **voie intraveineuse** et **voie intramusculaire.**

MODE D'EMPLOI

Les **gouttes** se prennent dans de **l'eau** au cours ou en dehors des repas. Pour les **nourrissons** dans du **lait.**
Les **injections intramusculaires sont indolores** avec 0 gr. 005 mgr. de **novocaïne** en solution **adrénalinée.**

DOSES :

ADULTES : 100 GOUTTES PAR JOUR, soit **1** cuillerée à café par jour à fractionner en 2 fois dans la journée, **soit 1/2 cuillerée à café matin et soir.**
ENFANTS : 40 à 60 gouttes par jour.
NOURRISSONS : 10 à 20 gouttes par jour.

ADULTES : 1 AMPOULE DE 2 c c. TOUS LES 2 JOURS jusqu 'à concurrence de 10 ampoules. **En cas d'extrême urgence** (grippe grave, etc.) 2 et 3 ampoules de 2 c. c. en 24 heures **sans crainte de crise hémoclasique.**
ENFANTS : demi-ampoule tous les 2 jours.
NOURRISSONS : 1/4 d'ampoule tous les 2 jours.

DURÉE DU TRAITEMENT :

Pour être efficaces, les **gouttes**, prises tous les jours, sont à continuer durant **2 mois c onsécutifs** sous forme de **cures** renouvelables **2 et 3 fois par an**
Lorsque **plusieurs dizaines d'injections** s'imposent en peu de temps, on laisse **un intervalle de 10 jours environ** entre deux séries de 10 infections.

Laboratoire des Produits médicinaux spécialisés.

L - M - D

A. Rolland, Pharmacien de 1re classe,
12, rue d'Aguesseau — PARIS (VIIIe) Tél. : Élysées 91-90

MICTASOL

DÉCONGESTIF PELVIEN
SÉDATIF-ANTISEPTIQUE

Formes :

Comprimés. Suppositoires.

Composition :

Comprimés : Bromure de Camphre 0.02, Formine 0.05, Noix de Malva Purpurea 0.25.

Suppositoires : Stovaïne 0.01, Ext. de Jusquiame 0.05, Antipyrine 0.20, Ichtyol 0.25 Malva purpurea 1 gr.

Propriétés thérapeutiques :

Décongestif pelvien, antiseptique urinaire, sédatif génital. Tolérance parfaite. Innocuité absolue. Sans contre-indication.

Indications thérapeutiques :

Prostatisme vasculaire. Rétention. Incontinence. Cystites. Séquelles de blennorragie. Néphrites. Pyélonéphrites. Métrites. Salpingites. Vaginites. Hémorroïdes. Varices.

Mode d'emploi :

Comprimés : 6 à 10 comprimés par jour, matin, midi, soir avec un peu d'eau.

Suppositoires : 1 ou 2 par jour.

Laboratoires du MICTASOL
COUDERC, Pharmacien de 1re classe
28 et 30, rue du Four — PARIS (VIe)
Téléphone : Fleurus 17-42.

MITIGANS ROXELANE

(Analgésine. — Amydopyrine. Phénacétine. — Caféine)

Analgésique puissant, anti-rhumatismal. Les propriétés thérapeutiques du Mitigan en font un spécifique de l'Élément Douleur.

Médication aussi inoffensive qu'efficace. Aucune intolérance.

Indications. — Toutes les algies, névralgies, migraines, rhumatismes, etc.

Doses. — 1 à 4 cachets par jour.

Les laboratoires PHARMACEUTIQUES de la ROXELANE

38 bis, rue Raphaël, Vanves-Paris.

MORÉTHYL DAUSSE

Morrhuate d'Ethyle : solution huileuse à 25%.
(Ampoules de 2 cc.)

Traitement de la tuberculose pulmonaire.

Indications. — L'action du Morhétyl se fait sentir sur toutes les formes de la tuberculose pulmonaire lentement évolutive, où il relève l'état général, fait baisser la courbe thermique en même temps que diminue l'expectoration bacillaire et que s'amendent les lésions. Les formes rapides de la maladie et la granulie ne semblent par contre nullement influencées.

Le Moréthyl ne comporte aucune contre-indication et ne provoque dans aucun cas de réaction locale ou générale.

Posologie. — 20 injections quotidiennes successives par voie sous-cutanée ou intra-musculaire. Laisser un repos intercalaire de 10 jours et pratiquer de la sorte plusieurs séries d'injections. Durée du traitement : 3 mois au minimum.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot, Paris (IV^{e}).

MORRHUALÈNE GAUTIER

Médication leucogène organique phospho-ferro-iodo arséniée (entièrement assimilable).

Forme. — Sirop (saveur agréable sans action nocive, ni irritante pour les muqueuses gastro-intestinales).

Compos. — Iode physiologique stable et inaltérable; fer organique d'origine protéique, entièrement assimilable; sel sodique de l'acide phospho-glycérique; méthylarsinate disodique; rhamnus frangula.

Action physiol. — Stimulant des organes lymphoïdes et des séreuses; modificateur vaso-moteur; excitant des organes hématopoïétiques; reminéralisateur puissant tonique général; excitant de la nutrition.

Indicat. — Lymphatisme (adénopathies de la scrofule et de la tuberculose, végétations adénoïdes, impétigo). Hypoglobulie (anémie vraie, chlorose, diiminution de la proportion d'hémoglobine, débilité générale). Maladies de la nutrition (rhumatisme chronique, artériosclérose, rachitisme infantilisme). Convalescence de toutes les maladies.

Posologie. — De 2 à 5 ans, 3 cuillerées à café par jour, de 5 à 10 ans 2 à 3 cuillerées à dessert par jour; de 10 à 18 ans, 2 cuillerées à potage par jour; adultes, 2 à 3 cuillerées à potage par jour, (Avant les repas dans un peu d'eau).

Echantillons et littérature.

Laboratoires DORANTOWICZ
17, Avenue Parmentier — PARIS (XI[e])
Téléphone : Roquette 14-12

MORRHUETINE JUNGKEN

Forme et Composition. — Liqueur à base de glycérine pure contenant: iode métallique 0,015 mgr. Hypophosphites composés (Na0, Ca0, Manganèse, en tout 0,15 cgr. par cuiller à soupe. Phosphate de soude: 0,15 cgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable; pas d'irritation des muqueuses; pas de troubles des fonctions gastriques. Très bien toléré en toutes saisons.

Propriétés. — Dépurateur, Tonique, Reconstituant.

Indications. — Anémie, lymphatisme, tuberculose, convalescences des maladies infectieuses, d'opérations et blessures.

Doses et Mode d'emploi. — *Enfants:* 1/2 ou 1/3 de verre à liqueur. — *Adultes:* 1 ou 2 verres à liqueur, après les repas, pure ou étendue d'eau au début des principaux repas.

BRACQUEMOND & C[ie]
Anciens établissements J. DUHÈME
105, Rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).
R. C. Paris 207.767 B.

MORRHUOL

Composition. — Principes actifs de l'huile de foie de morue isolés de la matière grasse.

Chaque capsule correspond à 5 grammes d'huile de foie de morue dont le Morrhuol supprime le goût désagréable et la mauvaise digestibilité.

Indications. — Lymphatisme, débilité, scrofule, rachitisme, affections chroniques de l'appareil respiratoire sous toutes leurs formes.

Action. — Reprise rapide de l'appétit et des forces, augmentation du poids, diminution de l'expectoration et de la toux.

Mode d'emploi. — *Adultes :* 4 à 8 capsules par jour, à prendre au début des 2 principaux repas. — *Enfants :* 2 à 4 capsules par jour.

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE

Dr PH. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS

MORRHUXINE

Composition. — Iode organique. — Brome. — Glycérophosphates alcalins et arrhénal à raison de un demi-centigr. par cuillerée à soupe. — Véhicule glycériné et sirop de fruits très agréable au goût et très assimilable.

Propriété. — Apéritif tonique, reconstituant anti-lymphatique.

Indications. — Succédané de l'huile de foie de morue ; est indispensable dans tous les cas où l'huile de foie de morue n'est pas tolérée par le malade.

Doses : Enfants 2 à 3 cuillerées à café par jour, adultes 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

La bouteille pour 12 jours de traitement : 10 francs.

E. VERGELOT, pharmacien.

163, rue de Flandre, Paris (XIXe).

MORUBIASE

Extrait hépatique total de morue irradié et sans corps gras.

Principes actifs :

Lipophosphatides, acide morrhuique, vitamines.

Formes :

Pilules et granulé. Une pilule ou une cuillerée à café de granulé contient les principes actifs de 30 gr. d'huile de foie de morue.

Avantages :

Petit volume, aucun goût, parfaite digestibilité, sans corps gras, se prend l'été comme l'hiver.

Indications :

Celles de l'huile de foie de morue : Anémie, Lymphatisme, Rachitisme. Affections chroniques des voies respiratoires.

Posologie :

Adultes : 6 à 8 pilules, par jour au début ou à la fin des repas.

Enfants : 2 à 6 cuillers à café suivant l'âge.

Arrhéno-Morubiase : Synergie thérapeutique : extrait hépatique et méthylarsinate disodique (0,005 mgr. par pilule).

Gaïaco-Morubiase : Extrait hépatique et 0,05 carbocinnamate de gaïacol par pilule.

Laboratoires MEYNET-CROSNIER
6, rue Chanoinesse — PARIS

MORUXASE

Concentrée :

20 gouttes renferment	Triodure d'arsenic	0.05
	» Manganèse	0.05
	Tantodin	0.50
	Glycérine	0.50

Sirop :

1 cuillerée à soupe renferme	Triodure	Arsenic Manganèse aa Fer	0.05
	Soluté iodotannique		0.50
	Lactophosphate de chaux		0.40
	Sirop au suc naturel de groseilles		20 gr.

Indications. — Carence physiologique, Anémie, Lymphatisme, Troubles de croissance. Action catalytique puissante du manganèse. Le sirop fait à froid contient intactes les vitamines du suc de groseilles.

Posologie :

de 2 à 7 ans	20 gouttes	2 fois par jour.
de 7 à 15 ans	40 gouttes	
Adultes	50 gouttes	
de 2 à 7 ans	1 à 2 cuillerées à café	2 fois par jour.
de 7 à 15 ans et adultes.	1 à 2 cuillerées à soupe	

Laboratoires ABADIE-TANZI
3, place Intérieure-Saint-Michel — TOULOUSE

MUCINUM *(Comprimés de)*

Composition. — Association de nombreux produits végétaux ou organiques (à l'exclusion de tout drastique), dont chacun à la dose utilisée serait sans action, mais dont l'ensemble réalise une véritable synergie laxative.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif doux n'irritant jamais l'intestin et ne provoquant pas d'accoutumance. Réussit dans tous les cas de *Constipation* du fait de la pluralité des éléments qui le composent.

Forme. — Petits comprimés très friables, sans saveur, pouvant être croqués ou avalés.

Posologie. — 1/2 à 2 comprimés par jour selon l'âge et la réaction individuelle (généralement au repas du soir).

Prix : **5 fr. 50** la boîte.

Laboratoire R. CHANTEREAU

8, rue de Constantinople — PARIS

MUCOSODINE

Antisepsie des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles

Composition. — Bicarbonate de soude, Hyperborate de soude, Chlorure de sodium, Borate de soude.

Propriétés. — Donne un sérum boraté, alcalinisé et oxygéné. Elle déterge la muqueuse pituitaire et la décongestionne. Elle dissout les mucosités et les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, Rhinites, Rhume des Foins, Sinusite, Ozène. — Amygdalites, Angines, Laryngites, Otites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café pour un verre d'eau chaude.
Bain nasal, douche nasale. Gargarismes. Bains de bouche. Irrigation.

Le flacon : **7** fr. **50**

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e^)

Téléphone : Invalides 12-63

MUSCULOSINE BYLA

Jus de Viande crue hyperactivé par les oxydases globulaires, les hormones spléniques, le manganol et les vitamines cardio-hépato-musculaires.

Propr. thérap. — Antibacillaire, Toni-nutritif, Excitant physiologique.

Indications. — Convalescence, Anémie, Tuberculose, Neurasthénie.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à bouche aux repas, dans la boisson préférée, toujours froide ou tiède, gazeuse de préférence.

Voir page 800.

ZOMO-MUSCULOSINE BYLA

(Sèche)

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS

R. C. Seine 71.895

MUTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère porphyrisé

Indications :
Syphilis à toutes ses périodes.

Dose normale :
Ampoule de 2 cc. renfermant 13 cg. de Bismuth métal.

Dose infantile : ampoules de 1 cc. renfermant 2 cg. 6 de Bismuth métal.

Mode d'emploi :
Une ampoule tous les deux jours ou 2 ampoules tous les 5 jours. Dans les cas rebelles : 2 ampoules tous les 2 jours.

Traitement de sécurité : Suppositoires Muthanol.

Laboratoire du MUTHANOL : G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e^)

R. C. Seine 143,981

MYCOLYSINE

du Docteur DOYEN

Solution colloïdale phagogène polyvalente. — Provoque la phagocytose. — Prévient et guérit la plupart des maladies infectieuses de l'homme.

Formes et doses:

Mycolysine buvable, 4 à 12 cuillerées par jour.
Extrait de Mycolysine, 1 à 4 cuillerées par jour.
Mycolysine injectable, ampoules de 10 cc.
Pastilles de Mycolysine, 15 à 20 pastilles par 24 h.

Indications. — Action thérapeutique rapide dans les affections aiguës des voies respiratoires, dans les phlegmons profonds, les lymphangites infectieuses, les fièvres éruptives et la grippe, la méningite cérébro-spinale, etc. .

P. LEBEAULT & Cie

5, Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (IIIe)

MYRTILLINE DEMASLES

Traitement des diarrhées, des dysenteries, de l'entérite sous toutes ses formes.

Forme. — Liquide, à base de myrtille et de salicaire.

Indications. — Diarrhées infantiles, saisonnières, tuberculeuses, entérites, dysenteries.

Propriétés thérapeutiques. — Action astringentes, sédative, antiseptique, analgésique.

Posologie. — Doses moyennes :

Adultes : Une cuillerée à café au début des deux principaux repas.

Enfants : Une demi-cuillerée à café deux fois par jour.

Nourrissons : 15 gouttes par année d'âge, deux fois par jour.

(Ces doses peuvent être augmentées ou diminuées selon les indications du médecin traitant.)

La *Myrtilline* se prend dans un peu d'eau.

Laboratoires DEMASLES
Vienne — ISÈRE.

NAIODINE

NaI injectable en solution aqueuse stabilisée par procédé spécial, en ampoules de 5 cc. et de 10 cc. contenant 0,01 cgr de sel hyperactif par cc.

Propriétés. — Inaltérable, **absolument indolore,** immédiatement assimilable, la NAIODINE réalise la cure atoxique rapide et complète de toute douleur spasmodique, névralgique et inflammatoire par imprégnation iodique de la cellule nerveuse. **Elle constitue le véritable traitement spécifique de la sciatique.**

C'est en outre un précieux succédané des stupéfiants (algies rebelles, morphinisme, etc.)

Enfin, utilisée comme solvant du novarsénobenzol, elle possède la propriété d'en rendre les injections indolores.

Indications. — Tout syndrome douloureux aigu ou chronique : dyspnées, emphysème, zona, *lumbago, sciatique*, névralgies faciales et intercostales, iritis, douleurs fulgurantes du tabès, névrites, rhumatisme articulaire aigu et rhumatisme déformant, arthrites chroniques, toxicomanies, etc.

Posologie. — Injection intramusculaire ou sous-cutanée, profonde, indolore, à distance ou mieux *loco dolenti :*

Traitement d'attaque : 10 à 30 cc. par jour.
Traitement d'entretien : 5 à 10 cc. par jour.

En une seule séance quotidienne (2 à 3 piqûres en série, facilement résorbées.)

Ne pas craindre *d'agir vite et énergiquement.* Aucune incomptabilité ni contre-indication, selon l'âge ou l'état du malade. Aucune réaction. Ni iodisme, ni accumulation.

LABORATOIRES J. LOGEAIS

22 *bis*, rue de Silly, Boulogne-sur-Seine
près Paris. Auteuil 40-15 et 40-16

NARCYL

Médicament spécifique de la Toux.

Laryngites, Bronchites, Coqueluche

En particulier : *Toux de la Tuberculose.*

Sirop dosé à 0 gr. 03 ctg. de Narcyl par cuill. à soupe (chlte d'éthylnarcéine synt.)

Comprimés dosés à 0 gr. 02 de narcyl et 0 gr. 25 de benzoate de Na.

Doses :

Sirop :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à bouche par jour.
Enfants : 2 à 4 ans : 1 à 3 cuill. à café par jour.
— : 4 à 7 ans : 4 à 5 cuill. à café par jour.
— : 7 à 15 ans : 1 à 2 cuill. à bouche par jour.
Comprimés : *Adultes :* 4 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires LONGUET
34, rue Sedaine — PARIS (XIe)

NATIBAÏNE

Seule association de la DIGITALINE NATIVELLE et de l'OUABAÏNE ARNAUD

Formes. — Solution glycéro-alcoolique au millième renfermant 1/3 de Digitaline Nativelle et 2/3 d'Ouabaïne Arnaud.

Indications. — Myocardites av. tachycardie. Hypertendus en voie d'arythmie complète avec diminution manifeste du tonus myocardique.

Doses. — Petites doses prolongées : X à XX gouttes par 24 heures. Doses moyennes : XX à XXX gouttes par 24 heures.

Échantillons et Littérature :

Laboratoire NATIVELLE
49, Boulevard de Port-Royal — PARIS

NATROSYL

Forme pharmaceutique. — Soluté.

Composition :

Soluté alcalin à base de baume du Pérou et d'essences antiseptiques aromatiques.

Action :

Antiseptique, lénitive, décongestionnante.

Indications :

Traitement médical des affections vagino-utérines, leucorrhée, métrite puerpérale, etc..

Doses :

1 à 3 cuillerées à café par litre d'eau bouillie en injections vaginales.

Laboratoires
du Docteur Pierre ROLLAND
18, rue Pierre-Curie PARIS (Ve)

NAZOPHYL DARVA

Composition. — A base de bleu de méthylène huiles volatiles, camphres associés.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique des affections du nez (rhumes de cerveau, grippe, irritations des muqueuses nasales) préventif des affections des voies respiratoires, réalise l'antisepsie du rhino-pharynx.

Mode d'emploi. — 5 à 6 fois par jour, introduire dans chaque narine, en aspirant profondément un peu de **Nazophyl Darva** (conserver le plus longtemps possible).

Emploi facilité par une présentation adéquate.

Littérature et échantillons sur demande adressée aux
LABORATOIRES ANDRÉ NARODETZKI
19, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

NÉCESSAIRE INHALATEUR HOJASOL

Composition de l'essence Hojasol :

Eucalyptol	50	100
Estragol	25	
Linalol	20	
Anéthol	3	
Eugénol	2	

L'inhalateur de poche se charge avec quelques gouttes d'Hojasol pur. Il est accompagné dans le nécessaire d'un flacon de rechargement avec mode d'emploi.

L'Hojasol pur sert en outre à combattre très efficacement, par simple attouchement, toutes piqûres d'insectes, moustiques, mouches, guêpes, etc., ainsi que les piqûres d'orties.

Laboratoire de l'HOJASOL
à Chars (Seine-et-Oise).
Gros et Exportation :
Dépôt : 49, rue Ferdinand-Duval, PARIS (IVe).

NÉO-ARSYCODILE

Méthylarsinate disodique
(Syn. Arrhénal)

Indic. thér. — Tous les avantages de l'arsenic organique. Plus particulièrement destiné à l'usage interne par la voie gastrique. Un long emploi (depuis 1900) a établi la supériorité de cette préparation.

Doses et mode d'emploi. — *Pilules* à 0,01 : 4 à 5 ou plus par jour aux repas, pendant 12 jours, repos 8 jours et reprise.

Ampoules à 0,05, même usage que pour l'ARSYCODILE et spécialement dans le paludisme et l'anémie des pays chauds.

Docteur M. LEPRINCE
62, Rue de la Tour — PARIS (XVIe)
15

NÉO-CALCILINE

OPOTHERAPIE TOTALE

Os frais épiphysaire : 0,15

Para thyroïde...	0,001	Diastase..	0,05
Thymus.....	0,05	Kinase....	0,05
Surrénale.....	0,05	Erepsine..	0,05

pour un comprimé, un cachet ou une mesure.

Mode d'emploi. — 2 comprimés, 2 cachets ou 2 mesures (granulé) avant chaque repas.
Enfants 1/2 dose.

Propriétés. — Assure la Récalcification intégrale. Dans le délai le plus court: Réveil de l'appétit, régularisation des fonctions gastro-intestinales, reprise de poids.

Les **Laboratoires ODINOT**, 21, r. Violet, PARIS exécutent également
Calciline formule normale
Calciline adrénalinée
Calciline méthylarsinée
Deux formes. — Comprimés — Granulé.

Mode d'emploi. — 2 comprimés ou 2 mesures avant chaque repas. — Enfants 1/2 dose.

NÉO-COLLARGOL

Le Néo-Collargol assure au Corps médical la garantie d'un produit à teneur en argent très élevé (80% d'argent métal).

Ni irritant, ni toxique, c'est un bactéricide des plus énergique dont l'emploi est toujours utile pour le traitement des maladies infectueuses et pour le pansement des plaies.

Il s'emploie en :

Pommade Néo-Collargol cocaïne pour le pansement de toutes plaies opératoires, variqueuses, brûlures.

Pommade Néo-Collargol non cocaïné pour frictions dans maladies infectieuses.

Ovules Néo-Collargol réalisant le pansement continu des vaginites, métrites, ulcérations du col utérin. Les sécrétions diminuent et la guérison suit rapidement.

Suppositoires Néo-Collargol pour hémorroïdes, fissure anale et prostatites.

Pilules Néo-Collargol pour les entérites, la coli-bacillose et l'appendicite chronique.

Compte-Gouttes pour le coryza et la grippe.

Laboratoires du Dr MARTINET
16, rue du Petit-Musc — PARIS

NÉOIACOL

Arsénobenzol en solution stable pour injection intramusculaire préparé par l'**Institut sérothérapeutique de Milan** dirigé par le Professeur BELFANTI

Solution acqueuse (4, 4¹) dioxy, 3, 3¹, diaminoarsénebenzol solubilisé et stabilisé) est un novarsénobenzol spécialement étudié pour l'usage intramusculaire.

Présente une forte stabilité qui permet une longue conservation en solution.

Ne produit aucune douleur et ne cause pas d'accidents inflammatoires.

Possède une activité thérapeutique presque égale à celle fournie par l'injection intraveineuse de Novarsénobenzol.

Rend possibles les cures ambulatoires.

Les dangers sont réduits au minimum.

La cure intensive de la syphilis est considérablement facilitée.

Laboratoire HUGUES

105, boulevard Malesherbes. — PARIS (VIII^e).

NÉOL

Constitution. — Préparation aqueuse peroxysulfatée, d'origine électrolytique, constituant une solution auto-génératrice d'Ozone naissant.

Propriétés. — Aucune toxicité, antiseptique-cicatrisant, essentiellement cytophylactique, kératoplastique et décongestif.

Indications. — Brûlures par le feu, le radium ou le froid. Ulcérations cutanées et muqueuses. Plaies phagédéniques. Métrites, angines, pharyngites.

Mode d'emploi. — L'eau néolée *(Néol 1 partie, eau 4 parties)* remplace avantageusement l'eau oxygénée dans toutes ses indications — Attouchements, badigeonnages (Angines, Stomatites, Laryngites, Métrite et Endométrite) : *Néol pur.* — Pansements (Brulûres. Plaies diverses) : *Eau néolée.* — Gargarismes : *Une cuill. à soupe par verre d'eau* avec une pincée de bicarbonate de soude. — Injections, grands lavages : *Quatre cuill. à soupe* par injection de deux litres d'eau.

Laboratoires BOTTU

Anciens Laboratoires du Néol

35, Rue Pergolèse — PARIS (XVI^e

NÉO-LAXATIF CHAPOTOT

LAXATIF

Composition. — Suc d'orange et manne.

Forme. — Sirop.

Indications. — Laxatif agréable pour les enfants, les dames et les personnes âgées ou affaiblies.

NE RENFERME
NI PRODUITS CHIMIQUES,
NI PHTALÉINE DU PHÉNOL,
NI DRASTIQUES,
NI STUPÉFIANTS.

Peut être donné aux enfants, même nouveau-nés.

Posologie. — Enfants du premier âge : 1/3 à une cuillerée à café.
Enfants de 3 à 5 ans : une à deux cuillerées à café.
Enfants de 6 à 14 ans : une à deux cuillerées à entremets.
Adultes : une à deux cuillerées à soupe.
S'il y a lieu, augmenter les doses jusqu'à effet actif, pour revenir ensuite à des doses moindres mais suffisantes.

Laboratoires AUBRIOT
56, boulevard Ornano
18 et 21, rue Championnet
PARIS (XVIII[e])
R. C. Paris 20.019

Agent Général pour la Belgique :
A. CHOCAT,
86, rue du Méridien — BRUXELLES

NÉOLYSE et NÉOLYSE RADIOACTIVE

Préparations à base de sels silico-magnésiens.

Indic. thérap. — Traitement des affections cancéreuses par les composés magnésiens insolubles.

Propr. thérap. — La Néolyse est établie d'après les observations du Prof. Robin et les arguments cliniques de MM. Richet, Delbet et J. Regnault (Acad. Médec., avril 1918).

Formes usuelles.

Néolyse : Cachets (en boîte de 60).
Ampoules (en boîte de 4).
Compresses (en boîte de 10).

Néolyse radio-active : Ampoules (boîtes de 4).

Laboratoire de la NÉOLYSE : G. FERMÉ
55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X)

NÉO-MÉSARCA « ROCHE »

Pour injections endoveineuses dans toutes les formes de la syphilis.

Le Néo-Mésarca « Roche » est le 4,4'-dioxy 3,3'-diamino-arsénobenzène-N-méthylène-sulfoxylate de sodium. Il correspond en tous points au produit introduit en thérapeutique par le Professeur Ehrlich sous la désignation de 914 ; il se présente sous la forme d'une poudre jaune, renfermant environ 20% d'arsenic, très soluble dans l'eau, en donnant une solution de réaction neutre.

Grâce à sa constitution de *véritable* sulfoxylate et à la prédominance du dérivé monométhylénique, le Néo-Mésarca « Roche » représente le dérivé arséno-benzénique possédant le coefficient chimico-thérapeutique le plus favorable.

Chaque série de fabrication est l'objet d'un contrôle minutieux, au triple point de vue chimique, physiologique et clinique. Le produit n'est livré au commerce que lorsqu'il est reconnu irréprochable. Le numéro du contrôle est inscrit sur chaque ampoule.

Conditionnements :

Pour nourrissons et jeunes enfants :

Dose 00 (rouge) = 45 milligrammes.
Dose 0 (violet) = 75 milligrammes.

Pour adultes :

Dose	I (bleu)	=	15 centigrammes
—	II (orange)	=	30 —
—	III (rouge)	=	45 —
—	IV (vert)	=	60 —
—	V (violet)	=	75 —
—	VI (noir)	=	90 —

PRODUITS
F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
21, Place des Vosges, Paris (III^e^)

NEOPANCARPINE

Extrait total hydro-alcoolique éthéré de *Jaborandi*

Formes. — Granules et Gouttes.

Indications thérapeutiques. — Les altérations de la sensibilité organique et les maladies anaphylactiques, *traitement de fond*, ne s'adressant nullement aux manifestations paroxystiques (crises), mais à l'altération permanente qui prépare et détermine ces dernières :
Toux quinteuses. Asthme. Coryzas spasmodiques. Urticaire. Névro-dermites. Eczéma.
La meilleure thérapeutique de désensibilisation.

Mode d'emploi. — *Adultes :* 1 ou 2 granules, *après les repas*, matin, midi et soir.
Enfants jusqu'à 5 ans : 3 à 10 gouttes, 3 à 4 fois par jour.
A partir de 5 ans : 10 à 20 gouttes 3 à 4 fois par jour.
Après les repas, matin, midi et soir.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris
5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI[e])
Téléph. : Auteuil 35-25

NÉO-RHOMNOL

Rhomnol Strychno-Arsénié (Nucléinate de Strychnine défini et Cacodylate de Soude).
Injections hypodermiques et comprimés.

Indic. Thér. — Neurasthénies, Grippe, Convalescences, Intoxications, Dépressions nerveuses, Etats cachectiques, Suites d'infections, etc.
(Spécificité.) Corps nouveau défini, à effets réguliers et constants.

Mode d'emploi. — Tous les jours une ampoule (en injections intra-musculaires de préférence) deux dans les cas graves. Habituellement, la boîte de 12 étant terminée, on institue un repos d'une semaine, suivi de la reprise des piqûres, si c'est nécessaire. Un comprimé à chaque repas, avaler sans croquer.

Docteur M. LEPRINCE
62, Rue de la Tour — PARIS (XVI[e])

NÉO-RIODINE

$C^3\ H^6\ O^4\ I\ S\ Na$.

Composition. — Dérivé sodique à 44% d'iode organique en solution aqueuse injectable.

Forme. — Ampoules de 2, 3, 5 cc. En boîtes de 10 et de 50 ampoules.

Propriétés thérapeutiques. — *Résorption certaine et rapide* facilitant les injections intra-veineuses. *Action immédiate et intensive* sans iodisme.

par voie buccale, voir **Riodine** ; mêmes applications, *action lente et prolongée*.

Indications. — Artério-sclérose, cardio-sclérose, myocardites chroniques, hypertension, etc... emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme, etc... obésité, rhumatisme chronique, maladies spécifiques et dans tous les cas où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

Doses. — En injections intra-veineuses ou intra-musculaires de 2, 3, 5 et 10 cc. suivant les cas.

Prix : 16 francs.

LABORATOIRES P. ASTIER

41 à 47, rue du Docteur-Blanche, Paris (XVI^e).

NÉOTHORIUM MILLOT

Traitement des MÉTRITES CHRONIQUES et des Ulcérations du Col.

Les sels de terres rares (Néodyme, Thorium etc.), possèdent, en applications externes, de remarquables qualités antiseptiques, topiques et cicatrisantes.

Ces propriétés ont été mises à profit par divers auteurs (A. FROUIN, L. HUDELO, GUENOT, GRENET, DROUIN et MUFFAT), dans le pansement des plaies atones, et principalement dans le traitement des ulcérations du col de l'utérus, et des métrites chroniques.

Les sels de terres rares réalisent la médication idéale de ces affections, en effet :

Energiquement antiseptiques et antivirulents, ils amènent rapidement le tarissement de la suppuration.

Décongestionnants et astringents, ils suppriment en quelques jours les phénomènes douloureux et fluxionnaires.

Kératoplastiques, ils stimulent énergiquement la cicatrisation des ulcérations les plus tenaces.

Dépourvus de toute toxicité et de toute causticité, ils sont absolument inoffensifs

Incolores et inodores, leur emploi est aussi discret qu'on peut le souhaiter à un traitement de ce genre.

Soucieux de rendre pratique cette intéressante médication, les LABORATOIRES MILLOT mettent à la disposition du Corps Médical les quatre préparations suivantes :

Ovules Néothorium Millot.

Métrites : un tous les jours, puis tous les deux jours.

Prix médical : la boîte de 6 ovules : 9 francs.

Crayons Néothorium Millot.

Endométrites : deux à trois par semaine.

Prix médical : la boîte de 8 crayons : 12 francs.

Comprimés Néothorium Millot.

Leucorrhée et Hygiène quotidienne : un ou deux dans de l'eau chaude en irrigation.

Prix médical : la boîte de 36 comprimés : 8 francs.

Tampons Néothorium Millot.

Ulcérations du col : un tous les jours, puis tous les deux jours. Prix médical : la boîte de 6 tampons : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

LABORATOIRES MILLOT

54, rue de la Bienfaisance, Paris (VIII^{e}).

Tél. : Laborde 0.69

NERGINE HEUDEBERT

Composition. — **La Nergine** apporte le phosphore organique, les éléments minéraux combinés et les vitamines du germe de blé naturel et constitue un reminéralisant précieux et un stimulant des sécrétions glandulaires.

Indications. — A recommander aux enfants en voie de croissance et dans tous les troubles de la nutrition accompagnant les affections aiguës ou chroniques ; neurasthénie, anémie, tuberculose, typhoïde surmenage et convalescence.

Excellent complément des farines lactées préparées à l'eau.

Mode d'emploi — Pour le nourrisson, délayer dans un peu de lait, à la dose d'une à deux cuillerées à café par jour.

Pour les adultes, à prendre en plusieurs fois 4 à 6 fortes cuillerées à café par jour, dans une infusion tiède ou mélangées aux aliments habituels

Produits de Régime HEUDEBERT

85, Rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)

NERVOCITHINE TISSOT

Composition et Formes. — Ampoules et Dragées.

Ampoules :

Fluorure de sodium	0,001
Nucléinate de fer	0,02
Méthylarsinate de soude	0,03
Glyco-phosph. de soude	0,07
Sulf. de strychnine	0,001

Dragées :

Même composition avec addition de 0 gr. 05 de Nte de manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Sérum histogénique. Traitement reconstituant intensif le plus puissant.

Indications thérapeutiques. — Toutes fatigues, Toutes anémies.

Doses. — 1 ou 2 ampoules par jour ; 1 ou 2 dragées à chaque repas.

Laboratoire du Docteur TISSOT

34 Boulevard de Clichy — PARIS

NEURÈNE

En 1904 et 1906, les Prof. Pouchet et Chevalier montrent que l'acide valérianique et ses sels sont physiologiquement inactifs.
En 1906, le Prof. Brissonnet découvre l'éther de bornyl (dit Bornéol soluble ou Neurène),

principe actif de la Valériane. Sans odeur.

Solution contenant 0 gr. 10 de Bornéol soluble par cuill. à café. Une cuill. à café de Neurène contient la partie active de 150 gr. de racine de Valériane.

Doses. — Adultes: 3 à 5 cuill. à café par jour. — Enfants: 1 à 3 cuill. à café par jour, selon l'âge.

Mode d'emploi. — Chaque cuill. à café dans 1/4 de verre d'eau sucrée **froide** et aromatisée à la fleur d'oranger.

Prop. Thér. — Régulateur et tonique des centres nerveux.

Indications. — Toutes les Affections nerveuses, Neurasthénie, Hystérie, Spasmes, Insomnies nerveuses...

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET
8, Rue de la Source — PARIS (XVI[e]) Tél. Aut. : 11.86

NEURÉOL

Présentation et composition. — Association soluble de Véronal, Pyramidon, Valériane, Crataegus, Extrait de Coca.

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique, antispasmodique, sédatif et hypnotique.

Avantages. — En solution aqueuse, bien toléré, pas d'accoutumance, aucune action nuisible sur le cœur, les reins, la mémoire.

Posologie et mode d'emploi. — Deux cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, avant de dîner ou de se coucher.

Laboratoires LAFARGE
6, boulevard Arago — PARIS

NEURINASE

Solution ou comprimés à base de Valériane fraîche renforcée par une faible dose de Diéthylmalonylurée soluble. Renferme 0 gr. 15 de Diéthylmalonylurée par comprimé ou cuill. à café de solution.

A. **Dose et mode d'emploi.** — 1° Sédatif : 1 cuill. à café, ou 1 comprimé matin, et soir dans de l'eau sucrée. — 2° Hypnotique : De 1 à 4 cuill. à café le soir au coucher. Enfants : 1/2 dose.

B. **Prop. Thér.** — Régulateur du système nerveux contre Insomnies. Mélancolie. Hystérie. Epilepsie. Troubles névropathiques de la Ménopause. Maladies de Basedow. Tics. Délires toxiques. Palpitations. Surmenage. Prurit, etc.

Contre-indication : Néant.

Prix : Solution : 14 fr. — Comprimés : 9 fr.

Laboratoire A. GENEVRIER

2, rue du Débarcadère — PARIS

NEUROBORE

PUR. — *Solution.*

Composition. — Solution inaltérable de tartrate borico-potassique pur. — 1 gr. par cuill. à café.

Prop. thérap. — Spécifique des affections nerveuses. Calmant antispasmodique.

Indic. thérap. — Agitation, Insomnies, Convulsions, Troubles névropathiques, Epilepsie, etc.

G. ASSOCIÉ. — *Cachets.*

Composition. — Tartrate borico-potassique, 1 gr. Phénylethyl-malonylurée, 0.05 ; correctif, par cachets.

Médication d'Attaque.

Après effet obtenu, substituer le *Neurobore pur.*

Laboratoire E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e^)

NEURO-MOKA

(Marque déposée)

CAFÉ TONIQUE
DÉCAFÉINÉ ET VITAMINÉ

POUR
NERVEUX — CARDIAQUES — RÉNAUX
DÉPRIMÉS HYPERSENSIBLES

PRODUIT MÉDICINAL FRANÇAIS

GARANTI PUR MOKA
TORRÉFIÉ ET CONCASSÉ
avec arome et saveur parfaitement conservés

COMPOSITION

GRAINS NATUREL DU CAFÉIER
chimiquement décaféiné à l'état vert
et
rationnellement vitaminé après torréfaction
par association de
vitamines hydrosolubles d'origine végétale.

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

Du seul fait de l'apport de ses vitamines spéciales
LE NEURO-MOKA
FAVORISE LA DIGESTION ET L'ASSIMILATION
par
action excito-sécrétoire sur les glandes exocrines
(salivaires, gastriques, pancréatique, intestinales)
et
action excito-motrice sur l'appareil digestif.
TONIFIE L'ORGANISME TOUT ENTIER
EXALTE L'IDÉATION et les FONCTIONS MOTRICES

AVANTAGES :

DÉNUÉ DE TOUTE ACTION EXCITANTE
ÉLECTIVE sur le système nerveux, le cœur et les reins.
Aucune crainte de **CAFÉISME** aigu ou chronique avec de hautes doses ou l'abus prolongé de Neuro-Moka. **Peut être donné aux jeunes enfants et aux vieillards.**
N'A PAS DE CONTRE-INDICATIONS

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Asthénies digestives, physiques, psychiques
et
multiples cas où la caféine nuit à la santé :
sujets nerveux, porteurs de lésions cardiaques ou rénales, hypersensibles, atteints d'insomnie, de tremblements, etc.

UNE SEULE FORME PHARMACEUTIQUE

Grains torréfié est et concassés
délivrés dans de flacons en verre à fermeture hermétique

MODE D'EMPLOI ET DOSES

Se prend en infusions chaudes faites à l'aide de filtres à raison de 2 à 3 cuillerées à café pour une tasse.

Laboratoire des Produits médicinaux spécialisés
L – M – D

A. Rollnad, Pharmacien de 1re classe,
12, rue d'Agresseau — PARIS (VIIe) Tél. : Élysées 91-90

NEURO PAX

en ampoules indolores.

Composition. — Manganèse, Phosphore organique et minéral, Arsenic, Strychnine, Fer.

Propriétés thérapeutiques. — Permet à l'économie d'absorber très aisément une grande quantité de Manganèse. D'où son incomparable puissance d'oxygénation qui détruit les Toxines par oxydation. Piqûre indolore, sans suite à redouter.

Stimulant énergique (traitement intensif).

Indications. — Affaiblissement organique et Épuisement nerveux, Asthénie physique et psychique, Déficience des Échanges, Phosphaturie, Troubles nerveux d'origine auto-toxique, etc.

Dose. — Injection profonde (intra musculaire).

Dose moyenne 2 cc. tous les 2 jours.

Laboratoires Cte RENÉ de GRAUWE

Pharmacien de 1re classe.

16, rue de Rocroy, PARIS. Usine à Saint-Denis.

NEUROPLASMA FORT

Composition. — *Ampoules de 1 cc.*

Cacodylate de soude	aa 0.025
— de magnésie	
Glycérophos. de soude	
Caféine	0.01
Cacodylate de strychnine	0.0005

Indications. — Neurasthénie. Dépression physique. Convalescences. Asthénie. Faiblesse circulatoire.

Avantages. — Piqûre indolore. Synergie pharmacologique.

Doses. — Une ampoule tous les deux jours.

Emploi. — Injection sous-cutanée ou, de préférence, intra-musculaire.

Échantillons :

MICHEL DELALANDE

13, rue Lacharrière — PARIS (XIe)

NEUROPLASMA MASSIF

Composition. — *Ampoules* de 5 cc. contenant: Cacodylate de soude, 0,25 ; cacodylate de magnésie, 0,05 ; glycérophosphate de soude, 0,10 ; Caféine, 0,04 ; cacodylate de strychnine, 1/2 milligr.

Indications. — États cachectiques, convalescences, tuberculose et prétuberculose, anémie, etc.

Avantages. — Piqûre indolore. Tonique immédiat, relèvement rapide du malade.

Doses. — Une ampoule tous les 2 jours ; après un repos de huit jours une nouvelle série de 12 ampoules.

Emploi. — Injection intramusculaire.

Échantillons :

MICHEL DELALANDE

13, Rue Lacharrière — PARIS Ie)

NEUROPLASMINE FORT

Composition. — Pour une ampoule de 1 cc.. Méthylarsinate de fer, 0,0125 ; cacodylate de soude, 0,025 ; Glycérophosphate de soude, 0,05.

Indications. — Chloro-anémie. Névrose et insomnies nerveuses. Surmenage. Entraînement sportif. Suites opératoires et anémies post-hémorragiques. Troubles de la circulation.

Doses. — Une ampoule tous les jours pendant les 6 premiers jours, puis une tous les deux jours pour la fin de la série.

Emploi. — Injection *intramusculaire* de préférence.

Échantillons :

MICHEL DELALANDE

13, Rue Lacharrière — PARIS (XIe)

NEUROSINE PRUNIER

(Phospho Glycérate de Chaux, Procédé G. Prunier).

Propriété thérapeutique. — Reconstituant du Sytème nerveux.

Mode de présentation. — La " Neurosine Prunier " est présentée sous trois formes : granulé, cachets, sirop.

Indications. — Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Surmenage, etc.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour de granulé ; 2 à 3 cachets par jour ; 2 à 3 cuillerées à bouche par jour de sirop. Chaque cuillerée à café de granulé, chaque cachet et chaque cuill. à bouche de sirop contiennent 0 gr. 30 de Glycérophosphate de chaux (Procédé G. Prunier).

Chassaing, Le Coq & Cie
(Anc. Mons Chassaing-Prunier)

6, Rue de la Tâcherie — PARIS

NEUROTROL

(Sérum neurotrophique).
Médication strychno-cacodylique.

Composition. — Cacodylate soude : 0,05 ; glycérophosphaste soude : 0,10 ; cacodylate strychn ne : 0,001 ; sérum isotonique : Q. S. p. 1 c. c.

Indications. — Asthénie, Neurasthénie, Dépression nerveuse, Diabète, Prétuberculose, Paludisme, Convalescence.

Doses. — *Deux formes.*

1° En ampoules de 1 c. c. ; 1 à 3 injections sous-cutanées par jour et progressivement. Les injections sont *absolument indolores.*

2° En gouttes : de 20 à 60 gouttes par jour et progressivement.

Laboratoires ABADIE-TANZI
3, Place Intérieure-St-Michel — TOULOUSE
(Haute-Garonne). — Tél. : 1306

NEUROTROPHOL BYLA

Elixir, Granulé, Dragées.

A base de nucléorquine Byla, d'acide nucléinique, de glycérophosphate de soude et de méthylarsinate disodique.

Doses et mode d'emploi. — *Elixir :* 1 verre à liqueur *après* chaque repas, pour les adultes ; 1 cuillerée à dessert ou à café pour les enfants. *Granulé :* 1 cuillerée à bouche *avant* chaque repas, pour les adultes ; 1 cuillerée à café pour les enfants. *Dragées :* Adultes : 4 à 8. Enfants : 2 à 4 par jour.

Propr. thérap. — Tonique neuro-musculaire. Excitant de la nutrition.

Indications. — Neurasthénie, Surmenage, Dépression, Sénilité, Asthénie musculaire, Epuisement, Psychoses génitales.

Les ÉTABLISSEMENTS BYLA,
26, avenue de l'Observatoire — PARIS
R. C. Seine 71.895

NEUROVAROL DOUETTEAU

Traitement rationnel de l'Insuffisance Ovarienne.

Composition :

Extrait Ovarien (0.10 par cachet).
Extrait Thyroïdien (0.0025 par cachet).

Poudres de plantes sélectionnées.

VALÉRIANE STABILISÉE.
HYDRASTIS. — HAMAMELIS. — VIBURNUM. — GOSSYPIUM.

Forme :

Cachets de petit diamètre.

Indications :

Insuffisance Ovarienne.
Règles douloureuses.
Accidents de la puberté et de la ménopause.

Doses :

1° **Traitement des troubles par hypo-fonction ovarienne pendant la période d'activité génitale.**

1 à 2 cachets par jour avant les repas pendant les 8 jours qui précèdent la date présumée des règles et pendant toute la durée de la menstruation.

2° **Traitement des accidents de la ménopause physiologique ou opératoire.**

1 à 2 cachets par jour pendant 20 jours par mois.

Laboratoires DOUETTEAU Frères
20, Faubourg Saint-Honoré, Paris (VIII[e]).

NEVORAL RAFEY

Le NEVORAL est parfaitement toléré par les estomacs délicats ; c'est en même temps un fortifiant, un tonique et un fébrifuge. Il ne contient aucun composé ou dérivé de l'opium, ni aucun hypnotique. Les actions des divers produits pharmaceutiques qui le composent se multipliant l'une par l'autre lui donnent un pouvoir thérapeutique considérable, quelles que soient l'origine et la cause de la douleur.

Indications thérapeutiques. —Névralgies, Rhumatismes, Migraines, Maux de tête et de dents, Courbatures, Fièvre grippale, Sciatique, Lumbago, Zona.

Le **NEVORAL supprime la douleur**, tandis que d'autres médicaments ne font que l'endormir.

Dose et mode d'emploi. — Adultes, 1, 2 ou 3 cach. p. j. Si 1 cach. n'a pas suffi, en prendre un sec. 1 h. après le prem. Enfants, le 1/4, le 1/3 ou la 1/2 du contenu d'un cachet à prendre dans un liquide sucré, de la confiture ou du miel.

Dépôt général :

Laboratoires RAFEY

Raoul FEIGNOUX, pharm. 1re classe

29, rue des Jardiniers. Montreuil (Seine)

NÉVRALGOL BROSSARD

(*Cachets*)

Analgésiques — Antithermiques — Fébrifuges

Indications. — Grippe. Toutes Névralgies : faciales, dentaires, stomacales, oculaires, intercostales, utérines, sciatiques. Rhumatismes. Migraines.

Doses et mode d'emploi. — Un à trois cachets par 24 heures pour les adultes, à distance des repas.

Prix : 7.85 la boîte de 12 cachets.
— 4.20 — 6 — .

Laboratoires SOENEN et BROSSARD
CORNAUD et BROSSARD, Succr
1, Rue des Cordouans — LA ROCHELLE
Echantillons sur demande des Docteurs.

NEVROSOL

Traitement spécifique de la *douleur et de la fièvre.*

Composition. — Association rationnelle des médicaments suivants :

Phényl, Diméthyl aminopyrazolone; Phénacétine; Chlorhydrate de quinine, Triméthyl Dioxypurine.

Indications. — Névralgies de toutes natures. Odontalgies-Migraines,Céphalée de la grippe et des états fébriles, courbatures, Douleurs rhumatoïdes, Sciatique, Lum. bago, Zona, Goutte, etc.

Avantages. — Ne déprime pas, ne fatigue pas l'estomac ni le rein. Son emploi prolongé est inoffensif.

Posologie. — 1 ou 2 cachets, à une heure d'intervalle, dans les accès de névralgie, de migraine, de maux de dents.

2 à 3 cachets par jour et pendant plusieurs jours dans les affections douloureuses fébriles.

Laboratoire Chimico-Thérapique de Paris
12, rue des Apennins — PARIS (XVIIe)

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

A base de Glycérophosphates alcalins. Ne contient ni chaux, ni sucre, ni alcool.

Forme. — Gouttes concentrées, 20 gouttes contiennent 0,40 cgr. de glycérophosphate composé à base de soude, de potasse et de magnésie.

Dose. — XV à XX gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson.

Propriétés. — Reconstituant rationnel par suite de sa composition qui est celle même des Tissus nerveux.

Indications. — Neurasthénie, Paralysie générale, Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage, Anémie cérébrale, Vertiges, Convalescence, etc. Aucune contre-indication.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS

NIGÉRINE VINCENT

Noir animal pur polyvalent.

Fixateur par excellence des toxines et alcaloïdes

Forme. — Poudre noire sans odeur ni saveur.

Indications. — Diarrhées, gastro-entérites aiguës et chroniques, intoxications d'origine gastro-intestinale, empoisonnements.

Doses. — 3 cuillerées à café par jour entre les repas dans un peu d'eau. — Dans les empoisonnements, 3 fortes cuillers à soupe en une ou plusieurs fois.

VINCENT, pharmacien,

14, avenue Mac-Mahon — PARIS

NISAMELINE
de TROUETTE-PERRET

Préparation à base d'extrait de Guaco ; doit être employée "INTUS et EXTRA" — action physiologique à l'intérieur, sur les centres nerveux sensitifs et sur la sécrétion rénale à l'extérieur ; sur les terminaisons des nerfs à la sensibilité générale.

Indications. — Prurits, Dermatoses, Névralgies.

Traitement interne :

Pilules Nisaméline " TROUETTE-PERRET " (0 gr. 10 Extrait de Guaco). 2 à 5 pilules à chacun des deux repas.

Sirop Nisaméline " TROUETTE-PERRET " (0 gr. 20 Extrait de Guaco). 1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux repas.

Traitement externe :

Poudre Nisaméline " TROUETTE-PERRET "
1/2 flacon ou 1 flacon, pour un grand bain. — 1 à 4 cuillerées à café pour 1/2 litre d'eau froide ou tiède, pour lotions, compresses, etc.

Pommade Nisaméline " TROUETTE PERRET ".
En onctions pour prurits et dermatoses localisés.

Savon Nisaméline " TROUETTE-PERRET ".
Pour lavages et soins hygiéniques.

Bien spécifier : **NISAMÉLINE " TROUETTE-PERRET "** pour avoir le véritable Guaco.

Laboratoire TROUETTE-PERRET
15, Rue des Immeubles-Industriels-PARIS (XI^e^)

NITIUM BUISSON

Bromure de radium suractivé enrichi en rayonnement alpha.

Crayon.
Traitement des métrites chroniques et hémorragiques. Curettage médical.

Ovules.
Vaginites.

Pommade.
Dermatoses. Bartholinites. Chancre mou. Lupus érythémateux, ulcérations diverses, ulcère variqueux, herpès génital.

Bougie : Urétbrites chroniques.

Chaque crayon, ovule, bougie ou tube de pommade contient 6 microgrammes de bromure de radium suractivé.

Etablissements Albert BUISSON
F. JALOT et Cie
157, rue de Sèvres — PARIS
R. C. Seine 222.705 B

NITROŸL LEYSIN INJECTABLE

Symbiose de sels de terres rares traités photolytiquement.

Présentation. — Ampoules pour injections hypodermiques et intramusculaires, en nombre proportionné au volume des articulations (Hanche, Creux cotyloïde 4 à 6 — Épaule, Genou, Malléoles 4 — Coude, Poignet 3 — Phalanges 1 à 2 — par 24 heures).

Indications. — Rhumatismes aigus et chroniques, articulaires, et musculaires, Ankyloses, Arthrites, Sciatiques, Lumbagos, etc., etc... Amène la disparition extrêmement rapide de la douleur et des phénomènes morbides ainsi que la réapparition de la liberté des mouvements.

PRIX. — Au public : 55 fr. — Au Corps médical : 40 fr.

Les Laboratoires LEYSIN
1 bis, rue Molitor — PARIS (XVIe)

NOPIRINE VICARIO

Aspirine Phénédine caféinée

Action antinévralgique plus rapide et plus durable que l'Aspirine.

Mode d'emploi :

Comprimés : 2 à 3 par jour.
Granulés : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Indications. — Névralgies rhumatismales. Migraines arthritiques. Céphalées des neurasthéniques. Grippe, etc.

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IXe)

NORMACOL

Mucilage Evacuant puissant, facile à ingérer, actif.

Possède toutes les propriétés à exiger d'un mucilage thérapeutique : pureté, pouvoir de gonflement considérable, infermentescible, inassimilable, extrême division (les grains restant indépendants même après gonflement), ingestion facile, presque agréable.

Action. — Laxatif mécanique.
Augmente le volume du contenu intestinal.
S'oppose à sa dessiccation excessive.
Rend sa surface onctueuse et glissante.

Forme. — Granulé dragéifié très menu.

Dose (moyenne). — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Différentes préparations :

Normacol (ordinaire) : avec bourdaine (constipés habituels)
Normacol pur : sans bourdaine (entéritiques, diarrhéiques).
Normacol sans sucre : avec bourdaine (diabétiques).

Laboratoires NORGAN
Pierre ALEXANDRE, Pharmacien
41, rue de Rome, Paris (VIIIe). Tél. Laborde 08-00

NOVARGYRE

Ampoules Guillaumin
à l'oxycyanure d'hydrargyre indolore.

Compos. — Les ampoules de Novargyre contiennent : Oxycyanure d'hydrargyre : 1 centigr. ; Stovaïne : 1 centigr. ; Eau distillée : 1 cm cube.

Propr. — Solution très stable, rigoureusement dosée, neutre, indolore, ne coagulant pas les albuminoïdes, d'une action très prompte et très sûre.

Indicat. — Accidents syphilitiques.

Mode d'emploi. — Injections intra-musculaires tous les deux jours de 1 à 2 cc. selon l'intensité de la maladie ou la susceptibilité du sujet. Faire huit à douze injections et laisser reposer le malade pendant une ou deux semaines. Renouveler ensuite le traitement s'il est nécessaire.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN
13, rue du Cherche-Midi — PARIS

NOVARSÉNOBENZOL

Dioxydiaminoarsénobenzol-méthylène sulfoxylate de soude

Médicament d'assaut des spirilloses et principalement de la syphilis, en injections intra-veineuses, à doses progressives de 0 gr. 15 à 1 gr. 20. Soluble dans l'eau distillée, sans alcalinisation.

Peut également être utilisé en injections intra-musculaires, en lavements et comme topique local (Angine de Vincent, etc.).

Littérature sur demande

Les Établissements POULENC Frères
86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS
R. C. Paris 5386

NOVO-BROL

Bouillon végétal achloruré (en tablettes) à base de Lupulin, Bromure et Phosphates. (Bromure non spécifié.)

Préparation et marque absolument françaises

Le Novo-Brol est le *seul produit utilisant* les remarquables *vertus* calmantes du *lupulin* (Extr. du houblon) associé au bromure (A.-C. Guillaume et H. Leclerc).

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications. — Hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.

Mode d'emploi et dose — Verser la valeur d'une tasse d'eau bouillante sur les tablettes de Novo-Brol pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle :

Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour.
Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour
Enfants nerveux : 1 à 2 tablettes (Suivant l'âge)

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET
8, rue de la Source – PARIS (XVIe)
Tél. Auteuil. : 11-86

NOVOLACTOL DAGUIN

Forme. — Granulé agréable pour les enfants.

Composition. — Papaïne extractive, Benzonaphtol, Ferments lactiques, Magnésie hydratée.

Dose. — *Nourrissons :* 3 demi-cuillerées à café délayées dans un peu d'eau dans l'intervalle des tétées.
Enfants de 2 à 3 ans : 3 cuillerées à café dans l'intervalle des repas.

Indications. — Affections gastro-intestinales et gastro-entérites des nourrissons. Intoxication alimentaire.

Établissements Daguin
à SAINT-MAUR (Seine).

NUCLÉARRHOL GABRIEL

(flacon de 250 cmc. cubes)

Élixir très agréable renfermant par cuillère à soupe 0 gr. 268 de nucléophosphate de soude méthylarsiné (0,1 gr. 021 méthylarsinate de Na).

Indications. — Puissant reconstituant, convalescence, maladies du système nerveux, affections dérivant de la pauvreté du sang, troubles de la nutrition, affections osseuses, tuberculose

Excite l'appétit. Fait augmenter le poids. Rend la toux plus facile et moins quinteuse. Reminéralise.

Doses. — *Adultes* : 3 cuillères à soupe par jour ; de 10 à 16 ans : 3 cuillères à dessert par jour ; de 5 à 10 ans : 3 cuillères à café.

Laboratoires HENRY
39 rue de Sclessin — LIÉGE

NUCLEARSITOL ROBIN

Association de la combinaison végétale nucléophosphatée avec le méthylarsinate. Nucléophosphate de chaux et de soude méthylarsiné.

Comprimés. Ampoules injectables.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 4 à 6 comprimés ou 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures.

Prop. Thér. — Antituberculeux. Reconstituant puissant.

ndications. — Cachexie des pays chauds, fièvres paludéennes syphilis, tuberculose scrofule, lymphatisme.

Laboratoires M. ROBIN
13, rue de Poissy — PARIS

NUCLÉATOL ROBIN

Combinaison de Nucléophosphates d'origine végétale

Granulé : Nucléophosphate de chaux et de soude.
Injectable : Nucléopnosphate de soude pur.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 4 à 6 cuillerées-mesures de granulé aux repas, ou 1 ou 2 ampoules en injection par 24 heures.

Prop. thér. — Exaltant de la Phagocytose, abaisse la température en quelques heures. Effets analogues à ceux des ferments métalliques ou des colloïdes.

Indications. — S'emploie dans les convalescences, les débilités, les cachexies ; provoque la défervescence dans les fièvres infectieuses, puerpérales, érysipèles, typhoïdes, etc. ; s'emploie aussi préventivement dans les opérations chirurgicales.

Laboratoires M. ROBIN
13, rue de Poissy — PARIS

NUCLHÉMOSE

RÉMY et LECOQ

Ampoules et granulé au Nucléinate de manganèse.

Manganèse : Source continue d'oxygène.

Acide nucléinique : Source de phosphore.

Aucun sel quels que soient ses composants ne mérite plus de considérations du thérapeute que le **Nucléïnate de manganèse** le plus puissant hématogène.

Action. — Hyperleucocytose. — Accélération des échanges. — Reprise de poids. — Augmentation de la résistance organique.

Indications. — Anémie. — Prétuberculose. — Puberté. — Paludisme. — Chlorose. — Déchéances organiques. — Leucorrhée. — Suites d'hémorragie. — Convalescences. — Reminéralisation par la Nuclhémose granulée seule.

Posologie. — *Nuclhémose granulée :*

Adultes : 4 mesures par jour.

Enfants : 1, 2, 3 — — suivant l'âge.

Pas de contre-indication.

Posologie *(suite)*. **— Nuclhémose injectable** (ampoules de 2 cc.).

Adultes : 1 injection intramusculaire par jour ou tous les 2 jours suivant les cas.

Enfants : 1 toutes les 2 ou 3 jours suivant l'âge.

Contre-indication : albuminurie.

Nuclhémose injectable :

Principe actif : Nucléinate de Manganèse.

Excipient : Sérum neurosthonique 2 cc. elle constitue un véritable sérum manganique.

Toutes nos ampoules sont : Aseptiques. — Indolores. — Efficaces.

LABORATOIRE DE LA NUCLHÉMOSE

6, place Clichy, Paris (IX^{e})

Téléphone : Central 65-18.

NUJOL

Huile de paraffine

Description. — Le NUJOL est une huile de vaseline parfaite, incolore, inodore et sans goût, possédant un degré exactement défini de viscosité et de densité.

Indications. — Le NUJOL est spécialement indiqué pour le traitement de la constipation. Il est particulièrement recommandé pendant la grossesse et la période d'allaitement. Le NUJOL peut être administré en toute confiance à tous les âges et dans toutes conditions de santé.

Doses. — Pour les adultes : Une cuillerée à bouche soir et matin, à jeun.

Pour les enfants : D'une demi-cuillerée à une cuillerée à café, suivant l'âge.

Préparé par les

Laboratoires du NUJOL

Standard Oil Co., (New Jersey)

Chez tous les Pharmaciens ou directement chez l'Agent de vente pour la France : SCOTT et Fils, 38, Rue du Mont-Tabor — PARIS

NUTROBIASE, RAISIN VIVANT

Composition. — Extrait intégr. de raisin rouge, concentré, conservé VIVANT : *levures, diastases, vitamines*, etc.

Forme. — Sirupeuse. Fige par refroidissement ; réchauffer légèrement pour ramener la fluidité (+ 30°).

Indications. — Cure de raisin *vivant* :

Enfants. — Nutrition (Estomac, Foie, Intestin). Constipation, Entérite. Reins. Débilité post-opératoire, Grossesse. Allaitement. Désintoxication

Doses. — Toujours dans 4 parties d'eau. Après les repas : *Enfants* (dep. 1 mois). 1/2 à 2 cuill. à café.

Adultes. — 1 à 2 cuillers à dessert.

Constipation : 2 à 4 cuillers à soupe.

Prix : Flacon 200 gr., 12 fr. ; litre, 38 fr.

A. KOEHLER, Docteur ès sciences

10, rue Cimarosa — PARIS (XVI^{e}).

NUTROMALT

Composition. — Maltose 30 %, Dextrines 67%, Chlorure de Sodium 1%, H^2O 2 %.
Sucre nutritif ne fermentant pas dans l'intestin. Complément indispensable du lait de vache dans l'allaitement artificiel.

Forme. — Poudre.

Indications. — Affections gastro-intestinales, selles acides et diarrhéiques des nourrissons et des enfants.

Doses. — Nourrissons de 1 mois : 4 1/2, cuillerées à café par 2-3 décilitres de lait. Doses variables suivant l'âge.

Établissements WANDER
58, rue de Charonne — PARIS (XI^e)

NYCTAL

Composition. — Bromdiéthylacétylurée.

Action. — Hypnotique idéal sans accoutumance, ni accumulation. Absence de toxicité, pas d'odeur désagréable : véritable sommeil de détente.

Indications. — Traitement de l'insom[illegible] nerveuse.

Forme pharmaceutique. — Comprimés.

Dose. — Un comprimé toutes les 4 ou 5 heures comme sédatif, 3 comprimés dans un liquide chaud comme hypnotique.

Laboratoires DURET & RÉMY
ASNIÈRES (Seine).

ŒNOPHOS

Acides hydro-éthylène-phosphoriques.
Reminéralisation phospho-dolomitique.

Méthode des Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

Formes. — Elixir, granulé, gouttes.

Prop. thér. — Neurotonique, reconstituant énergique : *fixateur électif* de la magnésie et de la chaux *(voir fiche DOLOMA)*. Médication phosphorique rationnelle.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, psychasthénies, surmenages physique et nerveux, *cancers, tuberculose.*

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :* A chaque repas : 1 cuill. à soupe d'*Elixir* ou 2 cuill. à café de *Granulé* ou 60 gouttes dans un demi-verre d'eau ou de vin léger sucré. *Enfants :* réduire les doses suivant l'âge.

Pour la cure reminéralisante, *voir* " *DOLOMA* ".

Laboratoire général d'Etudes Biologiques
S. A., 29, Place Bossuet — DIJON
Téléphone : 16-42

OLÉOCIDASE

ACIDE OLÉIQUE PAUL THIBAULT

Capsules dosées à 0 gr. 50 d'*Acide Oléique pur*, extrait de l'huile d'olive, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie, de Paris. Sous un volume très restreint l'*Acide Oléique Paul Thibault* réalise, avec effet rapide et constant, l'action toujours très lente et souvent incertaine attribuée à l'huile d'olive dans la désagrégation des calculs de cholestérine. La plus sûre méthode de drainage biliaire.

Indications. — Lithiase biliaire, Cholélithiasie, Cholécystites lithiasiques, Cholestérinémie, Ictères, Crises de Coliques hépatiques, Evacuation des calculs de Cholestérine, par désagrégation.

Posologie. — 3 capsules le matin à jeun, 3 capsules dans le milieu de la journée et si besoin, 3 capsules le soir dans un peu d'eau minérale bicarbonatée ou chlorurée sodique tiède (Vichy, Châtel-Guyon, Vals, etc.)

Nota. — Pour éviter l'emploi d'acides oléiques impurs prescrire toujours : capsules d'*Oléocidase Paul Thibault.*

Laboratoire des Produits Paul THIBAULT
6, rue Rosenwald — PARIS (XVe

OLÉOJASOL

Huile antiseptique à 10 % d'Hojasol.

Composition :

Eucalyptol.....	50	Anéthol.....	3
Estragol.....	25	Eugénol.....	2
Linalol.....	20	Huile végétale..	1000

Avantages. — L'Oléojasol ne contient ni menthol, ni camphre, ni aucun produit chimique.

A base d'Hojasol (essence pure d'une plante des Tropiques), d'odeur très agréable, possède un pouvoir cicatrisant et désinfectant remarquable, surtout pour les lésions à staphylocoques. Décongestionne les muqueuses, sans les dessécher ni les irriter, et guérit les plaies de toute nature.

Les brûlures, à tous les degrés, peuvent, avec avantage, être pansées à l'Oléojasol. Ce pansement sédatif de la douleur ne colle pas et favorise activement la cicatrisation.

Indications. — Maladies des Voies respiratoires, Sinusites, Coryza, Rhume des foins, Otites, Laryngites, Bronchites, Inflammation de tous les tissus, Furonculose, Antrax, Eczéma, Brûlures.

Mode d'emploi. — L'Oléojasol s'emploie en instillations, pulvérisations, pansements, injections intratrachéales.

Laboratoire de l'HOJASOL
à CHARS (S.-et-O.).

Gros et exportation :
Dépôt : 19, rue Ferdinand-Duval,
PARIS (IVe).

OLEO-MEL

" LE LAXATIF DE RÉGIME "

Gelée de miel à l'huile de paraffine

Formule. — Huile de paraffine extra neutre à viscosité maxima et **spéc.** raffinée pour l'usage interne. } P. E.
Miel surfin 1er choix }

Indic. — L'association de ces deux substances réalise une synergie parfaite qui relève, p. le traitement de la **Constipation et des affections gastro-intestinales,** de toutes les indic. et de la posol. même de l'huile de paraffine. **Action mécan. Innocuité absolue.**

Prép. — L'Oléo-mel, préparé p. un procédé spéc., se présente sous forme d'une gelée homogène, absolument stable et inaltérable; il conserve tout l'arôme et toute la saveur du miel, ce qui en fait une médication des plus agréables et des plus faciles à prendre.

Laxatif idéal des nourrissons et des pers. délicates.

Prix : **7 fr. 75**

Laboratoire DELFOUR à POUILLON (Landes)

OLÉTHYLE-BENZYLE

L'Oléthyle-Benzyle qui servit à faire en France les premières études cliniques sur le Benzoate de Benzyle et permit son introduction dans la thérapeutique est une présentation de Benzoate de Benzyle d'une pureté absolue.

Propriétés physiologiques. — Antispasmodique et Hypotenseur dépourvu de tout pouvoir narcotique ne produisant aucun effet nocif sur le cœur, les reins, l'appareil respiratoire et le système nerveux. Il peut donc être administré même chez les sujets atteints de néphrite.

Indications :

I. — Hypertension, Angine de Poitrine, Angio-Spasmes.

II. — Tous les états spasmodiques de la musculature lisse :

Spasmes bronchiques, asthme, coqueluche, hoquet persistant d'origine périphérique, péristaltisme exagéré de l'intestin (dysenterie, diarrhées, pylorospasme, coliques hépatiques, néphrétiques, intestinales, constipation spasmodique, spasmes de la vessie, dysménorrhées spasmodiques.

Présentation. — Trois formes médicamenteuses : les gouttes, les gélules (capsules molles), les ampoules.

L'Oléthyle-Benzyle Gouttes est une solution de Benzoate de Benzyle synthétique pur titré à 20 %.

L'Oléthyle-Benzyle Gouttes se prête à toutes les exigences de la clinique et permet de graduer à volonté les effets à obtenir suivant l'âge et la nature du sujet.

L'Oléthyle-Benzyle Gélules est la présentation de choix de ce produit permettant au malade d'avoir toujours sur lui et en toutes circonstances son médicament dosé de façon précise (chaque gélule représente vingt gouttes de la solution de Benzoate de Benzyle à 20 %.

L'Oléthyle-Benzyle Ampoules est destiné aux injections sous-cutanées. Chaque ampoule de deux centi cubes correspond à 25 gouttes de la solution de Benzoate de Benzyle à 20 %.

Posologie. — Oléthyle-Benzyle Gouttes, 20 à 30 gouttes trois ou quatre fois par jour, dans un peu de lait ou d'eau sucrée, de préférence au début ou au milieu des petits et grands repas.

Oléthyle-Benzyle Gélules 3 à 5 gélules par jour, espacées dans le courant de la journée, de préférence au début ou au milieu des petits et grands repas.

Ampoules d'Oléthyle-Benzyle pur. De une à deux ampoules dans les 24 heures en injections sous-cutanées.

Laboratoire Central de Paris

122, faubourg Sain-Honoré — PARIS

OLIOLASE CORBIÈRE

Huile iodée vraie, indolore, fluide, facilement injectable, contenant 0 gr. 40 d'iode métalloïde pur par centimètre cube.
Est indiquée pour toutes les affections justifiables de l'emploi de l'iode ou des iodures.
Pas d'iodisme. Aucune réaction locale ni générale, même si la dose injectée en une fois dépasse 10 cc.

Mode d'emploi. — En injection intramusculaire indolore.
Injecter très lentement.

Présentation.

Boîte de 10 amp. de 1 cc. conten. 0 gr. 40 d'iode.
— 6 — de 2 — — 0 gr. 80 —
— 4 — de 5 — — 2 gr. « —

LABORATOIRES CORBIÈRE
27, rue Desrenaudes, Paris.

OPHTALMINE

Indic. thérap. — Antisepsie oculaire, Arrêt de la cataracte, par deshydratation du milieu oculaire. Conjonctivites, Blépharites, Presbytie prématurée, etc..., etc.

Doses et Mode d'emploi. — Pommade, deux applications par jour.

Docteur M. LEPRINCE
62, rue de la Tour
PARIS (XVIe)

OPOCALCIUM DU Dr GUERSANT

Réminéralisation — Polyopothérapie

Composition. — Extraits totaux de glandes endocrines. Parathyroïde, surrénale, thymus, hypophyse « *ce dernier dans le granulé seulement* » associés au fluorure, phosphate, glycéro-phosphate, carbonate de Ca, phosphate de Mg et nucléinate de Mn.

Formes. — Cachets, comprimés, poudre, granulé (recommandé pour enfants).

Propriétés thérapeutiques. — La décalcification et d'une façon générale la déminéralisation de l'organisme sont dues moins à un apport insuffisant des minéraux alimentaires qu'à la déficience des glandes endocrines.

Pour récalcifier et réminéraliser, il faut donc procurer à l'organisme les extraits des glandes dont l'action hormostimulatrice et régulatrice assure le métabolisme des minéraux.

Or, *Opocalcium* seul remplit ces conditions essentielles et permet une minéralisation effective.

Indications. — Prétuberculose, tuberculose, neurasthénie, surmenage, débilité, croissance, phosphaturie, convalescence, lymphatisme, rachitisme, fractures, carie dentaire, grossesse, allaitement.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 cachets, 6 comprimés. 3 cuillerées à dessert de granulé, 2 à 3 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés, 3 cuillerées à café de granulé, 2 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 5 ans : 2 cuil. à café de granulé, 1 cuiller-mesure de poudre.

Opocalcium arsénié (avec méthylarsinate désodique) une seule forme : cachets.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 18 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

Opocalcium gaïacolé (avec sulfo-gaïacolate de potasse), antisepsie pulmonaire et réminéralisation associées.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

Opoferrine (avec fer organique).

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour.
Enfants : 2 à 4 comprimés par jour.

Laboratoire de L'OPOCALCIUM
Ranson, Docteur en Pharmacie
121, avenue Gambetta — PARIS (XXe)

OPOCALCIUM IRRADIÉ DU Dr GUERSANT

Composition :

Ergostérine activée par les Rayons Ultra-Violets (Vitamine D), associée au Complexe endocrino-minéral de l'Opocalcium.

Formes :

Cachets, Comprimés, Granulée.

Propriétés thérapeutiques :

L'*Opocalcium irradié* ajoute aux principes de *Réminéralisation générale* les *propriétés centuplées* de l'huile de foie de morue.

Indications :

Rachitisme, Croissance, Carence, Ossification, Dentition, Lymphatisme, Dénutrition, Prétuberculose, Tuberculose, Débilité, Asthénie, Surmenage, Phosphaturie, Infections, Fractures, Grossesse, Allaitement, Anémie, Convalescence.

Doses journalières & mode d'emploi :

Cachets : *Adultes :* 3.
Comprimés : *Adultes :* 6.
Granulés : *Adultes :*
3 cuillerées mesures à dessert.
Granulés : *Enfants :* jusqu'à 10 ans :
3 cuillerées mesures à café.
Granulés : *Enfants :* jusqu'à 5 ans :
2 cuillerées mesures à café.

Littérature et échantillons :

Laboratoires de l'Opolcacium

A. RANSON, docteur en Pharmacie,
121, avenue Gambetta, — PARIS (XXe)

OPOCHOL

Composition :

Oléate de soude, Bile dépigmentée et décholestérinée, Extrait total hépatique, Extrait de Boldo, Extrait de Kinkélibah.

Forme Pharmaceutique :

Pilules glutinisées.

Indications thérapeutiques majeures

Affections Hépatico-biliaires. — Hépatites, Cirrhoses. Petite insuffisance hépatique, Cholémie simple familiale de Gilbert et Lereboullet, Lithiase biliaire, Angiocholite, Coliques vésiculaires, Cholécystites médicales, Ictères.

Affections Intestinales. — Constipation par insuffisance de chasse biliaire. Entéro-côlite muco-membraneuse.

Indications thérapeutiques secondaires :

Maladies de la Nutrition. — Diabète par hypohépatie, Goutte, Obésité, Arthritisme, Hépatisme de Roger Glénard, États hyperchol estérinémiques.

Affections de l'appareil Circulatoire avec participation du Foie. — Foie cardiaque, Syndrome d'hypertension portale, Varices et Hémorrhoïdes des hépatiques, hémophilie, certaines Anémies.

Infections. Intoxications.

Neuro-psychiatrie. — Psychasthénie avec signes hépatiques, Mélancolie anxieuse présénile, dépression avec troubles hépatiques.

Mode d'emploi :

A. *En période de crise.* — 4 pilules par 24 heures, 2 pilules au moment des repas de midi et du soir.

B. *Dans l'intervalle des crises.* — 2 pilules par 24 heures une pilule à midi et une autre le soir aux repas.

Incompatibilités :

Aucune incompatibilité.

Prescrire :

Opochol : Pilules, 1 flacon.

LABORATOIRE DE MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe, Beauvais (Oise)

Échantillons et littérature à la disposition de MM. les Docteurs

OPONUCLYL TROUETTE-PERRET en Sphérules

Médication synergique organo-minérale

Composition. — Lipoïdes médullaires et spléniques, orchitine, hémoglobine, acide nucléinique, cinnamate de manganèse et de fer.

Indications. — Anémie, Chlorose, convalescence, croissance, surmenage, neurasthénie, lymphatisme, tuberculose.

Dose. Adultes : 2 sphérules à chaque repas.
Enfants : 1 sphérule à chaque repas.
Littérature et Echantillons.

Laboratoires TROUETTE-PERRET
15, Rue des Immeubles Industriels.
PARIS (XI^e^)

OPOPEPTOL

Suc gastrique physioloque total, inaltérable, incolore et sans goût, se prenant par gouttes, dans l'eau ou dans une boisson peu alcoolisée.

Digestif puissant, spécifique dans l'hyposécrétion et l'atonie gastrique.

Prix au public du flacon (contenant 50 doses) 18 francs.

Produits CARLO ERBA
G. Hugues Pharmacien.
105, Boulevard Malesherbes (passage)
Paris (VIII^e^).

OPOSYNERGINES

SYNERGIES ENDOCRINO-MINÉRALES

Complexes d'Autacoïdes endocriniens et de sels minéraux biotiques

Composition. — Ensemble rationnel d'autacoïdes hormoniques des glandes à sécrétions interne et d'organes régularisant la morphogénèse, associés à un complexe de substances organo-minérales sensibilisées, à **orientation vital** selon l'expression même d'Albert Robin, le **fluor**, le **calcium**, le **magnésium** le **phosphore** isolés de la partie interne de l'écaille d'huître, le **fer**, le **manganèse**, le **vanadium**, sous forme d'**alginoïdes** extraits du **cytoplasma** de certaines variétés d'algues marines.

Forme pharmaceutique. — Comprimés drageifiés se dissolvant dans l'intestin.

Deux formules :

1° Formule M destinée au sexe masculin à base d'autacoïdes de la glande interstitielle du porc cryptorchide.

2° Formule F destinée au sexe féminin, renferme l'ensemble des sécrétions internes de l'ovaire et des glandes mammaires. Cet ensemble déclanche le **stimulus** régulateur du métabolisme chez la femme.

Indications. — *Enfants*: **Troubles de la croissance,** dystrophie infantile. Enfants retardés dès leur naissance, soit au point de vue du poids, de la parole, de l'état mental. Rachitisme, chlorose de la puberté, etc.

Adultes: **Atrophie polyglandulaire.** Tous états d'asthénie, impuissance, puériliesme mental ma-

ladie de Dercum, certaines migraines par insuffisance thyroïdienne. Consolidation des fractures **sénilité précoce,** etc.

Vieillards : Séquelles de la veillesses, frilosité ostéomalacie, **cancer.**

Dans ce dernier cas, l'emploi des **Oposynergines** est justifié par les travaux de **Rohdenburg, Bulloch** et **Johnston**. Des auteurs ont démontré que l'ablation de la thyroïde, du thymus, des testicules, augmente la réceptivité au cancer.

Chez les sujets immunisés, cette ablation tend à diminuer l'immunité, tandis que l'administration des sécrétions internes de ces glandes tend au contraire à renforcer cette immunité.

Dose et mode d'emploi des Oposynergines.

Enfants: de 1 à 5 ans, 1/2 à 2 comprimés par jour écrasés dans un peu de lait; de 5 à 15 ans, 2 à 6 comprimés par jour.

Adultes et Vieillards: 4 à 8 comprimés par jour, et selon l'avis du médecin.

Nota. — L'action des Oposynergines est lente, mais certaine. Dans certains cas que seul le médecin pourra déterminer, il y aura lieu de poursuivre le traitement pendant des mois et même des années, avec des périodes de repos de 10 jours par mois.

Laboratoires G. CHAMAGNE

docteur en pharmacie

Lauréat de l'Académie de Médecine

24, rue Damesme — PARIS (XIII^e)

OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE

— Dr FRAYSSE —

THYRODOSE. — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant, ovaire 0,10, thyroïde 0,025

Doses. — *Adultes :* 2 à 3 pastilles par jour.

Indications. — Insuffisances thyroïdienne et ovarienne. — Troubles de la croissance, de la puberté et de la ménopause. — Obésité, etc.

NEURODOSE. — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant, orchitine 0,20, substance grise 0,10.

Doses. — *Adultes :* 4 pastilles par jour.

Indications. — Epuisement nerveux sous toutes ses formes. — Impuissance sexuelle surmenage. — Infantilisme etc.

PLACENTODOSE. — Granulés chocolatés de Placenta et de mammaire.

Doses. — 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Flaccidite utérine. — Métrorrhagies. — Insuffisance lactée. — Flaccidité et atrophie des seins. — Métrite. — Tumeurs. — Fibromes, etc.

SPLENODOSE. — Granulés chocolatés de Rate. — Foie. — Thyroïde. — Hémoglobine oss ine.

Doses. — 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Tuberculose. — Maladies du Foie et de la Rate. — Chlorose. — Anémie. — Maladies infectieuses. — Paludisme, etc.

LABORATOIRE DU Dr FRAYSSE

47, rue de Neuilly, Nanterre (Seine). — Tél. 288

Notices et échantillons sur demande

OPOTHÉRAPIE BOUTY

Extraits totaux d'organes frais desséchés dans un vide profond vers 0° et présentés en comprimés dragéifiés à froid permettant une conservation indéfinie.

Thyroïdine Bouty	0 gr. 10 de corps thyroïde desséché par dragée.	Obésité. Myxœdème.
Ovigénine Bouty	0 gr. 12 d'ovaires desséchés par dragée.	Ménopause naturelle ou artificielle.
Sequardine Bouty	0 gr. 10 de testicule desséché par dragée.	Insuffisance organique.
Hépatine Bouty	0 gr. 30 de foie desséché par dragée.	Cirrhose, Ictère. Diabète.
Surrénaline Bouty	0 gr. 10 de capsules surrénales desséchées par dragée.	Basedowisme, Addisonnisme.
Néphrine Bouty	0 gr. 15 de rein desséché par dragée.	Néphrite.

ASSOCIATIONS PLURIGLANDULAIRES

Triglandine Bouty	Chaque dragée contient : corps thyroïde desséché.... 0 gr. 08 Hypophyse 0 gr. 05 Ovaires.... 0 gr. 10	Sexe féminin.
Triglandol Bouty	Chaque dragée contient : corps thyroïde desséché.... 0 gr. 08 Hypophyse desséché. 0 gr. 05 Testicule desséché. 0 gr. 10	Sexe masculin.

Tous les produits opothérapiques ci-dessus sont également présentés en ampoules de 1 cc. et de 3 cc.

Biliol Bouty	Extrait concentré de bile de porc en capsules kératinisées.	Ictère, lithiase biliaire, etc.
Gastrozymase Bouty	Comprimés effervescents du suc gastrique de porc.	Dyspepsie, embarras gastrique.
Liqueur à la thyroïdine	Indication infantile 1 cuillerée à café = 0 gr. 02 de thyroïde desséché.	Myxœdème.

Laboratoires BOUTY
3, rue de Dunkerque — PARIS
Téléph. : Nord 51-64.

OPOTHÉRAPIE BYLA

Nouvelles présentations brevetées

SANS ODEUR, CONSERVATION INDÉFINIE, CONSTANCE D'ACTIVITÉ

1° **Comprimés-Cachets « OPO »** contenant dans le même pain azyme, deux **comprimés** concentriques renfermant, l'un le substratum cellulaire sec, l'autre le lipoïde correspondant.

Désagrégation immédiate dans le liquide stomacal.

Conservation indéfinie, grâce à la suppression des actions lipasiques de contact.

Prescrire : OPO-OVARINE-BYLA, etc.

2° **les « EXOS » BYLA,** sucs totaux **inaltérables,** préparés par exolyse des organes frais, et ar. matisés.

Prescrire : EXO-THYROÏDINE BYLA, etc.

3° **les GLANDULES BYLA** (comprimés dragéifiés), enrobés de sucre, afin d'empêcher l'action de l'air sur le principe actif et d'éviter **toute odeur.** *Conservation indéfinie.*

Prescrire : GLANDULES DE SURRÉNINE BYLA, etc...

4° **les AMPOULES BYLA :** préparées à partir des ORGANES FRAIS ; amenées à un état voisin de l'isotonie et présentées en ampoules de 2 cc. correspondant à 0 gr. 25 d'organe frais.

Prescrire : AMPOULES D'HÉPATINE BYLA, etc.

Pour les doses massives : AMPOULES " ISO " BYLA de 2 cc. correspondant à 1 gr. d'organe frais par cc.

Prescrire AMPOULES ISO Rein BYLA, etc...

Opothérapie simple, pluriglandulaire et panglandulaire

Les Établissements BYLA,

26, avenue de l'Observatoire. — PARIS (XIV[e])

R. C. Seine 7189[1]

OPOTHÉRAPIE CHOAY

1° Opothérapie simple.

Extraits totaux Choay.

Obtenus en desséchant, dans le vide profond et vers 0°, les organes soigneusement récoltés et traités sans retard. Préparés à l'abri de l'air, de la chaleur et de l'autolyse, ils équivalent aux organes frais. (Voir E. *Choay. Des Extraits opothérapiques*, 1911, Vigot, édit.)

Formes pharmaceutiques. — *Cachets* ou mieux *Comprimés*, friables, présentés en tubes hermétiques.

Ampoules : Solutions aqueuses stérilisées, délipoïdées, déprotéinées, contenant les principes thermostables et hydrosolubles des extraits correspondants.

Doses. — En moyenne 4 à 6 cachets ou comprimés par jour; 1 ampoule tous les 2 jours.

Nomenclature des principaux extraits simples. — Bile, corps jaune, foie, hypophyse (glande totale ou lobe postérieur seul), glande mammaire, mœlle osseuse, ovaire, pancréas, parathyroïde, placenta, rate, surrénale, (glande totale ou substance corticale), testicule, thyroïde.

2° Opothérapie associée,

Syncrines Choay.

Extraits opothérapiques totaux associés en formules correspondant aux principaux syndromes d'insuffisance plurigland.laire.

Formes pharmaceutiques. — *Cachets* ou mieux *Comprimés*, friables, présentés en tubes hermétiques.

Ampoules de 1 cc. contenant, en solution aqueuse, stérilisée, délipoïdée, déprotéinée, les principes thermostables et hydrosolubles de 10 cgr. du mélange correspondant.

Doses. — En moyenne 2 ou 3 cachets ou comprimés par jour; 1 ampoule tous les 2 jours.

Nomenclature des principales Syncrines. — N° 1. Plurigландulaire. — N° 2. Surréno-hypophysaire. — N° 3. Thyro-Surréno-Hypophysaire. — N° 4. Thyro-Ovarienne. — N° 4 *bis*. Surréno-Ovarienne — N° 5. Thyro-Orchitique. — N° 5 *bis*. Surréno-Orchitique. — N° 6. Hypophyso-Orchitique. — N° 6 *bis*. Hypophyso-Ovarienne. — N° 7. Thyro-Hypophyso-Ovarienne. — N° 8. Peptosthénine (glandes digestives). — N° 10. Placento-Mammaire. — N° 12. Spléno-Médullaire.

Laboratoire CHOAY

48, rue Théophile-Gautier — PARIS (XVI°)

Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10

OPOTHÉRAPIE FOURNIER

Extraits totaux préparés à froid dans le vide.

Endocrisines. — Tous organes : Thyroïde, ovaire, hypophyse, glande mammaire, surrénale, foie, reins, thymus, testicule, pancréas, placenta, etc.

Forme. — 1° *Cachets et comprimés.*

Doses usuelles toutes préparées. — Thyroïde, 0,025 mgr., 0,10 cgr. ; ovaire, 0,10 cgr. ; orchitine, 0,20 cgr; surrénale, 0,10 cgr. ; hypophyse, 0,10 cgr. ; foie, 0,50 cgr. ; reins, 0,25 cgr.

Cachets pluri-glandulaires

M, sexe masculin.
F, sexe féminin.
Troubles de croissance, infantilisme, arriération.

2° *Ampoules :*

Thyroïde. Ovaire. Surrénale. Hypophyse. Orchitine. Rate. — Association hypo-surrénale. Asthme. — Hypophyse lobe-postérieur, usage obstétrical.

Formuler : Endocrisines-glande injectable Fournier.

Laboratoires FOURNIER Frères
26, Boulevard de l'Hôpital — PARIS

OPOTHÉRAPIE MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo, 49
BOULOGNE-PARIS

Sous forme de Sphérulines, pilules inaltérables et toujours solubles, grâce à leur enrobage spécial. A tous extraits totaux d'organes, préparés aseptiquement, à froid, dans le vide.

Mode d'emploi. — 1 à 6 par jour, sauf Hépatiques et Rénales, jusqu'à seize par jour.

SPHÉRULINES SYNERGIQUES MONCOUR

(Thyro-ovariennes, Thyro-orchitiques, Hypophyso-ovariennes, Surréno-ovariennes, etc...)

Sur demande, toutes associations pluriglandulaires spéciales en **SPHÉRULINES.**

NÉO-SPHÉRULINES MONCOUR

Préparées fraîches, sur demande du médecin. Les préparations sont datées. Renseignements sur demande.

MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo, 49
BOULOGNE-PARIS

OPOTHÉRAPIE U. T. A.

Cholédol (pilules).

Pilules hépatiques. Tous les éléments de la Bile.
Lithiase biliaire, Acholie, Constipation chronique, Entérocolite m. m.

Néothyrol (comprimés-extrait fluide).

Extrait de glandes thyroïdes de moutons.
Myxœdème, Obésité, Infantilisme, Troubles menstruels.

Néovarine (comprimés).

Extraits d'ovaires d'animaux jeunes. Castration, Insuffisance ovarienne, Ménopause, Obésité féminine.

Biocalcine (granulé).

Sels minéraux et extraits de surrénales, glandes parathyroïdes, thymus.
Grossesse, Convalescence des maladies, Rachitisme, Tuberculose, Neurasthénie.

Antiphlébine (Comprimés).

Extrait de surrenales, corps thyroïde, hypophyse, Marron d'Inde, Hamamelis, Hydrastis.
Varices, Hémorroïdes, Troubles de la ménopause.

Phoscadol (sirop).

Association des médications phosphoriques, calcique et magnésienne.
Dyspepsie hypoacide. Migraines. Etats rhumatoïdes. Myalgies.

Diplovaccin (ampoules).

Émulsion de gonocoques cultivés sur milieux à base d'albumine humaine.
Blennorragie, aiguë et chronique, Catarrhe utérin ou vaginal, gonococcis à foyers fermés, etc.

Staphylovaccin.

Emulsion de staphylocoques polyvalents.
Furoncles, Anthrax, Impétigo, Sycosis, Infections staphylococciques.

Établissements P. THIWISSEN

13, rue Sainte-Véronique — LIÉGE

OPOTHÉRAPIQUES "MEURICE"

Ovarine. — Aménorrhée, ménopause, dysménorrhée, troubles d'origine ovarienne.

Ovaridine. — Association pluri-glandulaire (ovaro-thyroïdine).

Indications : Insuffisances endocrines, aménorrhées de ménopause ou de puberté, sclérodermie, rhumatisme chronique et troubles circulatoires relevant de la ménopause, suites d'ovariotomie.

Thyroïdine. — Croissance, myxœdèmes infantile et de l'adulte, obésité, insuffisance thyroïdienne.

Union Chimique Belge, S. A.

Division : Produits pharmaceutiques "Meurice"

68, Rue Berkendæl — BRUXELLES (Belgique).

OPOTHÉRAPIQUES PELLISSIER

Leur doctrine : Clarté, Simplicité, Loyauté.

Le procédé Pellissier utilisé pour la fabrication des produits opothérapiques est breveté. Il a fait l'objet de communications à l'Académie des Sciences le 21 mars 1921, à l'Académie de Médecine le 15 mai 1923, à la Société de Pathologie Comparée le 11 novembre 1924.

Les appareils de fabrication sont les plus puissants qui existent dans le monde et les poudres d'organes qu'ils permettent d'obtenir, sans aucun dégraissage, sont d'une activité incomparable, d'ailleurs reconnue et de conservation indéfinie.

Deux formes pharmaceutiques :

Pour les *adultes*, le cachet et le suppositoire (Opositoire).

Pour les *jeunes enfants*, le suppositoire (Opositoire).

Exemple de prescription pour les adultes :

Ovaire Pellissier, cachets à 0,25 cgr., 1 boite.

Glande mammaire Pellissier, cachets à 0,50 cgr., 1 boite.

Pancréas Pellissier, cachets à 0,25 cgr., 1 boite, etc...

Opositoires Pellissier de Prostate, à 0,25 cgr., 1 boite.

Opositoires Pellissier d'ovaire, à 0,25 cgr., 1 boite, etc...

Exemple de prescription pour les enfants :

Opositoires Pellissier de thyroïde, 1 milligr., 1 boite.

Opositoires Pellissier d'hypophyse, à 0,05 cgr., 1 boite.

Opositoires Pellissier de surrénale, à 0,05 cgr., 1 boite.

Opositoires Pellissier de thymus, à 0,25 cgr., 1 bo te, etc...

Organe scientifique bi-mensuel, *les Consultations opothérapiques*.

Les demander, par simple carte, pour en obtenir service régulier.

Les **Laboratoires PELLISSIER** ont introduit également dans la thérapeutique :

Les Comprimés de Silicate de soude Pellissier, à 0,25 cgr.

Les Ampoules de Silicate de soude Pellissier, pour l'injection intra veineuse, *pour le traitement de l'artériosclérose*, Communication à l'Académie des Sciences (17 août 1920).

Laboratoires PELLISSIER
33, avenue de Villiers — PARIS (XVII^e^)
Téléphone : Wagram 14-59
Usine, 18, Grande-Rue, à Asnières (Seine).

OPOTONINE

Composition. — Solution stable d'un composé quinléique iodé associé au Thymus.
Mode d'action. — Dissociation lente et régulière du composé odé lais sant le malade sous l'influence continue de l'iode.
Action de l'iode portée au maximum par la présence du Thymus qui joue le rôle de catalyseur.
Excite la mononucléose, favorise la défense de l'organisme, agit sur la croissance, influe heureusement sur le métabolisme, abaisse la tension artérielle.
Indications. — Lymphatisme, anémies, rachitisme déalcification dentaire emphysème, bronchites chroniques, artério-sclérose, hypertensoin artérielle, rhumatisme chronique.
Formes. — OPOTONINE CONCENTRÉE. OPOTONINE SIROP.
Mode d'emploi. — *Adultes* : OPOTONINE CONCENTRÉE, une demi-cuillerée à café 3 fois par jour, avant chacun des repas dans un peu d'eau.
OPOTONINE SIROP, 2 cuillerées à soupe par jour.
Enfants : OPOTONINE CONCENTRÉE. XX à LX gouttes avant chacun de deux principaux repas dans un peu d'eau.
OPOTONINE SIROP, 1 à 2 cuillerées à café par jour.

LABORATOIRES COUSSINET
20, rue des Martyrs, Paris (IXe)

OPOZONES LUMIÈRE

Constitution. — Préparations opothérapiques, à base de glandes fraîches, obtenues par un procédé, entièrement nouveau, présenté par MM. A. Lumière et Chevrotier, à la Société de Thérapeutique de Paris (23 octobre 1912), fondé sur les propriétés absorbantes de certains sels inertes. Ces préparations renferment intacts tous les éléments chimiques et biologiques de la glande. Ils sont glutinisés et dragéifiés, ce qui facilite leur conservation et permet d'éviter l'action trop hâtive des sucs digestifs.

Les Laboratoires Lumière préparent des Opozones à base de tous organes. Chaque Opozone correspond à son poids de glande fraîche (0 gr. 20).

Produits spéciaux des
Laboratoires A. LUMIÈRE

M. SESTIER, Pharmacien
9, Cours de la Liberté — LYON

ORARGOL AMICROS

Anti-Infectieux Général

ORARGOL INJECTABLE (0,05 %) AMPOULES

Boite de 6 amp. 5 cc. Tube de 1 amp. 10 cc.

Septicémies, Grippe, Fièvres, Traitement pré et post opératoire.

Posologie. — 5 à 20 cc. intramusculaire ou intraveineux tous les jours ou tous les deux jours. Chez les enfants, 1 cc. par année d'âge. En injection dès le début d'une infection seul ou combiné à la vaccinothérapie ou à la sérothérapie.

ORARGOL NON INJECTABLE (0,1 %) GOUTTES

Flacon de 60 grammes avec compte-gouttes

Grippe, Fièvres, Thérapeutique Infantile.

Posologie. — 20 à 100 gouttes par jour en plusieurs fois dans une boisson quelconque. Ces doses peuvent être doublées si cela est nécessaire, sans inconvénient.

ORARGOL O. R. L. — Flacon de 20 grammes avec compte-gouttes et instillateur nasal.

Instillations nasales : 4 à 5 gouttes dans chaque narine à l'aide de l'instillateur Amicros ou du Pulvargol.

Gargarismes : 10 à 15 gouttes dans une tasse d'eau chaude deux fois par jour.

Collyres.

Laboratoire des Produits AMICROS

5, Rue Clauzel — PARIS (IXe)

Tél. : Trudaine 00-47.

OREXYL

Spécifique des maladies de la nutrition et le plus actif des reconstituants.

Composition :

Persulfates alcalins, métavanadate de soude, florure de sodium, tannate d'orexine, glycéro-phosphate de chaux.

Formes. — Granulé et comprimés.

Indications :

L'Orexyl est indiqué dans tous les cas où il s'agit *d'augmenter la nutrition* et de *relever l'état général de l'organisme* : *Inappétence, Neurasthénie, Anémie, Asthénie, Grossesse, Convalescence, Bacillose pulmonaire, Surmenages, physique ou intellectuel. Fractures.*

Contre-indications. — Le diabète sucré et l'état fébrile.

Posologie :

Enfants : Une cuillerée à café de *granulé* dans un peu d'eau, 20 minutes avant les deux principaux repas, ou un *comprimé*. — *Adultes* : Une cuillerée à soupe de *granulé*, ou deux *comprimés* dissous dans un peu d'eau chaude *sucrée*, avant chaque repas.

Prix : La boîte, *Granulé* : 13 fr. *Comprimés* : 15 fr.

Préparé par M. LOUISGRAND,
pharmacien de 1re classe
186, rue Nationale — VILLEFRANCHE (Rhône).
Échantillons et vente en gros :
F. CARTIER, 1, rue de la Martinière — LYON

ORIPHOL

Indications. — Médication tonique type. Stimulant parfait de la nutrition. Reminéralisateur physiologique. Action rapide et durable.

Composition. — Acide nucléinique, méthylarsinate, Glycerophosphates, kola.

Forme. — Comprimés de saveur agréable.

Mode d'emploi. — Adultes : 4 comprimés par jour, 2 à chaque repas.

Adolescents : 2 à 3 comprimés par jour, suivant l'âge.

Enfants : 1 à 2 comprimés par jour, suivant l'âge.

A. MILLET & Ch.O. GUILLAUMIN
8, rue Richer PARIS

ORTHO-GASTRINE

Formule :

Sulfate de Soude anhydre.....	0 gr. 25
Phosphate de Soude anyhdre.....	0 gr. 25
Bicarbonate de Soude.....	0 gr. 10
CITRATE de Soude.....	0 gr. 10
Pour 1 paquet N° 30	

Avantages. — Sels purs et anhydres, absolument conformes au Codex. Chaque prise donne un verre à Bordeaux de solution limpide et facile à boire même pour les enfants, toujours stable comme goût et compositi n.

Indications. — Toutes celles de la solution alcalino-sodique dite de Bourget. Insuffisance sécrétoire du foie et de la vésicule biliaire. Dyspepsie. Gastralgie. Hyperchlorhydrie. Entérite. Intoxication alimentaire, etc.

Posologie. — Adultes : 2 à 4 paquets par jour.
Enfants (sucrer légèrement) de 6 mois à un an 1/2 à 1 paquet par jour dans le lait et les bouillies.
De 1 an à 3 ans, 1 paquet par jour

Laboratoire A. LEBLOND

Pharmacien de 1re Classe,
Ex-interne des Hôpitaux de Paris
51, rue Gay-Lussac — Paris (Ve)
R. C. Seine 56046

OSMO-VACCINS P. L.

Vaccins concentrés et isotoniques
en ampoules de 10 cc.

pour pansements locaux ou par voie buccale

(non injectables par voie hypodermique).

Osmo-Vaccins P. L. Gynécologiques. — Traitement des métrites, salpingites, vaginites, etc.
(Par tampons, mèches, injections intra-cervicales, etc.)

Osmo-Vaccins P. L. Gonococciques. — Traitement des affections à gonocoques chez l'homme : uréthrites, blennorragies, cystites gonococciques, prostatites, etc.
(Par injections uréthrales.)

Osmo-Vaccins P. L. Colibacilles. — Pour la plupart des infections intestinales (colites, entéro-colites), et dans les cystites, néphrites, tout particulièrement les pyo-néphrites infantiles, et dans tous les cas de syndrome entéro-rénal.
(Par voie buccale-lavages-lavements.)

Osmo-Vaccins P. L. Staphylococciques. — Pour le traitement des affections à staphylocoques : furonculose, anthrax, acné, etc.
(Par pansements et par voie buccale.)

Laboratoires BRÉANT

4, rue de Clichy (Trinité) — PARIS

R. C. Seine 381-205 Tél. : Central 71-83.

OSTELINE

Composition :

Partie insaponifiable de l'huile de foie de morue en comprimés et en gouttes, dissoute dans de l'huile d'olive anisée.

Quatre gouttes ou un comprimé correspondent à une cuiller à café d'huile de foie de morue de qualité parfaite.

Contrôle :

Chaque flacon d'Osteline est l'objet d'un contrôle physiologique rigoureux qui confère au produit une efficacité constante (voir litt.).

Indications :

Toujours parfaitement digérée, dépourvue d'odeur ou de saveur désagréable, extrêmement active à faibles doses, l'Osteline a les indications suivantes :

Déminéralisations de toutes natures (décalcification des tuberculeux, des femmes enceintes, de l'allaitement, décalcifications dentaires), *Troubles de la croissance*, *États* liés à un *métabolisme calcique défectueux* (spasmophilie, laryngospasme, hyperexcitabilité nerveuse), *Asthénies*, *Rachitisme*, *Acidose*, *Putréfactions intestinales* (L'Osteline rend aux fèces, lorsqu'elles sont alcalines ou hypoacides, leur acidité normale et s'oppose à la *constipation* en stimulant sans irritation ni accoutumance le péristaltisme intestinal).

Mode d'emploi :

Nourrissons, jeunes enfants : IV gouttes deux à trois fois par jour ou plus, dans du lait ou du jus d'orange.

Adultes et grands enfants : 3 à 6 comprimés par jour (avaler sans croquer).

Aucune contre-indication.

Littérature et échantillons

Laboratoires GLAXO

11, rue Bergère, Paris.

Téléphone Provence 29-98. R. C. Seine 210-361 B.

OUABAÏNE ARNAUD

Principe actif du Strophantus Gratus isolé par le procédé particulier du professeur Arnaud

Cardio-tonique énergique, Diurétique puissant.

Formes.

Solubaïne (voir à ce nom), Solution au 1/1000 d'Ouabaïne Arnaud.
Solution à QUATRE pour mille.
Comprimés au 1/4 de mmgr.

Ampoules de 1 cc. au 1/4 de mmgr., p. injections intraveineuses.

Ampoules de 2 cc. au 1/2 mmgr., p. injections intramusculaires.

Indications :

Insuffisance du ventricule gauche : des Aortiques, des Cardio-rénaux, des Hypertendus, avec ou sans artério-sclérose.

Insuffisance du ventricule droit : Lésions mitrales ou tricuspidiennes, Péricardites et symphyses du péricarde, Emphysème, Asthme, Myocardites d'origine infectieuse.

Bien spécifier sur l'ordonnance
« OUABAÏNE ARNAUD »

Echantillons et Littérature :

Laboratoire NATIVELLE
49, boulevard de Port-Royal, 9e

OUATAPLASME

du Dr Ed. LANGLEBERT

Pansement humide complet
Instantané, aseptique émollient

Indications. — Furoncles, Anthrax, Abcès, Brûlures, Eczéma, Plébites, Coliques. Plaies contuses.

Mode d'emploi. — Se prépare instantanément par simple immersion dans l'eau bouillie, chaude ou froide. Il peut être arrosé de substances médicamenteuses (Liqueur de Labarraque, Eau d'Alibour, Laudanum, etc.). Conserve son humidité pendant 24 heures.

Peut facilement se **sinapiser** en étendant à sa surface une couche de farine de moutarde qu'on aura au préalable délayée dans un peu d'eau froide ; ainsi préparé, il est le cataplasme sinapisé idéal.

Établissement SABATIER
10, rue Pierre-Ducreux — PARIS (XVIe)

OVULES IVULA PEARSON

Composition. — Ces ovules sont constitués par une mince enveloppe glyco-gélatineuse, à fusion rapide à 37°, qui contient à l'*état liquide* l'excipient des principes actifs « *Créoline et Camphre* ». Cet excipient donne avec les sécrétions une émulsion très fine qui assure une pénétration profonde.

Indications. — Traitement de toutes les affections gynécologiques et en particulier de celles relevant du gonocoque.

Présentation. — Boîte de 12 ovules.

Prescrire. — Un ou deux ovules à la fois par jour (ovule Ivula Pearson). (Pour les injections utiliser la « Douche Ivula Pearson », *produit liquide* antiseptique. 1 cuillerée à café par litre d'eau.)

LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES
WILLIAM PEARSON
5, rue Clauzel, Paris.

OVULES " ROCHE "

au Thigénol à 30 %

(Voir également page " Thigénol ")

Prop. thér. — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants et puissamment résolutifs. On constate au bout de quelques jours du traitement par les *Ovules " Roche "* la sédation parfaite des douleurs, et après quelque temps, l'arrêt complet des pertes. De même, les ulcérations rétrocèdent rapidement et le volume des organes hypertrophiés diminue dans des proportions notables, ce qui permet de retarder, sinon d'éviter une intervention chirurgicale.

Indic. thér. — Vaginite, Vulvovaginites, Métrites, Paramétrites, Gonorrhée, Leucorrhée, Métrorrhée, etc., etc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie

21, place des Vosges — PARIS

OVOMALTINE

Composition. — Matières protéiques 14,2%. Maltose 62,8 %. Dextrines 7.8 %. Corps gras 8,2 %. Cendres 3,7 %. Phosphose organique 1,18 %. H^4O2, 12 %. Diastases.

Forme. — Poudre irrégulière.

Indications. *Aliment de force* pour tout organisme affaibli par le surmenage, la maladie et la vieillesse. *Aliment remède et de régime* dans les affections gastro-intestinales. *Galactagogue* préparant et facilitant l'allaitement.

Doses. — *Enfants-Adultes:* 2 à 3 cuillerées, à café par tasse de lait, de lait coupé d'eau, de thé, de café, etc.

Préparer sans cuisson.

Ne convient pas aux nourrissons.

Etablissements WANDER

58, rue de Charonne — PARIS (XIe)

OXYDOTHYRINE PÂRIS

Composition. — La totalité des principes actifs de la glande Thyroïde privée de toxine par un procédé spécial. Est sans action sur le cœur.

Indications. — Embonpoint. Obésité. Fibrome, Goître et tous les états dus à l'insuffisance Thyroïdienne.

Forme. — Dragées renfermant 0 gr. 10 de substance active.

Posologie. — 1 à 2 dragées par 24 heures prises de préférence le matin à jeun.

Laboratoires Biologiques
André PÂRIS
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e)

OXYDOVARINE PÂRIS

Composition. — Tous les principes actifs de l'ovaire. Corps jaune et cellules interstitielles.

Forme. — Dragées dosées à 0 gr. 10 de substance ovarique totale.

Indications. — Troubles de la menstruation. Retentissements pathologiques de l'ovariotomie. Irrégularités. Insuffisance. Douleurs périodiques, accidents de la ménopause, etc.

Laboratoires Biologiques
André PÂRIS
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e)

OXYDROL

Eau oxygénée solidifiée.

omposition et propriétés. — Combinaison cristallisée d'eau oxygénée avec la carbamide. [CO (NH²)²H²O²].

Poudre blanche, inodore ne contenant aucune trace de sels ni d'acides mineraux, très soluble dans l'eau.

Teneur en eau oxygénée 35 %. Sa solution à 10 % correspond à l'eau oxygénée 11 volumes.

Permet de préparer à chaque instant et partout une solution d'eau oxygénée fraîche, en quantité voulue et d'une concentration bien déterminée.

L'action de l'oxydrol en solution est exactement celle de l'eau oxygénée. Désinfectant de premier ordre n'exerçant aucune action nocive ni toxique sur les tissus organiques soumis à son action.

Usage. — Pharmacie, médecine et chirurgie. Il nettoie à fond les plaies tout en les ménageant et possède en outre des propriétés désodorantes et hémostatiques.

Mode d'emploi. — Pour préparer une solution correspondante à l'eau oxygénée 11 volumes, dissoudre une partie d'oxydrol dans dix parties d'eau. Diluer selon les besoins.

POINTET & GIRARD
30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS

OXYGÉNASE

Composition. — Extrait vitaminique, spécialement préparé à partir de levures sélectionnées et hyper-actives, sensibilisé par un catalyseur, le manganèse. L'addition d'une substance-tampon appropriée, permet la tolérance parfaite.

Indications. — Troubles digestifs : inappétence, dyspepsies, entérites, diarrhées, etc.

Troubles des fonctions du foie et des glandes à sécrétion interne.

Troubles des oxydations : arthritisme, goutte, rhumatismes, asthme, migraines, dermatoses, obésité. — Prétuberculose et Tuberculose.

Mode d'emploi. — Six dragées par jour, dans un peu d'eau, à prendre avant les repas.
Demi-dose pour les enfants.

LABORATOIRE
de PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE,
Dr PH. CHAPELLE
8, rue Vivienne, Paris.

OXYMENTHOL PERRAUDIN (tablettes)

A base d'oxygène naissant, menthol, cocastovaïne, benzoate de soude, etc.
Tablettes de goût agréable.

Doses et mode d'emploi. — Adultes, 6 à 10 par jour à sucer ; Enfants, 3 à 6 par jour à sucer.

Propr. Thér. — Anesthésiques, antiseptiques, pectorales.

Indications. — Affections des voies respiratoires et de la gorge, Toux, Grippes, Pharyngites, Bronchites, Asthme, Emphysème, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

Laboratoire des Produits Scientia
Dr E. PERRAUDIN, pharmacien,
21, rue Chaptal. — PARIS

OXYMUTH SACA

Composition :
Hydrate d'oxyde de bismuth en suspension dans l'huile d'olive pure.

Forme :
Ampoules de 2 c.c. renfermant 0 gr. 15 d'hydrate d'oxyde de bismuth (= 0 gr. 125 de bi métal actif).

Indications :
Syphilis à toutes les périodes.

Mode d'emploi :
Une ampoule tous les 2 ou 3 jours en injection intramusculaire.
Prix de la boîte de 12 ampoules : 18 fr.

Usines Chimiques du Pecq
Siège social : 11, rue Beautreillis, PARIS.

OZOBIASE

Catalyseur oxydant.

Principe actif catalyseur oxydant (Facteur O) Communication Société de biologie, 27 février 1926; Société de thérapeutique, 10 février 1926.

Indic. thérap. — Nutrition du Tuberculeux, Amaigrissements, Hypotrophie.

Forme. — Comprimés. Flacons de 60 ampoules, 1/2 flacon de 30 ampoules.

Doses. — *Adultes :* 4 comprimés par jour. 2 avant les repas du midi et du soir.

Enfants de 10 à 15 ans : 1 comprimé midi et soir; au-dessous de 10 ans : 1 comprimé le midi. Pour les petits : écraser le comprimé et en donner la moitié ou le tiers. *Avaler les comprimés. Ne pas croquer,* ceci uniquement pour éviter le goût désagréable de l'enrobage.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (S.-et-O.).

PAIN ESSENTIEL

avec ou sans chlorure.

Compos. — Le **Pain Essentiel** est préparé avec des gruaux de blé dur, riches en gluten, additionnés de protéine du lait solubilisées.

Présentation. — Chaque baguette de 10 gr., représente la valeur nutritive de 16 gr. de pain ordinaire, et renferme 6 gr. d'hydrocarbonés.

Avantages. — A été étudié pour convenir à tous les régimes. Très friable, mais oblige le malade à mastiquer ses aliments.

Indic. thérap. — Produit de haute valeur nutritive. A recommander dans tous les cas de convalescences, surmenage et alimentation difficile; aux dyspeptiques, entéritiques et diabétiques légers. Aux obèses : maximum 3 et 4 baguettes par repas.

Dans d'excellentes panades galactagogues.

Sans chlorure pour arthritiques et albuminuriques.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, Rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine).

PAIN REDEUIL

Pain de régime.

Préparé par des procédés spéciaux de fabrication, diastasé, le PAIN REDEUIL fournit à l'organisme des aliments féculents après les avoir préalablement ramenés à une forme particulièrement apte à l'assimilation.

Ne donne aucun excès de sucre, ni dans le sang, ni dans les sécrétions.

De digestion facile, il est parfaitement bien toléré par l'estomac et ne provoque pas de constipation. De goût très agréable, comparable au pain de gruau du commerce, il ne rebute pas les malades soumis au régime, comme les biscottes, les biscuits, etc.

Pain frais.

En pains de 100 grammes, se conservant une dizaine de jours, ce qui permet de l'expédier à de longues distances.

Pain de conserve.

Préparé suivant les mêmes principes que le pain frais, de conservation pratiquement illimitée.

Aliments de régime.

Pâtes alimentaires. Chocolat. Farines. Sucre EXCELSIOR

Établissements REDEUIL

7, rue Couche, PARIS (XIVe).

PAINS SPÉCIAUX HEUDEBERT

Les **Pains spéciaux Heudebert** ont été créés pour l'alimentation des malades auxquels l'usage du pain est interdit.

Pour tous régimes.

Pain essentiel avec ou sans chlorure (voir article spécial).

Dyspepsie, entérite.

Pains grillés, Longuet et Gressins.

Constipation.

Pain complet.

Obésité.

Gressins, Pain essentiel.

Diabète.

Pain de gluten (régime très sévère, 5 à 10 % d'hydrocarbonés). Pain d'aleurone (régime sévère, 15 à 20 %). Spécial diabétic (régime normal, 30 à 35 % d'hydrocarbonés).

Albuminurie, arthritisme.

Pain hypoazoté. Biscottes, longuets et gressins sans sel.
Pain des villes d'eaux.

Pain de Royat (cœur, vaisseaux). **Pain de Contrexéville** (reins, voies biliaires), **Pain de Châtel-Guyon** (constipation), **Pain de St-Nectaire** (albuminurie), **Tranches de Plombières** (estomac, intestins), **Pain de Brides** (obésité), **Pain de Vittel** (arthritisme), **Pain d'Évian** (néphrites, artériosclérose).

La haute valeur nutritive de ces pains permet de régler médicalement leur consommation.

Produit de Régime HEUDEBERT

85, rue St-Germain — NANTERRE (Seine).

Jus de raisin
PAMPRYL

Blanc et rouge.

Composition. — Pur jus de raisins frais sélectionnés, préparé à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or) par un procédé perfectionné conservant intégralement toute la saveur du raisin mûr fraîchement cueilli.

Indications. — Nutritif, Antitoxique, Alcalinisant, Diurétique.

Toutes les indications de la cure de raisin : Auto-intoxications, Entérites, Insuffisance hépatique et rénale, Urologie, Néphrites, Arthritisme, etc.

Boisson de chevet des grands malades.

Produit naturel à conseiller chaque fois que le vin est interdit.

Dose moyenne. — 3 verres à bordeaux par jour, on peut augmenter sans inconvénient.

Se trouve dans toutes les Pharmacies : bouteilles, demi-bouteilles, quarts.

Société du PAMPRYL

2, villa de la Terrasse, PARIS. Tél. : Wagram 33 00.

PANBIASE ANTIPHYMIQUE

Tuberculose sous toutes ses formes.

Seul sérum synthétique dépourvu de toute toxicité et sans contre-indication d'emploi, capable de détruire complètement par ses *lipases*, *cérases* et *protéases*, l'enveloppe cirograisseuse protectrice du B. K. et le B. K. lui-même.

Ce sérum apporte à l'organisme des *lipases* et des *cérases* analogues à un *seul* être dans la création (*la Galleria cereana* ou chenille de la cire des ruches d'abeilles) l'immunité totale à la tuberculose.

Forme. — *Adultes* : ampoules de 5 cc. *Enfants* : ampoules de 3 cc. en injection intra-musculaire profonde tous les 2 ou 3 jours.

Laboratoires VAURS

72, avenue Kléber — PARIS. Tél. : Passy 97-51.

PANBILINE

Formes. — Pilules et Solution.

Définition. — La Panbiline, Spécifique total des *Maladies du Foie* et des Affections qui en dérivent, est la seule médication agissant simultanément sur la sécrétion hépatique et sur l'excrétion biliaire.

(*Voir Rectopanbiline*).

Composition. — Elle associe synergiquement les Opothérapies Hépatique et Biliaire avec les meilleurs Cholagogues sélectionnés et réunit, en milieu glycériné : Extrait hépatique, extrait biliaire intégral, extrait de Boldo, podophyllin (traces). La Panbiline n'est ni toxique, ni irritante, et ne contient ni sucre, ni alcool.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase Biliaire (Coliques hépatiques, Ictères), Hépatisme-Arthritisme, Cholémie familiale, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose, Tuberculose et Lymphatisme justiciables de l'Huile de Foie de Morue, que la Panbiline remplace. Dyspepsies, Hyperchlorhydrie Entérite mucomembraneuse, Constipation, Appendicite, Fièvre typhoïde, Intoxications, Infections, Névroses, Troubles de la grossesse, Dermatoses par dyshépatie. Maladies des pays chauds, Congestions du foie. Hépatites et Cirrhoses (Alcool, Paludisme, Syphilis).

Doses moyennes. — 2 à 12 pilules de Panbiline par jour, ou 2 à 12 cuillerées à café de Panbiline liquide par jour, au début des repas.
Demi-dose pour les enfants.

Échantillon, Littérature

Laboratoire de la PANBILINE
ANNONAY (Ardèche)

PANCRÉANNE

Composition. — Association de poudre de pancréas, pancréatine, tanin, sous forme de comprimés.

Action thérapeutique. — Assure la digestion totale des différentes sortes d'aliments, régularise la sécrétion intestinale, excite la sécrétion interne des Ilots de Langerhans.

Indications. — Dyspepsie. — Entérites. — Insuffisances digestives. — Diabète (cure d'entretien et de remplacement de l'insuline injectable).

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés à la fin des repas.

108 et 71, faubourg Saint-Honoré, Paris

Pharmacie GRIPIKOVEN

37 et 39, Marché aux Poulets, Bruxelles

PANCRÉPATINE LALEUF

Capsules glutinisées

Composition. — Extrait spécial de *Pancréas* activé par addition de *Suc hépatique* et analgésine. Chaque capsule contient 25 centigrammes de principes actifs.

Propriétés et Indications thérapeutiques. — Opothérapie du *Diabète* par médication interne. Sous l'influence de la Pancrépatine, on remarque :

1° Abaissement de la Glycémie ;
2° Abaissement et disparition totale fréquente de la Glycosurie ;
3° Disparition de la Polyphagie et retour à un appétit normal.
4° Disparition des troubles secondaires : soif, polyurie, prurit, etc.
5° Amélioration rapide de l'état général.

Mode d'emploi et doses. — Les capsules de Pancrépatine Laleuf, doivent toujours être prises au cours des repas. De 6 à 12 capsules par 24 heures suivant prescription médicale.

Laboratoires LALEUF

20, rue du Laos — PARIS (XV^e^)

PANFÉBRINE

Médicament de la fièvre et de toutes les fièvres

Stimulant les fonctions hépatique, biligène et splénique, sans action déprimante sur le cœur

Traitement du paludisme: **Panfébrine A B**
Spécifique de toutes les pyrexies : **Panfébrine B**

1° **Panfrébrine B** (toutes fièvres)

Composition. — Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Son rôle. — Antithermique dans toutes les *pyrexies.*

Action. — 1° Apyrétique énergique chez tous les tuberculeux fébricitants.

2° Maladies infectieuses (grippe, dothiénentérie, scarlatine, etc. et phlegmasies de toutes sortes),

Posologie. — Un cachet-comprimé de Panfébrine B dès que la température est à 38° ou au-dessus (Peut être renouvelé 2 à 4 fois en 24 heures).

2° **Panfébrine AB** (Paludisme)

Composition. — Panfébrine A : Acide méthylarsénique As $\equiv$ O-CH^3 $(OH)^3$. Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.
Panfébrine B : Composition indiqué ci-dessus.

Son rôle. — Action spécifique dans le paludisme (N'occasionne jamais d'accidents quiniques).

Avantage. — Innocuité absolue.

Posologie. — Préventif 1 cachet-comprimé A le matin, 1 cachet-comprimé B le soir. — Paludisme aigu et chronique : 3 cachets-comprimés A et 3 cachets-comprimés B par jour. — Enfants : 12 ans, 2 cachets-comprimés A et 2 cachets-comprimés B par jour. De 7 à 8 ans, 1 cachet-comprimé B par jour.

(Echantillons et littérature)

Laboratoires DORANTOWICZ
17 *bis*, avenue Parmentier
PARIS (XI^e) — Tél. Roquette 14-12

PANGADUINE

Extraite directement des Foies de Morue

Contient tous les principes actifs, alcaloïdes, phosphoglycérides, lécithines, contenus dans l'**Huile de foie de Morue.**

Elle permet d'absorber sous une forme agréable et parfaitement assimilable les principes médicamenteux correspondant à une dose d'huile de foie de morue intolérable pour le malade.

Elixir de Pangaduine. — *Très agréable au goût*, contient 10 cgr. de **Pangaduine** par cuillerée à bouche. *Dose :* Un verre à liqueur avant chaque repas.

Pangaduine granulée. — Contient 10 cgr. de **Pangaduine** par cuillerée à café. *Dose :* Une cuillerée à café avant chaque repas.

Ch. SOUILLARD

2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux — PARIS

PANGASTROL

Pansements de l'Estomac.

Composition. — Kaolin, Bismuth, Belladone, Codéine, Carbonate de Chaux, Magnésie.

Forme. — Sachets de 10 grammes.

Propr. thérap. — De par sa composition, le PANGASTROL réalise le pansement gastro-intestinal le plus parfait, et soulage rapidement les douleurs les plus aiguës.

Indications. — Hyperchlorhydries, Spasmes gastriques, Ulcères, Aérophagie, Dyspepsies, Diarrhées, Fermentations.

Laboratoire STOULS

156, Avenue Victor-Hugo — PARIS.

Téléphone : Passy 68-14.

PANGESTYL NARTY

Nature et action. — Le *Pangestyl Narty* est un produit mixte qui agit : 1° Par les antiseptiques et absorbants qu'il contient, comme désinfectant remarquable du tube digestif ; 2° Par l'heureuse combinaison des ferments qui en font un digestif de tout premier ordre, d'où son nom :

PANGESTYL *(qui digère tout).*

Indications. — Dyspepsies, Hypo ou Hyperchlorhydrie, Stases gastriques, Dilatations d'estomac, Désinfection intestinale, Diarrhées, Excellent désinfectant du foie et de ses voies d'excrétion : Coliques hépatiques, Ictère ou Jaunisse. Angiocholites, Choléocystites, etc.

Formes et Mode d'emploi. — *Granulés ou Cachets.* Une cuillerée à café de granulé ou un cachet à la fin des repas ou au moment des malaises dans une infusion chaude, café, tilleul, thé, camomille, etc.

Laboratoire Georges TINARD
134, boulevard Péreire — PARIS (XVII[e])

PANGLANDINE

Description. — Capsules kératinisées de 0 gr. 25 (50 par flacon) contenant une synthèse opothérapique : thymus, ovaires, rate, duodénum, hypophyse, capsules surrénales, thyroïde, pancréas, testicules, foie, prostate, en proportions physiologiques.

Action thérapeutique. — L'insuffisance fonctionnelle d'une glande à sécrétion interne, entraînant un surcroît de travail pour les autres, la médication opothérapique doit renforcer l'action des principales glandes en suppléant celle qui est déficiente et, par conséquent, comporter un mélange synthétique.

Indications. — 4 à 8 comprimés par jour dans la sénilité, l'obésité, la neurasthénie, les retards de croissance, les troubles de la puberté, le myxœdème, l'infantilisme.

Laboratoires CH. COUTURIEUX
18, avenue Hoche — PARIS

« PANHÉMOL »

Médication spécifique la plus active des Syndromes anémiques.

Le **« Panhémol »** présente, au maximum de concentration et d'assimilabilité, *tous les éléments du sang vivant*, sauf l'eau de constitution évaporée par concentration dans le vide, à basse température.

Formes. — Sirop. — Comprimés.

Composition. — Chaque cuillerée à soupe de Sirop **« Panhémol »** contient :

Extrait hématique total obtenu par concentration dans le vide, à froid, de Sérum et globules d'animaux sélectionnés.	20 cc.
Glycérophosphate de Sodium cristallisé.	0 gr. 10
Sirop à l'extrait hydro-glycéro-alcoolique d'écorces d'oranges amères vanilliné. Q. S. P.....	15 cc.

Chaque comprimé contient :

Extrait hématique sec total obtenu par concentration dans le vide, à froid, de Sérum et globules d'animaux sélectionnés.	2 cc. 5
Glycérophosphate de Sodium cristallisé.	0 gr. 05

Aucune autre préparation ne présente, à poids égal, une telle richesse en Hémoglobine (2 gr. 50 par cuillerée à soupe de sirop) et en principes actifs totaux du Sérum et des globules.

Posologie. — *Adultes :* Une cuillerée à soupe pure ou diluée dans un peu d'eau pure ou gazeuse, immédiatement avant les repas de midi et du soir, ou 3 à 6 comprimés.

Enfants : Une ou deux cuillerées à café, suivant l'âge, avant les repas de midi et du soir, ou 1 à 3 comprimés.

Indications. — Toutes les Anémies, Convalescences, Croissances, Tuberculoses, Paludisme, Hémorragies, Rachitisme et toutes déchéances organiques.

« Panhémol » réalise au maximum de puissance et d'efficacité *l'Opothérapie séro-sanguine totale.*

Laboratoires R. BOUYSSOU et Cie
90, avenue des Ternes, Paris (XVIIe)
Téléph. : Wagram 61-42

PANLACTO MIDY

Culture pure des 3 bacilles lactiques : bacille Bulgare, bacille Bifidus, bacille Paralactique à l'état vivant et actif.

Comprimés dosés à : Bacilles bulgares..... 0,02
Bacilles bifidi..... 0,02
Bacilles paralactiques. 0,02

Mode d'emploi. — 3 à 8 comprimés par jour, soit à la fin du repas, soit au petit déjeuner et dans un verre d'eau lactosée (5 grammes), le soir avant de se coucher.

Propr. thérap. — Détruit toutes les fermentations microbiennes, antiseptise et tonifie les intestins.

Indic. — Affections intestinales : diarrhées infantiles, gastro-entérites, entéro-colites, etc.

Laboratoires MIDY

4, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII[e])

PANLAX-ALLARD

(Cachets Gmet)

Cachets digestifs et laxatifs pour la *cure rationnelle de la constipation* par le rétablissement progressif des fonctions digestives.
(*exempts* de phénol-phtaléine).

Composition. — Formule complexe comprenant 10 produits d'origine végétale pour la plupart.

Forme. — Boîte de 40 tout petits cachets.

Indications. — Troubles digestifs avec constipation.

Doses. — 1 à 3 cachets par jour après les repas.

Effets. — Selles moulées sans coliques ni diarrhée ; peut-être donné aux femmes enceintes et aux nourrices.

Echantillons, **Laboratoire GMET**
A. LOROT, Pharmacien.
27, faubourg Montmartre, Paris (IX[e]).
Téléph. : Provence 43-10. (Voir GMET p. 393).

PANTOPON "ROCHE"

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

0 gr. 01 de Pantopon "Roche"
=0 gr. 50 ctg. de teinture d'opium,
=0 gr. 025 mgr. d'extrait d'opium,
=0 gr. 005 mgr. de morphine.

Posologie et mode d'emploi. — Voie buccale :

PANTOPON "ROCHE" SIROP

(dosé à 0,01 ctg. de Pantopon "Roche" par cuillerée à soupe.)

Adultes : 1 à 3 cuill. à soupe par jour et plus
Enfants : 1 à 3 cuill. à café selon l'âge.

PANTOPON "ROCHE" COMPRIMÉS

(1 comprimé = 0,01 ctg. de Pantopon "Roche").

Adultes : 1 à 3 par jour et plus.
Enfants : 1/3 à 1 par jour, selon l'âge.

PANTOPON "ROCHE" AMPOULES

(1 ampoule = 1 cc. = 0,02 ctg. de Pantopon "Roche").

Boites de 3, 6 et 12 Ampoules

Adultes : 1 et 2 par jour et plus.
Enfants : 1/4 à 1/2 ampoule selon l'âge.

Indic. thér. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Produits
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
21, Place des Vosges — PARIS

PAPAÏNE
de TROUETTE-PERRET

Ferment digestif, énergique, extrait du suc du Carica Papaya, digère les produits azotés, *quelle que soit la réaction de l'estomac*, acide, neutre ou alcaline.

Indications :
Toutes les fois que l'on digère mal.

Pour les Adultes :

Élixir "TROUETTE-PERRET" à la *Papaïne*.
Un verre à liqueur après chaque repas.

Cachets "TROUETTE-PERRET" à la *Papaïne*.
Un à deux cachets à chaque repas.

Comprimés "TROUETTE-PERRET" à la *Papaïne*.
Deux à huit comprimés à chaque repas.

Pour les Enfants :

SIROP DE PAPAÏNE de TROUETTE-PERRET

Gastro-Entérite des nourrissons, Diarrhées, Vomissements.
Une demi ou une cuillerée à café avant ou après chaque repas ou tétée.
A souvent réussi après échec de toute autre médication.
Bien formuler : *Élixir - Sirop - Cachets - Comprimés de TROUETTE-PERRET, à la Papaïne.*

Laboratoires TROUETTE-PERRET
15, Rue des Immeubles - Industriels, 15
PARIS (XI^{e})

PARALACTINE BYLA

Deux formes actives :
Comprimés sur lactose
Culture pur sur lait

Composition. — La *Paralactine Byla* est constituée par une culture de ferments lactiques, d'activité et de stabilité contrôlées.

Indications. — Entérites aiguës et chroniques des enfants et des adultes, eczéma, urticaire, acné, herpès, toutes affections de la peau, et tous phénomènes consécutifs à l'auto-intoxication d'origine intestinale.

Mode d'emploi. — *Comprimés :* 1 à 3 comprimés dissous dans un peu d'eau sucrée, froide ou tiède, trois fois par jour.

Culture sur lait. — Quatre cuillerées à café par jour, délayées dans un peu d'eau lactosée.

Les Établissements BYLA
26, avenue de l'Observatoire, Paris (XIV^e^).
R. C. Seine 71895.

PARATHYROCALCINE "MONCOUR"

REMINÉRALISATION
Fixation des SELS de CALCIUM
par l'utilisation, comme *MORDANT*,
de l'EXTRAIT TOTAL PARATHYROÏDIEN

Indications. — Prébacillose, bacillose, scrofule, convalescence, croissance, fractures, affections osseuses, décalcification dentaire, et, en général, toutes affections avec déminéralisation.

Notre Extrait total Parathyroïnien, élément essentiel de la médication, est préparé avec des glandes soumises à un contrôle histologique régulier.

Cachet : 1 à 3 par jour.
Comprimés : 2 à 6 —

MONCOUR
49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS

PARATOXINE

Composition. — Extrait biliaire dépigmenté à base d'oxy-cholestérine et de substances voisines de la cholestérine.

Action. — Excite les moyens de défense de l'organisme, neutralise les toxines microbiennes. Inocuité absolue.

Indications. — Tuberculose sous toutes ses formes

Mode d'emploi.

Ampoules de Paratoxine A, en injections sous-cutanées, 1 à 3 par jour, par séries de 6 semaines.
Pilules (2 à 10 par jour). — *Capsules* (4 à 8.)
Paratoxine B. (ampoules de 5 cc.) pour injections intra-laryngées et pulvérisations locales.

Laboratoires F. DUCATTE
191, Rue Saint-Honoré — PARIS (Ier)

PAROXYL

(Gouttes spécifiques contre la coqueluche).

Le *Paroxyl* n'est pas toxique. Il ne renferme aucune substance vénéneuse, ni stupéfiante.

Prop. thérap. — Action régulière et sûre. Effet *non seulement calmant*, mais *curatif*.

Indications. — Coqueluche (nourrissons, enfants et adultes).
Pas de contre-indication.

Posologie. — *3 prises par jour* (quel que soit l'âge du malade).

Trois prises par jour :

Enfants de moins de 1 an...	X à XXX gouttes
— de 1 à 5 ans.....	XX à LX gouttes
— 5 ans et au-dessus :	XX à cent gouttes
Adultes.....	XXX à cent gouttes

THIRIET et Cie
26 et 28, rue des Ponts — NANCY

PASSIFLORINE

Traitement phytothérapeutique des états névropathiques.

Composition. — Une cuill. à café contient 0 gr. 50 extrait fluide de Passiflora incarnata ; 0 gr. 25 extrait mou de Salix Alba ; XX gouttes alcoolé de Cratægus oxyacantha.

Action. — La *Passiflore* diminue la tension artérielle, régularise l'influx nerveux dans le domaine du grand sympathique et est un sédatif et un antispasmodique de premier ordre.

Son action est renforcée et prolongée dans la Passiflorine par le *Saule*, sédatif nervin que les auteurs américains ont comparé au bromure et par le *Cratægus* dont l'action tonicardiaque et équilibrante du système nerveux est bien connue (Huchard, Renon, H. Leclerc, etc.).

Indications. — Tous états névropathiques : angoisse, anxiété, neurasthénie, etc. Insomnie nerveuse, troubles fonctionnels du cœur d'origine nerveuse (palpitations, tachycardie, etc.), troubles nerveux de la vie génitale, etc.

Posologie. — Comme médicament équilibrant du système nerveux : Une cuillerée à café midi et soir avant les repas.

Contre l'insomnie nerveuse : Une à trois cuillerées à café le soir.

G. REAUBOURG, docteur en pharmacie
1, rue Raynouard — PARIS (XVI^e^)

PATHOLYSINE

(Traitement interne des néoplasmes)

Deux formes : Ampoules et Pilules

Composition. — Salicyl-arséni-oxybenzénol-magnésien.

Indications. — S'emploie dans tous les cas où le tissu conjonctif sous-cutané est intéressé, c'est-à-dire dans tous les cas de cancer, sauf le cancroïde.

Mode d'emploi. — 1° Ampoules : Injecter quotidiennement une ou deux ampoules de un centimètre cube. En injections sous la peau de l'abdomen ou des membres ou en injections intramusculaires dans les muscles fessiers ou dans ceux de l'épaule.

2° Pilules : Quatre pilules par jour, au moment des repas.

LABORATOIRES A. LEJEUNE

12, rue Emile-Castelar. — Paris (XII°)

PAVÉRON DAUSSE

(Alcaloïdes totaux de l'Opium)

Hypnotique, sédatif, analgésique.

Complexe alcaloïdique renfermant à l'état de chlorhydrates solubles tous les alcaloïdes de l'Opium.

0 gr. 02 de Pavéron = 0 gr. 01 de Morphine.

Action plus douce, plus régulière et plus durable que celle de la Morphine.

Indications. — Toutes les indications de l'Opium, de la Morphine et de ses succédanés.

Formes et posologie. — *Ampoules de Pavéron* dosées à 0 gr. 02 de Pavéron par cc. — *Dose* : 1 ampoule à la fois.

Dragées de Pavéron dosées à 0 gr. 01 de Pavéron. — *Dose* : 1 ou 2 dragées à la fois.

LABORATOIRES DAUSSE

4, rue Aubriot, Paris (IV°).

PÉLOSPANINES

Sulfates de terres rares

Traitement des Bacilloses subaiguës ou chroniques.

Injections intra-veineuses :

Pélospanines A, ampoules de 2 cc.
Pélospanines B, ampoules de 4 cc.

Injections intra-musculaires :

Pélospanines C, ampoules de 2 cc. (associat. lipoïdique).

Pélospanines G. (gouttes) dites : Pelo G.

Prix : A : 12 fr. — B : 18 fr. — C : 12 fr. G : 14 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères

26, boulevard de l'Hôpital — PARIS (V^e^)

PÉPIODON HENRY

Combinaison de l'iode avec les peptones trypsique et érepsique. Gouttes concentrées 0 gr. 05 d'iode par 20 gouttes.

Composé iodique idéal parce que :

1° Dérivant de peptones plus facilement assimilables que la peptone pepsique ;
2° Son dosage est toujours constant ;
3° Il n'est pas décomposé par le suc gastrique et n'irrite pas la muqueuse stomacale lors de la libération de l'iode.

Doses. — *Adultes :* de 20 à 40 gouttes 3 fois par jour dans de l'eau.

Enfants : de 10 à 30 gouttes par jour.

Flacon : 45 c. c.

Laboratoires HENRY

39, rue de Sclessin — LIÈGE

PEPSODIA

Comprimé saturant anti-acide
anti-dyspeptique et anti-gastralgique.
Régulateur de la digestion.

Présentation et Composition. — Comprimé friable d'un emploi très pratique, utilisant à la fois l'action neutralisante les sels alcalins et alcalino-terreux et les propriétés absorbantes des sels neutres. Ne contient aucun toxique.

Indications. — Pyrosis, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Spasmes pyloriques, Aérophagie, Troubles nerveux d'origine gastrique (Migraine, insomnie, vertige, nervosisme), Gastrites inflammatoires et toxiques, Ulcérations de l'estomac.

Mode d'emploi et Doses. — Dans les cas légers, 1 à 2 comprimés délayés dans un demi verre d'eau froide ou tiède dès le début des sensations pénibles. Peut être croqué comme une dragée. En cas de gastrites ou d'ulcérations 2 à 4 comprimés et plus (pansement calmant).
Aucune contre-indication.

LABORATOIRE CHIMICO-THÉRAPIQUE DE PARIS
12, rue des Apennins — PARIS (XVII^e^)

PEPTALMINE

Peptones de Viande et de Poisson
Extraits d'Œuf et de Lait
Farine de blé dans l'enrobage.

Prop. thérap. — Médication antianaphylactique polyvalente.

Indications. — Migraines, Urticaires, Troubles digestifs par assimilation défectueuse, Rougeurs de la face, Somnolences ou Pesanteurs après les repas, Coliques, Asthme, Prurits, Eczémas et, en général, les diverses manifestations anaphylactiques.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 dragées ou 2 cuillers à café de granulés, *une heure avant chacun des trois repas.*
Enfants : Moitié de ces doses.

Laboratoire des Produits SCIENTIA
D^r^ E. PERRAUDIN, pharmacien,
21 Rue Chaptal — PARIS

PEPTALMINE MAGNÉSIÉE

Peptones de viande et de poisson.
Extraits d'œuf et de lait.
Farine de blé dans l'enrobage.
Sulfate de Magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-anaphylactique et cholagogue.

Indications. — Troubles digestifs d'origine hépathique, insuffisance hépatique, congestions du foie, cholecystites chroniques et toutes les manifestations anaphylactiques avec participation hépatique.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes :* 2 cuillerées à café de granulés 1 heure avant chacun des 3 repas.
Enfants : moitié de ces doses.

LABORATOIRE
DES PRODUITS SCIENTIA
Dr E. PERRAUDIN, pharmacien,
21, rue Chaptal — PARIS

PEPTODIASE

STIMULANT GASTRIQUE

Forme. — Gouttes.

Composition. — 1° Association de :
Chlorure de Calcium,
— magnésium,
— sodium,
sels qui stimulent la sécrétion et la motilité gastriques et augmentent considérablement le pouvoir digestif du suc gastrique.

2° **Principes amers de la gentiane,** renforçant l'action des chlorures.

Propriétés thérapeutiques :
Réveille l'appétit,
Augmente la sécrétion et l'activité des sucs digestifs,
Accélère la digestion,
Favorise l'évacuation de l'estomac.

Indications. — Atonie gastrique,
Hypoacidité,
Hyposécrétion,
Digestion lente,
Aérophagie,
Anorexie.

Posologie. — Trente gouttes dans un peu d'eau sucrée au début ou au milieu des repas.

Enfants : quatre gouttes par année d'âge et par 24 heures.

Laboratoire P. ZIZINE

Dr en Médecine — Dr en Pharmacie,
Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux,
Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.
24-26, rue de Fécamp — PARIS (XIIe)

PEPTO-FER
du Dr JAILLET

Chloropeptonate de Fer
sous forme d'Elixir
très agréable à prendre

Propriétés. — Tonique, digestif, reconstituant, ne constipe pas, ne noircit pas les dents.

Indications. — Traitement des Anémies, de la Chlorose.

Dose et mode d'emploi. — Un petit verre à liqueur immédiatement après les deux principaux repas.

DARRASSE FRÈRES
13. Rue Pavée, 13, PARIS

PEPTO KOLA ROBIN

Type du Médicament Aliment

Liqueur très agréable contenant le suc de Kola fraîche.

Dose et mode d'emploi. — 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Indications. — Fatigues passagères physiques ou intellectuelles, Albumine, Diabète, etc.

Laboratoires M. ROBIN
13, Rue de Poissy — PARIS

PEPTONAL

Composition. — PEPTONE rendue inaltérable par dragéification spéciale.

Action. — Le meilleur préventif de la migraine par action empêchante de la crise hémoclasique ; curatif de l'urticaire par atténuation des effets de la crise.

Indications. — Migraine, Somnolence, frissons, lourdeur, après les repas (crise hémoclasique atténuée). Urticaire.

Formes pharmaceutiques. — Comprimés dragéifiés — Granulés.

Dose. — Deux Comprimés une heure avant chaque repas, ou une cuiller à café de granulé.

Laboratoires DURET & REMY
ASNIÈRES (Seine)

PEPTONATE DE FER ROBIN

Combinaison définie de peptone, de glycérine et de fer.

Gouttes concentrées. Elixir. Vin.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 10 à 30 gouttes ou 1 verre à liqueur d'Elixir ou de vin à chaque repas ; Enfants : 1 goutte par année d'âge 2 fois par jour.

Prop. Thér. — Reconstitution du globule rouge du sang.

Indications. — Tous les états anémiques et chlorotiques.

Laboratoires M. ROBIN
13, rue de Poissy — PARIS

PEPTONE VASSAL

SÈCHE

Représente 12 fois son poids de viande de bœuf. Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières données scientifiques est un produit remarquable tant par ses qualités organoleptiques que par sa richesse en matières directement assimilables. Cette Peptone a en outre l'avantage d'être d'un *prix modéré* qui en permet un usage prolongé.

Dose. — 3 cuillerées à soupe par jour dans le potage ou dans du vin de Malaga.

Chaque flacon de 50 gr. « Peptone » représente 600 gr. de viande de bœuf solubilisée.

Echantillon gratuit sur demande.

Établissements Léon DANJOU — LILLE

PEPTOZYM

Médication Opothérapique antidyspeptique.

Forme. — Dragées à double enrobage : 1° externe, soluble dans l'estomac ; 2° interne, soluble dans l'intestin.

Composition. — Les dragées « **Peptozym** » sont constituées de deux parties distinctes et concentriques :

1° un noyau central constitué par :
- Extrait de Pancréas.. 0 gr. 10
- Extrait de Bile..... 0 gr. 05
- Boldine..... 0 gr. 0075

et enrobé dans du gluten.

2° une masse périphérique constituée par :
- Extrait de muqueuse gastrique 0 gr. 15
- Poudre de noix vomique..... 0 gr. 025

et enrobée dans du sucre.

Indications. — Grâce au choix de leurs principes constituants particulièrement actifs et grâce à leur double enrobage qui permet à ces principes d'agir *physiologiquement, avec le maximum d'efficacité*, les Dragées « **Peptozym** » réalisent le traitement de choix de tous les *Troubles Dyspepsiques par Insuffisance sécrétoire* et *Asthénie nerveo-motrice*.

Posologie. — Deux à trois dragées, au cours des deux principaux repas, au début de l'absorption du plat principal.

Laboratoires R. BOUYSSOU et Cie
90, avenue de Ternes, Paris (XVII°).
Téléph. : Wagram 61-42

PÉRAZIODOL

Iodosalicylate de pipérazine

Forme. — Pilules kératinisées à 0 gr. 10.

Propriétés. — 1° *Iode naissant* = puissant antitoxique et antiseptique.
2° Pipérazine = antiarthritique.

Avantages. — 1° Composé *stable* sans acide iodhydrique libre.
2° *Pas d'iodisme.* Parfaite tolérance par le poumon.

ndications. — Artériosclérose, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Adénopathies, Infections microbiennes et leurs séquelles, Rhumatisme, Goutte, Douleurs rhumatoïdes.

Laboratoires
ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne — PARIS

PÉRISTALTINE CIBA

Glucoside pur du Rhamnus Purshiana (Cascara), agissant exclusivement sur le péristaltisme, sans provoquer de coliques. Utilisable également par voie hypodermique (Ampoules de 1 cm³ 1/2).
Ne produit pas d'accoutumance.

Indic. — Constipation chronique, formes atoniques et spasmodiques. Atonie post-opératoire : Injecter préventivement 1 ou 2 ampoules après l'intervention).

Comprimés — Cachets — Ampoules

Doses. — Adultes : 1 à 2 cachets, 2 à 4 comprimés. 1 à 2 ampoules. — Enfants : 1/2 à 1 1/2 comprimé, 1 cachet. — Injectée ou ingérée, la Péristaltine agit au bout de 10 à 15 heures.

La boîte de 20 cachets : 8 fr. 50
Le flacon de 20 comprimés : 7 fr. 50
La boîte de 5 ampoules : 18 francs.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, place Morand — LYON

PERLES TAPHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tannophosphate de créosote d'une irréprochable pureté et d'une parfaite tolérance gastrique.

Prop. thérap. — Asséchant bronchique, bactéricide, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, catarrhes, prétuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 5 perles par jour prises de préférence une à une, à tout moment de la journée. Dans les affections chroniques, procéder par alternance des périodes de cure (10 jours) et de repos (5 jours).

Littérature et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

3, rue d'Édimbourg — PARIS (VIII[e])
124, avenue Rogier — BRUXELLES

PERSODINE LUMIÈRE

Constitution. — Préparation stable de persulfates alcalins purs, obtenue par procédés spéciaux dans les Laboratoires Lumière.

Propriétés. — Préparation eupeptique exerçant une stimulation générale sur les fonctions de la nutrition. Elle excite l'appétit, facilite la digestion et l'assimilation, et provoque aussi l'augmentation rapide de l'embonpoint et du poids.

Indications. — Inappétence (Arnozan). Anorexie (Huchard). Tuberculoses pulmonaires et osseuses (Hobbs), Rachitisme, Dyspepsie (Robin), excepté dans les formes hyperchlorhydriques.

Emploi et doses. — Donner 2 fois par jour, une demi-heure avant les principaux repas, dans un quart de verre d'eau pure:
Adultes : 3 comprimés de Persodine Lumière
Enfants : 1 à 2 comprimés.

Produits spéciaux des
Laboratoires A. LUMIÈRE
M. SESTIER Pharmacien
9, Cours de la Liberté — LYON

PERUBORE (Comprimés)

Désinfectant rationnel des voies respiratoires
Inhalations — Gargarismes

Composition et forme. — Association d'essences balsamiques et de principes actifs de plantes, présentée sous forme de comprimés progressivement solubles.

Chaque comprimé contient :

Baume du Pérou	0 03
Essences aromatiques	0 025
Borate de soude	0 6
Bicarbonate de soude	0 30
Acide tartrique	0 10

Propriétés thérapeutiques. — Pansement antiseptique et sédatif du revêtement intérieur des voies respiratoires.

Indications thérapeutiques. — Rhumes, angines, toux, affections de la gorge, enrouements, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, sinusites, coryza.

Posologie et mode d'emploi. — 1° *Inhalation* : à faire matin, midi et soir, de 1 à 2 comprimés dans un bol d'eau bouillante ou dans un inhalateur, respirer les vapeurs par le nez et la gorge pendant cinq minutes.

2° *Gargarisme* ; à faire plusieurs fois par jour, un comprimé pour un demi-verre d'eau bouillie chaude.

Pulvérisation : dissoudre 2 à 3 comprimés dans l'eau du pulvérisateur à vapeur et faire une pulvérisation de 5 minutes.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER
1, place Victor-Hugo — PARIS (XVIe).
A Bruxelles : LE MARINEL, pharmacien, 46, r. du Trône.

PHAGOLYSINE

ENDOTINE EN ELIXIR COMPOSÉ

Médication Tonique Type de toutes les CONVALESCENCES et de tous les états de DÉFICIENCE ORGANIQUE

Composition :

Par cuillerée à café.
Un demi-milligramme d'endotine,
Un quart de milligramme d'arsenic.
Cinq milligrammes de fer assimilable.

Indications :

Adénopathies, anémies, lymphatisme, affections pulmonaires chroniques, convalescence des maladies aiguës, notamment des affections contagieuses de l'enfance, états prébacillaires, tuberculoses curables sous toutes leurs formes.

Indication majeure :

Prévention de la bacillose pulmonaire et tonique général.

Contre-indications :

Période menstruelle, température élevée, formes congestives, hémoptysies, formes trop avancées des affections pulmonaires.

Pendant la prise :

Eviter les Acidités et les Crudités.

Doses Maxima Prophylactiques et Toniques :

Nourrissons : En principe, pour débuter, une goutte par jour et par mois d'âge, deux ensuite.
Age scolaire : Le matin et à la fin de l'après-midi une cuillerée à café.
Adolescents.
Grossesse.
Suite de couches.
Vieillards. } Deux cuillerées à dessert par jour avant les repas.
Adultes : Deux cuillerées à bouche par jour avant les repas.

Doses thérapeutiques.

Le médecin traitant débutera par de très faibles doses avant le repas ; ces quantités seront progressivement augmentées jusqu'au maxima des doses prophylactiques, suivant : réaction, température et signes cliniques présentés par le malade.

Laboratoires de la PHAGOLYSINE
14, rue Cantin — COURBEVOIE (Seine.)

PHAGOSTHYL

Sérum neurotonique, Cytophile, Hémopoïétique, Reconstituant, phagocytaire. (*Pour adultes.*)

Composition :

Association de Cacodylates alcalins chimiquement purs (soude et magnésie), de Sulfate de strychnine en milieu isotonique. Ampoules de 5 centimètres cubes.

Indications :

Tuberculose, pré-tuberculose, Anémies, Asthénie, Neurasthénie, Grippe, Convalescences, Paludisme, Dermatose, Tertiarisme, Etats cancéreux, Cachexies.

Emploi :

Une injection intra-musculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse. Absolument indolore.
Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 c. c.

Laboratoires Biologiques André PARIS
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e^)

PHAGOSTHYL MANGANÉ

(exempt de Strychnine).

Composition. — Association de Manganèse, Arsenic, Calcium, Magnésium et Sodium en milieu isotonique pour la Médication par voie hypodermique. Ampoules de 5 centimètres cubes.

Indications. — Carences, Dénutrition, Décalcification, Anémies, Asthénie, Convalescence des Maladies aiguës, Anergie grippale, Surmenage, Amaigrissement, Troubles endocriniens.

Emploi. — Une injection intra-musculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, dans la région fessière, en prenant les précautions aseptiques d'usage.

L'injection des Phagosthyl est absolument indolore.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 c. c.

Laboratoires Biologiques André PARIS
4, rue de La Motte-Picquet, PARIS (XV^e^).

PHARMETAN

Association d'urénile, d'iodure et de salicylate de soude en solution glucosée.

Ampoules de 10 c. c., endoveineuses, intramusculaires.

Indications :

Encéphalite léthargique, rhumatismes.

Échantillon sur demande.

Union Chimique Belge, S. A.
Division :
Produits Pharmaceutiques MEURICE
68, Rue Berkendæl,
BRUXELLES (Belgique).

PHIAMINE

Tuberculose. — Asthénie.

Composition.

Aminos-acides en solution à 5 %.

Propriétés thérapeutiques.

La Phiamine ne contient aucun produit toxique. C'est un puissant modificateur du terrain. Son action s'exerce sur la secrétion bronchique, la température, le poids.

Forme.

Ampoules — Boîtes de 12.
1 c. c. = *Phiamine* A.
2 c. c. = *Phiamine* B.

Injections indolores ne donnant aucune réaction.

Indications thérapeutiques.

Prétuberculose, Tuberculose pulmonaire, Asthénies, Anémie, Surmenage.
Aucune contre-indication.

Mode d'emploi.

Injections sous-cutanées ou intra-musculaires, tous les deux jours.

Paul COURSAGET
Pharmacien.
9, rue Porte-Côté,
BLOIS (Loir-et-Cher).

PHILOGASTRINE

(Comprimés)

Traitement dialytique des dyspepsies. Réalise la concentration optima du contenu gastrique. Assure l'évacuation pylonique.

Forme. — Comprimés de 2 gr. 50.

Composition p. 100. — Lactobiose..... 90
Citrate de soude. 2
Bicarb. de soude. 8

Emploi. — deux comprimés dans 125 cc. d'eau tiède 2 heures après le repas, en une fois. Même dose, par gorgées, en cas de douleurs.

Indications. — Toutes dyspepsies.
Action rapide sur douleurs, aigreurs, brûlures, pesanteur, etc.
Usage prolongé fait disparaître les troubles sécrétoires.

Laboratoires REVEL

34, rue Saint-Lazare. Paris (IX^e).

PHOSOFORME

Trois Formes. — Solution, solution arséniée, Gouttes.
Principe actif. — Acide monoéthyl orthophosphorique.
Thèse de Doctorat en Pharmacie 1923.
Communicat. à la Société de Thérapeutique 1923.
Indic. thérap.. — États dyspeptiques. — Neurasthénies. — Rhumatisme chronique. — Lithiases. — Convalescences : Grippe. etc. — Phosphaturie. — Asthénie. — Azotémies. — Nutrition des tuberculeux et prédisposés.
Mode d'emploi. — Solution et solution arséniée, dose moyenne : 2 cuillerées à soupe par jour. Chaque cuillerée dans un grand verre d'eau, de boisson, de cidre, de vin blanc ou rouge *sucré*, à prendre au cours des repas.
Gouttes : 100 gouttes midi et soir, prises comme ci-dessus.

Laboratoires
de Biologie et Physiologie appliquées
D. DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

18

PHOSOL-QUINET

Formes. — Elixir phosphorique au Muscat et Granulé mangano-phosphaté.

Composition. — *Elixir* : Acide phosphorique. — Sels de chaux et de soude — Kola. — Noix vomique. — Rathanhia. — Arrhénal. — Elixir généreux au Muscat. — *Granulé* : Fondant de quinquina et de kola associés à des sels de manganèse et de chaux et d'acide phosphorique de saveur agréable.

Indications. — Asthénies diverses. — Anémie. — Surmenage. — Suralimentation. — Amaigrissement. — Croissances. — Convalescences, grippale en particulier. — Bacillose. — Affaiblissement général.

Propriété. — Double action.
1° Action reminéralisatrice.
2° Puissante et rapide action stimulante sur la nutrition.
Très bien toléré par les estomacs les plus délicats et très agréable à prendre.

Posologie. — *ADULTES* : 2 cuillerées à soupe par jour.
ENFANTS : de 9 à 12 ans, 2 cuillerées à café par jour.
— 12 à 15 — 2 — dessert —
Cet élixir se prend au milieu du repas dilué dans un verre de boisson habituelle.

LABORATOIRE DU PHOSOL-QUINET
143, rue du Temple, Paris (III[e]).

PHOSOTE
LAMBIOTTE FRÈRES

Phosphate de Créosote chimiquement pur, stable et complètement assimilable.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique, modificateur direct des lésions, antioxygène (met obstacle aux phénomènes d'autoxydation). Grand pouvoir asséchant. Tonifie l'organisme.

Indications. — Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, prétuberculose, tuberculose pulmonaire

Mode d'emploi. — 1° Injections intramusculaires profondes de 1 cc. tous les jours (ou 2 cc. tous les 2 jours ou 3 cc. tous les 3 jours), par cures de 21 jours suivies de 9 jours de repos; 2° Suppositoires dosés à 0 cm. 5 : 2 par jour.

S'abstenir de recourir simultanément à la médication arsenicale.

Littérature et Echantillons :
Produits LAMBIOTTE FRÈRES
3, rue d'Edimbourg — PARIS (VIII[e])
124, avenue Rogier, BRUXELLES

PHOSPHARSOL

Composition. — Préparation phosphoarseniée organique combinée à la strychnine.

Indications thérapeutiques. — Reconstituant général dans l'anémie, la neurasthénie, l'impuissance, la tuberculose, etc.

Doses et mode d'emploi. — De 2 à 4 tablettes, en progressant, à chacun des deux principaux repas. *Ne pas dépasser ces doses.*

Prix en France : 12 fr. 50 la boîte.
Dépôt général pour le gros :

Laboratoires RICARDOU
Docteur en pharmacie.
52, rue de Verneuil, Paris (VII^{e}).
Tél. : Littré 35-77.

PHOSPHATE PINARD ET PHOSPHARSYL

(*Phosphate Pinard Méthylarsiné*)

Caractères généraux. — Extrait directement des os. Se présente à l'état insoluble *gélatinoïdal*, dans un état extrême de division. Grâce à la constitution gélatineuse de sa molécule, le suc gastrique est sans action sur lui.

Il est *happé* par les hydrates de carbone alimentaires dont il suit l'*évolution assimilatrice*, d'où son assimilation *maximum*.

Le **PHOSPHARSYL** est le même produit contenant 0 gr. 03 de méthylarsinate sodique par cuillerée à potage.

Indications. — Tuberculose. Prétuberculose, Rachitisme, Affections des os, Croissance, Convalescence, Carie dentaire, Diabète, Inappétence **(PHOSPHARSYL)**. Maladies consomptives **(PHOSPHARSYL)**.

Posologie. — PHOSPHATE PINARD : Une à deux cuillerées à potage, avant les deux grands repas.
Demi-dose pour les enfants.

PHOSPHARSYL : Une cuillerée à potage, avant les deux grands repas.
Une cuillerée à crème, pour les enfants au-dessus de 6 ans.

N. B. — On obtiendra le maximum d'efficacité en faisant prendre alternativement aux malades, pendant 8 jours, le **PHOSPHATE PINARD** et, les 8 jours suivants, le **PHOSPHARSYL**.

Établissements du Docteur PINARD

88, Boul. Saint-Denis — COURBEVOIE (Seine)

PHOSPHATE VITAL DE JACQUEMAIRE

Glycérophosphates très purs qui ont servi aux expériences de M. le Professeur Albert Robin (Communication à l'Académie de Médecine du 24 avril 1894).

Formes et doses. — *Solution gazeuse* (de chaux, de soude ou de fer) :
2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Granulé (de chaux, de soude, de fer ou composé) :
2 à 4 cuillerées à café par jour.

Injectable (de chaux, de soude ou de fer) :
1 à 2 injections par jour.

Propr. — Double action reconstituante :

1° *Action reminéralisatrice*, par l'apport du phosphore uni aux bases qui lui sont normalement associées dans l'organisme, sous la forme même — directement assimilable — adoptée par celui-ci ;

2° Puissante *action stimulante sur la nutrition*, par l'intermédiaire du système nerveux et de tout le système glandulaire.

Indications. — Contre toutes les formes de la faiblesse et de l'épuisement : Croissance. Débilité. Anémie. Neurasthénie. Tuberculose. Grossesse. Allaitement. Surmenage. Convalescence.

Nota. — Ce traitement reconstituant s'associe utilement et sans contre-indications à de nombreuses autres médications : opothérapique, sérothérapique iodurée, arsenicale, mercurielle, anti-paludique.

Établissements JACQUEMAIRE
VILLEFRANCHE (Rhône).
Soc. à resp. lim. au cap. de 2.000 000 de francs.
Admr-Gérant : **M. MIGUET,** Dr en Pharmacie.

PHOSPHOBROM

Composition. — Bromure, Phosphate, Citrate alcalins.

Forme. — Granulé fondant soluble de goût agréable.

Mode d'emploi. — Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour ; enfants 1 à 2 cuillerées à café par jour selon l'âge.

Indications thérapeutiques. — Névropathie. — Fatigues nerveuses. — Neuroarthritisme. — Insomnies. — Palpitations des fausses cardiopathies. — Convulsions de l'enfance. — Dyspepsies nerveuses. — Aérophagie.

Laboratoire SERINDAT

22, Rue Poncelet, Paris (XVII[e])

PHOSPHO-FLUOR BEYNET

Reconstituant général aux phosphates organiques fluorés contenant aussi de la magnésie, du fer, de la silice dans les proportions où on les trouve dans l'économie.

Forme. — Granulé, cachets, comprimés.

Indications. — Différentes tuberculoses, rachitisme, ostéites, caries dentaires, grossesse, allaitement, anémie, convalescence, surmenage nerveux, phosphaturie.

Dose et mode d'emploi. — Granulé : *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pur ou dans un liquide.

Enfants de 3 à 10 ans, 1/2 dose.

Nourrissons : une pincée dans la bouillie.

Cachets ou comprimés : 2 à 4 par jour ; enfants 1/2 dose.

Chaque cuillerée à café de granulé de chaque cachet ou comprimé contient 0 gr. 50 de principe actif.

Prix actuel : 12 francs

Envoi d'échantillons sur demande adressée à la

Pharmacie SÉGUIN

165, rue St-Honoré — PARIS

PHOSPHOGAIACOL MARY

Nature. — A base de sels calciques assimilables, avec addition de thiocol, acide arsénieux et arseniate de strychnine.

Propriétés thérapeutiques. — Modification rapide des sécrétions bronchiques. Disparition de la toux, de l'expectoration, des engorgements ganglionnaires et du lymphatisme.

Forme. — S'emploie sous la forme de granulé très agréable au goût, à la dose de 2 à 3 cuillérées à café.

Laboratoire du reconstituant MARY

32, rue de l'Ouest, Paris.

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

PHOSPHOGÉNASE

Ferments Phosphogènes Vivants leurs Diastases, Vitamines et antitoxines.

Tous états *Asthéniques*

Tuberculoses. Rachitisme. Cachexie. Anémies. Croissance. Neuras hénie. Convalescences. Maladies Nerveuses. Maladie de Basedow et toutes les conséquences d'un trouble du métabolisme phosphorique.

Action. — Reconstituante. Antitoxique.

4 à 6 comprimés par jour suivant avis médical.

Aucune contre indication.

Laboratoires de Chimie Physiologique.

37, rue de Tivoli — BORDEAUX

PHOSPHOGÈNE FAVRICHON

Régime et alimentation de l'Enfance.

Composition.

Le Phosphogène se recommande par sa richesse en phosphates assimilables. C'est un aliment très sain, très reconstituant, très agréable au goût. Il ne contient ni cacao reconnu néfaste dans l'alimentation de l'enfance, ni produit exotique échauffant. Il ne constipe pas.

Indications.

Il convient à tous les enfants pendant leur croissance, mais particulièrement aux enfants débiles, à ceux dont la dentition est en retard, ou dont le système osseux ne se développe pas d'une façon normale.

Le Phosphogène rend de grands services aux jeunes mères pendant la grossesse et l'allaitement.

Il est également utile aux surmenés, aux convalescents dont il répare rapidement les forces en éléments phosphorés.

Dose.

Enfants : Une cuillerée à café par 100 gr. de lait, (à partir de 8 mois).

Adultes : Une cuillerée à soupe par 100 gr. de lait.

Le mode de préparation est indiqué sur chaque boîte.

Soupe de grains grillés. — Croissance.

Bouillon végétal. — Entérite avec diarrhée.

Littérature et échantillons sur demande.

FAVRICHON et VIGNON
Pharmacien-Chimiste.
à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).

PHOSPHOPINAL-JUIN

Phosphore colloïdal assimilable en combinaison organique.

Indications. — *Reminéralisateur* : Maladies de la nutrition, tuberculose, convalescence, anémie.

Fixateur des sels de chaux. — Aliment de la cellule nerveuse : Maladies du système nerveux, dépression mentale, neurasthénie, surmenage, fatigue cérébrale.
Pas de contre-indication.

Formes et doses moyennes.

Elixir : adultes : 2 cuillerées à café par jour.
enfants : 1 cuillerée à café par jour.

Capsules : adultes : 4 à 6 par jour.
enfants : 2 à 3 par jour.

Gouttes : adultes : 40 à 60 par jour.
enfants : 20 à 30 par jour.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

Le PHOSPHOPINAL-JUIN se prend dans un peu d'eau ou de boisson froide.

Laboratoire du POSPHOPINAL-JUIN
10, impasse Milord.
Teléph. : Marcadet 37-98.

PHOSTANIOL

en toutes saisons et à tous les âges

Composition. — Préparation tanno-iodique au phospholactate de chaux méthylarsiné (Parfum délicieux Ananas-fraise).

Pour tous les malades qui acceptent difficilement l'huile de foie de morue ou la digèrent mal.

Indications. — Anémie, croissances retardées, états ganglionnaires, inappétence, bronchite chronique, maladies scrofuleuses, impétigo et toutes dermatoses.

Posologie.

Chez l'enfant. — De 1/2 cuill. à café à 3 cuill. à dessert suivant l'âge.

Chez l'adulte. — 3 cuill. à soupe par jour.

Laboratoires COMTOS
F. CHANAL, pharmacien de 1re classe,
FESCHES LE CHATEL (Doubs)

PHOSTYL

Reconstituant puissant du neurone.

2 formes : Gouttes et Ampoules.

Composition : 1° Gouttes :

25 gouttes : S. Strychnine : 0,001 ; Méthyl. Na. : 0,02 ; S. Manganèse : 0,10 ; PO^4 H^3 off. : 0,25.

2° Ampoules :

1 ampoule : Vanadate Na. : 0,001 ; S. Strychnine : 0,002 ; Méthyl. Na. : 0,10 ; Glycéro. Na. : 0,10.

Indications :

Anémies, Convalescences, Neurasthénie, Dépressions, Surmenage. Reminéralisation rapide et durable par fixation de Ca, Na, K, Mg. Augmente et enrichit les hématies par fixation de fer.

Posologie :

Adultes : 25 gouttes midi et soir. De 12 à 18 ans : 15 gouttes ; de 6 à 12 ans, 6 gouttes ; à prendre avant les repas dans eau, vin, bière etc ; ampoules : une chaque jour en injection intramusculaire.

Laboratoire PY

58, Boulevard Richard-Wallace — Puteaux (Seine)

PHYLACTONE BYLA

Cachets et Granulé

Peptone spéciale à polyvalence protidique : **viande, poisson, lait, œufs.**

Dose et mode d'emploi. — Un cachet ou une dose, une heure avant les repas, dans un peu d'eau froide.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique.

Indications. — Migraines, Céphalées, Urticaires et tous états morbides relevant d'une intoxication alimentaire d'origine anaphylactique.

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire, Paris.

R. C. Seine 71895.

PHYSIOSCYAMINE

Médication du vague et du sympathique :

Composition. — Combinaison définie d'atropine, d'hyoscyamine et d'ésérine activée par la présence de pepsine spécialement préparée, unie à un excipient approprié.

Indications. — Troubles nerveux ressortissant à la dyspepsie hyperchlorhydrique, à la dilatation et à la ptose gastrique tels que : Vertiges, Congestions postprandiales, Migraines gastriques, Palpitations de cœur d'origine digestive, Tremblements, Somnolence, Bâillements, Constipation d'origine sympathique, etc., etc., etc.

Posologie. — Un cachet 10 à 15 minutes avant les trois repas.

Présentation. — Boîte de 30 cachets.

LABORATOIRE de la CEPHŒMETINE

L. PUECH, Pharmacien

44, rue Gambetta, à BIARRITZ

Dépôt. — Drogueries et Commissionnaires en spécialités.

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

PHYSIOSTHÉNINE

Toutes infections graves.

Formes. — Boîtes *Adultes* : 3 ampoules 20 c. c.
Boîtes *Enfants* : 4 ampoules 10 c. c.

Indications thérapeutiques. — Grippe, Angine, Broncho-Pneumonie, Fièvre Typhoïde, Fièvre Puerpérale et toutes les infections, quel que soit le siège, quel que soit le microbe, excepté tuberculose.
Injections à la seringue, sous la peau, avec ou sans novocaïne, ou profondément dans le muscle sans novocaïne. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc. Toxicité nulle.

NÉO-PHYSIOSTHÉNINE

Toutes infections de moyenne intensité.

Forme. — Boîtes de 8 ampoules de 5 c. c.
En injections sous-cutanées ou intramusculaires.
Adultes : 2 à 6 ampoules par jour.
Enfants : 2 à 4 ampoules par jour.
En injections intraveineuse.
Adultes : 1 à 3 ampoules par jour.
Enfants : 1 ampoule par jour.

Laroratoires DROUET et PLET
Rueil, Malmaison (Seine-et-Oise).

PHYTINATE DE QUININE CIBA

Phosphate organique de quinine contenant 57 % de quinine et 11 % de phosphore. Réunit l'action spécifique de la quinine à l'action tonique et reconstituante de la Phytine. Très bien toléré. Très soluble.

Indicat. — Celles de la quinine en général et plus particulièrement : Grippe, Migraines, Névralgies, Paludisme (surtout les formes anciennes accompagnées de cachexie et d'anémie). Maladies infectieuses, Coqueluche, Diabète, etc.

Doses. — Les mêmes que pour le sulfate ou le chlorhydrate de quinine.

Le tube de 20 comprimés, 10 fr.
Le flacon de 50 comprimés, 20 fr.

On trouve aussi le Phytinate de quinine en vrac, et on peut le formuler comme les autres sels de quinine.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, place Morand — LYON

PHYTINE CIBA

Produit naturel extrait des graines végétales, contenant 22 % de phosphore en combinaison organique avec la chaux et la magnésie. Le plus assimilable des médicaments phosphorés. Tonique et reconstituant. Stimulant des échanges nutritifs et de l'hématopoièse.

Indicat. — Débilité constitutionnelle, Neurasthénie, Névroses, Surmenage sous toutes ses formes, Tuberculose, Chlorose, Anémie Anorexie. Convalescences difficiles. Troubles de la grossesse et de la lactation, etc.

Cachets — Comprimés — Granulé

Doses. — Adultes : 1 gr. par jour (2 cachets, 4 comprimés, 2 cuillerées à café de granulé). Enfants : 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte.

Cachets et comprimés : la boîte 14 francs
Granulé : le flacon 16 francs

On peut aussi formuler la Phytine magistralement

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND

1, place Morand — LYON

PHYTOGÉNINE BYLA

Composition. — Complexe bio-minéral et opothérapique, intégralement assimilable : Phytophosphine, florure de sodium, nucléinate de manganèse associés aux : thymus, rate, surrénales, parathyroïdes, foie, moelle osseuse et os épiphysaire.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur intensif, modificateur puissant des échanges nutritifs.

Indications. — Troubles de la croissance, tuberculose, rachitisme, dépression nerveuse, convalescences, phosphaturies, anémies et tous états de déchéance organique.

Dose et mode d'emploi. — *Granulé* : 3 cuillerées à dessert par jour, à croquer. — *Cachets* : 2 à 4 par jour. — *Comprimés* : 4 à 8 par jour. (Enfants demi-dose.)

Les Établissements BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS
R. C. Seine 71895

PILULES DE BLANCARD

A l'iodure de fer inaltérable, approuvées par l'Académie de Médecine de Paris, dosées à 5 cgr. d'iodure de fer.

Dose et mode d'emploi. — Adultes : 2 à 6 pilules par jour aux trois principaux repas.

Prop. thér. — Agen incomparable d'Hématopoièse.

Indications. — Anémie, Scrofules, Lymphatisme, Chlorose, Leucorrhée, Aménorrhée, Syphilis accidentelles ou constitutionnelles, suite de Grippes infectieuses, etc.

BERTAUT-BLANCARD Frères
64, Rue de la Rochefoucauld — PARIS

PILULES du Dr DEBOUZY

Opothérapie biliaire.

Affections hépatiques. — Lithiase biliaire. — Insuffisance hépatique. — Entéro-colite.

Pilules de 0 gr. 30, extrait total de bile sélectionnée, stérilisée.

Dose. — 4 à 8 pilules par jour, prises aux repas.

Laboratoires LONGUET
34, rue Sedaine — PARIS (XIe)

PILULES ÉPARVIER

(CASCARA ÉPARVIER)

Forme et Composition. — Pilules contenant toute la partie active de l'écorce du « Rhamnus purshiana », à l'exclusion de *toute autre substance purgative*.

Action physiologique. — Action sur le système nerveux sympathique, sur les fibres lisses de l'estomac et de l'intestin et sur les glandes dont les sécrétions concourent à l'acte de la digestion.

Indications. — Constipation en général. *Laxatif de choix* dans la *grossesse* et l'*allaitement* et chez les hémorroïdaires et les variqueux. Intoxications gastro-intestinales. Migraine. Atonie des voies digestives.

Avantages. — Conservation indéfinie. Solubilité rapide et complète. Selles normales, sans coliques, sans diarrhée. *Pas d'accoutumance.*

Dose. — Une pilule (rarement deux) le soir, au dernier repas.

Echantillons sur demande à :

Laboratoire ÉPARVIER

26, Grande-Rue Saint-Clair — LYON

PILULES HÉLÉNIENNES NAUD

Composition. — A base d'Hélénine cristallisée. Protoxalate ferreux et quassine.

Indications. — D'après les essais cliniques les plus récents (thèse du Dr E. Parizot) l'*Hélénine* constitue le spécifique par excellence de la Leucorrhée, sans lésions anatomiques.

Mode d'emploi. — Sauf indication contraire du médecin, 4 à 8 pillules par jour aux repas.

Échantillon et littérature sur demande

Laboratoires LACROIX

37, rue Pajol — PARIS (XVIIIe).

PILULES D'HERMAL
BRETONNEAU

Ces pilules ne donnant pas d'hydrargirisme parce qu'enrobées au gluten, sont très souvent employées à côté des injections mercurielles et même à côté des injections de 606 et de néo-salvarsan. Voici leur formule :

Bi-iodure de Mercure.....	0,01
Iodure d'Arsenic.....	0,002
Correctif spécial.....	0,30

Nous croyons devoir prévenir Messieurs les Docteurs que les flacons de vente de *Pilules D'Hermal* ne sont accompagnés d'aucune notice.

Laboratoires Henri RIVIER, Pharmacien
26 et 28, rue Saint-Claude — PARIS

PILULES LÉMARY

Traitement mercuriel dissimulé

Dans le traitement de la syphilis acquise ou héréditaire, il y a très souvent un grand intérêt pour le médecin et même pour le malade à ce que ce dernier ignore quelle est la nature du médicament prescrit, soit que le médecin traitant, mal fixé encore sur le diagnostic veuille le fixer définitivement par un essai de médication spécifique, soit qu'il tienne à ne pas troubler la paix d'un ménage, d'une famille, par la révélation de la nature du mal, soit enfin qu'il s'attache pour une raison quelconque à une discrétion absolue. Il trouvera dans les **Pilules Lémary**, nom banal quelconque, mais NOM DÉPOSÉ, ce qu'il désire : le **traitement** mercuriel **dissimulé** ou **traitement discret**.

L'étiquette du flacon porte seulement cette inscription :

PILULES LÉMARY

(formule A ou formule B ou formule C)
fortifiantes, dépuratives, reconstituantes.

Le prospectus placé autour du flacon n'est pas plus explicite et ne peut donner lieu à aucune indication. Le médecin a donc ainsi toute sécurité.

Pour les pilules Dupuytren Codex, prescrire PILULES LÉMARY, formule A. — Dose habituelle, 1 à 3 pilules par jour, aux repas.

Pour les pilules Ricord Codex, prescrire PILULES LÉMARY formule B. — Dose habituelle, 2 par jour, 1 à chaque principal repas.

Pour les pilules au biiodure de mercure 0,005 millig. et iodure de potassium 0.25 centig., prescrire PILULES LÉMARY formule C. — Dose habituelle : 2 à 4 pilules par jour, selon le cas.

2 Pilules Lémary C = 1 cuill. à bouche de Sirop de Gibert.

Littérature — Echantillons

Laboratoire du Dr H. PHILIPPE

14 rue Palais-Grillet — LYON

PILULES LITHURANÉES
du Docteur BOVEIL

Traitement du diabète.

Composition :

Uranium : Radio-actif, active la sécrétion des glandes.
Helonin : Décongestif du foie et du pancréas.
Benzoate de lithine : Dissolvant de l'acide urique, en excès chez les diabétiques.
Arseniate de soude : Tonique général. Stimulant des glandes endocrines.
Géranium Robertianum : Tonique et astringeant.

Indications. — Le diabète sous toutes ses formes.

Doses et Mode d'emploi. — 6 pilules par jour ; 2 avant chaque repas avec un demi-verre d'eau de Vichy ou de Vals.
Traitement normal : 2 mois environ.
Échantillon et littérature sur demande.

M. PARIS, Pharmacien de 1re classe
1, Rue Lassalle — LYON (La Boucle).

PILULES PHILIPPE
Potassium — Sodium

Forme. — En *pilules kératinisées* ; elles évitent les maux d'estomac, suppriment réellement l'iodisme. — *Plus de 30 ans de pratique et de succès.*

Prière de prescrire :

Pilules Philippe à l'iodure de potassium { à 0,50 / à 0,20 / à 0,10

Sans indication spéciale, ce sont les **Pilules Philippe** à 0,20 centigr. d'iodure qui sont délivrées.

Pilules Philippe à l'iodure de sodium... à 0,20

Indications. — Artério-sclérose. Adénopathies, Tension artérielle, Goître, Obésité, Syphilis, etc.

Dose. — 2, 4, 6 et même 8 pilules par jour en deux ou trois fois.

Littérature et Echantillons

Laboratoire du Docteur PHILIPPE
14, rue du Palais-Grillet — LYON

PILULES PURGATIVES DU DOCTEUR DEHAUT

à base de Scammonée, aloès et Coloquinte

Tandis que les purgatifs salins ou l'huile de ricin provoquent la répugnance des malades par leur mauvais goût ou les préparatifs qu'exige leur emploi, les pilules Dehaut, au contraire, d'un aspect agréable, sont faciles à prendre et ne nécessitent aucun préparatif spécial.

Elles se prennent en mangeant.
Dose purgative : 2 à 3 pilules ;
Dose laxative : 1 à 2 pilules

Pharmacie DEHAUT
147, Faubourg Saint-Denis — PARIS

PILULES
du Docteur SÉJOURNET
antidiabétiques

Indications thérap. — Traitement du DIABÈTE sans régime trop rigoureux, le guérit souvent, l'améliore toujours sans crainte d'inconvénients. Évite les complications.

Doses et Mode d'emploi. — Complexe sous forme de pilules dosées à 0 gr. 02 de Santonine, avec excipient balsamo-résineux.

Reconstituant de premier ordre, etc.

1 Pilule à chaque repas.

Docteur M. LEPRINCE
62, rue de la Tour — PARIS (XVI[e])

PIPÉRAZINE MIDY

Diéthylène Diamine, N H $< \frac{CH^2}{CH^2} >$ N H alcalin organique du groupe des Pyridines. (Inscrit au Codex Français 1908.)

Granulé effervescent, dosé à 0,20 cgr. Pipérazine pure par cuillerée à café.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour comme préventif. 4 à 6 cuillerées à café par jour, dans les crises aiguës, dissoute dans un verre d'eau à distance des repas.

Prop. thér. — Dissout 92 % des composés de l'acide urique ; réduit les déchets uratiques en stimulant l'activité hépatique ; antiseptise les urines.

Indications. — Le plus actif des remèdes à prescrire dans les manifestations de l'Arthritisme et de l'Uricémie, Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques, Sciatique, Artéro sclérose, Eczéma, Diabète.

Aucune contre-indication, innocuité absolue, cœur, estomac, vais-eaux.

Laboratoires MIDY
4 rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII[e]).

PITUILOBINE BYLA

(en ampoules)

Composition. — Extrait épuré de lobes postérieurs d'hypophyses, *titré physiologiquement* sur utérus de cobaye. Cinq dosages en *unités internationales* : AMPOULES : A = 25 u. i. (1/8 lobe) ; B = 50 u. i. (1/4 lobe) ; C = 66 u. i. (1/3 lobe) ; D = 100 u. i. (1/2 lobe) ; E (intraveineuses) = 50 u. i. (1/4 lobe.

Indications. — Inertie utérine, hémorragie de la délivrance, salpingites chroniques, métrites, etc. Hémoptysies des tuberculeux, défaillances du myocarde, constipation.

Mode d'emploi. — Injections hypodermiques ou intramusculaires, ou mieux, injections intraveineuses, après dilution dans du sérum physiologique. 1/2 à 2 cc. dans la journée, suivant avis du médecin.

Les Établissements BYLA,
26, avenue de l'Observatoire, Paris.
R. C. Seine 71895.

PLAGÉINE SOULAS

(1) Ampoules — Pansements.
(2) Traitement de toutes les Plaies.

Composition :

Solution aqueuse, ni toxique, ni caustique, de *Goudron végétal* désodorisé et décoloré par procédé spécial, *Essence de Cèdre*, *Essence de Lavande*.

Propriétés physiologiques :

1° Antiseptiques ; 3° Résolutives ;
2° Epidermisantes ; 4° Analgésiques ;
5° Désodorisantes.

Indications thérapeutiques :

Plaies de toutes natures.
Plaies aseptiques : Plaies opératoires, Traumatismes, Entorses, Foulures, Engelures ulcérées.
Brûlures à tous les degrés.
Ulcères variqueux, *Plaies atones :* Eschares sacrées. Ulcérations par compression (moignons). Tuberculoses cutanées ulcéreuses. Ulcères gangréneux diabétiques, Néoplasmes ulcérés.
Plaies septiques ou souillées, Abcès, Furoncles, Anthrax, Phlegmons, Panaris.
Pédiatrie : Erythème fessier
Dermatologie : Eczéma, Psoriasis, Impétigo, Prurit anal, Prurit sénil.
Chirurgie conservatrice et esthétique.

Mode d'emploi :

Une ampoule pour un verre ou 150 c. c. d'eau stérile ou bouillie, ou trois ampoules pour un demi-litre. Employer la solution ainsi obtenue en pansements humides fréquents.

Echantillons et Littérature sur demande.

Laboratoire SOULAS

119, rue de Sèvres — Paris (VI[e]).
Tél. : Ségur 36-64.

PLURION COUTURIEUX

Description. — Complexe colloïdal d'arsenic, fer, manganèse et vanadium, isotonique, indolore, non toxique, en ampoules de 2 cc. (8 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. – Le PLURION augmente l'activité des organes hématopoïétiques et fournit aux globules rouges les éléments minéraux nécessaires à leur constitution (fer), à leur accroissement (arsenic) et à leur activité (manganèse et vanadium).

Indications. — 2 à 4 ampoules par jour dans les ANÉMIES GRAVES. 1 ampoule par jour dans les anémies des CONVALESCENTS, PALUDÉENS, SYPHILITIQUES, CANCÉREUX. 1 ampoule tous les deux jours dans les cas plus bénins.

Laboratoires CH. COUTURIEUX
18, avenue Hoche — PARIS

PNEUMOCRATOL

Forme.
Comprimés à base de : arsenic, manganèse, phosphore, strychnées, chaux, fluor, silice, ac. cinnamique, gaïacol-sulfonate, extraits opothérapiques.

Indications.
Affections pulmonaires aiguës et chroniques. Tuberculose, en particulier.

Contre-Indications.
Aucune.

Doses. — 6 à 10 comprimés par jour dans les affections pulmonaires autres que la tuberculose, 10 à 15 dans ce dernier cas.

Littérature franco sur demande

L. BOURDIER
147, faubourg Saint-Denis — PARIS

PNEUMOGÉINE RENARD

Composition. — Iodure double de caféïne et de théobromine (chaque cuillerée à café = 0,05 de caféine + 0,10 de théobromine combinés à l'iode et en solution dans un véhicule qui en masque le goût.

Propriétés thérapeutiques. — L'action de l'iode et de la caféïne se trouve renforcée et complétée par l'adjonction de la théobromine « le plus fidèle, le plus constant et le plus inoffensif des diurétiques » (Huchard).

La PNEUMOGÉINE par son action

régulatrice respiratoire assure aux poumons le maximum de rendement fonctionnel.

cardio-tonique, soutient le myocarde défaillant, abaisse la tension artérielle.

éliminatrice, débarrasse le sang des toxines et des déchets qui y sont accumulés, augmente la diurèse.

Indications. — I. Tous les états dyspnéiques : asthme, emphysèmes, bronchite chronique, dyspnées cardio-rénales, dyspnées névropathiques, etc.
II. Syndrome cardio-rénal.

Posologie. — Dose journalière : 2 à 6 cuillerées à café dans de l'eau sucrée ou, s'il est possible, verser le matin la dose prescrite dans un verre d'eau sucrée qu'on absorbe par petites gorgées dans le courant de la journée.

J. RENARD, docteur en Pharmacie
142, Avenue de Clichy
— PARIS —

PNEUMOSTYL DAGUIN

Forme. — Ampoules de 2 c. c. et ampoules de 6 c. c.

Composition. — Morrhuate d'éthyle, cholestérine, cinnamate et benzoate de benzyle, camphre goménol, eucalyptol, essences de labiées et huile d'olives neutre.

Mode d'emploi. — 1° Pneumostyl hypodermique (2 c. c.). Boîte de 6 ampoules.
2° Pneumostyl intratrachéal (6 c. c.). Boîte de 7 ampoules.

Indications. — Tuberculose, prétuberculose et toutes les affections des voies respiratoires.

Échantillons sur demande aux
Établissements DAGUIN
à SAINT-MAUR (Seine).

POLIOL CHURCHILL

(Hypophosphites composés de 0 gr. 20 par dose)
Médication reconstituante par le phospore directement assimilable.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules.

Association du *phosphore* avec les bases de l'organisme dans leur proportion avec 1 milligr. de méthylarsinate de strychnine par dose. Reconstituant complétement assimilable. Reminéralisant de choix.

Indications. — Neurasténie, surmenage intellectuel et physique convalescence déminéralisation, phosphaturie, affaiblissement.

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.
Comprimés. — 2 comprimés absorbés mais non dissous à chacun des deux principaux repas de la journée.
Ampoules. — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

Sirop. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.
Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.
Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.

Labortoire CHURCHILL
12, rue Castiglione — PARIS (Ier)

POLYFERMENTS LALEUF

Granulé

Composition. — *Ferments digestifs totaux*, associés aux citrate, sulfate, bicarbonate et phosphate de sodium.

Propriétés et indications thérapeutiques. Stimulant de la *sécrétion glandulaire*. Médicament de choix des *dyspepsies* de toutes nature et de toutes les affections du tube digestif et de ses annexes.

Mode d'emploi et doses. — Une ou deux cuillerées à café, délayées dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, à la fin des repas principaux ou au moment des troubles digestifs.

Laboratoires LALEUF
20, rue du Laos, PARIS (XV^e).

POLYMINÉRAL FORT

GRANULÉ

Composition. — Adrénaline, fluorure de sodium, phosphate de manganèse, hydrate de magnésie, formiate de chaux, phosphate de potasse, lactate de chaux, glycérophosphate de chaux.

Indications. — Reminéralisateur pouvant être utilisé pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes de croissance, etc.

Formes et doses. — Existe sous formes de:
Polyminéral adultes (Adrénaline 0,001 Fluorure de sodium 0,02 par mesure).
Doses: 2 à 6 mesures par jour.
Polyminéral enfants: (Adrénaline 0,0005, Fluorure de sodium 0,01 par mesure).
Doses: Bébés de 1 à 3 ans: 1/2 à 1 mesure: enfants de 3 à 8 ans: 2 à 3 mesures: enfants de 8 à 15 ans: 4 à 5 mesures.

Échantillons :

MICHEL DELALANDE
13, Rue Lacharrière — PARIS (II^e)

POLYVEININE

Complément rationnel du Traitement sclérosant.

Composition. — Poudre de glandes à sécrétion interne : Thyroïde, Surrénale, Hypophyse associées aux extraits stabilisés d'hamamelis, de viburnum, de marron d'Inde et d'hydrastis.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament scientifique dans lequel les effets curatifs des glandes à sécrétion interne sont associés aux vertus vaso-constrictrices des extraits végétaux.

Indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Ulcères, Varicocèles.

Mode d'emploi. — 4 comprimés par jour 20 jours par mois.

B. E. JAUME
Pharmacien à Tamaris près Alès (Gard).

POMMADE FORNET A L'INSULINE FORNET

Principe actif. — L'Insuline, qui vient d'être reconnu comme un médicament cytopoïétique remarquable, renforçant la trophicité générale de l'organisme (G. P. Boyer).

Indications. — Ulcères variqueux, Prurits, Psoriasis.

Forme. — Tubes étain.

Informations commerciales. — Laboratoires Thaidelmo, 23, rue du Caire, Paris (IIe).

Informations scientifiques. — Échantillons médicaux, littérature.

Institut de MICROBIOLOGIE
Sarrebruck.

POMMADES KLÉOS

Pommade Kléos faible.

Indications. — Feux, rougeurs, eczéma, éruptions dues à la dentition des bébés.
Composition. — Baume du Pérou, Talc, Oxyde de zinc, excipient, Glycéro aqueux.
Forme. — Pommades renfermées en tubes étain.

Pommade Kléos forte.

Indications. — Maladies de peau anciennes, gourme, acnée, intertrigo.
Composition. — Essence naturelle, Baume du Pérou, Ichtyol, Acide Borique, soufre, Oxyde de zinc, excipient.
Forme. — Pommades renfermées en tubes étain.
Ces pommades étudiées spécialement pour les enfants, sont toutes indiquées pour les épidermes particulièrement délicats.

Littérature et échantillons.

Laboratoires GUÉRET

2, rue des Cordeliers, Meung-sur-Loire (Loiret).

POMMADE LENOIR

à la Cinnamoléine

Traitement spécifique des *dartres chroniques* ; s'adresse exclusivement à ces eczémas à forme sèche, desquamant sans cesse, souvent prurigineux dont la ténacité est si désespérante pour le malade et pour le médecin.

Dans le *Pityriasis* du cuir chevelu, en décapant la couche épaisse des pellicules qui enserrent et étouffent les cheveux, elle enraye la calvitie et permet de recourir avec succès aux diverses lotions existantes et microbicides qui, sans elle, ne pourraient atteindre le sebumbacile enfermé dans les glandes sébacées.

Employée aussi avec succès contre les *verrues plates séborrhéiques* du visage, dites *crasse des vieillards*, les *psoriasis*, le *sycosis*, la *teigne*, le *favus*.

Mode d'emploi. — Onction matin et soir sur la partie malade.

Laboratoires A. LEJEUNE

12, Rue Emilio-Castelar. — PARIS (XII[e])

POMMADE LOGEAIS

Composition. — Dosée à 20 % d'oléosulfonate d'hamamélidine, combinaison définie d'une huile sulfonée spéciale avec un extrait glycériné total d'hamamélis préparé sans alcool.

Ni stovaïne, ni adrénaline, ni extraits opothérapiques.

Propriétés. — Analgésique, décongestionnante et doucement vaso-constrictrive. Sédation rapide et durable, aucune réaction douloureuse. Tolérance parfaite. Ne tache pas le linge d'une manière indélébile.

Indications. — Hémorroïdes externes. Prurit anal

Mode d'emploi. — Onction matin et soir après lavage avec le doigt enduit d'une forte couche de Pommade Logeais et jusqu'à sédation de la douleur (quelques minutes).

Nous joignons une canule à chaque tube, ce qui permet de traiter les hémorroïdes internes par la pommade Logeais.

Laboratoires Emile LOGEAIS

24, Rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE

POMMADE MIDY

(Adréno-Styptique)

(Adrénaline, Stovaïne, Anesthésine et Extrait de marrons d'Inde frais, stabilisé).

Mode d'emploi. — Une application matin et soir, et après les garde-robes.

Prop. thérap. — Sédation des douleurs, arrêt des hémorragies, décongestion et vaso-constriction, antisepsie.

Indications. — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Une canule rectale s'adaptant au tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes haut placées.

Laboratoires MIDY

4, Rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII[e])

POMMADE RADINE

Brûlures — Engelures — Crevasses du sein

Tube p. m. : 5 fr. (25 gr.), tube g. m. :10 fr. (100 gr.).
Pommade à base de principes extractifs de plantes aromatiques, antiseptiques, analgésiques et cicatrisantes (mélilot, romarin, thym, sauge, millepertuis, niaouli, etc.).

Mode d'emploi :

Brûlures : applications sur du lint ou de la toile après ouverture des phlyctènes aux ciseaux.

Crevasses du sein : applications sur le mamelon entre les tétées. Lavages avant et après la tétée à l'alcool glycérine.

Cicatrisation rapide et nette sans suppuration, suppression de la douleur.

Échantillonnage large pour hôpitaux, dispensaires, usines.

Laboratoires DUCLOS
EVREUX (Eure).

POUDRE ESCOUFLAIRE

Poudre et cigarettes anti-asthmatiques

Composition. — A base de nitre et des solanées les mieux triées (récoltes de 1er choix.)

Indic. thérap. et formes. — N° 2 (la plus faible) : Bronchite chronique, oppressions cardiaques, etc. — N° 1 : Asthme nerveux, Asthme des foins, fins de coqueluche, etc.

Mode d'emploi. — Une bonne pincée ou une demi-cuiller à café de poudre, allumée sur un fond de soucoupe recouverte d'un entonnoir ou d'un cornet en papier dirigeant la fumée vers la gorge. Avaler la fumée.

Ne pas attendre les affres de la crise ; la prévenir par une fumigation anticipée, et surtout la fumigation préventive du soir, avant de se mettre au lit.

Prix de vente : 8 fr. (pour environ 30 fumigations ou 30 cigarettes).

Laborat. ESCOUFLAIRE, à Baisieux (Nord).
(Echantil. grat. sur demande de MM. les Docteurs).

POUDRE GÉNIA

Composition. — Poudre à base de phosphate de chaux, magnésie, citrate de soude, bicarbonate de soude, carbonate de chaux, stovaïne.

Action. — Neutralisante, analgésique, laxative, reconstituante.

Indications. — Toutes les affections gastro-intestinales : Hyperchlorhydrie, Pyrosis, Fermentations, Crises gastriques, Entérite, Constipation, Obésité, Diabète, Goutte, Auto-intoxication.

Mode d'emploi. — *Adultes :* Une à deux cuillerées à café aux repas, dans un liquide quelconque.

Enfants : Une demi-cuillerée à café à chaque repas.

Nourrissons : Un quart de cuillerée à café dans un biberon ou un peu d'eau bouillie. une à deux fois par jour.

Laboratoire de la POUDRE GÉNIA
136, rue du Chemin-Vert — PARIS (XI^{e}).

POUDRE GYNULE

Produit gynécologique de choix.

Composition. — Tanin à l'éther, Borate de soude, Acide borique et Bicarbonate de soude.

Présenté sous forme de sachets (20 par boîte) a l'avantage de se dissoudre immédiatement contrairement à la plupart des comprimés.

Propriétés. — Décongestif puissant, modifie rapidement les sécrétions, tonifie la muqueuse et assure l'asepsie de la cavité vaginale. Ni toxique, ni caustique, réalise une isotonie parfaite. Prix : 6 fr. la boîte de 20 sachets.

Emploi. — Un sachet par injection de 1 ou 2 litres suivant les cas.

Échantillons et littérature sur demande.

Aux Laboratoires Ch. DEHAY,
58, rue Saint-Géry, Arras.

POUDRE LAXATIVE DE VICHY

du docteur Léonce Souligoux.

Composée de principes végétaux et aromatiques et d'un soufre spécialement traité, la poudre laxative de Vichy s'emploie à la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, le soir en se couchant. Très agréable, facile a prendre. De résultat constant.

CHASSAING, LE COQ et Cie

6, rue de la Tacherie — PARIS

POUDRE PATERSON

Composition :

Sous-nitrate de bismuth pur, *léger* (ancien Codex). Magnésie calcinée. Sucre pur.

Propriétés :

Le meilleur saturant neutre. Ne constipe jamais. *Agit à faibles doses. Le seul saturant gastrique* neutre présenté en *pastilles*, obligeant à la salivation. Active inoffensive. Très supérieure au carbonate de bismuth et aux produits de substitution (kaolin).

Indications :

Poudre en paquets : Pansement gastrique, Saturation. Gastropathies douloureuses. Dyspepsies. Hyperchlorhydrie. Acidités anormales. Ulcus gastrique et duodénal. Entérites et infections intestinales Dyspepsies gravidiques. Troubles digestifs du nourrisson.
Pastilles : Traitement d'entretien. Troubles digestifs légers ou chroniques. Digestions pénibles.

Formes et posologie :

Paquets : (2 gr.) 2 à 5 par jour, et plus, au moment des crises douloureuses.
Pastilles : 15 à 20 jour. Laisser fondre en bouche.

Laboratoires des Produits PATERSON
G. et M. Armingeat
46, rue de Saintonge — PARIS (IIIe)

POUDRE ET POMMADE D'INSULINE PHYLOZE

Forme et composition. — Insuline purifiée de fabrication française en poudre et en pommade

Mode d'action. — Excite la vitalité cellulaire et active la cicatrisation des plaies.

Indication. — Ulcères variqueux, plaies atones fermeture rapide de la plaie.

Mode d'emploi. — Déterger la plaie par un pansement humide, la saupoudrer de Poudre d'Insuline Phyloze ou appliquer la Pommade d'Insuline Phyloze et recouvrir d'une gaze.

Appliquer la Poudre ou la Pommade d'Insuline Phyloze une fois par jour.

Dans les cas graves et après cicatrisation de l'ulcère, pour parachever la guérison, recourir aux injections d'Endopancrine. (Voir ce mot.)

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE

48, rue de la Procession, Paris (XV^e^).

POUDRE SATINE

Composition :

Stéarates	12 gr.
Acide borique	5 —
Talc	3 —
Tanin	0,40

Propriétés thérapeutiques. — Irritations de la peau ; rougeurs des nouveau-nés. Ne se laisse pénétrer par aucun liquide.

Indications. — Toilette des bébés. Irritations cutanées, escharres des malades alités.

Laboratoire NOGUÈS

11, rue Joseph-Bara, PARIS.

PRÉVENTYL

Nécessaire de poche de prophylaxie antivénérienne

Le premier créé en France sous le contrôle et d'après les conseils des Maîtres de la vénéréologie française.

Composition. — En trois tubes d'étain de couleur différente :
1° Pommade de Metchnikoff (calomel 33%) ;
2° Gelée au protargol à 3% ;
3° Emulsion de savon ;
4° Une cartouche de ouate hydrophile.

Présentation. — Grand modèle (10 fr.), pour 8 à 10 applications.
Petit modèle (5 fr.), aspect et format d'une boîte d'allumettes, pour 3 applications.

Echantillons et littérature sur demande aux
Laboratoires MARCHAND et LEROY
40, Rue d'Enghien — PARIS (X°)
Téléphone Provence 37-13

PREZYMASE

Cure de désensibilisation.

Composition. — Peptone de poisson, peptone de viande et extrait sec de quinquina.

Mode d'action. — Prémunit l'organisme contre les accidents de la sensibilisation (Théorie de Widal). Méthode dont les détails ont été réglés par Pagniez et Pasteur Vallery-Radot.

Posologie. — Une dragée une demi-heure avant chaque repas.

Laboratoires LEBOIME
19, rue Franklin — PARIS (XVI°)

PRODUITS BENEDICTUS

L'aliment simple

(pour sevrage, entérite, estomac).

Benedictus chocolaté au lin grillé

(pour constipation, anémie).

Le Digest aliment

aux levures de fruits (dyspepsie, foie, rhumatismes, goutte, acidité).

Neigia Mousseline

(névrose, rachitisme, arthritisme).

La Pastanita

(grand reconstituant, anémie).

La Manne Christus

(sans sucre) aliment des diabétiques.

Le Graminosa

(alimentation infantile).

Leguminus

(alimentation pour diabétiques et pour les anémiques nerveux).

Dépôt : Fondation Benedictus Marigaz,

74, rue Lamarck, à PARIS (XVIIIe).

PRODUITS PENNÈS

Sel de J. A. Pennès

Hygiénique, reconstituant, stimulant. Remplace les bains alcalins et ferrugineux et surtout les bains de mer.

Vinaigre de J. A. Pennès

Antiseptique, hygiénique.
Rapport favorable de l'Académie de médecine.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque, Paris (X^e).

PROSTHÉNASE GALBRUN

Gouttes titrées. Solution organique de fer et de manganèse combinés à la peptone et à la glycérine, entièrement assimilable.

L'association de ces deux métaux en combinaison organique renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque. Ne donne pas de constipation. Tonique puissant. Reconstituant énergique.

Anémie - Chlorose - Débilité - Convalescence

Vingt gouttes de Prosthénase contiennent 1 centig. de fer et 5 millig. de manganèse.

5 à 20 gouttes pour les enfants
10 à 50 gouttes pour les adultes.

Laboratoire GALBRUN

8 et 10, Rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e)

PROTAMINOL BYLA

(en ampoules de 30 cc.).

Composition. — *Sérum de cheval* débarrassé de ses protéines de choc, auquel on a ajouté des produits d'*hydrolyse acide* de la caséine du lait, particulièrement riche en *acides aminés* et en bases hexoniques.

Propriétés thérapeutiques. — Le PROTAMINOL BYLA offre la ressource d'un *véritable mode d'alimentation parentérale*, aussi bien par l'eau et les sels qu'il renferme que par ses éléments dissous ou colloïdaux qui assurent l'anabolisme cellulaire. Réhydratant des tissus (aucun phénomène de choc.)

Indications. — Traitement des diarrhées infantiles.

Mode d'emploi. — Injections sous-cutanées, ou même, en cas d'urgence, par voie intrapéritonéale, à la dose de 30 à 60 cc. en deux fois dans la journée.

Les ETABLISSEMENTS BYLA,
26, avenue de l'Observatoire, Paris.
R. C. Seine 71895.

PROTIODYNE

Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

Composition. — Sélection de noyaux aminés de Peptones et d'Albumoses iodées, et chlorure de calcium.

Forme. — Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 25 de principes actifs (*Enfants*).
Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 50 de principes actifs (*Adultes*).

Injections hypodermiques **indolores**.
Jamais de **choc**, ni de **réactions anaphylactiques**.

Propriétés. — Par ses effets **préventifs** et **curatifs** des infections fébriles et des intoxications, la **Protiodyne** est une arme puissante toujours à la disposition du médecin devant une infection dont il n'a pas le sérum spécifique.

Indications. — Infections fébriles en général. Grippe, Pneumonies, Fièvres typhoïdes, **puerpérales**, etc. Dermatoses par auto-intoxication, Urticaires, Furonculose ; désensibilisation de tout syndrome anaphylactique : Asthme vrai, Asthme des foins, Migraines, etc.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 50 à la première injection.

Enfants : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 25 à la première injection.

A renouveler de 24 en 24 heures ou de 48 en 48 heures, si la sédation des accidents infectieux n'a pas été obtenue ou ne s'est pas maintenue.

Chez le jeune enfant, réduire la dose suivant l'âge et le poids.

La Protiodyne ne doit être employée que sous le contrôle du médecin.

Communications du professeur DUBARD de Dijon : Journal de Médecine et de Chirurgie pratique, 1919 ; La Clinique et le Scalpel, 1923.

Littérature et Échantillons sur demande au

Laboratoire général d'Études Biologiques

S. A., 29, place Bossuet — DIJON

PROTIODYNE DRAGÉES

Composition. — Albumoses et Peptones iodées, Sulfate de magnésie.

Propriété. — Désensibilisation de tout syndrome anaphylactique.

Indications. — Manifestations anaphylactiques, en général : migraines, urticaires, prurits, eczémas, entérocolites, asthmes, troubles digestifs par assimilation défectueuse : rougeurs de la face, somnolences, flatulences, pesanteurs après les repas, etc., etc.

Forme. — Comprimés dragéifiés, à 0 gr. 40 de principes actifs.

Doses et mode d'emploi. — Une heure avant chacun des trois repas. *Adultes :* deux dragées. *Enfants :* une dragée. La dragée ne doit être ni croquée, ni sucée, mais avalée avec un peu d'eau.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire général d'Études Biologiques.
S.A., 29, place Bossuet, Dijon.

PROVEINASE MIDY

(Comprimés)

Composition :
1° Extraits secs (desséchés dans le vide) des plantes stabilisées : Cupressus. Viburnum, Marron d'Inde, Hamamélis et Genêt.
2° Poudres d'organes à sécrétion interne : Thyroïde, Surrénale et Hypophyse.

Propriétés thérap. — Synergie régulatrice de l'insuffisance veineuse. Associe les effets organothérapiques des glandes endocrines et les vertus vaso-constrictrices de plantes soigneusement sélectionnées.

Indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Varicosités, Varicocèles, Ulcères variqueux. Hémorroïdes, Œdèmes post-phlébitiques, Troubles congestifs de la Ménopause et de la Puberté.

Mode d'emploi .
États chroniques : 2 à 3 comprimés par jour.
États aigus : 3 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires MIDY
rue du Colonel-Moll — PARIS

PROXYTOL

Association des Proxytases des organes de la digestion (Foie, Estomac, Intestin, Pancréas).
Spécifique des affections gastro-intestinales.

Mode d'action. — Assure le fonctionnement cellulaire normal par l'apport des ferments de synthèse ; active la nutrition de l'organe, rétablit les sécrétions.

Indications. — 1° Les dyspepsies ; 2° Les entérites ; 3° L'insuffisance hépatique ; 4° Gastro-entérites des nourrissons.

Forme. — Boîte de 36 comprimés.

Doses. — *Adultes.* Croquer de 4 à 6 comprimés par jour le matin à jeun ou loin des repas.
Enfants : Demi-doses.
Nourrissons : 2 à 4 comprimés dissous dans l'eau, à prendre 3/4 d'heure avant les tétées.

PROXYTASES

Diastases tissulaires pures spécifiques à chaque organe.
Catalyseurs biologiques réglant l'assimilation intime, permettant à l'organe déficient de restaurer ses lésions et de recouvrer son activité physiologique.
Action rapide, rigoureusement spécifique.

Indications. — Les insuffisances fonctionnelles de chaque organe.

Prescrire. — Proxytases ovaire, Proxytases rein, Proxytases thyroïde, etc.

Formes. — Boîte de 36 comprimés pour tous les organes.

Doses. — *Adultes* : Croquer 4 à 6 comprimés par jour, le matin à jeun ou loin des repas.
Enfants : Demi-doses.

Laboratoire des PROXYTASES

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e^)

R. C. 18 000 Téléph. Littré 68-22, 23, 24.

PULMOCARDINE

Asthme et maladies cardio-respiratoires.

Composition : (comprimés dragéifiés).

Quebraco : Combat la dypsnée et augmente l'amplitude des mouvements respiratoires.

Grindelia : Expectorant, diminue la tachycardie et la dyspnée.

Lobélia : détend la contracture et supprime l'angoisse.

Iodure et Caféine : fluidifie les sécrétions bronchiques, régularise le cœur et restitue l'énergie à la systole.

Indications. — Asthme, Emphysème, Bronchite chronique, Angine de poitrine, maladies du cœur et des vaisseaux, etc.

Doses. — 2 dragées au début des 2 repas.

Laboratoire J. PERROCHON
57, Rue Origet — TOURS

PULMOGYL

Composition. — Comprimés dragéifiés constitués par l'association de l'Aconit, la Codéine, le Benzoate de soude et le Thiocol.

Chaque comprimé contient :

Poudre d'Aconit	0,02
Codéine	0,005
Benzoate de soude	0,15
Thiocol	0,39
Sucre et gomme, qs. pr.	0,75

Indications. — Spécifique des toux spasmodiques, Asthme, Emphysème, Grippe et toutes affections des voies respiratoires.

Doses. — *Adultes :* 5 comprimés par jour, 7 à 8 dans les toux rebelles.

Enfants : A partir de 8 à 10 ans : 3 à 5 par 24 heures.

Laboratoire J. DELORME
33, rue Lauriston — PARIS (XVI^{e})
Téléphone : Passy 14-86
(R. C. Seine 4358)

PULVÉOL

(Poudre et pastilles)

réalisant l'antisepsie du carrefour aéro-digestif.

Antiseptique volatil, dénué de causticité, à base de menthol, eucalyptol, terpinol, essences volatiles, acide borique et borate de soude.

Indications. — *Oto-rhino-laryngologie et stomatologi courantes.* — Sinusites, rhinites, pharyngites, trachéites affections du cavum, angines, stomatites, gingivites Calme toutes les dysphagies.

Affections respiratoires. — Trachéo-bronchites, grippes à forme respiratoire, asthme, coqueluche.

Hygiène du nez, de la gorge et de la bouche dans les pyrexies ; dentifrice en nature sur la brosse à dents dans les traitements spécifiques mercuriels ou bismuthiques.

Usage hygiénique : tous professionnels de la voix.

Mode d'emploi. — *Poudre* : inhalation avec une cuiller à café de poudre dissoute dans un bol d'eau bouillante. Les éléments volatils disparus il reste une excellente solution tiède, antiseptique et isotonique pour gargarismes, bains de gorge ou lavages de bouche.

Pastilles. — 8 à 10 par jour.

Laboratoire du PULVÉOL

10, Impasse Milord.
Téléph. : Marcadet 37-98.

PURGANOL DAGUIN

($C^{20}H^{32}O^4$)

Forme. — Pastilles laxatives, à la menthe, dosées chacune à 0,20 de médicament actif. Bien préférable à la forme comprimés qui se désagrègent mal.

Mode d'emploi. — *Adultes :* 1/2 à une pastille le soir, au coucher.

Enfants : 1/4 à 1/2 selon l'âge. Sucer lentement et boire ensuite.

Ne donne pas de coliques, ne congestionne pas les organes du petit bassin, ce qui permet aux femmes enceintes d'en faire usage, Laxatif préféré des nourrices.

Échantillons sur demande aux
Établissements DAGUIN
à SAINT-MAUR (Seine)

PYOFORMINE

Ampoules de 2 c. c.

Pus aseptique obtenu par ponction de l'abcès térébenthiné du cheval en suspension dans une solution physiologique d'*Uroformine Gobey*.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 amp. p. jour en injection sous cutanée ou intramusculaire.

Propriétés thérap. — Médication héroïque des infections, toutes les pyrexies, toutes les septicémies. Remplace l'abcès de fixation.

Indications. — Méningites aiguës et encéphalites, pneumonies et complications, typhoïde, paratyphoïde et infections colibacillaires, pyélites, pyélonéphrites, cholécystites aiguës, états puerpéraux, péritonites aiguës, états septicémiques.

Laboratoires GOBEY
21, rue d'Aumale — Paris.

PYRATONE

(*Guérison rapide de la Coqueluche*)

Composé de métaux colloïdaux, possède des propriétés anti-microbiennes et électro-chimiques puissantes.

Forme. — Comprimés.

Prop. thérap. et indications. — Coqueluche et toutes les séquelles bronchiques et pulmonaires de nature infectieuse, convalescences souvent pénibles des grippes, guérison radicale du *Rhume des Foins*.

Mode d'emploi. — Aux enfants de tout âge, un comprimé de deux heures en deux heures dissous dans un peu d'eau ordinaire ou sucrée. La guérison commence généralement le 2e jour du traitement. Dans les infections graves, fièvres violentes, on peut augmenter le nombre des doses, sauf en cas d'entérite.

Littérature et échantillons sur demande.

Pharmacie FERRÉ
71, boulevard Saint-Michel — PARIS (Ve)

PYRÉTHANE

Antinévralgique puissant.

Forme liquide ; Gouttes ; Ampoules.

Composition. — Diméthylaminopyrazoline phénazone carbomate d'éthyle (uréthane.)

Emploi et doses. — Doit se prendre dilué en eau bicarbonatée sodique (Vichy, Vals ou eau ordinaire ou sucrée, 60 cc. avec 0,30-0,50 de bicarbonate.

Gouttes. Adultes : 25-50 à répéter à intervalles de 20'. Chercher la dose-levier et passer aux doses massives 80-100, si nécessaire. Maximum : 300 *pro die.*

Enfants : 1 à 2 gouttes par année d'âge.

Indications antithermiques : Donner à doses réfractées.

Ampoules A — 2 cc. antithermiques : 1 à 2 ampoules, avec ou sans médication intercalaire.

Ampoules B — 5 cc. antinévralgiques. Grandes névralgies, tabes, névrites, sciatiques : 1 à 2 par jour, avec ou sans médication intercalaire intensive. Maximum : 200 gouttes.

Injections intramusculaires.

Indications. — Migraines, Céphalalgies, Névralgies essentielles, intercostales, faciales, oculaires (25-50 à répéter), chercher la dose-levier ; Dysménorrhées (25-50) ; Arthrites, Lumbagos, Sciatiques, Radiculites, Polynévrites, Syringomyélie (doses variables) ; Algies syphilitiques, Tabes, Cancer (60-80-100 gouttes, permettent de garder en main médicale l'emploi de la morphine) ; Rhumatisme chronique et séquelles rhumatismales (25-50, 2 fois par jour) ; phénomènes douloureux inflammatoires et traumatiques. (Post opératoire en petite chirurgie.) — Échantillons et Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**
7, Rue du Rocher — PARIS

Laboratoire CAMUSET
18, Rue Ernest-Rousselle — PARIS

PYROLÉOL EDET

Composition. — Principes actifs de plantes non toxiques à saturation (mélilot, mille-pertuis, eucalyptus, etc.), solution huileuse.

Propriétés. — Neutre et aseptique, non toxique, analgésique et antiseptique, stimulant, tonique et cicatrisant.

Indications. — Brûlures, plaies atones, dermites, radiodermites, ulcères variqueux, engelures, escarres, eczéma, zona.

Présentation. — En flacons : 1/4, 1/2, entier.

Mode d'emploi. — Laver à l'eau bouillie et à l'eau oxygénée. Appliquer compresses stérilisées imbibées de *Pyroléol*. Renouveler après 24 ou 48 heures.

Résultats. — Disparition de la douleur, suppression de suppuration fétide. Production rapide de cicatrices vascularisées lisses, souples, non adhérentes.

Pharmacie Centrale des Pharmaciens de France
21, rue des Nounains-d'Hyères — PARIS (IV^e^).

QUASSIA-KINA RABOT

aux écorces d'oranges amères

Prop. thérap. — Reconstituant énergique. Le meilleur stimulant de l'appétit. Très bien toléré par les estomacs les plus délicats.

Indicat. — Asthénie, Vertiges stomacaux, Inappétence, Débilité, Convalescences.

Formes pharmaceutiques et mode d'emploi.

VIN : Un verre à madère aux 2 principaux repas. Véhicule idéal de la médication iodée même intensive.

DRAGÉES : Recommandé aux malades, auxquels le vin est contre-indiqué, *Adultes :* 3 à 6 par jour, 1/4 d'heure avant les repas. *Enfants :* 1/2 dose.

GRANULÉ : Convient particulièrement aux enfants, *Adultes :* 1 cuillerée à café aux repas. *Enfants :* 1/2 dose.

C. DAVID-RABOT et ses fils.

Dr en Phie. — Phien Ex. Intne des Hôp. de Paris
49, rue de Bitche. — COURBEVOIE (Seine)

QUASSINE HOUDÉ

Granules titrés à 2 milligrammes.

Quassine Houdé

Principe actif *cristallisé* du quassia amara.

Propriétés thérapeutiques :

Amer, excitant énergique de l'appétit, prescrit dans dyspepsies atoniques, embarras gastrique, contre les borborygmes, l'inappétence, etc.

Doses et mode d'emploi :

4 à 6 granules par jour, pris cinq ou dix minutes avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ
9, rue Dieu — PARIS

QUINA BARON

à l'extrait sec complet de quina

Solution sans alcool, correspondant à 0 gr. 50 d'extrait par cuillerée à soupe.

Mode d'emploi :
Deux à trois cuillerées à soupe par jour, avant chaque repas.

Propriétés :
Anémiés, convalescents, tuberculeux, opérés, et dans tous les cas où l'organisme doit être tonifié.

P. FOURNIE
pharmacien de 1re classe
3, place de la Miséricorde — LYON

QUINARSOL ANTIANÉMIQUE

Extrait de quinquina Grandval associé aux Strychno-Phospharsinates

Propriétés thérapeutiques :
Tonique — Stimulant général. — Apéritif.

Composition : *Chaque Comprimé contient :*

Quinquina Grandval.....	0 gr. 30
Glycérophosphates composés	0 gr. 30
Strychnine combinée.....	1 mgr. 60
Arsenic combiné.....	0 mgr. 18

Indications. — Anémie, Surmenage intellectuel et physique. — Faiblesse générale, toutes convalescences, Grippe. — Diabète et ses complications, Séquelles du Paludisme.

Permet l'absorption facile du Quinquina et de la Strychnine.

Dose :
2 comprimés avant chacun des deux principaux repas

Laboratoires GRANDVAL
12 et 14, Rue Féry — REIMS

QUINARSOL FÉBRIFUGE

Extrait de quinquina à haut titre alcaloïdique avec fer et arsenic assimilable.

Composition : Chaque comprimé contient :

Quinquina Grandval (à haut titre).....	0 gr.	60
Fer combiné.....	0 gr.	015
Arsenic combiné.....	0 mmg.	90

Propriétés thérapeutiques :

Antipaludique. — Permet suivant la dose, soit de juguler l'accès, soit de combattre l'état chronique et de faciliter la résistance de l'organisme. — Régénérateur du Globule et des Eléments protoplasmiques.

Indications :

Paludisme et ses conséquences, Fièvre de Malte, Affections produites par le séjour dans les pays chauds.

Dose :

Pendant la crise, 4 à 8 comprimés par jour, suivant la violence de l'accès. — **Etat chronique,** 4 comprimés par jour.

LABORATOIRES GRANDVAL

12 et 14, rue Féry, Reims.

QUINBY
& QUINBY SOLUBLE

(Quinio-bismuth. Formule AUBRY.)

Adoptés par les hôpitaux de Paris, les ministères de l'Hygiène et des Colonies.

Produits originaux à base d'iodo-bismuthate de quinine chimiquement pur :

a) en suspension huileuse 10 °/₀ (*Quinby*).

b) en solution aqueuse **incolore** (*Quinby soluble*).

Propriétés thérapeutiques

Spécifique le plus puissant de la syphilis à toutes ses périodes et sous toutes ses formes. Injections intra-musculaires, indolores. Pas de stomatite, pas d'abcès ni indurations, aucune toxicité.

Présentation :

Quinby.

1° Amp. normales de 3 c. c. correspondant à 0 gr. 05 de bi-métal (boîtes de 12 et 6 amp.).

2° Am. double dose (étiq. bleue) de 3 c. c. correspondant à 0 gr. 15 bi-métal (boîtes de 12 et 6 amp).

3° Amp. infantiles de 1,5 c. c., correspondant à 0 gr. 03 de bi-métal (boîtes de 12 amp. seulement).

Quinby soluble.

Amp. de 5 c. c. correspondant à 0 gr. 05 de bi-métal (pour adultes, et par boîtes de 6 amp. seulement).

Posologie :

Adultes : 12 inj. de 3 c. c. (*Quinby*) ou 18 inj. de 5 c. c. (*Quinby soluble*). (2 inj. par semaine).

Enfants : 12 inj. de 2/10° de c. c. (*Quinby*) par année d'âge (2 inj. par semaine).

B. : Les ampoules *Quinby soluble* sont plus spécialement réservées au traitement d'attaque de la syphilis ou de ses manifestations morbides, les ampoules *Quinby*, étiq. bleue, lorsque l'on désire faire des piqûres moins fréquentes.

Toutes ces ampoules peuvent être livrées directement, en vrac, par boîtes de 25, 50, 100, à des prix très avantageux à MM. les docteurs qui en font la demande directe au Laboratoire.

Laboratoires P. AUBRY
54, rue de Bienfaisance — Paris (VIII°).
Tél. : Laborde 15-26.

BELGIQUE
Agent Général : Ch. SCHŒFFER
34, rue du Canada —BRUXELLES

En Belgique, ces produits peuvent être prescrits aux frais de l'État par MM. les médecins autorisés.

QUINÉINE

Extrait intégral des principes actifs du quinquina.

Préparation concentrée, de titrage fixe, très active, faite avec des écorces choisies de même origine, concassées de la même façon, etc. XL gouttes deux fois par jour comme tonique. Dose fébrifuge : par 1/2 cuillerée à café. En solution non alcoolique.

Indications. — Paludisme, grippes, asthénie, convalescences, anémies.

Laboratoire des Produits Scientia
Dr E. PERRAUDIN, pharmacien,
21, rue Chaptal — PARIS

QUINICARDINE

Forme. — Comprimés de sulfate de quinidine pur à 0 gr. 20.

Indications. — Arythmies ; fibrillation auriculaire ; tachycardies.

Doses. — Tâter la susceptibilité du malade par 1 ou 2 comprimés, puis augmenter progressivement la dose journalière à 4, 5, 6, 7 ou 8 comprimés par doses fractionnées de 1 à 2 comprimés à la fois.

Laboratoire NATIVELLE
49, Bd de Port-Royal, PARIS (XIIIe)

QUINIMUTHOL SACA

Composition. — Iodobismuthate de quinine en suspension dans l'huile d'olive pure.

Forme. — Ampoule de 3 c. c. renfermant 0 gr. 30 d'iodo-bismuthate de quinine (= 0 gr. 054 de bi-métal actif).

Indications. — Syphilis à toutes les périodes.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les 2 ou 3 jours en injection intramusculaire.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 18 fr.

Usines Chimiques du PECQ
Siège Social : 11, Rue Beautreillis — PARIS

QUINIUM ROY

Composition :

Granulée, inaltérable, cette préparation renferme *tous* les principes actifs (*toniques* et *fébrifuges*) de Quinquinas sélectionnés, sous la forme reconnue la plus active et n'a *aucune* analogie avec les extraits toujours incomplets du Codex.

Propriétés thérapeutiques :

Fébrifuge, *reconstituant énergique*, tonique.

Indications :

Grippe, paludisme, Asthénies (post-grippales et autres). Convalescence, anémie.

Doses :

Tonique : 1 cuillerée à café aux repas.
Fébrifuge : 1 à 3 cuillerées à soupe aux repas (en nature, ou dissous dans un liquide au choix).

Laboratoires A. ROY & Cie
81, boulevard Suchet — PARIS (XVIe)
Auteuil : 05-46.

QUINOFORME LACROIX

Composition. — Formiate basique de quinine découvert par H. Lacroix, inscrit au Codex (1925).

Avantages. — Le plus soluble et le plus actif des sels de quinine.
Le plus riche en quinine (87,56% de sels basique ou neutre.
Injection indolore, n'occasionnant jamais d'abcès.

Indications. — Paludisme, Fièvres malariques Fièvres intermittentes.

Formes pharmaceutiques:
Ampoules, 6 à 12 ampoules de 0,25, 0,50 0,75, 1 gr. 1,25 et 1,50
Cachets, 6 et 12 cachets de 0,25 et 0,50
Comprimés, 10 et 20 comprimés de 0.10 à 0,50.
Pilules à 0,10.

Laboratoires H. LACROIX
V. Mérobian, successeur
37, rue Pajol — PARIS (XVIII^{e}).

QUINOÏDINE DURIEZ

dérivé du quinquina

Chaque dragée contient 0,10 quinoïdine.

Tonique, fébrifuge, antinévralgique. Supérieure à la quinine contre les récidives des fièvres intermittentes et la cachexie tellurique (Docteur Burdel. *Union Médicale*, novembre-décembre 1878, etc.), sans ses inconvénients habituels (bourdonnements d'oreilles, troubles gastriques), malgré l'usage prolongé. V. *Bull.* Académie de Médecine, 21 mai 1878 Communication du D^{r} Burdel. — Communications des D^{rs} Le Moine, Dardenne, Dujardin-Beaumetz, etc., etc. — *NOTICE* sur demande.

4 à 6 dragées par jour pendant 2 à 3 semaines,

DURIEZ
20, place des Vosges — PARIS

QUINSAL

à l'Éther Salicylique de Quinine et lithine acétylsalicylée en tablettes glutinisées

ACTION THÉRAPEUTIQUE POLYVALENTE :

Calmant immédiat de la Douleur par le groupement acétylsalicylique et la Quinine.

Antithermique par la Quinine.

Diurétique et Uricolytique par le Sel de Lithine et la Quinine.

Spécifique antirhumatismal par les Salicylates. Tolérance parfaite (tablettes glutinisées).

Indications : Rhumatismes, Sciatique, Lumbago, Névralgies, Douleurs grippales et en général toutes les Algies.

Posologie. — *Cas aigus.* — De 7 à 12 tablettes en 3 fois par 24 heures, de préférence loin des repas afin que l'action sédative soit plus rapide.

Cas chroniques. — Dans l'intervalle des accès : 3 par 24 heures.

Enfants. — De 1 à 3 par 24 heures.

Laboratoire du QUINSAL

M. LEULIER, docteur en pharmacie

Membre de la Société de Chimie biologique

GRAY (Haute-Saône)

Échantillon et Littérature sur demande.

LE QUOTIDIEN

(marque déposée en 1909).
pur jus de raisin frais sans alcool.

Composition. — Pasteurisé à température modérée (évite d'altérer les vitamines, les albumines et les corps azotés). Maintenu dans le vide dans son état originaire (évite toute oxydation).
N'est additionné d'aucun antiseptique, ni acide sulfureux, ni autres (évite ainsi d'entraîner des réactions chimiques).

Indications thérapeutiques :

Estomac, Intestins, Reins, Constipation, Désintoxication, Reconstitution.
Boisson de table idéale pour les estomacs délicats. Doit être bu à table pur ou mélangé d'eau ou un verre à Bordeaux avant chaque repas.
Échantillons et analyse sur demande.
En vente : toutes Pharmacies, Maisons d'alimentation et de Produits de régime.

Henri CHARTIER
à SAUMUR.

RADIOLYSINE

Complexe colloïdal radio-actif
en solution isotonique injectable

Composition. — Mésothorium, Cu, Mg, Si, Fe, Mn. Ph. Ca.

Propriétés. — La Radiolysine réalise la chimiothérapie totale du Cancer. Elle permet au médecin d administrer simultanément à son malade tous les éléments qui ont donné des résultats dans le traitement du cancer.

Indications. — Tous les cancers, soit comme médication adjuvante du traitement chirurgical (prévient les récidives) ou des traitements radium et radiothérapiques dont elle prolonge l'action. Cancers inopérables.

Présentation. — En boîtes unitaires, chaque boîte contenant les 2 ampoules jumelles nécessaires pour une seule injection de 5 cc.

Mode de prescription. — Prescrire 10 Radiolysine, pour une série de 10 injections intramusculaires, une tous les 3 jours.

N.-B. — Aucune indication ne révèle au malade la nature de l'affection pour laquelle il est traité.

Pierre ALEXANDRE Pharmacien
41, rue de Rome — PARIS (VIIIe) Lab. 08-00.

RADIOPAQUE HEUDEBERT

Composition. — Le RADIOPAQE Heudebert est un repas d'épreuve pour examen radiologique du tube digestif; son opacité est obtenue par le sulfate de baryum gélatineux en suspension dans un support alimentaire composé d'hydrates de carbone, de graisses et de matières azotées représentant une valeur nutritive de 750 calories pour la dose de l'examen.

Avantages. — En raison de sa réelle valeur alimentaire le RADIOPAQUE ne modifie en rien le rythme des contractions et permet l'examen du tube digestif dans son état de fonctionnement normal; de plus, son goût très agréable de crème au chocolat le fait accepter sans répulsion par les malades les plus difficiles.

Présent. — Il est présenté en flacons de 400 cc. pour examen complets et en 1/2 flacons pour examens partiels et examens des enfants. Il est prêt à l'emploi sans aucune préparation supplémentaire et son bouchage dans le vide suivi de de 2 stérilisat. lui assure une conserv. indéfinie.

Produits de Régime HEUDEBERT
85, Rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)

REALPHÈNE

Éther phosphorique du glucose
et Stovarsol calcique.
Augmentation rapide et durable
de l'appétit. du poids et des forces.

Indications :

Asthénie. — Anorexie. — Amaigrissement. — Convalescences. — Anémie. — Surmenage. — Entérites chroniques. — Troubles généraux de la nutrition.

Formes :

1° comprimés ; 2° cachets ; 3° granulé.

Établissements Albert BUISSON,
F. JALOT et Cie.
157, rue de Sèvres, 157. Paris (XVe).
R. C. Seine 222 705 B.

RÉARGON

Nouvel agent chimique antigonococcique.

Composition :

Albuminate d'argent spécial et glucosides anthraquinoniques combinés.

Propriétés :

Pénétration profonde des muqueuses.
Haut pouvoir bactéricide.
Action analgésique remarquable.
Tolérance parfaite.

Usage:

En injections, lavages, instillations avec solution à 5 de Réargon pour 100 eau distillée.

Doses:

Urétrites aiguës : par jour 3 ou 4 injections de 10 minutes.
Traitement abortif : 8 injections en 24 heures.

Laboratoires NORGAN
Pierre ALEXANDRE, pharmacien,
41, rue de Rome, Paris (VIIIe).
Tél. Laborde, 08-00

RECONSTITUANT MARY

Propriétés thérapeutiques. — Tonique de premier ordre ; grande richesse thérapeutique.

Quina. — Coca, kola, gentiane, quassia, cacao, noix vomique, fer organique et phosphates.

Traitement curatif des anémies, lymphatisme, anorexie, convalescences.

Mode d'emploi. — 1 à 2 verres à madère au milieu du repas. Demi-dose pour enfants.

Laboratoire
du Reconstituant MARY
32, rue de l'Ouest, Paris.
P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

RECTAGINE

(Suppositoires radifères)

Composition. — Organate d'argent à 17 °/o d'argent pur, Hydrargyre, sulfo-oléo sulfonate de sodium camphré, et bromure de radium.

Indications. — 1° *Chez l'homme :*

Agit sur les complications de la blennorragie, sur l'urètre, les testicules, les vésicules séminales, la prostate, etc.

2° *Chez la femme :*

Action complémentaire des crayons Leucagine dans le traitement des métrites à tous stades ; médication de tous les états congestifs ou infectieux de l'utérus, des trompes, et des ovaires.

3° *Cas particuliers :*

Action résolutive très nette sur : le prurit anal, les érosions de l'anus, les hémorrhoïdes internes et les oxyures.

Posologie. — Introduire un suppositoire au moment du coucher, pendant 10 jours consécutifs, ou tous les 2 jours suivant le cas.

Demander renseignements et littérature aux :
Laboratoires L.-G. TORAUDE O. ✻ O. I. U
Docteur en pharmacie. Lauréat de l'Institut
et de l'Académie de Médecine
22, rue de la Sorbonne, Paris (V°)

RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Œsculine adrénalinée et d'Ortho-cocaïne, livrée en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdicure parfait.

Prop. thér. — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice. Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

Laboratoire de la Varilaxine
164, Rue Saint-Honoré, 164
PARIS

RECTOPANBILINE

Formes. — Solution pour lavement et suppositoires.

Définition. — Lavement établi d'après les dernières données scientifiques et les travaux du Dr Bensaude amenant, en quelques minutes, sans réaction nocive, par un mécanisme physiologique une évacuation complète de tout le gros intestin. — Non irritant, non douloureux, non toxique, non salissant. — Concourt, en outre, à la guérison durable de la *Constipation* en rétablissant la biligenèse normale grâce à sa teneur en *Panbiline*. (Voir *Panbiline*.)

Composition. — Est une *Panbiline* avec prédominance d'Extrait de *Bile fraîche* additionnée dans les suppositoires de glycérine solidifiée.

Indications. — Toutes les modalités de *Constipation* médicale. En s'opposant à l'*Auto-intoxication intestinale*, supprime ses nombreuses manifestations pathologiques (troubles digestifs, nerveux, nutritifs, cutanés, etc.). Est le meilleur moyen d'entraver le développement de l'*Artériosclérose* dont le point de départ est aujourd'hui rattaché universellement à l'Autointoxication intestinale (Huchard, Chauffard, etc.). Résout parfaitement le problème posé par Metchnikoff dans ses travaux sur la *vieillesse précoce*.

Autres indications : Hémorroïdes, Vers intestinaux, Etats où la défécation doit se faire sans efforts : Hernies, Grossesse, Accouchements.

Posologie. — Un ou deux suppositoires par jour ou une à trois cuillerées à café de solution dans 160 grammes d'eau bouillie chaude à prendre en lavement à garder quelques minutes. — Demi-dose pour les enfants.

Échantillon, Littérature.

Laboratoire de la PANBILINE
ANNONAY (Ardèche).

RÉGYL

(à base de peroxyde de magnésium hydraté, de fluorure de sodium et de ferments digestifs).

Mode d'emploi :

Un ou même deux comprimés après chaque repas. Doubler la dose dans les états aigus.

Présentation :

Sous forme de comprimés pesant chacun 0 gr. 60.

Propriétés :

Régulateur de l'estomac, gastralgie, dyspepsie, flatulences, fermentation, pesanteur, renvois, crises stomacales tenaces.

Échantillons sur demande.

Laboratoire du RÉGYL

8, Rue Richer — PARIS

RÉPARATEUR THUAU

Présentation. — Vin.

Composition :

Kola stabilisée	Extr. HA.	0,15
Coca.....	Extr. HA.	0,15
Noix vomique.....	Extr. sec.	0,009
Samos.....		20

Indications. — Faiblesse générale, neurasthénie, surmenage, convalescence.

Mode d'emploi. — Médication pour adultes : 2 verres à liqueur par jour.

Laboratoire
du RÉPARATEUR THUAU
22, faubourg Saint-Michel — ANGERS

RESYL

Antiseptique pulmonaire

Ether glycéro-gaïacolique soluble. Non caustique, libère du gaïacol à l'état naissant. Antiseptique pulmonaire et modificateur des sécrétions bronchiques. Sous son influence la bronchorrhée diminue, les bacilles se raréfient, l'état général et les signes stéthoscopiques s'améliorent.

Indicat. — Tuberculose pulmonaire avec ou sans température. Bronchites et toutes les affections de l'appareil respiratoire en général.
Sirop, Comprimés, Ampoules.

Doses. — 2 à 6 cuillerées à café de sirop, 2 à 6 comprimés par 24 heures. Voie hypodermique : une ampoule tous les 2 jours.

Sirop le petit flacon : 8 fr. 50
— grand — : 15 fr.
Le tube de 20 compr. : 7 fr.
La boîte de 12 amp. : 15 fr.

Laboratoires O. ROLLAND
1, Place Morand — LYON

RÉTHRAGINE

Médication bactéricide et radioactive des affections urétrales (aiguës et chroniques,) chez l'homme et chez la femme.

Nature du Produit. — La Réthragine est une composition médicamenteuse présentée sous forme de bougies renfermant en milieu indolore un organate d'argent titré à 20 % d'argent pur, de l'acide urique et du Bromure de Radium au maximum d'activité et répondant à des constantes physiques nettement déterminées.

Indications. — La Réthragine, sous forme de bougies urétrales, agit efficacement non seulement sur les infections de l'uretre, mais encore sur les infections annexes.

Prescrire. — *Hommes* : Bougies Réthragine H ; *Femmes* : Bougies Réthragine F.

Traitement complémentaire: **Gapsules RÉTHRAGINOL.**

Demander renseignements et littérature aux

Laborat. L.-G. TORAUDE O. ✻ O. I. Q

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut
l'Académie de Médecine

22, rue de la Sorbonne —PARIS (V^e^)

RÉVULSIF MILKO

Innovation thérapeutique.

Composition. — Terpènes, Alcool (sans produits phénoliques, essence de moutarde ou de capsicum, prurigineux).

Présentation. — 3 concentrations différentes:

N° 1. *Pour bébés* (Nourrissons et jeunes enfants),
N° 2. *Pour enfants* (de 5 à 13 ans environ),
N° 3. *Pour adultes.*

Le **Révulsif Milko** détermine une Vaso-dilatation intense sans provoquer de phlyctènes. *Ne tache ni n'altère les téguments*, d'où répétition à volonté des badigeonnages. Pas d'action lacrymogène, ni sternutatoire. Odeur agréable.

Action secondaire: Antisepsie pulmonaire par absorption cutanée des essences et élimination bronchique.

Indications. — Rhume, Bronchite, Broncho-pneumonie, Coqueluche, Pleurite, Pleurésie.

Laboratoire H. CLUZEL

60, Cours Emile-Zola — LYON Villeurbanne

RHAGADINE BRACQUEMOND

Forme. — Pommade en tubes.

Propriétés thérap. — La *Rhagadine*, à base d'un mélange de Kératine, d'une innocuité absolue, possède des propriétés durcissantes assez grandes pour raffermir l'épiderme le plus délicat ; mélangée à des corps gras, maintient à l'épiderme toute sa souplesse sans atténuer en rien les propriétés spécifiques de la substance médicamenteuse agissante.

Indic. thérap. — Gerçures des seins, Erythèmes des nouveau-nés, Fissures anales chez les hémorroïdaires, Ulcères variqueux, Brûlures, Plaies déchiquetées ou par arrachement.

Échantillons sur demande adressée au :

Laboratoire BRACQUEMOND

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccin curatif antigonococcique.

Constitution. — Corps bacillaires rigoureusement stérilisés et enrobés dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver inaltérés jusqu'au niveau de l'intestin, où leur absorption détermine un processus naturel de défense organique.

Indications. — Agit efficacement contre tous les états infectieux, d'origine gonococcique chez l'homme et chez la femme (blennorragie, orchite, métrite, salpingite, salpingo-ovarite, rhumatisme gonococcique).

Doses. — 4 à 6 sphérules par jour, loin des repas. Aucune réaction locale ni générale.

Produits spéciaux des **Laboratoires A. LUMIÈRE**

M. SESTIER, Pharmacien

9, cours de la Liberté — LYON

RHÉSAL VICARIO

Succédané inodore du salicylate de méthyle. Liquide rapidement absorbable par la peau, sans provoquer la moindre irritation cutanée.

Action prompte et durable.

Mode d'emploi :

En onctions, deux à trois fois par jour, en recouvrant de flanelle ou même de taffetas gommé.

Indications :

Rhumatismes. Goutte. Névralgies.

Laboratoire VICARIO

17, boulevard Haussmann — PARIS (IXe)

RHIZOTANIN CHAPOTOT

Composition. — Tanin physiologique vivant directement assimilable, sels de chaux et de magnésie.

Forme. — Cachets : pour *adultes*.
Poudre : pour *enfants*.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, états tuberculeux et prétuberculeux, états de consomption, bronchites chroniques.
Neutralisation des toxines.
Consolidation du terrain affaibli.
Amélioration rapide des accidents diarrhéïques.
Exaltation des réactions défensives de l'organisme.

Posologie. — Cachets 4 à 6 par jour.
Poudre : 2 à 4 cuillères mesure par jour, dans de la confiture ou du miel.

Laboratoire AUBRIOT

56, Boulevard Ornano,
18 et 20, Rue Championnet, PARIS (XVIIIe).

Agent général pour la Belgique
A. CHOCAT, 86, rue du Méridien, Bruxelles.

RHODAZIL

(Benzoate de Benzyle U. R.)

Antispasmodique
Non toxique, parfaitement toléré

Indications. — *Asthme vrai, Hypertension, Dysménorrhée, Coliques néphrétiques et hépatiques, Mal de mer*; Hoquet persistant, Coqueluche, Spasmes de l'estomac et du pylore, Vomissements des nourrissons, Entérospasmes, Spasmes de la vessie, etc.

Présentations. — 1° *Rhodazil Solution:* flacon compte-gouttes de 30 cc.
2° *Rhodazil Capsules:* Étui de 50.

Posologie. — *Rhodazil Solution : Nourrissons et Enfants:* IV gouttes par année. *Adultes:* Une demi-cuillerée à café pour une dose renouvelée toutes les 3 ou 4 heures.
Rhodazil Capsules: Pour adultes seulement : 2 capsules toutes les 3 ou 4 heures.

Laboratoire des Produits
USINES DU RHONE
21, Rue Jean-Goujon, PARIS (VIII[e]).

RHOFÉINE

Acide acétylsalicylique U. R.... 0 gr. 50
Caféine..... 0 gr. 05

Comprimés : Tube de 20.
Cachets : Étui de 10.

Analgésique tonique.

Agit comme l'Acide acétylsalicylique mais soutient le cœur.

La *Rhoféine* doit être préférée chaque fois que par suite de l'état de dépression du malade ou de la prolongation du traitement, l'administration d'un tonique est indiquée.

Indications. — *Grippe*, Fièvres éruptives, Asthénie cardiaque des maladies des pays chauds, Migraines, Névralgies faciales.

Posologie. — 1 à 6 comprimés ou cachets par jour.

Laboratoire des Produits
USINES DU RHONE
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII[e])

RHOMNOL

$C^{36}H^{49}N^{15}P^{10}P^{4}$

A base d'acide nucléinique pur et de nucléophosphates naturels.

Indic. thér. — Puissant reconstituant du noyau cellulaire, antineurasthénique de choix, indiqué dans toutes les affections dyscrasiques consomptives.

Doses et mode d'emploi. — *Pilules* à 0,05 : 4 à 6 par jour aux repas. *Saccharure* (granulé) 0,10 par cuill. à dessert; une cuill. à dessert aux repas, pour adultes; moitié ou quart pour les enfants, suivant l'âge. *Ampoules* 1 cc. (0,05 de nucléinate de soude par cc.) pour injections intramusculaires de préférence (Spécialement indiquées dans les maladies infectieuses aiguës).

Dr M. LEPRINCE
62, rue de la Tour — PARIS (XVIe)

RICÉYL BILLAULT

Traitement efficace de la constipation.

Forme. — Poudre.

Composition :

Huile de Ricin	40 gr.	pour 100 gr.
Magnésie	40 gr.	
Lactate de Magnésie	5 gr.	
Excipient : Sucre	15 gr.	

Le RICÉYL agit tout à fait différemment des autres laxatifs. A ces derniers, on demande de produire leur effet du soir au matin sans se préoccuper des suites qui se manifestent si l'on en prend chaque jour : entérite, constipation accrue. Tout au contraire, le RICÉYL implique un traitement à suivre et prétend au rétablis-ement normal des fonctions, grâce notamment à son action sur la sécrétion biliaire. Le plus souvent d'ailleurs, après un, deux ou trois jours, on peut diminuer puis espacer les doses. Une véritable rééducation de l'intestin est ainsi obtenue rapidement.

Faisons observer que le traitement par le RICEYL n'est pas onéreux, par le fait que l'on espace les doses pour un résultat durable.

Mode d'emploi. — Le RICEYL s'administre dans du lait, du café, ou du café au lait sucré, chaud, le matin à jeun ou le soir au coucher.

Adultes. — Dose purgative : 3 à 4 cuillerées à café. Dose laxative : 1 à 2 cuillerées à café.

Enfants. — Bébés, à partir du sevrage, 1/2 cuillérée à café ; de 3 ans à 6 ans, 1/2 cuillerée à café ; de 6 ans à 12 ans, 1 à 2 cuillerées à café.

Laboratoires L.-G. TORAUDE O.✻O.I.Q
Docteur en pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de médecine,
22, rue de la Sorbonne, Paris (Ve).
Dépôt et Agence générale de vente des Produits pharmaceutiques spécialisés BILLAULT
R. C. Seine 218758 B.

RICIGEL

Huile de Ricin

Sous une forme nouvelle et agréable.

Forme. — Gelée de fruits contenant 90 0/0 d'huile de ricin fraîche, 2 0/0 agar-agar, 8 0/0 sirop de fruits.

Goût agréable, spécialement indiqué pour femmes et enfants.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes celles de l'huile de ricin.

Indications. — Toutes celles de l'huile de ricin.

Doses. — 2 à 3 cuillerées à café à jeun produisent trois ou quatre heures après des selles molles, sans coliques. Cette dose pour les enfants est moindre et, chez les adultes, peut être doublée pour obtenir une véritable purgation.

ROBERTS et Cie, Pharmaciens,
5, rue de la Paix. Paris.
Central 69-86.

RIODINE

$(C^{18}H^{33}O^{2})^{3}(I\,H)^{3}C^{3}H^{6}$.

Composition. — Ether glycérique iodé de l'acide ricinoléique contenant environ 20% d'iode.

Forme. — Flacon de 50 perles, Chacune représentant l'action de 0,20 cgr. environ d'iodure alcalin.

Propriétés Physiologiques — Médicament iodo-organique type, directement et totalement assimilable. *Action prolongée et durable* sans iodisme.

Pour injections intraveineuses ou intramusculaires, voir **Néo-Riodine**. mêmes applications : *action rapide et intensive*.

Indications. — Artério-sclérose, myocardites chroniques, hypertension etc... Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme, etc... Obésité, rhumatisme chronique, scrofule, syphilis, et dans toute affection où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

Doses. — 2 à 6 perles par jour avant les repas.

Prix : 10 francs.

LABORATOIRES P. ASTIER
41 à 47, rue du Docteur-Blanche, Paris (XVIe).

ROB OBERLIN

Hérédo-spécificité et cure d'entretien.

Par cuillerée à café HgI^2 un tiers de cgr. NaI 0.017
Par cuillerée à dessert HgI^2 un demi-cgr. NaI 0.025
Par cuillerée à soupe HgI^2 un centigr. NaI 0.05

Prescription, en moyenne :

1 an et au-dessous : 1/3 de cuillerée à café par jour.
2 ans : 1/2 cuillerée à café par jour.
3 et 4 ans : Une cuillerée à café par jour.
5 à 12 ans : 1 à 2 cuillerées à dessert par jour.
12 à 17 ans : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.
Adultes : de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Forme agréable à absorber et présentation discrète.

Laboratoire OBERLIN
J. TINARDON, Pharmacien de 1re Classe de l'École Supérieure de Paris
17, rue Cadet, PARIS

ROYÉRINE DUPUY

Poudre digestive absorbante et recalcifiante en cachets.

Compos. — Pepsine extractive : Pancréatine extractive; Sous-carbonate de bismuth, Phosphate, Carbonate de chaux et Magnésie lactosée.

Avantages. — La pepsine et la pancréatine associées à une poudre non fermentescible, antiputride, comme le carbonate de bismuth, se conservent indéfiniment. Absorbant de premier ordre, antiacide, ne provoque pas de constipation. Recalcification assurée.

Indications. — Dyspepsies à forme hypersthénique. Gastralgies. Fermentations secondaires. Entérites aiguës et chroniques. Diarrhées profuses des tuberculeux. Eruptions provenant de troubles digestifs (Urticaire).

Dose. — 2 à 8 cachets par jour.
En boîtes de 40 cachets.

LABORATOIRE de THÉRAPEUTIQUE des VOIES DIGESTIVES J. LAUMONIER
223, rue Saint-Martin, Paris

ROZODERME

Le *Rozoderme* est une pommade **rose** à base d'*essences végétales antiseptiques* (Lucas-Championnière) et de substances chimiques inoffensives destinées à créer et entretenir un milieu favorable à la réfection des tissus. Présentation en tubes.

Propriétés. — Le *Rozoderme* calme la douleur et l'irritation, aseptise les plaies en détruisant les germes nocifs, stimule la vitalité des tissus et active la cicatrisation. Convient parfaitement pour la toilette journalière des jeunes enfants.

Indications. — Erythème fessier, feux de dents des nourrissons, gerçures du sein, brûlures et diverses formes d'eczéma : aigu, chronique ou variqueux, dermites toxiques, zona intercostal, etc.

Mode d'emploi. — Appliquer une couche légère sur la partie malade, préalablement lavée et séchée, recouvrir de gaze et renouveler le pansement toutes les vingt-quatre heures.

Laboratoire du ROZODERME
11, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV^e^)

RYTHMOSYSTOL

Marrube blanc, 4/5 ; *adonis vernalis*, 1/5.
Formes, Dragées et Gouttes.

Propriétés. — Régularisation du Rythme cardiaque (*extrasystoles*). Pas d'accumulation. Pas de contre-indications, aucune toxicité.

Posologie. — *Dragées :* 10 à 12 par jour.
Gouttes : 60 par jour.

COMTE, Pharmacien
60, rue Saint-Guilhem
MONTPELLIER.

SALÈNE CIBA
(et SALÉNAL CIBA)

Ethers méthyl et éthyl-glyco-salicylique possédant, à un haut degré, les propriétés analgésiques du salicylate de métnyle, mais ayant sur ce dernier l'avantage de l'absence d'odeur et de toute action irritante.

Indicat. — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, Lumbago, Torticolis, Névrite rhumatismale, Goutte, Sciatique, etc.

Doses. — Se formule magistralement, pur ou en liniment par 5 ou 10 gr.

Le SALENAL (pommade au Salène) est vendu en tube de 30 gr. Prix : 10 fr.

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, place Morand — LYON

SALICAIRE DAUSSE

Traitement de l'entérite sous toutes ses formes.

Formes. — *Fondant de salicaire* contenant 0 gr. 15 d'extrait de salicaire par 5 gr. de granulé.
Extrait fluide de Salicaire Dausse.

Indications. — *Diarrhée infantile, diarrhée tuberculeuse, dysenterie amibienne, dysenterie bacillaire, entérites.*

Posologie. — *Fondant de salicaire :*
ADULTES : 5 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : 1/2 à 5 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Extrait fluide de Salicaire Dausse :
NOURRISSONS : XX gouttes 3 fois par jour.
ADULTES : 3 à 6 grammes par jour.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot, Paris (IV^{e}).

SALINS DU JURA

Station hydrominérale classée par l'Académie de Médecine de Paris.

Ses Produits Thérapeutiques naturels pour le traitement à domicile :

EAUX MERES CRISTALLISÉES

(Gynecomer)

Forme : Cristaux.

Propriétés Thérapeutiques. — Résorption des exudats et engorgements, décongestion et mobilisation des organes, correction des déplacements vicieux ; élimination des produits pathologiques.

Indications. — Traitement des Métrites et Salpingites, subaiguës et chroniques, fibrômes, déviations utérines, cellulites pelviennes, troubles menstruels, suites de couches.

Doses. — 1 à 4 cuillerées à soupe par litre d'eau bouillie, chauffée à 38-40°C à prendre en irrigation vaginale, à faible pression, dans la position allongée à observer encore une heure après.

SELS POUR BAINS

(Iurbainsel)

Forme : cristaux.

Propriétés Thérapeutiques. — Augmentation des échanges moléculaires, activation de la vie cellulaire, action modificatrice sur le milieu sanguin et lymphatique.

Indications. — Anémie, Débilité, Rachitisme, Lymphatisme, chez les enfants.
Asthénie, chez les adultes.

Doses. — 10 à 20 grammes par litre d'eau chauffée à 36° C au maximum, pour un bain de 10 à 20 minutes.

EAUX MERES LIQUIDES

Forme : Liquide.

Propriétés Thérapeutiques. — Action résolutive et décongestionnante.

Indications. — Adénites, Adénopathie, Ostéite, Affections ganglionnaires osseuseset articulaires.

Doses. — En compresses, pures ou diluées.

Agence Générale :
11, Avenue de l'Opéra, Paris. R. C. S. 235623.

SALSANOS

A base de sels de soude (sulfate, phosphate, tartrate, citrate)

Forme. — Sel granulé, effervescent, soluble et d'un goût agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Maintient l'alcalinité du sang, empêche celle de l'urine, diminue l'acide urique et participe à son élimination, aide à la dissolution des urates et des oxalates, active la combustion des graisses.

Indications. — Artério-sclérose, Pléthorisme, Gastralgie, Arthritisme, Rhumatisme, Goutte, Coliques hépatiques et néphrétiques, Maux de tête, Troubles digestifs. Obésité et en général toutes les affections du foie et des reins.

Doses. — Une à trois cuillerées à café dans un 1/2 verre d'eau le matin à jeun.

ROBERTS & Cie, Pharmaciens
5, rue de la Paix — PARIS

SALUBRINE PHÉNIX

Liquide et comprimés.

Composition. — Antiseptique puissant à base de formolsulfonate de soude et de thymol.

Formes pharmaceutiques. — Solution inodore miscible à l'eau ; d'odeur agréable, ne tachant pas le linge. (Comprimés.)

Indications. — Gynécologie, accouchements, pansements, hyperhydrose.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe ou 2 à 4 comprimés par litre d'eau. (Usage externe.)

Laboratoire P. MAUCHANT
14, rue de Birague — PARIS (IVe).

SALVATYL

Prophylaxie antivénérienne individuelle

Le Salvatyl est une pommade à base de Protochlorure de Mercure léger et dissociable, polyvalent, efficace contre les infections gonococcique et tréponémique ; doit être utilisé le plus tôt possible après un contact suspect, au plus tard dans les douze heures consécutives ; agit en surface et en profondeur. Le Salvatyl se présente en tube-canule pour l'application de la pommade dans le canal de l'urètre, sur la muqueuse balano-préputiale et les écorchures des parties génitales. Le Salvatyl a été expérimenté avec succès dans l'Armée Métropolitaine, les équipages de la Flotte, les Colonies ; est adopté par le Ministère de la Marine et par le Ministère des Colonies.

LABORATOIRE J. GAUTIER

24, rue Ponthieu, Paris (VIII^e^).

SALVENASE LEGOUX

Composition :

Traitement interne.

A. Comprimés non enrobés se désagrégeant très rapidement ; constitués de :
- Extraits secs : Marrons d'Inde (stabilisé), Cupressus, Hamamelis, Viburnum, Boldo
- Poudre de glandes : Surrénales, Thyroïdes, Ovaires

B. Granulé aromatisé soluble dans l'eau, de citrate de soude pur.

Traitement externe.

Sels pour bains à base de :
- Sulfate de potasse et d'alumine
- Hydrochlorate de soude
- Carbonate de soude acide.

Indications. — Traitement complémentaire de la cure A BAGNOLES DE L'ORNE, ou à défaut son meilleur succédané.

Mode d'emploi :

Traitement interne.
1° matin à jeun, une cuillerée à café pleine de granulé, dissous dans un verre d'eau.
2° A chaque repas de midi et du soir, prendre 2 à 3 comprimés.

Traitement externe.
1 bain ou 2 par semaine dans lequel on aura fait dissoudre le contenu d'une boîte Salvenase (sels pour bains).

Laboratoires LEGOUX, frères

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

Anciennement, 10, rue de Turenne, Paris (IV°).

SALYPTOL NARTY

Traitement de la Grippe, de la Coqueluche et des maladies des Voies respiratoires.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament héroïque, calmant énergique de la toux, antifébrifuge de premier ordre, médicament antigrippal et anti-bronchitique, par excellence.

Indications :

Laryngites. Trachéites. Rhumes vulgaires. Bronchites aiguës. Bronchites chroniques dites négligées. Affections pulmonaires. Grippes et ses formes. Coqueluche et toutes les toux de l'enfant.

Deux formes :

Élixir (adultes) : 4 à 5 cuillerées à dessert par 24 heures.
Gouttes (enfants) : 10 gouttes par jour et par année d'âge.

Laboratoire Georges TINARD
134, Boulevard Pereire — PARIS (XVII^{e})

SALYSÉRUM

du Docteur Jules SÉJOURNET

Composé cosalycilé

(*Communication Académie de Médecine.*)

Forme. — Ampoules de 2 cc. d'acide salicylique *indolore*.

Indic. thérap. — Rhumatisme aigu ou subaigu, Pleurodynies, Torticolis, Lumbagos, Rhumatisme gonococcique, Sciatique, Goutte.

Doses. — 1 à 4 ampoules injectées au point douloureux.

Laboratoires de Biologie et de Physiologie appliquées
DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

SAMBUL

Médicament végétal, *sans colchique*.

Composition :

A base d'un suc extrait des baies du Sambucus Ebulus. Désodorisé.

Indications :

Goutte ; rhumatismes ; sciatique ; névralgie ; lumbago, etc.

Posologie :

Une cuillerée à café matin et soir, avant et à distance des repas. *N'est pas toxique* ; pas de contre-indications. Traitement à prolonger dans les cas chroniques rebelles de prime abord. Cures ininterrompues de 1 à 3 flacons.

Littérature et spécimens médicaux sur demande

Société des Laboratoires du SAMBUL

ÉVREUX — (Eure)

SANAS

Composition.

Extrait glycériné concentré de foies frais de morue. Produit vitaminé, sans trace d'huile.

Préparation.

Sur les lieux mêmes de la pêche, dans les laboratoires du *Sanas*, à Saint-Pierre, Miquelon.

Formes.

1° Gouttes ;
2° Ampoules pour boisson. Spécialement indiquées pour les colonies et pays chauds.

Avantages.

Sans odeur ou saveur désagréables.
Contient sous un faible volume, les principes actifs des foies frais. Se prend aussi bien l'été que l'hiver.

Indications.

Toutes celles de l'huile de foie de morue. Rachitisme. Prétuberculose. Anémie. Convalescence des maladies infectieuses. Adénopathies. Inappétence.

Posologie.

Enfants : Dose journalière : II à IV gouttes par année d'âge.

Adultes : Dose journalière : L à LX gouttes.

Mode d'emploi.

Une demi dose journalière avant chacun des deux principaux repas, dans un peu de lait, de bière, de vin, de potage ou mélangée à un aliment quelconque.

A. WELCKER et Cie

72, rue du Commerce — PARIS (XVe)

SANEX-INHALANT

Composition. — Liquide volatil antiseptique, à base d'essences aromatiques de pin sylvestre, de thym, de menthe, de camphre, de melaleuca de Gomène, d'eucalyptus, etc. Présenté en tube stilli-gouttes aluminium.

Avantages. — Permet de faire de très fréquentes inhalations antiseptiques sans appareil spécial ; il suffit de verser quelques gouttes de SANEX-INHALANT sur un mouchoir, et de respirer fréquemment les vapeurs qui se dégagent pendant plusieurs heures. Ne tache pas le linge. Odeur agréable.

Indications. — Affection du nez, de la gorge et des bronches ; en particulier Coryza, Sinusite, Rhume des foins.

Sur demande, envoi d'un spécimen à MM. les Docteurs.

Laboratoire BOISSY

49, rue Hoche, COURBEVOIE, près Paris.

Dépôt : Pharmacie MANTOUT, 3, rue de Scribe, PARIS

SANGUIL

Reconstituant complet.

Composition. — Association de glycérophosphate de soude, phosphate tricalcique, fluorure de calcium, nucléinate de manganèse, oxalate de fer, méthylarsinate de soude, kola fraîche totale, noix vomique totale, surrénale, corps thyroïde.

Action thérapeutique. — Stimule la cellule nerveuse. Excite la nutrition. Régénère les globules sanguins. Tonifie l'organisme. Assure la réminéralisation complète par ses fixateurs opothérapiques.

Formes. — Granulé de goût agréable. Cachets.

Mode d'emploi :

Cachets : Un cachet avant chacun des trois repas.

Granulés :

Moins de 12 ans : deux cuillerées à café par jour.
De 12 à 18 ans : trois cuillerées à café.
Adultes : trois cuillerées à dessert.

A prendre au début des repas.

Laboratoires du SANGUIL
12, rue Saint-Gilles, Paris (III^{e}).

SANOFORMINE

Composition. — Bicarbonates alcalins, trioxyméthylène, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, menthol et essences aromatiques.

Formes. — Comprimés de dissolution facile et rapide dans l'eau tiède ou froide.

Propr. thérap. — Antiseptique, bactéricide, désodorisant puissant, astringent, déconges-tionnant et analgésique.

Indications thérapeutiques et posologiques

1° Toilette intime : 1 à 2 comprimés par litre

2° Métrites, leucorrhée, salpingites, etc., 2 à 3 comprimés par litre.

3° Désodorisant : 12 comprimés pour un bain de pieds quotidien. — 10 comprimés par litre en lavage (plis de l'aine, creux de l'aisselle.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER
1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI[e])
A Bruxelles :
LE MARINEL, pharmacien, 46, rue du Trône.

SANOGYL

Pâte Dentifrice antispirillaire pour prévenir et traiter les Pyorrhées alvéolaires Gingivites, Stomatites simples, mercurielles, bismuthiques, etc.

SANORAM

Antiseptique puissant, en comprimés : ne coagule pas l'albumine. Recommandé en Chirurgie générale, traitement des brûlures, soins de la bouche, toilette intime, etc., etc.

" LA BIOTHÉRAPIE "
3, Rue Maublanc PARIS (XV[e])
Téléph. : Ségur 05-01

SANTAL-MIDY

Composition :

Essence de Santal pure obtenue par la distillation du bois de Santal citrin de Bombay, préférable au Copahu, au Cubèbe et à l'essence de térébenthine.

Forme. — Capsules.

Indications :

Blennorrhagie, Inflammation de la vessie, Néphrite suppurée, Catarrhe de la Vessie, Catarrhe vésical des vieillards, Maladie de Bright, Cystite aiguë, Coliques néphrétiques.

Doses :

Dès que la maladie est déclarée, 10 à 12 capsules le premier jour. Augmenter de 3 à 4 capsules les deuxième et troisième jours. Diminuer progressivement la dose.

Diviser les doses en quatre parties que l'on prend à distance égale et chaque fois un quart d'heure avant les repas.

Laboratoire de Pharmacologie Générale
Dr Ph. CHAPELLE, 8, rue Vivienne — PARIS

SANTAL MONAL

au bleu de Méthylène

Forme. — Capsules.

Compos. — Chaque capsule contient :
Essences balsamiques : 0 gr. 16
Bleu de Méthylène : 0 gr. 02

Dose. — 4 à 10 capsules par jour.

Action. — Antigonococcique, Antiseptique, Analgésique, Diurétique. Le plus actif et le mieux toléré des produits préconisés pour le traitement des Affections des Voies Urinaires.

Particularité. — Colore les urines en bleu.

Laboratoires MONAL & Cie
6, rue Bridaine — PARIS

SANTHÉOSE

A base d'une diméthylxantine irréprochablement pure, associée selon les cas au phosphate de soude, à la caféine ou au benzoate de lithine.

Forme :

Se présente en cachets en forme de cœur (dosés à 0,50 de principe actif) et existe sous 4 variétés : 1° *Santhéose* pure : Affections cardio-rénales, albuminurie. 2° *Santhéose* phosphatée : Scléroses, convalescences. 3° *Santhéose* caféinée : asthénie, asystolie, infections. 4° *Santhéose* lithinée : artério sclérose, rhumatisme, goutte.

Dose. — 1 à 4 cachets par jour.

Propriétés thérapeutiques :

Diurétique, hypotenseur, toni-cardiaque, antitoxique.

Indications :

Toutes les affections justiciables d'un diurétique rénal direct.

Dépôt général :

4, rue du Roi-de-Sicile — PARIS (IV°)

SAPOLAN

Onguent de Naphte spécial
Spécifique des Prurits. — Eczémas.
Psoriasis. — Lichens.

Sapocrème. — Crème de SAPOLAN. Adoucissante, antiprurigineuse. Dermites aigues.
Sapocade. — Sapolan et Huile de Cade. Psoriasis. Séborrhée, Sycosis.
Lait de Sapolan.— Erythèmes.
Lait de soufre-Sapolan : Acné.
Lait de Cèdre-Sapolan : Pityriosiset Séborrhée du cuir chevelu.
Poudre de Sapolan : Dermites aigues.
Sapo-pâte. — Pâte de Lassar au Sapolan.
Savon de Sapolan : Savon surgras au Sapolan : Peaux irritables.

Laboratoire R. CAVAILLÈS
34, rue de Turin — PARIS (VIII°)
Détail: 116, bd Haussmann et toutes pharmacies.

SAVONS Aᵉ. MOLLARD

SAVONS MOLLARD A TOUS MÉDICAMENTS

SAVONS SULFUREUX DE TOILETTE Aᵉ. MOLLARD

SAVONS FLUIDES MOLLARD
pour les soins du cuir chevelu
(cèdre, cade, sulfureux, panama)

LOTION Aᵉ MOLLARD A. LA PILOCARPINE

SAVON DENTIFRICE MOLLARD

POMMADE ALCALINO-SULFUREUSE MOLLARD

CRÈME SULFUREUSE DE SAVON MOLLARD
(affections squameuses du cuir chevelu)

Émile LANG et Cie
2, rue du Marché-des-Blancs-Manteaux
PARIS (IVe)

SAVON PÉRUSOL

Composition.—Baume du Pérou, Benjoin.
Propriétés. — Neutre, Balsamique, Antiseptique, adoucissant.
Formes et Indications :
a) *Savon de Toilette :* Toilette quotidienne, soins hygiéniques de la peau et des muqueuses.
Dermatoses superficielles. — Rougeurs, Acnés, Gercures, Engelures Dartres.
b) *Savon pour la barbe :* Sycosis, Dermites irritatives, Acné.
c) *Savon Liquide :* Chirurgie, Gynécologie, Soins de la Chevelure.

Laboratoires Vendel et Lescène frères
58, Rue de Vouillé — PARIS (XVe)
Téléphone Vaugirard 08.19

SCILLARÈNE "SANDOZ"

Compos. — Glucoside cristallisé, principe actif isolé du Bulbe de la Scille.

Forme. — Comprimés à 0 millig. 8 de substance active : solution à 1/2000, ampoules p. injections intramusculaires profondes à 1 cc. dosées à 0 gr. 0005.

Propriétés. — Produit pur, cardiotonique et diurétique. Pas d'irritation rénale ou gastrique. Pas d'accumulation.

Indications. — 1° Remplace la digitale quand elle n'agit pas ou n'agit plus ; 2° Maintient la compensation ; 3° Puissant diurétique dans les néphrites, *le diurétique azoturique vrai*.

Posologie. — 1/2 à 2 ampoules par jour, 1 comprimé ou XX gouttes 2 à 8 fois par jour.

Produits SANDOZ
3 et 5, rue de Metz. — PARIS (X°)
Dépôt général et Vente :
Usine des pharmaciens de France.
125, rue de Turenne — PARIS (III°)

SCLÉRAMINE DAUSSE

(Cachets d'iode dissimulé).

Iodométhylate d'hexaméthylénetétramine.

Produit cristallisé organique contenant 45 % d'iode dissimulé et permettant l'administration d'importantes quantités de ce métalloïde sans crainte d'iodisme. C'est, en outre, un antiseptique interne puissant par son radical hexaméthylènetétramine.

Formes. — Cachets dosés à 0 gr. 25 de ce produit.

Indications. — Artério-sclérose, goutte, rhumatismes chronique et infectieux, rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme blennorrhagique, sciatique, tuberculose pulmonaire, emphysème, arthritisme, tertiarisme, tabès, myélites, hypertension.

Posologie. — *Cachets.* — 2 cachets par jour, par périodes de 15 jours.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot, Paris (IV°).

SCLÉROSÉRUM

Traitement des Varices et des Hémorroïdes par les injections sclérosantes.

Formule. — Nouvelle formule à base de sels doubles de Quinine et d'Urée, en milieu hypersclérosant.

Indications, technique et posologie. — Demander à notre Laboratoire l'opuscule traitant ces questions et contenant quelques-unes des observations prises dans les hôpitaux de Paris.

Avantages sur les autres solutions. — 1° Le plus actif des sels employés ; 2° absolument indolore pendant et après l'injection (jamais de crampe) ; 3° le moins réactionnel pour les tissus périvasculaires ; 4° nullement escharrotique à des doses permettant des scléroses étendues et complètes ; 5° sa présentation permet d'obtenir automatiquement tous les taux de solution désirables.

Laboratoires HOURQUET et VIENNE
114, rue du Temple — PARIS (III°).

SCLÉROVEINE HARDY

Traitement sclérosant des varices par injections intra variqueuses (méthode du professeur Sicard).

Formes : Ampoule S. au salicylate de soude (5 c. c. à 10, 20, 30, 40 %). Ampoule C, au chlorhydrate de quinine (3 c. c. à 40 cgr.).

Indications : Tous les états variqueux.

Mode d'emploi : Consulter la notice spéciale.

Pharmacie de GENÈVE
142, Boulevard Saint-Germain,
PARIS

SCUROCAÏNE

Novocaïnum Codex français 1908.

Le moins toxique des succédanés de la cocaïne.

Solutions à tous titres, additionnés ou non d'Adrénaline U. R, pour tous usages anesthésiques :

Anesthésie par infiltration.
— tronculaire.
— rachidienne.
— épidurale.
— dentaire.
— oculaire.
— rhino-laryngologique.

Comprimés dosés à 0 gr. 05 avec ou sans Adrénaline U. R.

Scurocaïne cristallisée (Chlorhydrate).
Nitrate de Scurocaïne.
Scurocaïne basique.

Laboratoire des Produits
USINES DU RHONE
21, Rue Jean-Goujon, PARIS (VIIIe).

SCUROFORME

(Paraminobenzoate de Butyle normal)
Anesthésique topique,
insoluble, des plaies et des muqueuses
Non toxique *Non irritant*

1° **Scuroforme en nature.** — Pour être employé en pulvérisation, en insufflation, pour être associé aux pommades, lavements : Plaies douloureuses, Brûlures, Rectites, Colites, Affections oto-rhino-laryngologiques.

2° **Poudre lactosée à 1/10e.** — Pour être employée en pulvérisation et insufflation : Affections rhino-laryngologiques, Dysphagie.

3° **Pastilles chocolatées à 0 gr. 002.** — Pastilles "RHODIA" spécialement indiquées contre : Stomatites, Angines, Pharyngites, Enrouements des fumeurs et des orateurs. Toutes affections douloureuses relevant de la Stomatologie.

4° **Comprimés carbonato-calciques à 0 gr. 05.** — N'exercent aucune influence sur les phénomènes de la digestion. Douleurs gastriques par ulcération.

5° et 6° **Solution huileuse** à saturation ; **Solution glycéro-alcoolique** au 1/1 0 ; Anesthésie par badigeonnages ; usages dentaires.

Laboratoire des Produits
USINES DU RHONE
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIIIe)

SÉCACORNINE "ROCHE"

Compos. — Tous les principes actifs de l'ergot de seigle (*secale cornutum*) sous une forme soluble et injectable.

Action thérap. — Stable, d'action sûre, régulière et constante, c'est un vaso-constricteur puissant, donc un hémostatique interne énergique, décongestionnant, augmentant la tension artérielle et régularisant le pouls.

Indic. Thérap. — a) *Action hémostatique.* Toutes les hémorragies internes, hémoptysies, hématémèses, entérorragies, ménorragies, etc. — b) *Action toni-cardiaque.* Myocardites infectieuses. — c) *Action décongestive.* Congestion pulmonaire, états congestifs de l'encéphale, congestion éthylique, etc. — d) *Action vaso-constrictive.* Diarrhées, leucorrhée, lochies persistantes, sueurs des phtisiques, etc. — e) *Action sur les fibres musculaires lisses.* — a) *Utérus.* — Atonie utérine, avant, pendant et après les accouchements et les avortements. — Troubles menstruels. — b) *Rectum et vessie.* — Polypes du rectum (injection sous-muqueuse). — Incontinence d'urine, spermatorrhée, etc.

Doses et mode d'emploi. — 1 centimètre cube ou 1 ampoule, ou 40 gouttes, ou 4 comprimés de *Sécacornine "Roche"* agissent comme 4 grammes de seigle ergoté.

Thérapeutique d'urgence. — 2 cc. ou 80 gouttes par voie buccale; ou 2 ampoules par voie hypodermique ou intramusculaire.

Doses moyennes. — 1/2 à 1 ampoule par jour, par voie hypodermique ou intramusculaire ; 20 à 30 gouttes par jour, 1/2 à 1 cc. par jour, par voie buccale ou rectale ; 2 à 4 comprimés par jour, par voie buccale.

Thérapeutique locale. — 2 cc. ou 2 ampoules par jour, en injections intra-utérines (atonie utérine) ; 1 cc. ou 1 ampoule par jour en injection sous-muqueuse (loco dolenti): Prolapsus du rectum.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
21, Place des Vosges — PARIS (IIIe)

SEDATINE CHRISTIAENS

Formule. — Diiodo Salicylate de sodium, 2 g. 10 ; Solution q. s. pour 100 cc. En ampoules stérilisées de 2 cc.

Indications thérapeutiques. — Remplace la *Morphine* dans : Douleurs arthritiques, Sciatique, Lumbago, Névralgies cérébrale et intercostale, Vomissements incohercibles, Crises hépatiques.

Toxicité. — *Nulle*, peut être laissée dans toutes les mains.

Forme. — Boîte de 6 et boîtes de 12 ampoules de 2 cc.

A. CHRISTIAENS
2, rue du Champ-de-Mars, Reims.

SÉDATOSE

Tartrate borico-potassique
du Docteur Andr Gigon

Composition. — Tartrate borico-potassique chimiquement pur.

Forme. — Poudre desséchée.

Indications thérapeutiques. — Epilepsie.

Mode d'emploi et dose. — Cuillère-mesure dosant 50 centigr. : 6 à 10 par jour ; traitement prolongé.

Flacon de 40 gr.

Laboratoire du Doct[r] André GIGON
7, rue Coq-Héron – PARIS (1[er])

SÉDATULINE

Aérophagie-Palpitations

Composition. — A base de passiflore, ballote, cratægus, valériane (plantes stabilisées).

Indications. — Insomnies, états nerveux et spasmodiques, affections du cœur et des vaisseaux de l'estomac et de l'intestin.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café le matin et le soir et la nuit si besoin avec un peu d'eau pure ou sucrée.

Prix : 12 francs.

E. LEROUX

Pharmacien de la Faculté de Paris,
Ex-interne des Hôpitaux
Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Inférieure).

SÉDOBROL "ROCHE"

Extrait de bouillon végétal concentré achloruré et bromuré

Tablettes et liquide :

1 tablette ou 1 mesure = 1 gr. Na Br.

Mode d'emploi et doses :

Adultes : 1 à 5 tablettes ou mesures par jour.

Enfants : 1/2 à 2 tablettes ou mesures par jour, selon l'âge.

Dans une tasse d'eau très chaude, on verse une ou deux mesures de *Sédobrol "Roche"* liquide ou on fait dissoudre une ou deux tablettes : on prépare ainsi instantanément un bouillon particulièrement savoureux que l'on peut prendre à n'importe quel moment de la journée.

Prop. Thér :

Médicament sédatif, hypnotique et calmant donnant des résultats certains et permettant d'imposer un *traitement bromuré* intensif *dissimulé*, tout en rendant agréable le régime déchloruré.

Indic. Thér. :

Insomnies, névralgies, excitabilité, irritabilité, gastralgies, dyspepsies, palpitations, cardiopathies, migraines, spasmes, convulsions, chorées, névroses, épilepsie, etc.

PRODUITS
F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
21, Place des Vosges — PARIS

SEDOGASTRINE

Sédatif des douleurs gastriques.

Formes. Granulé, comprimés (avec bonbonnière de poche).

Composition. — 1° *Substances neutralisantes :*

Hydroxyde de magnésium. Carbonate de calcium léger précipité à froid. Bicarbonate de soude.

2° *Substances modératrices de la sécrétion :*

Phosphate de sodium, Phosphate de calcium.

3° *Substance calmante et antispasmodique :*

Poudre de Ciguë à dose inoffensive, mais suffisamment active.

Propriétés thérapeutiques :

Sédation des phénomènes douloureux gastriques.
Réparation de la muqueuse de l'estomac.
Pas de constipation.
Pas d'accoutumance.

Indications. — Hypersécrétion.
Hyperacidité.
Dyspepsie douloureuse.
Spasmes.
Ulcères.

Posologie. — Après les repas et au moment des douleurs prendre :

Granulé : une cuillerée à café.
Comprimés : deux à quatre jusqu'à sédation.

Laboratoire P. ZIZINE

Dr en Médecine — Dr en Pharmacie.
Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux.
Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux
24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XIIe)

SÉDOL

Association Scopolamine-Morphine.

Mode d'emploi et dose. — 1° **Ampoules** 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures; 2° **Suppositoires** 1 à 2 " supposédol " par 24 heures.

Propr. Thér. — Beaucoup plus actif que la morphine à dose égale.

Indications. — Phénomènes douloureux. Insomnies douloureuses. Cancers. Spasmes. Crises tabétiques. Anesthésie chirurgicale. Accouchements, etc.

Etablissements Albert BUISSON

F. JALOT & Cie

157, rue de Sèvres — PARIS

R. C. Seine 222-705 B



SÉDONEUROL DEHAUSSY

Antispasmodique, Sédatif, Antialgique. Pas d'accoutumance. — Pas de torpeur.

Composition.

Médication de base : Phényl-éthyl-malonyl-urée (gardénal).

Tartrate boricopotassique.

Correctifs et adjuvants : Atropine, Caféine (comprimés blancs), Strychnine (comprimés roses), à très faibles doses.

Médication énergique *renforçant l'une par l'autre l'action sédative* du gardénal et du bore, *permettant un même effet thérapeutique* avec des doses moins élevées de gardénal que lorsque ce dernier est employé isolément, *supprimant les inconvénients* de ce dernier (somnolence, dépression physique et intellectuelle) grâce aux correctifs dont on évite l'accoutumance en alternant leur administration dans les traitements de longue haleine (comprimés blancs et roses).

Formule, posologie et indications établies d'après les travaux de Pierre Marie, Crouzon, Bouttier, Carrière, etc.

Indications.

États spasmodiques. — Traitement de choix de l'*Épilepsie* dans toutes ses formes. — *Maladie de Parkinson* et *Parkinsonisme*. — *Asthme rebelle*.

États d'instabilité nerveuse. — *Insomnies rebelles, Anxiété.*

Algies paroxystiques. — *Migraine, Angine de poitrine.*

Enfants et nourrissons. — Toutes les manifestations spasmodiques de l'*épilepsie*, du *croup*, des *laryngites striduleuses et aiguës, toux persistante des broncho-pneumonies, coqueluche, tétamie, états convulsifs, chorées, tics, vomissements spasmodiques du nourrisson*, etc.

Posologie.

Épilepsie. — Doses progressivement croissantes jusqu'à suppression des crises. Commencer par quatre comprimés chez l'adulte, deux comprimés à cinq ans.

Autres indications.

Adultes, dose moyenne entre 4 et 8 comprimés. — *Enfants*, 1/2 comprimé par année d'âge. — *Nourrissons* (tolérance parfaite), 1/2 comprimé jusqu'à six mois, un comprimé de six à douze mois en deux prises.

(Un comprimé = 2 centigrammes et demi de gardénal).

Laboratoire DEHAUSSY

66, rue Nationale, LILLE

SÉDOSINE

Sédatif du système nerveux.

Action élective sur le système neuro-végétatif.

Association synergique hyperactive :

Dans la *Sédosine*, l'action antispasmodique bien connue de la Jusquiame se trouve considérablement renforcée par la présence du Cratœgus et de la Passiflore, l'association des trois principes végétaux permettant d'obtenir un effet notable avec une dose réduite de Jusquiame.

Le mode d'association médicamenteux n'a, comme on sait, nulle part ailleurs, autant d'importance que lorsqu'il s'agit du Sympathique (Expériences de Danielopolu, de Garrelon, Santenoise et Tinel).

La *Sédosine*, à l'encontre des hypnotiques, agit par un véritable processus de détente et sans recourir à l'intoxication de la cellule nerveuse.

Indications :

États spasmodiques. Excitation nerveuse. Insomnie. Neurasthénie. Psychasthénie. Mélancolie.

Posologie :

Contre l'insomnie : 2 à 3 cuillerées à café prises en une seule fois avant de se coucher.

Sédatif nerveux : Dose moyenne : 1 à 3 cuillerées à café ou davantage dans le courant de la journée, suivant tolérance du malade.

La *Sédosine* se prend en nature ou mieux dans un peu de tisane.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS

Téléphone : Maillot 17-75

SEL DIGESTIF BÉ-ME-CÉ

Poudre à l'État moléculaire et stabilisée.
Spécifique de l'*Hyperacidose*.

Bicarb. de soude, 4 ; magnésie, 1 ; carbonate de chaux léger, 1 ; lactosés et chim. purs par c. à c., 1 cuillerée à café après chaque repas.

PLURIBIASE

Comprimés à 2 noyaux.
Dyspepsies hyposthéniques.

1er noyau soluble dans *l'estomac* : pepsine T. 500, 0,05 ; ext. de belladone, 0,001 ; ext. de jusquiame, 0,001 ; sucre, 0,20. 2e noyau soluble dans *l'intestin* : ext. de boldo, 0,005, bile dépig. et déchol., 0,10 ; pancréatine T. 200, 0,10 ; kinase, 0,10 ; érepsine, 0,10 ; ferments lactiques desséchés, 0,03.

2 comprimés avant chaque repas.

Labor. Gastro-entérologiques ODINOT
21, rue Violet — PARIS

SELENIOL

(Procédé André LANCIEN)

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de sélénium en ampoules de 3 cmc (4 par boîte).

Action thérapeutique. — Le séléniol est une solution limpide de couleur brune ; sous cette forme il n'est pas toxique et possède une affinité notable pour les cellules néoplasiques dont il provoque la liquéfaction, il améliore les troubles fonctionnels et relève l'état général.

Indications. — 1 à 3 ampoules par semaine en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses, dans le traitement des affections cancéreuses, soit seul, soit associé à la Cytuline Couturieux.

Laboratoires CH. COUTURIEUX
18, avenue Hoche — PARIS

SEL HÉPATIQUE U. N. ARQUEVAUX

Composition. — Complexe alcalin hypersolvant de l'acide urique.

Forme. — Poudre blanche entièrement soluble.

Propriétés thérapeutiques. — Lixiviation de l'organisme par osmose isotonique; action désincrustante décuplée analogue à celle des stations thermales de Carlsbad, Contrexéville, Bagnoles. Dissolvant de l'acide urique, éliminateur de toxines. Laxatif. Stimulant des fonctions de l'estomac, du pancréas, du foie, des reins et de l'intestin. Régulateur du métabolisme physiologique.

Indications. — Traitement des troubles dus à l'acide urique (Rhumatisme, Goutte, Gravelle, Névralgies, Lumbago, Sciatique, etc.), de l'Artério-sclérose, des Phlébites et troubles trophiques ; de la Constipation. Anti-acide. Anti-rhumatismal. Lithiases hépatique et rénale.

Posologie. — Une cuillerée à café rase (cinq grammes) dans 200 gr. d'eau, de préférence très chaude à prendre le matin à jeun 25 jours de suite.

Littérature sur demande.

L. ARQUEVAUX

Pharmacien à Étampes (S.-et-O.)

Dépôt :

Office Commercial Pharmaceutique

71, Rue du Temple à PARIS (IIIe)

SEL DE HUNT

Alcalin type

Régulateur normal de l'Acidité gastrique et des Fonctions digestives.

Indications. — Dyspepsies. Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Fermentations acides, de l'Hyper et de l'Hypo-Chlorhydrie.

Forme. — Granulé friable.

Posologie. — Une à une cuillerée et demie à café dans 1/2 ou 1/4 de verre d'eau. Pour les légers malaises ne nécessitant que de petites doses, on peut à la rigueur prendre le *Sel de Hunt* à sec.

Prix au public : 8.50 le flacon

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT

16, Rue de Boulainvilliers — PARIS

(Téléphone : Auteuil 20-21)

SEPTICEMINE CORTIAL

Composition. — Di-formine iodobenzo-méthylée, cristallisée, dialysable, injectable, atoxique, indolore. Aucune réaction locale ou générale.

Propriétés. — Antisepsie intégrale, interne et externe, diffusion extrême jusque dans le liquide céphalo-rachidien. Chute de la température, régulière, complète, définitive. Microbicide et antitoxique ; éliminateur hépatique et rénal.

Indications. — Infections Aiguës médicales : Grippe, encéphalite, bronchopneumonie, fièvre typhoïde et paratyphoïde, Entérites aiguës, Fièvres éruptives, Paludisme, Affections rhino-pharyngées.

Infections Chirurgicales : Septicémies, pyohémies, infections puerpérales, Appendicite, Erysipèle, Anthrax, Ostéomyélites, Péritonites tuberculeuses.

Forme. — Ampoules de 4 cc.

Dose. — Septicémies à marche rapide : 2, 4 et 6 amp. dans les 24 h. Septicémies à marche lente : 1 à 2 ampoules dans les 24 heures.

S'emploie aussi en applications locales et pulvérisations. Pure ou étendue d'eau. Urologie, gynécologie, Suppurations, Tumeurs ouvertes, Ulcérations de l'amygdale, Rhinites.

Stomatologie : pulvérisations alvéolaires et gingivales, injections intra-gingivales, circonscrivant du foyer infectieux.

Laboratoires CORTIAL

15, Boulevard Pasteur. — PARIS

SÉRO-COMPRIMÉS MÉRIEUX

Composition :

A base de sérums polyvalents antidiphtérique, streptococcique, staphylococcique de l'Institut biologique Mérieux Lyon.

Indications :

Préventivement : dans tous les cas de contagion ou d'irritation de la gorge.
Curativement : dans le traitement local des diverses angines.

Mode d'emploi :

Prendre toutes les deux heures et le soir au coucher, un à deux comprimés qu'on laissera fondre lentement dans la bouche en évitant l'absorption trop voisine de liquides ou aliments.

S. SAVIGNEUX

Pharmacie
Dépositaire général
63, rue Victor-Hugo — LYON

SERODAUSSE ANTITOXISENYL

Nature du produit.

C'est un sérum de jeune taureau, traité par du sérum de vieux bœuf. Il contient toutes les hormones circulantes des jeunes animaux et les anticorps des poisons séniles de Carrel, ces derniers apparaissant consécutivement à l'injection du sérum de vieil animal faite au jeune taureau.

Propriétés physiologiques.

Ce sérum, administré à des chapons ou à des vieux coqs, oriente l'animal vers la masculinité : il chante, devient combatif, sa crête se développe et prend un aspect sanglant, l'instinct sexuel s'éveille. Le chapon, en raison de la netteté de ses réactions, sert au titrage physiologique du SÉRODAUSSE.

Effets thérapeutiques.

Chez les vieillards des deux sexes, chez les sujets d'âge mûr, chez les individus jeunes atteints de sénilité précoce, le SÉRODAUSSE produit un effet d'invigoration avec plus grande aptitude au travail physique et intellectuel, de l'euphorie et une orientation du caractère vers l'optimisme.

Mode d'emploi.

Prendre, pendant six jours consécutifs, une ampoule de 15 c.c. le matin à jeun, 30 minutes au moins avant le petit déjeuner, dans un quart de verre d'eau sucrée.

Laboratoires DAUSSE
4, rue Aubriot — PARIS (IVe).

SÉROMA

Sérum granulé, activé, total.

Composition :

100 gr. de Séroma contiennent :

Sérum normal d'équidés..	90 gr. 90
Sucre aromatisé.....	90 gr. 90
Calcium.....	0 gr. 05
Fer.....	0 gr. 30
Manganèse.....	0 gr. 15

Propriétés thérapeutiques. — Sérum total de sang artériel d'équidés soumis à une saignée unique, scientifiquement traité, stérilisé sans coagulation, rendu atoxique, stabilisé par dessiccation et activé par des co-ferments minéraux.

Indications thérapeutiques. — Surmenage, Fatigue cérébrale, Chocs moraux, Dépression, Hémorragies, Hémophilies, Hémoptysies. Dans les Affections chroniques, quelle que soit leur nature (tuberculose, cancer, paludisme, etc.), adjoint à la thérapeutique appropriée, il permet à l'organisme de résister, ainsi que dans toutes les maladies infectieuses.

Doses moyennes :

Adultes : 1 cuillerée à café de granulé deux fois par jour, un quart d'heure avant les repas.

Enfants : demi-doses.

Laboratoires REY
(Ludin) DIJON.

Séroma contient près de son poids de sérum active.

SÉRO-SÉRUM RIVIER

hémostatique
hémopoïétique-tonique,
intégralement désalbuminé.

Le seul sérum de cheval injectable sans danger d'anaphylaxie.

Contient tous les principes actifs (cristalloïdes et lipoïdes) du sérum sanguin.

Formule. — Chaque ampoule de 2 cc. représente 5 cc. de sérum frais de cheval.

Posologie. — Le Séro-Sérum Rivier se présente en ampoules de 2 cc. stérilisées.
Une injection journalière d'une ampoule est la dose suffisante.

Laboratoires RIVIER

26 et 28, rue Saint-Claude — PARIS

SÉRUM ANTI-ASTHMATIQUE de HECKEL

Composition. — Le Sérum de Heckel a pour base un extrait organique pur des glandes surrénales stabilisé dans un liquide isotonique.

Mode d'emploi. — Au moment de la crise, une injection sous-cutanée d'une demi-ampoule ou d'une ampoule.

Action. — L'excitation du pneumo-gastrique spasme les bronches et cause la crise d'asthme. Le sérum de Heckel en excitant le grand sympathique, annihile l'action du pneumo-gastrique et le spasme cesse.

Indications. — Toutes les formes d'Asthme, au moment des crises. Il est contre-indiqué chez la femme au terme de sa grossesse, et chez les cardiaques en imminence d'asystolie.

Présentation. — Sérum de Heckel pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.
Sérum de Heckel infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes - PARIS - Tél. : Wagram 37-64

SÉRUM FERRUGINEUX FRAISSE

Composition :

Glycérophos. de Soude : 0 gr. 10 ; Cacodylate de Fer : 0 gr. 01 ; Cacodylate de Strychnine : 1/2 milligr., pour 1 cm³ d'eau distillée.

Indications :

Dynamogénique puissant : spécifique des anémies et de la chlorose.

Formes :

1° En ampoules, boîtes de 12 ampoules : 16 fr.

2° En gouttes, prix du flacon : 12 fr.

Laboratoires FRAISSE
8, Rue Jasmin, 8 — Paris

SÉRUM HYPOTENSIF FRAISSE

Composition :

Extrait de Gui : 0 gr. 05.
Nitrite de Soude : 0 gr. 01.

Indications :

Contre l'hypertension artérielle, l'artério-sclérose.

Formes :

1° En ampoules, boîte de 12 ampoules : 16 fr.

2° En gouttes, prix du flacon : 12 fr.

Laboratoires FRAISSE
8, Rue Jasmin, 8 — PARIS

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

Composition :

Glycérophosphate de Soude : 0 gr. 10 ; Cacodylate de Strychnine 1/2 milligr. ; pour un cm³ d'eau distillée.

Indications :

Dynamogénique puissant. Active la phagocytose. S'emploie dans l'adynamie et la neurasthénie.

Formes :

1° En ampoules, boîte de 12 ampoules : 16 fr.

2° En gouttes, prix du flacon : 12 fr.

Laboratoires FRAISSE

8, Rue Jasmin, 8 — PARIS

SÉRUM-VÉGÉTAL

du Docteur CUGUILLIÈRE
(antituberculeux)

Composition :

Essences d'ail finement distillées et indolores, sels de chaux d'origine végétale, diastases vivantes soufrées.

Références scientifiques :

Expérimention sur des bovidés sous le haut patronage de M. le marquis de Castellane et sous le contrôle de l'éminent vétérinaire *M. Faure*, *guérisons* reconnues à l'examen anatomopathologique *par le professeur H. Martin-Roux* (hôpital Bichat à Paris).

Académie de médecine (séance du 10 mars 1908.) Travail scientifique : *Guérison de la tuberculose par l'ail*. En vente : Librairie Norbert Maloine, 27, rue de l'École-de-Médecine, à Paris.

Indications :

Tuberculose pulmonaire au début ; 75 % de guérisons.
— — 2e période : 55 % de —
— — 3e période : 25 % de —
(si l'état général n'est pas trop mauvais et que les lésions n'ont pas détruit entièrement la totalité du tissu noble).

Tuberculose ostéo-articulaire (non suppurée)
99 % de guérisons.

Tuberculose ostéo-articulaire (suppurée).
85 % de guérisons.

Posologie :

Le sérum existe sous 3 formes : *Ampoules à 5cm³ (adultes)*. *Ampoules à 2cm³ 1/2 (enfants)*, et *sirop* où le sérum est mélangé à du sirop iodotannique et à de l'arrhénal.

Le sérum végétal du Docteur Cuguillère ne possède aucune *toxicité* et est employé depuis *21 années* avec le plus grand succès par les plus éminents praticiens.

Dans les formes chroniques : *Enfants* : une injection de 2 cm³ 1/2 par semaine, et une cuillerée à café de sirop par jour. *Adultes* : une injection de 5 cm³ par semaine et une cuillerée à soupe de sirop par jour.

Dans les formes aiguës : *enfants* : 2 injections de 2 cm³ 1/2 par semaine et 2 cuillères à café de sirop par jour. *Adultes* : 2 injections de 5 cm³ par semaine et 2 cuillerées à soupe par jour.

Arrêter le traitement par le sérum en période d'accidents congestifs.

(Échantillons permettant un essai loyal.)

Laboratoires CUGUILLÈRE
19, rue des Chalets, Toulouse (France).

SETI

Ampoules jumelées de soufre et d'iode.

Les ampoules jumelées « Seti » contiennent dans une même solution aqueuse le *soufre* et l'*iode*. La teneur en *soufre* est de 2 cg. 6 par injection, soit des centaines de fois plus grande que dans les autres préparations soufrées aqueuses, l'injection est indolore et ne donne aucune réaction locale ni générale.

Indications. — Tous les rhumatismes chroniques, Névralgies rebelles, Sciatique, Lumbago.

Mode d'emploi. — Dans une seringue de 5 c. c. armée d'une aiguille nikelée de 5 cm., aspirer le contenu de l'ampoule colorée, puis aspirer le liquide de l'ampoule blanche jusqu'à décoloration complète. Faire l'injection intramusculaire profonde tous les deux jours, dans la région supéro-externe de la fesse.

Laboratoires P. BRISSON et Cie

114, Avenue Michelet — St-Ouen (Seine).

SIDERARSAN

Réparateur général par excellence, fer et arsenic et glandes endocrines.

Forme. — Sirop. — Comprimés (opothérapie).

Posologie. — 3 cuillerées ou 3 comprimés par jour 0,005 de méthylarsinate de fer + extraits pluriglandulaires et oxyhémoglobine par cuillerée à soupe et par comprimé.

Indications. — Tuberculose, Anémie, Chlorose, Paludisme, Neurasthénie, Surmenage, Troubles de la formation, Convalescence.

Echantillons gratuits sur demande.

A. POURSAIN

Docteur en médecine,

2, avenue des Tilleuls, Melun.

Paris. Téléphone : Opéra 00-45.

SILGUINE

Composition. — Chaque comprimé contient :

0.05 Extrait sec stabilisé de gui de pommier.
0.01 Extrait sec d'aubépine.
0.10 Poudre de prêle.
0.03 Extrait de glandes endocrines mâles.

Action. — La "SILGUINE", à base de produits végétaux particulièrement assimilables, abaisse la tension artérielle, augmente la diurèse, tonifie le cœur. Elle comble le déficit des secrétions endocrines particulièrement important au moment de la ménopause. Elle sature l'organisme de silice et empêche l'apparition de lésions athéromateuses et de l'artério-sclérose.

Indications. — Tous les symptômes de l'"Automnose", hypertension artérielle, artério-sclérose, céphalées, somnolence, vertiges, bourdonnements d'oreilles, troubles oculaires, troubles de la circulation, dyspnée nocturne, dyspnée d'effort, hémorragies, hémorragies cérébrales, accidents rénaux, accidents cardiaques.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés, avant chaque repas, 20 jours par mois.

Laboratoires REAUBOURG
1, Rue Raynouard, PARIS (XVI[e])

SILICYL

Médication de base et de régime des *états artérioscléreux*, empêchant la transformation des éléments élastiques et striés de l'endartère, c'est-à-dire la *lésion initiale* et les altérations consécutives hypertrophiques, hyperplasiques et dégénératives, avec imprégnation secondaire calcaire ou cholestérinée d'un placard athéromateux ou d'une sténose oblitérante.

Principe. — L'adrénaline ne produit plus de lésion athéromatheuse chez les sujets soumis à l'action du silicate de soude. (Professeur Gouget, *P. M., 1911.* — L'injection intra-veineuse inoffensive, abaisse la tension artérielle et ramène à la normale la viscosité sanguine. (Professeurs Sartory, Scheffler et Pélissier, *Acad. Sciences Août 1920.*)

Composition. — Silicates de formule $Si^2O^{12}Na^4$ et K^4, stables, solubles, purs, sans excès de base, bien tolérés et de fabrication très spéciale.

Emploi et doses. — La médication doit être prolongée, de façon tenace et persistante par périodes de 20 jours par mois.

COMPRIMÉS : Titrés à 0,50 de sel de soude et de potasse, 1 à 2 compr. au repas, 3 fois par jour.

AMPOULES : Voie intraveineuse, 1 ampoule par 48 heures (Action rapide : prés cléreux, angor.)

Résultats. — Abaissement de la tension Mm et Ma. Viscosité ramenée à la normale. Hypotension. Elimination chlorurée. Diurèse. Action antiathéromateuse. Disparition de la Dyspnée d'effort et des symptômes cérébraux. Euphorie et augmentation de la vitalité générale.

Indications. — Prés clérose, Artériosclérose. Hypertension. Aortite. Athérome aortique. Sclérose rénale. Angine de poitrine. Endartérite oblitérante progressive. Prophylaxie de l'athérome et de l'hémorragie cérébrale. Troubles cérébraux. Migraines. Vertiges. Paresse intellectuelle. Bourdonnements, etc. Otite scléreuse. Sclérose auriculaire. Troubles oculaires. Presbytie. Fatigue et Sclérose cardiaque. Calcification. Anémie siliceuse. Consolidation accélérée des fractures.

Échantillons — Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P, LOISEAU**
7, Rue du Rocher — PARIS

Laboratoire CAMUSET
18, Rue Ernest-Rousselle — PARIS

SILISODE

Formes. — Granulé.

Comp. — Une cuillerée à café de granulé contient :

Silicate de soude	0,40
Benzoate de lithine	0,10

Dose. — Une cuillerée à café avant les repas.

Action. — Hypotensive, déchlorurante.

Indications. — Maladies de la cinquantaine, Hypertension, Artério-Sclérose, Aortites, Angines de poitrine.

MICHELS
Pharmacien de 1re Classe.
9, Rue Castex — PARIS

SINAHIN

Antidiabétique

Forme. — Pilules de Semen-contra total.

Propriétés :

Traitement sans restrictions trop sévères dans l'alimentation normale.

Formule extraite des travaux d'Avicenne (Communication Académie de Médecine, décembre 1913.)

Posologie :

Trois à quinze pilules par jour.

Laboratoires CARTERET
15, Rue d'Argenteuil — PARIS

LE SINAPLASME

Cataplasme sinapisé instantané

du Dr **Jean FAURE**

LE PREMIER EN DATE – LE PLUS RÉGULIER

LE MOINS CHER — LE MEILLEUR DE TOUS

– ÉVITER LES CONTREFAÇONS –

DUSSUEL et FAURE

AIX-LES-BAINS (Savoie).

SIROP DE BLANCARD

A l'iodure de fer inaltérable
10 cgr. par cuillerée à soupe.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à soupe par jour aux repas.

Propr. Thér. — Agent incomparable d'Hématopoièse.

Indications. — Anémie, Scrofules, Lymphatisme, Chlorose, Leucorrhée, Aménorrhée, Syphilis accidentelles ou constitutionnelles, suite de Grippes infectieuses, etc.

BERTAUT-BLANCARD Frères,

94, Rue de La Rochefoucauld — PARIS

SIROP BRAHMA

Composition. — Sulfogaïacolate de potasse, benzoate de soude, codéine, dionine, aconit, belladone, grindélia.

Action. — Antiseptique puissant, régularise les sécrétions, les diminue. Calme rapidement la toux.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, laryngites, coqueluche, tuberculose au début.

Mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à soupe par vingt-quatre heures, une heure avant ou deux heures après manger, pur ou mieux dans de la tisane.

Laboratoires G. COULLOUX
116, rue du Pont — AUXERRE (Yonne).

SIROP COMPOSÉ AUX HYPOPHOSPHITES "FELLOWS"

Le réminéralisateur par excellence

Compos. — Potasse, chaux, fer, manganèse, sodium, quinine, strychnine.

Indicat. — Anémie, neurasthénie, maladies chroniques, affections pulmonaires, rachitisme, convalescence.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : tonique, 1 cuillerée à café à chaque repas ; stimulant et tonique, 2 cuillerées à café aux repas. — Pour les enfants : De 9 à 12 ans, une demi cuillerée à café ; 5 à 9 ans, un tiers de cuillerée à café ; 1 à 5 ans, un quart.

Nota. — Pour obtenir les meilleurs résultats, avoir soin de toujours diluer le sirop dans de l'eau froide, dans la proportion d'un demi-verre d'eau pour une cuillerée à café de sirop.

Laboratoire ROBERTS & Cie
5, rue de la Paix — PARIS

SIROP FAMEL

Antiseptique. — Lactocréosote soluble. — Cicatrisant, non caustique bien toléré.

Calmant. — Codéine, Aconit.

Récalcificateur. — Lactophosphate de chaux.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes.* — Une cuillerée à soupe le matin, avant déjeuner, et une le soir, au coucher ; délayer dans infusion chaude non sucrée. En cas de besoin, 3e cuillerée à midi.

Propriétés Thérapeutiques. — Calmant de la toux, puissant antiseptique du poumon.

Indications Thérapeutiques. — Affections des bronches et du poumon : bronchites chroniques, tuberculose, rhumes négligés. Comme adjuvant dans la grippe, coqueluche, rougeole, scarlatine, pour écarter les dangers de complications pulmonaires.

16 à 22, rue des Orteaux. Paris (XXe).

SIROP DU Dr GELINEAU

Composition :

Arsenic-Chloral-Bromuré.

Indications thérapeutiques :

Insomnie, Névralgie, Hystérie.

Posologie :

Une à deux cuillerées à bouche le soir au coucher.

Doses supplémentaires en cas de besoin.

Littérature et échantillons sur demande

Laboratoires J. MOUSNIER
à SCEAUX (Seine) près PARIS

SIROP GRIBELL

Composition. — Baume du Canada, « Prunus virginianus », Aconit, Codéine, Phosphate de chaux soluble, Baume de Tolu.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi. — Adultes : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour, pur ou dans de la tisane pectorale chaude.

PATE GRIBELL

Même composition — Mêmes indications

SIROP GRIBELL POUR ENFANTS

Formule spéciale ne renfermant aucun principe opiacé.

Mode d'emploi. — Jusqu'à 7 ans, 3 à 5 cuillerées à café par jour. Au-dessus de 8 ans, par cuillerée à dessert, suivant l'âge.

Laboratoires BELIERES
19, rue Drouot — PARIS (IX^{e}

SIROP GUILLIERMOND

Iodo-tannique

GUILLIERMOND est le créateur de la médication iodo-tannique.

Le SIROP GUILLIERMOND ne renferme que de l'Iode et du Tannin.

Chaque cuillerée à soupe contient cinq centigrammes d'Iode. Goût agréable. Conservation parfaite.

Doses. — 2 cuillerées à soupe, à dessert, à café, suivant l'âge.

Propriétés thérapeutiques. — Affections cardio-vasculaires. Affections pulmonaires chroniques. Lymphatisme. Goitre. Dermatoses. Albuminurie. Artério-Sclérose.

Pour éviter toute substitution, prescrire :
Sirop Guilliermond : un flacon

Laboratoires G. DEGLOS
131, Rue de Vaugirard — PARIS

SIROP D'HÉMOGLOBINE MÉTHYLARSINÉ HENRY

Seule préparation à base d'hémoglobine fournissant à l'organisme l'équivalent de 0 gr. 10 de fer métallique par jour.

Composition :

Hémocristalline : 10 %
Peptonate de fer Henry : Q. S pour arriver à une dose journalière de 0 gr. 10 de fer *prodie*.
Méthylarsinate de soude : 0 gr. 02 par cuillerée à soupe.

Doses :

Adultes : 3 cuillerées à soupe par jour.
Enfants : de 5 à 10 ans : 3 cuillerées à café ; de 10 à 16 ans : 3 cuillerées à dessert.

Laboratoires HENRY
39, rue de Sclessin — LIÈGE

SIROP Dr J.-O. LAMBERT

Composition. — Sirop à base de pin, sassafras, menthol, acide benzoïque, cassia, gaultherie, sulfate de magnésie, chloroforme : 1/2 goutte par dose.

Action. — Sédatif de la toux, expectorant, antiseptique pulmonaire.

Indications. — Toux, rhumes, bronchites aiguës et chroniques, catarrhe, asthme, etc.

Mode d'emploi. — *Adultes :* 1/2 à 1 cuillerée à soupe, 5 à 6 fois par jour.
Enfants de moins d'un an : 5 gouttes.
1 à 2 ans : 5 à 10 gouttes.
3 à 5 ans : 10 à 30 gouttes.
6 à 10 ans : 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau.

Laboratoires Saint-Vincent-de-Paul
A. Corhumel, 25 rue des Petits-Hôtels,
PARIS (X^e^).

SIROP LANCHAT

Composition. — Alc. f. Aconit (VIII gouttes + bromoforme I goutte).
Héroïne, 0 g. 002; Iodophosphate de codéine, 0 g. 015; Thiocol, 0 g. 20 p. cuil. à soupe.

Suppression des formalités inhérentes aux prescriptions de toxiques.

Indications thérapeutiques. — Dans toutes les *Affections des voies respiratoires*, toux rebelle à forme quinteuse, émétisante ou catarrhale, asthme, emphysème, grippe, tuberculose...

Posologie. — 6-12 ans, 3 cuill. café p. jour; 12-15, 3 cuill. dessert p. jour; adultes 3-5 cuill. soupe p. jour. Éviter son usage chez les tout petits enfants.
Entre les repas pur, ou dans tisane, grog. ou lait tiède.

Littérature et échantillons

Laboratoires COMTOS
F. CHANAL, pharmacien de 1re classe
FESCHES LE CHATEL (Doubs)

SIROP LAXATIF GOBEY

Laxatif uniquement végétal, d'une douceur et d'une sûreté d'action inégalées. Le véhicule, pur jus de fruits, constitue une véritable friandise.

Doses et mode d'emploi. — De une demi-cuillerée à café à une cuillerée à soupe le soir, au coucher, suivant l'âge.

Indications thérapeutiques. — Le sirop Laxatif Gobey peut être employé dès le premier âge, chez les nourrissons. Sa composition en fait le médicament par excellence de tous les sujets délicats. Il est particulièrement indiqué chez la femme enceinte, les opérés, les enfants et les vieillards. Ne provoquant jamais le moindre trouble, il ne comporte donc aucune contre-indication et peut être utilisé par tous sans limitation de durée parce qu'il ne s'accompagne pas d'accoutumance.
Pris pendant deux ou trois semaines systématiquement au printemps et à l'automne, le sirop laxatif Gobey réalise une cure de désintoxication et constitue le dépuratif idéal.

Laboratoires GOBEY, 21, rue d'Aumale, PARIS

SIROP DE LA MATERNITÉ

Ext. de fl. pêcher 25 gr., Manne en larmes 20 gr. Alcool 60 gr., Alc. de mandarine 5 gr. Sirop q. s. pour 1 litre.

Dose et mode d'emploi. — Jusqu'à 2 mois 1/2 cuill. à café, au-dessus de 2 mois 1 à 2 cuill. à café.

Propriétés thérap. — Laxatif pour enfants, pouvant être donné à tout âge. Pas de coliques.

Indications. — Constipation Embarras gastrique. Pas de contre-indications.

Laboratoire L. LAURIN
86, Boulevard Port-Royal — PARIS

SIROP MAVER

Composition. — A base d'*hyposulfite de soude*, benzoate de soude, sulfogaïcolate de potasse.
Ne contient *aucun stupéfiant*, ni belladone, ni aconit.

Indications. — Toutes affections des *bronches* et des *poumons*. Médicament de choix des tousseurs habituels à expectoration difficile. Aucune contre-indication.

Posologie. — 4 à 5 cuillerées à soupe par jour loin des repas. Pour les enfants suivant l'âge, remplacer par cuillère à dessert ou cuillère à café.

M. A.
Établissements WOLLACKER
31, rue Saint-Georges — PARIS

SIROP MINÉRAL SULFUREUX CROSNIER

Au monosulfure de sodium inaltérable et goudron.
Approbation scientifique de l'Académie de médecine de Paris.

Indications thérapeutiques :

Succédané avantageux des eaux sulfureuses. Affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryngites, lymphatisme, dermatoses, hydrargyrisme, bismuthisme.

Posologie :

Adultes : une cuillerée à soupe de sirop 2 à 3 fois par jour, une heure avant ou deux heures après les repas.
Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert : de 7 à 14 ans ; 2 à 3 cuillerées à café pour ceux de 2 à 6 ans.

Granules minéral sulfureux Crosnier.

Composition & indications thérapeutiques :

Celles du sirop.

Posologie :

2 granules : 1 cuillerée à soupe de sirop.

Laboratoires CROSNIER
6, rue Chanoinesse — PARIS

SIROP NOGUES

Composition :

Alcoolre d'aconit Teinture belladone	{ aa.....	0,035
Teinture de grindelia.....		0,08
Bromoforme.....		0,02
Codéine.....		0,02
Benzoate de soude.....		0,09
Sirop de Tolu, Desessartz, laurier-cerise.....		Q. S.

pour une cuillerée à bouche.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à bouche par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, incisif, pectoral.

Indications. — Toux quinteuses, bronchites, toutes affections des bronches.

Laboratoire NOGUES
11, rue Joseph-Bara — PARIS

SIROP PHÉNIQUE VIAL

Composition. — Sirop à base d'acide phénique, principe actif des goudrons.

Indications. — Trachéite, Laryngite, Bronchite aiguë et chronique, Asthme, Grippe, Coqueluche, Tuberculose pulmonaire, Hémoptysie, Bronchite fétide, Gangrène pulmonaire, toutes les Hémorragies, Diarrhées chroniques.

Action. — Antiseptique et désodorisant puissant; augmente la coagulabilité du sang, diminue les sécrétions.

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à soupe par jour, pur ou de préférence dans une tasse de tisane quelconque.

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
Dr PH. CHAPELLE, 8, rue Vivienne, PARIS

SIROP PRÉGA

Calmant de la toux et du spasme des bronches.

1° Calme l'**irritation** et tarit le **catarrhe des muqueuses bronchiques,** grâce à un ensemble d'agents à efficacité connue et éprouvée (codéine, tolu, aconit, benzoate de soude.)

2° Combat en outre un autre symptôme pénible, jusque-là négligé, à savoir, le **spasme des muscles lisses de l'arbre bronchique,** par l'adjonction nouvelle d'un dérivé phényl-méthylique, qui calme ces fibres aussi puissamment que la papavérine, sans en avoir la toxicité.

Dose pour les adultes. — 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Doses pour les enfants. — 2 ans : une cuillerée à café matin et soir; 5 ans : 3 à 4 cuillerées à café par jour; à 10 ans : 5 à 6 cuillerées à café.

Laboratoires DEHAUSSY
66, Rue Nationale — LILLE

SIROP REINVILLIER

au phosphate de chaux hydraté

(Dr. Reinvillier, Lauréat de l'Acad. de Méd.)

Entièrement assimilable, à cause de l'état moléculaire du phospate.

Le meilleur agent de la recalcification.

Chaque cuillerée à soupe renferme 3 grammes de phosphate de chaux hydraté.

Doses. — 2 à 4 cuillerées à soupe, à dessert ou à café suivant l'âge, pur ou mélangé à quelques cuillerées d'eau ou de lait.

Propriétés thérapeutiques. — Recalcification. Tuberculoses. Maladies des os et du système nerveux.

Laboratoires G. DEGLOS

131, Rue de Vaugirard, PARIS

SIROP " ROCHE "

AU THIOCOL

1 cuill. à soupe de Sirop " Roche " = 1 gr. de Thiocol " Roche ".

1 gr. de Thiocol " Roche " = 0,52 cgr. de gaïacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. — Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour ; Enfants : 2 à 4 cuill. à café selon l'âge.

Prop. Thér. — Antiseptique pulmonaire. Phagocytogène. Eupeptique. Orexique.

Indic. Thér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques. Grippe. Pneumonie. Coqueluche, Scrofule, Anémie. Rachitisme. Dyspepsie. Entérites. Diarrhées, etc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie

21, place des Vosges — PARIS

SIROP DE SIRTAL

Composition. — Tricrésol sulfonate de calcium, dérive d'un monophénol, le Crésol, qui est lui-même un des constituants de la créosote; aucun autre agent sédatif, opiacé ou hypnotique.

Propriétés. — C'est au Tricrésol que sont dues les principales propriétés antiseptiques et balsamiques de la créosote Il présente les propriétés physiologiques de la créosote et ne détermine jamais aucun phénomène d'intolérance des voies digestives.

Applications thérapeutiques. — Puissant sédatif de la toux par ant sepsie pulmonaire. Indiqué dans toutes es maladies des voies respiratoires accompagnées de catarrhe, de toux et d'expectoration : *rhumes, bronchites aiguës, bronchites chroniques, congestions pulmonaires, emphysème, grippe, dilatation des bronches, broncho-pneumonies, pneumonies, tuberculose pulmonaire* dans ses formes à marche lente, torpides, sans hémorragies, avec expectoration abondante.

Doses :

Pour l'adulte : 4 à 6 cuillerées à soupe par jour ;
Pour l'enfant : 4 à 6 cuillerées à café.
Ces doses peuvent être augmentées suivant les cas

Laboratoires CLIN
20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.

SIROP TINARDON

Iodo-tannique phosphaté

Contenant pour 100 cc³ :

Iode bi-sublimé.....	0 gr. 15
Extrait sec de ratanhia...	1 gr. 10
Lactophosphate de chaux.	2 gr. 25
Sirop d'orange q. s. pour 100 cc³.	

Posologie. — 2 ou 3 cuillerées à soupe suivant l'âge. (Le flacon contient environ 30 cuillerées à soupe).

Indications. — Lymphatisme, Adénopathies, croissance difficile.

LABORATOIRE OBERLIN
J. TINARDON,
Pharmacien de 1re classe de l'Ecole Supérieure de Paris.
17, rue Cadet, Paris.

SISTOMENSINE CIBA

Substance lipoïdique extraite de l'ovaire, insoluble dans l'eau.

Action physiologique. — Equilibre la fonction menstruelle, limite et régularise le flux cataménial. Agit efficacement sur les douleurs dysménorrhéiques.

Indications.

I. — Flux menstruel trop abondant, ménorragie essentielle des jeunes filles.
II. — Règles trop fréquentes.
III. — Règles de trop longue durée.
IV. — Douleurs et malaises liés à un flux trop abondant.

Comprimés, Ampoules.

Doses. — 3 à 6 comprimés par 24 heures : 1 ou 2 ampoules.

Le flacon de 40 comprimés : 15 francs.
La boîte de 4 ampoules : 20 francs.
(*Voir Agomensine*)

Laboratoires CIBA, O. ROLLAND
1, Place Morand — LYON

SODERSEÏNE

Indication. — Coqueluche.

Composition. — Bismuth colloïdal obtenu par électrolyse.

Forme. — Solution sans saveur et d'une innocuité absolue. (Ce qui en rend l'emploi facile même chez les nourrissons).

Doses journalières.

Enfants jusqu'à 6 mois... ..... 100 gr.
— de 6 mois à 2 ans ..... 150 gr.
— de 2 ans et au-dessus... 200 gr.

(Echelle de doses sur le flacon)

J. DEPRUNEAUX, Pharm. de 1re Classe
18, Rue de Beaune et 31, Rue de Verneuil
PARIS (VIIe)

SODOLACTINE

(Estomac.)

Poudre soluble, n'agissant ni comme un alcalin, ni comme un absorbant, ni comme un isolant. De goût très agréable, la *Sodolactine* est le médicament de choix dans la plupart des affections stomacales.

La *Sodolactine* ne modifie pas le chimisme du contenu gastrique, elle facilite physiquement l'évacuation de l'estomac. Non laxative.

Outre son activité, facile à vérifier, elle a l'énorme avantage de constituer un traitement très économique.

Posologie :

Une mesure dans une tasse *à thé* d'infusion ou d'eau tiède.

Après les repas : Hyperchlorhydrie. Dyspepsies hypersthéniques, Aigreurs, Brûlures, Ulcérations, Affections atteignant l'orifice pylorique, Vomissements et nausées de la grossesse. Vomissements des nourrissons :

(une cuillerée à café dans un biberon de 120 c/c d'eau bouillie, faire prendre 1 à 2 cuillerées à soupe de cette solution après chaque tétée.)

Avant les repas (un quart d'heure) et le matin à jeun : Hypochlorhydrie, Dyspepsies simples, Dilatations, Atonies gastriques, Digestions laborieuses, Mal de mer.

Remarque importante. — La *Sodolactine* agissant d'une façon physique et non chimique, bien respecter la concentration indiquée : *une mesure par tasse à thé de liquide.* (A titre indicatif une tasse à thé 120 c/c ou 8 cuillerées à soupe.)

Laboratoires GERDA

93, rue de Marseille — LYON

SODOTHIOL

Composition :

Solution stérilisée pure, isotonique, injectable de thiosulfates alcalins.

Forme pharmaceutique :

Ampoules de 2 centicubes préparées pour injections hypodermiques ou intramusculaires.

Indications thérapeutiques majeures :

Affections hépatiques. — Coliques hépatiques, Lithiase biliaire, Angiocholite lithiasique, Cholécystite calculeuse, Cholémie simple, Ictère catarrhal ou émotif, Hépatisme de Roger Glénard.

Manifestations Arthritiques. — Lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Gravelle, Anurie calculeuse, Calculs vésicaux, Rhumatismes noueux déformant, chroniques Ankysoles fibreuses articulaires, Otosclérose, Otospongiose.

Indications thérapeutiques secondaires :

Dermatologie. — Eczémas, Acnés, Accidents cutanés récidivants ou prurigineux.

Etats Congestifs chroniques des muqueuses respiratoires

Mode d'emploi :

A. *Cure d'Assaut.* — 10 injections, une tous les jours.

B. *Cure de Fixation.* — 10 autres injections 15 jours, puis deux mois plus tard.

C. *Cure d'Entretien.* — 10 injections six mois, puis 1 an après la première série.

Dans le cas de Rhumatismes chroniques noueux ou déformants et quelques affections cutanées récidivantes, la *Cure d'Assaut* comprendra 20 injections à raison d'une par jour, complétée d'une *Cure de Complément A bis* après 15 jours de repos.

Le *Sodothiol* étant dépourvu de toute toxicité, son usage pourrait, s'il en était besoin, être prolongé tout le temps jugé nécessaire.

Incompatibilités :

Acides, Sels acides, Iodures.

Prescrire :

Sodothiol : 1 boîte d'Ampoules.

LABORATOIRE DE MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe, Beauvais (Oise).

Echantillons et littérature médicale sur demande.

SOLUBAÏNE

Solution *au millième* d'Oubaïne Arnaud

Cardio-tonique énergique, diurétique puissant.

Indications. — Insuffisance du ventricule gauche : des aortiques, des cardio-rénaux, des hypertendus, avec ou sans artério-sclérose. — Insuffisance du ventricule droit : lésions mitrales ou tricuspidiennes, péricardites et symphyses du péricarde, emphysème, asthme, myocardites d'origine infectieuse.

Doses. — Petites doses d'entretien prolongées : XX gouttes par 24 heures. Doses moyennes : XXX à L gouttes par 24 heures. Doses massives : L à CL gouttes par 24 heures.

Fractionner les doses en 3-4 fois dans la journée.

La Solubaïne permet d'administrer l'Ouabaïne Arnaud par voie buccale ; elle est aussi maniable que la solution de Digitaline Nativelle.

Echantillon et Littérature

Laboratoire NATIVELLE

49, boulevard du Port-Royal — PARIS

SOLUCAMPHRE DELALANDE

Dérivé du camphre naturel, soluble dans l'eau succédané de l'huile camphrée

Avantages. — Injection facile et indolore.
Résorption immédiate d'où action plus vive et plus vigoureuse.
Injection intraveineuse sans danger.
Toxicité nulle.

Action physiologique. — L'action du Solucamphre rappelle en tous points celle du camphre. Il agit sur le myocarde en renforçant les contractions et sur le pneumogastrique en régularisant celles-ci.

Mode d'emploi :

De 2 à 8 cc. par jour en médecine.
De 10 à 15 cc. par jour en chirurgie.

Présentation. — Boîtes de 6 ampoules de 1 cc., 2 cc., 5 cc.

MICHEL DELALANDE

13, rue Lacharrière, Paris (XI^{e}).

SOLUPROTINE ROCHE

Solution à 10 % de Protéine Solubilisée.

(PEPTONE de CASÉINE "ROCHE")

de composition constante, stérilisable et inaltérable.

Indications. — *Toutes les indications de la Protéinothérapie :* Rhumatismes. Infections. Septicémies. Gonococcies. Salpingites. Kératites. Sycosis. Furonculose. Tuberculose, et en général, toutes les fois que l'on cherche à déclencher ou à stimuler les réactions défensives de l'organisme.

Doses et mode d'emploi. — *Injections intra-musculaires.* — Etats aigus : doses croissantes de 1/4, 1/2, puis 1 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours.

Etats subaigus et chroniques : doses croissantes de 1/2, 1, puis 2 cc. tous les 2, 3 ou 4 jours.

Injections endoveineuses. — Etats aigus ou subaigus : diluer 1/4 ou 1/2 cc. dans 10 cc. de solution physiologique pour chaque injection et faire l'injection tous les 3 ou 4 jours.

N. B. — *Les injections intramusculaires et endoveineuses sont parfaitement indolores ; elles donnent lieu quelquefois à des réactions assez violentes, dont l'intensité varie avec chaque malade (choc protéique). Il peut y avoir des sueurs, de la fièvre, des frissons, etc. qui sont l'indice de la réaction défensive de l'organisme.*

Boîte de 12 ampoules de 1 cc.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie

21, place des Vosges — PARIS (IIIe)

SOLUTION BARDET

à l'Extrait sec de Quinquina.

Adoptée par le Ministère des Colonies.
Médaille d'Or, Strasbourg 1924.

Composition. — Solution sans sucre, ni alcool, contenant 0 gr. 50 de principes actifs par cuillère à soupe et titrant au minimum 10 % d'alcaloïdes totaux.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique et reconstituant énergique contre l'Anémie, la Chlorose, le Lymphatisme et dans toutes les Convalescences.

Fébrifuge puissant à forte dose contre les Fièvres intermittentes, le Paludisme et toutes Maladies fébrigènes.

Mode d'emploi. — Comme *Tonique* et *Reconstituant :* Adultes : une cuillère à soupe.

Enfants : Une cuillère à café au début des deux principaux repas.

Comme *Fébrifuge :* 4 à 5 cuillères à soupe dans les 24 heures.

Se méfier des nombreuses contrefaçons et imitations.

Formuler : **« SOLUTION BARDET »**

Echantillons et Littérature :

Pharmacie BARDET
Fondée en 1860
76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e^)

SOLUTION LAROYENNE

Composition :

Succinate d'ammoniaque, valérianate d'éthyle, bromure de potassium.

Indications :

Spécifique contre toutes les formes de l'agitation nerveuse.

Posologie :

Une cuillerée à café, dans un peu d'eau avant chacun des trois repas.

Laboratoire DUREL
7, Boulevard Denain, Paris.

SOLUTION PAUTAUBERGE

Composition. — Créosote, 0 gr. 10; chlorhydrophosphate de chaux, 0 gr. 50; par cuillerée à soupe.

Action. — Absorbée par l'appareil digestif, éliminée par les poumons, la créosote combat les deux foyers de la Tuberculose et des Infections à flores associées.

Le **chlorhydro-phosphate de chaux** recalcifiant et reconstituant.

Indications. — Affections pulmonaires, Convalescence de pleurésie, Broncho-pneumonie, Grippe, Rougeole, Coqueluche, Scrofule.

Dose. — 2 à 3 cuillerées à soupe par jour

L. PAUTAUBERGE,
10, Rue de Constantinople — PARIS (VIII[e])

SOLVURIC

Forme :

Granulé effervescent à base de formine et de benzopyruvate de soude et de lithine.

Indications :

Arthritisme, Goutte, Gravelle, Artériosclérose, Antisepsie urinaire.

Doses :

2 à 4 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau.

Laboratoire P. MAUCHANT

14, rue de Birague — PARIS (IVe)



SOMALGINE

Cytoplasma et complexes organo minéraux de l'algue Laminaria Flexicaulis.

Les Laminaires sont des algues de fond que l'on rencontre sur les côtes de Bretagne et qui font partie de la grande famille des Cryptogames vasculaires.

Ces algues sont constituées par une fine trame de cellules garnies intérieurement d'une matière organique azotée, liée à l'**iode**, au **calcium**, à la **magnésie** et à l'**arsenic**.

Tout récemment, on est parvenu à déceler dans ces algues la présence de tous les métaux radio-actifs grâce à une méthode spectroscopique très sensible, due au professeur Urbain.

Depuis la plus haute antiquité, les algues de la mer ont servi à l'alimentation de la plupart des peuples d'Extrême-Orient. Dans les îles Havaï, par exemple, elles entrent pour 90 % dans l'alimentation des indigènes. Au Japon, sous le nom de Kombu, on vend sur les marchés d'infinies variétés de produits alimentaires à base d'algues marines qui constituent une des plus importantes industries de l'Empire.

La récente découverte des Vitamines, substances minimales indispensables à la vie, a permis de donner une explication rationnelle de ces méthodes d'alimentation pour ainsi dire inconnues chez nous.

Les peuples d'Extrême-Orient se nourrissent, en effet, à peu près exclusivement de poisson séché et fumé, de riz décortiqué, tous aliments privés de ces **vitamines** dont l'absence détermine la Pellagre, le Béribéri et le Scorbut et c'est un instinct ancestral qui les conduit à chercher dans la mer ces substances si abondantes dans les algues.

Un chimiste anglais, **Drummond**, a, en effet, récemment prouvé que les algues marines sont très riches en Vitamine A, la

plus importante de toutes. Ces algues, qui forment de véritables forêts sous-marines, servent d'habitat et de nourriture à des myriades de crustacés qui sont à leur tour consommés par les poissons gros et petits, et, en particulier, par les morues qui en engloutissent des quantités prodigieuses et accumulent ainsi dans leur foie les principes auxquels l'huile doit son activité thérapeutique.

Des recherches systématiquement conduites dans les hôpitaux pendant plusieurs années, ont démontré la grande valeur de l'extrait cytoplasmique de Laminaria, ou *Somalgine*, dans toutes les maladies des voies respiratoires, dans l'anémie, et en général chez tous les affaiblis, les surmenés et les convalescents, gazés de guerre.

Ce n'est pas seulement à l'iode, qui y existe en quantité très faible, que l'on doit attribuer les effets thérapeutiques de ce produit, mais aussi aux vitamines et aux complexes organo-minéraux en combinaison colloïdale.

Les remarquables recherches d'**Eggenberger** dans le canton d'Appenzel, en Suisse, tendent à prouver que l'iode est un élément indispensable à l'Économie et qu'il constitue par conséquent un aliment important. Il a trouvé que, dans toutes les régions alimentées par l'eau des glaciers, privée par conséquent de toutes traces d'iode, le goître et le crétinisme était à l'état endémique.

La **Somalgine** influence favorablement la fonction d'assimilation ; par ses alginoïdes, elle régularise les fonctions intestinales et cette action est très importante.

La **Somalgine** est un puissant suraliment réminéralisateur, assurant la **reconstitution intégrale** du muscle par fixation de l'azote et du phosphore.

Laboratoires G. CHAMAGNE
Docteur en Pharmacie.
Lauréat de l'Académie de Médecine.
24, rue Damesme — PARIS (XIII[e])

SOMNIFÈNE " ROCHE "

Dialcoyl-barbiturates de diéthylamine.
Le plus maniable des hypnotiques.

C. F. trav., observ., serv. des Professeurs Raviart, Abadie, Claude, Crouzon, Laignel-Lavastine, Weiss, Etienne, Anglade, Roger, Perrens, Cloetta, Gelma, Combemale, Fredet, Cleisz, Gayet, S. Banus et des Drs Perlis, Vullien, Assoignion, Kindler, Boisnière, Jourdan, Journiac, de Teyssieu, Hamant, Bénech, Redonnet, G. et D. Bardet, etc., etc.

Indic. thérap. — Toutes les insomnies simples ou compliquées, Agitation, Délire, Convulsions, Troubles mentaux, Troubles nerveux, Epilepsie, Tétanos, etc.

SOMNIFÈNE " ROCHE " Gouttes

XXX gouttes = 1 cc.

Solution aromatisée pour atténuer la saveur spéciale du produit ne pouvant être utilisée pour injections, permettant de *donner à chacun sa dose*, que l'on peut ainsi augmenter ou diminuer à volonté.

Doses habituelles. — XXX à XLV et LX gouttes (et plus) dans 1/2 verre d'eau ou de tisane, 1/2 heure avant de se coucher ou dans la nuit.
Enfants : V à X et XV gouttes (selon l'âge).

SOMNIFÈNE " ROCHE " Ampoules

Ampoules de 2 cc.
pour injections intra-musculaires

1 à 3 ampoules (Intolérance gastrique, refus du malade, agitation intense, troubles mentaux, etc.

Ampoules de 5 cc.
pour injections indoveineuses.
Anesthésie Obstétricale et Chirurgicale.
Cas graves de psychiatrie.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie

21, Place des Vosges — PARIS

SOMNOTHYRIL

(Traitement de l'insomnie).

Composition :

Diéthylmalonylurée, Analgésine, Thyroïdine, Salicylate de Physostygmine.
1 pilule = 0,20 Diéthylmalonylurée.

Caractéristiques :

Seuil d'activité fort éloigné de son seuil de toxicité. Pas d'accoutumance. Sommeil calme. Réveil agréable.

Action curative par rétablissement de l'équilibre vago-sympathique et endrocrinien.

Propriétés thérapeutiques :

Toutes insomnies et particulièrement insomnies rebelles.

Mode d'emploi :

Avaler sans sucer ni croquer avec un demi-verre d'eau ou de tisane.

D'une façon générale, prendre le premier soit 1 pilule 2 heures environ après le repas.

En cas d'efficacité insuffisante, porter le lendemain la dose à deux (2) pilules prises au même moment.

Ne pas dépasser trois (3) pilules par dose et par 24 heures.

Laboratoires CANTIN

à Palaiseau (S.-et-O.)

SOPORALOSE

Principe actif. — Anhydroglucotrichloréthanol chimiquement pur.

Propriétés physiques. — Fines aiguilles cristallines, légèrement amères, peu solubles dans l'eau.

Action physiologique. — Son action est sur le système nerveux, localisée au cerveau. Agit à faible dose comme hypnotique, à dose plus forte comme anesthésique. Sans action sur la circulation, la respiration, la digestion. Non toxique, élimination parfaite, accoutumance nulle.

Action thérapeutique. — Provoque un sommeil calme et exempt de rêves, sans sensation désagréable au réveil.

Posologie. — Dose normale moyenne : 0 gr. 30. Dose réduite suffisante pour sujets sensibles : 0 gr. 10.

Usage. — Contre toutes insomnies simples ou provenant de causes passagères, de fatigue, de surmenage, de soucis, de neurasthénie.
Convient remarquablement aux cardiaques, dyspeptiques, artérioscléreux, vieillards, tuberculeux.

Fabricants : POINTET & GIRARD
30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS

SORNYAL

Produit supérieur au Benzoate de Benzyle, dont il ne présente pas les inconvénients et contenant tous les dérivés benzyliques en association médicamenteuse.

Deux présentations : 1° *Gouttes* ; 2° *Comprimés*.

GOUTTES. — Spécifique des affections spasmodiques des organes à musculature lisse :
Asthme vrai (ou essentiel). Coliques hépatiques ou néphrétiques, Constipation et diarrhée spasmodiques, Hoquet persistant, Coqueluche, Hypertension.

Posologie. — 5 à 40 gouttes 4 à 5 fois par jour.

COMPRIMÉS : Spécifique de la DYSMÉNORRHÉE (Règles douloureuses).

Posologie. — 2 comprimés à un quart d'heure d'intervalle, 6 à 10 par jour.

Demander renseignements et littérature aux

Laboratoires L.-G. TORAUDE O. ✻ O. I. Q.
Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.
22, Rue de la Sorbonne — PARIS (V°)

SPASMALGINE " ROCHE "

Antispasmodiques vrai.

Composition. — 1 ampoule ou 1 comprimé contient :

A. 1 centigramme	PANTOPON " ROCHE " (Opium total injectable).
B. 2 centigrammes	PAPAVÉRINE "ROCHE" (Alcaloïde de l'opium le moins toxique, à propriétés spasmolytiques spéciales).
C. 1 milligramme	ATRINAL " ROCHE " (Ether sulf-atropine,sans action sur le centre parasympathique).

Propriétés. — Les *propriétés antagonistes* des éléments entrant dans la composition de la *Spasmalgine " Roche "* expliquent la *toxicité atténuée* de ce médicament prouvée par l'expérimentation et la clinique.

Indic. thérap. — *Tous les états spasmodiques*, et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'intestin, de l'estomac, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, hoquet épidémique, excitation ante et post-opératoire, accouchements laborieux, tous états d'hyperexcitation, etc.

Dose et mode d'emploi :

Voie buccale	Dose moyenne : 1 à 2 comprimés par jour. Dose forte : 2 à 4 comprimés par jour.
Voie hypodermique ou intramusculaire.	Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour. Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie

21, place des Vosges — PARIS

SPASMINE JOLLY

Sédatif de choix du système nerveux.
Combinaison physiologique stabilisée de Valériane fraîche et Aubépine.
Odeur et saveur agréables.

Forme. — Elixir dosé à 0 gr. 10 par cuillerée à café.

Doses et mode d'emploi. — 4 à 6 cuillerées à café par 24 heures; 1/2 dose pour les enfants.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, hypnotique et hypotenseur, régulateur cardiaque.

Indications. — Névropathies et Cardiopathies.

Echantillons et Notice sur demande.

Laboratoire L. JOLLY
1, rue Christine — (PARIS (VI^{e})

SPASMOSÉDINE

Antispasmodique — Sédatif nerveux.
(Thérapeutique cardio-vasculaire).

Composition :

Phényléthylmalonylurée..... 0 gr. 015
Bromhydrate de quinine..... 0 gr. 05
Extrait de Cratægus stabilisé. 0 gr. 05
Excipient q. s. pour 1 comprimé. *glutinisé*

Présentation :

Comprimés glutinisés.

Indications & Posologie :

a) Palpitations, extrasystoles, instabilité cardiaque.
1 à 2 comprimés avant chacun des 2 principaux repas (10 jours par mois).

b) Tous les troubles fonctionnels consécutifs aux spasmes vasculaires de l'hypertension (céphalée, bourdonnements d'oreilles, éblouissements, vertiges, etc...)
1 à 2 comprimés avant chacun des 2 principaux repas (10 à 15 jours par mois).

c) Angine de poitrine et algies précordiales.
1 à 3 comprimés avant chacun des 2 principaux repas (pendant 10 à 15 jours par mois).

Avaler avec un peu d'eau, *sans sucer ni croquer.*

LABORATOIRES DEGLAUDE
Médicaments cardiaques spécialisés.
6, rue d'Assas, PARIS (VI^e^)
Tél. Littré 31-85.
Belgique :
Agent Général : L. PRUNIERES
19, rue Louis Hap, Bruxelles.

SPÉCIFIC BRACHAT

Médication antihémorroïdale.

Formes. — Pommade et suppositoires.

Composition. — Contient une série de principes actifs non toxiques, assurant au patient un soulagement immédiat, arrête les hémorragies, cicatrise, décongestionne.

Indications. — Hémorroïdes internes et externes.

Mode d'emploi. — Une application matin et soir et après les selles.

Les mêmes principes se trouvent réunis sous forme de suppositoires; MM. les docteurs peuvent ainsi ordonner la forme de produit qui convient le mieux à leur malade.

Pour se convaincre de la réelle efficacité de ce produit, ne pas hésiter à demander échantillons aux :

Laborat. Chimico-Pharmac. BRACHAT
à Livry-Gargan (S.-et-O.)

SPÉCIFIQUE BEJEAN

La préparation antigoutteuse et antirhumatismale la plus efficace et la plus inoffensive. Elle réussit dans les cas où les autres médicaments ont échoué.

Composition :

Contient comme principes actifs : 1 gr. de teinture de colchique et 0,20 d'iodure de potassium par cuillerée à café.

Indications :

Goutte aiguë ou chronique, Rhumatismes, Sciatique, Névralgies et, en général, toutes les manifestations douloureuses ou fluxionnaires se portant sur les articulations, les muscles et les viscères et qui soient d'origine goutteuse et rhumatismale.

Doses :

Cas aigus : Trois cuillerées à café par jour, dans une infusion de feuilles de frêne ou un peu d'eau sucrée, jusqu'à sédation de la douleur.

Cas chroniques : Une ou deux cuillerées à café par jour pendant une semaine sur deux ou pendant douze jours.

Pour les enfants et les vieillards, les doses ci-dessus devront être réduites de moitié.

La médication devra être suspendue en cas de diarrhée ou autres troubles intestinaux.

Dépôt général :

30, rue des Francs-Bourgeois, PARIS

SPECTROL

Sérothérapie spécifique des anémies

Composition. — Sérum frais hémopoïétique de cheval, prélevé sur des animaux mis en état de rénovation sanguine par saignées préalables, contenant les hémopoïétines spécifiques du Professeur Carnot (Ac. des Sc., 1906). Ce sérum n'est pas inactivé par tyndalisation, ses substances minimales sont intactes.

Action. — 1° Agent d'Hémopoïèse (Hémopoïétines de Carnot);

2° Agent de Leucopoïèse et de phagocytose (opsonines);

3° Action tonique générale du sérum de cheval;

4° Agent d'Hémostase générale (Traitement prophylactique des interventions sanglantes).

Indications. — Toutes anémies, hémophilie, états hémorragipares, convalescences, déficiences organiques, tuberculose, infections, et toxi-infections, cure pré-opératoire dans les interventions chirurgicales sanglantes.

Pas d'accidents sériques ou infectieux.

Mode d'emploi. Posologie. — Sirop agréable à prendre.

Une cuillerée à potage le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau froide ou tiède (jamais chaude).

Une à deux cuillerées à potage dans un demi-verre d'eau avant les deux principaux repas.

Le sérum pris dans ces conditions est rapidement évacué dans le duodénum et ne se peptonise pas.

Littérature. Échantillons

LANCOSME

71, avenue Victor-Emmanuel III — PARIS (VIII°

SPYROLIDES

Composition. — Comprimés gynécologiques à base de bleu de méthylène, de méthylbenzénols, de tanin et de perborate de sodium, *source d'oxygène naissant.*

Présentation. — Ces comprimés, à base de substances antiseptiques et décongestionnantes, ont un parfum discret et agréable et possèdent d'éminentes propriétés désodorisantes. Les SPYROLIDES sont *le DERNIER MOT* de la science pharmaceutique en matière de comprimés gynécologiques : leur emploi est commode et discret. *Ils se dissolvent instantanément et intégralement. Ils ne tachent ni le linge ni les objets de toilette. Ils ne sont ni caustiques, ni irritants ni toxiques.*

Absolument parfaits pour l'hygiène et les soins intimes de la femme, ils sont à tous points de vue bien supérieurs aux autres antiseptiques tels que : sublimé, liqueur de Labarraque, permanganate de potasse, etc...

Propriétés Thérapeutiques. — Au contact de l'eau, les SPYROLIDES dégagent de l'oxygène ; on obtient ainsi une solution riche en oxygène à l'état naissant, qui vient renforcer l'action antiseptique des SPYROLIDES et donne une solution puissamment bactéricide, dont l'emploi, même prolongé, n'irrite jamais les muqueuses. Au contraire des antiseptiques-poisons, non seulement les SPYROLIDES laissent aux muqueuses toute leur vitalité mais ils favorisent leur rapide régénération et les aide ainsi, en les tonifiant, à se défendre contre les infections microbiennes.

La petite pellicule qui se forme à la surface de l'eau est due au dégagement d'oxygène : elle se dissout par simple agitation. Nous insistons particulièrement sur le fait que les SPYROLIDES se dissolvent intégralement et immédiatement dans l'eau chaude, tiède ou même froide.

Mode d'emploi. — Un à deux comprimés par litre, pour l'injection quotidienne ou bi-quotidienne de propreté et d'hygiène.

A titre curatif : deux à trois comprimés par litre, en cas de leucorrhée, métrites, vaginites, salpingites, etc..., ou après l'accouchement.

L'eau SPYROLIDÉE par un ou deux comprimés désodorise complètement la peau (transpiration excessive des aisselles, des pieds, etc.).

Prescrire : Spyrolides : 1 tube. — Faire suivre du nombre d'injections quotidiennes et du nombre de comprimés à employer.

Le tube de 28 comprimés permet ordinairement un traitement de 14 à 28 jours d'un prix de revient particulièrement modéré (0 fr. 50 par jour au maximum au prix actuel de 7 fr. 85).

Echantillons et litterature : sur simple demande adressée aux :

LABORATOIRES ANDRÉ NARODETZKI

19, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

STALYSINE

Vaccin antistaphylococcique.
(D'après la technique du docteur Fisch.)

Indications. — Furonculose, anthrax, acné et toutes affections d'origine staphylococcique.

Effets thérapeutiques. — Disparition ou atténuation des phénomènes inflammatoires, arrêt de l'évolution quand les abcès sont déjà formés et non-formation de foyers nouveaux.

Formes. — Pour injections hypodermiques : ampoules de 1 c.c.
Filtrat pour application sur les foyers ouverts : ampoules de 3 c.c.
Pour voie buccale : ampoules de 3 c.c.

Prix : 25 francs.

Laboratoires P. ASTIER
41 à 47, rue du Docteur-Blanche — PARIS

STANION

Description. — Etain colloïdal en capsules et en ampoules.
Capsules : contiennent 0 gr. 05 d'étain colloïdal avec enrobage de kératine (50 capsules par flac.).
Ampoules : contiennent 3 cmc de solution isotonique d'étain colloïdal électrique (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — L'étain colloïdal s'emploie dans le traitement de toutes les staphylococcies où il permet d'obtenir la régression de l'œdème, suppression de l'inflammation et de la douleur, retour à la température normale, assèchement des foyers, expulsion aisée des bourbillons ; les récidives sont évitées.

Indications. — 1 à 2 ampoules par jour dans le traitement des staphylococcies, soit au voisinage de l'abcès, soit dans la fesse.
Capsules : 4 à 10 par jour dans le traitement des furonculoses, folliculites, anthrax, phlegmons, panaris, abcès tubéreux, pyodermites, sycosis, septicémies staphylococciques.

Laboratoires CH. COUTURIEUX
18, avenue Hoche — PARIS

STANNO-BARDANE HENRY

Association de *Peptonate d'étain* avec l'extrait de racine fraîche de bardane stabilisée.

A) *Stanno-Bardanne Solution* (0 gr. 01 d'étain pur par 60 gouttes) destiné aux enfants, 4 gouttes par année d'âge 3 fois par jour.

B) *Stanno-Bardanne Pilules* (chaque pilule dosée à 0 gr. 015 d'étain pur) pour adultes, 3 ou 4 pilules par jour.

Indications. — *Maladies à staphylocoques.*

Laboratoires HENRY

39, rue de Sclessin — LIÈGE

STANNOXYL

Oxyde d'étain et étain métallique absolument purs

Indications. — Furonculose et toutes affections à staphylocoque : acné, anthrax, abcès du sein chez les nourrices, etc.

Formes. — Pour l'usage *interne* : comprimés, cachets, ampoules. — Pour l'usage *externe* : liquide, pommade.

Avantages. — Traitement **pratique, rapide** et **définitif** : l'ingestion quotidienne de 4 à 8 comprimés fait disparaître l'inflammation et les couleurs et arrête l'évolution de la maladie.

Laboratoires
ROBERT et CARRIÈRE

37, rue de Bourgogne — PARIS

STAPHYLASE
du Docteur DOYEN

Solution concentrée des principes actifs des levures de bière et de vin.

Indications. — Acné, Furonculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonies, Grippes, Coryza, Stomatites, Dyspepsie, Entérites.

Doses. — Adultes : 4 à 12 cuill. à potage par jour ; Enfants : 1 à 4 cuill. à café par jour.

Associée à l'iodure de potassium et au bromure de potassium, la Staphylase a la propriété d'annihiler les effets secondaires de ces produits.

P. LEBEAULT & Cie
Rue Bourg-l'Abbé — PARIS (IIIe)

STAPHYLO-COCCINE FRAQUET

Extrait protoplasmique de la levure de bière isolé de sa membrane cellulaire. La levure est ainsi de digestion plus facile, d'action plus prompte à doses moindres.

Prop. Thérap. — Agent de la phagocytose.

Indications. — Furonculose, Anthrax, Angine, Maladies infectieuses, Dermatoses.

Doses et mode d'emploi.

Adultes : 2 à 5 cuillers à soupe par jour.
— 4 à 10 comprimés —
— 1 ampoule —

Enfants : Moitié de ces doses ou moins suivant l'âge.

Laboratoire des PRODUITS SCIENTIA
Dr E. PERRAUDIN, pharmacien,
21, rue Chaptal — PARIS

STAPHYLOCIDE AUDRAS

Tablettes sucrées parfumées à la menthe, dosées à 0 gr. 25 d'Étain-Oxyde d'étain plus purs et plus solubles que les produits commerciaux, parce que "Étain d'électrolyse".

— Croquer 2 à 4 tablettes par jour, aux repas de préférence.

— Contre furonculose, acné, orgelets, phlegmon, abcès divers et toutes infections staphylococciques.

Enfants et adultes : pas de contre-indication.

NOTA. — Préparation particulièrement *pratique, absorbable, efficace,* à cause de sa forme de tablettes, nécessitant une longue trituration et division des principes actifs avec le sucre, et leur assurant en outre une fine émulsion par la salive. L'étain arrive ainsi à l'estomac dans l'état idéal pour une absorption rapide et totale.

La boîte (10 à 20 jours) : **10** fr. toutes pharmacies.

Demander échantillon à :

Laboratoire du STAPHYLOCIDE AUDRAS
à YSSINGEAUX (Hte-Loire).

STAPHYLOTHANOL

Hydroxyde de bismuth radifère.

Indications Thérapeutiques :

Toutes les staphylococcies : furoncle, anthrax, abcès tubéreux de l'aisselle, ostéomyélites, ostéites, etc.

Se recommande dans les cas *rebelles* à toute autre médication.

Posologie et Présentation :

Adultes : 1 amp. de 2 cc. tous les trois jours (boîtes de 6) ou 1 suppositoire tous les deux jours (boîtes de 10).

Enfants : 1 amp. de 1 cc. tous les trois jours (boîtes de 6).

Laboratoire G. FERMÉ
55, Boul. de Strasbourg — PARIS (X^{e}).
R. C. Seine : 143.981

STENERGINE

Cacodylate de Manganèse
Nucléinate de Manganèse
Reconstituant général
Producteur d'énergie

Formes. — Cachets, Comprimés, Ampoules.

Indications. — Anémie, Chlorose, Neurasthénie, Convalescence des maladies aiguës, Adynamie, Lymphatisme, Dépression des arthritiques.

Mode d'emploi et doses. — La dose moyenne est de deux cachets ou comprimés par jour, mais dans les cas où l'on recherche une action stimulante et rapide, on devra la porter à trois. Une ampoule chaque jour.
Les cachets ou comprimés peuvent être pris à toute heure, mais de préférence au début des repas. Pour les enfants un ou deux suffisent.

Laboratoires " STÉNÉ "
4, place des Vosges — PARIS

STÉRAMINE

Pâte antiseptique soluble

Compos. — Crème onctueuse stéaro-sodique contenant 1 % de Clonazone Daufresne, libérant lentement dans la plaie de l'hypochlorite naissant.

Indications. — Plaies récentes ou infectées, brûlures, engelures, ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Appliquer une fois par jour une couche de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et recouvrir d'un pansement sec.

Avantages. — Action antiseptique prolongée, pansement propre et sans odeur, cicatrisation rapide.

En tubes d'étain.

Echantillons médicaux sur demande.

Laboratoire des ANTISEPTIQUES CHLORÉS
40, rue Thiers — LE HAVRE

STÉROGYL

Formule. — Solution huileuse au centième d'ergostérine irradiée pure.

Présentation. — En flacon de 10 c. c. dont 10 gouttes = 4 milligr. de vitamine D. La faible quantité d'huile administrée à chaque prise n'est pas susceptible de provoquer le moindre trouble digestif, même chez les nourrissons les plus fragiles.

Propriétés thérapeutiques. — Sous l'influence des rayons ultra-violets, l'ergostérine, substance inerte, donne naissance à une substance active, la vitamine D, douée d'un pouvoir antirachitique très puissant.

La vitamine D est la seule partie agissante de l'huile de foie de morue qu'elle remplace totalement dans toutes ses indications.

Indications thérapeutiques. — Tous les états rachitiques, tous les troubles du métabolisme du Calcium, toutes les déperditions en chaux et en phosphates.

Par conséquent, rachitisme, états ganglionnaires, anémies prétuberculeuses et post-infectieuses, grossesse, carie des dents, consolidation des fractures.

Posologie. — Jusqu'à 1 an..... 10 gouttes par jour
de 1 à 2 ans..... 20 — —
à 10 ans..... 30 — —
Adultes..... 40 — —

Laboratoire Français de Chimiothérapie,
21, rue d'Aumale — PARIS

STHÉNOLÉINE

(Marque déposée)

HUILE HYPERTONIQUE CHOLESTÉRINÉE INJECTABLE

PRÉPARATION MÉDICINALE FRANÇAISE

COMPOSITION :

FORMULE CHIMICO-ORGANIQUE

Goménol naturel	0 gr. 10 cgr.
Eucalyptol	0 gr. 15 cgr.
Camphre	0 gr. 20 cgr.
Cholestérine pure	0 gr. 04 cgr.

Huile d'olive **lavée à l'alcool** et **chargée par décoction** des principes extractifs de plantes sélectionnées riches en **phytine** et en **baume**. Q. S. pour **une ampoule de 2 c. c.**

PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES

Cardio-tonique Stimulant nervin — **Anti-infectieux** **Anseptique pulmonaire.**

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

Tous états adynamiques - Toutes maladies infectieuses
Affections voies respiratoires. — Tuberculose

UNE SEULE FORME PHARMACEUTIQUE

Ampoules de **2 c. c.** en **Boîtes de 10** et **Boîtes de** 5 amp.

MODE D'EMPLOI ET DOSES

Injections **hypodermiques** et **in ramusculaires** indolores.
Adultes : 1 ampoule de 2 c. c. tous les deux jours.

Laboratoire des Produits médicinaux spécialisés

L - M - D

A. Rolland, Pharmacien de 1re classe,
12, rue d'Aguesseau. — PARIS (VIIIe) Tél. : Élysées 91-99

STOMAL

Pansement gastrique calmant.

Composition. — Poudre à base de kao'in, carbonates alcalins, saturants, bétol, pepsine et sucre anisé.

Indications. — Pyrosis, Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Gastrites, Dilatation. Calme la crise gastrique par saturation des acides; désinfecte l'intestin et neutralise les fermentations.

Posologie. — Une cuillerée à café à jeun et après les repas dans un peu d'eau ; une ou deux autres dans la journée si besoin. Innocuité absolue.

Échantillons sur demande adressée à :

Laboratoire PY

58, Bd Richard-Wallace, à Puteaux (Seine).

STOMARINE BILLAULT

Traitement des maladies de l'estomac par le tricarbonate de chaux, magnésie, bismuth.

Forme Comprimés.

Il résulte des recherches faites sur des affections stomacales et notamment des travaux remarquables du professeur A. ROBIN que les meilleures médications provoquant le soulagement et la guérison de la presque totalité des troubles de l'estomac comportent dans leur formule de la magnésie et du bismuth.

Partant de ces données, nous avons fait un choix judicieux des composés de magnésie et de bismuth qu'il fallait utiliser et après un dosage rigoureux des éléments actifs, nous avons adopté le tricarbonate de magnésie, Bismuth et chaux ; ce dernier corps agissant comme neutralisant de l'acidité stomacale sans action laxative.

Mode d'emploi, — Sucer 2 comprimés et davantage sans inconvénient chaque fois que les douleurs se font sentir ; celles-ci sont calmées instantanément.

Laboratoires L.-G. TORAUDE O. ✻ O. I. ✿
Docteur en pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.
22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e^)
Dépôt et Agence générale de Vente des Produits pharmaceutiques spécialisés BILLAULT
R. C. Seine 218758 B

STOMAXINES ROXELANE

Médication complète des affections digestives.

Formule A : **Antisepsine**

Phosphate de Na Charbon végétal et animal.
Benzonaph. Bic. de Na Citrate de Na
Magnésie calc. Carb. de Ca.
Embarras gastriques. — Fermentations.

Formule B : **Neutraxine**

Substances neutralisantes notamment.
Carb. de Ca et de Magnésie.
Hyperchlorydrie.

Formule C : **Eupexine**

Pepsine Pancréatine (Système de conservation breveté). Hypopepsie.

Formule D : **Spasmaxine**

Ext. thébaïque	5 millig.
Poudre de Belladone	1 centig.
Stovaïne	2 millig.
Sels digestifs	q. s.

Spasmes. — Crises douloureuses gastriques.
Aérophagie.

Formule E : **Gastrixine**

ombinaison de Carb. de Bi et Kaolin stovaïné par procédé spécial assurant l'adhérence parfaite à la muqueuse (deux millig. de stovaïne par cachet). Pansements gastriques.

Formule F : **Purgolaxine**
Purgatif 2 à 3 cachets.

Scammonée Jalap Rhubarbe (poudre de belladone q. s.) Constipation.

Formule G : **Lactomaxine**

Comprimés de ferments lactiques.
Affections gastro-intestinales.

Formule H : **Hepaxine**

Bic. de Na Phosph. de Na Sulf. de Na desséchés et chimiquement purs.
Etats gastro-intestinaux et hépatiques.

Forme cachets : 3 à 6 par jour.

Forme poudre : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Les laboratoires PHARMACEUTIQUES DE LA ROXELANE
38 bis, rue Raphaël, Vanves-Paris

STOMOBROL

Sédatif et Curatif puissants des Gastropathies, Troubles dyspeptiques douloureux.

Propriétés thérapeutiques. — *Pansement véritable de la muqueuse gastrique* par le Kaolin.
Antiseptique : par le Carbonate de bismuth.
Absorbant : par le Carbonate de chaux léger et la Magnésie hydratée.
Sédatif : par le bromure de sodium, la belladone, la codéine.
Musculopotétique : par la noix vomique qui rétablit les contractions normales de l'estomac rendues indolores par la belladone.
Reconstituant : par le phosphate tricalcique et la strychnine (*noix vomique*) *dans les états dépressifs consécutifs aux gastropathies.*
Indications. — Dyspepsies, hypersthénies, gastralgies, pyrosis, ulcères, aérophagies, anorexies d'origine digestive. Entérites aiguës et chroniques.
Présentation et mode d'emploi. — *Poudre* : 1 à 2 cuillerées à café délayées dans un peu d'eau après les repas ou au moment des douleurs.
Cachets : 2 à 4 par jour, après les repas ou au moment des douleurs avec une infusion chaude de préférence.

Laboratoires CLAVERIE
4, Avenue de Brazza — ROMAINVILLE (Seine)

STOMOXYGÈNE

Troubles gastro-intestinaux. — Constipation. Fétidité de l'haleine.

Composition. — Peroxyde de Magnésie, *chimiquement* pur associé à la maltase et à l'émodine.

Forme. — Comprimés drageifiés.

Propriétés thérapeutiques. — Désintoxication des voies digestives, par désinfection des cavités fermées et inaccessibles à l'air atmosphérique par dégagement « in situ » d'oxygène naissant. Rééducateur intestinal parfait.

Indications. — Toutes les dyspepsies, gastralgies, ballonnements. — *Constipation sous toutes ses formes.* — Fétidité de l'haleine. — Toutes les fermentations.

Mode d'emploi. — 1 à 2 pastilles avant chaque repas. — Aucune contre-indication. La boîte de 60 pastilles 12 fr.

Laboratoires SOULAIRAC
Saint-Quentin, (Aisne).

STOVAÏNE

Chlorhydrate
de Diméthylaminobenzoylpentanol

Produit synthétique. Le moins toxique des anesthésiques locaux, à pouvoir égal ; aucune action vaso-constrictive ; agit comme tonique du cœur et comme antiseptique. L'action de la Stovaïne est au moins égale à celle de la cocaïne, mais son absence de toxicité permet d'en utiliser des doses beaucoup plus considérables. La Stovaïnomanie n'existe pas.

En dehors des emplois chirurgicaux (rachi-anesthésie locale et régionale) la stovaïne se prescrit dans toutes les affections internes et externes où il s'agit de combattre la douleur, le prurit ou l'irritation.

Littérature sur demande

Les Établissements POULENC Frères

86 et 92, Rue Vieille-du-Temple — PARIS

R. C. Paris 5386

STOVARSOL

Acide Oxyacétylaminophénylarsinique

Le *Stovarsol* se distingue par sa forte teneur en arsenic et sa faible toxicité. Étudié à l'Institut Pasteur de Paris par MM. Fourneau et Levaditi, et à l'Hôpital Cochin par M. le Docteur Fournier, ce produit a fait l'objet de nombreuses publications. C'est le premier exemple d'un médicament d'ordre chimique, administré par la bouche dans l'intention de prévenir une maladie infectieuse.

Indications. — Traitement précoce et traitement d'entretien de la syphilis. Spirochétoses, Pian, Amibiase, Lambliose, Diarrhées, Prétuberculose, Pyorrhée alvéolaire, Paludisme.

Doses. — 1 à 4 comprimés dosés à 0 gr. 25, par 24 heures.

Le *Stovarsol sodique*, soluble et injectable par la voie intraveineuse a donné de bons résultats dans la paralysie générale et dans le Paludisme.

Des comprimés dosés à 0 gr. 01 ont été étudiés en vue de la thérapeutique infantile.

Littérature franco sur demande

Les Établissements POULENC Frères
6 et 2, Rue Vieille-du-Temple — PARIS (III[e])
R. C. Paris 5386

STRICTOFORME DAUSSE

(Extrait spécial de Genêt)

Vaso-constricteur des artères et des veines. Hémostatique puissant, non toxique, retiré du Genêt à balais. Succédané de l'adrénaline et de l'ergot de seigle.

Formes. — *Solution* à administrer par gouttes.

Indications. — 1° Dans les *Hémorragies, Hémoptysies, Hématémèses, Epistaxis, Métrorragies,* etc. etc.

2° Dans les états hypotensifs : *Tuberculose, insuffisance surrénale,* etc.

3° *Varices, phlébites chroniques, ménopause.*

Posologie. — 1° *Par voie buccale :* 3 prises de XXV à XXXV gouttes avant les repas, dans un peu d'eau sucrée.

2°) *En application locale ;* appliquer sur la partie saignante une compresse imbibée de strictoforme.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot, Paris (IV^e^).

STROPHANTINE CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,0001 de Strophantine cristallisée extraite du Strophantus Gratus.
Synonyme **Ouabaïne.**

Indications. — Affections mitrales. Dyspnée. Oppression. Œdèmes. Asystolie. Cardiopathies des enfants et vieillards. Lésions cardiaco-aortiques. Artério-sclérose avec ou sans néphrites.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur.

STROPHANTUS CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,001 d'Extrait titré de Strophantus.

Indications. — Asystolie. Oppression. Dyspnée. Œdèmes. Affections mitrales. Cardiopathies enfants et vieillards.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur, *diurétique.*
En cas urgent, on peut donner 10 à 20 granules pour forcer la diurèse.

Prix de l'Académie de Médecine.

Laboratoire CATILLON
3, boulevard Saint-Martin — PARIS

STRYCHNAL LONGUET

Toutes indications de la strychnine.

Affections médullaires et névritiques. — Asthénie. — Neurasthénie. — Tuberculose. — Maladies infectieuses. — Convalescence. — Anémie.

Dérivé synthétique de la strychnine, de toxicité dix fois moindre.

Doses. — Par jour :

2 à 4 granules de 0 gr. 01 ctgr. de Strychnal.

1 à 2 ampoules de 0 gr. 01 ctgr. de Strychnal par c³.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e^)

STRYCHNARSITOL ROBIN

Injectable

Nucléophosphate de soude pur et méthylarsinate de strychnine

Ampoules injectables de 2 cc.

Dose et mode d'emploi.

Une injection Hypodermique de 1 cc. par 24 heures pouvant être portée à 2 cc. en une seule injection dans les cas graves.

Laboratoires M. ROBIN

13, Rue de Poissy — PARIS

STUPHO

Antidiarrhéique non toxique

Composition. — Extrait de Salicaire, Lactate de chaux, Benzonaphtol.

Aux propriétés antidiarrhéiques de la salicaire signalées par d'éminents thérapeutes (de ROUVILLE, CAMPARDOU, DUFOUR) s'associe l'action remarquable du Lactate de chaux dans toute diarrhée ou dyssenterie.

La présentation en comprimés ou granulés en permet l'administration aisée aux enfants les plus jeunes, la solution du granulé dans l'eau donnant instantanément une préparation vanillée très agréable au goût.

Mode d'emploi. — Comprimés : 2 à 6 par 24 h. pour l'adulte ; 1 à 4 par 24 heures pour l'enfant à délayer dans 1/4 verre d'eau sucrée tiède.

Granulé : 1 à 4 cuillerées à bouche pour l'adulte.
1 à 3 cuillerées à dessert pour l'enfant.
1 à 4 cuillerées à café pour le bébé.
à croquer ou dissous dans un peu d'eau tiède.

LABORATOIRE DU MAINGUY
M. BASSIN, Dr en pharmacie, à Bondy (SEINE)
Échantillons sur demande.

SULFARSINOL LEFÈVRE

Composition. — Combinaison organique de nature grasse, renfermant du soufre, de l'iode et de l'arsenic associés de l'acide cinnamique.

Facilement saponifiable dans l'intestin en donnant du soufre et de l'iodure d'arsenic à l'état colloïdal en même temps qu'un cinnamate alcalin.

Se trouve en capsules gélatineuses correspondant à la formule : acide cinnamique : 0,02 ; iodure d'arsenic : 0,003 ; sulfoléine à 35 % de soufre : 0 gr. 30.

Propriétés thérap. — Celles du soufre colloïdal et de l'iodure d'arsenic associés à un balsamique, l'acide cinnamique. — Affections cutanées, rhumatismes, bronchites, emphysèmes, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 6 capsules par jour, avant le repas.

Échantillons :

Laboratoire du Docteur C. LEFÈVRE
52, Rue Decamps — PARIS (XVIe)

SULFARSIODE

Composition et dosage :

Iode..... 0 gr. 006 par cc.
Arsenic..... 0 gr. 002 —
Soufre allylique..... 0 gr. 004 —
1 cc. représente 42 gouttes.

Formes et prix :

Gouttes : 12 fr. le flacon

Indications.

Troubles ganglionnaires et lymphatiques, adénite, affections cutanées, asthme, arthritisme, engelures, accidents spécifiques héréditaires ou acquis.

Posologie :

Bébés, selon l'âge, 6 à 12 gouttes par jour.
Adolescents — 10 à 20 — —
Adultes — 15 à 30 — —
A prendre en 2 fois dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas.

Agent général : **François CARTIER**
1, rue de la Martinière — LYON
Préparé par Dr ROGER, Pharmacien

SULFO-BORE

Composition. — Poudre antiseptique, désodorisante, par l'anhydride sulfureux et le soufre naissants.

Indications. — *Gynécologie* : Métrites, leucorrhée, suites de couches, toilette intime, prurits (1 à 2 cuillerées à soupe par litre d'eau chaude).

Affections de la peau : Pellicules, acné, sueur des aisselles, des pieds (en lavages ou saupoudrages).

Coryza, ozène (en prises ou humages). *Maux de gorge* (en gargarismes) : 1 cuillerée à café par verre d'eau chaude.

Laboratoires A. ROY et Cie
81, boulevard Suchet — PARIS (XVIe)
Tél. : Auteuil 05-46.

SULFOBYL

Forme. — Dragées glutinisées.

Composition :

Soufre colloïdal	0,02
Extrait de bile	0,05
Extrait de foie	0,05
Entérokinase	0,02
Extrait de pancréas	0,02
Urotropine	0,05
Aloïne	0,005

Par dragée.

Action thérapeutique :

Excite la sécrétion biliaire et la fonction antitoxique, assure la digestion parfaite des différents aliments, combat les infections intestinales et la constipation, évite le choc hématoclassique de Widal.

Indications :

Insuffisances du foie et de l'appareil digestif, constipation, auto-intoxication intestinale, arthritisme, dermatoses, etc...

Mode d'emploi :

Adultes : 2 dragées après chaque repas avec un peu d'eau.
Enfants : 1 dragée.
Avaler sans croquer. — Prix 10 fr.

Laboratoires LAFARGE
6, boulevard Arago — PARIS

23

SULFOÏDOL ROBIN

Soufre colloïdal.

Granulé. Ampoules. Pommades.

Doses et modes d'emploi. — Granulé : 2 cuillers-mesure 2 fois par jour. Chaque cuiller contenant 10 centigr. de soufre colloïdal.

Injectable : 1 injection par jour dans les cas graves. Dans les cas ordinaires 1 injection tous les 2 ou 3 jours.

Indications. — Troubles de la nutrition sulfurée. Pharyngites chroniques. Bronchites chroniques. Antisepsie de l'intestin. Rhumatismes aigus et chroniques. Arthritismes. Syphilis.

Laboratoires M. ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS

SULFOLÉINE

du Dr E. ROZET

Principe actif. — Sulfolitholate d'ammonium.

Propriétés thérapeutiques. — Médication soufrée organique, antiseptique, expectorante, balsamique, décongestionnante. Ni toxique, ni narcotique, ni antispasmodique, n'entrave pas l'expectoration.

Forme. — Solution désodorisée, aromatisée.

Indications. — Coqueluche, Bronchites aiguës et chroniques, Laryngites et Rhino-pharyngites aiguës et chroniques, Associations microbiennes secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

Doses moyennes. — 3 à 5 cuillerées à café, à dessert, à soupe par 24 heures, suivant les âges et l'intensité des cas. La Sulfoléine peut être prescrite aux plus jeunes nourrissons. Les doses moyennes peuvent être doublées.

Mode d'emploi. — Donner les doses prescrites avant les repas, après une quinte, soit pures, soit dans eau sucrée, lait, tisane, à volonté.

Prix : **8 fr.**

Laboratoire de la Sulfoléine ROZET

Pharmacie Benderitter, à VENDOME (L.-et-Cher).

SULFO-MÉSARCA «ROCHE»

Pour injections intramusculaires dans toutes les formes de la syphilis.

Le Sulfo-Mésarca « Roche » est le 4,4'-dioxy-3,3'-diamino-arséno-benzène-N-méthylène sulfonate de sodium ; il se présente sous forme d'une poudre fine, légèrement colorée en jaune, très soluble dans l'eau, avec une réaction faiblement acide. Sa teneur en arsenic est de 20 %.

Aussi actif, plus stable et moins toxique que les sulfoxylates, le Sulfo-Mésarca « Roche », n'est pas irritant pour les tissus et peut être parfaitement employé en injections sous-cutanées et intra-musculaires indolores, avec d'aussi bons résultats, ce qui met entre les mains de tous les praticiens, sans préparation anté-opératoire, sans soins spéciaux post-opératoires, un traitement ambulatoire facile et discret, sans que le malade soit obligé de s'arrêter, donc, d'attirer l'attention de sa famille, sur une thérapeutique exceptionnelle.

Conditionnements :

Pour nourrissons et jeunes enfants :

Dose 00 (rouge) = 45 milligrammes.
Dose 0 (violet) = 75 milligrammes.

Pour adultes :

Dose	I (bleu)	=	15 centigrammes
—	II (orange)	=	30 —
—	III (rouge)	=	45 —
	IV (vert)	=	60 —
—	V (violet)	=	75 —
—	VI (noir)	=	90 —

PRODUITS
F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
21, Place des Vosges, Paris (IIIe)

SULFUREUX POUILLET

Approuvé par l'Académie de Médecine.

MÉDICATION SULFUREUSE

Composition. — Poudre à base de sulfure de calcium préparé dans nos laboratoires, associé à des sels alcalins.

Mode d'action. — Au contact de l'eau, formation de monosulfure de sodium à l'état naissant.

Dans l'organisme, dégagement de faibles doses d'hydrogène sulfuré qui fluidifie les sécrétions bronchiques — aseptise l'appareil respiratoire — assure l'évacuation intestinale et lutte contre l'intoxication — modifie les cellules cutanées, altérées ou anormales.

Avantage. — Réalise extemporanément la médication sulfureuse à domicile impossible avec les eaux minérales et les préparations habituelles dénuées de stabilité.

Indications. — Catarrhe des voies respiratoires. — Bronchites chroniques. — Asthme. — Rhinites. — Pharyngites, laryngites chroniques. — Ozène. — Arthritisme. — Goutte. — Rhumatisme. — Lymphatisme, scrofule. — Intoxication mercurielle. — Dermatoses. — Herpès, eczémas, lichen, impetigo, etc...

Formes et mode d'emploi.

Boisson : 1 mesure pour un verre d'eau ou de lait (agiter avec une baguette de bois) ; à prendre matin et soir, loin des repas.

Échantillons sur demande.

Bain ou Lotions :
1 flacon pour un bain d'adulte,
un demi-flacon pour un bain d'enfant,
1 cuillerée à café pour deux litres d'eau (pour lotions).

Laboratoire POMPANON
112, Rue du Bac, 112 — PARIS

SULFURINE DU DOCTEUR LANGLEBERT

Composition. — A base de : Carbonate neutre de sodium et de soufre spécial.

Action :

La *sulfurine* donne, par sa dissolution dans l'eau, un bain alcalin soufré ; et réalise, à domicile, le bain hygiénique par excellence.

Indications. — Dermatoses, rhumatisme chronique, traumatismes, blessures, diabète, lymphatisme, scrofule, anémie, chlorose, rachitisme convalescences, déchéance organique.
Bain hygiénique, tonique et fortifiant. N'abîme pas les baignoires.

Mode d'emploi. — Une boîte pour un grand bain. Utiliser, pour les soins de toilette et dans les dermatoses, *le savon Sulfurine Langlebert.*

ADRIAN & Cie
9 et 11, rue de la Perle. — PARIS

SULFURION

Description. — Complexe colloïdal électrique isotonique, non toxique et indolore, à base de soufre, en ampoules de 3 cc. (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le Sulfurion libère les ankyloses dans le rhumatisme chronique, diminue les nodosités, permet le retour au fonctionnement des articulations et remédie à l'insuffisance sulfurée. En même temps les phénomènes douloureux disparaissent et le retour à la santé s'établit.

Indications. — 1 ampoule de 3 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans toutes les formes de rhumatisme aigu ou chronique, simple, fibreux, osseux, partiel, blennorragique, et dans toutes les insuffisances sulfurées, goutte, acné, pharyngites chroniques, etc.

Laboratoires CH. COUTURIEUX
18, avenue Hoche — PARIS

SULFURYL MONAL

Forme. — Pastilles agréables à sucer.

Composition. — Synthèse des eaux minérales sulfureuses.
Chaque pastille dégage 2 cc. d'hydrogène sulfuré dans l'estomac.

Dose. — Croquer ou sucer 2 à 6 pastilles par jour.

Propriétés. — Permet d'instituer d'une façon active partout et en toute saison la *médication sulfureuse interne*.

Action. — Antiseptique et antitoxique, stimule les échanges.

Indications. — Affections de la gorge et des voies respiratoires. Grippe. Coqueluche. Lymphatisme. Rhumatismes. Syphilis. Maladies de la peau. Etats infectieux et post-infectieux.

Laboratoires MONAL et Cie
6, rue Bridaine — PARIS

SUPPARGYRES
du Docteur FAUCHER

Traitement de la Syphilis acquise ou héréditaire, récente ou ancienne. Méthode simple sous forme discrète, *voie rectale*, active et sans inconvénients à tous les âges et dans tous les états (grossesse, fatigue, voyage, etc.).

Forme. — Adultes. — Suppositoires à 0,04 cgr. de Hg. vif préparé mécaniquement à froid pour obtenir une division absolue. Nourrisson et enfants de 1 à 10 ou 11 ans 0,02 cgr.

Dose. — 1 le soir en se couchant. Suivre le traitement 30 à 40 jours, repos de 8 ou 10 jours ou davantage et recommencer.

Nota. — Hg. vif *est* et *reste*, il est supérieur à tous les sels, jamais stable. Le seul anti-syphilitique *indiscutable et indiscuté*. Sa véritable voie d'absorption est la *voie rectale* parceque tous les capillaires de l'intestin vont au foie qui vitalise et rend Hg. actif : On mélange a une solution d'arséno-benzol des tréponèmes vivants : *Ils vivent*. Mais si l'on ajoute au mélange une trace d'*EXTRAIT de FOIE*, les tréponèmes *sont foudroyés*,
(Exp. de Levaditi.)

Laboratoire du Docteur TISSOT
34, Boulevard de Clichy — PARIS

SUPPO-GYNALS

Analgésique sédatif général

Forme. — Suppositoires.

Composition. — Antipyrine, chlorhydrate de morphine, extraits de belladone, de jusquiame, de cannabis et de sénécio, beurre de cacao.

Prop. thérap. — Calment instantanément les douleurs qui précèdent les règles, et en général toutes les douleurs des organes du bassin, règles douloureuses, contractions utérines, hémorroïdes, fistules, etc.

Mode d'emploi. — Dès le début des douleurs, introduire dans l'anus un « SUPPOGYNAL ». Dix minutes après, deuxième suppositoire. (Il est bon d'employer les S.-G. dès le début des douleurs. Plus on tarde, moins l'effet est sûr).

Laboratoire LEES
124, Rue du Bac — PARIS.

SUPPOSITOIRES CORBIÈRE

Composition. — A base d'Arsénobenzol (606).

Mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir après une selle spontanée ou provoquée par un lavement évacuateur.

Continuer le traitement vingt-quatre jours, cesser deux semaines et reprendre une nouvelle série.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes. Syphilis viscérale.

Hérédo-Syphilis. — Angine de Vincent. — Dysenteries amibiennes.

Présentation. — Chaque boîte contient 6 suppositoires et ne porte aucune indication de nature à gêner le secret professionnel.

Suppositoires pour adultes à 0 gr. 10 de 606.

Suppositoires pour enfants, à 0 gr.03 de 606.

Suppositoires pour nourrissons, à 0 gr. 01 de 606.

Laboratoires pharmaceutiques CORBIÈRE
27, rue Desrenaudes - PARIS - Tél. : Wagram 37-64

SUPPOSITOIRES A L'ESCULEOL

Contre les hémorroïdes

Adrénaline, scuroforme, stovaïne, extrait de marron d'Inde et d'Hamamélis, Euproctol.

Avantages. — Analgésiques, antiseptiques, décongestionnants.

Ne provoquent aucun choc local et atténuent rapidement les douleurs.

Mode d'emploi. — Un suppositoire matin et soir et après chaque garde robe pendant les crises.

Pour les chroniques, un suppositoire par jour.

Michel DELALANDE

13, rue Lacharrière, Paris (XI^{e}).

SUPPOSITOIRES LOGEAIS

Composition. — Chaque suppositoire contient 0,60 cgr. d'oléosulfonate d'hamamélidine, combinaison définie d'une huile sulfonée spéciale avec un extrait glycériné total d'hamamélis préparé sans alcool.

Indications. — Hémorroïdes internes et rectite concomitante.

Propriétés. — Analgésiques, décongestionnants vaso-constricteurs. Sédation rapide et durable, aucune réaction douloureuse. Tolérance parfaite. Ne tachent pas le linge d'une manière indélébile.

Ni stovaïne, ni adrénaline, ni extraits opothérapiques.

Mode d'emploi. — Introduire matin et soir après lavage un suppositoire Logeais par le petit bout pour ne pas augmenter l'irritation locale.

Laboratoires Émile LOGEAIS

24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE

SUPPOSITOIRES MIDY

(Adréno-Styptiques)

Adrénaline	0 gr. 00025
Anesthésine-stovaïnée	0 gr. 06
Ext. de Marrons d'Inde frais stabilisé.	0 gr. 02

pour un suppositoire.

Dose et mode d'emploi :

Introduire un ou deux suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin une heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes; soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Propiétés Thérapeutiques :

Décongestionnants, astringents, anesthésiques, calmants, antiseptiques.

Indications :

Traitement rationnel des Hémorroïdes.

LABORATOIRES MIDY

4, rue du Colonel-Moll, Paris (XVII^{e}).

SUPPOSITOIRES PEPET

(Beurre de Cacao-Glycérine)

pour Bébés, pour Garçonnets,

pour Adultes.

CONSTIPATION. HÉMORROIDES

La boîte : 12 fr. 50

La 1/2 boîte : 7 fr. 50

Henry ROGIER

Docteur en Pharmacie.

56, Boulevard Péreire

PARIS

SYLCASE GRYSA

Récalcifiant rationnel indiqué dans tous les cas de déminéralisation.

Fractures. — Diminue de moitié le temps nécessaire à la consolidation.

Tuberculose. — Guérison de la tuberculose osseuse. Aide à la reminéralisation des tuberculeux.

Rachitisme et croissance. — Favorise de développement osseux des enfants. Prévient et limite la carie dentaire.

PRODUITS CHIMIQUES du MAINE

7, Rue Saint-André — LE MANS

SYNCAINE

Novocaïnum : Pharmacopée française 1920

Composition. — Ether para-aminobenzoïque du diéthyl-aminoéthanol.

Propriétés. — Anesthésique, sept fois moins toxique que la cocaïne.

Applications. — Anesthésie locale, régionale, épidurale et rachidienne.

Formes : *I. Syncaïne pure*, à l'état de sel.

II. — Comprimés Syncaïne pure et de *Syncaïne-Adrénaline.*

III. — Ampoules sèches, à 0 gr. 08, 0 gr. 12, 0 gr. 15.

IV. Solutions adranesthésiques.

V. Nécessaire pour anesthésie épidurale.

VI. — Tubes stérilisés Clin (1, 2, 5, 10, 25 et 50 cc.), aux titres usuels.

VII. — Collyres de Syncaïne.

Laboratoires CLIN

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

SYNERGYL VADAM

Histogénèse générale

Formes :

Ampoules et Granulé

Doses :

Une ampoule tous les deux jours (ou une cuillerée à café de granulé deux fois par jour), chez tous les grands déprimés et Convalescents.

Tonique ante et post opératoire

Composition :

Nucléophosphates de soude et de chaux associés aux arsenicaux assimilables et à la strychnine (0.001 par ampoule).

Demander renseignements et Littérature aux

Laboratoires VADAM

5, Rue Bréa — PARIS (VI^{e})

Toutes analyses médicales.

SYNTHOL

Complexe de Cyclanols polyméthyliniques et de Cétones cycliques agissant par action physique. Rigoureusement exempts d'alcaloïdes toxiques, de radium ou de dérivés radio-actifs.

Présentation. — Liquide hyalin, non toxique, ni caustique, ni salissant, s'employant exclusivement en applications externes. Livré en flacons de 250 cc. environ, entourés, chacun d'un écran inactinique.

Propriétés. — Excitant efficace de la vasomotricité (propriétés immédiatement vérifiables). Tonique du système nerveux par action réflexe et régulateur des échanges intraorganiques. Cryogénique d'action rapide provoquant instantanément une sensation d'euphorie chez l'individu en état de santé ou en cours de maladie. Dynamogénique et tonique de toute déficience organique sans aucune action secondaire néfaste.

Indications. — La plupart des états de dépression et le symptôme douleur.

Du fait de son mode d'action très général, le **Synthol** est plutôt qu'un médicament un mode thérapeutique utilisable dans de nombreuses circonstances comportant un état de dépression ou le symptôme douleur.

a) Symptôme *Fatigue :* États asthéniques au cours des maladies, Anémies, Dénutrition, Convalescence des États infectieux, etc., Surmenage intellectuel, Insomnie, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Surmenage physique.

b) Symptôme *Douleur :* Migraines, Névralgies, toutes les douleurs dues aux accidents arthritiques, Rhumatismes aigus, chroniques, déformants, articulaires, musculaires.

Limitations des mouvements articulaires, Arthrites. Sciatiques. Lumbagos, Névralgies faciales, Douleurs intercostales, Coliques intestinales, Hépatiques, Néphrétiques, Utéro-ovariennes, etc.

c) Autres indications principales :
Troubles de la circulation veineuse : Hémorroïdes, Phlébites, Varices, etc.

Usages gynécologiques : Leucorrhée, Vaginites, Métrites. Troubles de la Ménopause. Période obstétricale.

Usages chirurgicaux : Pansements aseptiques Anesthésie locale en remplacement du Kélène. Anémie post-opératoire.

Usages stomatologiques : Pyorrhée alvéolo-dentaire. (Irrigations dans le trajet intragingival au moyen d'une seringue, guérison obtenue en quelques jours.)

Pansements dentaires, Irritations des muqueuses, etc.

Posologie. — S'utilise en Lotions, Compresses, Frictions, Pulvérisations, Lavages, Gargarismes, Pansements pur ou étendu d'eau à 50 et 20 %. En général, les applications doivent être faites non seulement sur le point où se manifeste le symptôme douleur, mais en même temps sur la région où l'on estime que se trouve la cause principale du malaise (les applications sur la tête et la nuque sont très importantes et généralement indiquées du fait de l'action du **Synthol** sur les centres bulbaires).

Utiliser : **Synthol** pur : en Frictions sur la tête, la nuque et les régions malades. Additionné d'eau à 50 et 20 % ; en Gargarismes et Injections intravaginales, etc., et Compresses permanentes renouvelées plusieurs fois par jour, en Compresses sur les Contusions, Brûlures, Douleurs névralgiques variées, et injections dans les trajets fistuleux.

Eviter de laisser s'écouler plus de 24 heures entre chaque application. L'usage du **Synthol** sur l'épiderme ne doit jamais produire de rubéfaction. Il est inutile de frictionner fort. Dans le cas d'utilisation prolongée en compresses pures, vaseliner légèrement la peau.

LABORATOIRES DU SYNTHOL

Usine Centrale,

15, rue du Bois, VINCENNES (Seine).

TABLETTES HOVA
(ou Hovalettes)

Composition. — Chaque tablette renferme *cinq centigrammes* d'extraits dialysés, dont un tiers de houblon et deux tiers de valériane.

Propriétés. — Sédation inoffensive et *progressive* du système nerveux, dispensant de l'emploi du chloral, des bromures et des dérivés barbituriques.

Indications. — *Toutes les affections d'origine nerveuse :* Surexcitation, Insomnie, Neurasthénie, Troubles de la ménopause. Se prescrit également aux enfants dont le sommeil est agité, aux vieillards pour combattre les battements de cœur et autres manifestations de l'artériosclérose.

Mode d'emploi. — 3 à 4 tablettes trois fois par jour, aux deux repas et au moment de se coucher. Demi-dose pour les enfants.

Laboratoire ZYMA
4, rue Bellart — PARIS (XV^e).

TABLETTES PERROUD

La " Tablette Perroud " est certainement la forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : Le goût n'est pas offusqué, les reflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de Cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum :* dans l'*Hyperchlorhydrie*, 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite, gastralgie, Hypersécrétion* dans les *fermentations intestinales*, à petites doses seule ou associée, la " Tablette Perroud " rendra toujours de réels services.

Laboratoire PERROUD
rue des Archers — LYON

TABLETTES ZÉVA

Formule. — Extraits SECS d'hydrastis, hamamélis, viburnum, bourdaine, kola, excipient spécial.

(aucune incompatibilité comme avec les mélanges d'extraits fluides et de teintures).

Présentation. — Tablettes de 1 gr. équivalentes à environ XL gouttes du mélange d'extraits fluides. Goût agréable.

Posologie. — 1 à 4 par jour, 15 à 20 jou par mois.

(aucune contre-indication)

Indications. — Dysménorrhée, aménorrhée, Ménopause, Suites d'ovariotomie, Varices, Phlébites, Hémorroïdes.

Laboratoire H. CLUZEL

60, Cours Émile-Zola—LYON-VILLEURBANNE

TABUROL MONAL

Hématopoiétique leucocytogène.

Trois formes. — Ampoules, Dragées, Gouttes.

Composition. — Hémoglobine, manganès strychnine, fluor, méthylarsate, glycéro phosphate, acide nucléinique. Dans les ampoules pas hémoglobine.

Doses. — 4 à 6 dragées par jour aux repas. Avaler sans croquer. — XV à XX gouttes avant les repas. — 1 ampoule chaque jour.

Action. — Stimule la nutrition cellulaire. Restaure les déficiences nerveuses. Reminéralise l'organisme.

Indications. — Etats anémiques, convalescences ; troubles palustres, dépression nerveuse.

Laboratoires MONAL et Cie

6, rue Bridaine, Paris

TÆNIFUGE BARDET

(Médaille d'Or, STRASBOURG 1924)

Composition. — Préparation liquide à base d'Aspidium Félix Mas, obtenue par un procédé mécanique à l'état colloïdal.

Indications. —Tænias, Ascarides, Oxyures, Ankylostomes, Tricocéphales.

Posologie. — Se conformer aux indications du prospectus joint au flacon.

Prix : **25** fr.

Echantillons et littérature détaillée

Pharmacie BARDET

FONDÉE EN 1860

76, rue de Sévres — PARIS (VII[e])

TÆNIFUGE FRANÇAIS DU Dr E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait chloroformo-huileux de Fougère mâle des Pyrénées, comprenant le purgatif. Présenté en capsules.

Indications. — Ankylostomiase, Teniasis, Parasites intestinaux.

Caractéristiques. — Pas de traitement préalable, pas de diète, pas de purgatif, pas d'arrêt du travail, absorption particulièrement simple, *non toxique*.

Mode d'emploi. — Absorption de capsules le matin à jeun, en dix minutes, avec *aussi peu de liquide que possible*. Action au bout d'une heure ou deux. Si malaise ou nausées absorption d'un peu de café ou de thé.

Dose. — Adultes : 12 capsules. Enfants au-dessous de 12 ans : autant de capsules que d'années d'âge et une en plus.

Laboratoires du Dr E. DUHOURCAU

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).
Anciennement, 10, rue de Turenne — PARIS

TÆNIFUGE KIRN

en capsules

à base de filicine, principe actif de la fougère mâle dissous dans son huile grasse.

Tænifuge le plus actif, ne présentant pas les dangereux inconvénients des tænicides, comme la pelletiérine. (Travaux et thèse de Kirn et Schmidt)

Capsules Kirn. — Capsules à l'extrait vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la filicine, est toujours stable et uniforme; sans calomel.

Mode d'emploi. — 1° Avant-veille, purgation; 2° la veille, diète presque absolue (lait); 3° Le matin à jeun l'absorption de 5 en 5 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement suivies.

Enfants. — Capsulines Kirn, spécialement dosées.
Médication sans similaires

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

8, rue de la Source — PARIS (XVI[e]) Tél. Aut. 11-86

TAMPOL " ROCHE "

Pansement gynécologique idéal

Le *Tampol Roche* est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique, non absorbante contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet.

Mode d'emploi. — Plonger pendant 3 à 4 secondes environ le *Tampol " Roche "* dans de l'eau bouillie à peine tiède, puis, la malade, ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tout sens : le *tamponnement vaginal est parfait.*

N. B. — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du *Tampol Roche* d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de la gélatine.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & C[ie]

21, Place des Vosges — PARIS

TAPO

Ferments lactiques.

Spécifiques des affections gastro-intestinales.

Forme. — Cultures liquides.

Composition. — Excipient : Bouillon de viande peptoné. Principe actif : Ferments lactiques sélectionnés.

Propriétés thérap. — Au point de vue curatif, le **Tapo** modifie rapidement le terrain infecté, augmente la résistance du malade en apportant une aide indispensable à la leucocytose organique et détruit les conséquences de l'infection.

Au point de vue préventif, le **Tapo** met l'organisme en état de non réceptivité tant par la résistance qu'il augmente que par la destruction des micro organismes qui assiègent l'individu continuellement.

Indications. — Gastrites, entérites, entérocolites, intoxications alimentaires, diarrhées chroniques, dysenteries, insuffisance hépatique, appendicite chronique, néphrites coli-bacillaires, albuminurie, impétigo, eczéma, furonculose, pyodermites, enfin dans toutes les maladies fébriles aiguës (grippe, fièvres typhoïde et paratyphoïde) *comme agent anti infectieux.*

Posologie. — De 1 à 2 flacons-ampoules par vingt-quatre heures (ou plus dans les cas d'infections marquées) pur ou dans un peu d'eau. Le traitement est de trois boîtes, on peut le continuer comme préventif en cas dérécidive.

Le **Tapo** est d'une conservation indéfinie ; ne s'altère pas sous l'action de la chaleur et du froid : c'est donc le produit d'élection pour les colonies et les pays chauds.

Laboratoires MADYL
14, rue de Miromesnil, PARIS.

TARTRATE BORICO-POTASSIQUE PACHAUT

Tubes dosés de tartrate borico-potassique pur à faire dissoudre au moment de l'emploi. Conservation parfaite.

Indications. — Épilepsie, troubles névropathiques.

Présentation. — En boites de 30 tubes dosés à : 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr., 3 gr., 4 gr., 5 gr., 6 gr., 8 gr.

Posologie. — Dose moyenne : 4 à 5 gr. par jour pour les adultes. Dépourvu de toute toxicité, doit être pris chaque jour sans interruption jusqu'à guérison.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre le contenu d'un tube dans un verre d'eau, à prendre en 2 ou 3 fois dans les 24 heures.

Laboratoires PACHAUT
130, Boulevard Haussmann — PARIS

TAXOL

Composition :

Extrait total des glandes de l'intestin	0 gr. 05
Extrait biliaire	0 gr. 10
Agar-Agar	0 gr. 05
Ferments lactiques	0 gr. 05

Forme. — En comprimés de 0 gr. 25.

Prop. thér. — Régulateur physiologique de l'intestin. Aucune accoutumance. Non toxique.

Indication. — Constipation.

Dose et Mode d'emploi. — Commencer le traitement par deux comprimés après un des repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Laboratoires Réunis " LOBICA "
11, Rue Torricelli — PARIS (XVII[e])

TÉBÉPHAGUINE-FORNET

Vaccin buccal antituberculeux

Principe actif. — Bacilles tuberculeux isolés des affections tuberculeuses les plus diverses et dégraissés par un procédé spécial breveté en France.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire, osseuse et autres.

Forme. — Flacon de 30 pilules.

Dose. — 1 à 3 pilules par jour.

Propriétés thérap. — Après une réaction locale et générale, légère diminution et disparition de la Fièvre, des Sueurs, de la Toux, des Douleurs et de la Faiblesse, Augmentation du poids et des forces, Amélioration de l'appétit, du sommeil et de l'état général.

Informations commerciales :

Laboratoires THAIDELMO

23, rue du Caire — PARIS (II[e])

Informations scientifiques et échantillons.

INSTITUT DE MICROBIOLOGIE SARREBRUCK

TEGEOL

Antiprurigineux keratoplastique

Composition :

Pommade répondant à la formule suivante :

Macération huileuse de fleurs de genêt...	1 gr
Ichtyosulfate d'ammoniaque.....	1 gr
Oxyde de zinc.....	5 gr.
Vaseline / Lanoline } Q. S. pour.....	30 gr.

Action thérapeutique :

Antiseptique, analgésique, vaso-constricteur, antiprurigineux, cicatrisant, keratoplastique.

Indications :

Toutes les dermatoses. Eczémas amorphe, vésiculeux, séborrhéique, suintant, chronique. Erythèmes, impetigo, dartres. furonculose, Tous les prurits. Ulcère variqueux, plaies atones, brûlures, gerçures des seins, engelures, etc..

Mode d'emploi. — En applications locales, avec ou sans pansement, suivant les cas.

LABORATOIRES COUSSINET

21, rue des Martyrs, Paris (IX[e]).

TERKAL MONAL

Forme. — Dragées.

Compos. — Carbonate de gaïacol terpino-codéiné associé au fluorure de calcium nucléiné et aux extraits de plantes béchiques.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour entre les repas. Avaler sans croquer.

Action. — Calmantes, Expectorantes, Curatives, Reminéralisatrices.

Indications. — Toux, Bronchites, Affections broncho-pulmonaires.

Laboratoires MONAL & Cie
6, Rue Brigaine — PARIS

TÉTRANITROL ROUSSEL

Composition.

Comprimés de tetranitrate d'Erythrol à 1, 2, 5 mmgr et 1 centigr.

Indications.

Hypertension : **Angine de poitrine, asthme cardiaque, œdème pulmonaire.**

Doses et mode d'emploi.

Laisser fondre les comprimés sur la langue au moment des crises (de 1 à 15 mmgr. par 24 heures).

Pharmacie ROUSSEL
10, rue Washington. — PARIS (VIIIe).

THALASSOTONINE VADAM

Histogénèse générale
et particulièrement pulmonaire

Formule.

Eau de mer isotonique	5 cc.
Cadodylate de soude	0,05
S. de Strychnine	0,001
Nucléophosphate de soude	0,10

MODE D'EMPLOI et DOSES

Pour adultes. — Pratiquer tous les 2 jours une injection intramusculaire profonde en ayant soin de faire pénétrer le liquide très lentement dans les tissus. Maintenir quelques secondes un tampon de ouate stérile sur la piqûre après le retrait de l'aiguille et pratiquer un très léger massage pour faciliter la résorption du liquide.

Pour enfants au-dessous de 10 ans. — Commencer par injecter une demi-ampoule et augmenter progressivement jusqu'à une ampoule entière.

Demander renseignements et Littérature aux

Laboratoires VADAM
5, rue Bréa — PARIS (VI^e^)
Toutes analyses médicales.

THAOLAXINE

(Laxatif-régime)

Combinaison d'agar-agar et d'extrait de rhamnées. Paillettes, cachets, comprimés, granulé.

Doses et mode d'emploi. — Paillettes 1 à 4 cuillerées à café à chaque repas ; cachets, 1 à 4 cachets à chaque repas ; comprimés, 2 à 8 comprimés à chaque repas ; granulé, 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas (spécialement préparé pour les enfants).

Propr. thérap. — Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

Indications. — Spécifique de la constipation habituelle.

Laboratoires DURET & RÉMY
ASNIÈRES (Seine)

THÉISINE DUBAT

Granulé de Théobromine et Extrait de maïs.

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique idéal dans les affections du cœur et des reins. Action certaine, constante, durable ; toxicité nulle ; pas de céphalées, pas d'intolérance. *Granulé* de goût agréable préféré aux cachets et aux solutions par les enfants et les vieillards.

Indications. — Toutes celles de la théobromine, insuffisance cardiaque, endocardite, myocardite, fléchissement du cœur dans l'artériosclérose, affections cardiorénales, mal de Bright, albuminurie, néphrite, maladies infectieuses et tous les cas d'insuffisance urinaire.

Doses. — 2 à 8 cuillerées à café par jour.

1 cuillerée à café = { 0 gr. 25 théobromine pure. / 0 gr. 05 extrait de maïs.

Echantillons sur demande.

LABORATOIRE DU Dr DUBAT

80, rue du faubourg Saint-Denis, Paris.

THEMSALINE

Composition :

La Themsaline préparée d'après les travaux du Dr Jentzer de Genève (Voir *Traitement biologique des infections*, Masson, éditeur) est un mélange fractionné et rectifié d'essences et de résines.

Propriétés :

Agit comme antiseptique, antitoxique, analgésique, sédatif, leucogène et tonique. Attaq e l'infection étiologiquement et non symptomatiquement, comme tous les narcotiques.

Indications :

Toutes les infections aiguës : grippe, et infections pyogènes, érysipèle, angines, annexites, furoncles, phlegmons, péritonites, fistules d'origine infectieuse, plaies infectées. *Co- tre-indications* : éviter les doses fortes dans la pneumonie, la broncho-pneumonie, les néphrites.

Mode d'emploi :

En injec ions intraveineuses, pratiquées *lentement* avec une seringue à tuberculine et de préférence, avec l'aiguil e spéciale Jentzer : 6/10 cmc. chez l'adulte et 3/10 cmc. chez l'enfant. Une injection par jour jusqu'à guérison ou apyrexie.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XVe)

THÉOBROMINE INVAR

Produit soumis au contrôle physiologique le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Diurétique puissant.

Indications. — Néphrites, cardiopathies, artériosclérose, arthritisme.

Formes. — Pure, caféinée, lithinée, phosphatée, en boîtes de 24 cachets à 0,50 ; 30 cachets à 0,25.

Pharmacie Centrale des Pharmaciens de France
21, rue des Nonnains-d'Hyères
PARIS (IVe).

THÉOBROMOSE DUMESNIL

Théobrominate de lithium cristallisé

Prop. thér. — Possède les propriétés toni-cardiaques et diurétiques de la théobromine, mais est dépourvue des inconvénients de celle-ci ; son activité se manifeste à des doses 5 fois moindres. Elle agit quand la théobromine est inefficace et provoque l'excrétion de l'urée et des chlorures.

Indications. — Les effets cardio-toniques et vaso-dilatateurs de la Théobromose, en outre de son action diurétique énergique, font de ce produit associé ou non à la Digitaline la base de la thérapeutique cardio-rénale. Elle est indiquée dans l'urémie, l'uricémie, l'artério-sclérose, la sclérose cardio-rénale, les œdèmes d'origine cardiaque ou rénale, etc.

Formes. — 1° Solution. Dose : 1 à 4 cuill. à soupe par jour dans un peu d'eau sucrée.
Une cuill. équivaut à 0,50 cgr. de théobromine.
2° Gouttes. — Dose : 1 à 4 cuillers-mesures par jour.
60 gouttes ou une cuiller-mesure équivalent à 0,50 de Théobromine.
3° Comprimés. — Dose : 2 à 8 par jour.
comprimés équivalent à 0,50 cgr. de Théobromine.

Laboratoires DUMESNIL
10, rue du Plâtre — PARIS

THÉOBRYL "ROCHE"

(Théobromine injectable).

Indications. Contre-indications, Action thérapeutique de la Théobromine, mais plus maniable, plus actif et à doses moindres. (Voir les travaux des Professeurs Pouchet, Rémond, E. Duhot, des Docteurs Jouisse, Richard St-Yves, Bénech, Ségard, Vigouroux, Colomiès, Crampon, etc.).
Toujours très bien toléré par les adultes, les vieillards et les enfants.

THÉOBRYL "ROCHE" AMPOULES

chaque ampoule = 2 cc.

Cette forme est indiquée quand il y a intolérance gastrique ou susceptibilité du malade et chaque fois qu'il faut agir vite et imposer un traitement intensif.
ADULTES : dose moyenne utile, 1/2 ampoule 2 à 4 fois par jour.
(Voir page Ampoules Théobryl).

THÉOBRYL "ROCHE" GOUTTES

1 cc. = XXX gouttes.

Cette forme permet de continuer et de prolonger l'action obtenue par les injections ou de réaliser un *traitement d'entretien* toujours parfaitement supporté. Chaque dose doit être prise dans un verre d'eau sucrée ou aromatisée, ou bien dans une tasse de tisane de queues de cerises, orge et chiendent, stigmates de maïs, etc., à n'importe quel moment de la journée, de préférence une demi-heure avant ou après les repas.
ADULTES : dose moyenne utile, X gouttes 4 à 8 fois par jour.
Enfants : V gouttes 2 à 6 fois par jour.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
21, place des Vosges — PARIS (IVe).

THÉOSALVOSE

Composition. — Théobromine chimiquement pure, extraite du cacao.

Propriétés. — Diurétique d'une innocuité complète, d'un pouvoir remarquable, d'une fidélité constante.

Indications. — Artériosclérose, Affections cardiaques et rénales. Albuminurie, Intoxications, Urémie, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Hydropisie, Maladies infectieuses, Scarlatine.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cachets dosés à 0 gr. 50 par jour.

Formes. — Théosalvose pure, digitalique, strophantique, spartéinée, scillitique, caféinée, phosphatée, lithinée.

Laboratoires André GUILLAUMIN
13, Rue du Cherche-Midi — PARIS

THÉOXANTHINE

Diurétique cardio-rénal
Adjuvant précieux des cures toni-cardiaques

Composition. — Théobromine *cristallisée* pure associée au phosphate disodique.

Indications. — En général toutes celles de la théobromine. Pas d'intolérance. Activité plus grande à doses moindres. Complète très heureusement les cures toni-cardiaques.

Présentation et posologie.

Cachets A : Théobromine crist. pure.... 0,50
Phosphate disodique 0,20
Adultes. — 2 à 3 cachets par jour.

Cachets B : Théobromine crist. pure.. . 0,25
Phosphate disodique..... 0,10
Enfants 1 à 2 par jour : Adultes 4 à 6.

Echantillons et littérature.

Laboratoires DEGLAUDE
6, rue d'Assas, Paris (6e) Tél. : Littré. 31-85.
Belgique : *Agent général :* **L. Prunières**
19, rue Louis Hap. — BRUXELLES

THIGÉNOL " ROCHE "

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

Propr. thér. — Antiseptique, analgésique, kératoplastique, décongestionnant et puissamment résolutif.

Indic. thér. — Dermatologie, Oto-rhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc.

Thigénol " *Roche* " pur ou en solution glycérinée (10 à 15%) en applications externes :

Savon " *Roche* " *au Thigénol*, le meilleur savon antiseptique.

Toutes les affections gynécologiques :

Thigénol " *Roche* " pur ou en solution glycérinée (10 à 15%).

Ovules " *Roche* " *au Thigénol* à 30% (voir page spéciale).

Tampol " *Roche* " pansement gynécologique idéal (voir page spéciale).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE & Cie
21, Place des Vosges — PARIS

THIOCOL "ROCHE"

Dérivé du gaïacol, inodore, ni toxique, ni caustique, soluble dans l'eau.
1 gr. de Thiocol "Roche" = 0,52 de gaïacol cristallisé.

Doses et modes d'emploi :

SIROP "ROCHE" au Thiocol
(1 cuill. à soupe = 1 gr. Thiocol "Roche")
Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour
Enfants : 2 à 4 cuill. à café, selon l'âge.

CACHETS "ROCHE" de Thiocol
(1 cachet = 0,50 Thiocol "Roche")
2 à 6 cachets par jour

COMPRIMÉS "ROCHE" de Thiocol
(1 comprimé = 0,50 Thiocol "ROCHE")
2 à 6 comprimés par jour

Propr. Thér. :

Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique, Orexique.

Ind. Thér. :

Toutes les affections broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites. Diarrhées, etc.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
21, Place des Vosges — PARIS

THIOSYL

Soufre colloïdal sans albumine
(en suspension huileuse).

Ampoules de 2 cc. Chaque centimètre cube contient 2 milligrammes de Soufre colloïdal, sans albumine en suspension dans huile végétale.

Indications.

Anémies. — Rhumatismes. — États infectieux.

Mode d'emploi.

Comme tonique général, 1 ampoule tous les deux jours par série de douze ampoules.

Dans les cas de grippe. — Fièvres éruptives. — Syphilis. — Tabès, 1 ampoule tous les quatre jours.

Dans les cas graves, une injection tous les jours pendant 6 jours, puis tous les deux jours, par série de douze ampoules.

LABORATOIRES KEYBER
M. Berger, Pharmacien
29, Faubourg Bourgogne, Orléans.
Dépôt général ; Office commerciale pharmaceutique, 71 rue du Temple Paris III[e] et ses succursales.

THOROXYL

Antiseptique intestinal - antidiarrhéique non constipant.

Pharmacologie. — A base de terres rares, bactéricide et favorisant l'action des sucs digestifs.

Indications. — Tous les états diarrhéiques du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte. Tous les syndromes infectieux à point de départ intestinal (colibacillurie, etc.).

Posologie. — Aucune contre-indication. Aucune toxicité. 6 à 10 comprimés pour l'adulte. 2 à 6 comprimés pour l'enfant et le nourrisson.

Laboratoires du Dr LAURENT-GÉRARD
Docteur ès sciences.
Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris.
40, rue de Bellechasse — PARIS
Tél. : Littré 97-95.

TIODINE COGNET

$C^6SN^2H^{13}I$

Composition. — Combinaison cristallisée, soluble dans l'eau, de l'iode 47 °/₀ avec la thiosinamine

Propriétés. — Réalise l'Association *Iode-soufre*. Médicament organo-iodique soufré. Pas d'iodisme. Pas de contre-indications.

Indications. — Toutes celles de l'iode et du soufre, ensemble ou séparément. Toutes scléroses, Hypertension. Rhumatisme chronique. Tabès. Scléroses médullaires. Asthme. Emphysème. Syphilis, Obésité, etc.

Formes et posologie. — Pilules (Tiodine : 0 gr. 05 par pilule). *Adultes :* 2 à 5 par jour. *Enfants :* 2 par par jour. Ampoules (Tiodine 0 gr. 20), 1 tous les 2 jours (voie sous-cutanée, intramusculaire ou intra-veineuse).

Laboratoires des Produits COGNET
Armingeat et Cie
43, rue de Saintonge — PARIS (IIIe)

TISANES DAUSSE

Préparées avec des plantes sélectionnées soumises à une dessiccation rapide, les tisanes Dausse présentent le maximum d'activité thérapeutique et constituent des adjuvants précieux des diverses médications.

Les nombreuses formules de **Tisanes Dausse** permettent d'utiliser largement cette médication. A signaler :

La **tisane hépatique Dausse** à base de plantes cholagogues (Combretum).
La **tisane antidiabétique Dausse.**
La **tisane antiarthritique Dausse.**
La **tisane dépurative Dausse,** etc...
Uricolytique Dausse.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot, Paris (IVe).

TONIKÉINE CHEVRETIN

Sérum Neuro-Tonique

Ampoules contenant chacune :

Sulfate de strychnine....	1 milligr.
Cacodyl. de soude.....	0.05
Eau de mer diluée.....	5 cc.
Glycérophosph. soude (Cod. 1908).	0.20

Prop. thér. — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer auxquelles s'ajoutent celles des autres éléments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

Indications. — *États de dépression nerveuse et organique, Convalescences, Neurasthénie, Entérites, Tuberculose.*

Laboratoires LEMATTE et BOINOT
52, rue La Bruyère — Paris
Télégr. CHEVREMATTE-PARIS

TONUDOL

Comprimés, granulé, injectable.

Nucléarsinate de manganèse associé aux hypophosphites de chaux et de fer.

Dose et mode d'emploi. — *2 comprimés.*

1 mesure ou cuillerée à café de *granulé* avant chaque repas.

Injectable : 1 ampoule de 1 c. c. tous les jours ou tous les deux jours en injection intramusculaire profonde.

Indications. — Reconstituant de l'organisme dans les Surmenages, les Troubles de la Nutrition et de la Croissance, la Chlorose et l'Anémie.

Fortifie sans provoquer d'excitation.

Laboratoires LICARDY
38, boulevard Bourdon — NEUILLY-PARIS
Téléphone : Maillot 17-75.

TONYOL "F"

Composition. — Préparation à base d'acanthea virilis, de piscidia et de viburnum.

Action. — L'acanthea virilis, dont le principe actif est la muirapuiamine, a été étudiée par Rebourgeon et Matte. C'est un remarquable tonique neuromusculaire et un accélérateur du courant circulatoire, à action prolongée due à la lenteur de l'élimination.

Indications. — Troubles de la circulation, Accidents de la puberté et de la ménopause, Règles douloureuses et irrégulières, Congestion pelvienne, Artério-sclérose, Varices, Hémorroïdes.

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés par jour.

Laboratoires VARGAS
5, rue Chauveau-Lagarde — PARIS (VIIIe)

TOPIQUE STOMACAL DAUSSE

Granulé à base de gélose, gélatine et carbonate de bismuth. Réalisation pratique de la Thérapeutique par le pansement gastrique.

Indications. — Toutes les formes de gastrite, même celles qui s'accompagnent de *rétention*, les *dyspepsies hyperacides*, les *ulcérations*, les *hémorragies gastriques*.

Action sédative immédiate dans toutes les algies gastriques.

Posologie. — 1 cuillerée à soupe plusieurs fois par jour, au réveil à jeun, une demi-heure avant chacun des principaux repas, le soir au coucher.

Délayer la dose dans 1/4 de verre d'eau et absorber après simple dissolution.

LABORATOIRES DAUSSE
4, rue Aubriot, Paris (IV).

TOTAL-TONIC

Le plus complet et le plus énergique des Reconstituants.

Forme. — Elixir.

Action. — Immédiate sur les système nerveux, osseux, musculaire, glandulaire et sur le plasma sanguin.

Indications. — Toutes défaillances de l'organisme, amaigrissement, Asthénie, Anorexie, Anémies, convalescences, maladies de la nutrition, bronchites chroniques et prébacillose, neurasthénie etc.

Composition. — Chaque cuiller à soupe contient :

Fer (citrate ammoniacal).....	0.05
Manganèse (sulfate).....	0.0375
Phosphate de soude.....	0.50
Acide phosphorique officinal.	0.25
Méthylarsinate de soude.....	0.015
Extrait de quinquina.....	0.25
Teinture de noix vomiques...	0.25
Teinture de Coca.....	1.25
Extrait fluide de kola.....	0.32

Le TOTAL-TONIC réalise une association nouvelle, complète, et moderne des éléments indispensables à l'organisme défaillant.

Mode d'Emploi. — Adultes : Une cuiller à soupe avant le repas de midi et du soir dans un peu d'eau, de vin ou de lait.

Adolescents : (14 à 18 ans) : Une cuiller à dessert aux mêmes heures et de la même façon.

Enfants (au-dessus de 10 ans seulement) : Une cuillère à café dans un peu d'eau ou de lait avant le repas de midi et du soir pendant 12 jours ; arrêter 5 jours et terminer le flacon aux mêmes doses.

Laboratoires B. C. L.
M. BERGER
29, Faubourg de Bourgogne — ORLÉANS

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple PARIS (IIIe) et ses succursales.

24

TOT'HAMÉLIS

(ni jouvence, ni extrait, ni teinture).

Composition. — *Feuille* d'Hamamélis administrée en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante *fraiche*.

Propriétés thérapeutiques. Médication de base de l'insuffisance veineuse. Le **TOT' HAMÉLIS** peut être prescrit : 1° seul, avec des résultats contrôlables en moins de huit jours de traitement ; 2° associé à tous produits ; 3° en alternant avec les mêmes produits pour éviter l'accoutumance. (Le **TOT'HAMÉLIS** a, sur les compositions polyvalentes, l'avantage de laisser au médecin la direction du traitement à instituer, selon les cas).

Indications. Stases veineuses. Etats congestifs. Hypertension.

Posologie. — *Comprimés :* 6 par jour, aux repas. *Cachets :* 2 par jour, aux repas Après disparition des troubles à combattre, les doses peuvent être diminuées de moitié comme médication d'entretien.

Laboratoire CHANTEREAU

8, rue de Constantinople — PARIS

TRÉPARSÉNANS

SULFO-TRÉPARSÉNAN

Composition. — Dioxydiaminoarsénobenzène méthylène sulfonate de soude. Contient 20 % d'arsenic ; solutions moins oxydables à l'air que celles des 606 et 914. Injections sous-cutanées ou intramusculaires *indolores*.

Formes. — *Le Sulfo-Tréparsénan* est délivré en ampoules scellées à la lampe et contenant le produit dans le vide sur gaz carbonique, en boîtes d'une dose et en boîtes de 10 ampoules d'une même dose.

Doses.

00	0	I	II	III	IV
0 gr. 02	0 gr. 04	0 gr. 06	0 gr. 12	0 gr. 18	0 gr. 4

V	VI	VII	VIII	IX	X
0 gr. 30	0 gr. 36	0 gr. 42	0 gr. 48	0 gr. 54	0 gr. 60

NÉO-TRÉPARSÉNAN

Composition. — Dioxydiaminoarsénobenzol méthylène sulfoxylate de soude. Produit défini, rigoureusement table ; se présente sous l'aspect d'une poudre jaune citron légère, douée d'une odeur franche, faiblement alliacée, très facilement soluble dans son poids d'eau distillée ; sa solution est neutre.

Doses et Formes. — Délivré en ampoules scellées à la lampe et contenant le médicament dans le vide, sur gaz carbonique, aux doses suivantes :

I	II	III	IV	V
0 gr. 15	0 gr. 30	0 gr. 45	0 gr. 60	0 gr. 75

VI	VII
0 gr. 90	1 gr. 05

1° Par boîte de 1 dose en ampoules de 10 cc. à fond plat ;

2° Par boîte contenant la série des 6 doses progressives (I à VI) en ampoules à fond plat ;

3° Par boîte de 10 ampoules de la même dose, en ampoules ordinaires de 5 cc. à fond rond ;

4° En boîtes de 3 ampoules de 3 grammes de sel.

TRÉPARSÉNAN. — Dichlorhydrate de dioxydiamidoarséno-benzène.

Doses de 0 gr. 10 à 0 gr. 60 par progression de 0 gr. 10.

Nota. — Avant d'être livrés pour l'usage thérapeutique, les *Tréparsénans* sont l'objet d'un contrôle chimique et d'un contrôle physiologique des plus sévères de façon à ne présenter que des produits parfaitement purs, de bonne conservation et de constance éprouvée.

Laboratoires CLIN

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

TRÉPARSOL

acide formyl-méta-amino-para oxyphénylarsinique.

Indications :

Syphilis, à tous les âges (nourri-sons, enfants, adultes), et à toutes les périodes de la maladie (Hérédo-Syphilis, Syphilis primaire, secondaire, tertiaire, Para-Syphilis).

Dysenterie amibienne. Le Tréparsol est un véritable spécifique de cette affection, qu'il guérit en détruisant les Amibes et les Kystes amibiens.

Protozooses intestinales ; Diarrhée des Tuberculeux ; entéro-colites diverses (d'origine parasitaire ou infectieuse).

Pian et toutes Spirochétoses ; Angine fuso-spirillaire de Vincent, etc.

Présentation :

Tubes de 30 comprimés dosés à 0,25 (dosage adultes).

Tubes de 40 comprimés dosés à 0,10 (dosage enfants).

Tubes de 60 comprimés dosés à 0,02 (dosage nourrissons).

Posologie :

Adultes : 1 à 4 comprimés par jour.

Enfants : 0,01 à 0,02 cg par jour et par kilog.

Mode d'emploi :

Traitement *discontinu* (3 à 4 jours consécutifs par semaine), et *progressif* (commencer par des doses faibles et augmenter de semaine en semaine.)

Dépôt : Pharmacie générale,
54, rue de la Chaussée-d'Antin, PARIS.

Laboratoire
L. LECOQ et F. FERRAND,
14, rue Gravel, LEVALLOIS (Seine).

TRÉPOL

Traitement bismuthique de la syphilis. Médication intra-musculaire en ampoules stérilisées (3 cc.).

Spirillicide à base de tartrate basique de bismuth renfermant environ 80 % de Bi en suspension huileuse.

Adopté par l'Assistance publique et le Ministère de l'Hygiène.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

Laborat. L.-G. TORAUDE O. ✻ O. I. ⓒ

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e^)

TRÉPOQUINOL

Iodure quinio-bismuthique en *suspension aqueuse organo-synthétique.*

Propriétés spirillicides excessivement accusées où la composition chimique de la suspension facilite non seulement la résorption du bismuth, mais encore augmente son activité thérapeutique.

Indications :

Syphilis paludéenne, toutes affections tréponémiques.

Adopté par le ministère de l'Hygiène pour ses dispensaires de prophylaxie et dans tous les hôpitaux.

Pour tous renseignements sur le mode d'emploi, la technique et la littérature de cette préparation, s'adresser aux

Laboratoires L.-G. TORAUDE O ✻ O. I. ⓒ

Docteur en Pharmacie, Lauréat de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e^).

TRIASE

Extrait de Cascara privé de ses principes amers et drastiques par un nouveau procédé chimique

Laxatif idéal

Composition. — Extrait de cascara désamérisé et agar-agar.

Indications. — Régulateur physiologique des fonctions de l'intestin. Ni malaises, ni coliques, sans interruption de la vie normale.

Posologie. — Comme laxatif : 1 ou 2 cachets ou comprimés avant le repas du soir ou en se couchant. Comme purgatif : 3 ou 4 cachets ou comprimés le soir en se couchant. Pour les enfants de 8 à 15 ans, moitié dose.

Laboratoires STENE

4, place des Vosges — PARIS (IV^e^)

TRIBROMURE GIGON

Composition. — Bromure triple de potassium, sodium et ammonium.

Forme. — Poudre desséchée.

Indications thérapeutiques. — Etats nerveux, Psychoses, Hyperexcitabilité, Insomnies, Epilepsie.

Mode d'emploi et doses. — Cuillère-mesure dosant 1 gr. : 2 à 12 par jour.

Flacons de 30, 60 et 125 gr.

Laboratoire du Doct. André GIGON

7, rue Coq-Héron — PARIS (I^er^)

TRICALCINE

A base de sels calciques rendus assimilables : phosphates tribasiques, carbonates et autres sels de chaux et de magnésie nécessaires à l'organisme.

Prop. Thérap. — Recalcification de l'organisme (Formule et théorie de Ferrier-Sergent).

Indications. — Tuberculoses pulmonaire, osseuse, péritonite tuberculeuse, Rachitisme, Lymphatisme, Scrofulose, Grossesse, Allaitement, Troubles de la dentition, Fractures.

Doses et mode d'emploi. — Tricalcine pure.

Adultes :

Poudre : 1 cuiller mesure
Cachets : 1 cachet
Comprimés : 1 comprimé
Granulés : 2 cuillers mesure
Tablettes chocolat : 2 tablettes
Tricalcine adrénalinée : 1 cachet
— Méthylarsinée : 1 cachet
— Fluorée : 1 cachet

} Avant chacun des trois repas

— **Opothérapique** (1) : 2 drag. ou 2 cuillers à café de granulés aux 3 repas.
Parathyroïdes: Surrénales, Thymus, Foie, Rate, Moelle os-euse.

Enfants : moitié de ces doses.

(1) La formule de la Tricalcine opothérapique a été établie d'après les travaux les plus récents des auteurs français et étrangers sur le métabolisme du calcium. Cette formule d'association pluriglandulaire est composée des meilleurs fixants endocriniens du calcium.

Laboratoire des Produits SCIENTIA
Dr E. PERRAUDIN, pharmacien,
21, rue Chaptal — PARIS

TRIDIGESTINE DALLOZ

Composition. — Les trois ferments digestifs essentiels à leur maximum d'activité physiologique sous une forme qui assure l'intégrité complète de leur pouvoir digestif.

Forme. — Granulé.

Indications. — Dyspepsies par insuffisance sécrétoire.

Dose. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Laboratoire DALLOZ
13, Bd de la Chapelle — PARIS (X^{e}).

TRIDYNOL

Traitement du Dr Delmasure de Lille.

Médicament composé leucopoiétique puissant. Employé avec succès depuis un an et demi contre les tuberculoses.

Mode d'action. — Augmentation des globules blancs et spécialement des lymphocytes.

L'autolysat des globules blancs est bactéricide par ses oxydases et lipases. Dissolution des cires bacillaires par les lipases. Exp. de Flessinger.

Agglutination des bacilles qui prennent des formes d'involution et de souffrance, puis diminuent de nombre et disparaissent après 6, 8, 10 mois.

Ce traitement est activé et exalté par la Diathermie transpulmonaire qui, employée seule, est inutile. Diathermie transpulmonaire 1500 à 2000 milliampères, trois séances par semaine une demi-heure. 20 à 30 séances consécutives.

Parfois momentanément dépression et fatigue vers le dixième au quinzième jour.

En général, augmentation de la toux et des crachats qui deviennent souvent très abondants, purulents, puis muqueux et enfin disparaissent.

Contre-indication absolue : l'*Albuminurie*.

Contre-indication passagère : l'*Hémoptysie*.

La Diathermie ne provoque pas d'Hémoptysie (professeur d'Arsonval).

Réaction thermique variable, souvent défervescence après un temps variable.

Résultats. — Malgré toute la prudence de rigueur en cette matière, on peut dire que les résultats sont très bons au premier et deuxième degré. Variable au troisième degré, tout dépendant de l'état général.

Administration à doses fractionnées pour éviter le choc, pilules.

Pilules : 5 par jour en moyenne, 8 h., 10 h., 12 h., 3 h., 7 h., sans s'occuper des repas.

Cette médication est très efficace à doses réduites chez les enfants, combinée avec les rayons ultra-violets (sans diathermie).

Pour renseignements s'adresser :

Laboratoire du TRIDYNOL

18, rue de l'Orphéon — LILLE

TRIGANOL VIGIER

Traitement des Amaigrissements et des Asthénies.

Forme :

Cachets (contenant 0 gr. 75 de poudre).

Composition :

Poudre de fenugrec désodorisée, complètement épuisée par les solvants généraux, ne rancissant pas.

Propriétés et indications thérapeutiques :

Stimule l'appétit, donne des forces et favorise la reprise du poids. Tuberculose à tendance fibreuse. Asthénie (dépression physique ou psychique). Convalescence des maladies infectieuses. Diabète et tous états d'amaigrissement.

Doses. — Trois cachets par jour. Cette dose peut être augmentée considérablement, le fenugrec ne présentant aucune toxicité.

Laboratoires VIGIER et HUERRE
12, Boul. Bonne-Nouvelle — PARIS

TRI-IODO ERCÉ

Iodure de Bismuth. Quinine et Arsenic.

Forme.

Ampoules-seringues auto-injectables pour injections intra-musculaires.

Indications.

1° Amibiase aiguë et chronique.
2° Paludisme.

Avantages.

1° Disparition définitive des kystes amibiens.
2° Association de la cure anti-malarique et de la réfection hématique.

Mode d'emploi.

1° *Amibiase.* — 6 à 12 injections à 2 ou 3 jours d'intervalle,
2° *Paludisme.* — 3 injections à 36 heures d'intervalle puis une tous les 3 jours.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne, Paris.

TRINITRINE CAFÉINÉE DUBOIS

(Dragées à Noyau Mou).

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième.	2 gouttes (3 centigr.)
Caféine..... ...	2 centigrammes.
Chl. d'Héroïne.	1 demi-milligramme.

Propriétés et indic. thérap. — *Vaso-dilatateur puissant à diffusion instantanée et action immédiate*, ne provoquant aucun phénomène réactionnel. Médicament de choix de *l'Angine de Poitrine, l'Asthme Cardiaque, l'Œdème Pulmonaire.*

Mode d'emploi. — Ces dragées doivent être *croquées* : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée du principe actif et par là-même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle), au moment des accès. Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Laboratoires LALEUF
20, rue du Laos — PARIS (XV^e^)

TRINITRINE ROUSSEL

Composition :

Comprimés n^os^ I, II, III correspondant à 1, 2 ou 3 gouttes de la solution au 1/100^e^.

Indications.

Hypertension : Crises douloureuses des aortiques, angine de poitrine, asthme cardiaque.

Doses et mode d'emploi :

Au moment des crises, laisser fondre sur la langue un comprimé. (Deux à 6 par 24 heures).

Pharmacie ROUSSEL
10, rue Washington. — PARIS (VIII^e^)

TRIRADOL

Association d'iode organique, menthol, camphre et éléments radio-actifs.

Indications thérapeutiques. — Toutes les tuberculoses à lésions limitées et à évolution lente.

Contre-indications. — Tuberculose évolutive rapide, néphrite, insuffisance hépatique, etc.

Posologie. — Adultes : une ampoule de 1 cc. ou 4 à 6 capsules par jour, par série de 30. Enfants : suivant l'âge. — Voir Littérature.

Présentation. — Boîte de 10 Ampoules. Boîte de 60 capsules.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg. — PARIS (X^e^)
R. C. Seine 143.981.

TRISODYL ROZET

Hypotenseur Antiscléreux.

Composition (Dose quotidienne moyenne)

Nitrite de soude Chimiq. pur...	0 gr. 20
Silicate de soude Chimiq. pur...	2 gr.
Citrate de soude Chimiq. pur...	4 gr.

Formes Pharmaceutiques et Posologie.

Comprimés. — 6 comprimés par jour dans un peu d'eau.

Solution. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, avant les deux principaux repas.

Action. — Provoque une vaso-dilatation périphérique modérée et continue, portant sur les Artérioles et les Capillaires. (Nitrite de soude). Solubilise la chaux, augmente la diurèse, s'oppose aux fermentations (Silicate de soude). Ramène à la normale, la coagulabilité et la viscosité sanguine (Citrate de soude).

Indications. — Hypertension artérielle. Artériosclérose, États pléthoriques et angiospasmodiques, Angine de poitrine, aortites, etc.

Prix : 20 fr. le flacon de solution ou la boîte de Comprimés pour un traitement d'un mois environ.

Laboratoire de la Sulfoleine Rozet

Benderitter, Pharmacien à Vendôme (L.-et-Ch.)

TUBEROL

Association d'essences balsamiques pures.

Propriétés thérap. — Sans aucune toxicité. Inoffensif. Il est absorbé par la peau ou respiré en fumigations ou inhalations, puis exhalé avec toute son efficacité antiseptique par la muqueuse des voies respiratoires. Une petite quantité est éliminée par les reins dans les urines.

Indic. thérap. — a) Toutes affections des voies respiratoires : Broncho-pneumonie, Bronchite capillaire, Abcès du poumon, Pneumonies grises, Bronchites aiguës, Catarrhes des emphysémateux, etc.

b) Les états ganglionnaires : Ganglions et Abcès froids non fistuleux.

Mode d'emploi. — 1° Applications thoraciques, Dans une flanelle bien imbibée qui séchera à même la peau ;

2° En inhalations, 1/2 cuill. à café dans un litre d'eau bouillante ;

3° En compresses. Sur les ganglions, pur ou mélangé de 2 ou 3 parties d'huile ou de vaseline.

Laboratoires du TUBÉROL-E. BOUTEILLE
23, rue des Moines — PARIS

TUBES DULCIS

Pommades ophtalmiques.

Argolène (Sel d'Ag). — Conjonctivites aiguës, à 5 0/0 et 10 0/0.

Cadmiol (Sel de Zn et Cd). — Conjonctivites chroniques, à 1 0/0.

Cuprinol (Sel organique de Cu). — Conjonctivites chroniques, à 1 0/0 2 0/0, 5 0/0.

Iodo-Calcique. — Traitement de cataracte, 8 0/0.

Novoptine. — Ulcères à pneumocoques, à 1 0/0.

Oxyde orangé de Hg. — Blépharites, conjonctivites phlycténulaires, à 1 0/0 2 0/0, 3 0/0, 4 0/0, 5 0/0.

Ophtalmoforme. — Antipurulent, à 2 0/0, 3 0/0.

Aristol. — Antipurulent, à 2 0/0.

Iodoforme. — à 1 0/0 et 2 0/0.

Thiosinamine. — Opacités synéchies à 1 0/0.

Mydriasine. — Mydriatique puissant.

Alcaloïdes seuls.

Alcaloïdes associés.

Pilules Iodo-Kératine.

Pilules de Cytogénol.

Laborat. de Thérapeutique oculaire du Docteur FERRY, à BOURG (Ain)

TUBES DU Dr GUIRAUD

(Anciennement DAVIEL)

POMMADES OPHTALMIQUES

munis d'une canule spéciale permettant l'introduction directe de la pommade dans l'œil.

TOUTES FORMULES

Spécialement recommandées : Pommades à l'aristol, à l'oxyde de jaune orangé et à l'atropine. Obtenues par dissolution préalable de la substance active et évaporation du solvant, ce qui assure un état de division extrême et une puissance d'action considérable.

Échantillons sur demande

Docteur GUIRAUD

Ex-Pharmacien des Hôpitaux
98, Rue Saint-Genès - BORDEAUX

TUBES OPHTALMOLOGIQUES FERLUX

Tubes Ferlux :

Oxyde de mercure orangé, 1, 2, 3, 4 et 5 %
— — jaune, 1, 2, 3, 4 et 5 %
Iodoforme, Calomel, Précipité blanc, Mydriasirine (atropine + cocaine), Ethylhydrocupréine (optochin), Halocalcine (I Na + Ca Cl^2), Ichtyol-oxyde de zinc, Thigénol-oxyde de zinc, etc, etc.

Produits Orhino :

Pour Otorhinolaryngologie.

Laboratoires RHINOPHTA

G. Bousquet, Docteur en Pharmacie, à Albi.

TULLE GRAS LUMIÈRE

au Baume du Pérou

est destiné à éviter l'adhérence aux plaies des pièces de pansement. — Le pansement fait avec le **Tulle Gras Lumière** se détache aisément sans effort, sans provoquer de douleur ni d'hémorragie résultant de l'arrachement d'éléments appartenant aux tissus fragiles en voie de régénération.

Le **Tulle Gras Lumière** est coupé en carrés de 10 × 10 cm, qui sont superposés dans une boîte métallique, et séparés par du papier destiné à en protéger l'asepsie.

Pour les plaies de grande surface, nous avons un format de 22 × 22 qui n'est livré que sur demande spéciale.

Produits Spéciaux des Laboratoires A. LUMIÈRE

M. SESTIER Pharmacien
9, Cours de la Liberté — LYON

ULCÉOPLAQUE-ULCÉOBANDE

« LE PANSEMENT »

Pansement souple et spongieux préparé avec des poudres aseptiques émulsionnées.
C'est un merveilleux générateur de la cellule, un stimulant de sa vitalité.
Les résultats sont surprenants.
Cicatrisation rapide des *plaies atones* et des *ulcères variqueux*, même très anciens, *sans interrompre ni le travail ni la marche.*
Boîtes de 6 pansements pour 24 jours.
Ulcéoplaque N° 1 — 5 cm/6 cm.
Ulcéoplaque N° 2 — 7 cm / 9 cm.
Ulcéobande — une pièce.

Laboratoire SÉVIGNÉ
11, rue de Jarente — PARIS (IVe)
Dépôt et détail : 26, rue de Sévigné
PARIS (IVe)

ULCÉROPHILE NOSAN

Traitement ambulatoire des Ulcères variqueux.

Présentation et composition :

Bande de 0m,13 × 12 mètres imprégnée aseptiquement par un procédé spécial d'une pâte gélatino-amidonnée (pâte de Unna modifiée) constituant, après application, un appareil de contention parfait.

Action :

Décongestionnant, cicatrisant, on obtient par ce pansement un bas à varices semi-rigide moulé sur le membre et ne pouvant se distendre ; provoque par la marche un léger massage qui a pour résultat la résorption rapide du liquide séreux infiltré et le dégonflement du membre. Rétablissement de la circulation veineuse, meilleure nutrition des tissus qui retrouvent toute leur vitalité et enfin la cicatrisation des lésions.

Indications :

Toutes les plaies atones des membres inférieurs et particulièrement des Ulcères variqueux même les plus anciens, sans tendance à la cicatrisation. Plaies traumatiques à cicatrisation lente, phlébites, varices douloureuses, eczémas, brûlures à épidermisation difficile.

Mode d'emploi :

Plonger la boîte contenant la bande dans un récipient d'eau assez profond (casserole) et porter à l'ébullition jusqu'à ramollissement complet, (15 à 20 minutes). Appliquer la bande directement sur la peau à la façon d'une bande molletière en évitant les renversés.

Pharmacie MAYAUD
6 *ter*, rue Voltaire,
La Garenne-Colombes (Seine).

ULMARÈNE GIGON

Composition. — Éther salicylique liquide d'odeur agréable.

Indications thérapeutiques. — Analgésique local, antirhumatismal externe. Spécifique contre les rhumatismes, les névralgies.

Formes. — 1° Ulmarène pur flacons de 30, 60, 125 cmc. ;

2° Ulmarène formulé dans une préparation magistrale (liniment, pommade) ;

3° Ulmarol Gigon (liniment) :

4° Baume du docteur Gigon, en tube.

Mode d'emploi. — Onctions suivies d'enveloppements.

Laboratoires du docteur André GIGON,

7, rue Coq-Héron — PARIS (1er)

URACÉTOSE

Granulé sucré, effervescent, soluble

Propriétés thérap. — Action urisolvante très énergique, diurétique aussi puissant que doux pour le filtre rénal Antiseptique urinaire et hépato-rénal par excellence, analgésique.

Tolérance indéfinie. Aucune contre-indication.

Composition. — Tartrate de pipérazine (Lycéto), hexaméthylénététramine, salicylate, benzoate et formiate de lithine, lactose et sucre effervescent.

Indications. — Toutes les manifestations de l'arthritisme, Artério-Sclérose. Douleurs, Rhumatismes, Goutte, Gravelle, Coliques néphrétiques et hépatiques, Névralgies, Migraines, Sciatiques, Maladies du foie, des reins, de la vessie et des Voies urinaires (Néphrites, Pyélo-Néphrites, Cystites, Urétrites, Blennorragies etc.).

Grippe, Influenza, Fièvre et *toutes les maladies infectieuses.*

Dose et mode d'emploi. — 3 à 6 cuillerées à café par jour, dans de l'eau. Pour les enfants de 5 à 15 ans, par demi cuillerée à café, 3 à 6 par jour.

Echantillons et littérature

Laboratoires FÉVRIER & DECOISY

26, rue Sévigné — PARIS (IVe)

URASEPTINE ROGIER

A base de Pipérazine, Urotropine, Helmitol, Benzoate de soude et de lithine, etc.

Granulé soluble dosé à 0 gr. 50 de substance active par cuill. à café.

Dose. — 3 à 6 cuill. à café par jour.

Propriétés. — Antiseptique urinaire et biliaire par excellence. Dissout et chasse l'acide urique.

Le flacon : 12 fr. 50

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie
56, boulevard Pereire — PARIS

URAZINE

(Citro-salicylate de Pipérazine)

Le plus actif des dissolvants de l'acide urique et des urates. Analgésique, antiseptique.

Le médicament de choix à opposer à la *lithiase rénale* et à *toutes les manifestations arthritiques* (goutte, rhumatisme, gravelle, etc.).

Innocuité absolue. Aucune contre-indication.

Comprimés dosés à 0 gr. 30 (3 à 4 par jour, au moment des repas).

Granulés effervescents (une cuillerée à café, dans un demi-verre d'eau, aux deux principaux repas).

Laboratoire des Produits
" USINES DU RHONE "
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e^)

URIFLUINE

Succinate de lithine pur

Le seul sel de Lithine injectable sous la peau sans douleur ni réactions

Indications. — Rhumatisme chronique et déformant, goutte, gravelle, lithiase rénale, coliques néphrétiques, sciatique.

Propriétés thérapeutiques. — Ce sel dissout l'acide urique au sein de l'économie et ensuite aide à son expulsion par une action diurétique très accusée.

Mode d'emploi. — Les injections peuvent se faire dans toutes les régions du corps ; elles n'ont aucun inconvénient, n'amenant ni douleurs, ni gonflement, ni réaction d'aucune sorte. Selon les cas en faire une matin et soir, une par jour, une tous les deux jours.
Les comprimés et les pilules d'Urifluine se prennent à la dose de 2 à 4 par jour.

Laboratoires " STÉNÉ "
4, place des Vosges — PARIS

URILYSONE

Héxaméthylène-citrate d'anhydro-héxaméthyltétramine-benzoate de lithine.

Antiseptique urinaire et des voies biliaires.

Indications :
Cystites et pyélonéphrites.
Blennorragie.
Cholécystites et Angiocholites.
Rhumatismes.
Calculs.

Doses :
Etats aigus : 2 à 3 comprimés par jour.
Etats chroniques : 1 à 2 comprimés par jour.

Le tube de 20 comprimés : 7 francs.

Laboratoires O. ROLLAND
1, place Morand — Lyon

URISANINE

Composition. — Benzoate d'hexaméthylène-tétramine (urotropine) dissous dans un excipient à base végétale (plantes balsamiques) auquel a été incorporé l'extrait de stigmates de maïs.

Dosage. — Une cuillerée à café = 1 gr. de Benzoate d'urotropine + 0,20 cgr d'extrait de stigmates de maïs dissous dans 4 gr. d'excipient végétal balsamique.

Propriétés thérap. — Antiseptique urinaire et biliaire complet; balsamique et diurétique; dissolvant phosphatique, urique et uratique; éliminant sûr et rapide.

Indications. — Toutes affections des voies urinaires et biliaires, maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe), comme préventif de l'infection vésico-rénale.

Mode d'emploi. — Se prend diluée dans 1/2 verre d'eau naturelle ou gazeuse.
Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.
Enfants : par 1/2 cuillerée à café suivant l'âge.

Laboratoires de l' " URISANINE "
28, rue Milton — PARIS

UROFORMINE GOBEY

Comprimés dosés à 0 gr. 50. Comprimés effervescents dosés à 0 gr. 25 (solubilité instantanée.) Solution injectable en ampoules de 2 et 5 c c., 0 gr. 25 par c c.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés par jour dans un verre d'eau froide. Injections de 0 gr. 50 à 2 gr. par jour.

Prop. thér. — Le plus puissant antiseptique interne. Dissolvant de l'acide urique.

Indications. — Fièvres infectieuses, Grippe, Encéphalite, Complications broncho-pulmonaires, etc., Rhumatismes, Infections des voies biliaires et urinaires, etc.

Laboratoires GOBEY
21, rue d'Aumale — PARIS

UROIODINE

Composition. — L'Uroïodine ou Iodoéthylate d'hexaméthylénetétramine est une combinaison organique contenant 42 % d'iode rigoureusement titré, associée à un sel de lithine.

Propriétés physiques et chimiques. — Solution dialysable, se décompose lentement, est diffusée dans tout l'organisme, s'élimine dans l'urine sous forme d'iodure alcalin, ce qui indique une destruction complète de la molécule organique. Pas d'accumulation.

Propriétés physiologiques. — *Grâce à sa molécule iodée*, l'Uroïodine est un excitateur puissant des fonctions lymphoïdes, déterminant une hyperleucocytose intense, un fixateur d'oxygène, stimulant les échanges nutritifs de l'organisme.

Grâce à l'heureuse combinaison Iodo-Formine, l'Uroïodine constitue un agent anti-infectieux particulièrement énergique. Enfin *grâce à l'association Formine-Lithine* l'Uroïodine est un diurétique très actif et un excellent dissolvant de l'acide urique et des urates.

Indications. — Toutes affections glanduiaires : adénites, adénopathies, végétations adénoïdes, scrofulides, etc... Maladies de la nutrition : toutes manifestations des diathèses Urique-goutte, gravelle, calculs, etc. Arthritique : rhumatismes chroniques et déformants. Tuberculoses localisées : osseuses et ganglionnaires. Tertiarisme, Scléroses, Asthme, Emphysème, etc...

Formes et Posologie. — Ampoules A de 1‰ $^3/_4$. Ampoules B de 3‰ $^3/_4$. Comprimés kératinisés de 0gr.50. Chez l'enfant au-dessous de 15 ans 1 à 2 ampoules A par jour. Chez l'adulte, 1 à 2 ampoules B en injections intramusculaires ou intraveineuses (bien tolérées sans réaction locale ni choc hémoclasique, résorption parfaite). Comprimés : 1 à 2 comprimés suivant l'âge chez l'enfant ; 2 à 6 comprimés suivant l'âge chez l'adulte, comme traitement d'entretien contenant 42 % d'iode ; remplaçant avantageusement les iodopeptones qui n'ont que 17% d'iode, mieux tolérés grâce à leur enrobage spécial.

Laboratoire de l'UROIODINE

45, boulevard Lafayette — CALAIS

UROL NEUVILLE

Antiseptique urinaire. — Antiseptique biliaire. — Antiseptique général.

Composition :

L'Urol est à base de benzoate de soude, d'hexaméthylène tétramine et d'extraits diurétiques, (*uva, ursi*, chiendent, etc.). Une cuillerée à café correspond à 0 gr. 50 de citrate d'hexamétylène tétramine et 0 gr. 10 d'extraits. Il présente tous les avantages de l'urotropine en remédiant à ses inconvénients. Il respecte l'estomac et assure la perméabilité du rein.

Action et indications :

Antiseptique urinaire, il exerce sur l'urine une action infertilisante, il retarde sa fermentation ammoniacale et la désinfecte lorsqu'elle est précédemment infectée. Son emploi est indiqué dans les infections aiguës ou chroniques de l'arbre urinaire (pyurie, bacillose-rénale, cystite, infections gonococciques, urethrites, prostatites, lithiases, pyélonéphrites, etc.)

Cholagogue, il favorise l'excrétion biliaire, en agissant directement sur le foie, sur la contraction des canaux et la vésicule biliaire ; il exerce un pouvoir antiseptique et en agissant sur les phénomènes moteurs et secrétoires, il assure le drainage des voies biliaires.

Adjuvant de toute médicamentation anti-infectieuse, il s'associe au traitement sérothérapique, dans toutes les septicémies, quel qu'en soit l'agent pathogène, et dans toutes les grandes infections à germe connu (diphtérie, broncho-pneumonie, fièvre puerpérale). Dans certaines infections dont l'agent causal n'a pu être encore déterminé (encéphalite léthargique) il devient, grâce à son urotropine, un véritable spécifique.

Contre-indication :

Dégénérescence rénale.

Mode d'emploi :

2 à 3 cuillerées à café par jour, dilué dans un verre d'eau.

Laboratoire NEUVILLE
239, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris (VIII[e])
Tél. : Elysées 17-58.

UROMÉTINE
LAMBIOTTE FRÈRES

Hexaméthylènetétramine pure

Formes. — Comprimés, Ampoules, Cristaux.
Prop. thér. — Puissant antiseptique interne, antitoxique, antiuricémique.
Indications. — Toutes infections urinaires, intestinales et biliaires, toutes maladies infectieuses toutes manifestations de la diathèse urique.
Mode d'emploi. — 1° Comprimés de 0 gr. 50 à faire dissoudre dans l'eau et à prendre matin, midi et soir : 6 à 8 dans les cas aigus, 3 à 4 dans les cas chroniques. 2° Ampoules de 2 cc. et 5 cc. dosées à 0 gr. 25 par cc. pour injections intramusculaires ou mieux intraveineuses. 3° Cristaux pour prescriptions magistrales.
Littératures et échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES
3, Rue d'Edimbourg — PARIS (VIII°)
124, Avenue Rogier — BRUXELLES

UROMIL

Composition. — Association d'éther phényl-cinchonique, pipérazine, hexaméthylène-tétramine.
Forme. — Granulé de goût agréable, effervescent, instantanément soluble dans l'eau.
Action. — Mobilise, dissout, élimine l'acide urique. Par ses éléments phosphoriques, empêche la formation de purines endogènes, génératrices d'acide urique.
Par son phosphate disodique, entrave la précipitation de l'acide urique au niveau du rein et de la vessie.
Possède une activité double de celle des pipérazines granulées.
Indications. — Diathèse urique, goutte, rhumatisme chronique, lithiase hépatique et rénale.
Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau.

Laboratoires de l'UROMIL
Dr L. BELIÈRES,
19, rue Drouot, 19 — PARIS (IX°)

UROSAN DUFAYARD

Forme. — Comprimé à faire dissoudre.

Composition. — Benzo-camphorate d'urotropine et extrait de styles de maïs.

Indications. — Antiseptique, urinaire et biliaire. *Médicament de choix* pour le traitement des Cystites. Prostatites. Urétrites, Pyélites. Pyélonéphrites, de la Grippe. Fièvre typhoïde. Diathèse urique. Rhumatismes. Goutte. Gravelle. Calculs. Phosphaturie.

2 à 6 comprimés par jour, dissous dans l'eau.

Echantillons sur demande.

Laboratoires DUFAYARD

12, rue des Saints-Pères — PARIS

UTÉRAMINE

Composition

Solution au centième de chlorhydrate de paraoxyphényléthylamine présentée en ampoules de 1 c. c., pour injections, et en flacons de 10 c. c., pour l'usage interne.

Propriétés :

Excellent hémostatique, cardio-tonique et *bon excitant de l'utérus.* Remplace ergotines et extraits pituitaires aux effets inconstants.

Indications :

Obstétrique et gynécologie. Post-partum (hémorragies et atonies utérines), placenta praevia, ménorragies, métrorragies, dysménorrhées, ménopause.
Médecine interne. Hémophylie, hémoptysie, épistaxis, hémorragies intestinales, choc, collapsus, hémorragies en nappes.

Mode d'emploi :

On utilisera pour les injections hypodermiques (avant-bras ou cuisse) ou intramusculaires (muscles fessier), 1 à 3 c. c. et jusqu'à 5 c. c. selon les cas. Pour l'usage interne, 20 à 30 gouttes trois fois par jour.

Laboratoire ZYMA

4, rue Bellart — PARIS (XV^e^)

UVÉ

Premier produit français
ayant permis l'utilisation pratique
de l'actinothérapie indirecte.

GOUTTES UVÉ

Composition :

Solution aqueuse de phosphates et chlorures de Calcium, Manganèse, Magnésie et Fer (0 gr. 11 par c. c.), *irradiés par rayons ultra-violets*. Ni arsenic, ni strychnine.

Mode d'action :

Reminéralisent, reconstituent, désintoxiquent.

Indications :

Toutes les anorexies (nourrissons, enfants, adultes), dont elles sont le **véritable spécifique**. Convalescences post-infectieuses, Asthénie, Psychasthénie, Surmenage, Grossesse, Troubles endocriniens (Maigreur, Migraines, Aménorrhées, certains rhumatismes chroniques).

Posologie :

Adultes : 40 à 60 gouttes. *Enfants :* 20 à 40 gouttes, à prendre en une ou deux fois, dans un peu d'eau simple ou de préférence bicarbonatée. *Nourrissons :* 5 à 25 gouttes dans du lait.

AMPOULES UVÉ

Composition :

Manganèse, Fer, Nickel, en combinaison organique ; phosphates de Na, K et Mg.

Indications :

Identiques à celles des gouttes.

Posologie :

Adultes : 1 ampoule de 5 c. c. *Enfants :* 1 ampoule de 2 c. c. tous les deux jours.

Injection intramusculaire indolore.

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoires de l'UVÉ
101, rue de l'Abbé-Groult — PARIS (XV[e])

UVESTÉROL

Vitamine D.

ERGOSTÉRINE et CHOLESTÉRINE

Irradiées par rayons ultra-violets.

Composition. — Émulsion colloïde contenant par 10 gouttes : 1 mg d'Ergostérine, 6 mg de Cholestérine.

Mode d'action. — CALCOFIXATEUR, ANTITOXIQUE, BACTÉRICIDE.

Avantages. — Ergostérine sous forme d'éther oléique naturel extrait de la levure de bière. Infiniment **plus assimilable** que l'Ergostérine pure, simplement dissoute dans de l'huile. L'UVESTÉROL est **1 000 fois plus actif** que la Cholestérine ordinaire, non irradiée. Il est parfaitement toléré même chez les fébricitants. **2 gouttes = 3 cuillerées** à soupe d'huile de foie de morue.

Indications. — *Toutes celles de l'Ergostérine :* Troubles de la minéralisation, Rachitisme, Tétanie, Retards de Croissance, Caries dentaires, Fractures, Convalescences, Ostéomalacie, etc.

Toutes celles de la Cholestérine : Tuberculoses chroniques ou évolutives lentes (pulmonaires, séreuses, osseuses, ganglionnaires). Lymphatisme.

Posologie. — *Adultes :* 30 à 60 gouttes. *Enfants et nourrissons :* 10 à 40 gouttes. Soit pures, soit diluées dans un peu de lait.

Dans le rachitisme évolutif et la tétanie, la dose courante chez le nourrisson est de 30 à 40 gouttes, pouvant être portée au besoin à 60-80 gouttes.

Échantillons et Littérature sur demande.

Laboratoires de L'UVÉ

101, rue de l'Abbé-Groult — PARIS (XVe).

VACCIN ANTI-ASTHMATIQUE
du Professeur MINET

Le traitement vaccinal de l'asthme et des affections pulmonaires présente sur les nombreuses médications utilisées jusqu'à ce jour, l'avantage de s'adresser non pas à un symptôme, tel que la toux ou l'oppression, mais à une des causes les plus évidentes de l'entretien des affections, à savoir la pullulation microbienne à l'intérieur des voies respiratoires.

Indications. — Asthme, Emphysème, Catarrhe, Infections secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — L'injection doit être faite dans le tissu cellulaire sous-cutané; le point d'élection est la région dorsale, vers la base du thorax. Chez l'adulte, on peut injecter sans inconvénient le contenu d'une ampoule de 1 cc. 1/2. Les injections doivent être répétées tous les deux jours. Entre la 5e et la 6e injection, il est recommandé d'interrompre durant 6 jours et de reprendre le traitement dans les mêmes conditions. Chez l'enfant, le vaccin est aussi bien supporté que chez l'adulte, à la dose de 1/4 de cc. entre 1 et 3 ans; à 1/3 de cc. de 3 à 7 ans; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

VACCIN ANTI-PNEUMONIQUE
du Professeur MINET

« A la suite de l'injection de ce Vaccin, on assiste à une « modification véritablement impressionnante du ta- « bleau classique de la Pneumonie. »

Indications. — Pneumonie, broncho-pneumonie des enfants et des vieillards.

Mode d'emploi. — Le point d'élection est incontestablement la région sus-épineuse. Chez l'adulte, il faut injecter d'emblée le contenu d'une ampoule, soit 1 cc. et répéter l'injection toutes les 24 heures. Dans les cas graves, la dose peut être portée, dès le deuxième jour, à deux ampoules en une seule injection Si le cœur et les reins sont déjà touchés par l'infection, il y a lieu de commencer à la dose de 1/2 cc. Chez l'enfant, il y a lieu de réduire la dose à 1/4 de cc. entre 1 à 3 ans; 1/3 de cc. de 3 à 7 ans; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

VACCIN ANTI-GRIPPAL
du Professeur MINET

Traitement de la grippe et de toutes les complications pulmonaires et suppuratives : otites, sinusites, etc. congestion grippale.

Mode d'emploi. — Voir Vaccin Anti-Pneumonique.

Laboratoires " STÉNÉ "

4, place des Vosges — PARIS

VACCINOTHÉRAPIE ATOXIQUE CÉPÈDE

Hyperleucocytose et phagocytose spécifique exaltée.
Médication causale naturelle.

Innocuité absolue.

Vaccin Ac. Sa (acné)	Cépède.
Vaccin Bg. Pf. S. P. E. S. Ca (coqueluche et complications)	Cépède.
Vaccin C. (colibacillaire)	Cépède.
Vaccin C. E. (coli-entérococcique)	Cépède.
Vaccin C. E. S. (diarrhée)	Cépède.
Vaccin C. S. E. S. (entérite et entérocolite)	Cépède.
Vaccin E. (entérococcie)	Cépède.
Vaccin E. S	Cépède.
Vaccin E. Sa	Cépède.
Vaccin G. (gonococcie)	Cépède.
Vaccin G. S. E. S. (blennorrhagie)	Cépède.
Vaccin G. C. S. E. S. (affections blennorrhagiques de l'homme et de la femme)	Cépède.
Vaccin G. C. S. E. S. Psd	Cépède.
Vaccin Mo (Morax) (conjonctivite aiguë)	Cépède.
Vaccin Mo. Sa. (Morax-Staphyl.) (conjonctivite mixte)	Cépède.
Vaccin Mo. P. Sa. (Morax-Pneumo-Staphylo) (conjonctivite mixte)	Cépède.
Vaccin P. E. S. (pneumonie)	Cépède.
Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca	Cépède.
Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca. Py (Otite)	Cépède.
Vaccin Pf. S. P. E. S. Ca. (grippe et complications)	Cépède.
Vaccin Pf. Pb. S. P. E. S Ca. (Asthme)	Cépède.
Vaccin S (érysipèle)	Cépède.
Vaccin Sa (furoncles)	Cépède.
Vaccin S. Sa (peau-ostéomyélite)	Cépède.
Vaccin S. E. S (puerperalité)	Cépède.
Vaccin S. P. E. S (100 millions)	Cépède.
Vaccin S. P. E. S (400 millions)	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. (catarrhe	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. 100	Cépède.
Vaccin S. P. E. S. Ca. Pz (Ozène)	Cépède.

Tous curovaccins atoxiques sur demande de MM. les médecins

La caractéristique de la méthode Cépède réside dans la suppression totale de la phase vaccinale négative. Dans les curovaccins Cépède ci-dessus (désignés par les initiales des microbes servant à leur préparation) les toxines microbiennes sont toujours éliminées ou anéanties. L'injection sous-cutanée n'entraîne aucune réaction ni aucun phénomène morbide général ou local surajouté.

La boîte de 10 ampoules : 25 francs au public.

Institut de Biologie appliquée

60, rue Mathurin-Régnier et 47, rue Bargue
PARIS (XVe) — Téléph. : Ségur 11-40
Adresse télégraphique : Ibacépède — PARIS

Dans toutes les pharmacies.

VACCINS BACTERIENS I.O.D

(Procédés RANQUE et SENEZ)

Prophylaxie — Vaccinothérapie

VACCIN : Antityphoïdique.
— Antistaphylococcique.
— Polyvalents I. II. III. IV.
— Pneumo-Streptococcique.
— Anti-coquelucheux.
— Anti-gonococcique.
— Antistreptococcique.
— Anticolibacillaire.
— Antimélitococcique.

Injectables en injections sous-cutanées
Polyvaccin-Pansements non injectable.

Dépositaires généraux :
DEFFINS, 40, Fg Poissonnière — PARIS
LABORATOIRE de BIOLOGIE MEDICALE
16, rue Dragon — MARSEILLE
HAMELIN, 31, rue Michelet — ALGER
CAMBE, passage de Corinthe — TUNIS
Pour littérature et échantillons :
16, rue Dragon — MARSEILLE

VACCINS

(Bruschettini)

I. V, Antipyogène.

II. V, Antigonococcique.

Littérature et Échantillons

Laboratoires Fournier Frères

26, Boul. de l'Hôpital — PARIS

VACCINS DE RONCHÈSE

Ampho-vaccins

Composition générale. — Sont constitués par un lysat de germes ayant eu suspension une faible proportion de germes entiers bromés.

Avantages. — De par leur composition, ils allient les avantages des lysats (action immédiate, absence de réaction) et ceux des émulsions microbiennes de faible concentration (très léger phénomène de réaction non perceptible par le malade, mais favorable aux réactions de défense).

Le brome assure une stérilisation parfaite des germes et atténue considérablement les toxines tout en respectant leur pouvoir antigène.

Pas d'intolérance.

Ampho-vaccins injectables. — Par centimètre cube ; lysat de 2 milliards de germes totaux et 200 millions de germes bromés totaux.

Pulmonaire. — Pneumocoques, pneumobacilles, Streptocoques, staphylocoques, entérocoques, micrococcus catarhalis, cocco-bacilles de Pfeiffer.

Antistaphylococcique. — Staphylocoques.

Intestinal. — Colibacilles, entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, bacilles pyocyaniques.

Urinaire. — Colibacilles, entérocoques, staphylocoques.

Anti-infectieux. — Staphylocoques, streptocoques, colibacilles, entérocoques, bacilles pyocyaniques.

Ampho-vaccin à ingérer. — En ampoules de 5 c. c. Par centimètre cube : lysat de 1 milliard de germes totaux et un milliard de germes totaux bromés.

Intestinal. — Colibacilles, entérocoques, Proteus, Bacillus bifidus, Bacilles pyocyaniques.

Ampho-vaccins-pansements. — Filtrat de cultures additionné de microbes bromés, et rendu impropre à la culture *in loco* des germes secondaires.

Pour plaies et furoncles. — Staphylocoques, streptocoques, colibacilles, entérocoques, bacilles pyocyaniques.

Pour le rhino-pharynx. — Pneumocoques, pneumobacilles, streptocoques, entérocoques, micrococcus catarrhalis, cocco-bacilles de Pfeiffer staphylocoques.

Échantillons sur demande.

Laboratoires des Ampho-vaccins
7, Place Cassini, à Nice.
A.-D. RONCHÈSE, Docteur en pharmacie.

25

VACCINS " STÉNÉ "

Vaccin anti-furonculeux " Sténé ". Traitements de la furonculose et des affections à staphylocoques.
(En injections sous-cutanées, ampoules de 1 cc. — en comprimés).

Bouillon-vaccin anti-furonculeux " Sténé ", pour pansements.

Vaccin anti-coryza " Sténé " polyvalent. Traitement des Coryzas aigu et chronique, des pharyngites, angines, rhinites et de l'ozène.

LABORATOIRES " STÉNÉ "
4, place des Vosges, Paris.

VACCIN DE WEILL ET DUFOURT

Composition. — Pneumocoques, Entérocoques, Staphylocoques, Tétragènes.

Indications :

1°) *Préventif :* Bronchites profondes ou épidémiques. — Broncho-pneumonies post-opératoires.
2°) *Curatif :* Broncho-pneumonies de l'enfant et de l'adulte. — Pneumonies.

Avantages. — Aucune contre-indication. — Aucune réaction.

Posologie :

Nourrissons : 1/3 de cc. ; puis 1/2 cc. ; puis 1cc.
Adultes : 1 cc.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
37, rue de Bourgogne, Paris.

VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur L. Duchon
adoptés par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Lysat-vaccin polyvalent (B. diphtériques, streptocoques, pneumocoques, staphylocoques, B. de Pfeiffer, M. catarrhalis, colibacilles). Il est obtenu par un procédé exclusivement biologique : utilisation des propriétés du B. pyocyanique qui lyse les germes, neutralise leurs toxines et permet sa stérilisation par filtration.

Indications. — *Enfands, adultes, vieillards :* Bronchopneumonies, congestions pulmonaires, grippe, rougeole, diphtérie, post-opératoires et leurs complications suppuratives Action préventive et curative.

Mode d'emploi. — 3/4 de c. c. le premier jour, 1 c. c. chaque jour, jusqu'à apyrexie, puis 1 c. c. tous les deux jours.

RHINO-VACLYDUN

Composition. — Lysats des germes pathogènes du Rhino-Pharynx. Les surinfections dans les broncho-pneumonies, démontrées par l'étude simultanée des flores du Rhino-Pharynx et des foyers pulmonaires, ont permis de déceler la nocivité de ces germes.

En application sur les muqueuses des fosses nasales, de la gorge, ce lysat-vaccin provoque une immunité cellulaire locale.

Indications. — Spécialement indiqué dans le rhume de cerveau, il trouve encore son emploi dans les angines, les adnoïdites et la prévention des infections descendantes de la grippe, de la rougeole, de la coqueluche, de la diphtérie, etc.

Mode d'emploi. — En instillation ou mieux en pulvérisation dans les narines, la gorge, 3 à 4 fois par jour.

Nota. — Le lysat-vaccin, milieu favorable au développement des germes est antiseptisé en raison de son contact avec les poussières de l'air. Il n'est pas injectable.

Laboratoires LEBOIME
19, rue Franklin — PARIS (XVI[e]).

VALBORNINE ROGIER

(Iso-Valérianate de Bornyle Bromé)

Perles. — 3 à 6 par jour avant les repas ; ou, pour l'insomnie, 2 perles le soir, deux heures après un léger repas.

Propriétés. — Antispasmodique énergique et puissant sédatif du système nerveux, régulateur de la circulation et de la respiration.

Le flacon : 8 fr.

Henry ROGIER, Docteur en Pharmacie
56, boul. Péreire — PARIS

VALÉRAL PUY

Liquide ou capsules
Bromovalérianate sodique alcalin.
Alcoolat de cratœchus et passiflora.

Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures, tolérance absolue, odeur, saveur agréables, action fidèle et soutenue, pas d'accoutumance ni dépression.

Véritable spécifique des Névroses convulsives douloureuses spasmodiques, Phobies, Névralgies, Insomnies, Crampes.

Dose. — Une cuillerée à soupe ou 4 capsules contiennent 1 gr. de Valéral. 2 à 3 cuillerées à soupe dans 1/4 verre d'eau sucrée par jour, dont une le soir.

Envoi littérature. **Laboratoire PUY**
GRENOBLE.

VALÉRIANATE GABAIL DÉSODORISÉ

La seule et unique préparation n'ayant pas d'odeur.

Composition. — Extrait de valériane, acide valérianique, eau distillée. 0,50 d'extrait par cuillerée à café.

Indications. — Spécifique des maladies nerveuses, le seul réellement sans odeur.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

Laboratoires S. GABAIL
3, rue de l'Estrapade — PARIS (Ve).
5, rue Lefbebvre — PARIS (XVe).

VALÉRIANATE GRIGNON

à odeur dissimulée

Composition. — Contient tous les principes actifs de la plante fraîche.

Forme. — Liquide de goût agréable, l'odeur de valériane étant absolument masquée.

Prop. thérap. — Antinerveux, antispasmodique.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuill. à café par jour.

Pharmacie GRIGNON
2, rue Duphot — PARIS.

VALÉRIANATE PIERLOT

Liquide ou en capsules.

RESTE TOUJOURS et MALGRÉ TOUT

l'unique préparation efficace et inoffensive, résumant tous les principes sédatifs et névrosthéniques de la valériane officinale.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée ou non le soir avant de se coucher et le matin à jeu.

H. RIVIER

Pharmacien de 1re classe

26 et 28, rue Saint-Claude — PARIS

VALÉRIANE BYLA

(Sédatif régulateur du système nerveux.)

Renferme tout le suc inaltérable de la *plante fraîche et vivante, stabilisé* et concentré. Ne contient ni acide valérianique libre, ni ammoniaque combinée.

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant des centres nerveux supérieurs affaiblis, dépresseur de l'excitabilité réflexe exagérée. Antiépileptique, antispasmodique, analgésique, hypnotique.

Indications. — Névroses, hystéries, épilepsie, insomnies nerveuses, névralgies, neurasthénie, troubles de la ménopause, convulsions des enfants, palpitations, tachycardie, etc.

Mode d'emploi. — 3 cuillerées à café par jour.

Les Établissements BYLA,

26, avenue de l'Observatoire, Paris.

R. C. Seine 71895.

VALÉRIANE PACHAUT

Préparation liquide contenant les principes actifs de la valériane fraîche sans addition d'aucun hypnotique ou stupéfiant.

Indications. — Névroses, états spasmodiques, insomnies.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café par jour.

La Valériane liquide PACHAUT est **inodore** et d'une **saveur agréable.**

Laboratoires PACHAUT
130, boul. Haussman — PARIS

VALÉRIANOSE GIGON

Composition. — Extrait de valériane fraîche stérilisée et pepsine.

Forme. — Pilules glutinisées.

Indications thérapeutiques. — Sédatif du système nerveux, Antispasmodique, Antinévralgique.

Mode d'emploi et doses. — 4 à 6 pilules par jour. Solubilité dans l'intestin.

PEPTO-VALÉRIANE

Solution sans odeur d'extrait de valériane fraîche stérilisée et pepsine.
De 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

Laboratoires du Dr André GIGON
7, Rue Coq-Héron — PARIS (1er).

VALÉRIUM PAUL THIBAULT

Dragée de *Valérianate de Cérium, sans odeur*, de *P. Thibault*, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Le meilleur sédatif régulateur du système nerveux. Action particulièrement élective sur le grand sympathique.

Indications. — Troubles gastriques d'origine névropathique, Dyspepsies nerveuses, Vomissements chroniques, Vomissements incoercibles de la Grossesse, Insomnies, Névralgies, Neurasthénie, Mal de Mer, Hoquet.

Posologie. — Prescrire 2 dragées le matin et 2 dragées dans le milieu de la journée. Dans les affections chroniques, prescrire, si possible 2 dragées 2 à 3 heures avant les troubles. Continuer le traitement 10 à 12 jours. Cesser 2 à 3 jours et reprendre.

Les dragées de Valérium P. Thibault, sont dosées à 0,05 de principe actif.

Laboratoires des Produits Paul THIBAULT
6, rue Rosenwald — PARIS (XV^e^).

VALÉROBROMINE LEGRAND

Liquide : Dosé à 0,50 cgr. de bromovalérianate de soude par cuill. à café.

Capsules enrobées de gluten : Dosées à 0,25 cgr. de bromovalérianate de magnésie par capsule.

Propriétés. — Sédatif anti-nerveux. Exerce une action énergique sur les centres nerveux. Diminue et abolit leur excitabilité réflexe.

Indications. — Toutes les indications des bromures avec plus d'activité et sans en avoir les inconvénients toxiques.

Doses. — *Liquide* : 2 à 6 cuill. à café par jour dans un peu d'eau sucrée. *Capsules* : 4 à 12 capsules par jour.

DARRASSE FRÈRES
13, rue Pavée — PARIS.

VALÉROMENTHOL

Préparation à base de *suc frais de valériane* combiné à l'éther mentholique de l'acide valérianique.

Propriété thérapeutique. — Tous les avantages des bromures sans aucun de leurs inconvénients. Calmant par excellence. Antispasmodique sûr. Antidote de la douleur, des troubles nerveux et des états pathologiques de la neurasthénie.

Indication thérapeutique. — Neurasthénie, hystérie, insomnie, toutes affections nerveuses.

Mode d'emploi. — 3 à 5 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou d'infusion.

108 et 71, faubourg Saint-Honoré, Paris.

Pharmacie GRIPEKAVEN

37 et 39, Marché aux Poulets Bruxelles.

VALÉRONAL

Solution ou comprimés.
Sédatif puissant et inoffensif des troubles nerveux, Psychopathies.
Hypnotique doux sans odeur.
Antispasmodique.
Par cuillerée à café ou par comprimé.

Véronal sodique très pur.....	0 gr. 15
Extrait physiologique de Valériane fraîche par plasmolyse.....	5 cc.

Dose sédative. — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé 2 à 3 fois par jour.

Dose hypnotique. — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé avant le dernier repas et 2 ou 3 au coucher dans infusion.

Pas de contre-indication.

LABORATOIRE BERGER

14, rue des Pyramides, Paris.

VANADARSINE GUILLAUMIN

GOUTTES

Composition. — Solution d'arséniate de Vanadium au centième.

Propriétés. — Puissant stimulant de l'appétit, sans aucune action néfaste sur l'estomac et les intestins. Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. Sous son influence le teint redevient frais.

Indications. — S'emploie avec succès dans la prétuberculose et la tuberculose, la chorée, le rachitisme des enfants, les états anémiques, chlorotiques, dans la neurasthénie, les dépressions nerveuses, le surmenage, le paludisme, les leucémies et les convalescences.

Mode d'emploi. — La *Vanadarsine* s'administre aux mêmes doses que la liqueur de Fowler dont elle n'a pas les inconvénients : V à X gouttes dans un peu d'eau avant les 2 principaux repas.

VANADARSINE GUILLAUMIN

AMPOULES

(Sérum Vanadarsiné)

Composition. — Ampoules contenant 0 gr. 002 arséniate de vanadium par cent. cube.

Propriétés. — Solution très stable, indolore, parfaitement tolérée en injections hypodermiques. Reconstituant globulaire sanguin de premier ordre, oxydant énergique, excite l'appétit, augmente le poids et les forces et stimule les combustions organiques.

Indications. — Chlorose, anémie, prétuberculose, tuberculose, chorée, rachitisme, paludisme, syphilis, asthénie, leucémies, neurasthénie, surmenage, convalescence, anorexie.

Mode d'emploi. — *Adultes :* Injecter 1 à 3 cent. cubes par jour ou tous les deux jours.

Enfants : Injecter selon l'âge.

Faire une vingtaine d'injections. Après 8 à 10 jours de repos recommencer le traitement si nécessaire.

Se prescrit en ampoules de 1 cc. et de 3 cc. (dose forte).

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN
13, rue du Cherche-Midi — PARIS

VANADINE CHEVRIER

Composition :
Solution d'acide vanadique chloratée.

Propriétés :
Stimulant de l'appétit ; sans action sur l'estomac.

Indications :
S'emploie dans la prétuberculose, la tuberculose, l'anémie, la neurasthénie, et les affections de l'estomac.

Mode d'emploi :
Six à dix gouttes dans une cuillerée d'eau, avant le repas.

Docteur G. CHEVRIER
21, faubourg Montmartre — PARIS

VANUCLÉOL

Composition. — Nucléophosphate de Vanadium strychnarsiné.

Formes pharmaceutiques. — 1° Ampoules ; 2° Gouttes.

Indications. — Oxydant par le Vanadium, leucosthénique par les nucléines, le **VANUCLÉOL** s'emploie dans les cas d'*Asthénies, Surmenage, Tuberculose et Prétuberculose, Anémie*, etc...

Mode d'emploi. Douze injections journalières par les ampoules.
Gouttes : Vingt gouttes à chaque repas.

Échantillon et littérature sur demande

Laboratoires LACROIX

VARILAXINE

Groupe cinq laxatifs différents : Rhubarbe, Cascara, Podophyllin, Rhamnus, Tamarin, mais d'action équivalente.

Chaque boîte renferme 5 tubes, numérotés de 1 à 5.

Doses et mode d'emploi. — Avaler, sans les croquer, deux Comprimés avant le repas du soir, en alternant du n° 1 au n° 5, pour reprendre au n° 1 le 6e jour, et continuer la variation.

Propr. Thér. — Action laxative toujours identique — Jamais d'accoutumance ni d'irritation — Tolérance parfaite — Innocuité absolue.

Laboratoire de la VARILAXINE
164, rue Saint-Honoré — PARIS

VARISCLÉRINE

(Ampoules)

préparées selon les indications du Professeur Sicard

Injections sclérosantes intravariqueuses, sans accidents, sans insuccès.

Varisclésine A : Salycyl de soude.

Varisclérine B : Quinine.

Laboratoire ANGELINI
61, rue de Seine — PARIS

VASCUROL

(dragées)

Traitement de l'hypertension et des troubles de la circulation.

Composition. — Gui, aubépine, scille, hexaméthylène tétramine iodé, extraits opothérapiques et laxatifs.

Indications. — Hypertension, Présclérose et Artério-sclérose. Troubles de la ménopause. Varices. Hémorrhoïdes. Obésité.

Mode d'emploi. — 2 dragées au début de chacun des deux principaux repas.

Laboratoire P. GUÉRIN
Pharmacien, Meulan (Seine-et-Oise).

VASOLAXINE

Huile de vaseline pure

Dose :

Adultes : 1 cuillerée à soupe en se levant à jeun et le soir en se couchant.
Enfants : 1 cuillerée à café.
Aromatiser, si jugé nécessaire, avec menthe, citron, cognac, etc.

Indications :

Constipation, Entérites, Appendicites chroniques, Hémorroïdes.

Le flacon : 10 fr.

Laboratoires FOURNIER Frères
26, boulevard de l'Hôpital — PARIS.

VÉGÉPHOS

Composition. — Phosphore organique, extrait de l'embryon de blé.

Propriétés. — Récalcifiant supérieur aux phosphates de chaux, directement assimilable. Agent phosphoré, contribue à la formation du squelette du noyau cellulaire, de la substance nerveuse.

Indications. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose, Rachitisme, Déminéralisation.

Utile dans : convalescence, grossesse, allaitement.

Formes. — Cachets à 0,60 : boîtes de 20. — Granulés à 12%. — Poudre.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 cachets par jour ; 1 à 2 cuillerées à café par jour ; dose moyenne, poudre 0 gr. 60 à 1 gr. 20 en une ou deux fois.

Pharmacie Centrale
des Pharmaciens de France,
21, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS (IVe).

VÉGÉTOL EXTERNE

Médication picro-balsamique.

Spécifique des infections locales de la peau et des muqueuses.

Composition. — Complexe liquide renfermant les constituants de plusieurs essences (thym, aspic, citronnelle, etc) et les produits de réaction de l'acide picrique sur ces constituants.

Propriétés. — Produit non toxique, microbicide, décongestionnant, analgésique et cicatrisant grâce à l'action de l'acide picrique, des essences et de leurs dérivés.

Indications. — Plaies, furoncles, anthrax, panaris. Affections des yeux, du nez, de la gorge, des oreilles. Maladies gynécologiques (en injections). Maladies des voies urinaires en injections et en instillations.

Laboratoire du Végétol
8, rue des Quatre-Fils — PARIS
Téléphone : Archives 65-65.

VEINICURA

Médication Spécifique des Troubles de la Circul. veineuse.

Composition et Forme. — Association d'extraits végétaux à propriétés vaso-constrictives et toniques du système veineux, d'extraits glandulaires (thyroïde et hypophyse) modificateurs de la nutrition générale, et d'un sel fluidifiant du sang (citrate acide de soude).

Présenté en comprimés *bicolores :* comprimés rouges contenant les extraits végétaux et le Citrate, comprimés blancs contenant les extraits glandulaires seuls, afin d'éviter leur altération qui se produit fatalement lorsqu'ils sont mélangés à d'autres produits, surtout lorsque ceux-ci sont hygrométriques.

Indications Thérapeutiques.—Tous les troubles circulatoires dus à la stase veineuse : varices et varicosités, hémorroïdes, varicocèles, congestions passives de l'utérus et de la prostate, pesanteurs des jambes, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés de chaque couleur en moyenne par jour, les rouges pendant le repas, les blancs entre les repas.

Laboratoire et Dépôt général :
Pharmacie BELLAIR, 42, Bd Pereire — PARIS.
Téléph. : W. 68-60.

VEINOFLUINE

Régulateur de la Circulation Veineuse.

Composition. — Extraits mous stabilisés de Cyprès et de Marron d'Inde. Extraits mous d'*Hamamélis Virginica* et de *Viburnum Prunifolium*.

Présentation. Gouttes.

Prop. thérap. — Régularisation de la circulation veineuse, augmentation de la résistance de la paroi vasculaire et disparition des réactions douloureuses liées aux phénomènes congestifs.

Indications. — Toutes les congestions, dilatations et inflammations veineuses : varicocèles, hémorroïdes, phlébites. Les troubles utérins de la ménopause ou de la puberté.

Posologie et mode d'emploi. — Trois fois par jour, avant les repas, par prises de XXX gouttes dans de l'eau, du vin ou une infusion.

Pharmacie NEUVILLE
239, faubourg Saint-Honoré — PARIS.

VEINOSÉRUM

Indications, — Retour d'âge, Varices, Phlébites, Œdèmes, Hémorroïdes, et tous états congestifs.

1° *Forme gouttes :* Formule très active à base d'extraits de plantes *stabilisées* par procédé spécial (capsicum, gui, marron d'Inde, hamamélis, rhamnées).

Doses : 20 gouttes matin et soir 15 jours par mois.

2° *Forme liqueur*, à base de citrates alcalins, urotropine et extraits de rhamnées.

Doses : 1 cuill. à soupe matin et soir 15 jours par mois.

Laboratoires ABADIE-TANZI
3, Place Intérieure-Saint-Michel,
TOULOUSE

VEINOSINE

Traitement spécifique complet des affections veineuses.

Comprimés à base de : Hamamélis virginica, Marrons d'Inde, Citrate de soude, Glandes thyroïde et hypophyse.

Indications. — Hyposphyxie, Phlébites aiguës et chroniques, Insuffisance valvulaire de la saphène, Varices, Varices de la grossesse, Pseudo-varices par troubles des glandes à sécrétions internes, Hémorroïdes, Troubles de la vie génitale chez la femme, Puberté, Ménopause.

Doses. — Trois comprimés avant les repas de midi et du soir.

P. LEBEAULT & Cie
5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (IIIe).

VELLEDOL ADRIAN

Composition. — Principe actif du gui.

Action. — Hypotenseur constant, régulier et durable.

Indications. — Hémorragies (hémoptysies, ménorrhagies, hématémèse, etc...), congestions localisées et hémorragies congestives. Hypertension, artériosclérose, tachycardies, arythmies, céphalées, vertiges, bourdonnements d'oreilles.

Formes & mode d'emploi. — Pilules dosées à 0,05 : 4 à 6 pilules par jour.

Ampoules de 1 c. c. dosées à 10 cgr., 1 à 3 ampoules par jour.

ADRIAN & Cie
9 et 11, rue de la Perle — PARIS

VÉNECINE

Composition. — Préparée par un procédé physico-chimique breveté, présente sous forme d'eau, à l'état de complexe colloïdal stable et de solution, les éléments essentiels nécessaires à la cellule vivante : calcium, sodium, potassium, fer, silice, strontium, chlore, carbone, soufre.

Propriétés. — La Vénecine paraît être, en dehors des eaux sulfureuses prises au griffon, la seule préparation stable contenant du soufre assimilable et fixable par la cellule vivante. Grâce à cette propriété et à sa charge électrique élevée, elle active les échanges et favorise l'activité humorale et tissulaire. C'est un excitant de la croissance et des glandes endocrines.

Indications. — *Chez l'enfant et l'adolescent :* Arrêt et retard du développement, maladies par carence, troubles endocriniens.

Chez l'adulte : Troubles de la nutrition, rhumatisme chronique, goutte, certaines dermatoses, troubles endocriniens.

Chez le vieillard : Artériosclérose, sénilité.

Présentation. — 1° En bouteilles d'un litre. — 2° En ampoules injectables de 2 à 10 c. c.

Posologie. — *Eau :* Trois à six verres à bordeaux par jour pendant vingt-cinq jours.

Ampoules : Une ampoule par jour pendant trois semaines. Employer les ampoules de 2 c. c. dans les cures de désensibilisation et les ampoules de 10 c. c. dans les cures dirigées contre le rhumatisme, la goutte ou les états d'asthénie.

Cie Française de la Vénecine

7, rue des Italiens, PARIS.

VÉRALGINE

Analgésique et antimigrainique.

Action ultra-rapide. Effet prolongé même avec une dose minime.

Composition. — Acet phénétine, Amidopyrine, Triméthylxanthine, Soneryl.

L'association de ce dérivé barbiturique (à la dose de 0 gr. 03 par prise) avec les analgésiques vrais que renferme chaque comprimé renforce l'action médicamenteuse de ces derniers et permet avec des doses beaucoup plus faibles d'obtenir des effets curatifs plus intenses en rapidité et durée, **sans aucune intolérance, ni réaction cutanée.**

Indications. — Toutes douleurs ou névralgies, Rhumatismes, Goutte, Sciatiques, Migraines périodiques, Migraines des hypertendus, Grippe, Affections dentaires, Périostite. Maux de tête consécutifs aux rachianesthésie, etc.

Les comprimés portent un trait de division permettant de fractionner les doses.

Posologie. — Adultes 1 à 2 comprimés ou cachets.
Enfants 1/4 ou 1/2 comprimé.

Ces doses peuvent être répétées 2 à 3 fois par 24 heures.

Laboratoire du MAINGUY
BONDY (Seine).
M. BASSIN Docteur en pharmacie.
Échantillons sur demande.

VÉRIANE BURIAT

Composition. — Préparation liquide contenant par cuillerée à café : 0 gr. 12 amide barbiturique diéthyle et 1 gr. Valériane fraîche et INODORE.

Indications. — Hypnotique fidèle, inodore et sédatif du système nerveux central parfaitement toléré par les estomacs délicats. Sommeil calme, réveil normal.

Posologie. — Comme sédatif : 2 à 5 cuillerées à café espacées dans les 24 heures.

Comme hypnotique : 2 à 5 cuillérées à café 3 heures avant le moment du sommeil, dans une infusion ou eau sucrée.

Laboratoire BURIAT
25, rue Copernic — PARIS (XVIe).

VERONIDIA BUISSON

Solution de diéthylmalonylurée associée à l'extrait de Passiflora incarnata dans un véhicule synergique et agréable au goût. Chaque cuill. à soupe de solution ou chaque comprimé renferme 0 gr. 25 de principe actif.

Prop. Thér. — Sédatif idéal de l'hyperexcitabilité nerveuse dans toutes ses manifestations : Névroses diverses. Palpitations. Phobies. Insomnies. Névrose d'angoisse, etc.

Dose. — 2 cuill. à café comme antispasmodique dans le courant de la journée. — 1 à 2 cuill. à soupe ou comprimés comme hypnotique, le soir au coucher.

Établissements Albert BUISSON
F. JALOT & Cie
157, rue de Sèvres — PARIS.
R. C. Seine 222.705 B.

VERRULYSE

Composition. — A base de glycérophosphates (phosphate vital) de chaux, fer, manganèse, magnésie, hydrofluosilicate de soude, charbon végétal et quinquina.

Formes. — Poudre légèrement comprimée en petits cachets.

Boîte de 60 cachets constituant le traitement complet pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes.

Demi-boîte de 30 cachets constituant le traitement complet pour les enfants de 8 ans.

Dose et mode d'emploi. — *Pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes.* — 1 cachet par jour pendant 60 jours, au début d'un repas (toujours le même de préférence).

Pour les enfants de moins de 8 ans. — 1 cachet tous les deux jours (30 cachets en 60 jours) ou mieux : 1/2 cachet par jour délayé dans une cuillerée de potage ou tout autre aliment, pendant 60 jours.

Propriétés. — **1° Effet local.** — Au bout de 10 à 15 jours, les verrues prennent une teinte rosée sur le pourtour, et deviennent parfois le siège d'une légère démangeaison ; puis elles grossissent un peu, reprennent ensuite leur couleur et leur grosseur normales et disparaissent dans le mois qui suit la fin du traitement, par élimination ou par résorption progressive, sans laisser de cicatrices. En cas de guérison dès les premières semaines, comme cela se produit quelquefois, le traitement doit néanmoins être continué jusqu'au bout, afin d'éviter les récidives.

1° **Effet général.** — Reconstituant. Amélioration très nette chez les enfants, de l'entrain, de l'appétit, du teint.

Indications. — Traitement spécifique des verrues et autres papillomes (larynx, organes génitaux, etc...).

Paraît exercer une action favorable contre d'autres productions épidermiques, pour lesquelles une expérimentation plus étendue est en cours.

Aucune contre-indication. Après l'emploi d'une première boîte, le traitement peut être prolongé et même renforcé sans inconvénient dans les cas exceptionnels où cela est nécessaire (jusqu'à 6 cachets par jour dans les cas de verrues rebelles ou de tumeurs malignes).

Établissements JACQUEMAIRE
VILLEFRANCHE (Rhône).

Soc. à resp. lim. au cap. de 2.000 000 de francs.
Admr-Gérant : **M. MIGUET**, Dr en Pharmacie.

VERTICURINE

Composition. — Silicate de soude, chimiquement pur.

Actions. — Hypotensive-ant-athéromateuse déchlorurante, ramène les viscosités à la normale, fait disparaître les symptômes cérébraux.

Indications. — Artério-sclérose. Angine de poitrine. Troubles cérébraux. Otite scléreuse. Hypertension. Aortite. Bourdonnements. Sclérose cardiaque. Présclérose. Vertiges, Ménopause.

Formes et doses. — 1° *Liquide :* chaque cuil. à soupe représente un gr. de silicate assimilable. Dose : 1 cuil. à soupe aux 2 principaux repas ; 2° *Comprjmés :* chaque comprimé renferme 0 gr. 50 de silicate assimilable. Dose : 2 comp. à chacun des principaux repas.

Nous recommandons de préférence la solution dorénavant préparée **sans goût désagréable.**

Laboratoire L. GRIAS, Pharmacien de 1re cl.
47, rue Féray — CORBEIL (S.-et-O.)

VIGARDYNE

(ferment lactique actif).

Description. — Comprimés, par boîte de 48 comprimés.

Indications thérapeutiques. — Affections gastro-intestinales. Diarrhées des adultes et nourrissons. Entérites sous toutes ses formes. Embarras gastriques et intestinaux. Auto-intoxications.

Avantages. — Des moyens techniques et scientifiques nouveaux nous permettent d'assurer la *vitalité intégrale* de nos ferments. La Vigardyne doit son indéniable valeur thérapeutique à son extrême richesse en ferments lactiques *vrais* ainsi qu'à la virulence de ceux-ci.

Posologie. — 8 à 10 comprimés par jour, avant les trois principaux repas. Nourrissons : 2 comprimés avant les principales tétées.

Laboratoire VIGARDYNE
11, rue des Garennes — CHATOU (S.-et-O.).
A. MODIANO, pharmacien de 1re classe.

VIN DE BAUDON

Antimonio-phosphaté

Comp. — Contient le phosphate de chaux sous une forme non acide, éminemment assimilable. Cette assimilation se trouve exaltée par la présence de l'antimoine qui forme avec le phosphate une véritable combinaison organique et qui agit lui-même par ses vertus propres, comme excitant et régulateur du bon fonctionnement de l'appareil digestif

Avantages. — Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades.

Ind. thérap. — Affaiblissement général, anémie, lymphatisme, rachitisme, scrofule, croissance, suppurations prolongées, maladies des os, grossesse, allaitement, etc.

Posol. — Un verre à madère p. les adultes et un verre à liqueur p. les enfants à prendre au moment des repas; on peut en prendre selon les cas jusqu'à 4 ou 5 p. j.

Laboratoire VAUDIN et GUILLAUMIN
Doct. en Pharm. 12, r. Charles-V — PARIS.

VIN DE BUGEAUD

Toni-nutritif

Malaga vieux - Quinquina - Cacao

Indications :

Faiblesse générale, Anémie, Surmenage, Etats consomptifs, Diabète, Convalescence des maladies aiguës, Anémie palustre, etc.

Dose :

Un verre à madère aux deux principaux repas.

P. LEBEAULT & Cie
5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (IIIe).

VIN DE CHASSAING

à la pepsine et à la diastase

S'emploie dans toutes les affections stomacales provenant d'une insuffisance de digestion, à la dose d'un ou deux verres à liqueur immédiatement après le repas.

CHASSAING, LE COQ et Cie

6, rue de la Tacherie — PARIS.

VIN GIRARD

Iodo-tannique phosphaté.

Nature. — Le *Vin Girard* est la meilleure formule des préparations iodo-tanniques phosphatées consacrées par l'usage. — Un verre à madère de *Vin Girard* contient :

Iode	0 gr. 075 mil.
Tannin	0 gr. 50 cent.
Lacotophosphate de chaux	0 gr. 75 cent.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 verres à madère par jour pour une grande personne ; demi-dose pour enfant.

Prop. Thér. — Tonique et reconstituant, augmente la phagocytose.

Indicat. — Lymphatisme, scrofule, tuberculose au 1er degré, engorgements ganglionnaires, convalescences.

Laboratoire A. GIRARD

48, rue d'Alésia, Paris.

VIOSTEN

Composition. — Lipoïdes, phosphatides, éther benzylocinnamique, *huile de foie de morue*.
Injections en 1 cc. Comprimés.

Indications. — Anémies, Asthénies, Convalescences, Tuberculoses, Rachitisme.

Doses.

Enfants :

Au-dessous d'un an.
1 cc. tous les 4 jours. — 1 comprimé par jour.
De 1 à 3 ans.
1 cc. tous les 3 jours. — 2 comprimés par jour.
De 3 à 12 ans.
1 cc. tous les 2 jours. — 4 comprimés par jour.
Au-dessus de 12 ans.
1 cc. tous les jours. — 6 comprimés par jour.

Adultes :

1 à 2 cc. par jour. — 6 comprimés par jour.

LABORATOIRES LESCÈNE

Livarot (Calvados). Paris, 58, rue de Vouillé,
Tél. : Vaugirard 08-19.

VIOXYL MOUNEYRAT

Puissant accélérateur de la nutrition générale

Indications. — Asthénies diverses, Cachexies. Convalescences; Maladies consomptives, Anémie, Chloro-anémie, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose, Neurasthénie, Asthme, Diabète.

Formes. — Elixir et Granulé.

Posologie. — *Adultes :* Débuter par 2 cuillerées à café par jour, une le matin, une le soir, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas. Au bout de 3 ou 4 jours, porter cette dose à 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Établissements MOUNEYRAT

12, rue du Chemin-Vert
VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

VISCO-SÉRUM

Sérum réminéralisateur nerveux sensibilisant, isotonique, isovisqueux,

Indications thérapeutiques. — Tous les états de dépression du système nerveux et de l'appareil cardio-vasculaire.

Présentation. — Amp. : Boîte de 10 ampoules
Gouttes : Flacon de 20 gr.

Posologie. — Ampoules de 5 cc, (une cure comprend deux séries de 10 piqûres) gouttes : 20 à chaque repas.

Laboratoire G. FERMÉ

55, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e^).

R. C. Seine 143.981.

VISCUM ZYMA

Composition. — Dialysé de baies, feuilles et tiges de gui blanc, obtenu selon le procédé de GOLAZ.

Propriétés. — Le *Viscum Zyma* abaisse la pression sanguine, agit comme tonique du cœur et favorise l'élimination des chlorures et de l'urée.

Indications. — *Convient dans tous les états morbides associés à l'hypertension :* artériosclérose, urémie, albuminurie de la grossesse ; est également indiqué dans certains cas d'épilepsie.

Mode d'emploi. — S'emploie à la dose de 20 à 30 gouttes, diluées dans un peu d'eau, avant les repas (2 à 3 fois par jour).

Laboratoire " ZYMA "
4, Rue Bellart — PARIS (XV^e^).

VITAGÉINE

Granulé

Épuisement nerveux et musculaire.

Mode d'emploi :

Une cuillerée à café de granulé avant ou après le repas, dissous dans un peu d'eau.

Laboratoire Ch. SEGUIN
7, rue Sainte-Isaure, 7,
PARIS (XVIIIe).

VITAL-EXTRAIT

Composition. — Extraits et Ferments Opothérapiques vivants: Extrait Cérébral, du muscle Cardiaque, du Sérum sanguin, Glandes interstitielles, Sécrétions endocrines et Vitamines. Ensemble d'éléments régénérateurs et stimulants en association avec l'arsenic et le phosphore organiques (nucléophospharsine) et des catalyseurs, fer, manganèse, calcium en combinaison nucléinique.

Indications. — Rapidement et spécialement actif dans les cas de faiblesse des veillards, malades chroniques; convalescences des maladies graves anémies, consomption, tuberculose, impuissance, asthénie, neurasthénie, névroses, surmenage, troubles de la grossesse, etc. Tonique général, donne Vitalité immédiatement perceptible, provoque l'augmentation du taux des globules rouges, la reconstitution cellulaire et l'accélération de la nutrition générale. *Régénérateur intensif.*

Forme. — Comprimés dragéifiés de petit volume.

Doses. — *Adultes* 2 comprimés. *Enfants* 1 comprimé à chacun des deux principaux repas.

Laboratoires Biologiques E. BASSOL.
Place des Postes, Sainte-Alvère — DORDOGNE.

VITAMINE ROGIER

VITAMINE B.

Indications. — Diabète. Maladies par carence. Troubles de la croissance. Béribéri.

Formes et Doses. — Comprimés. — 4 à 6 comprimés par 24 heures.

« L'influence passagère de l'Insuline peut être prolongée par un régime équilibré.

D'autre part, l'adjonction à ce régime, soit de Vitamine B, soit de Lévulose, ou du mélange de ces deux corps permet d'espacer les injections d'Insuline et de rendre mieux opérante une même dose de cette substance. »

(Communication faite à l'Académie des Sciences, séance du 22 Octobre 1923).

Littérature et échantillon sur demande.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie

56, boulevard Péreire — PARIS.

VITARGYL

Composition et Propriétés :

Vitellinate d'argent spécial dosé à 20 %.

Petites masses cristallines, très solubles dans l'eau.

La solution de *vitargyl* est neutre au tournesol, ne précipite pas les chlorures, ne coagule pas l'albumine.

Action thérapeutique. — Antiseptique puissant, sédatif, et décongestif externe. Action non corrosive, parfaitement indolore.

Application. — Le *vitargyl* est d'un emploi précieux pour le lavage et le pansement des plaies ; pouvoir microbicide énergique, propriétés excitantes sur les éléments réparateurs des tissus.

Indications. — Urologie, Gynécologie, Ophtalmologie, Oto-rhinolaryngologie. Est présenté sous forme pure et à préparations (ampoules, crayons, ovules, suppositoires).

Fabricants POINTET et GIRARD

38, rue des Francs-Bourgeois, PARIS.

VIVOLÉOL

Huile de foie de morue spéciale, garantie active et riche en vitamines :

(Facteur antirachitique et facteur de croissance.)

(Contrôle biologique rigoureux.)

Forme. — Liquide.

Indications :

Troubles de la croissance, Troubles de l'ossification, Troubles de la dentition. États de dénutrition. Lymphatisme. Maladies par carence.

Posologie :

Enfants — Nourrissons :

15 à 30 gouttes par jour, jusqu'à 1/2 cuillerée à café.

Jusqu'à 3 ans :

1/2 à 1 cuillerée à café.

Au-dessus de 3 ans :

1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

Adultes :

1 cuillerée à soupe par jour.

N. B. — Le VIVOLÉOL peut être pris à toute époque de l'année. Son emploi se conçilie très bien avec celui des préparations récalcifiantes.

Laboratoires du VIVOLÉOL
(Annexe des Laboratoires Zizine)
69, Rue de Wattignies, Paris (XII^{e}).
Téléphone : Diderot 28-96.

VOCALDOP

Thérapeutique laryngologique.

1° La *poudre Vocaldop* réunit en une seule prescription une *inhalation* et un *gargarisme*.

Une cuillerée à café de *poudre Vocaldop*
+ H^2O chaude = Inhalation (respiration nasale).
Gargarisme (bain buccal).

2° Le *cachet Vocaldop* représente une synergie médicamenteuse adaptée aux trois qualités de la voix parlée et chantée : timbre, puissance, résistance.

Indications :

Enrouement, Surmenage vocal, Pharyngite, Laryngite.

Prescriptions :

Deux inhalations par jour, 2 à 3 cachets par jour pendant 15 jours.

Laboratoire laryngologique du Dr Cordier
222, faubourg Saint-Martin — PARIS.

VULCASE

(comprimés)

Laxatif-dépuratif.

Soufre organique ; opothérapie biliaire.

Propriétés thérapeutiques. — Combat la constipation par action directe sur le foie, n'irrite pas l'intestin, ne provoque pas d'accoutumance.

Indications. — CONSTIPATION. Affections du FOIE et de l'Intestin. Dermatoses.

Mode d'emploi. — Prendre deux comprimés soit le matin à jeun, soit vers 17 heures.

Laboratoires P. BRISSON et Cie.
114, avenue Michelet, Saint-Ouen, Seine.

VULNÉRINE DU Dr BERGEN

Principes actifs. — Camphre associé au Phénol, Naphtol, Précipité blanc, Ether éthylpyramidobenzoïque, Oxyde de zinc, etc.

Forme :

Emplâtre semi-fluide en tube d'étain de 50 c. c.

Indications. — Ulcères variqueux, plaies atones, Brûlures, Eczémas, Cancroïdes, Lupus, Erisypèle, Engelures, Impétigo, etc.

Pansement précieux :

Ni sec, ni humide, ni adhérence, ni macération. Calmant. Epidermisant incomparable. Les brulures guérissent sans laisser de traces,

Mode d'emploi :

1 ou 2 applications par jour. Recouvrir avec le papier à pansement spécial qui accompagne chaque tube de Vulnérine, puis coton hydrophile et bande. Jamais d'imperméable. Nettoyage à l'éther du pourtour de la plaie.

Laboratoire DUCOQ à Langeais, (I.-et-L.).
R. C. 2059, Chinon.

LA YAOURTINE

Culture sèche des ferments du Yaourt.

Composition. — Ferments bulgares sélectionnés, protégés, par un enrobage spécial, de l'action oxydante de l'air et de l'humidité (Procédé Nestlé).

Formes. — Dragée et granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de l'auto-intoxication intestinale, et de ses répercussions cutanées, rénales et hépatiques.

Posologie.

Nourrissons. — 1 à 2 cuillerées à café par jour. Yaourtine granulée.

Enfants et Adultes. — Cas aigus : 2 à 4 cuillerée p. jour Yaourtine granulée. Cas chroniques : 10 à 12 dragées par jour.

A prendre à jeun avec lait bouilli, 1 h. avant le repas.

L.-J. MOUNIER, Pharmacien de 1re classe
18, place de Laborde, PARIS (VIIIe). Laborde 18-20.

YOGOURTH (Extrait de)

Djévher-I-Hayatt

Sous forme de pain. Aliment complet pour régime dépourvu de tous produits chimiques ou organiques.

Préparation. — Dans un grand bol, jeter 100 grammes d'extrait ; verser de l'eau bouillie froide petit à petit, en délayant bien, jusqu'à ce qu'on obtienne une crème homogène. Ajouter plus ou moins d'eau, suivant que l'on désire obtenir une crème plus ou moins liquide. Sucrer à volonté.

Peut également se consommer comme fromage, saupoudré de sucre, si on le désire.

Société des Établissements Jacques ELMASSIAN,
23/25. Rue Singer — PARIS (XIVe).
Téléphone : Auteuil 18-73.

ZARYL (ancien MYRRH)

Procédé André LANCIEN

Composition et présentation. — Essences d'ambre, ambrette, myrrhe, styrax, rose, orange douce, catalysées et fixées sur hydra-celluloses provenant du maïs et du palmier nain. La fibre est distribuée en cigarettes (sans Eucalyptus).

Propriétés thérapeutiques. — Sédatives, analgésiques, procurent le sommeil calme et réparateur, antispasmodiques, décongestives, désodorisantes, cautérisantes, antiseptiques.

Posologie et mode d'emploi. — 4 à 6 cigarettes par jour, si possible avaler la fumée. La fumée est un véritable colloïde gazeux, agent thérapeutique de premier ordre.

Indications. — Toutes maladies congestives des voies respiratoires, extinction de la voix, asthme, grippe, bronchite, toux coqueluchcuse, trachéite, laryngite, catarrhe, rhume des foins, coryza, sinusite, ozène, céphalée.

Gazés et toutes professions dans lesquelles on respire des poussières.

Aucune contre-indication ; ne donne ni vomissements ni nausées, inoffensif pour le rein, le foie, le cœur, Pas d'incompatibité médicamenteuse.

Laboratoire chimico-thérapique de Paris

12, rue des Apennins — PARIS (XVII^e^)

ZIMBYL

Procédé André LANCIEN

Composition et présentation. — Ethyl, Cin, Aminoforme, très soluble dans l'eau et distribué en ampoules de 3 cc. tyndalisées (Cf. Académie des Sciences 1924).

Propriétés thérapeutiques. — Augmentation de poids, diminution des sueurs profuses, de la température, de l'oppression, reprise du travail et amélioration de la formule leucocytaire. Injections indolores se résorbant rapidement, ne produisant aucun choc. Le Cin, éthyl, formine se dissocie dans l'organisme en éléments bactéricides, éliminés par les reins et les voies respiratoires.

Posologie et mode d'emploi. — 3 cc. intra-musculaire tous les 2 jours par séries de 10 injections (repos 10 jours) 2 séries suffisent. Chez les enfants de plus de 5 ans, un cc. tous les deux jours intra-musculaire (10 injections).

Composé complètement atoxique, point d'accoutumance, n'agit pas sur le foie, intestins, reins ou cœur. Pas d'incompatibilité médicamenteuse.

Indications. — Amaigrissement, asthénie, dénutrition. Bronchites, anémies, cachexies, bacilloses rénales, préventif des infections tuberculeuses.

Laboratoire chimico-thérapique de Paris

12, rue des Apennins — PARIS (XVII^e^)

ZOHOL

Prop. thér. — Reconstituant.

Indications. — Anémie, Surmenage, Phosphaturie, Convalescences.

1° Formes : En granulés.

Composition :

Hypophosphite de chaux	.....	0 gr. 06
— fer	.....	0 gr. 06
— manganèse	.....	0 gr. 06

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café à chacun des principaux repas.

2° Forme : En ampoules.

Composition :

Hypophosphites composés	.....	0 gr. 18
Sulfate de strychnine	.....	1/4 de mgr.
Eau physiologique Q. P.	.....	2 cc

Mode d'emploi. — Le contenu d'une ampoule en injection sous-cutanée.

Laboratoires Réunis " Lobica "
11, Rue Torricelli — PARIS (XVII°)

ZOMO-MUSCULOSINE BYLA

(sèche)

EXTRAIT SEC, préparé dans le vide et concentré, de chair musculaire de bœuf, à haut pouvoir métabolique.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-bacillaire, toni-nutritif, excitant physiologique.

Indications. — Convalescence, anémies, tuberculose, neurasthénie, etc.

Doses et mode d'emploi. — Un demi à un tube par jour, délayé dans une tasse de bouillon à peine tiède, ou mélangé à de la purée de légumes, ou encore à de la confiture.

Les Établissements BYLA,
26, avenue de l'Observatoire, Paris.
R. C. Seine 71895.

ZYMATINE LESCÈNE

Composition. — Galactozymases. Vitamines associées aux carbonophosphates minéralisants, ferments. Alcalinité titrée, Lactose.

Propriétés. — Humanise le lait de vache, lui restitue les carbonophosphates et les ferments qu'il perd par l'ébullition. Fluidifie le caséum, le peptonifie pour empêcher les phénomènes d'anaphylaxie.

Indications. — *Enfants* : Prophylaxie de la gastro-entérite. Maladies de nutrition Athrepsie, Constipation. Rachitisme. Intolérance lactée. Vomissements.

Adultes : Constipation: Affections du tube digestif. Dyspepsies avec hyperacidité. Vomissements. Ulcères de l'estomac. Déminéralisation. Etats infectieux.

Doses. — *Enfants* : 1 centigramme par gramme de lait pur ou 2 cuillerées à café par litre de lait bouilli et refroidi ; agiter fortement pour mélanger. Donner tiède en agitant de temps en temps, à une température ne dépassant pas 50°.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau avant ou après les repas.

Laboratoires LESCÈNE

LIVAROT (Calvados) — PARIS 58, rue de Vouillé.
Téleph. : Vaug. 08-19



3e Partie

NOMENCLATURE NOMINALE DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES MÉDICALES

avec les adresses de leurs fabricants

Les noms des produits précédés d'un astérisque figurent dans la 2e partie du présent ouvrage avec leurs compositions, propriétés thérapeutiques, indications et posologies.

A

Abactériol	54, bd Jacqmain, Bruxelles.
*Absuric	19, r. Drouot, Paris.
*Acécoline	Lab. L. LEMATTE & G. BOINOT, 52, r. La Bruyère, Paris.
Acépiline Rambaud	38, r. Gay-Lussac, Paris.
*Acésine Guillaumin	13, r. Cherche-Midi, Paris (7e)
*Acétylarsan	21, rue Jean-Goujon, Paris.
*Acide oléique P. Thibault	6, r. Rosenwald, Paris. (Voir : Oléocidase.)
*Acidural Dupraz	41, r. Etienne-Marcel, Paris.
Acimyl Monimart	23, r. Grand-Cerf, Meaux.
*Acodros	BOUVELOT, 62, r. d'Antibes, Cannes (A.-M).
*Acolitol	LANCOSME, 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
*A. D. Grosjean	8, r. Lafayette, Paris.
*Adolose Legrand	9, r. des Trois-Frères, Paris.
*Adonidine Clin	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Adoverne Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
*Adral	Labor. ROBERT & CARRIERE, 37, r. de Bourgogne, Paris.
*Adrénine Mialhe	8, rue Favart, Paris.
*Adrénaline Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Adrénaline Clin	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
*Adrénaline Invar	21, r. Nonnains-d'Yyères, Paris.
*Adrénocalcine	L. ADAM, à Granville (Manche).
*Adrénoléine	FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.
Adrénophyséine	14, r. de Clichy, Paris.
Adrénopituine Byla	26, av. Observatoire, Paris.
*Adrépatine Laleuf	20, rue du Laos, Paris.
*Adrialgine	9, r. de la Perle, Paris.
*Adrianine	9, r. de la Perle, Paris.
*Aérophagyl	20, faub. Poissonnière, Paris.
*Éthone-Falcoz	9, r. Boissonnade, Paris.
*Agamétol.	Labor. des Etabl. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
*Agarase	RÉAUBOURG, 1, r. Raynouard, Paris.
Agaryl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
*Agocholine Zizine	24-26, r. de Fécamp, Paris.
*Agomensine Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
Agonol Cognet	43, r. de Saintonge, Paris.

Aimaquinase	Sté Rég. de l'Ouest à Rennes.
*Airoglyce	55, r. Chabrol, Paris.
*Airol Roche	21, place des Vosges, Paris.
Aldogène Carteret	15, r. d'Argenteuil, Paris.
*Alepsal Genévrier	2, r. du Débarcadère, Paris.
Algaliment	47, r. Colbert, Tours.
Algarine Nyrdhal	20, r. La-Rochefoucauld, Paris.
Algarol	71, r. du Commerce, Paris.
*Algatan	40, rue Condorcet, Paris.
*Algocratine Lancosme	71, av. V.-Emman. III, Paris.
Algodigestine	PONCET, à Limoges.
Algolane Poulenc	92, r. Vieille-du-Temple, Par.
*Alibourine	Labor. B. E. A., Belfort.
*Aliment Tinardon	17, r. Cadet, Paris.
*Allisatine Sandoz	3 et 5, r. de Metz, Paris.
*Allocaïne Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
*Allonal Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
*Aloïne Houdé	9, r. Dieu, Paris.
*Alucol	WANDER, 58, r. de Charonne, Paris.
*Alunozal	21, r. Jean-Goujon, Paris.
Amandol	5, av. des Tilleuls, Paris.
Ambrine	48, boul. La-Tour-Maubourg, Paris.
Ambrosia	6, r. des Vinaigriers, Paris.
*Amibiasine	23, r. Bienfaisance, Paris.
*Amidal	4, pl. des Vosges, Paris.
*Amino-Sel Byla	26, av. de l'Observatoire.
Amipyrine.	GAILLON, 113, bd Voltaire, Paris.
*Ampho-vaccins de Ronchèse	7, pl. Cassini à Nice (A.-M.).
Ampoules bi-iodure Hg. Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
*Ampoules Boissy	49, r. Hoche, Courbevoie.
Ampoules Churchill	12, r. Castiglione, Paris.
*Ampoules de Digalène	HOFFMANN LA ROCHE. 21, pl. des Vosges, Paris.
Ampoules Egralène Brisson	114, av. Michelet, St-Ouen.
Ampoule huile soufrée Brisson	114, av. Michelet, St-Ouen.
*Ampoules névrosthéniques Dausse	4, rue Aubriot, Paris (IV^e^).
*Ampoules de Pantopon	Hoffmann-la-Roche et C^ie^, 21, pl. des Vosges, Paris.
*Ampoules Reipar	DRAPIER, à Audincourt.
Ampoules Seti Brisson	114, av. Michelet. St-Ouen.
Ampoules d'Uriage	15, Champs-Élysées, Paris.
*Amylodiastase Thépénier	2, r. Clapeyron, Paris.

Anacidase	MEUNIER, Auxerre (Yonne).
Analgénine	17, r. Cadet, Paris.
***Anapeptone Vassal**	28, r. Hôpital-Militaire, Lille.
***Anaquintine Lescène**	à Livarot (Calvados).
Anasepsine J. Muraire	41, r. Francs-Bourgeois, Paris.
Androstine Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
***Anéol**	25, r. Petits-Hôtels, Paris.
Anestile Bengué	47, r. Blanche, Paris.
***Anexol**	DROUET & PLET, à Rueil (Seine-et-Oise).
***Angiolymphe**	4 *bis*, r. Hébert, Courbevoie.
Angiosthénine	5, av. de Tilleuls, Paris.
***Aniodol**	40, r. Condorcet, Paris.
***Antacidyl**	DURET & REMY, à Asnières (Seine).
***Antalgol Dalloz**	13, boul. la Chapelle, Paris.
***Antasthène**	54, faug. St-Honoré, Paris.
***Anthema**	Et. POULENC, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
***Anthraxone**	Institut de Microbiologie, à Sarrebrück.
***Antialgos Christiaens**	à Reims.
***Anti-asthmatiques du Dr Cléry**	Labor. du Dr CLERY, 53, boul. Saint-Martin, Paris.
***Antiasthme Bengalais**	FAGARD, 44, r. d'Aguesseau, Boulogne-sur-Seine.
***Antiasthmine**	66, r. Nationale, Lille.
***Antiépileptique de Liège**	46, r. Claude-Lorrain, Lille.
AntigastralgiqueWinckler	MIDY & Cie, 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
***Antigrippine Midy**	MIDY et Cie, 4, rue du Colonel-Moll, Paris.
Antimucose Mariani	41, boul. Haussmann, Paris.
***Antiphlogistine**	116, r. la Convention, Paris.
***Antiphlogosine**	126, r. de la Pompe, Paris.
***Antiphymique Vadam**	5, r. Bréa, Paris.
***Antipur**	121, av. de St-Ouen Paris.
Antipyrine U. R.	21, r. Jean-Goujon, Paris.
***Antirrhoïde Bélières**	19, r. Drouot, Paris.
Antiseptinol	C. BARON, aux Sables-d'Olonne (Vendée).
***Antivirus**	La Biothérapie, 3, r. Maublanc, Paris.
Antodyne Poulenc	92 r. Vieille-du-Temple Paris.
***Antonal**	7, r. Henry-Gréville, Angers.
***Anurol**	25, r. Petits-Hôtels, Paris.
***Anusol**	Pharmacie du Dr MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
Anytal Brisson	114, av. Michelet, St-Ouen.
Apaludol	AUCLAIR, à Aigurande (Indre).

*Aphloïne	15, r. des Immeubles Industriels, Paris.
*Apioline Chapoteaut	VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
Aplexil	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Apocynine du Dr Deschamps	LALEUF, 20, r. du Laos, Paris.
*Aquintol	Pharmacie du Dr MIALHE, 8, rue Favart, Paris.
Archésine Trouette-Perret	15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
Ardogène	9, r. du Temple, Enghien (Seine-et-Oise).
Argent colloïdal Nyrdhal	20 r La-Rochefoucauld Paris.
*Argybil	LANCOSME, 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
*Argycuprol	4 *bis*, r. Hébert, Courbevoie (Seine).
*Arhémapectine Gallier	36, b. Montparnasse, Paris.
*Arhéol Astier	45, r. du Dr-Blanche, Paris.
*Arhine Lambiotte Fr.	3, r. d'Edimbourg, Paris.
*Arquéritol	LESURE, 70, r. Bac, Paris.
*Arrhénal Adrian	9, r. de la Perle, Paris.
Arrhéniques Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
*Arrhénuclène Bergevin	à Chateaudun (Eure-et-Loir).
Arsaminol Clin.	20, r. Fossés-St.-Jacques, Paris.
*Arsénicaux Bouty	3 *bis*, rue Dunkerque, Paris.
Arsenic Organique Glasser	COIRRE, 79, r. du Cherche-Midi, Paris.
*Arséniode	BURIAT, 25, r. Copernic, Paris.
Arsenion Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
Arsénobenzol Billon	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Arseno-fer Henry	39, r. Sclessin, Liége.
Arsiquinine Lemaitre	12, r. Vavin, Paris.
*Arsi-Strychnal Longuet	34, r. Sedaine, Paris.
*Arsycodyle Leprince	62, r. de la Tour, Paris.
*Arsylène Roche	21, pl. des Vosges, Paris
Arsynal Legrand	GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.
*Arterion Vincardi	VIGUIER, 42, av. Borriglionne, Nice.
*Artérioveinine	121, av. Saint-Ouen, Paris.
Arthri-sel	9, r. Saint-Paul, Paris.
Arthritose	à Dieppe (Seine-Inférieure).
Arzonil	143, Gde-Rue, Guillotière, Lyon.

*Ascéine	CIBA, 1, pl. Morand, Lyon.
*Asciatine	21, r. Jean-Goujon, Paris
*Asclérosol	F. CARTIER, 1, r. de la Martinière, Lyon.
*Ascoléine Rivier	26, r. Saint-Claude, Paris.
*Aseptone	Labor. MOULIN, 50, r. de République, Puteaux (S.).
*Aspiphan	9, pl. de la Paix, Mulhouse.
Aspirine U. R.	21, r. Jean-Goujon, Paris.
Aspirine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Asquirol Poulenc	92 r. Vieille-du-Temple Paris
*Astasol Douetteau	20, faub. St-Honoré, Paris.
Astéine Biron	10, r. Lafayette, Grenoble.
Asthmatyl	3, r. du Pont, Epinal.
Asthmor	88, av. J.-B.-Clément, Boulogne-sur-Seine.
*Asthmylose	2, r. Lesdiguières, Paris.
*Atemnol	126, r. de la Pompe, Paris.
*Atophan Cruet	13, r. des Minimes, Paris.
*Atoquinol Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
Atoxyl Poulenc	92 r. Vieille-du-Temple Paris.
*Atural	142, av. de Clichy, Paris.
Aurion Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
*Avanazol Couturieux	id.
*Azigol	Produits Thévenot, 21, r. des Roses à Dijon.
*Azotyl	11, r. Torricelli, Paris.
*Azufrol Couturieux	18, av. Hoche, Paris.

B

Babeurre Lactella	à Tourcoing.
Babeurre Nutricia	65, bd Sébastopol, Paris.
Babutyrose	59, b. Gambetta, Tourcoing.
*Backérine	4, pl. des Vosges, Paris.
Bactioxyne	39, r. Cambon, Paris.
Bains de Brides	41, r. de Verneuil, Paris.
*Bain Carré	LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris.
*Bakolyse	122, r. Cherche-Midi, Paris.
*Ballotyl	113, boul. Voltaire, Paris.
*Balmiga	18, r. Pierre-Curie, Paris.
Balsamiodol	10, r. Washington, Paris.
*Balsamol Lescène	à Livarot (Calvados).
*Balsoforme	USINES DU RHONE, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
Bandes ulcérophiles Nozan	6 *ter*, r. Voltaire, La Garenne Colombes.
*Banikol	12, r. des Apennins, Paris.
*Bardane stabilisée Dausse	4, rue Aubriot, Paris (IV^e^).

Barkyl	30, r. Bobillot, Paris.
Baume Agorca	30, r. Bobillot, Paris.
***Baume Aroma**	1, pl. Victor-Hugo, Paris.
***Baume Baissade**	Saint-Loup, près Marseille (Bouches-du-Rhône).
***Baume Bengué**	16, r. Ballu, Paris.
***Baume Delacour**	56, boul. Péreire, Paris.
Baume du Dr Gigon	7, r. du Coq-Héron, Paris.
Baume Lartigol	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Baume Lorol	ZEDAIRE, à Grenoble.
Baume Marta	BONNAURE, à Alais (Gard).
***Baume de la Maternité**	11, r. Joseph-Bara, Paris.
Baume Oco	8?, r. Lafayette, Paris.
***Baume Rhodia**	USINES DU RHONE, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
Baume Saihol	70, Grand'Rue, Sèvres.
***Baume Selenia**	DAVID, RABOT & ses Fils, 42, r. de Bitche, Courbevoie.
***Baume Suelta**	13, r. Lacharrière, Paris.
***Béatol**	11, r. Torricelli, Paris.
***Beef Lavoix**	5, av. Victoria, Paris.
***Belhémine**	Labor. de Sérothérapie, Boulogne-sur-Seine.
***Belladenal Sandoz**	3-5, rue de Metz, Paris.
***Belladone Dausse**	4, rue Aubriot, Paris (IVe).
***Bellafoline Sandoz**	3 et 5 r. de Metz, Paris.
***Benedictus (Produits)**	74, r. Lamarck, Paris.
Benzhermyl	36, q. Fulchiron, Lyon.
Benzoate de Naphtol	FRAUDIN, 4, av. Desfeux. Boulogne-sur-Seine.
***Benzo-Bismuth Millot**	54, r. Bienfaisance, Paris.
Benzocalyptol	213, r. Saint-Honoré, Paris.
***Benzoflorine Julien**	105, r. de Rennes, Paris.
***Benzo-iodhydrine Bruel**	36, r. de Paris, Colombes (Seine).
***Benzolactine**	38, r. Albouy, Paris.
***Benzo-Lactol**	25, r. de Sévigné, Paris.
***Benzo phosphine Christiaens**	2, r. du Champ-de-Mars, Reims.
Benzoquinol	1, r. Alexandre-III, Dunkerque.
Benzo-Ringyl	9, r. Boissonnade, Paris.
***Benzylol**	37, r. Galilée, Paris.
***Berkendyl**	68, r. Berkendæl, Bruxelles.
Bestol du Dr Lavoué	Rennes (Ille-et-Vilaine).
***Bétul-Ol Midy**	4, r. du Colonel-Moll, Paris, à Cunlhat (Puy-de-Dôme),
***Bexinine Amblard**	Lab. chimie physiologique, 37, r. Tivoli, Bordeaux.
Bianterol	17, boul. Haussmann, Paris.
Bibromure de Hg Vicario.	

•Bi-Citrol Marinier	159, r. de Flandre, Paris.
Bi-iodure Cros	10, r. du Bac, Paris.
Bi-iodure Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Bi-iodure Souffron	157, r. de Sèvres, Paris.
Bilexabol	156, r. Fauvelles, Courbevoie
•Biléyl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
•Biliase Raby	à Asnières (Seine).
•Bilifluine	Lab. STENE, 4, pl. des Vosges, Paris.
Biliol Bouty	3 *bis*, r. Dunkerque, Paris.
•Bilirhéine	11, pl. des Vosges, Paris.
•Bilivaccin	« La Biothérapie, 3, r. Maublanc, Paris.
Billirgyl	30, r. Miromesnil, Paris.
Bimineral Reynaud	DURAND, à Aigues-Mortes.
Binol Roger	177, b. St-Germain, Paris.
•Biocalcose Lematte et Boinot	52, r. Labruyère, Paris.
Biocrine	122, faub. St-Honoré, Paris.
•Biodermyl Monal	6, r. Bridaine, Paris.
•Biodynamine	17, r. Cadet, Paris.
•Biogastrine	1, boul. Henri-IV, Paris.
•Biogénol Demasles	à Vienne (Isère).
Biogésine Rochard	à Lorient.
•Biolactyl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
•Bionergyl	2, pl. du Théâtre-Français, Paris.
•Biophorine Girard	48, r. d'Alésia, Paris.
Biophosphine	DEPOUILLY, Le Creusot.
•Bioplastine Serono	6, r. des Ursulines, Paris.
•Biophytol	90, av. des Ternes, Paris.
Biosine Le Perdriel	11, r. Milton, Paris.
•Biotose Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
•Biotrigon	1, r. des Tournelles, Paris.
•Biozol	25, r. Drouot, Paris.
Bi Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Biscam-Gabail	5, r. Lefebvre, Paris.
Biscols Fraudin	4, av. Desfeux, Boulogne-sur-Seine.
Biscopaks Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
•Bis-ka-ma	DURET et REMY, Asnières (Seine).
Bismétine Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
•Bismhydral	LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris.
Bismupaïne	194, r. de Rivoli, Paris.
•Bismuth Desloaux	71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
Bismuth Perroud	7, r. des Archers, Lyon.
Bismuth léger Adrian	9, r. de la Perle, Paris.

•Bismuth Tulasne	68, boul. Malesherbes, Paris.
•Bismuthés « Meurice ?	68, r. Berkendæl, Bruxelles.
•Bismuthion Coutu-rieux	18, av. Hoche, Paris (XVIe).
•Bismuthoïdol Robin	13, r. de Poissy, Paris.
•Bivatol	Lab. Chimiothérapie, 21, r. d'Aumale, Paris.
Blastéase	21, pl. des Vosges, Paris.
•Blédine Jacquemaire	à Villefranche (Rhône).
•Blennosine	INSTITUT de MICROBIOLOGIE, Sarrebrück.
•Boldine Houdé	9, r. Dieu, Paris.
Boldo-Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
•Boldo-Verne	à Grenoble (Isère).
•Boldoïne Eparvier	26, Grd'Rue St-Clair, Lyon.
•Boldorhéine	Dr CHAPELLE, 8, r. Vivienne, Paris.
•Boléase Monal	6, r. Bridaine, Paris.
Bolène Lambda	95, boul. Magenta, Paris.
•Bonbons Lucas (Vermifuges)	JOUBERT & SIBASSIE, Nantes.
Bonbons vermifuges Royer	LAUMONIER, 225, r. Saint-Martin, Paris.
Bornyval	2, r. des Lions, Paris.
•Boricine Meissonnier	LOGEAIS, 22 *bis*, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.
•Boro-borax Vigier	12, b. Bonne-Nouvelle, Paris.
•Borocalcyl Thévenot	21, r. des Roses, Dijon.
•Borosodine Lumière	9, c. Liberté, Lyon.
•Borostyrol	MAYOLI, 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
•Borotropine Sevin	SOULAIRAC, St-Quentin.
•Bouchons Radioactifs Emana	14, r. de la Pépinière, Paris.
•Boues Radioactives Emana	14, r. de la Pépinière, Paris.
•Bougies Américaines	LOGEAIS, 24, r., de Silly, Boulogne-sur-Seine.
•Bougies Chaumel	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Bougies Raynal	12, r. de Nice, Paris.
•Boules Quiès	47, boul. Victor, Paris (XVe)
Bouragar	BONNAURE, à Alais (Gard).
•Bouteilles Radioactives Emana	14, r. de la Pépinière, Paris.
•Bov'Cardiac	FUMOUZE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Bov'Bilic	id.
Bov'hepatic	id.
•Brides-les-Bains	41, r. de Verneuil, Paris.
Bridia	id.
Bromalbin Adrian	9, r. de la Perle, Paris.
•Broméine Montagu	49, boul. Port-Royal, Paris.

*Bromiase Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
Bromidine Henry	39, r. Sclessin, Liége.
Bromocarpine Rocher	32, r. Grenelle, Paris.
*Bromogénol Pépin	à Courbevoie (Seine).
*Bromomaïsine	6, r. Rosenwald, Paris.
*Bromone Robin	13, r. de Poissy, Paris.
Bromovaleron Henry	39, r. Sclessin, Liége.
*Bromovose	Lab. MADYL, 14, r. Miromesnil, Paris.
Bromure de camphre Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Bromure Laroze	2, r. des Lions, Paris.
Bromure de sodium du Dr Gigon	7, r. Coq-Héron, Paris.
Bromure Souffron	157, r. de Sèvres, Paris.
Bronchoplastre	CAVAILLES, 34, r. Turin, Paris.
*Bronchoseptol	Lab. E. Lauriat, à la Garenne-Colombes (S.).
Brunyl	17, r. de Berri, Paris.
Buccochlore	BEAUCHAMP, 5, cours St-Louis, Marseille.
Buctol Pâris	4, r. Lamotte-Picquet, Paris.
*Bulgarine Thépénier	12, r. Clapeyron, Paris.
*Butelline	21, r. Jean-Goujon, Paris.

C

*C. 40 Drouet et Plet	37, r. Marly, Rueil (Seine).
*Cachets du Dr Boveil	1, r. Lassalle, Lyon.
Cachets Céli	LANDES, à Gramat (Lot).
Cachets Charvoz	à Tassin-la-Demi-Lune.
Cachets du Dr Faivre	à Lyon.
Cachets Fercocq	16, r. Maison-Brûlée, St-Maur.
Cachets Gau	AFFRE, Lamalou (Hérault).
*Cachets Kapytan	76, r. de Sèvres, Paris.
Cachets opothérapiques Byla	26, av. Observatoire, Paris.
*Cachets Roche de Thiocol	HOFFMANN-LA ROCHE & Cie, 21, pl. Vosges Paris.
Cacodylate Vigier	12, b. Bonne-Nouvelle Paris.
Cacodyle Gonnon	14, r. Victor-Hugo, Lyon.
*Cacodylo Phosphate vital Jacquemaire	à Villefranche (Rhône).
*Cacticardine Dr Conraux	à Caudebec (Seine-Inférieure).
Cæcaline Gagnière	à Clermont-Ferrand.
Caféine Houdé	9, r. Dieu, Paris.
*Caféine Invar	21, r. Nonnains d'Hyères, Paris.

Cafiodine	25, r. Petits-Hôtels, Paris.
Calcéose Boillot	9, r. Saint-Paul, Paris.
Calcifia	52, r. d'Aubuisson, Toulouse.
Calciline	(Voir : Néo-calciline), 25, r. Vaneau, Paris.
Calciphasine	Lab. ELAN, 13, av. Italie, Paris.
Calcitine	DIGNE Fils à Fréjus (Var).
*Calcional	LEMATTE & BOINOT, 52, r. La Bruyère, Paris.
*Calcium Sandoz	3 et 5, r. de Metz, Paris.
Calco-céril	16, r. Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.
*Calcoléol	Produits SCIENTIA, 21, r. Chaptal, Paris.
Calcophore	6, r. Raoul-Berton, Bagnolet.
*Calcozymase	19, r. Franklin, Paris.
Calmigorge	à Thury-Harcourt (Calv.).
*Calmosuppos	à Montguyon (Ch.-Inf.).
Calogyre	IMBERT, à Toulon (Var).
Camphemol	1, pl. Morand, Lyon.
*Camphodausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
Camphoral Aguettant	36, q. Fulchiron, Lyon.
*Camphostyl	LACROIX, 37, r. Pajol, Paris.
*Capillairal	Arquevaux, à Etampes (Seine-et-Oise).
Capsoléol	Lab. ANIMAT, à Nîmes (Gard).
*Capsovules Diplos	18, r. Pierre-Curie, Paris.
*Capsules Bardet	76, r. de Sèvres, Paris.
Capsules Bonnefond	49, boul. Port-Royal, Paris.
*Capsules Bruel	36, r. de Paris, Colombes (Seine).
*Capsules Cognet	43, r. de Saintonge, Paris.
*Capsules Dartois	6, r. Abel, Paris.
Capsules de Gonosan	2, r. des Lions, Paris.
*Capsules d'Hojasol	19, r. Ferdin.-Duval, Paris.
Capsules d'Ichtyol Vigier	12, b. Bonne-Nouvelle, Paris.
*Capsules Joret et Homolle	165, r. Saint-Honoré, Paris.
*Capsules de Morrhuine Puy	Grenoble (Isère).
*Capsules Noguès	11, r. Joseph-Bara, Paris.
*Capsules Pautauberge	10, r. Constantinople, Paris.
Capsules Raquin	78, faug. Saint-Denis, Paris.
Capsules salolées	LACROIX, 31, r. Philippe-de-Girard, Paris.
*Capsules Sérafon	9, r. de la Perle, Paris.
*Capsules Taetz	2, r. Lesdiguières, Paris.
Capsules Therpinol	14, r. Victor-Hugo, Lyon.

Carbaïne Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
*Carbatropine	49, boul. Port-Royal, Paris.
*Carbocitrol	64, bd Barbès, Paris.
*Carboïodine	24, r. Damesme, Paris.
*Carbolactyl	19, r. de Fleurus, Paris.
*Carbonal	14, r. Cantin, Courbevoie.
*Carbonate de Bismuth	7, r. des Archers, Lyon.
*Carbosanis	49, boul. Port-Royal, Paris.
*Cardibaïne	6, r. d'Assas, Paris.
*Cardiosthénine	Dr CHAPELLE, 8, r. Vivienne, Paris.
Cardiotanic	GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
Carnine Lefrancq	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Cascara Alexandre	41, r. de Rome, Paris.
*Cascara Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
*Cascarine Leprince	62, r. de la Tour, Paris.
Caseoline Girard	48, r. d'Alésia, Paris.
Catalysine du Dr Viquerat	FREYSSINGE, 6, r. Abel, Paris.
Cataplasme Electrique Morgin	46, r. Dauphine, Paris.
*Catéményl	Dr G. LALAURIE, à Cuxac d'Aude (Aude).
Cathiode Brisson	114, av. Michelet, St-Ouen.
Cédryl	à Narbonne.
*Cephœmétine	44, r. Gambetta, Biarritz.
Cerdesol	18, r. Favart, Paris.
*Céréales-Bébé	FAVRICHON à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).
Céréalose	Labor. ASTIER, 45, r. du Docteur-Blanche, Paris.
*Cérébrine Fournier	147, bd Montparnasse, Paris.
*Cérébroïl Leysin	1 *bis*, r. Molitor, Paris.
Cérédine Loudenot	106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.
Céréol Gigon	7, r. Coq-Héron, Paris.
*Céréossine	DEHAUSSY, 66, r. Nationale, Lille.
*Cérinil Boutroy	8, r. de Passy, Paris.
*Cérioma (Produits)	16, r. Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.
*Cériomine Boutroy	8, r. de Passy, Paris.
Cersomine	18, r. Favart, Paris.
*Cervol	19, r. de Fleurus, Paris.
*Cethocal	1, r. du Val-d'Osne, Saint-Maurice (Seine).
*Cétrarose Gigon	7, r. Coq-Héron, Paris
Charbon granulé Fraudin	4, aven. Desfeux, Boulogne-sur-Seine.
*Charbon Tissot	34, boul. de Clichy, Paris.
Chaulmorhuate Pomaret	21, r. Marbeuf, Paris.

*Chéloïdine	BROCADET, 89, r. du Commerce, Paris.
*Chenanthol	HINGLAIS, à Epernay.
*Chlocci	L. ADAM, à Granville (Manche).
*Chloral bromuré Dubois	DURIEZ, 20, pl. des Vosges, Paris.
*Chloral-Geranié	GROSJEAN, 8, r. Lafayette, Paris.
Chloralosane	KUHLMANN, 11, r. de la Baume, Paris.
*Chloramine	FREYSSINGE, 6, r. Abel, Paris.
*Chloréthyle Bengué	16, r. Ballu, Paris.
Chlorhydrol	FOUCHÉ, à Houdan (S.-et-O.).
*Chloridia	Produits Dânnec'h, 64, r. des Tournelles, Paris.
*Chlorinol	40, r. des Acacias Paris.
Chlorobacilline	TULIVET, St-Germain-en-Laye.
*Chlorobyl	11, r. Torricelli, Paris.
*Chloro-Calcion	MICHELS, 22, r. des Bernardins, Paris.
Choloroforme anesthésique	USINES DU RHONE, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
*Chloroforme Lambiotte Frères	3, r. d'Edimbourg, Paris.
*Cholécystine	VINCENT, 14, av. Mac-Mahon, Paris.
Choléine Camus	13, r. Pavée, Paris.
Choléitoires Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Cholélyse Carbou	8, r. Jean-de-Bellay, Paris.
*Choléoboldine Thévenot	21, r. des Roses, Dijon.
*Choléo-Combretol	25, r. Drouot, Paris.
*Choléokinase	à Asnières (Seine).
*Choléolactol Dâguin	5, r. des Remises, Saint-Maur.
*Cholergine	8, r. de la Source, Paris.
Cholotoxine	CHAUMONT - CAZALS, à Vichy (Allier).
*Chophytol	Dr BREL, 58, av. République, Paris.
*Cibalgine	Labor. CIBA, 1, pl. Morand, Lyon.
Cigares Gicquel	BRUN & DUMÉE, 64, r. des Tournelles, Paris.
Cigarettes du Dr Cléry	53, boul. Saint-Martin, Paris.
Cigarettes Espic	20, r. Saint-Lazare, Paris.
*Cineyl Grysa	7, r. Saint-André, Le Mans (Sarthe).
Cinnozyl Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

Cinol	à Narbonne
***Citrase**	37, r. de Bourgogne, Paris.
***Citraspirine**	22, bd Sébastopol, Paris.
***Citrocarbine**	WARIN, 4, ch. de la Muette, Paris.
***Citrofluyl**	4, ch. de la Muette, Paris.
***Citropaïne**	304, r. Saint-Jacques, Paris.
Citrosalol	57 *bis* av. Motte-Picquet Paris
***Citrosodine Grémy**	34, r. Sedaine, Paris.
Cliparsyl	37, r. Dr-Leroy, Le Mans.
***Clisémine Longuet**	34, r. Sedaine, Paris.
***Clonazone Daufresne**	40, r. Thiers, Le Havre.
Cloranol	58, r. Miromesnil, Paris.
***Clupéyl**	69, av. Faidherbe, à Malo-les-Bains.
Coagulène Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
Coca Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
***Cocaïne Midy**	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Coccidal Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
***Codocol**	20, r. des Martyrs, Paris.
***Codoforme Bottu**	35, r. Pergolèse, Paris.
***Colarsé**	49, r. Thiers, Boulogne-s.-Mer.
***Colchi-Sal Midy**	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Colitique	41 à 47, r. du Docteur-Blanche. Paris.
Colchiflor Vial	8, r. Vivienne, Paris.
Collo-Bacilline	11, r. Mansart, Paris.
***Collobiases Dausse**	4, r. Aubriot, Paris.
***Colloïdes Amicros**	5, r. Clauzel, Paris.
Colloïdes Clin	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
***Colloïdine**	LALEUF, 20, r. Laos, Paris.
***Colloïdogénine**	10, rue de l'Orne, Paris (15e).
***Collo-iode Dubois**	35, r. Pergolèse, Paris.
Colloïxols (Voir : Complexes colloïdaux)	49, r. de Paradis, Paris.
Collopherine Bapt	4, r. de l'Alma, Asnières.
Collosol Pépin	9, r. du 4-Septembre, Paris.
Collothiol	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
***Colluborine**	223, r. Saint-Martin, Paris.
Collyres stérilisés Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Coloplastre	34, r. de Turin, Paris.
Combrétine Boquillon	12, r. de Nice, Paris.
***Comitiol**	GRORICHARD, 12, pl. Labourée, Besançon.
***Complextraits**	HUCKEL, à Héricourt, (Haute-Saône).
***Comprimés Adrian**	9, r. de la Perle, Paris.
***Comprimés d'Alibour**	DURET & RÉMY, à Asnières (Seine).

*Comprimés Aqua Pura	ROBERT & CARRIÈRE, 37, r. de Bourgogne, Paris.
*Comprimés Chéralys	12, r. des Saints-Pères, Paris.
Comprimés de Gibert	19, r. d'Aubagne, Marseille.
Composé Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
*Comprimés Guillaumin	13, r. Cherche-Midi, Paris.
*Comprimés Kléos	2, r. des Cordeliers, Meung-sur-Loire.
*Comprimés Maver	Et. WOLLACKER & Cie, 31, r. Saint-Georges, Paris.
*Comprimés de Pantolaxine du Dr Boveil	1, r. Lassalle, à Lyon.
Comprimés du Prof. Pénières	COUPAT, à Ussel (Corrèze).
*Comprimés Roy	81, bd Suchet, Paris.
*Comprimés de Thiocol Roche	HOFFMANN-LA ROCHE, 21, pl. des Vosges, Paris.
Comprimés Vichy-Etat	G. PRUNIER & Cie, 6, r. de la Tacherie, Paris.
Conarsynol	12, pl. Puget, Toulon.
Condurango Gmet	27, faug. Montmartre, Paris.
Condurango granulé Astier	45, r. du Docteur-Blanche, Paris.
Conhydrargol	12, pl. Puget, Toulon
*Conjonctol	Lab. des Etabl. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
Coqueluchyl	3, r. du Pont-Epinal.
*Coramine	Labor. CIBA, 1, pl. Morand, Lyon.
*Coréine	8, r. de la Source, Paris.
Corps Thyroïde Moncour	à Boulogne-sur-Seine.
*Cratægine Leroux	à Caudebec-lès-Elbeuf.
Cratægol	14, r. Eug.-Delacroix, Paris.
Cratægus Bocquillon	10, r. du Bac, Paris.
Cratægus Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Crayons Chaumel	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Crème de Bismuth Quesneville	12, r. de Buci, Paris.
*Crème résolutive du Dr Rap	34, r. de Turin, Paris.
*Créosal Dubois	20, r. du Laos, Paris.
Crescol	157, r. de Sèvres, Paris.
*Créosoforme Lambiotte Frères	3, r. d'Edimbourg, Paris.
*Crésopirine	4, pl. des Vosges, Paris (IVe).
*Crésyl Joyes	36, r. d. Fr.-Bourgeois, Paris.
Crinocalcine	HATIER à Saint-Etienne.
*Cristolax	58, r. de Charonne, Paris.
Croquettes Marida	1, Jardin-Anglais, Le Raincy.
*Cryogénine Lumière	9, c. de la Liberté, Lyon.

*Cryptargol Lumière	9, c. de la Liberté, Lyon.
Cryptherмol	66, r. Nationale, Lille
Crysiodal	La Biothérapie, 3, r. Maublanc, Paris.
Cupranine Léger	2, boul. de Russie, Vichy.
*Cupressus Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IV[e]).
Cuprifer	à La Ferté-Macé (Orne).
Cuprase-Ducatte	191, r. Saint-Honoré, Paris.
*Cuprion Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
Cuprocithine	GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
*Curalués	LECOQ & FERRAND, 54, ch. d'Antin, Paris.
*Curatine Brunet	23, r. des Ecouffes, Paris.
*Curatoxine Vendel	114, r. du Temple, Paris.
*Curgol Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Curiode	17, av. Parmentier, Paris.
Curiosan	156, r. Fauvelles, Courbevoie
Curocalcine	11, boul. de Strasbourg Paris.
Curogène	73, r. de Paroisse, Versailles.
*Curovaccins atoxiques Cépède (Voir vaccinothérapie)	60, r. Mathurin-Régnier, Paris.
*Curoxyure	Labor. B. E. A., Belfort.
Cuscutine Foulon	Ermont (S.-et-O.).
Cyanaurol du D[r] Gigon	7, r. Coq-Héron, Paris.
*Cyanermine	25, r. Drouot, Paris.
Cynarine Estèbe	à Villefranche-Lauragais.
*Cytobiase	24, r. de Charenton, Paris.
*Cyto-Manganol	CORBIERE, 27, r. Desrenaudes, Paris.
Cytoplasmine Ducatte	8, pl. de la Madeleine, Paris
Cytosal	184, boul. Haussmann, Paris.
*Cyto-Serum Corbière	27, r. Desrenaudes, Paris.
*Cytotropines	FOURNIER Fr., 26, bd de l'Hôpital, Paris.
Cytuline Couturieux	18, av. Hoche, Paris.

D

*Déclonal	USINES DU RHONE, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
*Decorpa	41, r. de Rome, Paris.
Denisia Brisson	114, av. Michelet, St-Ouen.
Denisoline Brisson	114, av. Michelet, St-Ouen.
Dentoxyl	HAUTDIDIER, 37, r. Galilée, Paris.
*Dépuratif Kromelinck	19, r. Drouot, Paris.
*Dépuriode	ANGELINI, 61, rue de Seine, Paris.
Dermadésine	41, r. St-Pierre, Caen.

Dermofagine	15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.
Dermoplastol	10, r. du Plâtre, Paris.
Désensibilysine	BÉLIÈRES, 19, r. Drouot, Paris.
Détergine	Dr Bourdeau, à Parthenay.
Diabétifuge	21, r. Chaptal, Paris.
Diachusine	12, r. Emilio-Castelar, Paris.
Diadermine	12, r. Vavin, Paris.
Dial Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
Dialacétine Ciba	id.
Dialyl Brunot	16, r. Boulainvilliers, Paris.
Diascléral	2, r. Neuve-Popincourt, Paris.
Diases Progil	6, boul. de Strasbourg, Paris.
Diasténine Gremy	14, r. de Clichy, Paris.
Diastogène	DEHAUSSY, 66, r. Nationale, Lille.
Dicaliode	1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Didial Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
Diéménal	18, r. de Beaune, Paris.
Diénol	18, r. de Beaune Paris.
Digalène Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Digestif Capmartin	2, r. Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
Digestif Henry	39, r. Solessin, Liége.
Digestif Pinel	à Bonnelles (Seine-et-Oise).
Digestirol	25, r. Petits-Hôtels, Paris.
Digibaïne Deglaude	6, r. d'Assas, Paris.
Digifoline Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
Digimialbaïne	MIALHE, 8, r. Favart, Paris.
Digitale Dausse	4, r. Aubriot, Paris.
Digitale Ecalle	157, r. de Sèvres, Paris.
Digitaline Homolle & Quévenne	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Digitaline cristallisée de Nativelle	49, boul. Port-Royal, Paris.
Digitaline cristallisée du Dr Mialhe	8, r. Favart, Paris.
Digitaline Invar	21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
Dimétol Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Dimol	Bois-Colombes (Seine).
Diodoforme Taine	9, r. de la Perle, Paris.
Dioradin	25, r. Drouot, Paris.
Dioséine Prunier	6, av. Victoria, Paris.
Dippol	87, r. Denf.-Rochereau, Paris.
Dismenine Henry	39, r. Sclessin, Liége.
Disménol	119 r. St-Jacques Marseille.
Diurédausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe.)
Diurène	15, r. d'Argenteuil, Paris.
Diurocalcine Gros	13, pl. Delille, Clermont-Fer4.
Diurocardine	285, av. Jean-Jaurès, Lyon.

*Di-Uroïodine	45, boul. Lafayette, Calais
Dmégon (Néo)	POULENC Frères, 92, Vieille-du-Temple, Paris
Dmesta (Néo)	id.
Dmetys (Néo)	id.
*Doloma	29, pl. Bossuet, Dijon.
*Dolysine Rochereau	Salbris (L.-et-Ch.).
Dozéol Deglaude	6, r. d'Assas, Paris.
Dragées anticatarrhales	LEGOUX Frères, 10, r. de Turenne, Paris.
*Dragées Bengué	16, r. Ballu, Paris.
Dragées Carbonel	15, r. d'Argenteuil, Paris.
Dragées Demazières	131, r. de Vaugirard, Paris
Dragées de fer Cognet	43, r. de Saintonge, Paris
Dragées de fer Rabuteau	COMAR & Cie, 20, r. des Fossés-St-Jacques. Paris
*Dragées Elkin	DEPRUNEAUX, 18, r. de Beaune, Paris.
Dragées ergotées	MANNET, à Loudun (Vienne).
Dragées Fernel	76, boul Haussmann, Paris
*Dragées Gélineau	MOUSNIER, à Sceaux.
Dragées du Dr Hecquet	49, boul. Port-Royal, Paris
*Dragées Tonicardiaques Le Brun	155, boul. Magenta, Paris
Dragées de Masthophile	ANNIC, à Montbron (Charte)
*Dragées Névrosthéniques "Yse"	65, r. Louis-Blanc, Paris.
Dragées Nyrdhal	20 r La-Rochefoucauld Paris
Dragées Pautauberge	165, r. St-Denis, Courbevoie
*Dragées pulmonaires Giry	49, r. de Metz, Nancy.
Dragées Somedo	à Meudon (Seine-et-Oise).
Dragées Tasch	4, r. d'Illzach, Mulhouse.
*Dryco (Lait sec)	3, r. St-Roch, Paris.
Duodénase	12, r. de Nice, Paris.
Dynamocalcine	CHAVIALLE à Sèvres (Seine-et-Oise).
*Dyspeptine Hepp	Le Chesnay (Seine-et-Oise)

E

*Eau de Brides (Sous-produits),	41, r. de Verneuil, Paris
Ebanyl	59, r. Nollet, Paris.
*Eczéda	Labor. GOBEY, 21, r. d'Aumale, Paris.
*Edistol	40, r. des Carmes, à Orléans
*Ektogan	12, r. Lamartine, Paris

Elatine Bouin	à Boulogne-sur-Seine.
Elbon Ciba	Pl. Morand, Lyon.
Electrargol Clin	20, r. Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Electraurol Clin	id.
Electrocuprol	COMAR & Cie, id.
Electro Hg	COMAR & Cie, id.
Electromanganol	COMAR & Cie, id.
Electromartiol	COMAR & Cie, id.
Electropalladiol	COMAR & Cie, id.
Electro-platinol	COMAR & Cie, id.
Electro-Rhodiol	COMAR & Cie, id.
Electrosélénium	COMAR & Cie, id.
Elgine Julien	105, r. de Rennes, Paris.
Elixir Bonjean	DUSSUEL ET FAURE, à Aix-les-Bains.
Elixir Bryol	97, av. Ledru-Rollin, Paris.
Elixir Déret	COMAR & Cie, 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
Elixir Duchamp	6, rue Rocroy, Paris.
Elixir Ducro	20, pl. des Vosges Paris.
Elixir Duret	12, r. de Nice, Paris.
Elixir Dussaud	52, r. de Rome, Marseille.
Elixir eupeptique Tisy	VAUDIN & GUILLAUMIN 12, r. Charles-V, Paris.
Elixir de fer Kœnig	37, av. Marceau, Paris.
Elixir ferro ergoté	MANNET, à Loudun (Vienne).
Elisir Glasser	à Turkeim (Haut-Rhin).
Elixir Glover	13, r. des Minimes, Paris.
Elixir Grez	49, r. Maubeuge. Paris.
Elixir hépatique Henry	39, r. Sclessin, Liége.
Elixir Houdé	9, r. Dieu, Paris.
Elixir Mannet	à Loudun (Vienne).
Elixir Mariani	41, boul. Haussmann, Paris
Elixir Martin-Mazade	à Saint-Vallier (Drôme).
Elixir du Dr Mialhe	8, r. Favart, Paris.
Elixir de Pepto-Cardine	5, av. des Tilleuls, Paris.
Elixir Percy	12, r. Sévigné, Paris.
Elixir polybromuré Yvon	5, r. de la Feuillade, Paris.
Elixir Spark	19, b. Bonne-Nouvelle, Paris.
Elixir Spes	98, rue Saint-Ginès, Bordeaux.
Elixir du Dr Thermes	BRUN & DUMÉE, 64, r. des Tournelles, Paris.
Elixir thiogaïacolé Arquevaux	Etampes (Seine-et-Oise).
Elixir Virenque	131, r. Vaugirard, Paris.
Elixir de Virginie Nyrdhal	20,r. La-Rochefoucald, Paris.

Elixir Vital Quentin	MOUSNIER, à Sceaux.
***Embryonine du Dr Barré**	HAMEL, 10, pl. Thiers, Le Mans.
Emerson's Bromo-Seltzer	62, av. Champs-Élysées, Paris.
Emétinol Viel	7, r. Saint-Yves, Rennes.
***Emplâtres R. Cavaillès**	34, r. de Turin, Paris (VIIIe).
Emplâtre Duret	61, r. de Vaugirard, Paris.
Emulsion Bonnefond	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
***Emulsion Marchais**	11, r. Mission-France, Marseille.
***Endocalcase**	74, r. des Jacobins, Amiens.
Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
***Endopancrine**	48, r. de la Procession, Paris.
***Energétènes végétaux Byla**	26, av. l'Observatoire, Paris.
***Enésol Clin**	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Engelurol	22, r. de Vienne, Paris.
***Eniode Lefebvre**	2, r. Duphot, Paris.
***Ennego**	37, r. de Bourgogne, Paris.
Eno's Fruit Salt	3, av. Lowendal, Paris.
***Entéro-Antigènes**	31, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
***Entéroseptyl Clérambourg**	BRUNERYE, 4, r. Tarbé, Paris.
***Entérovaccin Lumière**	3, c. de la Liberté, Lyon.
***Entérozone**	56, boul. Pereire, Paris.
Entérozyme	52, r. Labruyère, Paris.
Enuczéma	53, r. Bourgogne, Orléans.
Eparseno	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple Paris.
Epidosine Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
***Eranol**	45, r. de l'Echiquier, Paris.
***Erbamil**	105, bl. Malesherbes, Paris.
***Ercerhinol**	37, r. de Bourgogne, Paris.
Ergot de seigle Dausse	4, r. Aubriot, Paris.
Ergotine Bonjean	99, r. d'Aboukir, Paris.
***Ergotine Lamante**	M. PARIS, 1, rue Lassile, à Lyon.
Ergotine Yvon	5, r. Lafeuillade, Paris.
Ergotinine Tanret	10, r. du Commandant-Rivière, Paris.
Erystypticum Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Erythroluès	LECOQ & FERRAND, 54, ch. d'Antin, Paris.
Erséol Prunier	6, r. de la Tapisérie, Paris.
***Esculéol**	13, r. Lacharrière, Paris.
Etain Amicros	5, r. Clauzel, Paris.
***Ether anesthésique**	USINES DU RHONE, 21, r. Jean-Goujon Paris.

Ether amyvalérianique	G. BRUEL, 36, r. de Paris, à Colombes (Seine).
Eucalcium	50, boul. de Paris, Marseille.
Eucalyptine Lebrun	155, boul. Magenta, Paris.
Euchol Lambda	95, boul. Magenta, Paris.
Eucytol	1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Eudynol	F. CARTIER, 1, r. de la Martinière, Lyon.
Eugéine Prunier	6, r. de la Tacherie, Paris.
Eugynol Grandval	12 et 14 r. Féry, Reims.
Eukénol Clément	7, pas. Thionville, Paris.
Eukinase Carrion	54, fb. Saint-Honoré, Paris.
Eumictine Leprince	62, r. de la Tour, Paris.
Euonymine Thibault	6, r. Rosenwald, Paris.
Eupeptique Monavon	à Sainte-Foy, près Lyon.
Euphon	1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Euphonol Aguettant	36, quai Fulchiron, Lyon.
Euphorol Loudenot	106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.
Euphoryl	114, r. du Temple, Paris.
Euphrénine Bastia	1, place Carnot, Lyon
Euphytose	Lab. MADYL, 14, r. de Miromesnil, Paris.
Eupnine Vernade	13, r. Pavée, Paris.
Eupnogénol	49, r. de Bitche, Courbevoie.
Euréka-Cooky	18, r. Molitor, Paris.
Euronal	15, r. d'Argenteuil, Paris.
Eusomnine Bélières	19, r. Drouot, Paris.
Eusthenol Roze	GMET, 27, faub. Montmartre, Paris.
Eutensyl Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
Evatmine Carrion	54, fb. Saint-Honoré, Paris.
Evine	3, r. de la Perle, Paris.
Evolaxine	Lab. du Dr LAURENT-GÉRARD, 40, r. de Bellechasse, Paris.
Evonymine Thibaut	51, r. des Mathurins, Paris.
Exol Cognet	43, r. de Saintonge, Paris.
Exolysés Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Extrait de céréales Adrian	9 et 11, r. de la Perle, Paris.
Extrait Hamyd	GMET, 27, fg Montmartre, Paris.
Extrait de Malt Français Déjardin	10, r. Parent-de-Rozan, Paris (XVIe).
Extraits Moncour	49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.

F

*Facmine Longuet	34, r. Sedaine, Paris.
Fantine Adoue	à Pauillac (Gironde).
Farines Favrichon	à Saint-Symphorien-de-Lay.
Farine lactée Heudebert	85, r. de Saint-Germain, Nanterre.
Farine lactée Nestlé	6, av. Portalis, Paris.
*Farine lactée diastasée Salvy	4, r. Lambrechts, Courbevoie.
*Farines Maltées Jammet	47, r. Miromesnil, Paris.
*Farine de malt Heudebert	85, r. de Saint-Germain, Nanterre.
Farré-Cure	29, r. Mogador, Paris.
Fébrifuge	Molière, à Constantine.
Fébriline	4, fg Stanislas, Nancy.
*Félamine Sandoz	5, r. de Metz, Paris.
*Félargent	21, r. Jean-Goujon, Paris.
Felsol	pl. Homme-de-Fer, Strasbourg.
Fer-Arsenic	AUCHER, La Ferté-Macé (Orne).
*Férarsényl	GAUTIER, 13, r. Dorian, Paris.
*Fer Bravais	16, r. de Rocroy, Paris.
Fer Henry	39, r. Sclessin, Liége.
Fer injectable Roussel	MOUSNIER, à Sceaux.
Fériode Byla	26, av. l'Observatoire, Paris.
*Fer Larcade	151, r. Lafayette, Paris.
Fer Manganèse Amicros	5, r. Clauzel, Paris.
Fermentérol Milan	15, r. d'Argenteuil, Paris.
Ferments organiques Zévor	COIRRE, 79, r. Cherche-Midi, Paris.
*Feroxal Buisson	157, r. de Sèvres, Paris.
*Fer-Ovarine Vitalis	38, boul. de Charonne, Paris.
Fer Quévenne	26, r. Petit, St-Denis.
Fer Rabuteau	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Ferrocalbiose	ROUSSY, Viroflay (S.-et-O.)
Ferrocalcine	GUÉRIN, Meulan (S.-et-O.)
*Ferrocodile Leprince	62, r. de la Tour, Paris.
Ferropeptone	17, r. Cadet, Paris.
*Ferrophytine Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
Ferroplasma	VIVIEN, 6, r. Abbeville Paris.
Ferrygène Carrau	34, boul. de Clichy, Paris
Fer Jaquemaire	à Villefranche (Rhône).
Ficatine	85, r. Turbigo, Paris.

Figadol Vivien	6, r. d'Abbeville, Paris.
Fixase	PARET, à Marseille.
Fixine Grémy	34, r. Sedaine, Paris.
Fixogène Loudenot	106, av. du Roule, Neuilly-sur-Seine.
Floravène	MORTIER & Cie, Bordeaux.
Floréases	20, faub. Poissonnière, Paris.
Fludiose	Tétard, à Beauvais.
Fluène	LANDRIN, 20, r. La-Rochefoucauld, Paris.
Fluodyle	10, r. Pierre-Ducreux, Paris.
Fluoformol Gonin	60, r. Saussure, Paris.
Fluoridia	50, r. de Lille, à Tourcoing.
Foie - Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Fondants Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
Forcival	6, r. Bridaine, Paris.
Fordynol	à Saint-Etienne.
Formadermine	21, r. Jean-Goujon, Paris.
Formagol Bouty	3 *bis*, r. de Dunkerque, Paris.
Formine Adrian	9, r. la Perle, Paris.
Formocarbine	Tétard, à Beauvais.
Formose	CHAVIALLE, 70, Gde-Rue, Sèvres.
Formo-Vaccins	LUCINIA, 154 *bis*, r. Breteuil, Marseille.
Formule Jacquemaire 60	Villefranche (Rhône).
Formyl	F. CARTIER, 1, r. de la Martinière, Lyon.
Fortossan Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
Fosfoxyl Carron	89, r. de Saint-Cloud, Clamart (Seine).
Fostrychnol Chanteau	8, r. de Constantinople, Paris.
Fosyls Carron	89, r. Saint-Cloud, Clamart (Seine).
Francoplaste Kraus	37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
Frangoléine	à Aigurande (Indre).
Frangulose Flach	6, r. de la Cossonnerie, Paris
Freinix	157, r. de Sèvres, Paris.
Frêne Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Frialine Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
Fructia (Brides-les-Bains)	41, r. de Verneuil, Paris.
Fructines Vichy	49, av. Wagram, Paris.
Fucobiline Prothière	55, r. Auguste-Comte, Lyon.
Fucoglycine	11, r. Milton, Paris.
Fucosine Prothière	55, r. Auguste-Comte, Lyon.
Fucus Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Fumigator Gonin	60, r. Saussure, Paris.
Furonculase	94 boul. des Batignolles, Paris.

G

Gadéïnol	45, boul. Lefèbvre, Paris.
Gadilène Vasseur	114, r. Faidherbe, Boulogne-s.-M.).
Gadiodine Labesse	36, r. des Lices, Angers.
Gadoferrol	93, r. Nollet, Paris.
*Gaduamine	RENARD, 142, av. de Clichy, Paris.
*Gaduase	Labor. SERVIER, à Orléans.
Gaïacalcine Latour	17, pl. des Vosges, Paris.
Gaïacol phosphaté Pautauberge	165, r. Saint-Denis, Courbevoie.
Gaïacophosphal Clin	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Gaïarsénan Ducatte	191, r. Saint-Honoré, Paris.
Gaïarsol Bouty	3 *bis*, rue de Dunkerque Paris
*Galabactéine	154 *bis*, r. Breteuil, Marseille.
Galactina	68, r. Phalsbourg, Le Havre.
Galactogènes Jolivet	140, faub. St-Honoré, Paris.
*Galactogil	Progil, 6, boul. Strasbourg, Paris.
*Galform	3, r. d'Edimbourg, Paris.
*Galyl Naline	à Villeneuve-la-Garenne.
*Gambéol	24, r. de Ponthieu, Paris.
Gangliosane	2, allées Spach, Strasbourg.
*Gardenal	Etab. POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Gastérine Frémont	à Vichy (Allier).
*Gastricine du Dr Dubourcau	10, r. de Turenne, Paris.
*Gastrocalcine	17, r. Cadet, Paris.
*Gastrocaol	à Vendôme (Loir-et-Cher)
*Gastropeptyl	40, r. des Accacias, Paris.
Gastroplasme	MILLET, à Rambouillet.
*Gastro-Sodine	21, r. Violet, Paris.
*Gastrotherib	LA BIOTHÉRAPIE, 3, rue Maublanc, Paris.
Gastrozymase Bouty	3 *bis*, r. de Dunkerque, Paris.
*Gaurol	30, r. Armand-Sylvestre, Courbevoie.
Gayacolchine	40, r. Beinfaisance, Paris.
*Gaze Néolée	35, r. Pergolèse, Paris.
*Gelagar	Et. WOLLACKER & Cie, 31, r. St-Georges, Paris.
Gelée antidiarrhéique Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
Gélobarine	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
*Gélocalcine	121, av. de Saint-Ouen, Paris.

*Gélogastrine	LICARDY, Neully-s.-Seine.
*Géloïde Stalys du Dr Wagon	Etablis. SIDÉPAL, 64, r. de la Boétie, Paris.
*Gélo-Pansement Byla	26, av. Observatoire, Paris.
*Gélor	63, r. Faisanderie, Paris.
*Gélotanin	Labor. CHOAY, 48, r. Théophile-Gautier, Paris.
*Gélotube 29	49, r. de Bitche, Courbevoie (Seine).
*Gelsémium Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
*Génatropine	4, pl. des Vosges, Paris.
*Génésérine	Labor. AMIDO, 4, pl. des Vosges, Paris.
Genêt Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
*Genhyoscyamine	4, pl. des Vosges, Paris.
Génolactine	3, boul. Courcelles Paris.
*Génoscopolamine	4, pl. des Vosges, Paris.
*Génostrychnine	id.
Géodyl	J. ROBERT, 39, r. de Bourgogne, Paris.
Geraseptol	12, r. Vavin, Paris.
Germocalcine	29, r. de Metz, Toulouse.
*Germose	7, r. d'Hauteville, Paris.
Germyl	9, r. Petitot, Dijon.
Givrinol	14, r. d'Auge, Caen.
*Glaxo	11, r. Bergère, Paris.
*Globugénol	à Fesches-le-Chatel (Doubs).
Globules Hébert	à Saint-Lô (Manche).
*Globules Fumouze	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Globules Laincar	LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris.
Globules Romon	MONAL & Cie, 6 r. Bridaine, Paris.
Globules Secrétan	22 *bis*, r. de Silly, Boul.-s.-S.
*Gloma (Voir : Malt Wander)	58, r. de Charonne, Paris.
*Glottyl	85 *bis*, r. du Ranelagh, Paris.
*Glutéokina	3, r. de Vouillé, Paris.
*Glycérophosphate Dalloz	13, boul. de la Chapelle, Paris.
Glycérométylarsénié	6, r. Dombasle, Paris.
Glycérophosphates effervescents	LE PERDRIEL, 11, r. Milton, Paris.
Glycérophosphates Freyssinge	6, r. Abel, Paris.
Glycérophosphates Jacquemaire	à Villefranche (Rhône).
*Glycérophosphate Robin	13, r. de Poissy, Paris.
Glycobyl	4, pl. des Vosges, Paris.
*Glycocarpine	DALIN, 49, quai Saint-Vincent. Lyon.

Glycogène Clin	20, r. des Fossés-Saint-Jacques. Paris.
*Glycojasol	19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
*Glyco-lactimase Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
Glyco - phénique Dr Déclat	6, r. de la Tacherie, Paris.
Glycophosphates granulés Astier	45, r. Docteur-Blanche, Paris.
Glyco-Phytol	3, r. Chanez, Paris.
Glyco-Thymosine	3, av. Lowendal, Paris.
*Glyctone phosphatée Charrière	Arquevaux, à Etampes (Seine-t-Oise).
*Glykoaline Robin	13, r. de Poissy, Paris.
*Glyphospher	6, ch. Combe-Blanche, Lyon.
Glyphospher	GIVANDEAU, LAVIROTTE & Cie, Lyon.
Glyphospho	52, r. Aubuisson, Toulouse.
*Gmet (Produits)	27, faub Montmartre, Paris.
*Gobérol	CHARMAISON, Clermont-Ferrand.
*Goménol	17, r. Ambr.-Thomas, Paris.
Gonacrine	Etablis. POULENC 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Gonéine (Capsules)	A. GUILLAUMIN, 13, r. Cherche-Midi, Paris.
*Gosiérine Dalloz	13, b. la Chapelle, Paris.
Goudron Freyssinge	6, r. Abel, Paris.
Gouttes amères de Baumé	Dr GIGON, 7, r. Coq-Héron, Paris.
*Gouttes Antispasmodiques Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
*Gouttes Arsénosténiques Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
Gouttes Esurine	Dr R. Petit, Angoulême.
*Gouttes Fluxines	BONTHOUX, à Villefranche.
Gouttes iodopeptiques Narud	38, r. N.-D.-Nazareth, Paris.
*Gouttes livoniennes	15, r. Immeubles-Industriel, Paris.
Gouttes Lo-Lo Tséisberg	F. BOUVIER, Le Chesnay (Seine-et-Oise).
Gouttes du Dr Ludlam	17, r. Cadet, Paris.
*Gouttes Nican	CANTIN, à Palaiseau (Seine-et-Oise).
*Gouttes Païdophiles du Dr Guiraud	60, cours d'Aquitaine, Bordeaux
*Gouttes Phosphosténiques Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
*Gouttes Pilka	Lab. ZYMA, 4, r. Bellart, Paris.
Gouttes Sap	83, r. des Martyrs, Paris.

*Gouttes Scandinaves	Dr H. PHILLIPE, 14, r. du Palais-Grillet, Lyon.
*Gouttes de Séru	69, r. de Sèvres, Paris.
*Grains céphalgifuges	Lab. L. M. D., 12, r. d'Agues-seau, Paris.
Grains d'Evian	PERROCHON, à Tours.
Grains Miraton	19, r. Alain-Chartier, Paris.
Grains de santé du Dr Franck	59, r. Nollet, Paris.
*Grains de Vals	11, r. Joseph-Bara, Paris.
Gramalt	CHASSAIGNE, à Ruffec (Charente-Inférieure).
*Granions de Fouard	61, r. Gaston-Laurian Montreuil (Seine).
Granulé Bravais	3, r. Mogador, Paris.
Granulé calmafrenkel	LEMATTE, 52, rue La Bruyère, Paris.
*Granulé Caresmel	5-7, r. Hen.-Gréville, Angers.
Granulé du Dr Mous-saud	H. RIVIER, 6, r. Saint-Claude, Paris.
Granulé Girard	48, r. d'Alésia, Paris.
*Granules Chanteaud	(Voir : Produits Chanteaud).
Granules Crosnier	6, r. Chanoinesse, Paris.
*Granules de Pantofort du Dr Boveil	1, r. Lassalle, à Lyon.
Granules du Dr Papil-laud	GIGON, 7, r. Coq-Héron, Paris.
Granules Homolle & Quévenne	14, r. des Beaux-Arts, Paris.
*Granulé pulmonaire Giry	49, r. de Metz, Nancy.
Granulé dépuratif Künckel	3, r. Watteau, Courbevoie.
Granulé Tinardon	17, r. Cadet, Paris.
Granules Houdé	9, r. Dieu, Paris.
Granules des Vosges	21, boul. Haussmann, Paris.
*Grassyl	Etablis. BUISSON, 157, r. de Sèvres Paris
*Grippol	INSTITUT DE MICRO-BIOLOGIE, Sarrebrück.
*Gui Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Gui Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
*Guipsine Leprince	62, r. de la Tour Paris.
*Guitose	F. CARTIER, 1, r. de la Martinière, Lyon.
Gynalcéol	17, r. Cadet, Paris.
*Gynergène	Etablis. SANDOZ. 5, r. de Metz, Paris.
*Gynocalcion	Lab. CORTIAL, 15, boul. Pasteur., Paris.
*Gynopausine	2, r. Nve-Popincourt, Paris.
Gynophiline	Douard, Uzel (C.-d.-N.).

H

Hamamélidine	LOGEAIS, à Boulogne.
***Hamaméline Roya**	41, r. de Rome, Paris.
***Hamaméliode**	17, r. Cadet, Paris.
Hamamélis Dausse	4, r. Aubriot, Paris.
Hamamélis Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
***Hamamélis Grandval**	12 et 14, r. Féry, Reims.
***Hectargyre Naline**	à Villeneuve-la-Garenne.
***Hectine Naline**	id.
Héléнine du Dr Korab	12, r. de l'Isly, Paris.
***Hélital**	15, pl. Nationale, Dieppe.
Helmazil	7, av. Marceau, Paris.
Hémabéol	72, av. Kléber, Paris.
***Hémagène Tailleur**	SÉVENET, 10, r. Le Chapelais, Paris.
***Hémagénine Giraud**	pl. de l'Eglise, Argenteuil.
Hémarsyl du Dr Roux	CAILLAU, à Argentat (Corrèze).
Hématéol	81, r. Le Corrège, Bruxelles.
Hématogénol	37, r. Galilée, Paris.
***Hémoantitoxine**	F. CARTIER, 1, r. de la Martinière, Lyon.
***Hémo - Cyto Sérum Corbière**	Labor. CORBIÈRE, 27, r. Desrenaudes, Paris.
Hémocléine Lafay	54, ch. d'Antin, Paris.
***Hémodrome**	LANCOSME, 71, av. Victor-Emmanuel III, Paris.
***Hémoductyl**	LICARDY, 38, boul. Bourdon, Paris-Neuilly.
***Hémofixine**	4, r. Beaurepaire, Paris.
Hémogénase	à Courpière (Puy-de-Dôme).
***Hémogénol Dausse**	4 r. Aubriot, Paris (IVe).
Hémoglobine Bovel	101, av. Mozart, Paris.
***Hémoglobine Deschiens**	9, r. Paul-Baudry, Paris (VIIIe).
***Hemoluol**	14, r. Cantin, Courbevoie.
***Hémopausine**	16, r. du Petit-Musc, Paris.
***Hémopectal**	A. FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.
***Hémo-Phagostyl**	A. PARIS, 4, r. La Motte-Piquet, Paris.
Hémopoïne	Dr SCHOLL, à Gembloux, Belgique.
Hémorroïdine	1, r. Alexandre-III, Dunkerque.
***Hémostyl Dr Roussel**	97 r. de Vaugirard Paris
Hémotonine	157, r. de Sèvres, Paris.
Hémoveine	BRICHARD, à Bar-le-Duc.
Hémozol	12, boul. Saint-Martin, Paris.

*Hemypnal	1, pl. Morand, Lyon.
*Hépacoline	25, r. Petits-Hôtels, Paris.
Hépatine Bouty	3 *bis* r. Dunkerque. Paris.
*Hépato-Byl	8, r. de la Source, Paris.
Hépato-Sérine	22, r. Guillaume-le-Conquérant, Caen.
*Hépatosodine	DURET & RÉMY, Asnières (Seine).
Hépatotanic	14, r. de Clichy, Paris.
*Héracléol	Lab. des Etabl. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
*Hergénol	Gros, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
Hermophényl	9, cours de la Liberté, Lyon.
Héroïne Vicario	11, boul. Haussmann, Paris.
Hétérolysine	OLIVIERO, 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.
*Héxachol	9, pl. de la Paix, Mulhouse.
Hexaformine	123, pl. Beauvoisine, Rouen.
*Hexotal	18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
Hippo-Carnis	MORAND, à Auray (Morbihan).
Hippoplasine du Dr Gran	BYLA, 26, av. de l'Observatoire, Paris.
*Hipposarcine Roy	56, ch. Combe-Blanche, Lyon
*Histogénol Naline	à Villeneuve-la-Garenne.
*Hojasol	19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
*Holos Deschiens	9, r. Paul-Baudry, Paris.
*Holovarine	48, r. de la Procession, Paris.
Holuryl	A. FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.
*Hopogan	12, r. Lamartine, Paris.
Hordéomaltine	10, r. Richelieu, Paris.
Hordose	31, r. des Pierres, Bruges (Belgique).
*Hormobiline	17 *bis*, av. Parmentier, Paris.
*Hormolaxine	13, r. Pavée, Paris.
*Hormovarine Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Hordénine Lauth	9, r. du 4-Septembre, Paris.
Huilaxine Gillot	59, r. de Châteaudun, Paris.
Huile Boris	14, r. de Birague, Paris.
*Huiles Cholestérinées Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
*Huile Crolas	56 ch. Combe-Blanche Lyon.
*Huile Gallina	4, r. Candolle, Paris.
Huile F. M. Hegg	13, r. Paul-Baudry, Paris.
Huile grise Duret	12, r. de Nice, Paris.
*Huile grise Hercé	37, r. de Bourgogne, Paris.
Huile grise stérilisée	VIGIER, 12, boul. Bonne-Nouvelle, Paris.
*Hyctal	DURET & RÉMY, Asnières (Seine).

*Hydralin	25, r. Drouot, Paris.
Hydrariode	à La Ferté-Macé (Orne).
Hydrastis Dausse	4, r. Aubriot, Paris.
Hydrastis Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
*Hydrastol	222, fg St-Martin, Paris.
*Hyoscyamine Houdé	9, r. Dieu, Paris.
Hypercitol	MATRAY, à Aubières (P.-de-D.).
Hypergal Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
Hypnase Vergelot	163, r. de Flandre, Paris.
Hypneural Cos	99, r. d'Aboukir. Paris.
*Hypochlorine	l'Antiseptique, 48, r. de Londres, Paris.
*Hypochloryl	7 *bis*, r. de Musset, Paris.
*Hypodermozone	56, boul. Péreire, Paris.
Hypophos Hurbourgne	à Mont meyan (Drôme).
Hypophosphites Churchill	12, r. Castiglione, Paris.
Hypophosphites Fellows	5, r. de la Paix, Paris.
Hypophyse - Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.

I. A. M.	Dr LAVOUÉ, à Rennes (Ile-et-Vilaine).
Ibogaïne Nyrdhal	20, La-Rochefoucauld Paris.
*Ioglandol Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Imido Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Immunase	Lab. Elan, 13, av. Italie, Paris.
*Immunizols Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
*Immuno-Antivirus	68, r. Berkendæl, Bruxelles.
*Immuno-Vaccins	68, r. Berkendæl, Bruxelles.
*Indhaméline	LEJEUNE, 12, r. Emile-Castelar, Paris.
Indine	DABAT, à Pau (Bas.-Pyr.).
Injection Clin Strychno Phospharsinée	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
*Inhalateur Hojasol	19, r. Ferdin.-Duval, Paris.
*Inhalateur et Inhalations	Labor. INHAL, à Condé-sur-Escaut (Nord).
*Inhalation Lancosme	71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
*Inhalène	à Berson (Gironde).
Inhalex	37, r. Galilée, Paris.
Inhalo-Bol	P. TAVERNIER, 32, r. de l'Ouest, Paris.

*Inhalol	62, r. d'Antibes, Cannes (Alpes-Maritimes).
*Inhalone	CH. DEHAY, à Arras.
*Inhalo-Sel	P. TAVERNIER, 32, r. de l'Ouest, Paris.
*Inolène	2, r. Nve-Popincourt, Paris.
*Inotyol	Dr DEBAT, 60, r. de Prony, Paris.
Inoxine	22, av. Opéra, Paris.
*Insulanol du Dr Roussel	97, r. de Vaugirard, Paris.
*Insuline Byla	26, av. Observatoire, Paris.
*Insuline buccale Fornet	INSTITUT DE MICROBIOLOGIE, Sarrebruck.
*Insuline Phyloze (Poudre et pommade)	48, r. de la Procession, Paris.
*Insulase Rogier	56, boul. Péreire, Paris.
*Insulyl Roussel	97, r. de Vaugirard, Paris.
*Intraits Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
*Inhaloxyl	4, ch. de la Muette, Paris.
*Ioda	63, r. de la Faisanderie,
Iodalbin Adrian	9, r. de la Perle, Paris.
Iodalia	12, r. Vavin, Paris.
*Iodalose Galbrun	8, r. du Petit-Musc, Paris.
*Iodamelis Logeais	24,r. Silly, Boulogne-s.-Seine.
Iodargol Viel	7, r. Saint-Yves, Rennes.
*Iodarsenic Guiraud	98, r. Saint-Genès, Bordeaux.
*Iodaselle Delamarre	49 r. Thiers, Boulogne-s.-Mer.
*Iodaseptine Cortial	15, bd Pasteur, Paris.
Iode Aucher	La Ferté-Macé (Orne).
*Iodéine Montagu	49, boul. Port-Royal, Paris.
Iodel	COUDERT, 116, av. Ledru-Rollin, Paris (XIIe).
*Iodentérol	4, r. Candolle, Paris.
Iode Oberlin	17, r. Cadet, Paris.
*Iode Organique Boissy	49, r. Hoche, Courbevoie.
Iodéol Viel	7, r. Saint-Yves, Rennes.
Iodéyl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
*Iodex	46, r. Claude-Lorrain, Lille.
*Iodhéma	4, r. Candolle, Paris.
Iodhyrine du Dr Deschamps	49, av. Lamotte-Picquet, Paris.
Iodine Médol	5, r. Clauzel, Paris (IXe).
*Iodo-Bismuth Ercé	39, r. de Bourgogne, Paris.
*Iodo-Bismuthate de Quinine	FRAISSE, 8, r. Jasmin, Paris.
Iodocéréol Dalloz	13, bd de la Chapelle, Paris.
Iodocol Carrion	54, faub. St-Honoré, Paris.
Iodogalle Vial	4, pl. Croix-Rousse, Lyon.
Iodogéline	CROZET, à Cannes (A.-M).
Iodo-Juglan	Morand, à Auray (Morbihan)
*Iodogénol Pépin	a Courbevoie (Seine).
*Iodo-Maïsine	6, r. Rosenwald, Paris.

*Iodométine Hautdidier	37, r. Galilée, Paris.
*Iodone Robin	13, r. de Poissy, Paris.
Iodonion	9, r. Victor-Letalle, Paris.
*Iodonucléol	14, r. de Birague, Paris.
Iodoplasme	85, rue des Morillons, Paris.
*Iodostarine Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Iodo-Théine Henry	39, r. Sclessin, Liége.
*Iodo-Thyroïdine Catillon	3, boul. Saint-Martin, Paris.
Iodo-Trypsine	11, r. Torricelli, Paris.
*Iodoveine Leduc	JAUME, à Tamaris (Gard).
*Iodurase	18, av. Hoche, Paris.
Iodures Cros	12, r. de Nice, Paris.
Iodures Foucher	142, boul. St-Germain, Paris.
Iodures Laroze	2, r. des Lions, Paris.
*Iodures Pachaut	130, bd Haussmann, Paris.
*Iodure Philippe	14, r. Palais-Grillet, Lyon.
Iodures Souffron	157, r. de Sèvres, Paris.
Iolase Corbière	27, r. Desrenaudes, Paris.
Ionodoses Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Ionoïdes	13, r. Pavée, Paris.
*Ipéca digitale Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IV[e]).
Irol Churchill	12, r. Castiglione, Paris.
*Isacène Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Isobromyl	COMAR & C[ie], 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
*Isotonyl (Poudre de Lausanne)	87, r. Lafayette, Paris.
*Ixium	Etablis. BUISSON, 157, r. de Sèvres, Paris.
*Ixogyne	12, r. des Apennins, Paris.

J

*Jécol	3, r. Watteau, Courbevoie.
Jecorsan Fornet	Inst. de Microbiologie, à Sarrebrück.
*Jemalt Wander	58, r. de Charonne, Paris.
Jicémine	304, r. Saint-Jacques, Paris.
Jovine Brisson	114, av. Michelet, St-Ouen.
Jugland Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Juglandine Ferrouillat	33, r. Daguerre, Paris.
*Juglane	à Chambéry (Savoie).
Juglanrégine André	2, r. des Alpes, à Valence.
Jus de raisins Challand	Nuits-St-Georges (C.-d'Or).
*Jus de raisins Pampryl	2, villa de la Terrasse, Paris.
Juvéol	17, r. Cadet, Paris.

K

Kalmine	METADIER, à Tours.
***Kacbrol**	54, r. Paris, Charenton (S.).
***Kaolinase**	20, faub. Poissonnière, Paris.
Kéfir Carrion	54, fg. Saint-Honoré, Paris.
Kélène	21, r. Jean-Goujon, Paris
Képhaline Brunot	10, pl. Thiers, Le Mans.
Képhir Salmon	28, r. de Trévise, Paris.
***Kerlactine**	71, av. de Saxe, Lyon.
***Kerlol Lerck**	à Saint-Etienne.
***Kidoline**	GALLIER, 38, boul. Montparnasse, Paris.
***Kina Elzevir**	Lab. des Etabl. SALLE, 4, r. Elzévir, Paris.
***Kinectine**	12, r. du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne.
Kineurine Moncour	49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
***Kipsol**	64 r La-Rochefoucauld Paris.
***Kluchol Remeaud**	38, r. J.-B. Clément, Boulogne-sur-Seine).
Kola-fer Trouette	15, r. Immeubles-Industriels
***Kola granulé Astier**	45, r. du Dr-Blanche, Paris.
Kola granulée Roy	81, boul. Suchet, Paris.
Kola Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Kola Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Kola Monavon	à Sainte-Foye, près Lyon.
Kola Pichat	5, cours Charlemagne, Lyon.
***Kolarsine Pautauberge**	10, r. Constantinople, Paris.
Krèazone	TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
***Kydalose**	DALIN, 49, quai Saint-Vincent, Lyon.
***Kymosine Rogier**	56, boul. Péreire, Paris.

L

***Lab-Lacto-Ferment**	MIALHE, 8, r. Favart, Paris
Laccodermes Brisson	114, av. Michelet, St-Ouen.
***Lachésine**	RENAUD, 2, r. Demours, Paris.
Lactagol Pearson	43, r. Pinel, Saint-Denis.
Lactate d'Hg (Voir : comprimés Roy)	
Lactéol Boucard	30, r. Singer, Paris.
Lactifère	3, r. Capitaine-Scott, Paris.
Lactigélose	DUCLOY, Arques (P.-de-C.)
***Lactimase Couturieux**	18, av. Hoche, Paris

Lactobacilline	13, r. Pavée, Paris.
*Lactobyl	11, r. Torricelli, Paris.
*Lactochol	id.
Lacto-Diastal	7, av. Marceau, Paris.
*Lactolaxine Fydau	4, r. Lamotte-Piquet, Paris.
*Lacto Mannitase	37, r. de Tivoli, Bordeaux.
Lactomorrhuol	DELPECH, 5, r. Danton, Paris.
Lactophosphine	8, r. de la Pompe, Paris.
Lactosone	17, r. Cadet, Paris.
Lactozymase B.	52, r. La Bruyère, Paris.
Lait albumineux Mollard	25, cours Lafayette, Lyon.
Lait Gallia	11, r. de Prony, Paris.
*Lait Glaxo	11, r. Bergère, Paris.
Lait Gloria	19, boul. Malesherbes, Paris.
Lait Guigoz	14, r. J.-J.-Rousseau, Paris.
*Lait de magnésie Phillips	62, Champs-Elysées, Paris.
*Lait sec Dryco	3, r. Saint-Roch, Paris.
Lait sec Nutricia	65, bd Sébastopol, Paris.
Laminiode	12, r. Fraternité, St-Mandé.
*Lansoyl	5, r. de la Paix, Paris.
*Lantol Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
Larosan Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
*Laurénol	19, r. Drouot, Paris.
Laxagarine	5, av. des Tilleuls, Paris.
*Laxamalt	LICARDY, Paris-Neuilly.
*Laxamer Lefèvre	52, r. Decamps, Paris.
Laxatif Châtel-Guyen Gubler	70, r. Legendre, Paris.
*Laxatifs Miraton	6, r. Rosenwald, Paris.
Laxatone Déjardin	109, bd Haussmann, Paris.
*Laxa Dannec'h	64, r. des Tournelles, Paris.
Laxoïl	12, r. Beautreillis, Paris.
Laxoléine	MILLET, à Rambouillet.
Laxol Fraudin	4,av. Desfeux, Boulogne-s.-S.
Laxo-lin	182, av. de Versailles, Paris.
Laxolip Henry	39, r. Sclessin, Liége.
Laxopeptine Girard	48, r. d'Alésia, Paris.
Laxophore Brachin	à Joinville (Haute-Marne).
Lebnol Thévenot	à Dijon.
Lécithine Adrian	9, r. de la Perle, Paris.
Lécithine Clin	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Lécithine Vial	8, r. Vivienne, Paris.
Lécithosine Robin	13, r. de Poissy, Paris.
Lenicads Brisson	114, av. Michelet, St-Ouen.
*Lénicure-Vichy	94, bd des Batignolles, Paris.
*Léniforme	26, r. Pétrelle, Paris.
Leptandrine Royer	225, r. Saint-Martin, Paris.
Leucagine	22, r. de la Sorbonne, Paris.

Leucobules Gallier	38, bd Montparnasse, Paris.
Levulose Rogier	56, boul. Péreire. Paris.
*Levure B. 17	CHANTEREAU, 8, r. Constantinople, Paris.
Levure Coirre	79, r. du Cherche-Midi, Paris
Levure Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
*Lecure fraiche Myceta	4, r. Bellart, Paris.
*Levurine extractive Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
Levuritin	FEIGEL, à Lutterbach (Haut-Rhin).
Licardet Brisson	114, av. Michelet, St-Ouen.
Lientine Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
*Limol Churchill	12, r. Castiglione. Paris.
Lipasonol	30, r. N.-D.-des-Victoires, Paris.
*Lipocérébrine Lematte et Boinot	52, r. Labruyère, Paris (IX^e).
Lipiodol Lafay	54, ch. d'Antin, Paris.
Lipobil	29, pl. Wilson, à Denain.
Lipochol Byla	26, av. Observatoir , Paris.
Lipocytol Grémy	14, r. de Clichy, Paris
*Lipodeterpénol Zyma	4, r. Bellart, Paris.
*Lipogazes dermatologiques	LECOQ & FERRAND, 14, r. Gravel. Levallois.
*Lipoféine	1, pl. Morand, Lyon.
*Lipogyre Ciba	id.
*Lipoïdes Iscovesco	107, r. des Dames, Paris.
*Lipoïdine Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
Liporhine	JOSSE, pl. Wilson, Denain.
Lipol	10, r. des Fleurs, Ronchin (Nord).
*Lipospléninedu Dr Groc	16, r. Saint-Gilles, Paris.
*Lipo-Vaccins	32, r. de Vouillé, Paris.
Liqueur d'Hermès	12, boul. Saint-Martin, Paris
Liqueur Laprade	49, r. de Maubeuge, Paris.
Liqueur Laville	20, r. Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Liqueur peptophosphorique	ADRIAN, 9, r. de la Perle, Paris.
Liqueur à la Thyroïdine Bouty	3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
Liqueur végétale Narud	38, r. N.-D.-Nazareth, Paris.
Liseronine	19, r. Drouot, Paris.
*Listose Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Litharsyne Ferré	142, bd St-Germain Paris.
Lithine effervescente	LE PERDRIEL, 11 ,r. Milton, Paris.
*Lobuline	37, r. de Bourgogne, Paris.
Lodolan	52, r. d'Aubuisson, Toulouse.
Loraga	70, r. Strasbourg, Vincennes.

Luargol	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Luatine	2, av. Parmentier, Paris.
Lual	VAURS, 72, av. Kléber Paris.
Luarsyl	id.
Luatol	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
***Ludin**	REY, 12, r. Montmartre, Dijon.
***Lusoforme**	15, r. d'Argenteuil, Paris.
Lutéovar	à Ermont (Seine-et-Oise).
Lycétol Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Lyciflore	HOURTOULLE, 11, r. des 2-Ponts, Paris (IV[e]).
Lyméogène	26, r. Cambon, Paris.
Lymphactol	4 *bis*, r. de Lyon, Paris.
***Lysats-Vaccins** (Voir Vaclydun)	
Lysol	65, r. Parmentier, Ivry (Seine).

M

***Magnésie Durel**	7, boul. Denain, Paris.
***Magnésie Ecba**	105, boul. Malesherbes, Paris.
Magnésie Roy	81, boul. Suchet, Paris.
Magol Churchill	12, r. Castiglione, Paris.
***Malarsan**	P. AUBRY, 54, r. de la Bienfaisance, Paris.
***Maltase Fanta**	6, r. Guyot, Paris.
***Malt Barley**	id.
Malt Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris.
Maltine Gerbay	à Roanne (Loire).
Malt Moritz	189, r. de Vaugirard, Paris.
Malt Régina	34, r. Pajol, Paris.
Malt Strauss	12, r. Broca, Paris.
***Malt Wander**	58, r. de Charonne, Paris.
***Maltea Moser**	8, ch. de Montbrillant, Lyon.
Maltine-Phénix	14, r. de Birague, Paris.
***Maltosan**	58, r. de Charonne, Paris.
***Malt Paillete Progil**	6, boul. de Strasbourg, Paris.
Mamelle Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Mandragol	GAILLON, 113, bd Voltaire, Paris.
***Mangaïne**	71, r. Sainte-Anne, Paris.
***Manganésia**	Produits Dannec'h, 64, r. des Tournelles, Paris.
Mangano-Calcique	à Saint-Amand-Montrond.
***Mangano Phosphal Julien**	105, r. de Rennes, Paris.

Manganoxyl	23, av. Motte-Picquet, Paris.
*Marinol (Labor. du)	à Dieppe (Seine-Inférieure).
Mariode	COURRET, 75, r. St-Dominique, Paris.
Marron d'Inde Dausse	4, r. Aubriot, Paris.
Marronine Huard	3, av. Orléans, Paris.
*Marrubiase	COMTE, 60, r. St-Guilhem, Montpellier.
Marsyle Clin	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Mas de la Ville	Arles-sur-Rhône.
*Maté Douglas	62, Champs-Élysées, Paris.
Maya Bulgare	322, r. Saint-Honoré, Paris.
Médicament de Saint-Boes	par Orthez (Basses-Pyrénées).
Medicoferments	10, r. de la Viotte, Besançon.
*Menopausine	9, pl. de la Paix, Mulhouse.
*Menosedine	Demasles, à Vienne (Isère).
*Ménovarine	58, r. de Clignancourt, Paris.
Mensuosedyl	DEGAIL, Mareuil-s.-Belle, (Dordogne).
Mentholina	GUIGNIER, Bois-Colombes.
Mercuriaux Vigier	12 b. Bonne-Nouvelle Paris.
Mésoforme	17 *bis*, av. Parmentier, Paris.
*Mésothorium Buisson	157, r. de Sèvres, Paris.
Méroléol Salle	4, r. Elzévir, Paris.
Mesarca Roche	21, boul. des Vosges, Paris.
Métacuprol	150, r. de la Pompe, Paris.
*Métarsenobenzol Saca	11, r. Beautrellis, Paris.
Métharfer Bouty	3 *bis*, r. de Dunkerque, Paris.
Métharsinate Clin	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Métharsol Bouty	3 *bis*, r. de Dunkerque, Paris.
Méthylarsinate Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Méthylarsinate Vigier	12 b. Bonne-Nouvelle Paris.
Métricine	GIRARDEL, à Asnières.
*Metritols	LEES, 124, r. du Bac, Paris.
*Mialbaïne	8, r. Favart, Paris.
Miceliode	2, sq. Desnouettes. Paris.
*Micelliode	Lab. L. M. D., 12, r. d'Agueseau. Paris.
Micranyl	GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
*Mictasol	28, r. du Four, Paris.
Migrainol	16, cours Gambetta, Lyon.
Minéraline du Dr Baud	14, r. de Birague, Paris.
Minéralogène	4, pl. Croix-Rouge, Lyon.
Minérol	10, r. Richelieu, Paris
Minérolaxine Le Tanneur	6, r. de Laborde, Paris.
*Mitigans Roxelane	38 *bis*, r. Raphaël, Vanves.
Mokavène	16, r. de Rocroy, Paris.
Mondorasme	95, r. de Turenne, Paris.

*Moréthyl Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
*Morrhualène Gautier	17 *bis*, av. Parmentier, Paris.
*Morrhuétine Jungken	105, r. de Normandie, Courbevoie (Seine).
*Morrhuine Puy	à Grenoble.
*Morrhuol Chapoteaud	VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
*Morrhuxine	163, r. de Flandre, Paris.
*Morubiase Crosnier	6, r. Chanoinesse, Paris.
Morubiline	32, r. Joubert, Paris.
Morucalcium	23, av. Motte-Picquet, Paris.
Moruphylle	BOST, Villefranche (Rhône).
*Moruxase Abadie	3, pl. St-Michel, Toulouse.
Mouches Albespeyres	78, faug. Saint-Denis, Paris.
Mucilose	MILLET, à Rambouillet.
*Mucinum	CHANTEREAU, 8, r. de Constantinople, Paris.
Mucogène Astier	45, r. Docteur-Blanche Paris.
*Mucosodine	25, r. Drouot, Paris.
Muqueuse Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Musculargyre	FEIGNOUX, Montreuil (S.)
Musculogenol	62, r. V.-Hugo, Houplines (Nord).
*Musculosine Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Mustérole	5 *bis*, r. des Haudriettes, Paris.
Mutandine	GREMY, 14, r. de Clichy, Paris
Muxol	Lab. SERVIER, à Orléans.
*Muthanol	55, boul. Strasbourg, Paris.
Mycodermine	109, boul. Haussmann, Paris.
*Mycelysine Doyen	5, r. Bourg-Abbé, Paris.
Mycicol Badel	à Valence-sur-Rhône.
Myo-Serum	168, b. St-Germain, Paris.
Myrtanol	30, r. N.-D.-des-Victoires, Paris.
*Myrtilline Demasle	à Vienne (Isère).

N

*Naïodine Logeais	22 *bis*, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine.
Narcotile Benguê	47, r. Blanche, Paris.
*Narcyl Grémy	34, r. Sedaine, Paris.
Narsénol	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Nasale Ymera	28, r. de Seine, Paris.
Nasocaïne	Lab. ANIMAT, Nîmes (Gard).
*Natibaïne	49, boul. Port-Royal, Paris.
Natrosyl	18, r. Pierre-Curie, Paris.

Nazilante	ANIMAT, Nîmes (Gard).
*Nazophyl Darva	19, b. Bonne-Nouvelle, Paris.
Néo-Arsycodile	62, r. de la Tour, Paris.
Néo-Asclérol	45, r. Caumartin, Paris.
Néoarsite	286, faub. Bannier, Orléans.
Néofilhos Le Perdriel	11, r. Milton, Paris.
*Néo-Calciline	21, r. Violet, Paris.
*Néo-Collargol	16, r. du Petit-Musc, Paris.
*Néciacol	105, bd Malesherbes, Paris.
Néo-Iodure Ménard	3, r. République, Lyon.
Néo-Kola Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
*Néol Bottu	35, r. Pergolèse, Paris.
*Néo-Laxatif Chapotot	56, boul. Ornano, Paris.
*Néolides H. B.	35, r. Pergolèse, Paris.
*Néolyse	155, av. Victor-Hugo, Paris.
*Néo-Mésarca Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
*Néo-Pancarpine	5, r. François-Ponsard, Paris.
*Néo-Phanol	9, pl. de la Paix, Mulhouse.
*Neoplalysines	49, r. de Paradis, Paris.
Néoquinine Falières	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
*Néo-Rhomnol	62, r. de la Tour, Paris.
Néo-Tréparsénan	COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
*Néo-Riodine Astier	45, r. Dr Blanche, Paris.
*Néothorium Millot	54, r. Bienfaisance, Paris.
Néo-Trépol	22, r. de la Sorbonne, Paris.
Néphrine Bouty	3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
Néphrine Byla	26, av. Observatoire, Paris.
*Nergine Heudebert	r. Saint-Germain, Nanterre.
*Nervocithine Tissot	34, boul. de Clichy, Paris.
*Neurène	8, r. de la Source, Paris.
*Neuréol	LAFARGE, 6, bd Arago, Paris.
Neurhémol Vinçon	à Auxerre (Yonne).
*Neurinase	2, r. du Débarcadère, Paris.
*Neurobore	23, r. des Moines, Paris.
Neurogaïacol Dethan	11, r. A.-de-Neuville, Paris.
Neuroiodure Dethan	id.
Neurolipase	23, r. d'Ouessant, Paris.
*Neuro-Moka	Lab. L. M. D., 42, r. d'Agues-seau, Paris.
*Neuro-Pax	Cie de GRAUWE, 16, r. de Rocroy, Paris.
*Neuroplasma	13, r. Lacharrière, Paris
*Neuroplasmine	id.
*Neurosine Prunier	6, r. de la Tacherie, Paris.
Neurosthyl	4, r., Lamotte-Picquet, Paris.
Neurotanic	GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
*Neurotrol Abadie	3, pl. St-Michel, Toulouse.
Neurotrope	MÉROBIAN, 37, r. Pajol, Paris.

*Neurotrophol Byla	26, av. Observatoire, Paris.
*Neurovarol Douetteau	20, faub. Saint-Honoré, Paris.
Neurovoïne	GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
Neutrol	AMICI, Saint-Sylvestre, Nice.
Neutrose Vichy	49, av. de Wagram, Paris
*Névoral	R. FEIGNOUX, 29, r. des Jardiniers, Montreuil (S.)
Névralgésine	DÉBORDES, à Moulins (Allier).
*Névralgol Brossard	1, r. Cordouans, La Rochelle.
Névraltéine Rogier	56, boul. Péreire, Paris.
Nevroserum	4, fg Stanislas, Nancy.
*Névrosol	12, r. des Apennins, Paris.
*Névrosthénine Freys-singe	6, r. Abel, Paris.
Nickobalt	156, r. de l'Université, Paris.
*Nigérine Vincent	14, av. Mac-Mahon, Paris.
Niketol	12, r. Paul-Baudry, Paris.
*Nisaméline	TROUETTE, 15, r. Immeubles-Industriels, Paris
*Nitium	BUISSON, 157, r. de Sèvres, Paris.
*Nitroyl Leysin	1 *bis*, r. Molitor, Paris.
*Nopirine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
*Normacol	41, r. de Rome, Paris.
Nortal Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Nosol Aguettant	36, q. Fulchiron, Lyon.
*Novargyre Guillaumin	13, r. Cherche-Midi, Paris.
Novarine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
*Novarsénobenzol Billon	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
*Novo-Brol	8, r. de la Source, Paris.
*Novo-Lactol	Et. DAGUIN, St-Maur (S.)
Novoseptine	57 *bis*, av. La-Motte-Picquet, Paris (XV^e^).
Nuclabia	Lab. chimie physiologique. 37, r. Tivoli, Bordeaux.
Nucléarène Cognet	43, r. de Saintonge, Paris.
*Nucléarrhol Gabriel	39, r. Sclessin, Liége (Belg.).
*Nucléarsitol Robin	13, r. de Poissy, Paris.
*Nucléatol Robin	id.
Nucléo-fer Girard	48, r. d'Alésia, Paris.
*Nuclhémose	RÉMY & LECOQ, 6, pl. Clichy, Paris
Nuclocithol	28, av. Grammont, Tours.
*Nujol	88 av Champs-Elysées, Paris.
Nurécase	GRANDVAL, à Reims.
Nutritine Déjardin	109, boul. Haussmann, Paris
*Nutrobiase	10, r. Cimarosa, Paris (XVI^e^).
*Nutromalt	58, r. de Charonne, Paris.
Nyctal	5, av. des Tilleuls, Paris.

O

Ocianine Chevretin	52, r. La Bruyère, Paris.
Ocréine Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
*Odarsol	COMAR & Cie, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
*Oléobiline	2, r. Maréchal-Pétain, Nice.
Oléo-Calcium	MAURES, à Port-de-Penne (Lot-et-Garonne).
*Oléocidase	6, r. Rosenwald, Paris.
*Oléojasol	19, r. Ferdinand-Duval, Paris.
*Oléolase Corbière	27, r. Desrenaudes, Paris.
Œna.e Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
*Œnophos	29, pl. Bossuet, Dijon.
Oléo-Bi-Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Oléo-Iode Dubois	35, r. Pergolèse, Paris.
Oléolaxine	5, av. des Tilleuls, Paris.
*Oléo-Mel	DELFOUR Pouilloi (Land.).
Oléo-Psyllium	Labor. ADLER, 36, r. Francs-Bourgeois, Paris.
*Olétyle Benzyle	122, faub. St-Honoré, Paris.
Olivéol Etiévant	BRUN, Demi-Lune, Lyon.
Onguent Ilon	31, r. Illzach, Mulhouse.
*Ophtalmine Leprince	62, r. de la Tour, Paris.
*Opocalcium	121, av. Gambetta, Paris.
Opochlorine	23, r. d'Ouessant, Paris.
Opogénines	40, r. Bellechasse, Paris.
Opoglandéol Fray	DURAND, Aigues-Mortes.
Opolaxyl Corbière	27, r. Desrenaudes, Paris.
*Oponuclyl Trouette-Perret	15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
*Opopeptol	105, boul. Malesherbes, Paris
*Oposynergines	24, r. Damesme, Paris.
*Opothérapie associée	Dr FRAYSSE, 47, r. de Neuilly, Nanterre (Seine).
*Opothérapie Bouty	3 *bis*, r. de Dunkerque, Paris.
*Opothérapie Byla	28, av. Observatoire, Paris.
Opothérapie Carrion	54, fb. Saint-Honoré, Paris.
Opothérapie Chaix	10, r. de l'Orne, Paris.
Opothérapie Chevretin	52, r. La Bruyère, Paris.
*Opothérapie Choay	48 r Théoph.-Gautier, Paris.
*Opothérapie Fournier	26, boul de l'Hôpital, Paris.
Opothérapie Fumouze	78, faub. Saint-Denis, Paris.
*Opothérapie Moncour	49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
Opothérapie "Le Pecq"	11, r. Beautreillis, Paris.
Opothérapie Richard	79, av. d'Orléans, Paris.
Opothérapie U. T. A.	P. THAVISSEN, 13, rue Sainte-Véronique, Liège.

*Opothérapiques Meurice	68, r. Berkendæl, Bruxelles.
*Opothérapiques Pélissier	33, av. de Villiers, Paris.
*Opotonine	20, r. des Martyrs, Paris.
*Opozone Lumière	9, cours Liberté, Lyon.
Opsine Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
*Orargol	Labor. AMICROS, 5, r. Clauzel, Paris.
Orchitine Byla	26, av. Observatoire, Paris.
*Orexyl	F. CARTIER, 1, r. de la Martinière, Lyon.
Orianol	GENTON, à Petit-Quévilly (Seine-Inférieure).
*Oriphol	8, r. Richer, Paris.
*Ortho-Gastrine	LEBLOND, 51, r. Gay-Lussac, Paris.
Osmoléine	26, r. des Moines, Paris.
*Osmo-Vaccins P. L.	Lab. BRÉANT, 4, r. de Clichy, Paris.
*Osteline	Labor. GLAXO, 11, r. Bergère, Paris.
Ostéo-hépatine	8, r. de la Source, Paris.
Ostréine Buisson	157, r. de Sèvres, Paris.
Ouabaïne Arnaud	49, Bd Port-Royal, Paris.
Ouabaïne Deglaude	6, r. d'Assas, Paris.
*Ouataplasme Langlebert	SABATIER, 10, r. Pierre-Ducreux, Paris.
Ovaire - Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Ovairine	62, r. Notre-Dame, Bordeaux.
Ovarigène Dismier	av. Alsace-Lorraine, Grenoble.
Ovarine Dubois	49 av Lamotte-Picquet Paris.
Ovarose	58, r. St-Placide, Paris.
Ovigénine Bouty	3 bis, r. de Dunkerque, Paris.
Ovo-lécithine Billon	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
*Ovomaltine	58, r. de Charonne, Paris.
Ovothyrol	8, r. de la Source, Paris.
Ovules Chaumel	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Ovules Derma	ROBIN, 13, r. de Poissy, Paris.
Ovules Magida	56, r. des Dames, Paris.
Ovules Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Oxycyanure d'hydrargyre	GUILLAUMIN, 168, boul. Saint-Germain, Paris.
*Oxydothyrine Pâris	4, r. Lamotte-Picquet, Paris
*Oxydovarine Pâris	id.
*Oxydrol	POINTET & GIRARD, 30, r. Francs-Bourgeois, Paris.

*Oxygénase	Dr CHAPELLE, 8, r. Vivienne, Paris.
Oxygénés du Dr Prim	27, r. Fourcroy, Paris.
Oxygénozone	11, r. Saint-Sabin, Paris.
Oxymenthol Perraudin	21, r. Chaptal, Paris.
*Oxymuth Saca	11, r. Beautreillis, Paris.
Oxynargyl	BESNARD, 56, r. des Dames, Paris.
Oxy-Thymoline	GODFRIN, à Nancy.
*Ozobiase	37, r. de Marly, à Rueil.
Ozol	à Avignon.

P

*Pain essentiel Heudebert	85, r. de Saint-Germain, Nanterre (Seine).
*Pains spéciaux Heudebert	id.
Pains de régime Milliat	319, av. Berthelot, Lyon.
*Pain Redeuil	7, r. Couche, Paris.
Pain de Santé Martin	à Montreuil-Belfroy, Maine-et-Loire).
Païphos	CABAILLÉ, Vernon (Eure).
Paludase Corbière	27, r. Desrenaudes, Paris.
*Panbiase antiphymique	VAURS, 72, av. Kléber, Paris.
*Panbiline	à Annonay (Ardèche).
Panbromine	17, r. Cadet, Paris.
*Pancréanne	108, fb. St-Honoré. Paris.
Pancréas - Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
*Pancrépatine Laleuf	20, r. du Laos, Paris.
Pandigitale Houdas	26, r. Saint-Claude, Paris.
*Panfébrine	17, av. Parmentier, Paris.
*Pangaduine	2, r. du Marché des Blancs-Manteaux, Paris.
*Pangastrol	STOULS, 156, av. Victor-Hugo, Paris.
*Pangestyl Narty	134, boul. Péreire, Paris.
*Panglandine Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
*Panhémol	90, av. des Ternes, Paris.
Panhistol	4 *bis*, r. de Lyon, Paris (XII^{e}).
*Panlacto-Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
*Panlax Allard	Labor. GMET, 27, faub. Montmartre, Paris (IX^{e}).
Panprocol	222, r. Duguesclin, Lyon.
*Pantofort du Dr Boveil (granules)	1, r. Lassalle, Lyon.

*Pantolaxine du Dr Boveil (cachets)	1, r. Lassalle, Lyon.
*Pantopon Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Panurol Tissot	34, boul. de Clichy, Paris.
Panvalerine Delattre	10, r. du Bac, Paris.
*Papaïne Trouette	15, r. Immeubles-Industriels Paris.
Papaverine	Dr BACONNET, 158, av. Suffren, Paris.
Papier Albespeyres	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Papier du Dr Balme	56, boul. Péreire, Paris.
*Papier Fayard	94, boul. Batignolles, Paris.
Papier Gicquel	BRUN & DUMÉE, 64, r. des Tournelles, Paris.
Papier iodogène Eymonnet	9, cours Liberté, Lyon.
Paracarbochloryl	76, r. Réaumur, Paris.
Paraffinoléol Hamel	17, r. de Berri, Paris.
Paragar	107, av. de la Reine, Boulogne-s.-S.
*Paralactine Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Paralaxol	à St-Germain-en-Laye.
Paralymphine	32, r. de Grenelle, Paris.
Paratétanine	17, r. Bourgelat, Lyon.
*Parathyrocalcine Moncour	49 av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
Parathyroïde-Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital Paris.
*Paratoxine Ducatte	191, r. Saint-Honoré, Paris.
*Paroxyl	THIRIET & Cie, 26 et 28, r. des Ponts, Nancy.
*Passiflorine	REAUBOURG, 1, r. Raynouard, Paris.
Pastilles Brachat	5, av. Victoria, Paris.
Pastilles Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Pastilles Houdé	9, r. Dieu, Paris.
Pastilles Méry	16, r. de Rocroy, Paris.
Pastilles Miraton	6, r. Rosenwald, Paris.
Pastilles Vichy-Etat	24, boul. Capucines, Paris.
Pâte Berthé	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Pâtes Jane	2, r. Marché des Blancs-Manteaux, Paris.
Pâtes lacto-maltées du Dr Jacquet	89, r. de Rivoli, Paris.
Pâte thionique Rambaud	38, r. Gay-Lussac, Paris.
*Patholysine	12, r. Emilio-Castelar, Paris.
Pausodyne	98, r. d'Angoulême, Paris.
*Paveron Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
Pebromon Henry	39, r. Sclessin, Liége.
Pectin	17, r. Cadet, Paris.

*Pellicules radifères du Dr Vallet	22, r. de la Sorbonne, Paris.
*Pélospanines	FOURNIER Frères, 26, boul. de l'Hôpital, Paris.
*Pepiodon Henry	39, r. Sclessin, Liége (Belg.).
*Pepsodia	12, r. des Appenins, Paris.
*Peptalmine	21, r. Chaptal, Paris.
*Peptodiase	ZIZINE, 11, r. Capri, Paris.
*Pepto-fer du Dr Jaillet	DARASSE 13 r. Pavée Paris.
*Peptokola Robin	13, r. de Poissy, Paris.
*Peptonal	DURET et REMY, à Asnières (Seine).
*Peptonate de fer Robin	13, r. de Poissy, Paris.
Peptone Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Peptone Catillon	3, boul. Saint-Martin, Paris.
Peptone Chapotaud	VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
*Peptone Vassal	28, r. Hôpital-Militaire, Lille.
Peptosodine	46, Gde-Rue, Boulogne-s.-M.
*Peptozym	90, av. des Ternes, Paris.
*Peraziodol	37, r. de Bourgogne, Paris.
Péricols Legros	74, r. Raspail, Bois-Colombes.
*Péristaltine Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
*Perles Taphosote	3, r. d'Edimbourg, Paris.
Peroxydines	135, r. de Rome, Paris.
*Persodine Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
Pertussin Salle	4, r. Elzévir, Paris.
*Perubore	1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Phagocytine Bureau	26, r. Saint-Claude, Paris.
*Phagolysine	14, r. Cantin, Courbevoie.
*Phagostyl	A. PARIS, 4, r. La-Motte-Piquet, Paris.
*Phagostyl Mangané	A. PARIS, 4, r. La-Motte-Piquet, Paris.
*Pharmetan	68, r. Berkandæl, Bruxelles.
Phénalgéine	29, r. de Metz, Toulouse.
Phénaseptyl	4, pl. Wilson, Limoges.
Phénol Bobœuf	47, r. de Rome, Paris.
*Phiamine Coursaget	9, r. Porte-Côté, Blois (L.-et-Cher).
Philocardine	25, r. Petits-Hôtels, Paris.
*Philogastrine	34, r. Saint-Lazare, Paris.
Phlyctol	37, r. de Bourgogne, Paris.
Phos	213, r. St-Honoré, Paris.
Phoscalgène	à Châteauroux (Indre).
Phosféryl Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
*Phosoforme	37, r. de Marly, Rueil
*Phosol Quinet	143, r. du Temple, Paris.
*Phosote Lambiotte	3, r. d'Edimbourg, Paris.
*Phospharsol	41, r. de Verneuil, Paris.
Phospharsinol	MORAND, à Auray.
*Phospharsyl colloïdal du Dr Pinard	88, boul. Saint-Denis, Courbevoie.

*Phosphate Vital de Jacquemaire	à Villefranche (Rhône).
*Phosphate Pinard	88, bd St-Denis, Courbevoie.
Phosphatine Falières	6, r. de la Tâcherie, Paris.
*Phosphobrom	22, r. Poncelet, Paris.
*Phospho-Fluor-Beynet	165, r. Saint-Honoré, Paris.
*Phospho-Gaiacol Mary	32, r. de l'Ouest, Paris.
*Phosphogénase	37, r. Tivoli, Bordeaux.
Phosphogène Favrichon	à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire). (Voir : Produits diététiques Favrichon).
Phospho-Iodine	46, Gde-Rue, Boulogne-s.-M.
*Phosphopinal Juin	10, impasse Milord, Paris.
Phosphorescine Leker	13, r. Marbeuf, Paris.
Phospho-Serum	r. Dupont-des-Loges, Rennes
Phosphotal Clin	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
*Phostaniol	à Fesches-le-Châtel.
Phostanno-Gaïacol	93, r. Nollet, Paris.
*Phostyl	Lab. PY, 58, bd R.-Wallacé à Puteaux.
Phydermol	70, r. Boucicaut, Fontenay-aux-Roses.
*Phylactone Byla	26, av. Observatoire, Paris.
*Phyllosan	9, pl. de la Paix, Mulhouse.
Physéine Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
*Physioscyamine	44, r. Gambetta, Biarritz.
*Physiosthénine	37, r. de Marly, Rueil.
*Phytinate de Quinine Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
*Phytine Ciba	id.
*Phytogénine Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Phytol	3, r. Chanez, Paris (XVIe).
Phyto-Tanin	Dr A. Petit, à Angoulême.
Phytothérapie Coirre	5, bd Montparnasse, Paris.
Pilules antidiabétiques Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Pilules Bengué	47, r. Blanche, Paris.
*Pilules Blancard	64, r. La Rochefoucauld, Paris.
Pilules Bosredon	GIGON, 7, r. Coq-Héron, Paris.
Pilules de Brides	41, r. de Verneuil, Paris.
Pilules Coulpier	30, r. Louis-le-Grand, Paris.
*Pilules du Dr Debouzy	LONGUET, 34, r. Sedaine, Paris.
Pilules Doumer	à Annonay (Ardèche).
Pilules Eparvier	26, Grande-Rue, Lyon.
*Pilules Gip	11, r. Joseph-Bara, Paris
Pilules Hardy	13, r. Minimes, Le Mans.
*Pilules hélénnes Naud	37, r. Pajol, Paris.

*Pilules d'Hermal	28, r. Saint-Claude, Paris
Pilules Laville	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
*Pilules du Dr Séjournet	62, r. de la Tour, Paris.
Pilules Lartigue	78, faub. Saint-Denis, Paris.
*Pilules Leman	14, r. Palais-Grillet, Lyon.
*Pilules lithuranées du Dr Boveil	1, r. Lassale, à Lyon.
Pilules de Moussette	20, r. Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Pilules Nella	4, r. Jean-Goujon, Paris.
Pilules Occ	87, r. Lafayette, Paris.
*Pilules Philippe	14, r. Palais-Grillet, Lyon.
*Pilules Purgatives du Dr Dehaut	147, faub. Saint-Denis, Paris.
Pilules de Quassine Frémint	6, r. Abel, Paris.
*Pipérazine Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Pipérasol Tissot	34, boul. de Clichy, Paris.
Piscidia Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Pituglandol Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
*Pituilobine Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Pixol Koehly	7, r. Rodier, Paris.
Placenta Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
*Plagéine Soulas	119, r. de Sèvres, Paris.
Plasma de Quinton	54, r. Saint-Honoré, Paris.
Plasone Vaurs	72, av. Kléber, Paris.
Pluribiase	8 av. Parc-Montsouris Paris.
*Plurion Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
Pneumobiol	27, r. Cavenne, Lyon.
Pneumo-calcine	11, r. Torricelli, Paris.
*Pneumocratol	147, faub. Saint-Denis, Paris.
*Pneumogéine Renard	142, av. de Clichy, Paris.
*Pneumostyl Daguin	à St-Maur, (Seine).
Pneumotanic Grémy	14, r. de Clichy Paris.
Podophylle Coirre	79, r. Cherche-Midi, Paris.
*Poliol Churchill	12, r. Castiglione, Paris.
Polvista	6, r. Trencavel, Béziers.
Polybromure Gonnon	14, r. Victor-Hugo, Lyon.
Polycine	GAILLON, 112, bd Voltaire, Paris.
*Polyferments	LALEUF, 20, r. Laos, Paris.
Polyformiate Couturieux	18, av. Hoche, Paris
*Polyminéral Fort	13, r. Lacharrière, Paris
Polyveinine	JAUME, Tamaris (Gard).
*Pommade adrénostyptique Midy	Labor. MIDY, 4, r. du Colonel-Moll, Paris.
Pommade Cuticura	3, av. Lowendal, Paris.
*Pommade Formet à l'Insuline	INSTITUT DE MICROBIOLOGIE, Sarrebruck.

*Pommades Kléos	2, r. des Cordeliers, Meung-sur-Loire.
*Pommade Lenoir	13, r. Emilio-Castelar, Paris.
*Pommade Logeais	24, r. Silly, Boulogne-s.-S.
Pommade Quartier	34, r. de Paris, Essonne (Seine-et-Oise).
*Pommade Radine (pour brûlures)	DUCLOS, Evreux (Eure).
Pommades Royer	225, r. Saint-Martin, Paris.
Potion Boissel	4, cours Cicé, Bordeaux.
Potion Bonnet	17, r. Cadet, Paris.
Poudre américaine Leroy	20, r. La Rochefoucauld, Paris.
Poudre antiasthmatique Henry	39, r. Sclessin, Liége.
*Poudre Escouflaire	à Baisieux (Nord).
Poudre Klappa	pl. Cathédrale, Sens.
Poudre de Lausanne (Voir : *Isotonyl*)	87, r. Lafayette, Paris.
Poudre de viande Rousseau	15, r. Immeubles-Industriels Paris.
Poudre du Dr Cléry	53, b. Saint-Martin, Paris.
Poudre Espic	20, r. Saint-Lazare, Paris.
*Poudre Génia	136, r. Chemin-Vert, Paris.
*Poudre Gynule	CH. DEHAY, à Arras.
Poudre Lartigue	78, f. Saint-Denis, Paris.
*Poudre laxative de Vichy	6, r. de la Tâcherie, Paris.
*Poudre Paterson	46, r. de Saintonge, Paris.
Poudre purgative Künckel	3, r. Watteau, Courbevoie.
Poudre Rhodys	97, bd St-Germain, Paris.
*Poudre Satine	11, r. Joseph-Bara, Paris.
Poudre Stear	34, r. Thiers, Gray.
*Préventyl	40, r. d'Enghien, Paris.
*Prézymase	LEBOIME, 19, r. Franklin.
Procuta Brisson	114, av. Michelet, St-Ouen.
*Produits Benedictus	17, r. Duguay-Trouin, Paris.
*Produits Billault	4, pl. de la Sorbonne, Paris.
*Produits Chanteaud	54 r. Francs-Bourgeois Paris.
*Produits diététiques	FAVRICHON, à Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).
*Produits Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Produits Go y	51, r. Mathurins, Paris.
Produits de Malt	5, r. Labroque, Strasbourg.
*Produits organiques Richard	79, av. d'Orléans, Paris.
*Produits Pennès	BOUTY, 3, r. de Dunkerque, Paris.
Progyne Thelliez	83, r. Maubeuge, Paris.
Propidon	Etab. POULENC, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.

*Prosthénase Galbrun	8, r. du Petit-Musc, Paris.
*Protaminol Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Protéobiol Vaurs	72, av. Kléber, Paris.
Protéol	5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
Prothéine	29, pl. Bossuet, Dijon.
Protiode Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
*Protiodyne	29, pl. Bossuet, Dijon.
Protyline Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
*Proveinase	MIDY Frères, 4, r. du Colonel-Moll, Paris
Provenine	4, cité Magenta, Paris.
*Proxytases	Labor. des PROXYTASES, 97, r. de Vaugirard, Paris.
*Proxytol	id.
Pruneline Bost	à Villefranche (Rhône).
Psinase Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
Pulmine Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Pulmobules Hyva	12, r. Grande, Evreux.
*Pulmocardine	57, r. Origet, Tours.
*Pulmogyl	33, r. Lauriston, Paris.
Pulmone	Lab. DARDENNES, Tours.
Pulmonine Bouty	3 *bis*, r. de Dunkerque, Paris.
Pulmosérum Bailly	15, r. de Rome, Paris.
Pulmostéryl	à Châteauroux (Indre).
*Pulvéol	10, impasse Milord, Paris.
Punch Novela	St-Julien-en-Jarez (Loire).
*Purganol Daguin	5, r. Remises, St-Maur (S.).
Purgos	LAVERGNE, à Vichy.
Purgyl Koehly	7, r. Rodier, Paris.
*Pyoformine	Lab. GOBEY, 21, r. Aumale, Paris.
Pyramidon U. R.	21, r. Jean-Goujon, Paris.
*Pyratone	71, b. Saint-Michel, Paris.
Pyrélaine Collas	15, r. Augustin-Thierry.
*Pyréthane	18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
*Pyroléol Edet	21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
Pyrothéine	3, r. de Paris, Auxerre.

Q

*Quassia-Kina Rabot	49, r. Bitche, à Courbevoie,
Quassine Frémint	6, r. Abel, Paris.
*Quassine Houdé	9, r. Dieu, Paris.
Quiétol	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Quiétyl	1, pl. Victor-Hugo, Paris.
*Quina Baron	P. FOURNIE, 3, pl. Miséricorde, Lyon.

Quina-fer Mechling	à Mulhouse.
Quina Laroche	COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
*Quinarsol Grandval	12 et 14, r. Féry, Reims.
*Quinby	P. AUBRY, 54, r. Bienfaisance, Paris.
*Quinéine	21, r. Chatpal, Paris.
*Quinicardine	Lab. NATIVELLE, 49, bd Port-Royal, Paris.
*Quinimuthol Saca	11, r. Beautreillis, Paris.
Quinine Pelletier	VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
Quinium Roy	81, boul. Suchet, Paris.
*Quinoforme Lacroix	37, r. Pajol, Paris.
*Quinoïdine Duriez	20, pl. des Vosges, Paris.
Quinol	STEINER, St-Marcel (Eure)
Quinquina Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Quinquina granulé Astier	45, r. du Docteur-Blanche, à Paris.
Quinquina Watelet	15, av. Montsouris, Paris.
*Quinsal	34, r. Thiers, Gray.
Quiphos Churchill	12, r. Castiglione, Paris.
*Le Quotidien	A. Chartier, à Saumur.

R

*Radiolysine	41, r. de Rome, Paris.
*Radiopaque	Heudebert, à Nanterre.
Radiosérum Jaboin	24, r. Montessuy, Paris.
Radiotétrane	40, r. Bellechasse, Paris.
Radipirine	9, r. Victor-Letalle, Paris.
Radjunal Chevrier	21, faub. Montmartre, Paris.
*Raisin vivant (Nutrobiase)	10, r. Cimarosa, Paris.
Rami-gouttes	à Levallois-Perret.
Ravix	CRAISSON, 14, r. J.-J.-Rousseau, Paris.
Réaline	GUILLAUME, Issoudun,
*Réalphène	Établis. BUISSON, 157, r. de Sèvres, Paris.
*Réargon	41, r. de Rome, Paris.
*Reconstituant Mary	32, r. de l'Ouest, Paris.
*Rectagine	22, r. de la Sorbonne, Paris.
*Rectoline	164, r. Saint-Honoré, Paris.
*Rectopanbiline	Labor. de la PANBILINE, à Annonay (Ardèche).
Rectoplasme	MILLET, à Rambouillet.
Rectosol	164, r. Saint-Honoré, Paris.
*Regyl	8, r. Richer, Paris.
Rein - Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.

Renetol	DUVAL, à Falaise.
***Rénotanic Grémy**	14, r. de Clichy, Paris.
***Réparateur Thuau**	22, faub. St-Michel, Angers.
***Résyl**	1, pl. Morand, Lyon.
***Réthragine**	22, r. la Sorbonne, Paris.
Retropituine Carrion	54, f. Saint-Honoré, Paris.
Retusol	119 bis, av. Ch.-de-Fer, Rueil (Seine-et-Oise).
Révulsif Boudin	6, r. du Moulin, Vincennes.
***Révulsif Milko**	60, cours Emile-Zola, Lyon.
Révulsior	PAULIN & BARRE, Tours.
***Rhagadine Bracquemond**	105, r. de Normandie, Courbevoie (Seine).
Rhamnine Henry	39, r. de Sclessin, Liége.
***Rhéantine Lumière**	9, cours de la Liberté, Lyon.
Rhésal-Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
Rhinadrol	A. FALVY, 40, r. des Acacias, Paris.
***Rhinolin**	81, av. Malakoff, Paris.
Rhino-Pro	4, cité Magenta, Paris.
***Rhizotanin**	56, boul. Ornano, Paris.
Rhodarsan	USINES DU RHONE, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
***Rhodazyl**	id.
Rhodocaïne Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
***Rhoféine**	USINES DU RHONE, 21, r. Jean-Goujon, Paris.
***Rhomnol Leprince**	62, r. de la Tour, Paris.
***Ricéyl Billault**	22, r. de la Sorbonne, Paris.
***Ricigel**	ROBERTS & Cie, 5, r. de la Paix, Paris.
Ricinopalmine	5, boul. des Brotteaux, Lyon.
***Riodine Astier**	45, r. du Dr-Blanche, Paris.
***Rob Oberlin**	TINARDON, 17, r. Cadet, Paris.
Rosanol	L. HINGLAIS, à Epernay.
***Royérine Dupuy**	223, r. Saint-Martin, Paris.
***Rozoderme**	11, r. des Deux-Ponts, Paris.
Rutonal	Etab. POULENC, 86, rue Vieille-du-Temple, Paris.
***Rythmosystol**	COMTE, 60, r. St-Guilhem, à Montpellier.

S

Salasenyl	23, r. d'Ouessant, Paris.
Salas-Embrocation	23, r. d'Ouessant, Paris.
Salbine du Dr Fayès	3, r. du 4-Septembre, Paris.
***Salénal Ciba**	1, pl. Morand, Lyon.
***Saléne Ciba**	id.

Salicaïne	168, b. Saint-Germain, Paris.
*Salicaire Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
Salicaire Henry	39, r. de Sclessin, Liége.
Salicarine Viel	7, r. Saint-Yves, Rennes.
Salicéral Clin	20, r. Fossés-St-Jacques.
Salicol Dussaule	6, r. Abel, Paris.
*Salins du Jura	11, av. de l'Opéra, Paris.
*Salubrine Phénix	14, r. de Birague, Paris.
*Salvatyl	24, r. de Ponthieu, Paris.
*Salvenase Legoux	10, r. de Turenne, Paris.
Salvone	37, r. Frédéric-Fays, Lyon.
*Salsanos	5, r. de la Paix, Paris.
Salvoxyl	237, r. Lafayette, Paris.
*Salyptol Narty	134, boul. Péreire, Paris.
*Salysérum	37, r. de Marly, Rueil.
*Sambul Gondard	à Evreux (Eure).
*Sanas	72, r. du Commerce, Paris.
*Sanex Inhalant	BOISSY, 49, r. Hoche, Courbevoie (Seine).
Sanguifer Bouret	87, r. Lafayette, Paris.
*Sanguil	12, r. Saint-Gilles, Paris
Sangul Dubat	80, faub. Saint-Denis, Paris.
*Sanka Delarbre	2, sq. Desnouettes, Paris.
*Sanoformine	1, pl. Victor-Hugo, Paris.
*Sanogyl	3, r. Maublanc, Paris.
Sanoram	id.
Santal Blanc	à Narbonne (Aude).
Santal Bretonneau	6, r. Saint-Claude, Paris.
Santal Clin	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
*Santal Midy	8, r. Vivienne, Paris.
*Santal Monal	6, r. Bridaine, Paris.
Santalol Montagu	49, boul. Port-Royal, Paris.
Santal Oberlin	17, r. Cadet, Paris.
Santal P. Petit	12, bd Saint-Martin Paris.
Santal salolé Lacroix	31, r. Philippe-de-Girard.
Santéine Montagu	49, boul. Port-Royal, Paris.
*Santhéose	4, r. du Roi-de-Sicile, Paris.
Santogénol Caubin	9, r. des Pyramides, Paris.
*Sapolan	34, r. de Turin, Paris (VIIIe).
Sapogynol	36, r. des Martyrs, Paris.
Sarkol	à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne).
Saturol	5, av. des Tilleuls, Paris.
Sauge Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
Savons Denisol Brisson	114, av. Michelet, St-Ouen.
*Savons Mollard	2, r. du Marché-des-Blancs-Manteaux, Paris.
*Savon Perusol	61, r. Vaugirard, Paris.
*Scillarène	SANDOZ, 5, r. Metz, Paris.
*Scléramine Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
Sclérobyl	65, av. Victor-Hugo, Paris.

Sclérolysine	191, r. Saint-Honoré, Paris.
*Scléroserum	114, r. Temple, Paris.
*Scléroveine Hardy	Ph. de Genève, 142, bd St Germain, Paris.
Scorogènes	COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Scurénaline	21, r. Jean-Goujon, Paris.
*Scurocaïne	id.
*Scuroforme	id.
*Sécacornine Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Sédacrine Crestey	164, r. Saint-Honoré, Paris.
Sédatine Christiaens	à Reims.
*Sédatose Gigon	7, r. Coq-Héron, Paris (1er).
*Sédatuline	E. LEROUX, Caudebec-les-Elbeuf (Seine-Inférieure).
*Sedlitz Ch. Chanteaud	54, r. Francs-Bourgeois, Paris (V.: Prod. Chanteaud).
*Sédobrol Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
*Sédogastrine	ZIZINE, 11, r. Capri, Paris.
Sédogène Sallé	14, r. des Pyramides, Paris.
*Sédol Buisson	157, r. de Sèvres, Paris.
*Sédoneurol	66, r. Nationale, Lille.
*Sédosine	38, b. Bourdon, Neuilly-s-S.
Sektal Grémy	34, r. Sedaine, Paris.
Sels Clarks	16 *bis*, r. Vivienne, Paris.
*Sel digestif Bé Me Cé	21, r. Violet, Paris.
Sel de fruit Crolas	56, ch. de Combe-Blanche, Lyon.
Sels Le Perdriel	11, r. Milton, Paris.
*Sel hépatique U. N. Arque vaux	à Etampes (Seine-et-Oise).
*Sel de Hunt	16, r. Boulainvilliers, Paris.
Sel Jolivet	140, r. Saint-Honoré, Paris.
Selnos Vichy	25, r. Drouot, Paris.
Sels naturels de Brides-les-Bains	41, r. de Verneuil, Paris.
Sel Vichy-Etat	24, b. des Capucines, Paris.
*Séléniol Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
Selvan Couturieux	id.
Sel Zem	85, r. Turbigo, Paris.
Sénophile Foucher	64, r. La Rochefoucauld, Paris.
*Septicémine Cortial	15, bd Pasteur, Paris.
Séquardine Bouty	3 *bis*, r. de Dunkerque, Paris.
Sérénol	11, rue Torricelli, Paris.
*Séro-comprimés Mérieux	63, r. Victor-Hugo, Lyon.
*Serodausse antitoxisenyl	4, r. Aubriot, Paris.
Séroferrine	52, r. La Bruyère, Paris.
Séroléine	C. BARON, aux Sables-d'Olonne (Vendée).

*Seroma	12, r. Montmartre, Dijon.
*Séro-Sérum Rivier.	26-28, r. St-Claude, Paris.
Sérosthényl Bouty	3 *bis*, r. de Dunkerque Paris.
*Sérum antiasthmatique de Heckel	CORBIERE, 27, r. Desrenaudes, Paris.
Sérum antiphymique Vadam	(Voir : Antiphymine).
Sérum antityphoïdique de Rodet	Labor. AGUETTANT, 36, q. Fulchiron, Lyon.
Sérum Collyre	26, av. Observatoire, Paris.
*Sérums Fraisse	8, r. Jasmin, Paris.
Sérums de l'Institut Mérieux	17, r. Bourgelat, Lyon.
Sérum Oliviero	87, r. Denfert-Rochereau, Paris.
Serum polymicrobien	ADLER, 36, r. Francs-Bourgeois, Paris.
*Sérum végétal	Dr CUGUILLERE, 19, r. des Chalets, à Toulouse.
*Séti	P. BRISSON & Cie, 74, r. Championnet, Paris.
Sicopion	26, r. Lafayette, Paris.
*Sidérarsan	A. POURSAIN, 2, av. des Tilleuls, Melun (S.-et-M.).
Sigmoïdine Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
Sigol	à Saint-Fons (Rhône).
*Silguine	1, r. Raynouard, Paris.
*Silicyl	18, r. Ernest-Rousselle, Paris
*Silisode	22, r. des Bernardins, Paris.
Simocalcine	CHARMASSON, à Marseille.
*Sinahin	15, r. d'Argenteuil, Paris.
Sinapisme Rigollot	13, r. Pavée, Paris.
*Sinaplasme du Dr Faure	DUSSUEL & FAURE, à Aix-les-Bains.
Sinrénaline	66, r. Nationale, Lille.
Sirodion	228, r. de Paris, à Montreuil-sous-Bois.
Sirop d'Aconit Ecalle	157, r. de Sèvres, Paris.
Sirop antiasthmatique Favrot	BLOTTIERE, 6, r. Dombasle, Paris.
Sirop d'Aubergier	COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Sirop Berthé	8, faub. Saint-Denis, Paris.
*Sirop de Blancard	64 r La Rochefoucauld Paris.
Sirop Blottière	6, r. Dombasle, Paris.
*Sirop Brahma	COULLOUX, 116, r. du Pont, à Auxerre (Yonne).
Sirop Briant	131, r. Vaugirard, Paris.
Sirop de Broméine	MONTAGU, 49, boul. Port-Royal, Paris.
Sirop Buci	COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.

Sirop Burgal	12, r. Sévigné, Paris.
Sirop carbolique du Dr Vialle	87, r. Lafayette, Paris.
*Sirop composé aux Hypophosphites Fellows	5, r. de la Paix, Paris.
*Sirop Crosnier	6, r. Chanoinesse, Paris.
Sirop Delabarre	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Sirop Derbecq	74, b. Beaumarchais, Paris.
Sirop de digitale	LABELONYE, 99, r. d'Aboukir, Paris.
Sirop du Dr Dubreuil	37, r. Gallilée, Paris.
Sirop de Dusart	VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
*Sirop Famel	18 à 22, r. des Orteaux, Paris.
Sirop ferrug. Laroze	2, r. des Lions, Paris.
*Sirop Gélineau	MOUSNIER, à Sceaux.
Sirop Gelvart	24, r. Bagnolet, Paris.
Sirop de Gibert	Maisons-Laffitte (S.-et-O.).
Sirop Gigon	7, r. Coq-Héron, Paris.
Sirop Girard	48, r. d'Alésia, Paris.
*Sirop Gribell	19, r. Drouot, Paris (IXe).
Sirop Grimault	VIAL, 8, r. Vivienne, Paris.
*Sirop Guilliermond	131, r. de Vaugirard, Paris.
Sirop du Dr Hecquet	49, boul. Port-Royal, Paris.
Sirop d'Hémoglobine Byla	26, av. Observatoire, Paris.
*Sirop d'Hémoglobine Henry	39, r. Sclessin, Liége.
Sirop d'Hémoglobine Star	2, r. Marché des Blancs-Manteaux, Paris.
Sirops Henry	39, r. Sclessin, Liége.
Sirop Henry Mure	71, r. Saint-Jacques, Paris.
Sirop d'Iodéine	49, boul. Port-Royal, Paris.
Sirop Jane	2, r. Marché des Blancs-Manteaux, Paris.
Sirop Jolivet	140, f. Saint-Honoré, Paris.
*Sirop Lambert	25, r. Petits-Hôtels, Paris
Sirop de Lamouroux	73, r. Sainte-Anne, Paris.
*Sirop Lanchat	à Fesches-le-Châtel.
*Sirop laxatif Gobey	21, r. d'Aumale, Paris.
Sirop Lecœur	GAVIN, Vimoutiers (Orne).
Sirop du Dr Manceau	à Château-du-Loir (Sahe).
*Sirop de la Maternité	11, r. Joseph-Bara, Paris.
*Sirop Maver	Et. WOLLACKER & Cie, 31, r. St-Georges, Paris.
*Sirop Noguès	11, r. Joseph-Bara, Paris.
Sirop Nourry	20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
*Sirop phéniqué Vial	8, r. Vivienne, Paris.
Sirop polyiodure Gonnon	14, r. Victor-Hugo, Lyon.
*Sirop Prega	66, r. Nationale, Lille.

Sirop Rabuteau	COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Sirop Rami	r. Chaptal, Levallois-Perret.
Sirop Rébillion	6, r. Pas-de-la-Mule, Paris.
***Sirop Reinvillier**	131, r. Vaugirard, Paris.
Sirop Rhegia	BONNAURE, Alais (Gard).
***Sirop Roche au thiocol**	21, pl. des Vosges, Paris.
Sirop de Sirtal	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Sirop de Teyssèdre	34 fb d'Angoulême Limoges.
***Sirop Tinardon**	17, r. Cadet, Paris.
Sirop Vacheron	av. Vallioud, Lyon.
Sirop Vauthier Marcq	98, r. du Chemin-Vert, Paris.
Sirop Zemmette	85, r. Turbigo, Paris.
***Sirtal**	COMAR & Cie, 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
***Sistomensine Ciba**	1, pl. Morand, Lyon.
***Soderseine**	18, r. de Beaune, Paris.
***Sodolactine**	Lab. GERDA, 93, r. Marseille, Lyon.
***Sodothiol**	Labor. de Médecine Expérimentale, Beauvais.
***Solubaïne Nativelle**	49, boul. Port-Royal, Paris.
***Solucamphre Delalande**	13, r. Lacharrière, Paris.
***Soluprotine Roche**	21, pl. des Vosges, Paris.
Solurol	COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
***Solution Bardet**	76, r. de Sèvres, Paris.
Solutions Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Solution Fumouze	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Solution Henry Mure	à Annonay (Ardèche).
***Solution Laroyenne**	7, boul. Denain, Paris.
***Solution Pautauberge**	10, r. de Constantinople, Paris.
Solution Schoum	19, r. St-Roch, Paris.
***Solvuric**	14, r. de Birague, Paris.
***Somalgine**	24, r. Damesme, Paris.
***Somnifène Roche**	21, pl. des Vosges, Paris.
***Somnothyril**	Lab. CANTIN, Palaiseau (S.-et-O.).
Soneryl	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
***Soporalose**	POINTET & GIRARD, 30, r. Francs-Bourgeois, Paris.
***Sornyal**	22, r. de la Sorbonne, Paris.
Sorol Churchill	12, r. Castiglione, Paris.
Spartéine Houdé	9, r. Dieu, Paris.
Spasma Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
***Spasmalgine Roche**	21, pl. des Vosges, Paris.
***Spasmine Solly**	27, r. Mazarine, Paris.

*Spasmosédine	6, r. d'Assas, Paris.
*Spécific Brachat	Lac. chimico-pharmac., à Livry-Gargan (S.-et-O.).
*Spécifique Bejean	12, r. Hospitalières St-Gervais, Paris.
*Spectrol	71, av. Victor-Emmanuel III Paris.
Sphérulines "Moncour"	46, av. Victor-Hugo, Boulogne-s S.
Spiralgine	Lab. Servier, Orléans.
Spirillan	23, r. de Berne, Paris.
Splenotanic	GREMY, 14, r. Clichy, Paris.
*Spyrolides	19, bd Bonne-Nouvelle Paris.
Stalysine	41-47, r. Dr-Blanche, Paris.
*Stanion Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
*Stanno-Bardane Henry	39, r. Sclessin, Liége.
Stannolip Henry	39, r. Sclessin, Liége.
*Stannoxyl	37, r. de Bourgogne, Paris.
*Staphylase du Dr Doyen	LEBEAULT, 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
*Staphylocide Audras	89, boul. Victor-Hugo, Calais.
*Staphylo-coccine Fraquet	21, r. Chaptal, Paris.
*Staphylotanol	55, boul. Strasbourg, Paris.
*Staréol Dupraz	41, r. Etienne-Marcel, Paris.
Stéarol	M. BONNET, Saint-Etienne.
*Sténergine	4, pl. des Vosges, Paris.
Sténofer Lumière	9, cours de la Liberté, Lyon.
*Sténol Chanteaud	(Voir : Produits Chanteaud).
Sténophyl Vigan	103, r. Saint-Lazare, Paris.
*Stéramine	Lab. Antiseptiques Chlorés, 40, r. Thiers, Le Havre.
Stéridrophil Wuhrlin	à Houdouville (Eure).
Stérilait	10, r. Card.-Mercier, Paris.
*Stérogyl	Lab. Chimiothérapie, 21, r. d'Aumale, Paris.
*Sthénoléine	Lab. L. M. D., 12, r. d'Agueseau, Paris.
Stibial	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Stoehone	37, r. F. Fays, Lyon.
Stomacol Boulet	36, av. Duquesne, Paris.
*Stomal	Lab. PY, 58, bd R.-Wallace, à Puteaux (Seine).
*Stomarine Billault	22, r. Sorbonne, Paris.
*Stomaxines Roxelane	38 *bis*, r. Raphaël, Vanves.
*Stomophile	17 *bis*, av. Parmentier, Paris.
*Stomoxygène	SOULAIRAC, à St-Quentin.
*Stovaïne Billon	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
*Stovarsol	id.
*Strictoforme Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).

*Strophantine et Strophantus Catillon	3, boul. Saint-Martin, Paris.
*Strychhnal Longuet	34, r. Sedaine, Paris.
*Strychnarsitol Robin	13, r. de Poissy, Paris.
*Stupho	38, r. Mainguy, Boudy (S.).
Succharure Leprince	62, r. de la Tour, Paris.
Suc-Durham	14, r. de Birague, Paris.
Succomusculine	10, r. de l'Orne, Paris.
Sucre Edulcor Ferré	142, b. Saint-Germain Paris.
Suc Wiandyl	27, r. Petits-Hôtels, Paris.
Sulfarène	(Labor. du), à Agen.
Sulfarsenol Pluchon	36, r. Claude-Lorrain, Paris.
*Sulfarsinal Lefèvre	52, r. Decamps, Paris (16e).
*Sulfarsiode	F. CARTIER, 12, r. Martinière, Lyon.
Sulfate d'Atropine Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Sulfhydral Ch. Chanteaud	54, r. Francs-Bourgeois, Paris.
Sulfo-benzol	239, f. Saint-Honoré, Paris.
*Sulfo-bore Roy	81, boul. Suchet, Paris.
*Sulfobyl	Lafarge, 6, bd Arago, Paris.
Sulfodermol Rambaud	38, r. Gay-Lussac, Paris.
*Sulfoïdol Robin	13, r. de Poissy, Paris.
*Sulfoléine Rozet	à Vendôme.
*Sulfo-Mésarca Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Sulfo-mol du Dr Fayès	3, r. du 4-Septembre, Paris.
Sulfo-rhinol Fayès	3, r. du 4-Septembre, Paris.
*Sulfurine du Dr Langlebert	9, r. de la Perle, Paris.
*Sulfurion Couturieux	18, av. Hoche, Paris.
*Sulfuryl Monal	6, r. Bridaine, Paris.
Sulphaqua Pépin	9, r. du 4-Septembre, Paris.
Sulphénine Trouette	15, r. Immeubles-Industriels, Paris.
Superol	33, r. Vaugirard, Paris.
*Suppargyre du Dr Faucher	34, boul. de Clichy, Paris.
Suppo-Cuivrol	Matray, Aubières (P.-de-D.).
*Suppo-Gynals	LEES, 124, r. du Bac, Paris.
Suppositoires Chaumel	78, faub. Saint-Denis, Paris.
*Suppositoires Corbière	27, r. Desrenaudes, Paris.
*Suppositoires à l'Esculéol	13, r. Lacharrière, Paris.
*Suppositoires Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
*Suppositoires Logeais	24, r. de Silly, Boulogne-sr-S.
*Suppositoires Pépet	56, boul. Péreire, Paris.
Suppositoires Royer	225, r. Saint-Martin, Paris.
Surrénale-Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Surrénaline Bouty	3 *bis*, r. de Dunkerque, Paris.

Surrénotanic Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
Synase	40, r. des Acacias, Paris.
***Syncaïne Clin**	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
***Synergyl Vadam**	5, r. Brea, Paris.
***Synthol**	15, r. du Bois, Vincennes (Seine).
***Sylcase Grysa**	Pr. chim. du Maine. Le Mans.
Sylvor	4, q. Pasteur, Cette.

T

***Tablettes de Brides**	41, r. de Verneuil, Paris.
***Tablettes Hova**	Lab. Zyma, 4, r. Bellart, Paris.
***Tablettes oxymenthol Perraudin**	Labor. SCIENTIA, 21, r. Chaptal, Paris
***Tablettes Perroud**	7, r. des Archers, Lyon.
Tablettes Renard	GIBAN, à Sens (Yonne).
Tablettes de Phospharsol	17, r. Rochechouart, Paris.
Tablettes de thyroïde	CATILLON, 3, boul. Saint-Martin, Paris.
***Tablettes Zeva**	60, cours Emile-Zola, Lyon.
***Taburol Monal**	6, r. Bridaine, Paris.
***Tænifuge Bardet**	76, r. de Sèvres, Paris.
***Tænifuge du Dr Duhourcau**	10, r. Turenne, Paris.
***Tænifuge Kirn**	DANIEL-BRUNET, 8, r. de la Source, Paris.
Tænifuges Limousin	10, r. du Bac, Paris.
***Tamar Indien Grillon**	13, r. Pavée, Paris.
Tampol Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Tampovules Corbière	27, r. Desrenaudes, Paris.
Tanacétyl Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Tannurgyl	6, r. Delaborde, Paris.
Tanosal	FEIGEL, à Lutterbach (Haut-Rhin).
***Tapo-Madyl**	14, r. Miromesnil, Paris.
Tarbisol	21, r. Jean-Goujon, Paris.
Tartrate Borico-potassique du Dr Gigon	7, r. Coq-Héron, Paris.
***Tartrate Borico-potassique Pachaut**	130, boul. Haussmann, Paris.
Tartro-Bi Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
***Taxol**	11, r. Torricelli, Paris.
***Tébéphaguine**	Institut de Microbiologie, Sarrebruck.
Técarine	92 r. Vieille-du-Temple, Paris.

*Tégéol	20, r. des Martyrs, Paris.
Teinture de Cocheux	36, q. Fulchiron, Lyon.
Tercinol	158, r. Saint-Jacques, Paris.
Tercyn Chéron	à Vincennes.
Térébules Gallier	38, bd Montparnasse, Paris.
*Terkal Monal	6, r. Bridaine, Paris.
Ternose Trouette	15, r. des Immeubles-Industriels, Paris.
Terpine Boveil	9, pl. des Terreaux, Lyon.
Terpine Gonnon	14, r. Victor-Hugo, Lyon.
Terpinol Adrian	9, r. de la Perle, Paris.
*Tetranitrol Roussel	10, r. Washington, Paris.
Testicule - Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Tétralgine Routhier	à Vierzon (Cher).
Thalaphyl	BOUTTET, à Ruffec (Charente-Inférieure).
*Thalassotonine Vadam	5, r. Bréa, Paris.
*Thaolaxine	DURET & REMY, à Asnières.
Thapsia Le Perdriel	12, r. Milton, Paris.
Thé de Brides	41, r. de Verneuil, Paris.
Théinol Bailly	15, r. de Rome, Paris.
*Théïsine Dubat	80, faub. Saint-Denis, Paris.
*Themsaline Zyma	4, r. Bellart, Paris.
Théobromine Guillaumin	13, r. du Cherche-Midi, Paris.
Theobromine Houdé	9, r. Dieu, Paris.
*Théobromine Invar	21, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
Théobromine Rousseau	à Ermont (Seine-et-Oise).
Theobromine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
*Théobromose	10, r. du Plâtre, Paris.
*Théobryl Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
Théosalvine	13, r. Cherche-Midi, Paris.
*Théosalvose	13, r. Cherche-Midi, Paris.
Théosol Rousseau	à Ermont (Seine-et-Oise).
*Théoxanthine	6, r. d'Assas, Paris.
*Thigénol Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
*Thiocol Roche	id.
Thionhydrol Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
*Thiosyl	M. BERGER, à Orléans.
*Thoroxyl	40, r. de Bellechasse, Paris.
Thymus - Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Thymine	11, ch. de la Muette, Paris.
Thymol doré	10, impasse Milord, Paris.
Thymoléine	ABOU, 26, r. Temple, Paris.
Thymusine Byla	26, Observatoire, Paris.
Thyratoxine Byla	id.
Thyrénine Grémy	14, r. de Clichy, Paris.

Thyrocréine Grémy	14, r. de Clichy, Paris.
Thyroïde – Endocrisines Fournier	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Thyroïdine Bouty	3 *bis*, r. de Dunkerque, Paris.
Thyroïdine Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Thyroxine Roche	21, pl. des Vosges, Paris.
*Tiodine Cognet	43, r. de Saintonge, Paris.
*Tisanes Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
Tissus Le Perdriel	11, r. Milton, Paris.
Tochlorine	92 r. Vieille-du-Temple, Paris.
Tonigénine	Labor. à Montrevel (Ain).
*Tonikéine Lematte et Boinot	52, r. Labruyère, Paris (IXe).
Tonilécithine Rogier	56, Bd. Péreire, Paris.
Toniphlébine Hardy	Ph. de Genève, 142, bd St-Germain, Paris.
Toniphosphine	56, r. des Dames, Paris.
Tonique Koenig	37, av. Marceau, Paris.
Toni-sérum Freyssinge	6, r. Abel, Paris.
*Tonudol	LICARDY, 38, boul. Bourdon, Paris-Neuilly.
*Tonyo "F"	VARGAS, 6, r. Chauveau-Lagarde, Paris.
Topique Bertrand	à Oullins (Rhône).
Topiques Chaumel	78, faub. Saint-Denis, Paris.
Topique stomacal Dausse	4, r. Aubriot, Paris (IVe).
*Tot'Hamelis	CHANTEREAU, 8, r. Constantinople, Paris.
*Total-Tonic	29, fb. Bourgogne, Orléans.
*Tréparsol	LECOQ & FERRAND, 14, r. Gravel, Levallois-Perret.
*Tréparsénan	COMAR, 20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
*Trépol	22, r. de la Sorbonne, Paris.
*Trépoquinol	id.
*Triase	4, pl. des Vosges, Paris (IVe).
*Tribromure Gigon	7, r. Coq-Héron, Paris.
*Tricalcine	21, r. Chaptal, Paris.
*Tridigestine Dalloz	13, b. la Chapelle, Paris.
*Tridynol	18, r. Orphéon, Lille.
*Triganol Vigier	12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Triglandyne Bouty	3 *bis*, r. de Dunkerque, Paris.
Triglandol Bouty	id.
*Tri-Iodo-Ercé	37, r. de Bourgogne, Paris.
*Trinitrine Caféinée Dubois	LALEUF, 20, r. du Laos, Paris.
*Trinitrine Roussel	10, r. Washington, Paris.
Trinitrine Vicario	17, boul. Haussmann, Paris.
*Triradol	55, b. Strasbourg, Paris.
*Trisodyl Rozet	BENDERITTER, à Vendôme.

*Tritonine	BRUN & DUMÉE, 64, r. des Tournelles, Paris.
Trixyl Fraudin	4, av. Desfeux, Boulogne-s-S.
*Trophène	48, r. de la Procession, Paris.
*Tubérol	23, r. des Moines, Paris.
*Tubes Dulcis	Dr FERRY, à Bourg (Ain).
*Tubes Ferlux	G. BOUSQUET, à Albi.
*Tubes du Dr Guiraud	98, r. St-Genès, Bordeaux.
Tubes Levasseur	23, r. de la Monnaie, Paris.
Tubes Sals	Oullins (Rhône).
Tuberculine C. L.	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
*Tulle gras Lumière	Cours de la Liberté, Lyon.
Tuya Feuillé	Dr BIDOT, 4, r. du Cirque, Paris.

U

Ulcéobande	11, r. de Jarente, Paris.
*Ulcéoplaque	11, r. de Jarente, Paris.
Ulcérine Berger	F. BOUVIER, Le Chesnay (Seine-et-Oise).
*Ulcérophile Nosan	6 *ter*, r. Voltaire, La Garenne-Colombes (Seine).
Ulmaire Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
*Ulmarène Gigon	7, r. Coq-Héron, Paris.
Ultrargen Leclerc	10, r. Vignon, Paris.
Ultravitamine	Villefranche-sur-Saône.
*Uracétose	26, r. de Sévigné, Paris.
Uralysol	11, r. Torricelli, Paris.
Uraséol	17, r. Cadet, Paris.
*Uraseptine Rogier	56, boul. Péreire, Paris.
*Urazine	21, r. Jean-Goujon, Paris.
*Uréol Ch. Chanteaud	54, r. des Francs-Bourgeois, Paris. (V. : Pr. Chanteaud.).
*Urifluine	4, pl. des Vosges, Paris.
*Urilysone	1, pl. Morand, Lyon.
Urisal du Dr Deschamps	49, av. Lamotte-Picquet, Paris.
*Urisanine	28, r. Milton, Paris.
Urocarbol	GENTON, Petit-Quévilly (Seine-Inférieure).
Urocédrol	GALLO, à Aurillac.
Urocléan	ADLER, 36, r. Francs-Bourgeois, Paris.
*Uroformine Gobey	21, r. Aumale, Paris.
*Uroïodine	45, boul. Lafayette, Calais.
*Urol Neuville	239, faub. St-Honoré, Paris.
Urolithiase	Sté Rég. de l'Ouest, Rennes.
*Urométine Lambiotte	3, r. d'Edimbourg, Paris.

*Uromil	Dr BELIERES, 10, rue Drouot, Paris.
Urophile Bailly	15, r. de Rome, Paris.
*Urosan	12, r. des Sts-Pères, Paris.
*Utéramine Zyma	4, r. Bellart, Paris.
*Uvé	101, r. l'Abbé-Groult, Paris.
*Uvesterol	101, r. l'Abbé-Groult, Paris.
Uviostérine	(Voir : Irrastérine)

V

Vabéol	30, r. N.-D.-des-Victoires, Paris.
*Vaccinothérapie Cépède	60, r. Mathurin-Régnier, Paris.
Vaccins Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
*Vaccins Stené	4, pl. des Vosges, Paris.
Vaccin antigonococcique	OLIVIERO, 87, r. Denfert-Rochereau, Paris.
Vaccin antituberculeux Bossan	Lab. des Indus. Biologiques, 25, r. Royale, Paris.
Vaccins antipollin	26, av. Observatoire, Paris.
Vaccins atoxiques stabilisés	POULENC Frères, 92, r. Vieille-du-Temple, Paris.
*Vaccins atoxiques Cépède	60, r. Mathurin-Régnier, Paris.
*Vaccins Bactériens I. O. D.	Labor. Biochimie Médicale, 16, r. Dragon, Marseille.
*Vaccins Bruschettini	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
Vaccins du Dr Creuzé	1, r. Bonaparte, Paris.
Vaccins Inava	26, r. Pagès, Suresnes (S.).
*Vaccins Lucinia	(Voir : Formo-vaccins).
Vaccins microbiens curatifs	GREMY, 14, r. de Clichy, Paris.
*Vaccins de Ronchèse	7, pl. Cassini, Nice (A.-M.).
*Vaccins de Weill et Dufourt	37, r. de Bourgogne, Paris.
*Vaclydun	LEBOIME, 10, r. Franklin, Paris.
Vacodyl	25, r. Petits-Hôtels, Paris.
Vadérol	DURAND, à Joigny (Yonne
*Valbornine Rogier	56, boul. Péreire, Paris.
*Valéral Puy	à Grenoble (Isère).
Valéramyl Foulon	à Ermont (S.-et-O.).
*Valéraniate Gabail	3, r. de l'Estrapade, Paris.
Valergyl Doucet	r. Gambetta, Bolbec.
*Valérianate Grignon	2, r. Duphot, Paris.
Valérianate Pachaut	130, b. Haussmann, Paris.
*Valérianate Pierlot	26, r. Saint-Claude, Paris.

*Valériane Byla	26, av. Observatoire, Paris.
Valériane Dausse	4, r. Aubriot, Paris.
Valériane Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
*Valériane Pachaut	130, b. Haussmann, Paris.
*Valérianose Gigon	7, r. Coq-Héron, Paris.
*Valerium Thibault	6, r. Rosenwald, Paris.
*Valérobromine Le - grand	13, r. Pavée, Paris.
*Valéromenthol	108, f. Saint-Honoré, Paris.
*Valéronal	BERGER, 14, r. des Pyramides, Paris.
Valimyl Clin	20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
Valtine	12, r. Tour-des-Dames, Paris
Valyl Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
*Vanadarsine Guillaumin	13, r. du Cherche-Midi, Paris.
*Vanadine Chevrier	21, faub. Montmartre, Paris.
*Vanucléol	37, r. Pajol, Paris.
Varicure Marck	à Neuilly-sur-Seine.
*Varilaxine	164, r. Saint-Honoré, Paris.
*Varisclérine	61, r. de Seine, Paris.
Variserum Lebon	à Charost (Cher).
*Vascurol	GUÉRIN, Meulan (S-et-O).
Vasogènes	43, r. Pinel, à Saint-Denis.
*Vasolaxine	26, boul. de l'Hôpital, Paris.
*Végéphos	21, r. Nonnains-d Hyères, Paris.
*Végétol Fournier	8, r. des Quatre-Fils, Paris.
Veinargyre	29, r. des Jardiniers, Montreuil (Seine).
*Veinicura	42, boul. Péreire, Paris.
Veinophiline	27, r. Poids-Farine, Marseille.
*Veinofluine	239, faub. St-Honoré, Paris.
*Veinoserum Abadie	3, pl. St-Michel, Toulouse.
*Veinosine	5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
*Velledol Adrian	9, r. de la Perle, Paris.
*Vénecine	7, r. des Italiens, Paris.
*Véralgine	38, r. du Mainguy, Bondy.
*Vériane Buriat	25, r. Copernic., Paris.
Véroginol	101, av. Mozart, Paris.
*Véronidia Buisson	157, r. de Sèvres, Paris.
*Verrulyse	MIGUET, Villefranche.
*Verticurine	GRIAS, 47, r. Feray, à Corbeil (Seine-et-Oise).
Vésicatoires d'Albespeyres	FUMOUZE, 78, faub. Saint-Denis, Paris.
Vexillan	89, av. Wagram, Paris.
Viburniode	GIRY, 49, r. de Metz, Nancy
Viburnum Gmet	27, faub. Montmartre, Paris.
*Vigardyne	11, r. des Garennes, Chatou.

Vigogastrine	222, r. Duguesclin, Lyon.
Vin d'Anduran	MOUSNIER, à Sceaux.
Vin Aroud	6, r. Dombasle, Paris.
***Vin de Baudon**	12, r. Charles-V, Paris.
Vin Bravais	3, r. Mogador, Paris.
***Vin de Bugeaud**	5, r. Bourg-l'Abbé, Paris.
***Vin de Chassaing**	6, r. de la Tacherie, Paris.
Vin Désyles	Levallois-Perret (Seine).
Vin Girard	48, r. d'Alésia, Paris.
Vin de Kola Midy	4, r. du Colonel-Moll, Paris.
***Vin de Lavoix**	(Voir : Beef Lavoix).
Vin Mariani	41, boul. Haussmann, Paris.
Vin de Moride	LANDRIN, 20, r. de La Rochefoucauld, Paris.
Vin Nourry	20, r. des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
Vin de Séguin	165, r. Saint-Honoré, Paris.
Vin Uranè Pesqui	au Bouscat-Bordeaux.
Vin de Vial	36, pl. Bellecour, Lyon.
Vin Voguet	5, r. Eug.-Delacroix, Paris.
Vioforme Ciba	1, pl. Morand, Lyon.
***Viosten**	Dr LESCENE, 58, r. de Vouillé, Paris.
***Vioxyl Mouneyrat**	Villeneuve-la-Garenne (S.).
Viridol	65, r. Monge, Paris.
***Viscoserum**	55, boul. Strasbourg, Paris.
***Viscum Zyma**	4, r. Bellart, Paris.
Vitaderme Bergonier	122, bd Murat, Paris.
***Vitagéine**	SÉGUIN, 7, r. Ste-Isaure, Paris.
***Vital Extrait**	E. BASSOL, à Ste-Alvère (Dordogne).
***Vitamina**	8, r. Vivienne, Paris.
***Vitamine Rogier**	56, boul. Péreire, Paris.
Vitamyl	4, pl. des Vosges, Paris.
***Vitargyl**	POINTET & GIRARD, 30, r. Francs-Bourgeois, Paris.
Vitazem	85, r. Turbigo, Paris.
Vitosine Décornez	à Ornans (Doubs).
Vitricines Carves	à Chambéry (Haute-Savoie).
Vivassol	78, faub. Saint-Denis, Paris.
***Vivoléol**	69, r. de Wattignies, Paris.
***Vocaldop**	222 faub. St-Martin, Paris.
Voltargol Robin	13, r. de Poissy, Paris.
***Vulcase Brisson**	114, av. Michelet, St-Ouen.
***Vulnérine Bergen**	DUCOQ, Langeais (I.-L.).

X

Xémaderm	59 r. Châteaudun, Paris.

Y

*Yaourtine	16, r. Saint-Gilles, Paris.
*Yogourth (Extrait de)	23-25, r. Singer, Paris.
Yoghourt Karlos	à Lécluse (Nord).
Yoghourt Lactella	à Tourcoing.
Yoghourt Lagnel	7, r. de la Pépinière, Paris.
Yohourth Carrion	54, faub. St-Honoré, Paris.
Yohimbine Gilbert	2, r. du Marché des Blancs-Manteaux, Paris.
Yse	62, r. Louis-Blanc, Paris.
Ystaline	2, pl. du Th.-Français, Paris.

Z

*Zaryl	12, r. des Apennins, Paris.
Zédeno	37, r. de Bourgogne, Paris.
*Zimbyl	12, r. des Apennins, Paris.
Zingal	11, ch. de la Muette, Paris.
*Zohol	11, r. Torricelli, Paris.
Zomol	VIAL, 8, r. Vivienne. Paris.
*Zomo - musculosine Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
Zoomine	4, boul. Malesherbes, Paris.
*Zymatine Lescène	à Livarot (Calvados).


7055-8-28. — Corbeil. Imp. Crété.
BIU SANTE POLE PHARMA PARIS
D 088 197812 4