


ERRATUM

La création de l'Ecole du Service de santé militaire de Strasbourg, par le Médecin-Général R. Izac. (Histoire des Sciences Médicales, X, n° 3-4 1976)

Deux erreurs se sont glissées dans cet article, entre la correction des épreuves et la mise en pages :

— Une facîle à identifier : p. 208, 25^e l. Il fallait lire : Fortoul... ne craignant pas de bousculer les idées reçues... et non : de « basculer » ces idées.

— La seconde nuit à la compréhension du texte : la première ligne du 3^e paragraphe, bien composée à la correction, s'est vue remplacée par la première ligne du 2^e paragraphe. Il faut lire : « Fortoul reconnaît ensuite que le Conseil de santé a raison de se préoccuper... »



**insuffisance
circulatoire
cérébrale**

vadilex

PROPRIÉTÉ PHARMACOLOGIQUE

Vadilex s'oppose à l'action vasoconstrictrice des substances α stimulantes (nor adrénaline en particulier) et rétablit un flux circulatoire normal.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

● Insuffisance circulatoire cérébrale :

Ralentissement intellectuel, perte de mémoire, troubles caractériels ou du comportement, vertiges, troubles auditifs, séquelles d'accidents cérébraux.

● Accidents vasculaires cérébraux aigus :

Hémiplégies, syndromes déficitaires centraux, traumatismes crâniens. Préparation aux interventions de neuro-chirurgie vasculaire et aux artériographies cérébrales.

● Troubles fonctionnels de l'hypertension artérielle.

● Ophtalmologie : rétinopathies vasculaires.

● O.R.L. : accidents vasculaires cochléaires et vestibulaires.

● Artériopathies périphériques, troubles circulatoires des extrémités.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Traitement de fond : 4 à 6 comprimés par jour.

Traitement d'urgence : 1 à 3 ampoules par jour en I.M., I.V. lente ou perfusion ; doit être suivi d'un traitement d'entretien

EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS

- Effet hypotensif chez les sujets âgés et alités ;
- Bouffées de chaleur chez les femmes présentant un syndrome préménopausique.

PRÉSENTATION, COMPOSITION ET PRIX

- Boîte de 30 comprimés dragéifiés dosés à 0,010 g de tartrate d'Ifenprodil. **25,25 F + S.H.P.** A.M.M. 312.961.6.

- Boîte de 10 ampoules de 2 ml dosées à 0,005 g de tartrate d'Ifenprodil. **12,00 F + S.H.P.** A.M.M. 315.698.4.

Remboursés S.S., agréé aux Collectivités et hôpitaux psychiatriques. Tableau C.

Laboratoires ROBERT & CARRIERE, 1 et 1 bis, avenue de Villars - 75341 PARIS CEDEX 07
Direction Médicale : 4-14, rue Ferrus - 75683 PARIS CEDEX 14 - Tél. : 580.55.25.