

sommaire

<i>Société française d'histoire de la médecine</i>	
Procès-verbal de la séance du samedi 25 novembre 1978	7
Procès-verbal de la séance du 16 décembre 1978	9
<i>Allocution du Président sortant</i>	
Docteur Th. Vetter	11
<i>Allocution du nouveau Président</i>	
Professeur J.-C. Sournia	13
<i>1978 : Année Claude Bernard</i>	
Jacqueline Sonolet	17
<i>Notes de Claude Bernard pour la préparation de son Rapport sur les progrès de la physiologie en France (1867)</i>	
Professeur Mirko D. Grmek	21
<i>Une lettre inédite de Déjerine à sa mère le 24 février 1878 sur la mort et les obsèques de Claude Bernard</i>	
Mme le Docteur Y. Sorrel-Déjerine	23
<i>Claude Bernard et Pasteur, Commission du choléra en 1865</i>	
Mlle Denise Wrotnowska	25
<i>Claude Bernard et Madame Raffalovitch</i>	
Docteur F.-J. Beer	33
<i>Colbert, père de la Sécurité sociale de la Marine</i>	
Docteurs J.-J. Dubarry J.-J. Peny, J.-F. Hervier	39
<i>A propos de quatre lettres inédites de Verlaine au Docteur Malbec son médecin pendant sa dernière année (1895)</i>	
Professeur J.-J. Dubarry (Bordeaux)	43

Suite page 5 ➡


spécialités
pharmaceutiques

les laboratoires



DAUSSE

60, RUE DE LA GLACIERE 75621 PARIS CEDEX 13 - TEL. 707 23 79



**insuffisance
circulatoire
cérébrale**

vadilex

PROPRIÉTÉ PHARMACOLOGIQUE

Vadilex s'oppose à l'action vasoconstrictrice des substances α stimulantes (nor adrénaline en particulier) et rétablit un flux circulatoire normal.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES

● Insuffisance circulatoire cérébrale :

Ralentissement intellectuel, perte de mémoire, troubles caractériels ou du comportement, vertiges, troubles auditifs, séquelles d'accidents cérébraux.

● Accidents vasculaires cérébraux aigus :

Hémiplégies, syndromes déficitaires centraux, traumatismes crâniens. Préparation aux interventions de neuro-chirurgie vasculaire et aux artériographies cérébrales.

● Troubles fonctionnels de l'hypertension artérielle.

● Ophthalmologie : rétinopathies vasculaires.

● O.R.L. : accidents vasculaires cochléaires et vestibulaires.

● Artériopathies périphériques, troubles circulatoires des extrémités.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE

Traitement de fond : 4 à 6 comprimés par jour.

Traitement d'urgence : 1 à 3 ampoules par jour en I.M., I.V. lente ou perfusion ; doit être suivi d'un traitement d'entretien.

EFFETS SECONDAIRES ÉVENTUELS

- Effet hypotensif chez les sujets âgés et alités ;
- Bouffées de chaleur chez les femmes présentant un syndrome préménopausique.

PRÉSENTATION, COMPOSITION ET PRIX

- Boîte de 30 comprimés dragéifiés dosés à 0,010 g de tartrate d'Ifenprodil. **25,25 F + S.H.P.** A.M.M. 312.961.6.

- Boîte de 10 ampoules de 2 ml dosées à 0,005 g de tartrate d'Ifenprodil. **12,00 F + S.H.P.** A.M.M. 315.698.4.

Remboursés S.S., agréé aux Collectivités et hôpitaux psychiatriques. Tableau C.

Laboratoires **ROBERT & CARRIÈRE**, 1 et 1 bis, avenue de Villars - 75341 PARIS CEDEX 07
Direction Médicale : 4-14, rue Ferrus - 75683 PARIS CEDEX 14 - Tél. : 580.55.25.