

SOMMAIRE

<i>Société française d'histoire de la médecine</i>	
Procès-verbal de la séance du 24 novembre 1979	7
Procès-verbal de la séance du 15 décembre 1979	9
<i>Société montpelliéraine d'histoire de la médecine</i>	
Premier trimestre 1979	13
Deuxième trimestre 1979	14
Quatrième trimestre 1979	16
<i>Le Professeur J. Enselme</i>	19
<i>Le Docteur A. Finot</i>	23
<i>Hôpitaux et Confrérie des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle à Paris,</i> par le Pr Jean Cheymol	29
<i>Un évadé de la médecine : Jean-Baptiste Charcot,</i> par le Pr G. Lanchou et le Dr C. Véron	43
<i>Le manuscrit 420 de Laon et la médecine carolingienne</i>	
— <i>Le Marcellus de Laon : observations paléographiques et critiques,</i> par B. Merlette, F. Vial, R. Rullière	52
— <i>Les recettes retenues par les Laonnois : observations médicales,</i> par F. Vial, B. Merlette, R. Paris, Ch. Roussel, R. Rullière	61
<i>Duhamel et la médecine,</i> par le Dr Patrick Vieuville	71
<i>J.-Vincent Laborde et son procédé de réanimation par tractions rythmées</i> <i>de la langue. La survie neuro-musculaire après décapitation,</i> par J.-J. Dubarry	77

Suite page 5 →



Depuis plusieurs années,
DAUSSE propose l'association
SOLURUTINE PAPAVERINE
F. RETARD
en thérapeutique
cardiovasculaire.
parce que...

SOLURUTINE PAPAVERINE F. RETARD

protège votre malade
des complications vasculaires

Composition :

Chlorhydrate de Papavérine	0,100 g
Morpholinyléthylrutoside	0,075 g
Acide ascorbique	0,075 g

pour un comprimé dragéifié.

Indications :

■ traitement des troubles liés à : l'hypertension artérielle, à l'artériosclérose, au diabète ■ spasmes vasculaires et leurs conséquences, insuffisance circulatoire cérébrale, rétinienne, coronarienne, périphérique ■ troubles de la perméabilité capillaire.

Posologie :

4 à 6 comprimés par jour, en deux prises, suivant le poids du malade.
Coût moyen de traitement journalier : **2,82 F.**

Contre-indications : en dehors des cas d'insuffisance respiratoire en voie de décompensation, cette spécialité ne présente pas de contre-indications. Une hygiène alimentaire attentive devra être instituée chez certains vieillards prédisposés à la constipation chronique.

Présentation :

boîte de 30 comprimés dragéifiés à strates multiples.
Prix public : **16,95 F** + SHP - Tableau A - Remb. par la Séc. Soc. et Coll. - Admis à l'A.P. - AMM 309.769.0.




LES LABORATOIRES DAUSSE
60, RUE DE LA GLACIERE
75621 PARIS CEDEX 13 - TEL. 589.89.29.
DIRECTION MEDICALE, 27, RUE DE LA
GLACIERE - 75013 PARIS, TEL. 570.15.18

SOMMAIRE (suite)

<i>Réflexions sur les prix Nobel de physiologie ou médecine</i> , par Pierre Nicolle et André Jude	83
<i>Les localisations anatomiques de l'âme au cours des siècles</i> , par Alain Bouchet et J.-L. Masson	95
<i>Le chirurgien-baron François Girardot (1773-1831), un oublié de l'Histoire</i> , par Jean-François Lemaire	107
<i>Les grands fundamentalistes médicaux lillois du début du siècle</i> , par Gérard Biserte	115
<i>Analyses d'ouvrages</i>	123

La cotisation annuelle à la Société française d'histoire de la médecine est de 40 F et l'abonnement à la Revue « Histoire des sciences médicales » est de 120 F.

Paiement par chèque bancaire ou virement au C.C.P. Paris 2208-69, à l'ordre de la S.F.H.M. et adressé au Trésorier, M. P.-A. Delaby, 58, rue de la Glacière, 75013 Paris.



Dans
le domaine
cérébral,
il existe quelques certitudes:
le rôle de la nor-adrénaline
en est une.

Vadilex

Inhibiteur compétitif de la nor-adrénaline.

La preuve est dans l'amélioration des signes.

Propriété pharmacologique. Vadilex s'oppose à l'action vasoconstrictrice des substances α stimulantes (nor-adrénaline en particulier). **Indications thérapeutiques.** Insuffisance circulatoire cérébrale : Ralentissement intellectuel, perte de mémoire, troubles caractériels ou du comportement, vertiges, troubles auditifs, séquelles d'accidents cérébraux. Accidents vasculaires cérébraux aigus : hémiplésies, syndromes déficitaires centraux, traumatismes crâniens. Préparation aux interventions de neuro-chirurgie vasculaire et aux artériographies cérébrales. Troubles fonctionnels de l'hypertension artérielle. Ophtalmologie : rétinopathies vasculaires O.R.L. : accidents vasculaires cochléaires et vestibulaires. Artériopathies périphériques, troubles circulatoires des extrémités. **Mode d'emploi et posologie.** Traitement de fond : 4 à 6 comprimés par jour. Traitement d'urgence : 1 à 3 ampoules par jour en I.M., I.V. lente ou perfusion ; doit être suivi d'un traitement d'entretien. **Effets secondaires éventuels.** Effet hypotensif chez les sujets âgés et alités, bouffées de chaleur chez les femmes présentant un syndrome préménopausique. **Présentations, composition et prix.** Boîte de 30 comprimés dragéifiés dosés à 0,010 g de tartrate d'lfenprodil. **25,90 F + S.H.P.** A.M.M. 312.961.6. Boîte de 10 ampoules de 2 ml dosées à 0,005 g de tartrate d'lfenprodil. **12,30 F + S.H.P.** A.M.M. 315.698.4. Remboursés S.S., agréés aux Collectivités et hôpitaux psychiatriques. Tableau C. **Laboratoires ROBERT & CARRIERE** 1 et 1 bis, avenue de Villars - 75341 PARIS CEDEX 07. Direction Médicale : 4-14, rue Ferrus - 75683 PARIS CEDEX 14 - Tél. 580.55.25.